

LIBRARY

The
Arnold Arboretum
Purchase
June 1971





Illustrated flora
Province Moscow

Parts 1-4

Moscow 1906-1914

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
ФЛОРА
МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

СОСТАВИЛЪ

Д. П. Сырейщиковъ.

D. P. Syreishchikoff

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ А. Н. Петунникова.

ЧАСТЬ I.

МОСКВА.

Издание книжнаго магазина Торговаго Дома Лахтинъ, Сырейщиковъ и К^о.

Москва, Петровскія линіи, домъ Полякова.

1906.



#

Illustrated

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ

Flora

ФЛОРА

Moscow Province

МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

СОСТАВИЛЪ

Д. П. Сырейщиковъ.

Dmitri P. Syreishchikof.

Подъ редакціей А. Н. Петунникова.

Redactor A. N. Petunnikov

ЧАСТЬ I.



МОСКВА.

Изданіе книжнаго магазина Торговаго Дома Лахтинъ, Сырейщиковъ и К^о.

Москва, Петровскія линіи, домъ Полякова.

1906.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

ARNOLD ARBORETUM
HARVARD UNIVERSITY

AK 321.3
.S89

Ch. 1-4



Издательство «Мир» Москва

ARNOLD ARBOREUM
HARVARD UNIVERSITY

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Мысль издать иллюстрированную флору Московской губерніи зародилась очень давно у Алексѣя Николаевича Петуникова, и почти всѣ клише къ этому изданію были уже готовы, когда онъ при детальной обработкѣ матеріала натолкнулся на цѣлый рядъ формъ, требовавшихъ критическаго пересмотра. Отложивъ обработку московской флоры, А. Н. Петуниковъ принялся за изученіе этихъ формъ, результатомъ чего явился его „Критическій обзоръ московской флоры“, занявшій изданіемъ своимъ почти 10 лѣтъ. Окончивъ эту свою капитальную работу, А. Н. намѣревался уже привѣяться за флору, но обстоятельства заставили его на нѣкоторое время совѣтъ отложить ботаническія занятія.

Тогда явилось у меня намѣреніе осуществить планъ Алексѣя Николаевича, который отнесся къ выполненію его въ высшей степени сочувственно и передалъ мнѣ всѣ свои матеріалы, за исключеніемъ рисунковъ, клише къ которымъ за это время были утрачены.

Пользуюсь случаемъ, чтобы высказать мою искреннѣйшую благодарность А. Н. Петуникову за его совѣты, за разрѣшеніе воспользоваться его ключомъ для опредѣленія семействъ и за синонимiku, которая почти вся цѣликомъ была имъ составлена, такъ что мнѣ пришлось дополнить ее лишь по новѣйшимъ работамъ.

Считаю также своимъ долгомъ выразить тутъ же живѣйшую признательность профессору М. И. Голенкину за предоставленіе мнѣ возможности пользоваться гербаріемъ и библіотекой Ботаническаго кабинета Московскаго университета.

Нѣкоторыя прежнія мѣстонахожденія, упомянутыя въ книгѣ, теперь уже утратили свое значеніе, каковы: Симоновъ монастырь, Анненгофская роща, Красный прудъ, Бутырскій прудъ и другія; тѣмъ не менѣе они мною приводятся какъ мѣста, на которыхъ были въ прежнее время находимы данныя растенія.

Большая часть рисунковъ для клише заимствована мною изъ большихъ иллюстрированныхъ изданій, и только немногіе срисованы съ гербарныхъ экземпляровъ. Клише дѣлать въ Москвѣ В. Петуниинъ.

Матеріалы, которыми я пользовался слѣдующіе:

- 1) Замѣтки А. Н. Петунникова.
- 2) Его обширный гербарій.
- 3) Мой гербарій, который я собиралъ 20 лѣтъ.

4) Гербарій А. А. Хорошкова, превосходно собранный и очень точно опредѣленный, за пользованіе которымъ приношу мою глубокую благодарность, а равно и за многія указанія по детальной разработкѣ нѣкоторыхъ видовъ.

- 5) Гербарій Б. М. Кулькова.

- 6) И, наконецъ, вся литература по московской флорѣ.

Весь трудъ будетъ состоять изъ трехъ частей: въ первую часть войдутъ высшія тайнобрачныя, голосѣмныя и односѣменодольныя; во вторую — двусѣменодольныя, подклассъ Archichlamydeae и въ третью часть—подклассъ Sympetales.

Въ порядкѣ изложенія я слѣдовалъ Ашерсону и Гребнеру въ ихъ сочиненіяхъ: *Flora des Nordostdeutschen Flachlandes* (Berlin, 1898—99) и *Synopsis der Mitteleuropäischen Flora*.

Д. Сырейщиковъ.

17 марта 1906 г.
Москва.

Литературные источники.

- Pal. — Pallas. Enumeratio plantarum quae in horto D-ni Procopii a Demidoff Moscuæ vigent. Petropoli. 1781.
- St. I. — Stephan. Enumeratio stirpium agri mosquensis. Mosqua. 1792.
- St. II. — Stephan. Nomina plantarum, quas alit ager mosquensis et hortus privatus. Petropoli. 1804.
- Lon. G. — Londres. Flora Gorinkensis. Note de quelques plantes aux environs de Gorenki et qui n'y sont point encore observées.—Mém. de la Soc. des nat. de Mosc. T. I. 1806, p. 113—115.
- Lon. — Londres. Seconde note de quelques plantes qui croissent aux environs de Gorenki et qui n'y sont point encore été observées. Ib. p. 282—283.
- Hoff. — Hoffmann. Hortus Mosquensis. Mosq. 1808.
- Lib. Tr. — Liboschitz et Trinius. Flore des environs de St. Petersbourg et de Moscou. Tome I. St. Petersb. 1811.
- Ad. — Adams. Enumeratio stirpium agri Mosquensis et Petropolitani (1813).
- Mart. — Martius. Prodrum Florae mosquensis. Editio altera. Lipsiae. 1817.
- Gold. Sp. — Goldbach. Spicilegium Florae Mosquensis,—Mém. de la Soc. des nat. de Mosc. T. V. 1817. p. 117—141.
- Либосицъ и Триниусъ. Флора С.-Петербургская и Московская. Сиб., 1818.
- Gold. C. — Goldbach. Catalog der moskowischen Flora. Regensb. Bot. Zeitung. 1820. II. zweite Beilage. p. 17—24.
- Goldbach. Correspondenz. Ib. IV Jahrg. Erster Band. Regensburg. 1821. p. 63—64.
- Hoff. H. — Hoffmann. Herbarium vivum seu collectio plantarum siccarum Caesareae Universitatis Mosquensis. Pars secunda. Mosq. 1825.
- Макс. Пут. — Максимовичъ, М. А. Отрывки изъ путешественныхъ записокъ о Московской губернии... Новый магазинъ естеств. исторiи, физики, химiи и пр., за 1825 г. Часть первая и вторая.
- Макс. — Максимовичъ, М. А. Списокъ растений Московской флоры. Тамъ же. 1826. Часть II., стр. 203—224.
- Макс. Приб. — Максимовичъ, М. А. Прибавленiе къ списку растений Московской флоры. Тамъ же. 1826. Часть III, стр. 215.
- Дв. — Двигубскiй. Московская флора или описанiе растений дикорастущихъ въ Московской губернии. Москва. 1828.

- Толстой, гр., М. Опыт ботаническаго календаря или время цвѣтенія дикорастущихъ растеній Московской губерніи. — Журналъ садоводства. 1838. №№ 2 и 3.
- Borg. — Borgmann. Plantes rares du gouvernement de Moscou. — Bull. de la Soc. des nat. de Moscou. 1842. T. XV. p. 699—700.
- Ledebour. Flora Rossica. Stuttgart. 1842—1853. Vol. I—IV.
- Annenkow. Observations sur la floraison de quelques plantes cultivées, faites à Moscou, pendant les années 1844—1848. Bull. de la Soc. des nat. de Moscou. 1849. III.
- Ann. — Annenkow. Flora mosquensis exsiccata. Cent. I—V. Ib. 1849. IV. 1850. II. 1851. I.
- Annenkow. Observations sur les plantes indigènes des environs de Moscou, faites pendant les années 1844—1849. Ib. 1851. I. p. 229—268. IV. p. 519—553.
- Semenow. Einige Bemerkungen über die Moskowischen Seerosen. Ib. 1854. I. p. 226—232.
- Lind. — Lindemann. Index plantarum quas in variis Rossiae provinciis hucusque invenit et observavit. Ib. 1860. III. p. 77—190.
- Рупр. — Рупрехтъ. Гео-ботаническія изслѣдованія о черноземѣ. — Приложение къ X т. Записокъ Имп. Академіи Наукъ. № 6. 1866.
- Кауф. I. — Кауфманъ. Московская флора или описаніе высшихъ растеній. Москва. 1866.
- Кауф. — Кауфманъ. О трехъ новыхъ формахъ растеній, найденныхъ въ окрестностяхъ Москвы. Извѣстія Общ. любителей естествознанія. Т. III, вып. I. Москва. 1866. Протоколы, стр. 89.
- Kauf. An. — Kauffman. Annotationes botanicae. — Москов. Универ. Извѣстія за 1868 г. № 9. Приложение, стр. 9.
- Pinz. — Pinzger. Kritischer Vergleich der im Gouvernement Moskau wildwachsenden Pflanzen mit den gleichen Species der deutschen Flora. — Programm der Saldner'schen Realschule zu Brandenburg. 1868.
- Clerc. Extrait de la Flore de Moscou. — Bull. de la Soc. des nat. de Moscou. 1870. II. p. 357—376.
- Clerc. Catalogus florae mosquensis. Ib. 1878. III. p. 161—200.
- Чистяковъ. Замѣтка по поводу южной границы сплошныхъ еловыхъ лѣсовъ въ западной части Моск. губерніи. — Изв. Имп. Общ. люб. естеств. Т. X., вып. I. 1872. Прот., стр. 14—17.
- Fischer von Waldheim Al. fil. Beitrag zur Kenntniss der Phanerogamen. Flora des Moskauer Gouvernements. — Bull. de la Soc. des nat. de Moscou. 1881. II. p. 421.
- Цин. — Цингеръ, В. Я. Сборникъ свѣдѣній о флорѣ средней Россіи. Москва. 1885.
- Гор. — Горожанкинъ. Матеріалы для флоры Московской губерніи. — Bull. de la Soc. des nat. de Moscou. 1888. II, p. 349—372.
- Мил. — Милютинъ. Нѣкоторые дополненія къ флорѣ Московской губерніи. Ib. 1888. III, p. 549—560.
- Кауф. II. — Кауфманъ. Московская флора или описаніе высшихъ растеній. Изд. II. Москва. 1889.

- Пет. — Петуниниковъ. Растительность Московской губернии. Москва. 1890.
- Милютинъ. Матеріалы по флорѣ известняковъ р. Оки. Москва. 1890.
- Е. О. — Fedchenko Olga. List of plants of the district of Moshaisk. Boston Journal (Popular Science News). Vol. XXV. 1891. №№ 5, 6, 7, 8.
- Маевскій. Флора средней Россіи. Москва. 1892.
- Pet. — Peter. Beiträge zur Kenntniss der Hieracienflora Osteuropas.—Nachrichten der Kön. Gesellschaft der Wiss. zu Göttingen. 1893. № 2.
- Маевскій. Флора средней Россіи. Изд. исправленное и дополненное подъ ред. С. Коржинскаго. Москва 1895.
- Литвиновъ, Д. П. Объ Окской флорѣ въ Московской губернии.—Матеріалы къ познанію фауны и флоры Росс. Имперіи. Отд. бот. вып. 3. стр. 1—34.
- Бух. I. — Бухгольцъ, Ф. В. Естественнo-историческая коллекція гр. Е. П. Шереметевой въ с. Михайловскомъ Московской губернии. I. Гербарій.—Списокъ сѣмянныхъ и высшихъ споровыхъ растений. Москва. 1897. in 8^o стр. 3—29.
- Сюзевъ, П. В. Наблюденія періодическихъ явленій въ жизни растений Московской флоры.—Матеріалы къ познанію фауны и флоры Россійской Имперіи. Отд. бот. вып. III, стр. 133—156. Отдѣльный оттискъ въ 22 стр.
- Ф. Б. — Федченко, Б. А. Новыя дополненія къ флорѣ Московской губернии.—Тамъ же, стр. 157—172. Отдѣльный оттискъ въ 15 стр.
- Шмальгаузенъ, П. Флора средней и южной Россіи, Крыма и Сѣвернаго Кавказа.—Руководство для опредѣленія сѣмянныхъ и высшихъ споровыхъ растений. Томъ I. Двудольныя свободнолепестныя. 1895. стр. V—XXX и 468 стр.—Томъ II. Двудольныя сростнолепестныя и безлепестныя, однодольныя, голосѣмянныя и высшія сосудистыя. 1897. стр. V—XVI и 752 стр.
- Петуниниковъ, А. По поводу статьи Б. А. Федченко: „Новыя данныя къ флорѣ Московской губернии“.—Ботаническія записки. Спб. Выпускъ XV. Отдѣльный оттискъ, стр. 1—8 и Résumé, стр. 9—10.
- Бух. II. — Бухгольцъ, Ф. В. Естественнo-историческая коллекція гр. Е. П. Шереметевой въ с. Михайловскомъ, Московской губернии.—I. Гербарій.—Списокъ сѣмянныхъ и высшихъ споровыхъ растений. Съ планомъ ботаническаго сада. Второе, дополненное и исправленное изданіе. Москва. 1900. in 8^o. 3—47 стр.
- Ф. ор. — Федченко, Б. А. О нѣкоторыхъ орхидныхъ Московской флоры.—Bull. de la Soc. des nat. de Moscou. 1899. № 4. p. 362—365.
- Мос. — Мосоловъ, Н. Дополненія къ флорѣ Подольскаго уѣзда, Московской губернии.—Труды Ботаническаго сада Имп. Юрьевскаго университета. Томъ I. вып. III, стр. 121—124.
- Пет. Кр. — Петуниниковъ, А. Н. Критическій обзоръ московской флоры. I. Dialypetalae.—Ботаническія записки, издаваемые при ботаническомъ садѣ Имп. С.-Петербургскаго университета проф. А. Бекетовымъ и проф. Хр. Гоби. Выпускъ XIII. (Томъ VI.)—II. Gamopetalae.—Труды Имп. С.-Петербургскаго Общ. Естествоиспытателей. Томъ XXX, вып. III. 1900 (отдѣлъ ботаники). III. Monochlamydeae. Труды Имп. С.-Петербургскаго Общ. Естествоиспытателей. Томъ XXXI, вып. III. 1901 (отдѣлъ ботаники).
- Ф. Оз. — Федченко, Б. А. Озера Московскаго уѣзда.—Русскія Вѣдомости. № 221. 1903 г.

Сокращенія.

- | | |
|---|---|
| <p>А. — Н. П. Анненковъ.
 А. А. — А. П. Адриановскій.
 Ар. — Арефьевъ.
 Ау. — П. В. Ауэрбахъ.
 Б. — Ф. В. Бухгольцъ.
 Бор. — Г. Борхманъ.
 Бѣл. — В. П. Бѣляевъ.
 В. — А. К. Варженевскій.
 Вар. — Н. П. Варгянъ.
 Г. — П. Н. Горожанкинъ.
 Г. О. — О. П. Горожанкина.
 Г. М. — М. П. Голецкинъ.
 Г. С. — С. Г. Григорьевъ.
 Гей. — К. К. Гейденъ.
 Ген. — П. П. Геннингъ.
 Гум. — Гумель.
 Д. — Доброславинъ.
 Дв. — П. А. Двигубскій.
 Дуб. — Н. Ф. Дубровинъ.
 З. — П. Ф. Золотницкій.
 И. — Л. А. Ивановъ.
 К. — Н. П. Кауфманъ.
 Кар. — С. П. Карельщиковъ.
 Кл. — О. Е. Клеръ.
 Кра. — Г. Краузе.
 Куль. — Б. М. Кульковъ.
 Л. — Д. П. Литвиновъ.</p> | <p>М. — П. П. Мельгуновъ.
 Маев. — П. Ф. Маевскій.
 Макс. — М. А. Максимовичъ.
 Мар. — Г. Марціусъ.
 Мил. — С. П. Милютинъ.
 Мос. — Н. А. Мосоловъ.
 Н. — С. П. Никитинъ.
 Нав. — С. Г. Навашинъ.
 П. — А. П. Петуниниковъ.
 П. П. — П. В. Палибинъ.
 Р. — Разумовъ.
 Рач. — С. А. Рачинскій.
 Рупр. — Ф. Рупрехтъ.
 С. — Д. П. Сырейчиковъ.
 Сем. — Н. М. Семеновъ.
 Ст. — Ф. Стефанъ.
 Сюз. — П. В. Сюзевъ.
 Тор. — Торнеусъ.
 Ф. — А. П. Федченко.
 Ф. Б. — Б. А. Фелченко.
 Ф. О. — О. А. Федченко.
 Х. — А. А. Хорошковъ.
 Ц. — Э. Циккендратъ.
 Цин. — В. Я. Цингеръ.
 Ч. — П. Д. Чистяковъ.
 Ш. — А. Штраусъ.
 Шпр. — Р. П. Шредеръ.</p> |
|---|---|
-
- | | |
|---|---|
| <p>Бгр. — Богородскій уѣздъ.
 Брн. — Бронницкій „
 Вер. — Верейскій „
 Вак. — Волоколамскій „
 Дмит. — Дмитровскій „
 Звн. — Звенигородскій „
 Кли. — Клискій „</p> | <p>Клм. — Коломенскій уѣздъ.
 Мож. — Можайскій „
 Мос. — Московскій „
 Под. — Подольскій „
 Руз. — Рузскій „
 Сри. — Серпуховской „</p> |
|---|---|

Отдѣлъ Embryóphyta Zoidiógama.

(Cryptógamae).

Растенія, не несущія цвѣтовъ, размножаются одноклѣточными крупинками (спорами), заключенными въ споровыхъ мѣшечкахъ (спорангіяхъ).

Подотдѣлъ Pteridóphyta (Cryptógamae vasculáres).

Изъ споръ образуются заростки (Prothallium) однодомные, и тогда б. или м. крупныя и хорошо развитыя, или двудомныя, и тогда очень маленькія и мало развитыя. Эмбриональная стадія развитія представляетъ хорошо развитыя листья и корни, глубоко заложеныя въ ткани стебля. Споры развиваются на листьяхъ или въ особыхъ вмѣстѣлицахъ, именуемыхъ спорангіями (Sporangia). Растенія съ замкнутыми сосудистыми пучками, содержащими лѣннчныя сосуды (Vasa scalaria).

Классъ I. Filicáriæ.

Листья крупныя, плоскія, б. ч. на черешкахъ, въ почкосложеніи свернутыя спирально. Споры на нижней поверхности листьевъ или на особой видоизмѣненной части листа.

Классъ II. Equisetáriae.

Стебель членистый; листья маленькія, сросшіяся между собой въ зубчатую влагалища, изъ-подъ которыхъ часто вырастаютъ мутовчато-расположенныя, простыя или развѣтвленныя членистыя вѣтви съ такими же листьями, подобіе влагалища. Споры въ спорангіяхъ на нижней сторонѣ 5—6-угольных щитковъ, сидящихъ на ножкахъ и образующихъ на верхушкѣ стебля и иногда вѣтвей яйцевидный или продолговатый колосъ.

Классъ III. Lycopodiáriae.

Стебель не членистый; листья мелкія, не сросшіяся, б. ч. спирально расположенныя; споры въ спорангіяхъ, сидящихъ въ пазухѣ листьевъ или въ особыхъ колосьяхъ, сидящихъ или на длинныхъ ножкахъ.

Отдѣлъ Embryóphyta Siphonógama.

(Phanerógamae).

Растенія, несущія цвѣтки, существенныя части которыхъ составляютъ пыльники и сѣмечки. Послѣ оплодотворенія возникаетъ сѣмя, состоящее изъ зародыша и обыкновенно двухъ оболочекъ.

Подотдѣлъ Gymnospérmae.

Сѣмечки не заключены въ пестикъ, пыльца при прорастаніи многокѣлочная. Въ зародышевомъ мѣстѣ передъ оплодотвореніемъ образуется богатый питательными веществами заростокъ съ женскими органами воспроизведенія, такъ называемый бѣлокъ. Сѣмя не заключено въ околоплодникъ; зародышъ съ 2 или многими сѣмечками; цвѣты однополые.

Классъ Coníferae.

Деревья и кустарники съ листьями въ видѣ иглъ (хвоя) или чешуекъ, съ смолистыми ходами, какъ въ древесинѣ, такъ въ корѣ и хвѣ. Цвѣты безъ околоцвѣтника.

Подотдѣлъ Angiospérmae.

Сѣмечка заключена въ пестикъ, образовавшийся изъ плодolistика, верхняя часть котораго (такъ называемое рыльце) приспособлена къ воспріятію и прорастанію пыльцы. Пыльца при прорастаніи двукѣлочная. Бѣлокъ образуется послѣ оплодотворенія.

Классъ I. Monocotylédones.

Зародышъ съ одной сѣмечкой, рѣже совсѣмъ безъ сѣмечки. Растенія травянистыя съ замкнутыми сосудистыми пучками. Листья б. ч. узкіе, съ параллельными жилками, или дугонаервные, рѣже углоаервные. Основное число цвѣточныхъ частей 3. Околоцвѣтникъ часто двойной, по 3 листка въ каждомъ вѣнцѣ.

Порядокъ *Pandanáles*.

Цвѣты въ шаровидныхъ или цилиндрическихъ початкахъ, однополые, безъ околоцвѣтника или околоцвѣтникъ въ видѣ не окрашенныхъ чешуекъ; завязей одна—много, съ одной или многими сѣменочками; сѣмя съ бѣлкомъ; листья линейные.

Сем. *Typhaceae* и *Sparganiaceae*.

Порядокъ *Helóbiae*.

Цвѣты одно- или двуполые, съ не окрашеннымъ или окрашеннымъ околоцвѣтникомъ, рѣже безъ околоцвѣтника; тычинокъ и завязей 1—много; завязь одно-многосѣменная; сѣмя безъ бѣлка или съ едва замѣтнымъ бѣлкомъ.

Сем. *Potamogetonaceae*, *Najadaceae*, *Juncaginaceae*, *Alismataceae*, *Butomaceae*, *Hydrocharitaceae*.

Порядокъ *Glumiflorae*.

Цвѣты одно- или двуполые, мелкіе, безъ околоцвѣтника или съ околоцвѣтникомъ, состоящимъ изъ чешуекъ, волосковъ или щетинокъ, сидящихъ въ пазухахъ прицвѣтныхъ чешуекъ, скрыты послѣдними: нѣсколько цвѣтковъ, сидящихъ на одной оси, образуютъ колоски; завязь одногнѣздная, односѣменная; сѣмя съ обильнымъ мучнистымъ бѣлкомъ. Травы съ линейными листьями.

Сем. *Gramineae*, *Cyperaceae*.

Порядокъ *Spathiflorae*.

Цвѣты одно- и двуполые, мелкіе, основное число въ цвѣткѣ 3 или 2 (рѣдко основное число 1), безъ развитыхъ прицвѣтныхъ листьевъ, но съ большимъ крыломъ (*Spatha*), охватывающимъ колосъ или початокъ. Сѣмя съ бѣлкомъ или безъ него.

Сем. *Araceae*, *Lemnaceae*.

Порядокъ *Liliiflorae*.

Цвѣты съ правильнымъ околоцвѣтникомъ.—основное число 3 или рѣдко 4—5,—рѣдко съ чашечкой и вѣнчикомъ; сѣмя съ мясистымъ или роговымъ бѣлкомъ.

Сем. *Juncaceae*, *Colchicaceae*, *Liliaceae*, *Asparagaceae*, *Iridaceae*.

Порядокъ *Microspérmae*.

Цвѣты б. ч. обоеполые, симметричныя, основное число 3, б. ч. съ окрашеннымъ околоцвѣтникомъ; тычинка б. ч. одна,—остальные неразвиты (рѣдко ихъ 2),—срастается со столбикомъ въ одно цѣлое; завязь нижняя, б. ч. одногнѣздная; сѣмя безъ бѣлка; пыльники 4-гнѣздные, пыльцевыя зерна соединены въ тетрады или комочки.

Сем. *Orchidaceae*.

Классъ II. Dicotylédones.

Зародышъ съ 2-мя сѣмедолями (рѣдко съ 1, у *Ficaria*, *Corydalis*, или вовсе безъ сѣмелей, какъ у *Monotropa*, *Orobanché*, *Pirola*). Сосудистыя пучки открытыя, расположены въ кругъ, нарастаютъ при посредствѣ камбія; у древесныхъ растений годовыя кольца. Листья простые или сложные, часто зубчатые, углонервные, рѣже съ параллельными жилками. Основное число въ цвѣткѣ б. ч. 5, иногда 2 раза по 4, очень рѣдко 2. Цвѣтокъ б. ч. имѣетъ чашечку и вѣничикъ, различно окрашенные, рѣдко одноцвѣтные.

Подклассъ I. Archichlamydeae.

Околоцвѣтника нѣтъ или онъ раздѣльнопестичный; лепестки окрашенные, безцвѣтные или зеленые; чашечка и вѣничикъ б. ч. ясно обособлены или же одинъ околоцвѣтникъ; очень рѣдко у нѣкоторыхъ видовъ, близко стоящихъ къ слѣдующему подклассу, околоцвѣтникъ со спайными лепестками.

Порядокъ Salicales.

Цвѣты въ сережкахъ, безъ околоцвѣтника, однополые, двудомные, у основанія цвѣтка часто сидятъ медовыя железы; завязь состоитъ изъ 2-хъ спайныхъ плодolistиковъ съ большимъ количествомъ очень мелкихъ сѣмянъ; сѣмя съ хохолкомъ, безъ бѣлка. Деревья и кустарники со спирально расположенными листьями съ прилистниками.

Сем. Salicaceae.

Порядокъ Juglandales.

Цвѣты безъ околоцвѣтника или съ зеленымъ околоцвѣтникомъ, однополые, однодомные; завязь состоитъ изъ 2-хъ сросшихся плодolistиковъ, съ 1 сѣменемъ; сѣмя—орѣхъ; женскіе цвѣты въ колосовидной кисти, мужскіе—въ сережкахъ. Деревья со спирально расположенными листьями.

Сем. Juglandaceae.

Порядокъ Fagales.

Цвѣты съ зеленымъ околоцвѣтникомъ, рѣже безъ него, б. ч. однополые, однодомные; тычинки часто сидятъ супротивъ долей околоцвѣтника; завязь нижняя, состоитъ изъ 2—3 плодolistиковъ, заключаетъ 1—2 сѣмя; сѣмя безъ бѣлка; цвѣты въ простомъ или сложномъ колосѣ или въ сережкахъ. Деревья и кустарники съ спирально расположенными листьями и прилистниками.

Сем. Betulaceae, Fagaceae.

Порядокъ Urticales.

Цвѣты съ зеленымъ околоцвѣтникомъ, тычинки сидятъ супротивъ долей околоцвѣтника; завязь верхняя, состоитъ изъ 2-хъ или 1 плод-

листика; плодъ односѣмный—орѣшекъ, летучка или костянка. Деревья или травянистыя растенія съ спиральными или супротивными листьями, съ прилистниками.

Сем. *Ulmáceae*, *Moráceae*, *Urticáceae*.

Порядокъ *Santaláles*.

Цвѣты снаружи зеленые, внутри бѣлые, тычинки сидятъ супротивъ долей околоцвѣтника; завязь нижняя, состоитъ изъ 2—3 сросшихся плодolistиковъ; сѣмя одно, подвѣшенное. Травянистыя растенія.

Сем. *Santaláceae*.

Порядокъ *Aristolochiáles*.

Цвѣты съ правильнымъ или неправильнымъ околоцвѣтникомъ; завязь б. ч. нижняя, 4—6-гнѣздная; сѣмена прикрѣплены къ центральному сѣменосу, или же завязь одногнѣздная и тогда со стѣнными сѣменосами; сѣмянъ много.

Сем. *Aristolochiáceae*.

Порядокъ *Polygonáles*.

Цвѣты съ чашечкой и вѣнчикомъ или только съ околоцвѣтникомъ, части котораго иногда расположены спирально; завязь одногнѣздная съ однимъ сѣменемъ; листья часто со сросшимися въ трубку прилистниками (съ раструбомъ).

Сем. *Polygonáceae*.

Порядокъ *Centrospermae*.

Цвѣты съ чашечкой и вѣнчикомъ или только съ околоцвѣтникомъ, части котораго расположены спирально или кругомъ; тычинокъ 1 или много; если въ одномъ кругу, то прикрѣплены часто супротивъ долей околоцвѣтника; завязь верхняя, б. ч. одногнѣздная, состоитъ изъ одного или многихъ сросшихся плодolistиковъ и съ 1 или многими сѣменами; сѣмя съ бѣлкомъ.

Сем. *Chenopodiáceae*, *Amarantáceae*, *Portulacáceae*, *Caryophylláceae*.

Порядокъ *Ranáles*.

Цвѣты съ чашечкой и вѣнчикомъ или только съ околоцвѣтникомъ, части котораго расположены спирально или кругомъ; тычинокъ б. ч. много; завязь б. ч. верхняя; плодolistиковъ много (рѣже 1), свободныхъ, не сросшихся, образующихъ свободныя листочки.

Сем. *Nymphaeáceae*, *Ceratophylláceae*, *Ranunculáceae*, *Berberidáceae*.

Порядокъ *Rhocadáles*.

Цвѣты съ чашечкой и вѣнчикомъ, правильные, рѣже неправильные, части цвѣтка расположены кругомъ, иногда только тычинки расположены

спирально; завязь верхняя, состоитъ изъ многихъ или изъ 2-хъ сросшихся плодolistиковъ.

Сем. Papaveráceae, Fumariodáceae, Cruciferae.

Порядокъ Sarraceniáles.

Цвѣты съ чашечкой и вѣнчикомъ или только съ околоцвѣтникомъ, части котораго расположены спирально или кругомъ; завязь верхняя, состоитъ изъ 3—5 сросшихся плодolistиковъ, со многими сѣменами, сидящими на стѣнныхъ или центральныхъ сѣменосахъ; сѣмена мелкія, безъ бѣлка. Маленькія растенія со спирально расположенными корневыми, ловящими насѣкомыхъ, листьями.

Сем. Droseráceae.

Порядокъ Rosáles.

Расположеніе частей цвѣтка б. ч. кругомъ; цвѣты съ чашечкой и вѣнчикомъ, часто неправильные; завязь верхняя, рѣже нижняя, со свободными или сросшимися плодolistиками, часто съ мясистымъ, несущимъ много сѣмянъ сѣменосцемъ.

Сем. Crassuláceae, Saxifragáceae, Rosáceae, Leguminósae.

Порядокъ Geraniáles.

Цвѣты съ чашечкой и вѣнчикомъ или голые, б. ч. 5-ные; части расположены кругомъ; завязь верхняя, состоитъ изъ 5—2 сросшихся, при созрѣваніи часто отдѣляющихся другъ отъ друга плодolistиковъ; каждый плодolistикъ съ 1—2 сѣменами; сѣмя съ брюшнымъ швомъ и съ зародышевымъ отверстіемъ (Micropyle), направленнымъ вверхъ; если же въ плодolistикѣ болѣе одного сѣмени, то иногда шовъ спинной и зародышевое отверстіе обращено книзу.

Сем. Geraniáceae, Oxalidáceae, Lináceae, Polygaláceae, Euphorbiáceae, Callitricháceae.

Порядокъ Sapindáles.

Цвѣты какъ у Geraniáles, но сѣмена имѣютъ обратное положеніе: висцїя со спиннымъ швомъ и обращеннымъ вверхъ зародышевымъ отверстіемъ (Micropyle), или восходящїя съ брюшнымъ швомъ и зародышевымъ отверстіемъ, обращеннымъ книзу. Б. ч. древесныя растенія.

Сем. Celastráceae, Aceráceae, Hippocastanáceae, Balsamináceae.

Порядокъ Rhamnáles.

Части цвѣтка расположены кругомъ. иногда безъ лепестковъ; тычинки прикрѣплены противъ частей вѣнчика; завязь верхняя или нижняя, состоитъ изъ 5—2 сросшихся плодolistиковъ съ 1—2 сѣменами въ каждомъ. Древесныя растенія.

Сем. Rhamnáceae, Vitáceae.

Порядокъ *Malváles.*

Цвѣты съ чашечкой и вѣнчикомъ, рѣдко безъ вѣнчика; части цвѣтка расположены кругомъ (иногда тычинки расположены спирально), вѣнчикъ б. ч. 5-ной; чашечка створчатая; тычинокъ много или онѣ расположены 2-мя рядами. и тогда внутреннiя расщеплены; завязь верхняя, изъ 2 или многихъ плодolistиковъ, содержитъ 1 или много прямыхъ сѣмянъ.

Сем. *Tiliáceae, Malváceae.*

Порядокъ *Parietáles.*

Цвѣты съ чашечкой и вѣнчикомъ, части цвѣтка расположены кругомъ или отчасти спирально, рѣдко цвѣты безъ вѣнчика; чашечка раздѣльнолиственная или снаян только у основанiя; завязь верхняя или нижняя, состоитъ изъ плодolistиковъ, б. или м. сросшихся. б. ч. съ стѣнными сѣменосами.

Сем. *Hypericeidées, Elatináceae, Cistáceae, Violáceae.*

Порядокъ *Myrtillórae.*

Цвѣты съ чашечкой и вѣнчикомъ или безъ вѣнчика, рѣдко цвѣты неправильные; части цвѣтка расположены кругомъ; пестикъ помещается свободно на днѣ трубчатого или колокольчатого, тонкаго, сильно ребристаго цвѣтоложка, пещущаго по своему краю и на внутренней сторонѣ другiе круги цвѣтка.

Сем. *Thymelaeáceae, Elaeagnáceae, Lythráceae, Onotheráceae, Halorrhagidáceae.*

Порядокъ *Umbelliflórae.*

Цвѣты съ чашечкой и вѣнчикомъ 5-нымъ или 4-нымъ; части цвѣтка расположены кругомъ; тычинки сидятъ въ 1 кругѣ; завязь нижняя; цвѣто-расположенiе б. ч. сложный зонтикъ.

Сем. *Umbelliflórae, Cornáceae.*

Подклассъ II. *Sympétalae.*

Цвѣты съ чашечкой и вѣнчикомъ; вѣнчикъ спайнолепестный, очень рѣдко у нѣкоторыхъ видовъ раздѣльнолепестный или его нѣтъ (пекло-ченiя: чашечки нѣтъ или она мало развита у *Carpifoliaceae, Rubiáceae, Valerianaceae, Dypsaceae* (*Compositae*), *Vacciniáceae*; вѣнчикъ вполнѣ или почти свободнолепестный у нѣкоторыхъ *Ericaceae, Primulaceae* и *Campulaceae*; вѣнчика нѣтъ у женскихъ цвѣтовъ *Xanthium*; вѣнчикъ пленчатый у *Plantago*; околоцвѣтника нѣтъ у *Fraxinus*).

Порядокъ *Ericáles.*

Цвѣточные покровы 4-ные или 5-ные. съ однимъ или двумя кругами тычинокъ; пестикъ иногда свободные; завязь верхняя или нижняя, изъ 2-хъ или многихъ плодolistиковъ.

Сем. *Piroláceae, Monotropáceae, Ericáceae.*

Порядокъ *Primuláles.*

Цвѣточные покровы б. ч. 5-ные; цвѣты правильные; тычинки спидать б. ч. супротивъ долей вѣничка; завязь одногнѣзная, верхняя или нижняя съ однимъ свободнымъ центральнымъ сѣменосомъ.

Сем. *Primuláceae.*

Порядокъ *Contórtae.*

Листья б. ч. супротивные, цѣльные; цвѣточные покровы б. ч. 5-ные или 4-ные, только съ однимъ кругомъ тычинокъ; очень рѣдко вѣничекъ свободнолепестный или его нѣтъ; вѣничекъ въ почкѣ часто скрученъ; завязь верхняя, состоитъ изъ 2-хъ сросшихся плодolistиковъ.

Сем. *Oleáceae, Gentianáceae, Apocynáceae, Asclepiadáceae.*

Порядокъ *Tubiflorae.*

Б. ч. травы. Цвѣточные покровы б. ч. 5-ные, съ однимъ кругомъ тычинокъ; цвѣты часто неправильные; вѣничекъ почти всегда сраженный; тычинки приросшія къ вѣничку; завязь верхняя, состоитъ изъ 2-хъ б. или м. сросшихся плодolistиковъ.

Сем. *Convolvuláceae, Polemoniáceae, Borragináceae, Labiátae, Solanáceae, Scrophulariáceae, Utriculariáceae, Orobrancháceae.*

Порядокъ *Plantagináles.*

Б. ч. травы. Листья б. ч. расположены спирально; цвѣточные покровы 4-ные, съ однимъ кругомъ тычинокъ; завязь верхняя, состоитъ изъ 1 или 2 сросшихся плодolistиковъ.

Сем. *Plantagináceae.*

Порядокъ *Rubiáles.*

Листья супротивные, цѣльные; цвѣточные покровы 4—5-ные, съ 1 кругомъ тычинокъ; вѣничекъ всегда спайнолепестный; завязь нижняя.

Сем. *Rubiáceae, Caprifoliáceae, Adoxáceae, Valerianáceae, Dipsacáceae.*

Порядокъ *Campanulátae.*

Б. ч. травы. Цвѣточные покровы б. ч. 5-ные; вѣничекъ всегда спайнолепестный; пыльники сросшіеся или наклоняющіеся другъ къ другу; завязь нижняя, многогнѣзная, съ 1 или многими сѣменами въ каждомъ гнѣздѣ, или завязь одногнѣзная, односѣменная.

Сем. *Cucurbitáceae, Campanuláceae, Compositae.*

Опредѣлитель семействъ.

1. Маленькія плавающія растенія съ сплюснутыми стеблями въ видѣ зеленыхъ чечевицеобразныхъ листочковъ—листецовъ, безъ листьевъ или съ едва замѣтными зачаточными листками.

Lemmaeae.

Стебель наземный, плавающий или подземный, никогда не бываетъ сплюснутъ въ видѣ листа и всегда съ развитыми листьями. 2.

2. Растенія не цвѣтущія, размножаются спорами, заключенными въ спорангіяхъ. 3.

Растенія цвѣтущія и приносящія плоды. 6.

3. Наземный стебель есть, покрытый чешуйчатыми или черепичатыми листьями, или однимъ влагалищемъ. 4.

Наземнаго стебля нѣтъ или если онъ есть, то несетъ одинъ вполне развитой, сложный листъ. 5.

4. Стебель съ кольцевыми, зубчатыми влагалищами.

Equisetaceae.

Стебель покрытъ мелкими, черепичато расположенными листьями.

Lycopodiaceae.

5. Молодые листья свернуты улиткой, взрослые несутъ на нижней поверхности листовыхъ долекъ, иногда вдоль нижняго свернутого края кучки спорангій.

Polypodiaceae.

Молодые листья не свернуты улиткой, взрослый листъ 1, рѣдко 2, обыкновенно мясистый или кожистый, несетъ на длинной ножкѣ крупныя, расположенныя колосомъ или колосовидной метелкой спорангій.

Ophioglossaceae.

6. Цвѣты вполне голые или съ зачаточными цвѣточными покрывами въ видѣ волосковъ, щетинокъ, чешуекъ или пленокъ, скрытыхъ въ пазухѣ прицвѣтничковъ или въ густомъ соцвѣтіи. 7.

Цвѣты съ развитымъ цвѣточнымъ покровомъ, т.-е. съ околоцвѣтникомъ простымъ. въ видѣ чашечки, или двойнымъ, рѣдко многоряднымъ, состоящимъ изъ цвѣточныхъ листковъ, одинаковыхъ по формѣ и окраскѣ или разныхъ, и тогда представляющихъ чашечку и вѣнчикъ. 25.

7. Травы или вьющіяся растенія. 8.
Деревья или кустарники. 21.
8. Листья мутовчатые или супротивные. 9.
Листья очередные, иногда пучковатые или только корневые. 14.
9. Листья въ мутовкахъ, въ каждой мутовкѣ болѣе 3 листьевъ. 10.
Листья супротивные, иногда верхніе собраны розеткой, если же листья мутовчатые, то не болѣе какъ по 3 въ мутовкѣ. 11.
10. Листья цѣльные, цѣльнокрайніе. (Pipraris) *Halorrhagidaceae*.
Листья вильчато-многораздѣльные съ роговыми зубчиками по краямъ. *Ceratophyllaceae*.
11. Растенія водяныя. 12.
Растенія наземныя (женскіе цвѣты Cannabis и Humulus)
Moraceae.
12. Листья съ маленькими роговыми зубчиками.
Najadaceae.
Листья безъ зубчиковъ. 13.
13. Тычинка 1; пыльники заостренные: плодъ одногнѣздый, на короткой ножкѣ, слегка согнутъ, съ однимъ столбикомъ (рис. 1 и 2).
(Zanichellia) *Polatogeloniaceae*.
Тычинка 1, рѣже 2; пыльники почковидные; завязь 4-гнѣздная или 4-дольная, съ 2 столбиками (рис. 3 и 4).
Callitrichaceae.



Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

14. Листья съ влагалищами. 15.
- (8) Листья безъ влагалищъ. 20.
15. Цвѣты однополые, однодомные, собраны однополыми головками, колосками или початкомъ; мужскія соцвѣтія сидятъ надъ женскими, или цвѣты двудомные. 16.
Цвѣты обоеполые или если однополые, то тѣ и другіе сидятъ въ одномъ колоскѣ. 18.
16. Мужскіе колоски состоятъ изъ чешуевидныхъ, пленчатыхъ прицвѣтничковъ, покрывающихъ другъ друга черепичато.
Cyperaceae.
Мужскіе головки или колосъ состоятъ только изъ тычинокъ или тычинки окружены длинными волосами, чешуекъ нѣтъ. 17.
17. Мужскіе и женскіе цвѣты собраны въ шаровидныя головки.
Sparganiaceae.

Мужские и женские цветы собраны въ длинный цилиндрической початокъ.

Typhaceae.

18. Цветы собраны въ одинъ частый, почти цилиндрической колосъ съ мясистымъ цвѣтоносомъ и съ большимъ прицвѣтнымъ листомъ—крыломъ или чехломъ, иногда той же формы, какъ и листья (рис. 5).

Araceae.



Рис. 5.



Рис. 6.



Рис. 7.



Цветы расположены сложнымъ колосомъ, метелкой, пучкомъ или полузонтикомъ 19.

19. Стебель обыкновенно съ узлами, цилиндрической или слегка сплюснутый; листья съ язычкомъ, сидящимъ со стороны пластинки листа; цвѣтокъ заключенъ въ 2 чешуйки; тычиночныя нити прикреплены къ срединѣ пыльника (рис. 6).

Gramineae.

Стебель безъ узловъ, б. ч. 3-гранный; листья безъ язычка или съ язычкомъ, сидящимъ супротивъ пластинки листа; цветы съ 1 чешуйкой; пыльники прикреплены концомъ къ нити (рис. 7).

Cyperaceae.

20. 3-лопастная завязь и 10—12 тычинокъ на ножкахъ окружены (14) общимъ колокольчато-бокальчатой обверткой и образуютъ цвѣточный пучокъ; такіе пучки расположены вильчатымъ полузонтикомъ; цвѣтоносы собраны зонтикомъ съ мутовчатой обверткой; столбиковъ 3, каждый



Рис. 8.



Рис. 9.



Рис. 10.

съ 2-лопастнымъ рыльцемъ; растения съ бѣлымъ млечнымъ сокомъ (рис. 8).

Euphorbiaceae.

Завязь и пыльники сидячіе; каждый цвѣтокъ либо въ пазухѣ простого прицвѣтнаго листа, и тогда обоенольный, состоитъ изъ 1-ой тычинки и 1-го пестика (*Corispermum*, рис. 9), либо облеченъ 2 прицвѣтниками. и тогда онъ женскій (*Atriplex*, рис. 10); цветы въ колосьяхъ.

Chenopodiaceae.

21. Цвѣты на цвѣтоножкахъ, въ пучкахъ, безъ покрововъ, голые, (7) частью обоеполые, частью мужскіе о 2-хъ тычинкахъ, частью—женскіе обѣ 1-мъ пестикѣ съ 2-раздѣльнымъ рыльцемъ; листья перистые; плодъ—двугнѣзная крылатка (рис. 11).

(Fraxinus) *Oleaceae*.



Рис. 11.

Цвѣты сидятъ, однополые, голые или съ зачаточнымъ околоцвѣтникомъ; мужскіе всегда въ сережкахъ или колосьяхъ; женскіе въ сережкахъ, шишкахъ или же одиночные, однодомные или двудомные. 22.

22. Деревья и кустарники съ зимующими или опадающими иглами (хвоя) или чешуйчатыми листьями; мужскіе цвѣты состоятъ изъ однихъ пыльниковъ съ расширеннымъ связникомъ; женскіе—изъ однихъ сѣмечекъ въ пазухахъ прицвѣтныхъ чешуекъ, которыя становятся деревянистыми или мясистыми и образуютъ шишку или ложную ягоду. 23.

Деревья и кустарники съ листьями, состоящими изъ черенка и пластинки; мужскіе цвѣты состоятъ изъ тычинокъ съ нитями; женскіе цвѣты съ пестикомъ, заключающимъ сѣмечко. 24.

23. Иглы (хвоя) одиночные, по 2 или пучками, зимующія или на зиму опадающія; сѣмена заключены въ одеревянѣвшую шишку.

Abietineae.

Иглы сидятъ мутовками по 3 или, вмѣсто иглъ, супротивно сидящія чешуйки, размѣщенные по стеблю въ 4 ряда; сѣмена въ ложной ягодѣ или въ маленькихъ деревяниющихся шишечкахъ.

Cupressineae.




Рис. 12. Рис. 13. Рис. 14. Рис. 15. Рис. 16. Рис. 17.

24. Двудомные. Околоцвѣтникъ зачаточный въ видѣ медника или блоччатый, прикрытъ прицвѣтной чешуйкой; мужскіе цвѣты о 2—30 тычинкахъ (рис. 12); женскіе состоятъ изъ пестика съ 2-раздѣльнымъ рыльцемъ и 2 (3—4)-створчатой, грушевидной завязи (рис. 13); коробочка съ хохлатыми пушистыми сѣменами (рис. 14).

Salicaceae.

Однодомные, однополые. Пестики съ 2-ми нитевидными рыльцами (рис. 17), мужскіе цвѣты о 2—4-хъ тычинкахъ (рис. 15);

завязь 2-гнѣздная, одноѣмная; плодъ — орѣшекъ или крылатка (рис. 16). *Betulaceae.*

25. Листья съ раструбомъ, т.е. съ пленчатыми, пазушными прилисточками, охватывающими узловатый стебель (рис. 18; у щавелей, *Rumex*, къ созрѣванію плодовъ раструбы часто отмираютъ и остаются только волокна), или пазушные, пленчатые прилистники охватываютъ стебель только своимъ основаніемъ (рис. 19) и иногда сростаются съ листомъ, образуя какъ бы влагалище листа, верхушка же прилистника остается свободной въ видѣ язычка, но тогда растенія всегда водяныя. 26. Раструба или пазушныхъ прилистниковъ нѣтъ. 27.




Рис. 18.



Рис. 19

26. Цвѣты о 4-хъ пестикахъ и 4-хъ тычинкахъ; пыльники короткіе, приросли къ лепесткамъ (собственно это — связники, расширенные въ видѣ лепестковъ); водяныя растенія; подводные листья прозрачныя. *Potamogetonaceae.*

Цвѣты обѣ 1-мъ пестикъ съ 2—3-мя короткими столбиками и 5—8-ю тычинками; околоцвѣтникъ простой, 5 (4—3)-раздѣльный, часто окрашенный, или же околоцвѣтникъ двойной, о 2-хъ рядахъ зеленыхъ листочковъ, по 3 въ каждомъ ряду, о 6—9-ти тычинкахъ и о 3-хъ (2—4) столбикахъ съ рыльцами въ видѣ кисточекъ; б. ч. наземныя растенія, рѣже водяныя, но безъ прозрачныхъ листьевъ. *Polygonaeeae.*

27. Цвѣты мелкіе, обоенные или разнополые, на очень короткихъ ножкахъ, или сидячіе, собраны въ головку, у основанія которой одинъ или нѣсколько прицвѣтниковъ, составляющихъ общую обертку; часто цвѣторасположеніе походитъ на одинъ сложный цвѣтокъ съ чашечкой и вѣнчикомъ (рис. 20). 28.



Рис. 20.



Рис. 21.

Цвѣты одиночныя или скученныя, но не образуютъ головокъ, окруженныхъ общей оберткой. 33.

28. Вѣнчикъ неправильный, мотыльковый (рис. 21); тычинокъ 10, сросшихся нитями въ трубку, или 1 изъ нихъ свободная; листья съ прилистниками, тройчато- или перисто-сложные. *Leguminosae.*

Вѣнчикъ правильный, а если неправильный, то язычковидный; тычиночекъ 4—5, свободныхъ или сросшихся пыльниками; листья безъ прилистниковъ. 29.

29. Завязь 2-гнѣздная, о 2-хъ столбикахъ; вѣнчикъ раздѣльнолепестный; 5 тычиночекъ прикрѣплены къ подпестичному диску (рис. 22).

Umbelliferae.

Завязь съ 1 столбикомъ; вѣнчикъ спайнолепестный (иногда глубоко-раздѣльный, но основаніе его спаяно); 4—5 тычиночекъ прикрѣплены къ трубкѣ вѣнчика. 30.

30. Листья мутовчатые, по 4—6 въ мутовкѣ; плодъ изъ 2 орѣшковъ. (Sherardia) *Rubiaceae.*



Рис. 22.



Рис. 23.

Листья очередные или супротивные, но не мутовчатые; плодъ—коробочка или сѣмянка, но не орѣшекъ. 31.

31. Цвѣты съ развитою зеленою чашечкою, 5-ные, съ 5 тычинками; вѣнчикъ глубоко-5-раздѣльный; завязь 2-гнѣздная; коробочка съ остающимся увядшимъ вѣнчикомъ (рис. 23). *Campanulaceae.*

Цвѣты съ зачаточной чашечкой въ видѣ волосяного хохолка, щетинокъ, зубцовъ, чешуекъ или вовсе безъ чашечки; вѣнчикъ 4-ной, 5-ной, трубчатый или язычковидный. 32.



Рис. 24.

32. Каждый цвѣтокъ съ 4-мя свободными тычинками, столбикъ простой, съ однимъ рыльцемъ; чашечка двойная: наружная въ видѣ зубцовъ или коронки и внутренняя—изъ ряда щетинокъ (рис. 24); вѣнчикъ неправильный, 4—5-надрѣзной; листья всегда супротивные. *Dipsacaceae.*

Каждый цвѣтокъ съ 5-ю тычинками и съ пыльниками, почти всегда спаянными; столбикъ съ 2-мя нитевидными рыльцами; вѣнчикъ или правильный трубчатый, или неправильный язычковидный (рис. 25), рѣже нитевидный; листья очередные, рѣдко супротивные. *Compositae.*

33. Цвѣты мелкіе, на б. или м. длинныхъ цветоножкахъ, располо-

- (27) жены сложнымъ зонтикомъ. т.-е. собраны въ простые зонтики, которые въ свою очередь расположены зонтикомъ (рис. 26).

Umbelliferae.

Цвѣты никогда не расположены зонтикомъ. 34.



Рис. 25.



Рис. 26.

34. Въ каждомъ цвѣткѣ или тычинокъ много болѣе чѣмъ вдвое противъ числа долей вѣнчика или простаго околоцвѣтника, или пестиковъ нѣсколько, и тогда число тычинокъ бываетъ ограничено, или же и пестиковъ, и тычинокъ много. 35.

Число тычинокъ въ каждомъ цвѣткѣ не превышаетъ двойного числа долей вѣнчика или простаго околоцвѣтника; пестикъ одинъ, хотя столбиковъ и рылецъ можетъ быть нѣсколько. 56.

35. Деревья и кусты. 36.

Травы, иногда полукустарники. 42.

36. Цвѣты сидячіе, однополые; мужскіе — въ плотныхъ сережкахъ, околоцвѣтникъ 5—6-раздѣльный, сросшійся съ прицвѣтникомъ; тычинокъ 14—36; сросшіеся прицвѣтники женскаго цвѣтка образуютъ 3—5-зубчатую обертку; околоцвѣтникъ явственно 4-зубчатый, опадающій; рыльце двулопастное; плодъ орѣхъ съ мясистой кожурой.

Juglandaceae.

Цвѣты на ножкахъ, обоеполые, полные, съ чашечкой и вѣнчикомъ. 37.

37. Цвѣтоносъ, несущій полузонтикъ, сросся съ большимъ свѣтло-зеленымъ прицвѣтнымъ листомъ—крыломъ (рис. 27); тычинокъ много; 5 свободныхъ чашелистиковъ и 5 лепестковъ прикрѣплены къ ложу цвѣтка.

Tiliaceae.

Цвѣтоносы безъ прицвѣтнаго крыла; тычинки и лепестки прикрѣплены къ краю чашечки. 38.

38. Листья супротивные; цвѣты съ 4 лепестками.



Рис. 27.

Рис. 28.

Рис. 29.

(Philadelphus) *Saxifragaceae.*

Листья очередные; цвѣты съ 5 лепестками. 39.

39. Пестикъ одинъ; завязь простая, съ охватывающимъ ее расширеннымъ цвѣтоложемъ, бокальчатымъ или колокольчатымъ; чашечка опадаетъ (рис. 28). (Amygdaloideae) *Rosaceae*.

Пестиковъ болѣе одного; завязи свободныя или сросшіяся между собой и съ трубчатой чашечкой, отгибъ ея остается. 40.

40. Пестики (2—5) срослись между собой и съ чашечной трубкой или съ цвѣтоложемъ, обращающимся въ мясистую оболочку плода (рис. 29). (Pomoideae) *Rosaceae*.

Пестики свободныя или сросшіяся только основаніемъ и никогда не срастающіеся съ цвѣтоложемъ, то вогнутымъ, облекающимъ пестики, то выпуклымъ, несущимъ ихъ на себѣ, 41.



Рис. 30.

41. Цвѣты одиночныя или по 2—4, съ большимъ числомъ пестиковъ, обращающихся въ щетинистыя сѣмянки или костянки, собранныя въ ложные плоды или ягоды (рис. 30). *Rosaceae*.

Цвѣты въ щиткахъ, въ простыхъ или щитковидныхъ метелкахъ, обыкновенно о 5 пестикахъ, обращающихся въ 2—5 сѣменные мѣшечки. (Spiraeoideae) *Rosaceae*.

42. Листья сочные, мясистые. 43.

- (35) Листья не мясистые, а нѣжные, тонкіе или кожистые. 44.

43. Цвѣты въ вѣтвистыхъ полузонтикахъ; пестиковъ 5 или 6.

Crassulaceae.

Цвѣты одиночныя, пазушные, сидячіе; пестикъ одинъ, съ короткимъ 3-раздѣльнымъ рыльцемъ. *Portulacaceae*.

44. Двудомныя. Одни мужскіе цвѣты, тройчатые. 45.

Растенія съ цвѣтами обоеполыми, иногда однополыми, но тогда они однодомныя. 46.

45. Цвѣты клубочками, въ рѣдкихъ колосьяхъ, съ простымъ 3-раздѣльнымъ околоцвѣтникомъ; тычинокъ 9; растеніе наземное.

(Mercurialis) *Euphorbiaceae*.

Цвѣты на ножкахъ, пазушные, съ чашечкой и вѣнчикомъ; тычинокъ 12; растеніе водяное. *Hydrocharitaceae*.

46. Листья узкіе, линейные, цѣльнокрайніе; цвѣты съ 3 лепестками и 3 чашелистками, окрашенными въ одинаковый цвѣтъ. 47.

Листья 6, или м. широкіе, лишь иногда узко-лентчатые, но тогда цвѣты 5-ные. 48.

47. Цвѣты крупныя, розовато-бѣлыя. въ ложномъ зонтикѣ; тычинокъ 9; пестиковъ 6; листья 3-гранные. *Butomaceae*.

Цвѣты мелкіе, зеленоватыя. въ рѣдкой кисти; тычинокъ 6; пестиковъ 3; листья цилиндрическіе. (*Scheuchzeria*) *Juncaginaceae*.

48. Тычинки срослись нитями въ одинъ или нѣсколько пучковъ. 49. Тычинки свободныя, не сросшіяся въ пучки. 50.

49. Тычинки срослись нитями въ одинъ пучокъ такъ же, какъ и столбики съ завязями (рис. 31); листья лопастныя, дланевиднаго очертанія. *Malvaceae*.

Тычинки срослись нитями въ 3 пучка; завязь 1 съ 3 нитевидными столбиками; коробочка 3-гнѣздная (рис. 32); листья супротивныя, цѣлюкрайніе, съ точечными железами.

Hypericoideae.

50. Листья, покрывающіе стебель, влагалищныя, вдоль складчатые, съ продольными жилками; тычинокъ 6; пестиковъ 3, сросшихся до половины. *Colchicaceae*.



Рис. 31



Рис. 32.



Стеблевые листья безъ влагалищъ и продольныхъ складокъ или въ листья корчевые. 51.

51. Тычинки и лепестки прикрѣплены къ краю отгиба чашечки (см. рис. 30); листья съ прилистниками, пальчатые или перистые.

Rosaceae.

Тычинки и лепестки прикрѣплены къ ложу цвѣтка. 52.

52. Цвѣты въ мутовчатыхъ кистяхъ или въ мутовчатыхъ метелкахъ.

Alismaceae.

Цвѣты одиночныя, въ кистяхъ или метелкахъ, но не мутовчатыхъ. 53.

53. Чашечка о 5 чашелистикахъ, изъ которыхъ 2 наружныхъ много менѣе 3 внутреннихъ, такъ что чашечка кажется 3-листной (рис. 33); цвѣты съ прицвѣтниками; полукустарники.

Cistaceae.

Чашелистики одинаковой длины или ихъ нѣтъ; цвѣты безъ прицвѣтниковъ; травы. 54.

54. Чашечка состоитъ изъ 2 чашелистиковъ, скоро опадающихъ, видныхъ только на бутонахъ (рис. 34). Травы съ млечнымъ сокомъ.

Paraperaceae.

Чашечка о 3—4—5 чашелистикахъ или ея вовсе нѣтъ, и тогда околоцвѣтникъ простой. Травы безъ млечнаго сока. 55.

55. Завязь одна, многораздѣльная, съ лучистымъ рыльцемъ (рис. 35); листья большіе кожистые, плавающие, цѣльнокрайніе.

Nymphaeaceae.




Рис. 33.

Рис. 34.

Рис. 35.

Завязей обыкновенно много, если же одна, то безъ лучистаго рыльца; листья б. ч. раздѣльные: растенія наземныя, а если водяныя, то листья не плавающие, но подводные и много-раздѣльные.

Ranunculaceae.

56. Тычинки сростаются нитями въ 1 или 2 пучка, образуя родъ (34) трубки или желобка. 57.

Тычинки вполнѣ свободныя или сростлись нитями только при самомъ основаніи въ короткое кольцо или же слиплись пыльниками. 60.

57. Вѣнчикъ правильный, ворончатый, 5-раздѣльный; цвѣты однополые.

Cucurbitaceae.

Вѣнчикъ неправильный, 4—5-раздѣльный, состоитъ изъ свободныхъ лепестковъ, иногда лишь сросшихся между собой при основаніи; цвѣты обоеполые. 58.

58. Чашечка, легко опадающая, состоитъ изъ 2 маленькихъ листочковъ; вѣнчикъ состоитъ изъ 4 лепестковъ (рис. 36).

Fumariodaceae.

Чашечка остающаяся; вѣнчикъ состоитъ изъ 5 лепестковъ. 59.

59. Чашечка изъ 5 свободныхъ чашелистиковъ: 2 боковыхъ больше 3 остальныхъ, крыловидные и окрашенные въ цвѣтъ лепестковъ; нижній лепестокъ болѣе прочихъ, желобчатый, на концѣ 3-лопастной и бахромчатый, сросшійся съ 2 боковыми; задніе 2 лепестка свободные и длиннѣе боковыхъ (рис. 37).

Polygalaceae.

Чашечка трубчатая, зубчатая; вѣнчикъ мотыльковый: 2 нижнихъ



Рис. 36.

Рис. 37.

лепестка срослись въ лодочку, 2 боковыхъ б. ч. свободные—крылья; большой верхній—парусъ или флагъ (рис. 38).

Leguminosae.

60. Чашечка или простой околоцвѣтникъ о 12 листочкахъ, зубцахъ (56) или доляхъ, 6 изъ нихъ часто длиннѣе 6 другихъ (рис. 39). 61. Чашечка или простой околоцвѣтникъ никогда не содержитъ болѣе 8 листочковъ или долей. 62.

61. Растенія подводныя; листья въ мутовкахъ, вильчато раздѣлены на доли съ роговыми зубчиками: цвѣты однополые (цветочная обертка въ мужскихъ цвѣтахъ напоминаетъ чашечку о 12 листкахъ).

Cerathophyllaceae.

Растенія не погружены въ воду: листья цѣльные, нераздѣльные; цвѣты обоеполые; чашечка о 12 зубцахъ, изъ которыхъ 6 большихъ чередуются съ 6 маленькими (рис. 39). *Lythraceae.*

62. Цвѣты однопестичные, съ простымъ одноряднымъ околоцвѣтникомъ въ видѣ одной чашечки или одного вѣнчика. 63.

Цвѣты о 2 пестикахъ или съ двойнымъ околоцвѣтникомъ, т. е. съ чашечкой и вѣнчикомъ, или въ видѣ 2-ряднаго вѣнчика или двурядной чашечки. 82.



Рис. 38.



Рис. 39.

63. Деревья или кустарники. 64.

Травы. 68.

64. Молодые вѣтви и листья серебристые, покрыты звездчатыми чешуйками, видными только при сильномъ увеличеніи; цвѣты съ 4 тычинками; вѣнчикъ 4-надрѣзной. Кусты. *Elaeagnaceae.*

Листья, вѣтви и цвѣты не серебристые и безъ звездчатыхъ чешуекъ; тычинки и отношеніе ихъ къ надрѣзамъ вѣнчика другое. 65.

65. Вьющійся кустарникъ; цвѣты съ трубчатымъ околоцвѣтникомъ и съ отгибомъ слабо 3-лопастнымъ; 6 пыльниковъ приросли къ столбику съ 3-лопастнымъ рыльцемъ. *Aristolochiaceae.*

Деревья или кустарники, но не вьющіеся. 66.

66. Деревья съ однополыми цвѣтами: мужскіе цвѣты въ повислыхъ, рѣдкихъ, прерванныхъ сережкахъ, съ 6—8-раздѣльной чашечкой и съ 6—10 тычинками; женскіе—въ прерывчатыхъ колосьяхъ, съ едва замѣтнымъ околоцвѣтникомъ; плодъ—желудь.

Fagaceae.

Деревья или кустарники съ обоеполыми цвѣтами. Цвѣтутъ до распусканія листьевъ. 67.

67. Кустъ; вѣничекъ розовый, гвоздевидный. съ 4-раздѣльнымъ отгибомъ (рис. 40); тычинокъ 8, сидящихъ въ 2 ряда на короткихъ нитяхъ; плодъ—ягода.

Thymelaeaceae.

Дерево. Околоцвѣтникъ маленький, чашевидный, 5 (3—8)-надрѣзной; тычинокъ 5 (3—8); плодъ—крылатка (рис. 41).

Ulmaceae.

68. Цвѣты однополые, двудомные. 69.

- (63) Цвѣты обоеполые. 71.



Рис. 40.



Рис. 41.

69. Листья дланевидные или дланевидно-5 — 9-раздѣльные.

(*Cannabis*) *Moraceae.*

Листья цѣльные, нераздѣльные. 70.

70. Растенія покрыты жгучими длинными волосками; женскіе цвѣты въ вѣтвистыхъ

многоцвѣтковыхъ колосьяхъ, собранныхъ пучками въ пазухахъ листьевъ.

Urticaceae.

Растенія безъ жгучихъ волосковъ; женскіе цвѣты въ пазушныхъ 1—3-цвѣтковыхъ колоскахъ. (*Mercurialis*) *Euphorbiaceae.*

71. Листья супротивные. 72.

Листья очередные. 73.

72. Цвѣты 4-раздѣльные съ 4 тычинками.

Urticaceae.

Цвѣты 5-раздѣльные; тычинокъ 10.

(*Scleranthus*) *Caryophyllaceae.*

73. Листья съ прилистниками. 74.

Листья безъ прилистниковъ. 75.



Рис. 42.



Рис. 43.

74. Листья цѣльные; цвѣтокъ 5-ной. съ 5-листной чашечкой (рис. 42). (нѣкоторыя) *Violaceae.*

Листья лопастные или перистые; цвѣты 4-раздѣльные (рис. 43).

(*Alchemilla*, *Poterium*) *Rosaceae.*

75. Цвѣты сидячіе, собраны въ клубочки, расположенные по цвѣтовосамъ ложнымъ или метельчатымъ колосомъ, рѣдко полужонтиками; иногда цвѣты одиночные, пазушные. 76.

Цвѣты на цвѣтоножкахъ. 77.

76. Цвѣты съ 3 прицвѣтниками и съ пленчатымъ 3—5-листнымъ околоцвѣтникомъ, съ 3—5 тычинками и 2—3 сидячими рыльцами.

Amarantaceae.

Цвѣты безъ прицвѣтниковъ, съ околоцвѣтникомъ не пленчатымъ, часто мясистымъ, 2—5-раздѣльнымъ, съ 1—5 тычинками и 2—5 сидячими рыльцами.

Chenopodiaceae.

77. Цвѣты въ полузонтикахъ, съ крупными, широкими прицвѣтниками, окрашенными въ ярко-зеленый или зелено-желтый цвѣтъ. 78.

Цвѣты въ кистяхъ или въ пазухахъ листьевъ, безъ окрашенныхъ прицвѣтниковъ. 79.

78. Листья ланцетные или овальные, съ млечнымъ сокомъ: 3-доль-



Рис. 44.



Рис. 45.

ная завязь на длинной ножкѣ; тычинки тоже на ножкахъ, облечены въ чашевидную обертку съ большими мѣдниками по краю (рис. 44).

Euphorbiaceae.

Листья почковидные, городковые; чашечка 4-раздѣльная, съ 8 тычинками и 2 столбиками, съ полунижней завязью (рис. 45).

(*Chrysosplenium*) *Saxifragaceae.*

79. Околоцвѣтникъ съ длинной трубкой и съ неправильнымъ изычковиднымъ отгибомъ, или околоцвѣтникъ 3-надрѣзной (рис. 46).

Aristolochiaceae.



Рис. 46.



Рис. 47.



Рис. 48.

Околоцвѣтникъ правильный, 4—5—6-раздѣльный или—надрѣзной. 80.

80. Околоцвѣтникъ 5-надрѣзной: плодъ — орѣшекъ съ продольными ребрышками (рис. 47).

Santalaceae.

Околоцвѣтникъ 6-дольный или 6-надрѣзной, или же только одна 4-листная чашечка безъ вѣничка, или вѣничекъ 4-надрѣзной. 81.

81. Плодъ — стручокъ съ 2 створками; 2 тычинки прикрѣплены къ

пёртоложу; только 4-лиственная чашечка безъ вѣпчика (уклонная форма—*Lepidium ruderae*).

Cruciferae.

Плодь—3-гнѣздная ягода; тычинокъ 6, рѣже 4. прикрѣпленныхъ къ вѣпчику; вѣпчикъ 4-надрѣзной, рѣже 4-раздѣльный или 6-дольный (рис. 48).

Asparagaceae.

82. Вѣпчикъ раздѣльнолепестный изъ свободныхъ лепестковъ; чашечка 6. ч. тоже изъ свободныхъ чашелистиковъ. 83. Вѣпчикъ цѣльный, спайнолепестный; чашечка 6. ч. тоже изъ спайныхъ чашелистиковъ. 117.



Рис. 49.



Рис. 50.

83. Деревья или кустарники. 84.

Травы. 92.

84. Цвѣтокъ состоитъ изъ двурядной чашечки и двуряднаго вѣпчика, въ каждомъ ряду по 3 лепестка (рис. 49); чашечка и вѣпчикъ окрашены въ одинъ цвѣтъ; прилистники въ видѣ тройчатой колючки.

Berberidaceae.

Покровы цвѣтка 4-ные или 5-ные, прилистниковъ въ видѣ колючекъ нѣтъ. 85.

85. Листья пальчато-сложные. 86.

Листья простые, цѣльнокрайніе, лопастные или же перистые, но никогда не бываютъ пальчато-сложные. 87.



Рис. 51.



Рис. 52.

86. Деревья съ супротивными листьями безъ прилистниковъ; цвѣты въ большихъ пирамидкахъ, ярко окрашены; вѣпчикъ неправильный (рис. 50); завязь съ нитевиднымъ рыльцемъ; плодь—3-створчатая коробочка.

Hippocastanaceae.

Выющійся кустарникъ съ очередными листьями и усиками, су-

противными листьямъ, съ прилистниками; цвѣты въ развѣсистыхъ щиткахъ, зеленоватые; рыльце головчатое (рис. 51); плодъ — ягода.

Vitaceae.

87. Листья лопастные, крупно-зубчатые или перистые. 88.

Листья цѣльные и цѣльнокрайніе, рѣже мелко-зубчатые. 89.

88. Листья супротивные; завязь верхняя, 2-гнѣздная, 2-лопастная; плодъ — 2-крылая сѣминка (рис. 52).

Asceraceae.

Листья очередные; завязь нижняя (рис. 53); плодъ — 1-гнѣздная ягода.

(*Ribes*) *Saxifragaceae.*

89. Цвѣты въ щиткахъ, бѣлые; чашечка маленькая, зубчатая. 90.

Цвѣты въ пучкахъ или короткихъ кистяхъ, зеленоватые или буроватые. 91.

90. Листья очередные, узкіе, сидячіе; цвѣты 5-ные, тычинокъ 10; завязь верхняя; листья сильно пахучіе. (*Ledum*) *Ericaceae.*

Листья супротивные, широкіе, на черешкахъ; цвѣты 4-ные; тычинокъ 4; завязь нижняя.

Cornaceae.

91. Тычинки чередуются съ лепестками (рис. 54); завязь съ 1 столбикомъ; листья супротивные; растение съ обоеполыми цвѣтами.

Celastraceae.



Рис. 53.



Рис. 54.

Тычинки супротивныя лепесткамъ (рис. 55); столбикъ двураздѣльный или завязь съ 4 столбиками; цвѣты обоеполые или двудомные, съ очередными или супротивными листьями.

Rhamnaceae.

92. Околоцвѣтникъ неправильный; одинъ изъ листочковъ околоцвѣтника часто со шпорой. 93.

Околоцвѣтникъ правильный; шпоры нѣтъ. 95.



Рис. 55.



Рис. 56.

93. Завязь нижняя; околоцвѣтникъ двурядный; одинъ листокъ околоцвѣтника отличается формой отъ 5 остальныхъ (рис. 56); тычинокъ 1—2, безъ нитей; листья влагалищные, цѣльные, цѣльнокрайніе.

Orchidaceae.

Завязь верхняя; околоцвѣтникъ состоитъ изъ чашечки и вѣнчика; тычинокъ 5, слѣпшихся своими пыльниками; листья черешковые. 94.

94. Чашечка остающаяся, 5-ная, листочки ея одинаковой формы, съ мѣшеччатыми придатками; вѣнчикъ 5-лепестный, нижній лепестокъ съ мѣшеччатой шпорою; столбикъ 1. искривленный; плодъ—3-створчатая коробочка (см. рис. 42). *Violaceae.*

Чашечка опадающая, изъ 2 (4) маленькихъ зеленыхъ листочковъ и одного крупнаго, ярко окрашеннаго и вытянутаго въ шпору; передній лепестокъ желобчатый, сердцевидный; оба боковые—больше, сраинные при основаніи съ обоими маленькими; рылецъ 5, сросшихся; коробочка длинная, 5-створчатая, створки скручиваются спирально (рис. 57). *Balsaminaceae.*

95. Завязь вполнѣ нижняя, иногда полунижняя, т.е. наполовину (92) сросшаяся съ чашечкой. 96.

Завязь вполнѣ верхняя, внутри чашечки. иногда ея нѣтъ (въ двудомныхъ растеніяхъ). 99.

96. Цвѣтокъ 3-чатый. т.е. какъ вѣнчикъ, такъ и чашечка состоятъ



Рис. 57.

Рис. 58

изъ 3 частей, или околоцвѣтникъ состоитъ изъ 2 вѣнцовъ по 3 листка въ каждомъ. 97.

Цвѣтокъ 4-ной или 2-чатый. 98.

97. Цвѣты крупныя, лиловые, пурпуровыя или желтыя; какъ чашечка, такъ и вѣнчикъ окрашены въ одинъ цвѣтъ.

Iridaceae.

Цвѣты бѣлыя; чашечка маленькая, зеленая (женскіе цвѣты).

Hydrocharitaceae.

98. Цвѣты въ мутовчатыхъ колосьяхъ, однополые; верхніе—мужскіе, нижніе—женскіе; лепестковъ часто нѣтъ; водяныя растенія съ глубоко-гребенчато-перисто-раздѣльными листьями съ нитевидными долями.

Halorrhagidaceae.

Цвѣты въ кистяхъ или одиночныя, обоеполые; растенія наземныя или болотныя, съ простыми или зубчатыми листьями; чашечка опадающая.

Onotheraceae.

99. Чашечка и вѣнчикъ 4-листные или только верхушечный цвѣтокъ (95) 5-лиственный. остальные—4-листные. или цвѣты 3-чатыя, и тогда чашечка иногда бываетъ 2-дольная. 100.

Всѣ цвѣты имѣютъ 5-раздѣльные чашечку и вѣтчикъ, или же околоцвѣтникъ состоитъ изъ 2 рядовъ по 3 листа въ каждомъ. 104.

100. Растенія бѣлыя или желтоватыя, безъ зеленыхъ листьевъ.

Monotropaceae.

Растенія зеленыя, съ листьями. 101.

101. Маленькія подводныя растенія съ одиночными, 3—4-лепестковыми цвѣтами и 3—4-дольной чашечкой; иногда чашечка бываетъ 2-дольная.

Elatinaceae.

Наземныя растенія б. или м. крупныя съ 4-дольными цвѣтами. 102.

102. Одна мутовка въ 4 листа на простомъ стеблѣ; цвѣтокъ одиночный, верхушечный, о 8 тычинокъ (рис. 58); завязь 4-гнездная; плодъ—ягода.

(Paris) *Asparagaceae.*

Растенія имѣютъ другой видъ; тычинокъ 4—6; плодъ—стручокъ, орѣшекъ или сѣмянка. 103.

103. Цвѣты въ щиткахъ или кистяхъ; тычинокъ 6, б. ч. 4 тычинки длиннѣе 2 остальныхъ; двустворчатый стручокъ или стручочекъ, рѣдко колѣчатый, поперекъ разламывающійся на колѣна, еще рѣже орѣшекъ; чашечка легко опадаетъ и не остается при плодѣ (рис. 59).

Cruciferae.

Цвѣты въ полузонтикахъ; 4 тычинки прикрѣплены къ околоцвѣтнику супротивъ его долей; плодъ—сѣмянка; наружная обертка, которая часто принимается за чашечку, остается при сѣмянкѣ (рис. 60).

(Alchemilla) *Rosaceae.*



Рис. 59.



Рис. 60.

104. Чашечка или наружный околоцвѣтникъ изъ свободныхъ чашечныхъ (99) лепистковъ, или глубоко-раздѣльная почти до самаго основанія. 105.

Чашечка зубчатая, надрѣзная или раздѣльная на доли, но не доходящая до основанія чашечки, или чашечка трубчатая. 114.

105. Цвѣты состоятъ изъ 2 рядовъ по 3 листка въ каждомъ, такъ что цвѣты кажутся состоящими изъ 6 листочковъ. 106.

Цвѣты съ цвѣточными покрывами 5-ными. 108.

106. Цвѣты б. м. крупныя, ярко окрашенныя; столбикъ съ головчатымъ или 3-лопастнымъ рыльцемъ; коробочка 3-гнездная; растенія съ луковицами.

Liliaceae.

Цвѣты мелкіе, невзрачныя, зеленоватыя или буроватыя; рылецъ 3 или 6; луковицъ нѣтъ. 107.

107. Цвѣты пленчатые, въ верхушечныхъ или боковыхъ клубочкахъ, колосьяхъ, пучкахъ или полусонтикахъ; столбикъ о 3 нитевидныхъ рыльцахъ; коробочка 3-створчатая, 1- или 3-гнѣздная (рис. 61). *Juncaceae.*

Цвѣты не пленчатые, въ верхушечныхъ кистяхъ; рыльца сидячія; 3 или 6 плодниковъ, вполне сросшихся между собой; 3 или 6 коробочекъ отдѣляются отъ цвѣточнаго стержня снизу вверхъ (рис. 62). *Juncaginaceae.*



Рис. 61.



Рис. 62.

108. Тычиночныя нити спаяны внизу въ короткое кольцо; тычинокъ 10, всѣ съ пыльниками или только 5, а 5 другихъ въ видѣ нитей или зубцовъ. 109.

Тычинки свободныя, нити ихъ не спаяны. 111.

109. Листья сидячіе, узкіе, цѣльнокрайніе. *Linaceae.*

Листья черешковые, раздѣльные или сложные. 110.

110. Листья сложные, 3-чатые, съ листочками вдоль складчатыми, цѣльнокрайними; завязь 5-гнѣздная, 5-гранная, о 5 столбикахъ; коробочка 5-гнѣздная, 5-створчатая (рис. 63). *Oxalidaceae.*



Рис. 63.



Рис. 64.

Листья пальчато- или перисто-раздѣльные, б. ч. зубчатые, супротивные; пестикъ изъ 5 вполне сросшихся завязей и столбиковъ съ 5 свободными рыльцами; плодъ распадается на 5 сѣмянокъ, отдѣляющихся отъ цвѣточнаго стержня снизу вверхъ вмѣстѣ со столбиками, которые закручиваются дугой, кольцомъ или же спиралью (рис. 64). *Geraniaceae.*

111. Листья супротивные или мутовчатые. 112.

Листья очередные или корневые. 113.

112. Одна мутовка въ 5—6 листьевъ на простомъ стеблѣ и одинъ верхушечный цвѣтокъ.

(уклонная форма—Paris) *Asparagaceae.*

Листья супротивные; цветы въ полузонтикахъ.

(Alsinoideae) *Caryophyllaceae*.

113. Верхняя поверхность листьевъ густо усажена железами на длинныхъ нитевидныхъ ножкахъ; молодые листья свернуты спирально; цветы мелкіе, въ кистяхъ; завязь съ 3 (4—5) столбиками (рис. 65). *Droseraceae*.



Рис. 65.



Рис. 66.

Листья безъ стебельчатыхъ железокъ и не свернуты спирально; цветы крупныя, одиночныя, на стрѣлкахъ; между вѣнчикомъ и тычинками корона изъ 5 пальчато-раздѣльныхъ железистыхъ пластинокъ (рис. 66); столбика нѣтъ; 4 сидячихъ рыльца.

(*Parnassia*) *Saxifragaceae*.

114. Цветы въ клубочкахъ, сидячіе въ пазухахъ листьевъ, съ тонкими (104) плечатыми прицветниками (рис. 67). *Paronychioideae*. Цветы на ножкахъ, въ кистяхъ, иногда одиночныя; плечатыхъ прицветниковъ нѣтъ. 115.



Рис. 67.




Рис. 68.

115. Листья супротивныя; лепестки съ погонкомъ, прикрѣплены вмѣстѣ съ тычинками къ ложу цветка; завязь простая, б. ч. на ножкѣ съ 2—3—5 столбиками (рис. 68).

(*Silenoideae*) *Caryophyllaceae*.

Листья очередныя или корневые, иногда въ ложной мутовкѣ; завязь 2—5-гнѣздная. 116.

116. Листья черешковыя, широкіе; лепестки и тычинки прикрѣплены къ ложу цветка; завязь 5-гнѣздная, съ 1 столбикомъ (рис. 69).

Pirolaceae.

Листья сидячіе, узкіе, цѣльнокрайніе; лепестки и тычинки прикрѣплены къ краю отгиба 5-надрѣзной чашечки; завязь 2-гнѣздная съ 2 остающимися въ видѣ рожекъ столбиками (рис. 70).

Saxifragaceae.

117. Завязь вполне верхняя, заключена въ чашечку. 118.

(82) Завязь нижняя, подъ чашечкой, рѣдко полунижняя. 137.

118. Травянистыя растенія съ вьющимся стеблемъ. 119.

Растенія съ прямымъ, иногда изгибаемымъ, но не вьющимся стеблемъ. 120.



Рис. 69.

Рис. 70

119. Стебель безъ листьевъ, нитевидный, розовый или бѣловатый; цвѣты мелкіе, скупены въ клубочки или въ короткихъ повиселыхъ кистяхъ. (Cuscuta) *Convolvulaceae*.

Стебель съ очередными черешковыми, стрѣловидными листьями; цвѣты крупныя, ворончатые, одиночныя, пазушныя, на ножкахъ. *Convolvulaceae*.

120. Тычинокъ 8—10, болѣе числа долей вѣнчика, колокольчатого или кубарчатого. 121.

Тычинокъ по числу долей вѣнчика или менѣе, отъ 2 до 7. 122.

121. Листья коротко-пильчатые, расположены черепичато въ 4 ряда; вѣнчикъ 4-надрѣзной, чашечка 4-раздѣльная, остающаяся, окрашена въ цвѣтъ вѣнчика; тычинокъ 8 (рис. 71).



Рис. 71.

(Calluna) *Ericaceae*.

Листья очередныя, пластинчатые; чашечка 5-раздѣльная; вѣнчикъ кубарчатый, съ

5 зубцами; тычинокъ 10.

Ericaceae.

122. Завязь 4-дольная или 4-лопастная, съ 1 столбикомъ въ серединѣ; плодъ распадается на 4 односемянныхъ орѣшка. 123.

Завязь цѣльная или по крайней мѣрѣ не 4-дольная, обращается въ коробочку или ягоду. 124.

123. Листья супротивныя, крестообразно расположенныя на 4-гранномъ стеблѣ; вѣнчикъ б. ч. неправильный; тычинокъ 4 или 2 (рис. 72).

Labiatae.

Листья очередныя, рѣдко попарно-сближенныя, б. ч. покрыты щетинками или волосистыя; цвѣты б. ч. въ завиткахъ, обыкновенно правильные; тычинокъ 5. *Borraginaceae*.

124. Цвѣты вполне правильные. 125.

Цвѣты неправильныя, т.-е. либо всѣ доли чашечки или вѣнчика

неправильный, либо только некоторые части вѣнчика не вполне одинаковыя. 132.

125. Тычинокъ 2 (рис. 73).

Oleaceae.




Рис. 72.

Рис. 73.

Тычинокъ 4—5 или болѣе по числу долей вѣнчика. 126.

126. Цвѣты съ пленчатымъ вѣнчикомъ (рис. 74), скупены на верхушкѣ стрѣлки въ плотный колосъ.

Plantaginaceae.

Цвѣты съ вѣнчикомъ не пленчатымъ и не собраны колосомъ на концѣ стрѣлки. 127.




Рис. 74.

Рис. 75.

Рис. 76.

127. Рыльце простое, головчатое или нитевидное. 128.

Рыльце 2-лопастное или 3-раздѣльное. 131.

128. Тычинки супротивны долямъ вѣнчика, т.-е. прикрѣплены къ трубкѣ вѣнчика противъ долей его отгиба; завязь простая (рис. 75).

Primulaceae.

Тычинки чередуются съ долями вѣнчика; завязь 2-гнездная или двойная. 129.

129. Листья очередные; плодъ—ягода или 2-гнездная коробочка, вслѣдствіе развитія ложныхъ перегородокъ 4-гнездная (рис. 76).

Solanaceae.



Рис. 77.

Рис. 78.

Листья супротивные; 2 плодника, сросшіеся завязями или также п столбиками, оканчиваются расширеннымъ кожистымъ дискомъ, круглымъ или 5-угольнымъ. 130.

130. Зѣвъ вѣнчика закрытъ 5-лопастнымъ кольцомъ, состоящимъ

изъ сросшихся между собой придатковъ пыльниковъ (рис. 77);
цвѣты мелкіе, бѣлые, въ пазушныхъ полузонтикахъ.

Asclepiadaceae.

Зѣвъ вѣнчика открытый, безъ придатковъ (рис. 78); цвѣты большіе,
фіолетовые, одиночные, пазушные.

Aprocynaceae.

131. Рылецъ 3 на длинномъ столбикѣ; завязь 3-гнѣздная; листья не-
(127) парноперистые (рис. 79).

Polemoniaceae.

Рылецъ 2-лопастное, спящее или на столбикѣ; завязь простая или
только внизу 2-гнѣздная; листья супротивные, простые, иногда
корневые и тогда очередные, 3-чатые (рис. 80).

Gentianaceae.



Рис. 79.

Рис. 80.

132. Тычиночекъ 3; 3 почти сидячихъ рыльца; коробочка 3-створчатая;
(124) чашечка 2-надрѣзная; вѣнчикъ ворончатый съ 5-лопастнымъ
отгибомъ, въ которомъ 3 дольки меньше 2 остальныхъ (уклон-
ная форма *Montia*).

Portulacaceae.

Тычиночекъ 2—4, изъ нихъ 2 больше 2 другихъ, иногда 5 не-
равныхъ между собой; рылецъ простое или 2-раздѣльное; коро-
бочка 2-створчатая. 133.

133. Травы безъ зеленыхъ листьевъ, съ одними чешуйчатыми бѣлыми
или буроватыми листьями (паразиты). 134.

Травы съ зелеными листьями. 135.



Рис. 81

Рис. 82.

134. Все растеніе свѣтло-буроватое, съ железистыми волосками; ты-
чиночечныя нити у основанія мохнатыя.

Orobanchaceae.

Все растеніе голое, свѣтло-розовато-бѣлое; цвѣты розоватыя; ты-
чиночечныя нити голыя; пыльники въ нижней части мохнатыя.

(*Lathraea*) *Scrophulariaceae.*

135. Чашечка глубоко-2-раздѣльная, почти 2-листная; вѣнчикъ 2-гу-
бый (рис. 81); водяныя растенія съ листьями вильчато-или
перисто-многогнѣздными на тонкія доли съ воздушными пу-
зырьками.

Utriculariaceae.

Чашечка 4—5-дольная; растенія б. ч. наземныя или болотныя;
листья безъ воздушныхъ пузырьковъ. 136.

136. Рыльце 2-лопастное; тычинокъ 2—4, рѣдко 5, но тогда всё онѣ или только 3 болѣе длинны съ мохнатыми нитями; плодъ — 2-створчатая коробочка.

Scrophulariaceae.

Рыльце головчатое; тычинокъ 5 съ изогнутыми пушистыми, но не мохнатыми нитями, изъ нихъ 3 длиннѣ остальныхъ; вѣнчикъ слабо-2-губый съ 5 неравными лопастями; плодъ — коробочка, вскрывается крышечкой (рис. 82).—(*Hyoscyamus*) *Solanaceae.*



Рис. 83.

Рис. 84.

137. Листья мутовчатые или супротивные. 138.

(117) Листья очередные. 141.

138. Листья мутовчатые, цѣльнокрайніе; цвѣты 4-ные; плодъ распадается на два орѣшка (рис. 83).

Rubiaceae.

Листья супротивные. 139.

139. Тычинокъ 3; столбикъ съ 3-раздѣльнымъ рыльцемъ; сѣмя — орѣшекъ съ перистымъ хохолкомъ (рис. 84).

Valerianaceae.

Тычинокъ 5—4, иногда раздвоенныхъ до основанія; столбиковъ 1—4—5; завязь 2—5-гнѣздная, иногда полунижняя. 140.



Рис. 85.

Рис. 86.

140. Маленькое травянистое растеніе; цвѣты собраны головкой; верхній цвѣтокъ 4-пой съ 2-лопастной чашечкой, остальные—5-ные съ 3-лопастными чашечками; завязь полунижняя; тычинокъ 5, раздвоенныхъ до низу такъ, что ихъ кажется 10; столбиковъ 5 (рис. 85).

Adoxaceae.

Кустарники или подкустарники съ супротивными листьями; завязь нижняя; вѣнчикъ и чашечка б. ч. 5-дольные; тычинокъ столько, сколько долей у вѣнчика (рис. 86).

Caprifoliaceae.

141. Растенія выющіяся или стелющіяся, со спиральными усиками;

(137) цвѣты однополые.

Cucurbitaceae.

Растенія не вьющіяся и не стелющіяся, безъ усиковъ; цвѣты обоеполое. 142.

142. Полукустарники съ б. или м. кожистыми листьями; цвѣты 4-ные или 5-ные; тычинокъ вдвое болѣе числа долей вѣнчика; пыльники двурогіе (рис. 87). *Vaccinium. Ericaceae.*

Травы. Цвѣты 5-ные съ 5 тычинками. 143.

143. Растенія съ колючими листьями; цвѣты въ шаровидныхъ головкахъ, каждый цвѣтокъ



Рис. 87.

Рис. 88.



Рис. 89.

съ оберткой изъ колючихъ чешуекъ и съ чашечкой изъ щетинокъ; вѣнчикъ трубчатый; сѣмянка (рис. 89).

(*Echinops*) *Compositae.*

Растенія безъ колючихъ листьевъ; чашечка изъ 5 зеленыхъ долей; вѣнчикъ колокольчатый; завязь 2—3-гнездная; коробочка вскрывается дырочками (рис. 88). *Campanulaceae.*

Отдѣлъ Embryóphyta Zoïdiógama.

Подотдѣлъ Pteridóphyta.

Классъ I. Filicáriæ.

1 сем. Polypodiáceæ Mart.

Спорангiи большею частью на длинныхъ ножкахъ съ продольнымъ кольцомъ толстостѣнныхъ клѣтокъ, прерваннымъ у мѣста прикрѣпленiя спорангiя къ ножкѣ. Сорiи (кучки спорангiевъ) округлые или линейные, сидятъ на нижней поверхности листьевъ, между краемъ и жилкой, рѣже на самомъ краю, подъ покрываломъ или голые. Травянистыя, многолѣтнiя растенiя съ толстымъ, простымъ корневищемъ, часто съ ползучимъ подземнымъ стеблемъ и листьями, спирально свернутыми въ почкосложенiи.

1. Листья, несущiе споры, сильно отличаются отъ листьевъ безъ споръ. Боковыя жилки на долькахъ листьевъ простыя, не вѣтвистыя. *Onoclea.*

Всѣ листья одинаковой формы и, вполне развитые, несутъ споры. Всѣ или нѣкоторыя боковыя жилки на долькахъ вильчато-вѣтвистыя. 2.

2. Сорiи сидятъ сплошнымъ рядомъ на самомъ краю листьевъ, образуя непрерывную полосу. *Pteridium.*

Сорiи сидятъ кучками на нижней поверхности листа, но не на самомъ краю его. 3.

3. Покрывала нѣтъ или оно округлое, или округло-почковидное, вдавлено и прикрѣплено посрединѣ или радиальной складкой. *Aspidium.*

Покрывало продолговатое, прикрѣплено краемъ или подъ со-
рiемъ. 4.

4. Покрывало продолговатое или крючкомъ, прикрѣплено однимъ краемъ, другой край свободный, большею частью рѣзничатый. *Athyrium.*

Покрывало однобокое, вначалѣ выпуклое, перегнутое черезъ сорiй и прикрѣпленное подъ нимъ, потомъ край покрывала отворочень. *Cystopteris.*

I. *Athyrium* Roth.

Сорій продолговатые, вытянуты вдоль наружной стороны боковых жилок или согнуты крючкомъ, и тогда заходятъ по другую сторону жилки. Покрывало той же формы, прикрѣплено однимъ краемъ къ жилкѣ, другой край свободный, большею частью рѣбчатый. Сосудистые пучки въ разрѣзѣ верхней части листового черешка имѣютъ видъ подковы.

1. *A. filix femina* Roth. Пет. Кр. III, стр. 147.—Пет., стр. 143.—Mart., p. 185.

Athyrium molle Roth. Mart., p. 186.—St. II, p. 57.

Asplenium Filix femina Bernh. Бух. II, № 512.—Бух. I, № 474.—F. O. № 8, p. 118.—Кауф. II, № 938.—Цин., № 1742.—Кауф. I, стр. 624—25.—Ann. C. I, № 66.

Aspidium Filix femina Gold.

Polypodium Filix femina. St. II, 57—St. I, № 696.

Корневище короткое, толстое, густо покрыто черешками прошлогоднихъ листьевъ, темно-бурое; листья 30—100 см., тонкіе, свѣтло-зеленые, продолговато-ланцетные, черешки въ 2—3 раза короче пластинки; доли первого порядка продолговато-ланцетные, заостренные, сидячія; доли второго порядка ланцетные или узко-ланцетные, по краямъ зубчатые или надрѣзные, надрѣзы на концѣ съ 2—3 зубцами; сорій сидятъ густо, съ блѣдными покрывалами.



Athyrium filix femina.

Споры съ $\frac{2}{2}$ июня, зрѣлыя $\frac{2}{2}$ августа. Часто по сырымъ лѣсамъ и кустарникамъ.

a. *dentata* Döll. (*Polypodium dentatum* Hoffm. *Polypodium molle* All.). Листья небольшіе, до 30 см. или нѣсколько длиннѣе, 2-перистые; доли второго порядка основаніями низбегающія, по краямъ просто- и коротко-зубчатые. Лизаветно, Павлово, Врн. у. (К.).—Воробьевы горы. (II.)

3. *fissidens* Döll. Листья большіе, 60 см. и длиннѣе, двояко-перисто-надрѣзные; доли второго порядка по краямъ глубоко-надрѣзано-пильчатые, почти перистые; надрѣзы въ верхней части дольки на верхушкѣ съ 2 зубцами, въ нижней съ 3-мя.

Село Богородское, Лосевный Островъ (II.).—Оврагъ Каменка, близъ дер. Варавино, Дмит. у. (С.).

2. *Cystopteris* Bernh.

Сорій круглые, сидятъ на утолщеніяхъ посрединѣ жилки. Покрывало однобокое, вначатѣ выпуклое, перегнутое черезъ сорій, прикрѣплено подъ нимъ къ споровому, подъ конецъ отогнуто. Небольшой, нѣжный и очень ломкій папоротникъ.

2. *C. fragilis* Bernh. Бух. II, № 515.—Бух. I, № 477.—F. O. № 8, p. 118.—Пет., стр. 175.—Кауф. II, № 937.—Цин. № 1741.—Pinz., p. 20.—Кауф. I, стр. 624.—Ann. C. VI, № 72.

Aspidium fragilis Sw. Gold. C., p. 23.

Athyrium fragilis Mart., p. 185.

Polypodium fragilis. St. II p. 57.—St. I № 697.

Корневище толстое, короткое; растение 10—35 см., светло- или желтовато-зеленое, очень ломкое; листья въ очертаніи продолговато-лицевидные или ланцетные, 2—3-перисто-раздѣльные; доли первого порядка на короткихъ черешкахъ, продолговатыя, яйцевидныя или ланцетныя; нижняя пара короче слѣдующей; доли второго порядка овальныя или продолговатыя, туповатыя, по краямъ зубчатыя или надрѣзныя; надрѣзы зубчатые; черешки листьевъ короче пластинокъ, въ нижней части покрыты светло-бурыми чешуйками.

Споры съ $\frac{1}{2}$ іюня. По тѣнистымъ, каменистымъ мѣстамъ. Кунцево, Никольское, Раменки, Братцово, Соколово; Варавино, Дмт. у. (К.).

- а. *dentata* Hook. Доли первого порядка яйцевидно-ланцетныя или продолговатыя, тупыя или заостренныя; доли второго порядка большею частью сближены, низбегающія и сливаются между собой. обратно-яйцевидныя или яйцевидныя, туповатыя, по краямъ тупо- и неравнозубчатыя. Царицыно (С.). Ланково, Руз. у., Бѣлые Колодези, Кзм. у. (П.).

- б. *pinnatifidita* Koch. Доли первого порядка яйцевидно-продолговатыя; доли второго порядка большею частью разставлены, продолговато-яйцевидныя, глубоко-перисто-надрѣзныя, особенно нижнія; надрѣзы зубчатые. Воробьевы горы (П.).—Введенское близъ Звенигорода (П. и С.).



Cystopteris fragilis.

3. *Aspidium* Sw.

Покрывала на соріяхъ нѣтъ или оно почковидное, или округло-почковидное, образуетъ щитокъ, прикрѣпленный къ споровому въ серединѣ или радіальною складкою.

1. Сорія голые, безъ покрывала. 2.

Сорія въ молодости со щиткомъ. 3.

2. Листья перисто-сложные, съ нижней стороны и по краямъ пушистые.

A. Phegopteris Baumg.

Листья двусложные, тройчатые, голые.

A. Dryopteris Baumg.

3. Щитокъ на соріи круглый, вдавленный только въ центрѣ, по краямъ свободный.

A. Braunii Spenner.

Щитокъ на соріи почти круглый или почковидный, вдавленный складкою отъ центра по радіусу до края. 4.

4. Листовыя доли второго порядка цѣльнокрайнія или слегка выемчато-зубчатыя. 5.

Доли второго порядка зубчато-надрѣзные или ясно-зубчатыя. 6.

5. Листовыя доли второго порядка туповатыя, плоскія; соріи сидятъ близъ края листа. *A. montanum* Aschr.

Доли второго порядка съ завернутыми краями; соріи сидятъ по срединѣ между жилкой и краемъ. *A. Thelypteris* Sw.

6. Нижнія доли перваго порядка на короткихъ, но замѣтныхъ черешкахъ; зубчики по краямъ шпоровидные. 7.

Нижнія доли перваго порядка сидячія; зубчики по краямъ простые. *A. filix mas.* Sw.

7. Листья мягкіе, перисто-2-4-сложные; нижнія доли перваго порядка неравностороннія; соріи не сливаются.

A. spinulosum Sw.

Листья почти кожистые, перисто-сложные; нижнія доли перваго порядка равностороннія; зрѣлые соріи касаются краями.

A. cristatum Sw.

3. *A. Dryopteris* Baumg.

Polypodium Dryopteris L. Бух. II, № 507.—Бух. I, № 469.—F. O., № 8 p. 119.—Кауф. II, № 932.—Кауф. I, стр. 619—20.—Ann. C. I, № 64.—Hoff., H., № 8011.—Gold. C., p. 23.—Mart., p. 184.—St. II, p. 57.—St. I, 698.—Pal., № 2216.

Phegopteris Dryopteris Fée. Пет., стр. 238.—Цин., № 1734.



Aspidium Dryopteris.

Корневище тонкое, ползучее, черное, лоснящееся; черешки соломенно-желтые, въ 2—3 раза длиннѣ пластинки, голые, только у основанія покрыты рѣдкими чешуйками; листья въ очертаніи широко-треугольные, двусложные, тройчатые; доли листа 2-перистыя, на черешкахъ, двѣ боковыя неравностороннія; листочки на доляхъ продолговатые или продолговато-ланцетные, перисто-раздѣльные, дольки ихъ тупыя, округлыя, рѣже слегка заостренныя, цѣльнокрайнія или неравно-городчатые. Споры съ $\frac{1}{2}$ іюля. По тѣнистымъ мѣстамъ и въ большихъ хвойныхъ лѣсахъ. Лосинный Островъ, Лизаветино (К.).—Звенигородъ (Куль.).

4. *A. Phegopteris* Baumg.

Phegopteris polypodioides Fée. Пет., стр. 238.—Кауф. II, № 931.—Цин., № 1733.

Polypodium Phegopteris L. Кауф. I, стр. 629.—Ann. C. III, № 271.—Hoff., H., № 8016.—Gold. C., p. 23.—Mart., p. 184.—St. II, p. 57.—St. I, № 693.


Корневище ползучее; черешки желтоватые, длиннѣе пластинки, покрыты, какъ и срединная жилка листа, буроватыми чешуйками; листья въ очертаніи сердцевидно-продолговатые, длинно-заостренные, темно-зеленые, съ нижней стороны и по краямъ пушистые, 2-перистые; листовыя доли первого порядка сближены, только нижняя пара долей нѣсколько отставлена, всѣ ланцетныя, длинно-заостренные, съ загнутой кверху верхушкой; доли второго порядка туповатыя, цѣльно-крайнія или мелко-зубчатые, нижнія (исключая первыхъ) сливаются между собой въ 4-угольникъ вмѣстѣ съ главнымъ черешкомъ листа и нѣсколько по нему изгибаются. Споры съ $\frac{2}{2}$ іюня. По болѣе крупнымъ лѣсамъ. Иваново, Кунцово, Соколово, Голиково, Клинъ у. (К.).—Лоспинный Островъ (А.).—Соколово на Сходнѣ, Воробьевы горы (П.).—Звенигородъ (Куль.).



Aspidium Phegopteris.

5. **A. Thelypteris Sw.** Пет. Кр. III, стр. 146.—Пет., стр. 142.—Gold. C., p. 23.
Polystichum Thelypteris Roth. Бух. II, 508.—Ф. Б., № 133.—Бух. I, № 470.—
Кауф. II, № 933.—Цин., № 1736.—Кауф. I, стр. 621.

Корневище тонкое, ползучее, черное; черешки очень ломкіе, почти голые, равны пластинкѣ, у спороносныхъ нѣсколько короче; листья въ очертаніи ланцетные или продолговато-ланцетные, свѣтло- или желтовато-зеленые, въ молодости съ нижней стороны покрыты рѣдкими, желтоватыми точечными железками и бѣлыми простыми волосками, потомъ голые; доли первого порядка линейно-ланцетныя, заостренныя; доли второго порядка продолговатыя, большею частью слегка заостренныя, цѣльнокрайнія, у спороносныхъ—съ сильно завернутыми краями, отчего доли кажутся почти треугольными и нѣсколько серповидно-согнутыми; сорин сидятъ посрединѣ между срединной жилкой и краемъ, во время созрѣванія сливаются; покрывало по краямъ зубчатое, железистое, скоро опадающее. Споры съ $\frac{2}{2}$ іюля.



Aspidium Thelypteris

По болотамъ и болотистымъ кустарникамъ. Воробьевы горы (К.).—С. Михайловское. Пдл. у.; болото Пальница (Б.).—Топоровское оз., Мож. у. (В. и Ф. Б.).—Глубокое оз., Руз. у. (Г. О. и Ф. Б.).—Мытищи, по Яузѣ (С.).—Соколово на Сходнѣ (П.).

6. *A. montanum* (Vogel) Aschr. Пет., Кр. III, стр. 147.*Aspidium Oreopteris* (Sw.). Hoff., Н., № 8046.—Mart., p. 184.*Polystichum Oreopteris* D.C. Кауф. II, стр. 652.—Цин., стр. 504.—Кауф. I, стр. 622.

Корневище короткое, косое, даетъ воронку листьевъ 60—100 см. дл.;

*Aspidium montanum.*

черешокъ короткий, вмѣстѣ съ срединной жилкой покрытъ рѣдкими пленкамъ; нижняя сторона 2-перистаго, продолговато-ланцетнаго листа густо покрыта точечными желтыми железками и простыми бѣлыми волосками; доли первого порядка почти сидячія, ланцетныя, заостренныя, нижнія почти треугольныя; доли второго порядка туповатыя, плоскія или съ слегка загнутыми краями, цѣльно-крайнія или слегка выемчатыя, рѣдко-зубчатыя; соріи сидятъ очень близко отъ края, но не касаются его. Находится въ гербаріи Гофмана за № 8046.

7. *A. filix mas.* Sw. Пет., стр. 142.—Hoff., Н., № 8034.—Gold. C., p. 23.—Mart., p. 185.*Polystichum Filix mas.* Roth. Бух. II, № 509.—Бух. I, № 471.—F. O., № 8, p. 118.—Кауф. II, № 934.—Цин., № 1737.—Кауф. I, стр. 622.—Ann. C. I, № 65.*Polypodium Filix mas.* L. St. II, p. 57.—St. I, № 695.—Pal., № 2215.

Корневище толстое, примостоящее, несетъ густую воронку листьевъ

*Aspidium filix mas.*

30—140 см. дл.; черешокъ много короче листа, въ нижней части покрытъ очень густо, въ верхней слабѣ длинными, линейно-ланцетными, бурыми или темно-бурыми пленкамъ; листъ темно-зеленый, продолговатый, съ нижней стороны свѣтлѣ окрашенъ, къ верхушкѣ суживается быстро, къ основанію постепенно; доли первого порядка ланцетовидно-линейныя, заостренныя; доли второго порядка почти съ параллельными, цѣльными или зубчатыми краями и съ закругленной, зубчатой верхушкой; соріи только въ верхней части листа сидятъ двурядно, на нижней части листа дольки оближены, но не

сливаются. Споры съ $\frac{1}{2}$ июля, зрѣлыя съ $\frac{2}{2}$ августа. По лѣсамъ и кустарникамъ, часто.

a. crenatum Milde. (typicum Luerissen). Доли второго порядка по краямъ и на закругленной верхушкѣ пильчато-зубчатыя. Мытницы, Лосинный Островъ, Хомутово на Клязьмѣ (С.).—Лапково, Ряз. у., Воробьевы горы (П.).

3. *subintegrum* Döll. Доли второго порядка по краямъ цѣльныя или почти цѣльныя, закругленная верхушка зубчатая. Оврагъ Каменка, близъ Варавина, Дмит. у. (С.).

8. *A. cristatum* Sw. Пет., стр. 142.—Gold., С., р. 23.—Mart., р. 185.

Polystichum cristatum Roth. Бух. II, № 510.—Бух. I, № 472.—F. O. № 8, р. 118.—Кауф. II, № 935.—Цин., № 1739.—Кауф. I, стр. 622.—Ann. С. III, № 272.

Polypodium cristatum L. St. II, р. 57.—St. I, № 694.—Pal., № 2214.

Корневище толстое, почти горизонтальное; черешки желтые, зеленоватые, рѣже желто-бурые, въ нижней части покрыты свѣтло-бурыми, крупными пленками, у споровыхъ листьевъ равны пластинкѣ, у бесплодныхъ вполнѣ короче ея; листъ узко-продолговатый, почти кожистый, одна или двѣ нижнихъ доли первого порядка нѣсколько шире разставлены и при сердцевидномъ основаніи почти треугольныя, остальные—продолговатыя; доли второго порядка продолговатыя, тупыя, часто лопастныя, двояко-пильчато-зубчатыя, зубчики заострены почти въ шипики; сорія сидятъ въ верхней части листа на долькахъ, повернутыхъ почти подъ прямымъ угломъ къ пластинкѣ листа и обращенныхъ нижней стороной вверхъ; сорія крупныя, во время созрѣванія касаются краями. Споры съ $\frac{1}{2}$ іюля. По болотистымъ кустарникамъ и сырымъ лѣсамъ. Голиково, Кля. у., Перово (К.).—Богородское, Зыково (П.).—Мытницы по берегу Яузы, Болшево на Клязьмѣ (С.).—Подсолнечное, Кля. у. (Гей.).



Aspidium cristatum.

9. *A. spinulosum* Sw. Пет., стр. 142.—Gold., С., р. 23.—Gold. Sp., р. 140.—Mart., р. 185.

Aspidium dilatatum Willd. Hoff., Н., № 8030.

Polystichum spinulosum D.C. F. O., № 8, р. 118.—Кауф. II, № 936.—Цин., № 1740.—Кауф. I, стр. 623.—Ann. С. II, № 170.

Корневище толстое, косое; черешки съ глубокой бороздкой; листъ 2-4-перистый; нижнія доли первого порядка яйцевидныя или яйцевидно-ланцетныя, неравностороннія; остальные продолговато-ланцетныя, равно-стороннія; доли второго порядка продолговато-ланцетныя, заостренныя; доли третьего порядка продолговатыя или эллиптическія, пильчатыя или пильчато-надрѣзныя; зубчики вытнуты въ острія; сорія расположены рядами, не сливаются. Споры съ $\frac{1}{2}$ іюля. По лѣсамъ и тѣнистымъ мѣстамъ.

α. genuinum Milde.

Polystichum spinulosum D.C. *vulgare* Koch. Бух II, № 511.—Бух I, № 473.—
Кауф. II, стр. 653.—Кауф. I, стр. 623.

Листья свѣтло-зеленые; черешокъ равенъ пластинкѣ; доли первого порядка коротко-заостренныя; доли третьяго порядка пальчатая, плоскія;



Aspidium spinulosum genuinum.



Aspidium spinulosum dilatatum.

соріи маленькіе, расположены двурядно; щитокъ зазубренный, безъ железокъ. Всесвятское (К.).—С. Михайловское, Пдл. у. (Б.).*

β. dilatatum Sw.

Polystichum spinulosum D.C. *dilatatum* Koch. Мос., № 56.—Кауф. II, стр. 654.—
Кауф. I, стр. 623.

Листья темно-зеленые съ желтоватыми, железистыми волосками; черешокъ значительно короче пластинки; доли третьяго порядка пальчато-надрѣзныя съ завернутыми краями; соріи болѣе крупныя; щитокъ, особенно по краямъ, железистый. Соколово, Лосинный Островъ (К.).—Соколово на Клязьмѣ, Мос. у., оврагъ Каменка близъ Варавина, Дмт. у. (С).

10. A. Bráunii Spenner. Пет. Кр. III, стр. 146.

Aspidium aculeatum Sw. v. *Bráunii* Döll. Ф. Б., № 29.

Aspidium aculeatum Sw. Цян., стр. 504.—Mart., p. 185.

Aspidium aculeatum Sw. *Swartzianum* Koch, Кауф. II, стр. 651.—Кауф. I, стр. 620.

Корневище короткое, толстое; черешокъ короткій, свѣтло-зеленый, у основанія черно-бурый, б. или м. густо покрытъ желтоватыми или буроватыми чешуйками; листья продолговато-ланцетные, къ обоимъ концамъ равномерно суживаются, сверху ярко-зеленые, нѣсколько глянце-вые, снизу окрашены свѣтлѣе, съ обѣихъ сторонъ покрыты бѣловатыми чешуйчатыми волосками; доли первого порядка продолговатыя, нижніи—туповатыя и сидятъ болѣе разставленно, остальныя—заостренныя; доли второго порядка изъ клиновиднаго косо-низбѣгающаго основанія неравно-сторонне-яйцевидно-ромбическія съ нѣсколько вытянутой, тупой верхуш-

кой, по краямъ съ прижатými щетинисто-острыми зубчиками: щетинки бѣловатыя; соріи крупныя, никогда не сливаются, сидятъ на долькахъ двурядно въ верхней половинѣ листа; щитокъ очень тонкій, скоро опадающій. Зрѣлыя споры $\frac{2}{2}$ августа. Кунцово, Царицыно (Ц.).—Воробьевы горы (Мар.). Горенки, гербарій Гольдбаха.

4. *Onoclea* L.

Листья, несущіе споры, сильно отличаются отъ листьевъ безъ споръ. Боковыя жилки на доляхъ второго порядка загibaются къ краю листа дугою, вогнутой къ срединной жилкѣ, и не развѣтвляются. Доли листьевъ со спорами свернуты до самой средней жилки и совершенно закрываютъ кучки спорангіевъ. Соріи округлыя. Покрывало снизу приросшее къ спороносу, свободный край его зубчатый, рано исчезаетъ.




Aspidium Braunii.

11. *O. Struthópteris Hoffm.* Пет. Кр. III, стр. 148.—Пет., стр. 230.

Struthiopteris germanica Willd. Бух. II, № 514.—Бух. I, № 476.—F. O., № 8, p. 118.—Кауф. II, № 941.—Цин., № 1746.—Кауф. I, стр. 626.—Ann. C. IV, № 73.—Gold. C., p. 23.—Mart., p. 186.

Osmunda Struthiopteris L. St. II, p. 57.—St. I, № 689.—Pal., № 2207.

Корневище толстое, съ побѣгами, несетъ воронку безплодныхъ листьевъ, внутри которой сидятъ 2—3 спороносныхъ листа; черешки короткіе съ широкимъ желобкомъ, въ молодости, какъ и жилки, покрыты бурымъ войлокомъ, потомъ голые; листъ 30—90 см. дл., въ очертаніи продолговатый, значительно суживается къ основанію и быстро заостряется къ верхушкѣ; доли первого порядка линейно-ланцетныя, заостренныя, сидячія, постепенно книзу укорачивающіяся и отгибающіяся внизъ, нижнія—почти стрѣловидно-стеблеобъемлющія; доли второго порядка продолговатыя, тупыя или усѣченныя, почти цѣльнокрайнія; спороносные листья сперва зеленые, потомъ темно-бурые, перистые; доли ихъ толстыя, почти цилиндрическія, свернутыя, съ каждой стороны четкообразно-бугорчатые.



Onoclea Struthiopteris

Первое появленіе споръ $\frac{1}{2}$ іюля, зрѣлыя $\frac{1}{2}$ сентября. По берегамъ рѣкъ и ручьевъ въ тѣнистыхъ мѣстахъ. Лизаветино, Никольское, Петрово, Воробьевы горы (К.).—С. Михайловское по р. Пахрѣ, Пдл. у. (Б.).—Усово, Зви. у. (П.).—Царицыно; Боровскій курганъ, Ври. у., Соколово на Клязьмѣ, Мос. у. (С.).


5. *Pteridium* Gleditsch.

Сорін сидять по самому краю листа въ видѣ непрерывной полоски, прикрыты 2 узкими, линейными покрывалами, изъ которыхъ верхнее свернуто наподобіе края листа. Боковыя жилки на доляхъ третьего порядка загбаются дугою, выпуклою къ срединной жилкѣ и вильчато развѣтвляются.

12. *P. aquilinum* Kuhn. Пет. Кр. III, стр. 148.—Пет., стр. 253.

Pteris aquilina L. Бух. II, № 513.—Бух. I, № 475.—F. O. № 8, p. 118.—Кауф. II, № 940.—Цин., № 1745.—Pinz., p. 20.—Кауф. I, стр. 626.—Ann. C. III, № 273.—Hoff., H., № 8078.—Gold. C., p. 23.—Mart., p. 186.—St. II, p. 57.—St. I, № 690.—Pal., № 2209.

Корневище толстое, ползучее, черно-бурое, даетъ 1 листь 60—150 см. дл.; черешокъ желобчатый, примостоящій, до 10 мм. толщины, голый, только у основанія съ бурымъ войлокомъ, желтоватый; пластинка листа въ очертаніи треугольно-яйцевидная, нервно-3-сложная дугообразно отогнута, стоитъ почти горизонтально; доли первого порядка ланцетныя, нижнія на длинныхъ черешкахъ; доли второго порядка ланцетныя, тупозаостренныя; доли третьего порядка широко-ланцетныя, косыя, тупыя, цѣльнокрайнія; края листьевъ, несущихъ сорін, рѣсничатые; сорін у самого края; щитокъ линейный, по краю тоже рѣсничатый. Споры съ $\frac{1}{2}$ іюля. По открытымъ мѣстамъ и кустарникамъ, рѣже по лѣсамъ, часто.



Pteridium aquilinum.

2 сем. *Ophioglossaceae* R. Br.

Съ подземнымъ корневищемъ, обыкновенно съ 1 (рѣже съ 2) мясистымъ листомъ, въ почкосложеніи не свернутымъ спирально и раздѣленнымъ на двѣ половинны: наружную или нижнюю въ видѣ листовой пластинки и внутреннюю или верхнюю, состоящую изъ спорангіевъ. 2-рядно расположенныхъ колосомъ или метелкою; спорангіи шаровидные, кожистые, сидячіе, безъ кольца, до половины 2-створчатые; створки раскрываются поперекъ щелью.

6. *Ophioglossum* L.

Листовая пластинка цѣльная, безъ средней жилки, но съ сѣтчатыми жилками; спорангіи сдвинуты между собой и образуютъ сплюснутый линейный колосъ.

13. *O. vulgátum* L. Пет. Кр. III, стр. 143.—Ф. Б., № 130.—F. O., № 8, p. 118.—Пет., стр. 231.—Кауф. II, № 927.—Мил., № 48.—Цян., № 1729.—Кауф. I, стр. 616.—Gold. C., p. 23.—Gold. Sp., p. 140.

Корневнище почти горизонтальное, цилиндрическое, до 2 см. дл., толстое, съ длинными толстыми корнями; не несущая споръ пластинка листа большею частию одна, яйцевидная, яйцевидно-ланцетная или продолговатая, туповатая, цѣльнокраянная, мясистая, основаніе ея нѣсколько сужено, низбѣгаетъ по черешку и охватываетъ ножку колоса; растеніе съ колосомъ отъ 5 до 30 см.; колосъ большею частию превышаетъ листь, 1,5—4 см., много короче ножки, несетъ съ каждой стороны по 12—40 спорангіевъ, верхушка его оканчивается острымъ кончикомъ. Споры съ конца іюня весь іюль. По сырým лугамъ на кочкахъ, любитъ глинистую почву. Раменки (Ау.).—Шеламово (Р.).—Богородское, Мос. у. (М.).—С. Романцево, Мож. у. (В.).—Ольгино и Сухарево, Ряз. у. (Ф. О.).—Близъ дер. Селюхино, между р. Сестрой и р. Лютинкой и у дер. Хвостово на р. Шошѣ, Клин. у. (П. и С.).—Макарово, Ряз. у. (Куль.).



Ophioglossum vulgatum.

7. *Botrychium* Sw.

Листовая пластинка перистая или двуперисто-раздѣльная. Спорангіи не слившіеся, собраны въ односторонніе 2-рядные колосья, расположенные метелкой.

1. Безплодная часть листа на длинномъ черешкѣ, выходящемъ почти у самой земли.

B. Matricariae Spr.

Безплодная часть листа сидитъ близъ середины черешка плодосной. 2.

2. Безплодная часть листа просто-перистая. *B. Lunaria* Sw.

Безплодная часть листа 2—3-перисто-раздѣльная.

B. virginianum Sw.

14. *B. Lunaria* Sw. Пет. Кр. III, стр. 144.—Ф. Б., № 131.—F. O., № 8, p. 118.—Пет., стр. 148.—Кауф. II, 928.—Мил., № 49.—Гор., № 59.—Цян., № 1730.—Кауф. I, стр. 616.—Ann. C. III, № 270.—Hoff., II, № 7971.—Gold. C., p. 23.—Mart., p. 183.

Osmunda Lunaria L. St. II, p. 57.—St. I, № 687.—Pal., № 2204.

Все растеніе въ 5—20 см., желтовато-зеленое, мясистое; безплодная часть листа въ 2—3 раза длиннѣе своего поперечника, въ очертаніи продолговатая, съ округлой верхушкой, перисто-раздѣльная на короткомъ черешкѣ, сидящемъ въ среднѣй черешка плодосной части листа; сегменты безплодной части — косо-полудлунные съ широкимъ клиновиднымъ основаніемъ и округлой или слабо-выемчатой верхушкой, цѣльнокраянныя или со слабо и неравно выемчатыми краями; плодосная часть листа

2—3-перистая, превышает длиною бесплодную; спорангии по созрѣваніи желто-бурые; споры желтыя. Споры весь іюнь. По холмамъ и откосамъ. Раменки (К.).—Останкино (А.).—Хорошово (Ш.).—Шеламово (Р.).—Петровское-Разумовское (Г.).—Близъ Ступи (М.).—Ромашково, Мос. у., и Романцево, близъ Бородина (М.).—Дубровицы, Пдл. у. (Г.).—Черкпзово и Тарасовка на Клязьмѣ (П.).—Косино; между Бавескимъ болотомъ и Ивановскимъ, Звн. у., Воскресенское, Звн. у., Ивлево, Бгр. у., Раменки, Мос. у. (П.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.).—Б. Мытницы; опушка лѣса, близъ Борпсова, Срп. у. (С.).

15. **B. Matricariae Spr.** Пет. Кр. III, стр. 145.

Botrychium rutaefolium A. Br. Ф. Б., № 132.—Ф. О., № 8, р. 118.—Пет., стр. 148.—Кауф. II, № 929.—Мал., № 50.—Гор., № 60.—Цин., № 1731.—Кауф. I, стр. 617.

Botrychium rutaceum. Mart., p. 183.

Все растеніе желто-зеленое, въ 10—25 см., бесплодная часть листа зимуетъ, въ очертаніи треугольная, двояко—иногда почти тройко-перисто-раздѣльная, на длинномъ черешкѣ, отходящемъ отъ плодородной почти у самой земли; дольки сидячія или коротко-черешковья, округлыя или продолговато-яйцевидныя, на верхушкѣ закругленныя или усѣченныя, цѣльнокрайнія или слегка неравно-зубчатыя, усажены короткими и рѣдкими волосками; плодущая часть листа на длинномъ черешкѣ, превышаетъ бесплодную, двояко- или тройко-перисто-раздѣльная; спорангии желтые,



Botrychium Lunaria.



Botrychium Matricariae.



Botrychium virginianum.

потомъ красно-бурые. Споры съ конца іюля и $1\frac{1}{2}$ августа. По опушкамъ лѣсовъ. Шеламово, Вер. у. (Р.).—Б. Мытницы, Михайловка. Мож. у. (П.).—Тарасовка на Клязьмѣ (П. и С.).—Близъ Бутырокъ и близъ Алексѣевского (Мар.).—Останкино (З.).—Голышкпно. Мож. у. (Ф. О.).—Близъ дер. Знаменской, д. Кубяковой, д. Ваулиной. Мож. у. (Ф. Б.).—Мос. Бр. ж. д. 111 верста (Мос. и Ф. Б.).—Ромашково (Н.).

16. *B. virginianum* Sw. Пет. Кр. III, стр. 145.—Пет., стр. 148.—Кауф. II, № 930.—Гор., № 101.—Цян., № 1732.

Osmunda virginica L. Pal., № 2205.

Все растение въ 15—45 см., плодущая часть листа на длинномъ черешкѣ. 2—3-перисто-раздѣльная; на срединѣ черешка плодущей сидитъ безплодная часть листа въ очертаніи широко-треугольная, ярко-зеленая, пѣжная, двояко- или тройко-перисто-раздѣльная; доли первого порядка яйцевидно-ланцетныя; доли второго порядка узко-ланцетныя, перисто-раздѣльныя. надрѣзы ихъ продолговатые, остро-неравно-зубчатые, съ заостренной верхушкой; черешокъ листа и черешки его долей покрыты волосами, въ молодости довольно густо, потомъ рѣдко. (Споры съ $\frac{1}{2}$ июня и весь июль. По опушкамъ, лѣсамъ и кустарникамъ. — Въ Клещевскомъ казенномъ лѣсу, Клин. у. (П. и С.).—На берегу р. Сосенки между фабриккой Соловьева и Галиновымъ, по вырубленному кустарнику и въ Лосинномъ Островѣ близъ Богородека (М.).—Близъ селца Сотникова, Сри. у. (Бѣл.).—Подъ Звенигородомъ (Ч. и П.).

Классъ II. Equisetariae.

3 сем. Equisetaceae D.C.

Растенія съ членистымъ корневищемъ; стебли колѣнчатые съ удлиненными междоузліями и продольными бороздками и ребрышками; листья пленчатые, сросшіеся въ трубчатые или ворончатые влагалища, пѣзподъ которыхъ обыкновенно вырастаютъ мутовчато-расположенныя, простые или развѣтвленные членистые вѣтви, съ такими же листовыми влагалищами; часто плодущіе стебли отличаются отъ безплодныхъ и развиваются въ разное время; спорангій на нижней сторонѣ 5—6-угольныхъ щитковъ, сидящихъ на ножкахъ и образующихъ на верхушкѣ стебля и иногда вѣтвей яйцевидный или продолговатый колосъ; споры шаровидныя съ двумя спиральными, перекрещивающимися, лентообразными пятами, отъ высыханія развертывающимися и выпрямляющимися.

8. Equisetum L.

1. Зубцы на влагалищахъ рано опадаютъ, остаются только ихъ основанія. *E. hiemale* L.

Зубцы остаются. 2.

2. Зубцы на стеблевыхъ влагалищахъ бурые или красно-бурые съ болѣе свѣтлой каймой, часто спаяны по два или по трѣ. 3. Зубцы на стеблевыхъ влагалищахъ черные, часто съ бѣлой каймой, свободные, не спаянные. 5.

3. Плодущіе стебли развиваются много ранѣе безплодныхъ.

E. arvense L.

Плодущіе и безплодные стебли развиваются одновременно. 4.

4. Боковыя вѣтви развѣтвленные.

E. silvaticum L.

Боковые вѣтви большею частью простыя.

E. pratense Ehrh.

5. Стебли лежащіе, приподнимающіеся, рѣдко прямостоящіе; зубцы на влагалищахъ вытянуты въ длинныя остроконечія, скоро опадающія, но замѣтныя на верхнемъ влагалищѣ; стебли очень тонкіе, около 2 мм. толщ., образуютъ дерновинки.

E. variegatum Schleich.

Стебли прямостоящіе, толще 2 мм.; зубцы влагалищъ не вытянуты въ остроконечія. 6.

6. Ребрышекъ на стеблѣ и зубцовъ на влагалищѣ 5—8.

E. palustre L.

Ребрышекъ на стеблѣ и зубцовъ на влагалищѣ 9—20.


E. heleocharis Ehrh.

17. *E. silvaticum L.* Пет. Кр. III, стр. 143.—Бух. II, № 503.—Бух. I, № 465.—F. O., № 8, p. 118.—Пет., стр. 183.—Кауф. II, № 922.—Цин., № 1717.—Кауф. I, стр. 611.—Ann. C. II, № 168.—Hoff., H., № 7949.—Gold C., p. 23.—Mart., p. 181.—St. II, p. 57.—St. I, № 682.—Pal., № 2200.

Плодоносные стебли несутъ широкія, нѣсколько вздутыя влагалища съ 11—14 продольнымъ ребрышками и съ такимъ же количествомъ зубцовъ, спаянныхъ по 2—4; нижняя часть влагалищъ сине-зеленая, верхняя—съ зубцами, красновато-бурая; безплодные стебли и, по созрѣваніи



Equisetum silvaticum.



Equisetum pratense.

споръ, плодоносные даютъ длинныя мутовчато-расположенныя, вѣтвистыя, дугообразно внизъ отклоненныя вѣтви; вѣточки 3—5-гранныя, влагалища ихъ зеленыя, съ 3—5 отклоненными, шиловидно-заостренными зубцами. Споры съ конца апрѣля и $\frac{1}{2}$ мая. Часто по тѣнистымъ мѣстамъ и лѣсамъ.

forma capillare Hoffm. (Mart., p. 181.) Стебли и вѣтви вдвое тоньше, чѣмъ у типичной формы, вѣтви менѣе частыя и почти горизонтальныя. Въ гербаріи Гольдбаха.

18. **E. pratense Ehrh.** Пет. Кр. III, стр. 143.—Мос., № 55.—Пет., стр. 184.
 Кауф. II, № 923.—Цин., № 1718.—Кауф. I, стр. 612.
Equisetum umbrosum Mey. Herb. Gold.

Корневище ползучее, безъ клубней: плодоносные стебли желтовато-бурые, безъ вѣтвей, по созрѣваніи споръ развиваются вѣтви; влагалища (числомъ 6—12) до 15 мм. дл., б. ч. ворончатая, немного вздутыя, сѣро-зеленыя или красноватая, съ 10—15 бороздками и такимъ же количествомъ широко-ланцетныхъ красно-бурыхъ зубцовъ, равныхъ $\frac{1}{2}$ или $\frac{1}{3}$ влагалища и часто спаянныхъ по 2—3 почти до самой ихъ верхушки; бесплодные стебли 18—50 см., сѣро-зеленые, остро-шершавые, съ продольнымъ ребрышками; влагалища сѣро-зеленые, до 8 мм. дл., б. ч. цилиндрическія, съ 10—15 бороздками; зубцы равны $\frac{1}{3}$ влагалища, продолговато-или широко-ланцетные, грязно-или буровато-бѣлые, съ широкой бурой полоской, сросшіеся почти до половины; вѣтви б. ч. простыя, въ густыхъ мутовкахъ, до 15 см. дл. и около 1 мм. толщ., горизонтально отстоящія, слабо шероховатая, 3—рѣдко 4—5-гранныя; влагалища на вѣтвяхъ до 2 мм. дл., зеленые; зубцы широко-яйцевидные или треугольные, съ широкой, бѣловатой, почти пленчатой каймой.

Споры въ маѣ. По тѣнистымъ мѣстамъ, рѣже предыдущаго. Кунцово, Царицыно, Горенки, Воробьевы горы (гербар. Гольдбаха.). — Сокольники (П.). — Мытищи. Лосинный Островъ (С.). — Платформа Суково, Брянск. ж. д. (X.).

19. **E. arvense L.** Бух. II, № 502.—Бух. I, № 464.—F. O., № 8, p. 118.—Пет., стр. 184. Кауф. II, № 921.—Цин., № 1716. Кауф. I, стр. 611.—Ann. C. V., № 90.—Gold. C., p. 23.—Mart., p. 181.—St. II, p. 57.—St. I, № 683.—Pal., № 2201.

Корневище съ клубнями; плодоносные стебли въ 15—30 см., сочные, свѣтло-бурые; влагалища 5—6, нѣсколько колокольчато-вздутыхъ, съ 8—12 продольнымъ ребрышками и такимъ же количествомъ ланцетныхъ, темновато-бурыхъ зубцовъ, часто по 2—3 спаянныхъ вмѣстѣ; колосъ 2—3,5 см. дл.; бесплодные стебли часто достигаютъ 50 см., ярко-зеленые, съ яснымъ 6—19 ребрышками; влагалища 5—12 см. дл., свѣтло-зеленые, съ 3-угольно-ланцетными, черными, бѣло-окаймленнымъ зубцами, которые въ 2 раза короче влагалища; вѣтви простыя и развѣтвленныя, 4—5-ребристыя; зубцы влагалища на вѣтвяхъ треугольные, длинно-заостренные, отстоящіе. Споры $\frac{1}{2}$ апрѣля и $\frac{1}{2}$ мая. По паровымъ полямъ и лугамъ, часто.



Equisetum arvense.

20. *E. palustre* L. Пет. Кр. III, стр. 143.—Бух. II, № 504.—Бух. I, № 466.—F. O., № 8, p. 118.—Пет., стр. 184.—Кауф. II, № 924.—Цив., № 1719.—Кауф. I, стр. 612.—Gold. C., p. 23.—Mart., p. 182.—St. II, p. 57.—St. I, № 684.—Pal., № 2202.


Корневище часто съ клубнями; плодоносные и бесплодные стебли одинаковые, достигаютъ 50 см., съ глубокими 5—8-продольными бороздками, слегка шероховатые; влагалища 7—12 мм. дл., цилиндрическія или слабо-ворончатые, съ ясными 5—8 ребрышками; зубцы широко-ланцетные, заостренные, черно-бурые или черные, съ широкимъ бѣлымъ краемъ;



Equisetum palustre.



Equisetum heleocharis limosum.



Equisetum heleocharis fluviatilis polystachyum.

вѣтви, если онѣ есть, 4—5—рѣдко 7-гранныя, почти гладкія, б. ч. простыя, вверхъ торчащія и нѣсколько отклоненныя; первый членникъ вѣтви короче стеблевого влагалища. По сырымъ лугамъ, часто. $\frac{2}{2}$ мая и рѣдко $\frac{1}{2}$ июня.

«. *polystachyum* Wieg. Вѣтви на концахъ несутъ по колоску; нашу разновидность надо отнести къ формѣ *corymbosum* Milde, у которой нижнія вѣтви длиннѣе верхнихъ, такъ что достигаютъ одной высоты, образуя зонтикообразную кисть. Купавна, Бгр. у. (II.).

21. *E. heleocharis* Ehrh. Пет. Кр. III, стр. 143.

Equisetum limosum L. Бух. II, № 505.—Бух. I, № 467. F. O., № 8, p. 118.—Пет., стр. 183.—Кауф. II, № 925.—Цив., № 1720.—Кауф. I, стр. 613.—Ann. C. V., № 91. Hoff. H., № 7945.—Gold. C., p. 23.—Mart., p. 181.—St. II, p. 57.—St. I, № 1685.

Стебли до 1.5 метра, гладкіе съ продольными линиями, засушенные—съ 9—20 сильно выдающимися ребрышками; влагалища до 1 см. дл., прилегаютъ къ стеблю (только 2—3 верхнихъ нѣсколько ворончатые), лоснящіяся, нижнія почти черныя, верхнія зеленые; зубцовъ, такъ же, какъ и ребрышекъ, 9—20, ланцетно-шиловидныхъ, черныхъ, съ узкой перепончатой каймой; если вѣтви есть, то онѣ съ 4—10 ребрышками, почти гладкія; самый нижній членникъ вѣтви нѣсколько короче влагалища стебля; зубцы

на влагалищахъ вѣтвей шиловидные, прижатые или слегка отклоненные. Споры во $2\frac{1}{2}$ мая и весь июнь. По берегамъ рѣкъ, прудовъ и по тонкимъ болотамъ.

Раздѣляется на два подвида:

α. *limosum* L. (E. *Linnaeanum* Döll.)

Equisetum limosum L. *Linnaeanum* Döll. Бух. II, № 505.—Бух. I, № 467.

Стебли безъ вѣтвей.

β. *fluviatilis* L.

Equisetum limosum L. *fluviatile* L. Бух. II, № 505.—Бух. I, № 467.

Стебли съ вѣтвями.

1. Вѣтви кончаются маленькими колосками.

polystachyum Lejeune.

Вѣтви безъ колосковъ. 2.

2. Вѣтви только въ верхней части стебли, короткія, 1,5—3 см. дл.


brachycladon Döll.

Стебли покрыты вѣтвями до половины и болѣе; вѣтви до 20 см. дл.


leptocladon Döll.

22. *E. hiemale* L. Бух. II, № 506. — Бух. I, № 468. F. O., № 8, p. 118. — Пер., стр. 183. — Кауф. II, № 926. — Цин., № 1722—Кауф. I, стр. 613.—Gold. C., p. 23.—Mart., p. 182.—St. II, p. 57.—St. I, № 686.

Стебель б. ч. простой, до 1 метра, темно- или сѣро-зеленый, шероховатый, съ 10—25 продольными ребрышками и зубцами на влагалищахъ; влагалища 3—12 мм. дл., съ красноватыми или черно-бурыми основаніями



Equisetum hiemale.



Equisetum variegatum.

и верхушкой, середина влагалища гризно-бѣлая, зубцы очень скоро опадаютъ, остаются только ихъ основанія, иногда зубцы видны только на верхнемъ влагалищѣ, линейно-шиловидные, почти черные, съ узкимъ бѣлымъ краемъ; колосъ основаніемъ своимъ заключенъ въ верхнее влагалище, оканчивается шишникомъ. Споры въ маѣ. По сырымъ мѣстамъ. Во-

робьевы горы (П.).—Мухино, Мож. у., между Нѣмчиновскимъ постомъ и Ромашковымъ, Кунцово; за Лужками, Срп. у. (С.).

24. *variegátum* Schleich.

Образуетъ густыя дерновинки; стебли лежачіе, приподнимающіеся, рѣже прямостоящіе, 10—30 см. дл. и до 2 мм. толщ., у основанія съ рѣдкими, похожими на стебли вѣтвями, въ верхней части простые, б. ч. ярко-зеленые, шероховатые, съ 4—12 ясными ребрышками и зубцами; влагалища коротко-колокольчатые или цилиндрическія, въ верхней части почти черныя; зубцы черные съ бѣлымъ краемъ, изъ широкаго основанія продолговато-ланцетные, вытянуты въ длинный, узкій, скоро опадающій кончикъ; колосъ б. ч. съ остроконечіемъ. Лихоборы на берегу р. Лихоборки (Гей.). Собр. 1 июня 1902 г.

Классъ III. *Lycopodiáriæ*.

4 сем. *Lycopodiáceæ* D.C.

Стебли удлинненные, вильчато-вѣтвистые, иногда подземные, и только вѣтви надземныя, густо покрыты простыми мелкими листочками. Спорангій шаровидные или почковидные, раскрываются щелью на 2 створки, сидятъ въ пазухахъ листьевъ или въ особыхъ колосьяхъ, сидячихъ или на длинныхъ ножкахъ.

9. *Lycopódium* L.

1. Стебли сплюснутые.

L. complanatum L.

Стебли цилиндрическіе. 2.

2. Спорангій въ колосьяхъ. 3.

Спорангій не въ колосьяхъ, а въ пазухахъ листьевъ.

L. Selago L.

3. Колосья спорангіевъ одиночные, сидячіе на концѣ вѣтви; листья заострены почти въ колючку.

L. annolinum L.

Колосья спорангіевъ по 2—5 на длинной ножкѣ; листья переходятъ въ довольно длинный бѣлый волосокъ.

L. clavatum L.

24. *L. Selágo* L. Пет. Кр. III, стр. 142.—Бух. II, № 501.—Пет., стр. 218.—Кауф. II, № 920.—Гор., № 100.—Цин., № 1725.—Кауф. I, стр. 609.—Gold. С., р. 23—Mart., р. 183.—St. II, р. 57—St. I, № 699.—Pal., № 2217.

Стебли прямостоящіе или приподнимающіеся, въ 20—30 см., вильчато-развѣтвленные, съ парными вѣтвями равной длины; все растеніе темно-зеленое, лоснящееся; листья линейно-ланцетные, цѣльнокрайніе, рѣже мелко- и разставлено-зубчатые, до 9 мм. дл., б. ч. 8-рядные; спорангій сидятъ въ пазухахъ листьевъ въ срединѣ годовалыхъ вѣтвей. Споры съ начала августа и весь сентябрь. Въ большихъ хвойныхъ лѣсахъ. Мытищи, Лосинный Островъ, теперь это мѣсто вырублено (С.).—Масловскій лѣсъ, экземпляръ найденъ Я. В. Байковымъ и присланъ для Михайлов-


скаго гербарія (Б.).—Лоспинный Островъ близъ Богородска (Гей.).—Челенкино, Дмт. у. (Слущкій).*

25. *L. annótinum* L. Пет. Кр. III, 142.—Мос., № 54.—Ф. О., № 8, p. 118.—Пет., стр. 218.—Кауф. II, № 919.—Цив., № 1726.—Кауф. I, стр. 609.—Ann. С. I, № 63.—Hoff. II.—Макс. Пут.—Gold. С., p. 23.—Mart., p. 182.—St. II, p. 57.

Стебель ползучій, до 1 метр. дл. съ примоторчащими простыми, рѣже вѣлчато-вѣтвистыми вѣтвями, достигающими 30 см.; листья горизонтальные или отклоненные, 5—8-рядные, до 7 мм. дл., линейно-ланцетные,



Lycopodium Selago.



Lycopodium annotinum.

заостренные почти въ колочку, по краямъ мелко-зубчатые, съ выдающеюся жилкой на нижней сторонѣ; все растеніе ярко-зеленое; колосъ желтоватый, одиночный, конечный, сидячій, 1,5—4 см. дл. и 2—5 мм. толщ.; споролетники до 3 мм. дл., округло-яйцевидные, перепончатые, по краямъ неравно-зубчатые, быстро заостренные въ кончикъ, часто отгибающійся кнаружи. Споры съ начала іюля. По сырмъ лѣсамъ. Лоспинный Островъ, Горенки (К).—Между Ромашковымъ и Черепковымъ (Н).—Масловскій лѣсъ, Пдл. у. на границѣ съ Вер. у. (Мос.).—Быково (Куль.).

26. *L. clavátum* L. Бух. II, № 500.—Бух. I, № 463.—Ф. О., № 8, p. 118.—Пет., стр. 218.—Кауф. II, № 918.—Цив., № 1728.—Pinz., p. 20.—Кауф. I, стр. 609.—Ann. С. II, № 169.—Hoff. II., № 7961.—Gold. С., p. 23.—Mart., p. 182.—St. II, p. 57.—St. I, № 700.

Стебли ползучіе, часто превышающіе длиною 1 метръ, съ неравной длины прямостоящими, вѣтвистыми вѣточками въ 5—18 см.; листья многорядные, 3—4 мм. дл., обращены вверхъ и часто прижаты къ стеблю, линейно-ланцетные, вытянуты въ длинный, бѣлый, часто пильчатый волосокъ, б. ч. пѣлынокрайніе, рѣже, особенно нижніе, слегка зубчатые; колоски по 1—4, въ 3—6 см. дл. и до 4 мм. толщ., сперва зеленые, потомъ желтоватые, сидятъ на длинной, до 18 см. дл. ножкѣ, покрытой рѣдкими листочками, края которыхъ зубчатые и перепончатые; споролетники

2—3 мм. дл. и до 2 мм. шпр., яйцевидные съ выщеленно-зубчатыми краями, вытянуты въ остріе, равное длинѣ споролестника. Споры съ начала іюля. По лѣсамъ и кустарникамъ, часто.

27. *L. complanatum* L. Пет. Кр. III, стр. 142.—F. O., № 8, p. 118.—Пет., стр. 218.—Кауф. II, № 917.—Цин., № 1727.—Кауф. I, стр. 608.—Hoff. H., № 7960.—Mart., p. 182.—St. II, p. 57.—St. I, № 701.—Pal., № 2218.

Стебель ползучій, подземный, до 1 метра дл., дасть прямоторчащія, въ 5—40 см. дл., отъ основанія многократно-вильчато-развѣтвленные, сплюснутыя вѣтви; все растеніе, кромѣ подземнаго стебля, ярко-зеленое; листья



Lycopodium clavatum.



Lycopodium complanatum.

супротивные, 4-рядные, 3—4 мм. дл., ланцетные или коротко-ланцетные, заостренные; сидящіе на острой сторонѣ стебля, сплюснутые, ланцетные, съ килемъ, на плоской сторонѣ безъ кия, приросшіе; колоски по 2—6, до 25 мм. дл. и 3 мм. толщ., на ножкѣ до 12 см. дл., покрытой рѣдкими, линейно-ланцетными листочками; споролестники до 3 мм. дл. и 2 мм. шпр., округло-яйцевидные, по краямъ неравно-выщеленно-зубчатые, быстро переходятъ въ короткое остріе. Споры съ начала іюля. По лѣсамъ и кустарникамъ, любитъ песчаную почву. Быково, Раменское, Брн. у., Васильево, Бгр. у., (К.).—Серебряный боръ близъ Хорошова (А.).—Денисьево, Зви. у., Свиново (Гольдбахъ).—Близъ Хвостова, Клин. у. (II и С.).—Карачарово, Клин. у., Клещевскій лѣсъ, Клин. у., Никифорово, Сри. у., Усово, Зви. у., Дуброва, Бгр. у. (II.)

Отдѣлъ Embryóphyta Siphonógama.

(Phanerógamae.)

Подотдѣлъ Gymnosépmae.

Классъ Coníferae.

Деревья или кустарники, б. ч. съ пластинчато-отстающей корой; листья многолѣтніе, рѣже однолѣтніе, опадающіе, иглообразные (хвоя) или чешуйчатые, въ мутовкахъ, супротивные или спиральныя, сидящіе одиночно или пучками; цвѣты однополые, безпокровные; мужскіе состоятъ изъ однихъ 2 — 6-гнѣздныхъ пыльниковъ, образуютъ колосъ; женскіе состоятъ изъ сѣменочекъ, сидящихъ въ пазухахъ прицвѣтныхъ чешуекъ, которыя становятся послѣ опыленія деревянистыми или мясистыми и образуютъ вѣтвь съ сѣменемъ въ первомъ случаѣ шишку, во второмъ — ложную ягоду; сѣмя деревянистое, часто крылатое.

1. Иглы сидятъ въ мутовкѣ по 3, или листья чешуевидной формы. 2.

Иглы длинныя, не чешуевидныя, сидятъ пучкомъ или по одной. 3.

2. Вѣтви сплюснутыя: однодомный кустъ; плоды — кожистыя, маленькія шишечки.

Thuja.

Вѣтви цилиндрическія; двудомный кустъ; плодъ — мясистая ложная ягода.

Juniperus.

3. Хвоя сидитъ по 30—40 въ пучкѣ, на укороченныхъ боковыхъ вѣточкахъ, имѣющихъ полушаровидную форму, на зиму опадаетъ, на побѣгахъ сидитъ по 1.

Larix.

Хвоя на зиму остается, сидитъ по 1 или по 2—5, и тогда имѣетъ пленчатое влагалище. 4.

4. Хвоя сидитъ по одной. 5.

Хвоя сидитъ по 2—5 пучками.

Pinus.

5. Хвоя плоская, тупоконечная, съ нижней стороны съ 2 бѣловатыми полосками.

Abies.

Хвоя въ разрѣзѣ сплюснута-4-гранная, заостренная, колючая, безъ полосокъ на нижней сторонѣ.

Picea.

5 сем. Abietinéae Rich.

Съ игловатыми листьями, зимующими или мягкими, опадающими на зиму, очередными или собранными пучкомъ, составляющимъ собственно укороченную вѣтвь; пыльники двугнѣздые; за каждой прицвѣтной чешуйкой помѣщаются 2 сѣмепочки, сросшіяся съ зачаточнымъ плодикомъ въ видѣ пленки; сѣмена заключены въ одеревянѣлой шишкѣ.


* *Abies* D.C.

Хвоя располагается почти 2-рядно, плоская, съ нижней стороны съ 2 бѣловатыми полосками; пыльцевые мѣшечки раскрываются поперекъ; шишки вверхъ торчащія; зрѣлыя чешуйки опадаютъ, остается только вверхъ торчащій стержень шишки.

A. balsaméa Mill.

Pinus balsamea Pal., № 2071.

Узко-пирамидальное дерево до 25 метр. выс.: на гладкой черновато-сѣрой корѣ образуются многочисленные вздутія, наполненные прозрачной



Abies balsamea.

смолой (такъ называемый канадскій бальзамъ); почки округлыя, густо покрыты лоснящейся, точно лакированной смолой; иглы неправильно-двурядныя, часто дугообразно изогнуты и обращены вверхъ, верхняя сторона ихъ лоснящаяся, темно-зеленая, нижняя съ 2 бѣловатыми полосками, на концѣ округлая или слабо выемчатая, 15—28 мм. дл. и 1,5 мм. шир.; шишки прямоторчащія, яйцевидно-продолговатая, тупыя, 6—10 см. дл. и 2,5 см. толщ., молодая — темно-фіолетовая, потомъ сѣробурья, б. ч. покрыты смолой; прицвѣтныя чешуйки почти круглыя, или основаніе ихъ вытянуто клиновидно, верхушка быстро переходитъ въ остріе, по краямъ вычлененно-неравно-зубчатая, почти равны или

на остріе превышаютъ чешуйку шишки; сѣмя клиновидно-3-гранное, 5 мм. дл., съ широкимъ сѣровато-фіолетовымъ крыломъ въ 10 мм. дл. Цвѣтетъ въ маѣ. Разводится по садамъ и паркамъ.

* *A. sibirica* Ledeb. Пет. Кр. III, стр. 141.—Пет., стр. 129.


Abies Pichta Forbes.

Высокое, узко-пирамидальное дерево, до 40 метр.; кора гладкая, черновато-сѣрая, почки округлыя, покрыты смолой; иглы мягкія, 15—35 мм. длины и 1,25 мм. шир., линейныя, на концѣ округлыя или слегка выемчатая, съ верхней стороны темно-зеленая, лоснящаяся, съ нижней—съ 2 бѣлыми полосками, располагаются на вѣтви почти двурядно, на верхнихъ

вѣтвяхъ обращены вверхъ и нѣсколько искривлены; шишки примоторчащія, продолговато-цилиндрическія, тупыя, 6—8 см. дл. и 3 см. толщ., молодыя — пурпурово-фіолетовыя, потомъ свѣтло-бурыя, б. ч. густо покрыты потеками смолы; прицвѣтныя чешуйки обратно-сердцевидно-клиновидныя, вытянуты въ остріе, по краямъ мелко-зубчатыя, въ $\frac{1}{2}$ короче широкихъ, обратно-клиновидныхъ чешуекъ шишки, боковые края кото-



Abies sibirica.



Picea excelsa.

рыхъ зазубренно-рѣбчатые; сѣмя обратно-яйцевидное, гранистое, 6—7 мм. длины, съ фіолетово-пурпуровымъ крыломъ въ 10 мм. дл. Цвѣты въ маѣ. Разводится по садамъ и паркамъ.

10. *Picea* Lk.

Хвоя твердая, колючая, въ разрѣзѣ сплюснуто-4-гранная; пыльцевыя мѣшечки раскрываются вдоль; шишка повислая, по созрѣваніи сѣмена выпадаютъ; чешуйки не отпадаютъ отъ стержня; у женскихъ колосковъ чешуйки находятся въ пазухахъ маленькихъ перепончатыхъ прицвѣтниковъ, съ которыми скоро срастаются.

28. *P. excelsa* Lk.

P. vulgaris Lk. Пет. Кр. III, стр. 141. — Бух. II, № 499. — Бух. I, № 462. — F. O., № 8, p. 118. — Пет., стр. 239. — Кауф. II, № 916. — Цин., № 1710. — Кауф. I, стр. 605. — Lind., p. 162.

Pinus Abies L. Дв., № 897. — Макс., № 892. — Gold. C., p. 23. — Mart., p. 172. — Hoff. II., № 2482. — St. II, p. 54. — St. I, № 661. — Pal., № 2073.

Пирамидальное дерево, достигаетъ 50 метр.; кора красновато-бурая или сѣрая, тонко-пластинчатая, на молодыхъ вѣтвяхъ свѣтло-бурая, лоснящаяся; иглы сидятъ спирально, обращены въ бока и вверхъ, темно-зеленыя, лоснящіяся, заостренныя, 4—5.5 см. дл.; мужскіе цвѣты цилиндрическо-коническіе; женскіе — продолговато-цилиндрическіе, пурпуровые, примоторчащія; шишки висячія, продолговато-цилиндрическія, 10—16 см.

дл., 3—4 см. толщ.; молодые—зеленые, зрѣлыя—свѣтло-бурыя; чешуйки расположены черепичато, широко-ромбическія, на верхушкѣ усѣченныя, слабо выемчато-зубчатыя, слегка вдавленные; сѣмена яйцевидно-заостренныя, темно-бурыя, 4 мм. длины, съ красно-бурымъ крыломъ въ 3 раза длиннѣе сѣмени. Цвѣтетъ въ маѣ. Сплошными лѣсами и отдѣльно.

var. **fennica** Regel. Пет. Кр. III, стр. 141.

Picea vulgaris Lk. Uvarowii Kauffm. F. O. № 8, p. 118. —Кауф. II, стр. 636.—Кауф. I, стр. 605.

Чешуйки у шишки округленные, цѣлюкрайнія, не вдавленные.

Порѣчье, Мож. у. (гр. Уваровъ).—Петровско-Разумовское (Шр.).

* *Lárix* D.C.

Хвоя мягкая, пучками, на зиму опадаетъ; пыльцевые мѣшечки раскрываются вдоль; шишки съ неоппадающими чешуйками, созрѣваютъ на первый годъ и по выпаденіи сѣмянъ очень долго остаются на вѣтвяхъ; чешуйки у женскихъ колосковъ находятся въ пазухахъ всегда свободныхъ прицвѣтниковъ.

* **L. europaëa** D.C. Пет. Кр. III, стр. 141.—Пет., стр. 209.—Кауф. II, стр. 635.—Цин., стр. 497.—Кауф. I, стр. 605.

Pinus Larix L. Pal., № 2069.

Larix decidua Mill., *Larix Larix* Karst.

Высокое дерево, достигаетъ 20—30 метр., у насъ б. ч. съ пзуродованной, корявой отъ морозовъ верхушкой; кора буро-сѣрая, на молодыхъ вѣтвяхъ гладкая, желтоватая; иголы сидятъ пучкомъ по 30—40, мягкія, свѣтло-зеленныя, узколинейныя, 1,5—3 см. дл. и 0,5—0,75 мм. толщ., туповатыя, съ верхней стороны съ слабымъ килемъ, съ нижней—съ выдающейся жилкой; мужскіе цвѣты яйцевидно-округлые, потому почти цилиндрическіе, желтые; женскіе—продолговато-цилиндрическіе, ярко-пурпуровые; шишки 25—40 мм. дл. и 20—24 мм. толщ., яйцевидныя или яйцевидно-продолговатыя, тупыя, на короткой ножкѣ, свѣтло-бурыя; чешуйки расположены черепичато, кожистыя, овально-округлыя, съ волнисто-изогнутымъ, иногда слегка наружу отвороченнымъ краемъ, всегда голыя, на спинкѣ сильно выпуклыя и съ продольными бороздками; сѣмя обратно-яйцевидное, 3—4 мм. дл. съ свѣтло-



Larix europaëa.

бурымъ, въ 2 раза превышающимъ длину сѣмени крыломъ. Цвѣтетъ $\frac{2}{3}$ апрѣля и $\frac{1}{2}$ мая. Разводится по садамъ.

* **L. sibírica** Ledeb. Пет. Кр. III, стр. 141.—Пет., стр. 209.—Цин., № 1712.

Высокое стройное дерево, у насъ не страдаетъ отъ морозовъ; кора сѣрая, на молодыхъ вѣтвяхъ лоснящаяся, желтоватая; иголы такія же, какъ

и у *Larix europaea* D.C., но длиннее, 3—5 см. дл., и пучки их сидят более густо; мужские цветы полушаровидные, прижатые; женские — 10—12 мм. дл. часто бледно-зеленые; шишки 30—40 мм. длины.



Larix sibirica.



Pinus Cembra.

состоять из меньшего количества и более крупных чешуек, покрытых пушком, на спинке сильно выпуклых, слабо-бороздчатых и с краем, слегка загнутым внутрь и никогда наружу. Цветы $\frac{2}{2}$ апреля и $\frac{1}{2}$ мая. Разводится.

11. *Pinus* L.

Хвоя сидит пучками по 2—5; мужские цветы сидят у основания молодых веточек, расположены сложными колосьями; женские — на концах ветвей поодиночке или по 2—3; шишки созревают на второй год, зрелые чешуйки не опадают, на конце утолщены в виде ромбического щитка, часто с бугорком посредине.

1. Иглы по 2 в пучке.

P. silvestris L.

Иглы по 5 в пучке. 2.

2. Иглы толстые, жесткие, темно-зеленые; молодые побег пушистые; шишки яйцевидные.

P. Cembra L.

Иглы мягкие, тонкие, снаружи светло-зеленые, внутри сизоватые; побег голые; шишки цилиндрические, веретенообразные.


P. Strobus L.

* ***P. Cembra* L.** Пет. Кр. III, стр. 141.—Пет., стр. 240.—Кауф. II, стр. 635.—Цин., стр. 498.—Кауф. I, стр. 604.—Pal., № 2066.

Дерево достигает 20 метр.; кора буро-серая, пластинчатая, на годовалых ветвях серо-зеленая, гладкая; молодые побег покрыты рыже-желтым пушком; иглы по 5, прямостоящие, 3-гранные, по краям остро-шершавые, 5—8 см. дл., выходят из бурого, опадающего влагалища; мужские цветы сидячие; женские — почти сидячие, на конце побег.

говъ по 1—2—3; шишки почти сидячія, въ молодости зеленовато-фіолетовыя, потомъ свѣтло-бурыя, яйцевидныя; 6—8 см. дл. и 5 см. толщ., чешуйки съ узкимъ полуромбическимъ щиткомъ и слегка отогнутой верхушкой; сѣмена безъ крыла, крупныя, обратно-яйцевидныя или тупо-3-гранныя, въ твердой бурой скорлупѣ, до 12 мм. дл. и 6—7 мм. толщ. Цвѣтеть въ концѣ мая и началѣ іюня. Разводится.

* **P. Stróbus L.** Пет. Кр. III, стр. 141.—Пет., стр. 241.—Цян., стр. 498.—Pal., № 2067.



Pinus Strobus.

Дерево достигаетъ 50 метр.; кора зеленовато-сѣрая, долго остается гладкой, потомъ пластинчатая; на годовалыхъ вѣтвяхъ сѣро-зеленая, лоснящаяся; иглы по 5, очень тонкія, гибкія, 6—10 см. дл., по краямъ шероховатыя, остро-3-гранныя, на наружной сторонѣ свѣтло-зеленыя, на внутренней — сизоватыя, выходятъ изъ длинныхъ желтовато-красныхъ влагалищъ, скоро опадающихъ; мужскіе и женскіе цвѣты на ножкахъ; шишки висячія, по 1—3, длинно-цилиндрическія, заостренныя, слегка согнутыя, 10—15 см. дл. и 4 см. толщ., сперва зеленыя съ фіолетовымъ оттѣнкомъ, потомъ бурыя; чешуйки продолговатыя или клиновидныя, бурыя; щитокъ желтовато-сѣрый, мало утолщенный, нѣсколько морщинистый, съ тупой верхушкой; сѣмя маленькое, яйцевидное, бурое, 5—6 мм. дл. и 4 мм. шпр., съ длиннымъ крыломъ въ 18—20 мм. дл. Цвѣты $\frac{1}{2}$ іюня. Разводится въ садахъ и паркахъ.

29. **P. silvéstris L.** Пет. Кр. III, стр. 141.—Бух. II, № 498.—Бух. I, № 461.—F. O. № 8 p. 118.—Пет., стр. 240.—Кауф. II, № 915.—Цян., № 1713.—Кауф. I, стр. 604.—Lind. p. 162.—Ann. C. II., № 155.—Дв., № 896.—Макс., № 891.—Gold. C., p. 23.—Mart., p. 172.—St. II, p. 59.—St. I, № 660.—Pal., № 2064.

Очень высокое дерево съ сѣро-бурой корой, отдѣляющейся тонкими пластинками; на молодыхъ вѣтвяхъ кора желтовато-красная; иглы 3—6 см. дл., парныя, полцилиндрическія, торчащія, съ наружной стороны темно-зеленыя, съ внутренней сине-зеленыя, часто слабо спирально скрученныя, сидятъ въ длинныхъ, вначалѣ бѣлыхъ, потомъ бурыхъ остающихся влагалищахъ; мужскіе цвѣты сѣрно-желтые, рѣже красноватые; женскіе по 1—2—3 на верхушкѣ побѣговъ, до опыленія примоторчащія, послѣ опыленія заггибаются книзу; шишки отъ 2,5 до 6 см. дл. и 2—3 см. шпр., сѣро-бурыя, б. ч. тускляя, коническія или широко-коническія; чешуйки шишекъ лопатчатые, съ ромбическимъ щиткомъ и бугоркомъ на верхушкѣ; крыло въ 2 раза длиннѣе сѣмени. Цвѣты въ концѣ мая и началѣ іюня. Сплошными лѣсами и отдѣльно, любятъ песокъ.

α. nána Pall. Pall. Fl. ross. I (1784) p. 6.—Schedae ad. Herb. Fl. Ross. № 1597.

Низкорослое дерево, въ 2—3 метра выш., съ прямымъ, тонкимъ стволомъ, восходящимъ у ния, скрытаго въ торфяномъ мхѣ; годичныя кольца очень узкія; иглы, мужскіе колосы и



Pinus silvestris



Thuja occidentalis.

шишки мелкіе; смоляныхъ ходовъ въ иглахъ 10—13, болѣе чѣмъ у типичной формы. Растетъ по большимъ торфянымъ болотамъ.

- β. *cónis aggregátis*. Шишки сидятъ мутовками въ нѣсколько рядовъ, всего отъ 5 до 20 шишекъ на одной вѣткѣ. Больш. Мытищи, во владѣніи Челноковыхъ, молодое дерево лѣтъ 25, наблюдалось 4 періода плодоношенія (С.).

6 сем. Cupressinéae Rich.

Мутовчатые иглы или супротивныя чешуйки, пыльники, въ числѣ 3—6, подъ связникомъ, расширеннымъ въ видѣ щитка; простыя чешуйки, окружающія сѣмечки образуютъ съ сѣменами ложную ягоду или деревянящую маленькую шишечку.

* *Thuja* Tourn.

Однодомный кустъ или дерево; мужскіе цвѣты верхушечные; пыльники шарообразные, по 3—6 подъ связникомъ, расширеннымъ въ видѣ щитка; женскіе цвѣты яйцевидные или продолговатые, одиночные, на короткихъ ножкахъ; шишечка кожистая; чешуйки расположены крестообразно; сѣмянъ б. ч. 2 при каждой чешуйкѣ, сплюснутыхъ, съ узкимъ крыломъ вокругъ всего сѣмени.

* *T. occidentális* L. Пет. Кр. III, стр. 141.—Пет., стр. 290.—Pall., № 2074.

Кустарникъ или маленькое дерево, достигаетъ 5—8 метр.; кора сѣро-бурая; молодыя вѣтви сплюснутыя, распластанныя, ярко-зеленыя; листья


чешуйчатые, расположены 4 рядами, накрывают друг друга черепичато; листья, сидящие на широкой стороне вѣтви, обратно-яйцевидные, продолговатые, тупые съ бугорчатой железой на спинкѣ, листья, сидящие на ребрѣ вѣтки, ланцетной формы, б. или м. заостренные, сжатые съ боковъ и достигаютъ 4 мм. дл.; мужскіе цвѣты буро-желтые, маленькіе; женскіе—свѣтло-зеленовато-желтые, состоятъ изъ 10—12 почти кожистыхъ чешуекъ; шишечка отогнута книзу; 7—13 мм. дл., сѣмена 3—4 мм. дл. Цвѣтетъ въ маѣ. Разводится.

12. *Juniperus* L.


Двудомный кустарникъ; мужскіе цвѣты овальные; пыльники по 3—5 подъ связникомъ, расширеннымъ въ видѣ щитка, расположены 2—3-членными кольцами; женскіе—почти шаровидные, состоятъ изъ 2—3—4, рѣже 6 мясистыхъ чешуекъ, между которыми находятся 3 прямостоящія сѣмепочки; по оплодотвореніи чешуйки разрастаются, образуя мясистую ложную ягоду.

30. *J. communis* L. Пет. Кр. III, стр. 141.—Бух. II, № 297.—Бух. I, № 460.—F. O. № 8, p. 118.—Пет., стр. 206.—Кауф. II, № 914.—Цин., № 1715.—Кауф. I, стр. 603.—Lind., p. 162.—Дв., № 924.—Макс., № 922.—Hoff. H., № 7775.—Gold. C., p. 23.—Mart., p. 178.—St. II, p. 55.—St. I, № 681.—Pal., № 2139.

Кустарникъ достигаетъ 3 метр., рѣже деревце; кора темно-сѣрая или сѣро-бурая, пластинчатая, на молодыхъ вѣтвяхъ свѣтло- или кашта-



Juniperus communis.



Juniperus Sabina.

ново-бурая, лоснящаяся, съ тонкими ребрышками, пидущими отъ иглъ, отчего вѣточка почти 3-гранная; иглы по 3, сидятъ мучковкой, жесткія, колючія, 4—17 мм. дл. и 1—2 мм. шир., оттопыренные, сверху съ плоскимъ, синеватымъ желобкомъ, снизу съ тупымъ килемъ; мужскіе цвѣты коротко-яйцевидные, на короткихъ ножкахъ; женскіе—шаровидные, зеле-

ныя, около 2 мм. дл.; ложная ягода черная съ сизымъ налетомъ, шаровидная. 7—9 мм. въ діаметрѣ. Цвѣты $2\frac{1}{2}$ мая. По лѣсамъ и кустарникамъ, очень часто.

* J. Sabina L. Пет. Кр. III, стр. 141.—Pal. № 2137.

Кустарникъ въ 1—2 метра, рѣже выше, съ пирамидальными, обращенными вверхъ вѣтвями; старая кора пенельно-сѣрая, кора на вѣтвяхъ желто- или красно-бурая; иглы на молодыхъ вѣточкахъ узко-ланцетныя, до 4 мм. дл., заостренныя, расположены 4-рядными кольцами, съ внутренней стороны съ бороздкой, съ наружной—съ продолговатой железкой; на болѣе старыхъ вѣтвяхъ иглы сидятъ по 2—3 въ кольцо и не длиннѣе 1 мм., продолговато-игольчатныя, туповатыя или заостренныя почти въ колючку и оттопырены отъ вѣтки; мужскіе цвѣты почти сидячіе, до 4 мм. дл. и 2 мм. шир.; женскіе—понижающіе, очень маленькіе; ложная ягода на поникшей 5 мм. дл. ножкѣ, шаровидная, до 9 мм. въ діаметрѣ, буровато-черно-синяя съ сизымъ налетомъ. Цвѣты $2\frac{1}{2}$ мая. Разводится по садамъ.

Подотдѣль Angiospérmae.

Классъ I. Monocotylédones.

1. Очень маленькія плавающія растенія безъ яснаго раздѣленія на стебель и листья. *Lemnaceae.*

Б. или м. крупныя растенія со стеблемъ и листьями. 2.

2. Цвѣты мелкіе, всегда правильные, безъ околоцвѣтника или съ околоцвѣтникомъ прозрачнымъ, зеленымъ, бѣловатымъ или буrowатымъ. 3.

Цвѣты б. или м. крупныя, правильные или неправильные, всѣ доли ихъ или хоть часть б. или м. ярко окрашены. 13.

3. Околоцвѣтникъ состоитъ изъ 6 листочковъ. 4.

Околоцвѣтника нѣтъ или онъ мало замѣтенъ, часто состоитъ только изъ щетинокъ, волосковъ или иногда изъ листочковъ, но послѣднихъ всегда менѣе шести. 6.

4. Плодъ сухой—коробочка; цвѣты обоеполые. 5.

Плодъ—ягода; цвѣты двудомные; стебель прямостоящій, покрытъ чешуевидными листьями, въ пазухахъ которыхъ сидятъ пучки укороченныхъ вѣтвей, похожихъ на листья.

(*Asparagus*) *Asparagaceae.*

5. Цвѣты пленчатые, въ верхушечныхъ или боковыхъ клубочкахъ,

колосьяхъ, пучкахъ или полузонтикахъ; столбикъ съ 3-мя нитевидными рыльцами; коробочка 3-створчатая, 1—или 3-гнѣздная.

Juncaceae.

Цвѣты не пленчатые, въ верхушечныхъ кистяхъ, рыльца сидячія; 3 или 6 плодниковъ, вполне сросшихся между собой; 3 или 6 коробочекъ отдѣляются отъ цвѣточной оси снизу вверхъ.

Juncaginaceae.

6. Околоцвѣтникъ женскихъ цвѣтовъ состоитъ изъ многихъ чешуекъ; многолѣтнія водяныя и болотныя растенія съ линейными, широкими, нѣсколько мясистыми листьями; цвѣты двуполые, однодомные; плодъ—костянка. *Sparganiaceae.*

Околоцвѣтника нѣтъ или онъ прозрачный, бокальчатый или кубышкообразный, или же состоитъ изъ щетинокъ или волосковъ. 7.

7. Цвѣты собраны въ б. или м. густыя соцвѣтія. 9.

Цвѣты одиночныя, б. ч. пазушные; подводныя растенія съ узкими листьями. 8.

8. Листья цѣльнокрайніе, линейные, плоды сидятъ по 2—4.

Potamogetonaceae.

Листья съ зубчиками; плоды сидятъ по одному.

Najadaceae.

9. Цвѣты заключены въ пленчатые чешуйки. 10.

Цвѣты безъ пленчатыхъ чешуекъ. 11.

10. Стебель съ узлами, б. ч. цилиндрическій, рѣже нѣсколько сплюснутый; листья б. ч. съ открытымъ влагалищемъ и съ язычкомъ; колоски 1—много-цвѣтковые; цвѣты б. ч. обоеполые; околоцвѣтникъ въ видѣ 2—4 маленькихъ прозрачныхъ пленокъ; каждый цвѣтокъ заключенъ въ 2 или 4 чешуйки.

Gramineae.

Стебель почти всегда безъ узловъ, часто 3-гранный; листья съ закрытыми влагалищами и почти всегда безъ язычка; колоски многоцвѣтковые; цвѣты б. ч. однополые, иногда двудомные; околоцвѣтника нѣтъ или онъ состоитъ изъ волосковъ или щетинокъ; сѣмя б. ч. заключено въ мѣшечекъ; каждый цвѣтокъ прикрытъ 1 чешуйкой.

Cyperaceae.

11. Наземныя или болотныя растенія; листья никогда не бываютъ плавающими; цвѣты въ початкахъ. 12.

Водныя растенія съ плавающими или подводными листьями; цвѣты въ колосьяхъ.

Potamogetonaceae.

12. Цвѣты однополые; женскіе — окружены длинными волосками; листья линейные.

Typhaceae.

Цвѣты обоеполые, безъ волосковъ; листья сердцевидные или мечевидные.

Araceae.

13. Цвѣты однополые. 14.

Цвѣты обоеполые. 15.

14. Завязь верхняя; плодъ состоитъ изъ многихъ свободныхъ плодниковъ; болотныя растенія. (Sagittaria.) *Alismataceae*.
Завязь нижняя; плодъ 5—6 гнѣздный; подводныя или плавающія растенія. *Hydrocharitaceae*.
15. Плодъ состоитъ изъ 6 или многихъ свободныхъ плодолистиковъ; цвѣты правильные; болотныя или водяныя растенія. 16.
Плодъ одинъ, состоитъ б. ч. изъ 3-хъ вполне сросшихся плодолистиковъ (у *Majanthemum* изъ 2-хъ, у *Paris* изъ 4—5). 17.
16. Листья плоскіе; цвѣты въ пирамидально-мутовчатой метелкѣ; тычинокъ 6. *Alismataceae*.
Листья, б. ч. 3-гранные, цвѣты зонтикомъ; тычинокъ 9. *Butomaceae*.
17. Завязь верхняя, цвѣты правильные. 18.
Завязь нижняя; цвѣты б. ч. неправильные. 20.
18. Листья, покрывающіе стебель, съ влагалищами, вдоль складчатые; пестикъ состоитъ изъ 3-хъ плодолистиковъ, верхніе концы которыхъ свободны и несутъ отдѣльные столбики. *Colchicaceae*.
Стеблевые листья безъ влагалищъ или листья только корневыя. Завязь 3-гнѣздная, состоитъ изъ 3 плодолистиковъ, вполне сросшихся до самой верхушки 19.
19. Плодъ ягода; растенія съ мясистымъ корневищемъ. *Asparagaceae*.
Плодъ коробочка; растенія съ луковицамъ. *Liliaceae*.
20. Тычинка 1, рѣже 2 сросшихся со столбикомъ. *Orchidaceae*.
Тычинокъ 3, свободныхъ, не сросшихся со столбикомъ. *Irđaceae*.

Порядокъ Pandanáles.

7. Сем. Typháceae Jaume St. Hilaire.

Растенія однодомныя, съ 2-рядными листьями и открытыми влагалищами; соцветіе — цилиндрическій, ложный, початочный колосъ: околоцвѣтникъ состоитъ изъ многочисленныхъ длинныхъ волосковъ; мужскіе цвѣты верхушечные, приросшіе къ главной оси, состоятъ изъ 3 тычинокъ съ сросшимися почти до верхушки тычиночными нитями: пыльники 4-гнѣздные; женскіе цвѣты расположены такъ же, какъ и мужскіе, но подъ ними, съ прицвѣтниками или безъ нихъ завязь на длинной ножкѣ съ очень длиннымъ столбикомъ и нѣсколько расширеннымъ рыльцемъ: орѣшекъ на длинной ножкѣ съ остающимся столбикомъ и рыльцемъ.

13. Typha L.

31. *T. latifolia* L. Пет. Кр. III, стр. 132.—Бух. II, № 481.—Бух. I, № 443.—F. O., № 8 p., 118.—Пет., стр. 296.—Кауф. II, № 891.—Цви., № 1348.—Кауф. I, стр. 590.—Lind., p. 162.—Ann. C. III, № 255.—Дв., № 842.—Макс., № 833.—Hoff. II, № 7398.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 160.—St. II, p. 52.—St. I, № 626.—Pal., № 2002.

Стебель прямостоящий, въ 1—2 метра; листья съ длинными влагалищами, 10—20 мм. шир., б. ч. синеовато-зеленые, широко-линейные, туповатые; мужской початокъ слѣдуетъ непосредственно надъ женскимъ, рѣдко между обоими початками есть небольшой промежутокъ; женскій початокъ черно-бурый; женскіе цвѣты на ножкахъ въ 1,5—2 мм. дл., безъ прицвѣтничковъ, съ черно-бурымъ, косымъ, ромбическо-ланцетнымъ рыльцемъ, значительно превышающимъ околоцвѣтныя волоски; пыльники 2,5—3 мм. дл., въ 2—3 раза короче нитей. Цвѣты во $\frac{2}{2}$ июня и началѣ июля,



Typha latifolia.



Typha angustifolia.

зрѣлыя сѣмена въ сентябрѣ. По болотамъ, канавамъ, прудамъ и по берегамъ рѣкъ, часто.—Кромѣ типичной формы, у насъ встрѣчается: *f. elatior* Graebn. Початки короткіе, часто не длиннѣе 6 см., почти соприкасающіеся между собой, листья очень узкіе, 5—7 мм. шир. Кудиново (II.)

32. *T. angustifolia* L. Пет. Кр. III, стр. 132.—Пет., стр. 296.—Кауф. II, № 892.—Гор., № 97.—Цви., № 1349.—Кауф. I, стр. 591.—Дв., № 843.—Lind., p. 162.—Макс., № 834.—Gold. C., p. 22.—Mart. p. 160.—St. II, p. 52.—St. I, № 627.

Стебель прямостоящий, 1—2 метра; листья узко-линейные, 3—10 мм. шир., плоскіе или плоско-выпуклые, у основанія желобчатые; мужской початокъ разобщенъ отъ женскаго промежуткомъ цветоноса въ 3—8 см. дл.; женскій початокъ узко-цилиндрическій, красно-бурый; женскіе цвѣты на ножкахъ 3—5 мм. дл., съ нитевидными, на верхушкѣ ложковидными прицвѣтничками, равными волоскамъ; рыльце линейное, красно-бурое; пыльники 1,5—3 мм. дл., въ $1\frac{1}{2}$ раза короче нитей. Цвѣты во $\frac{2}{2}$

июни. По берегамъ рѣкъ и озеръ. Кривое озеро за Владычнымъ монастыремъ близъ Серпухова (Вар.) и озеро за Дракинымъ (Экс. Бот. Лаб. бор. 1886). — Ручей близъ Борцова, Срп. у. (П. и С.).

8. Сем. Sparganiaceae Agardh (Engl.).

Растенія однодомныя, съ 2-рядными листьями и открытыми влагалищами: соцветіе пазушное и верхушечное, простымъ или нѣсколько вѣтвистымъ колосомъ: нижніе цвѣты женскіе, верхніе — мужскіе; околоцвѣтникъ состоитъ изъ 3-хъ (рѣдко 5) пленчатыхъ чешуекъ безъ волосковъ; женскіе цвѣты въ головкахъ, сидячіе или, особенно нижніе, на ножкахъ; завязь сидячая, рѣдко на очень короткой ножкѣ, съ 6. или м. короткимъ столбикомъ (иногда совершенно безъ столбика) и косо насаженнымъ подъ конецъ опадающимъ рыльцемъ: мужскіе цвѣты сгучены въ шаровидныхъ головкахъ, состоятъ изъ 3 тычинокъ съ свободными нитями; пыльники 2-гнездные; костинка съ сухимъ, губчатымъ околоплодникомъ, съ бѣлкомъ и прямымъ зародышемъ.

14. Sparganium L.

1. Столбикъ и рыльце длинныя, нитевидныя; длина рыльца въ 5—6 разъ превышаетъ ширину. 2.

Рыльце яйцевидное, иногда почти круглое, длина его не болѣе какъ вътрое превышаетъ ширину, ясно ограничено отъ очень короткаго столбика; часто рыльце сидячее, безъ столбика.

S. minimum Fr.

2. Всѣ листья съ яснымъ килемъ, особенно у основанія 3-гранные; плавающіе листья въ верхней своей части съ нижней стороны съ ясною, выдающеюся срединной жилкой. 4.

Листья безъ кили, на спинкѣ округло-выпуклые или совершенно плоскіе, иногда съ слабо выдающеюся срединной жилкой. 3.

3. Всѣ листья и стебли плавающіе. *S. affine* Schnitz.

Стебли и листья прямостоящіе или только корневыя листья плавающіе. *S. affine* Schnitz., var. *Borderi* Weberbauer.

4. Стебли и листья плавающіе.

S. simplex Huds., var. *longissimum* Fr.

Стебли и листья прямостоящіе или только нижніе плавающіе. 5.

5. Всѣ листья съ яснымъ килемъ, особенно у основанія остро-3-гранные. 6.

Листья съ нижней стороны выпуклые, безъ кили или только у основанія тупо-3-гранные съ выпуклыми гранями.

S. affine Schnitz, var. *Borderi*. Weberbauer.

6. Соцветіе вѣтвистое. *S. neglectum* Beeby.

Соцветіе простое, безъ вѣтвей. *S. simplex* Huds.

33. *S. neglectum* Beeby. Пер. Кр. III, стр. 133.


Sparganium ramosum Huds. Бух. II, № 482.—Бух. I, № 445.—F. O., № 8, p. 118.—Пет., стр. 283.—Кауф. II, № 893.—Цин., № 1352.—Кауф. I, стр. 592.—Дв., № 844.—Макс., № 831.—Gold. C., p. 22.—Gold. Sp., p. 137.—Mart., p. 160.

Sparganium erectum L. α. St. I, № 628.

Стебель б. ч. примостоящий, торчащий из воды болѣе половины, во время созрѣванія плодовъ иногда приподнимающийся; листья торчащіе или отогнутые, широко-линейные, постепенно заостренные, у основанія 3-гранные съ вогнутыми гранями, по всей длинѣ съ килемъ, 3—15 мм. шир.; соцветіе вѣтвистое, каждая вѣточка несетъ 1—3 женскихъ и много мужскихъ головокъ; завязь постепенно переходить въ столбикъ; рыльце свѣтлое или черповатое, около 1.5—3 мм. дл.; плодъ буровато-



Sparganium neglectum.



Sparganium simplex.

желтый, лоснящийся, 6—10 мм. дл. 3—4 мм. шир., книзу обратно-конпческій, съ 3—6 закругленными ребрышками, верхушка его почти округлая, переходитъ въ остающийся столбикъ; косточка съ тонкими продольными бороздками, не доходить до верхушки плода, а отдѣлена отъ него губчатой тканью. Цвѣтетъ въ $\frac{2}{2}$ іюня и весь іюль, плоды съ конца августа до средины сентября. По ручьямъ и канавамъ. Всесвятское, Угрешскій монастырь; Даниловское. Дмт. у. (П.).—Мытищи; Борисовскій ручей, Срп. р. (С.).—Сѣтунь (Н.).—Тушино (Г.).—Молоди. Срп. у. (Ч.).—С. Михайловское, Пдл. у. (Ф. О.).

34. *S. simplex* Huds. Пет. Кр. III, стр. 134.—Бух. II, № 483. Бух. I, № 446.—Пет., стр. 283.—Кауф. II, № 894.—Цин., № 1353.—Кауф. I, стр. 592.—Lind., p. 162.—Дв., № 845.—Макс., № 830.—Hoff. II., № 7402.—Gold. C., p. 22.—Gold. Sp., p. 137.—Mart., p. 160.—

Sparganium erectum L. β. St. II, p. 52.—St. I, № 628*. Pal., № 2003.

Стебель примостоящий, отчасти или до соцветія погруженный въ воду, 20—60 см., или же стебель плавающий, и тогда часто превышаетъ 1 метр.; листья линейные, въ нижней части 3-гранные, 5—12 мм. шир., по

степенно сужены въ тупой кончикъ; корневые—б. ч. плавающие; стебле-
вые—часто торчащие изъ воды, съ б. или м. широкими влагалищами; со-
цветіе простое, состоитъ изъ 3—8 мужскихъ и 2—6 женскихъ головокъ,
изъ которыхъ нижнія на ножкахъ, а верхнія сидячія; нижній прицветный
листь не превышаетъ длиною всего соцветія; завязь постепенно пере-
ходить въ длинный столбикъ съ длиннымъ нитевиднымъ рыльцемъ; плодъ
продолговато-эллиптический 4—5 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир., съ явственной
появкой, достигающей иногда 2 мм. дл. Цвѣты съ $2\frac{1}{2}$ июня и весь июль,
рѣдко въ $1\frac{1}{2}$ августа; зрѣлые плоды съ начала сентября. По рѣкамъ,
озерамъ и канавамъ.

Встрѣчаются слѣдующія формы:


1. *typicum* Aschr. et Gr. Очень часто.
2. *angustifolium* Beckmann. Въ ручьѣ Вяземкѣ близъ Дарына, Звн. у. (П.).
3. *longissimum* Fr.

Sparganium simplex Huds. *fluitans* Gord. et Gren. F. O. № 8, p. 118.—Цин., стр. 405.

Мож. у (Цин.). Костыши, Дмт. у. (П.).

1. Стебель и листья прямостоящіе, хотя и бываютъ погружены въ воду, но не плавающие, и соцветіе всегда торчитъ надъ водой. 2. Стебель и все листья плавающие, часто превышаютъ 1 метръ; листья въ нижней трети тупо-3-гранные, въ остальныхъ $\frac{2}{3}$ плоскіе, слегка выпуклые съ нижней стороны и съ явственной срединной жилкой; соцветіе выдается надъ водой, съ большимъ числомъ мужскихъ головокъ, изъ которыхъ верхнія сучены.

longissimum Fr.



Sparganium affine.



Sparganium affine v. *Borderi.*

2. Листья до 12 мм. шир., прямо торчащіе, почти по всей своей длинѣ 3-гранные, расположеніе ихъ двурядное, часто нѣсколько скрученное спирально.

typicum Aschr. et Gr.

Все растение 15—35 см. выш.; листья 4—6 мм. шир., прямо торчащіе.

angustifolium Beckmann.

35. *S. affine* Schnitzl. Пет. Кр. III, стр. 135.*Sparganium natans* L.

Стебель б. ч. плавающий, часто болѣе 1 метра дл., рѣдко стебель прямостоящій; корневые листья длинные, плавающие, съ нижней стороны почти полуцилиндрическіе или сильно выпуклые, верхняя сторона плоская; стеблевые листья съ сильно расширенными влагалищами; соцветіе плавающее, состоитъ изъ 1—3—6 мужскихъ и 2—3 женскихъ головокъ, б. или м. скученныхъ, иногда соцветіе вѣтвистое; столбикъ длинный, рыльце нитевидное; плодъ веретенообразный, наибольшая ширина его посрединѣ; косточка яйцевидная, къ обоимъ концамъ заостренная. Цвѣтеть во $2\frac{1}{2}$ іюля, плоды въ сентябрѣ. Въ Глубокомъ озерѣ, Руз. у., озеро Долгое близъ дер. Рыбаки, Мос. у. (II. и С.).

2. *Borderi* Weberbauer. Стебель прямостоящій, 10—40 см.; всѣ листья прямостоящіе, значительно превышаютъ соцветіе, иногда корневые—плавающие, съ верхней стороны плоскіе, съ нижней—округлые, рѣдко у основанія тупо-3-гранные съ выпуклыми гранями, стеблевые—съ длинными, б. ч. вздутыми влагалищами. Глубокое озеро, на берегу при впаденіи р. Малой Нестры, Руз. у., погружено въ воду см. на 15 (II. и С.).

36. *S. minimum* Fr. Пет. Кр. III, стр. 134.—Бух. II, № 484.—Бух. I, № 447.—Г. О., № 8, р. 118.—Пет., стр. 283.—Ф. Б., № 126.—Кауф. II, № 896.—Мил. № 47.*Sparganium affine* Schnitzl. Гор., № 98.—Цик., № 1354.

Sparganium natans L. Кауф. II, № 895.—Кауф. I, стр. 592.—Lind. p. 162.—Ann. C. III, № 257.—Макс., № 832.—Gold. C., p. 22.—St. II, p. 52.

Стебель 6—80 см., плавающий или прямостоящій; листья тонкіе, плавающие или торчащіе, 2—8 мм. шир., линейные, съ тупыми кончиками, съ обѣихъ сторонъ плоскіе, очень рѣдко съ слабо-замѣтной срединной жилкой; соцветіе простое, состоитъ изъ 1, рѣже 2 мужскихъ и 2—4 женскихъ головокъ, изъ которыхъ нижняя часто на короткой ножкѣ; завязь эллиптическо-яйцевидная, быстро переходитъ въ очень короткій столбикъ или въ сидячее рыльце; плодъ яйцевидный, съ обѣихъ сторонъ коротко-заостренный, зеленовато-сѣрый. Цвѣты во $2\frac{1}{2}$ іюля, зрѣлыя сѣмена съ конца августа и въ сентябрѣ.

*Sparganium minimum.*

Встрѣчаются слѣдующія формы:

α. *typicum* Aschr. et Gr.β. *flaccidum* Aschr. et Gr.

Спасское-Сѣтунь (Г. О.).—Истоки р. Химки (И.).—Каржени, Шелякова, Архангельское, Мож. у. (Ф. Б.).—Близъ Дарьина, Ашеринскій оврагъ (Ф. Б. и Г. С.).—Р. Язовка и въ Во-

роновѣ, Илл. у. (Б.).—Петровско-Разумовское, Мытищи (С.).—Костыши, Дмит. у., Казарины луга, Дмит. у., Тростенское озеро, Ряз. у. (П.).—Между Краснымъ Станомъ и д. Воронцовой (Сюз.).—С. Чуденки, Бгр. у. (П. П.).

γ. *gatis* Meish. (sp.).

Въ р. Вяземкѣ близъ Дарына, Звени. у. (П.).—Больш. Мытищи въ торфяной канавѣ (П. и С.).

1. Стебли очень не высокіе, 6—15 см. верхніе листья высовываются изъ воды, серповидно-изогнутые; всѣ женскія головки сидячія.

gatis Meish.

Стебли достигаютъ 80 см., б. ч. плавающіе съ плавающими листьями: нижнія женскія головки часто на ножкахъ. 2.

2. Листья 6—8 мм. шир. *flaccidum* Aschr. et Gr.

Листья 4—5 мм. шир. *typicum* Aschr. et Gr.

Порядокъ Helobiae.

9 сем. Potamogetonaceae Aschr.

Многолѣтнія растенія, подводныя или съ плавающими на поверхности воды листьями; листья очередные, иногда верхушечные супротивные; цвѣты обоеполые, рѣже однополые, съ 4-листнымъ околоцвѣтникомъ, рѣже его нѣтъ; тычинокъ 1—4, б. ч. съ раздѣльными пыльниками, надъ которыми часто выступаетъ ланцетовидный придатокъ (связникъ); завязей 4, одногнѣздныхъ; столбика нѣтъ, рѣже онъ замѣтный; рыльце косое; плодъ—костянка, сидячая или на ножкѣ; сѣмя безъ бѣлка, съ б. или м. изогнутымъ зародышемъ.

15. Potamogeton L.

Многолѣтки съ ползучимъ корневищемъ и съ подводными стеблевыми и часто плавающими верхушечными листьями; цвѣты обоеполые, въ б. или м. длинныхъ, густыхъ или прерванныхъ початкахъ или колосьяхъ; 4 сидячихъ 2-гнѣздныхъ пыльника, б. ч. съ разобщенными гнѣздами, сидящими на связникѣ, сильно разросшемся въ большую чешуйку въ видѣ лепестка, отчего цвѣтокъ кажется состоящимъ изъ 4-листнаго околоцвѣтника; пестиковъ 4; столбиковъ нѣтъ или почти нѣтъ; рыльце сидячее; плодъ состоитъ изъ 4 костянокъ, нѣсколько сжатыхъ съ боковъ.

1. Стебли сильно сплюснутые, почти 2-крылые, вверху такой же ширины, какъ и листья. *P. compressus* L.

Стебли цилиндрическіе, а если и сплюснутые, то очень слабо и безъ крыльевъ. 2.

2. Листья узко линейные, не шире 3 мм. 3.

Листья узко или линейно-ланцетные или же овальные но всегда шире 3 мм. 6.

3. Листья съ длинными влагалищами, сросшимися до половины съ прилистниками. *P. pectinatus* L.

Листья со свободными прилистниками. 4.

4. Цвѣтоносъ не длиннѣ колоса.

P. obtusifolius Mert. et Koch.

Цвѣтоносъ въ 2—4 раза длиннѣ колоса. 5.

5. Стебель нѣсколько сплюснутый; листья 2—2,5 мм. шир., цвѣтоносъ вверху нѣсколько утолщенъ.

P. mucronatus Schrad.

Стебель вполне цилиндрическій; листья 0,5—1,5 мм. шир., цвѣтоносъ къ верхушкѣ не утолщенъ. *P. pusillus* L.

6. Всѣ листья на длинныхъ черенкахъ, кожистые, непрозрачные, овальные, плавающіе; отъ подводныхъ листьевъ остаются одни немного желобчатые черешки. *P. natans* L.

Подводные листья есть, и они прозрачные. 7.

7. Всѣ листья или, по крайней мѣрѣ, верхніе черешковые. 8. Всѣ листья сидячіе. 11.

8. На цвѣтущихъ стебляхъ всѣ листья подводные. 9.

На цвѣтущихъ стебляхъ верхніе листья плавающіе. 10.

9. Листья линейно-ланцетные, маленькіе.

P. gramineus L. var. *graminifolius* Fr.

Листья ланцетные или широко-ланцетные, крупныя, до 30 см. дл.

P. lucens L.

10. Цвѣтоносы къ верхушкѣ утолщаются; костянка на спинкѣ съ тупымъ килемъ; подводные листья не длиннѣ 8 см.

P. gramineus L.

Цвѣтоносы не утолщаются къ верхушкѣ; костянка на спинкѣ съ острымъ килемъ; подводные листья до 25 см. дл.

P. alpinus Balbis.

11. Листья широколинейные или узколанцетные по краямъ мелкозубчатые, б. ч. курчавые; костянка съ длиннымъ, согнутымъ носикомъ. *P. crispus* L.

Листья широкіе пной формы; костянка съ короткимъ носикомъ. 12.

12. Стебель въ междоузліяхъ колѣнчато-изогнутый; листья продолговатые или ланцетные, на верхушкѣ стянуты колпачкомъ; костянка съ острымъ килемъ. *P. praelongus* Wulf.

Стебель прямой, не изогнутъ колѣнчато; листья округло- или продолговато-линейвидные, глубоко сердцевидные, стеблеобъемлющіе, на концѣ безъ колпачка; костянка съ тупымъ килемъ.

P. perfoliatus L.

37. **P. natans** L. Бух. II, № 491.—Бух. I, № 452.—Ф. О. № 8, p. 118.—Пет., стр. 248.—Кауф. II, № 899.—Цин., № 1366.—Кауф. I, стр. 596.—Lind., p. 164.—Ann. C. V, № 59.—Дв., № 182.—Макс., № 168.—Hoff. H., № 1194.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 31.—Ad., p. 87.—St. II, p. 11.—St. I, № 107.

Корневище ползучее, вѣтвистое; стебли часто длиннѣе 1 метра; нижніе подводные листья безъ пластинки, ко времени цвѣтенья б. ч. отмираютъ; верхніе листья плавающие на поверхности воды, овальные или продолговатые, до 5,5 см. шир. и до 12 см. дл., у основанія округлые или слегка сердцевидные, верхушка туповатая или коротко заостренная; черешки равны листу, иногда значительно превышаютъ его, сверху слегка



Potamogeton natans.



Potamogeton alpinus.

желобчатые; прилистники до 10 см. дл., иногда длиннѣе черешка; соцветіе до 8 см. дл., на ножкѣ одинаковой толщины во всѣхъ ея частяхъ; костянка съ очень короткимъ носикомъ, 4—5 мм. дл., съ тупымъ килемъ на спинкѣ, слегка морщинистая. Цвѣты съ половины іюня до августа, зрѣлыя сѣмена $\frac{2}{3}$ августа. По рѣкамъ и прудамъ, очень часто.

38. *P. alpinus* Balbis. Пет. Кр. III, стр. 136.

Potamogeton rufescens Schrad. F. O. № 8, p. 118.—Пет., стр. 248.—Кауф. II, № 900.—Цви., № 1368.—Кауф. I, стр. 596.

Корневище ползучее, часто вѣтвистое; стебли достигаютъ 2 метр., красноватые; все растеніе послѣ сушки б. ч. краснѣетъ; подводные листья до 25 см. дл. и 25 мм. шир., къ обоимъ концамъ заостренные, ланцетные, вѣсколько туповатые, съ ясною срединною жилкой; плавающие листья обратно-яйцевидные или продолговато-лопатчатые, туповатые, кожистые, на черешкахъ короче пластинки; прилистники около 6 см. дл., тусклые, б. ч. красновато-бурые; колосъ до 4 см. дл., на цвѣтоношѣ, достигающемъ 7 см. дл.; костянка сплюснутая, чечевицеобразная, до 2,5 мм. дл., съ килемъ. Цвѣты съ $\frac{2}{3}$ іюня и весь іюль, плоды съ августа. По ручьямъ и медленно текущимъ рѣкамъ.

а. *purpurascens* Seidl. Во всѣхъ частяхъ растеніе очень крупное: промежутки между листьями до 5 см.; листья широкіе, плавающие, широко-яйцевидные, почти кожистые; колосъ достигаетъ 5 см. дл., на очень длинномъ цвѣтоношѣ.

Лизаветино, Киреево, близъ Семеновскаго (К.). — Тимошевское торфяное болото, Дмит. у., Больш. Мытниц, Химки, Кунцево, — прудъ (П.). — Тростенское озеро, Руз. у. (П. и С.). — Ручей близъ Богородскаго у. по лѣв. берегу Ярославской жел. дор. (С.). — Д. Вязки, Брн. у., въ ручьѣ (Х.).

39. *P. perfoliatus* L. Бух. II, № 487. — Бух. I, № 450. — F. O. № 8, p. 118. — Пет., стр. 249. — Кауф. II, № 904. — Цин., № 1372. — Pinz., p. 18. — Кауф. I, стр. 597. — Lind., p. 164. — Ann. C. V, № 63.

Potamogeton perfoliatum. Дв., № 183. — Макс., № 170. — Hoff. H., № 1196. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 31. — Ad., p. 87. — St. II, p. 11. — St. I, № 108.

Все растеніе погружено въ воду; стебли не изогнуты колышато, достигаютъ 5 мм. толщ.; б. ч. сильно вѣтвистыя; листья округлы или продолговато-яйцевидныя, 5—12 см. дл. и 3—6 см. шир., у основанія глубоко-



Potamogeton perfoliatus.



Potamogeton praelongus.

сердцевидно-стеблеобъемлющія, по краямъ иногда очень мелкозубчатые и волнистыя; прилистники маленькіе, широко яйцевидныя, не длиннѣе 10 мм., очень тонкіе, скоро опадающіе; колосъ до 3 см. дл., густой, на цвѣтосѣ до 8 см. дл.; косянка косо-обратно-яйцевидная, около 3 мм. дл., съ тупымъ клиемъ, сплюснутая, съ короткимъ, вѣсколько загнутымъ назадъ носикомъ. Цвѣты съ $\frac{1}{2}$ іюня и іюль, плоды съ конца іюля. По рѣкамъ, прудамъ и озерамъ, очень часто.

α. *typicus* Aschr. et Gr. Листья широко-яйцевидныя (рис. I).

β. *cordato-lanceolatus* Mert. et Koch. Листья яйцевидно-ланцетныя (рис. II).

40. *P. praelongus* Wulf. Пет. Кр. III, стр. 136. — Мос., № 52. — F. O. № 8, p. 118. — Пет., стр. 249. — Кауф. II, № 627. — Цин., № 1371. — Рупр., стр. 88. — Кауф. I, стр. 597. — Макс., № 169.

Potamogeton praelongum. Дв., № 186.

Всё растение погружено въ воду; стебель достигаетъ 2 метр., въ нижней части безлиственный, вѣтвистый, у каждаго листа колѣчато-изогнутый; листья продолговато-ланцетные, до 13 см. дл. и 4,5 см. шир., сужены къ обоимъ концамъ, на верхушкѣ стиснуты колпачкомъ, у основанія округлые или сердцевидно-стеблеобъемлющія, слегка по краямъ волнистые, съ ясною срединной жилкой; прилистники 1,5—6 см. дл., свѣтло-бурые или соломенно-желтоватые; колосъ 3—5 см. дл., густой, на длинномъ, достигающемъ 20 см. дл. цветоносѣ, близъ верхушки часто нѣсколько изогнутомъ; костянка около 4 мм. дл., съ острымъ килемъ и короткимъ носикомъ. Цвѣты въ июнѣ. По рѣкамъ и озерамъ, рѣдко. Юрьевское озеро, Пдл. у. (Мос.).—Тростенское озеро, Руз. у. (П.).—Мож. у. (Ф. О.).

41. *P. lucens* L. Бух. II, № 489.—Бух. I, № 453.—Ф. О. № 8, p. 118.—Пет., стр. 248.—Кауф. II, № 902.—Цип. № 1370.—Кауф. I, стр. 596.—Дв., № 184.—Макс., № 169.—Нoff. H., № 1192.—Gold., C. p. 18.—Mart., p. 31.—Ad., p. 87—88.—St. II, p. 11.—St. I, № 109.

Стебель до 3 метр. и 3—4 мм. толщ.; всѣ листья подводные, ланцетные, лоснящіеся, очень крупныя, до 30 см. дл. и до 5 см. шир., на короткихъ черешкахъ, по краямъ очень мелко-зубчато-шероховатыя, иногда



Potamogeton lucens.



Potamogeton gramineus.
α. graminifolius.



β. heterophyllus.

волнистыя, близъ верхушки стебля сближенные; прилистники до 8 см. дл. на концѣ округлые; колосъ до 6 см. дл., толстый, на толстомъ цветоносѣ до 7 мм. толщ.; костянка почти круглая, съ очень короткимъ носикомъ и тупымъ килемъ. Цвѣтетъ весь июнь и июль. зрѣлыя сѣмена съ $\frac{2}{2}$ августа. По рѣкамъ и озерамъ, очень часто.

42. *P. gramineus* L. Пет. Кр. III, стр. 133.—Ф. Б., № 123.—Бух. II, № 456.—Пет., стр. 248.—Кауф. II, № 901.—Гор., № 99.—Цип. № 1369.—Lind., p. 164.—Ann. C. V, № 60.—Дв., № 190.—Макс., № 175.—Нoff., № 1190.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 32.—Ad., p. 89.—St. II, p. 11.—St. I, № 111.

Корневище тонкое, на концѣ часто съ утолщеніемъ; стебли достигаютъ 1 метра, очень тонкіе (1—2 мм.), часто сильно вѣтвистые; подводные листья ланцетные или линейно-ланцетные, 4—8 см. дл. и около 8 мм. шир., заостренные, по краямъ шероховатые, иногда лоснящіеся, основаніе ихъ сужено почти въ черешокъ, рѣже полустеблеобъемлющіе; плавающие листья продолговатые или иногда широко-яйцевидные, кожистые, до 7 см. дл. и до 3 см. шир., на длинныхъ черешкахъ; прилистники линейные, иногда почти нитевидные; колосъ около 3 см. дл. на цвѣтоносахъ, въ верхнемъ концѣ нѣсколько утолщенныхъ, 2—7 см. дл. и 2—3 мм. толщ.; костянка 1—2 мм. дл. яйцевидная, съ тупымъ килемъ. Цвѣты съ $\frac{2}{2}$ июня.

α. *graminifolius* Fr. Пет. Кр. III, стр. 138.

Всѣ листья подводные, линейно-ланцетные.

β. *heterophyllus* Fr. Пет. Кр. III, стр. 138.—Бух. II, № 490.—Нолл. Н., № 1191. Подводные листья ланцетные, серповидно-отогнутые; плавающие—ланцетные или овально-эллиптическіе, кожистые, на б. или м. длинныхъ черешкахъ.

γ. *terrestris* Fr. Пет. Кр. III, стр. 138.

Растеніе наземное: всѣ листья на черешкахъ, кожистые, широко-эллиптическіе.

Тростенское и Глубокое озеро, Руз. у. (Ч., II. п. С.) и β. *heterophyllus* Fr. еще въ Масловскомъ лѣсу около моста черезъ р. Сухолку, Пдл. у. (Б.).

43. *P. crispus* L. Бух. II, № 488.—Бух. I, № 451.—Ф. О. № 8, p. 118.—Пет., стр. 249.—Кауф. II, № 905.—Цин. № 1373.—Кауф. I, стр. 597.—Lind., p. 164.—Макс., № 171.—Gold. C., p. 18.

Potamogeton crispum. Дв., № 187.—Mart., p. 32.—Ad., p. 88.—St. II, p. 11.—St. I, № 110.



Potamogeton crispus.

Корневище ползучее, вѣтвистое; стебель простой или вѣтвистый, до 1 метра дл. и 2 мм. толщ.; листья почти всегда подводные, узко-ланцетные или линейно-ланцетные, у основанія округлые, сидячіе, на концѣ тупо-заостренные, 4—9 см. дл. и 4—13 мм. шир., по краямъ мелко-зубчатые и б. ч. курчавые; прилистники не длиннѣе 1 см., широкіе, очень тонкіе, опадающіе; колосъ рѣдкій, 4—15-цвѣтковый, на цвѣтоносѣ 2—5 см. дл.; костянка почти круглая, на спинкѣ съ тупымъ килемъ, вытянута въ длинный, часто серповидно-отогнутый носикъ. Цвѣты—весь июль и начало августа. По рѣкамъ и прудамъ.

α. *serrulatus* Rehb. Листья по краямъ плоскіе. Р. Сѣтунь близъ Давыдова (А.).—Трепорево, Мож. у., и Серпуховъ (К.).—Петровское—Разумовское; Бацманово на Окѣ, Кал. у., р. Нерская за Левичиннымъ, Бгр. у.,

Косино (П.).—Клязьма близъ Черкизова (П. и С.).—Р. Уча близъ Листвянъ (С.).—Р. Пахра, Пдл. у. (Б.).

44. *P. compressus* L. Пет. Кр. III, стр. 136. — Пет., стр. 247. — Кауф. II, № 906. — Цин., № 1374. — Кауф. I, стр. 597. — Gold. Sp., p. 121. — Ad., p. 88.

Potamogeton compressus, Дв., № 189.

Potamogeton complanatus Willd. Дв., № 185. — Макс., № 172.

Potamogeton zosteracfolius Schum. Borg., p. 700. — Макс. приб., № 172. — Gold. C., p. 18.

Potamogeton planicaulis Gold. Gold. Sp., p. 121.

Potamogeton Goldbachii, Герб. Борхмана.

Корневище ползучее; стебли сильно сплюснутые, крылатые, почти такой же ширины, какъ и листья, вѣтвистые, до 2 метр. дл. и 2—3 мм. толщ.; листья линейные, до 20 см. дл., 2—4 мм. шир., на концѣ округлые, быстро переходя въ короткое остріе; прилистники бѣловатые, до 4 см. дл.; колосы густые, 10—15-цвѣтковые, 1—2 см. дл., на цветоносахъ



Potamogeton compressus.



Potamogeton obtusifolius.

2—6 см. дл. и до 2 мм. толщ.; костянка полукруглая, съ сильно выпуклой передней стороной, съ тупымъ клиемъ на спинкѣ и короткимъ носикомъ. Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ. По рѣкамъ и прудамъ. Р. Ступи близъ Давыдова (А.). — Муза (Бор.). — Близъ Симонова монастыря (Гольдб.). — Уча близъ Листвянъ, Петровское-Разумовское, Клязьма близъ Каргашина (С.). — Истра подъ Воскресенскимъ, Зви. у., Лукинка въ прудахъ (П.).

45. *P. obtusifolius* Mert. et Koch. Пет. Кр. III, стр. 139. — Пет., стр. 248.

Стебли слегка сплюснутые или почти цилиндрическіе, очень тонкіе, б. ч. сильно вѣтвистые, съ листьями, сидящими близъ верхушки болѣе сближенно, чѣмъ на остальномъ стеблѣ; листья линейные, съ 3—5 жил-

камн, 1—2 мм. шир., на концѣ закрутленные, быстро переходятъ въ очень короткое остріе, очень рѣдко верхушечные листья слегка заостренные; прилистники бѣловато-желтые, широкіе, до 1,5 см. дл.; колосъ короткий, 6—18-цвѣтковый, на тонкомъ цвѣтоносѣ, равномъ колосу или же короче его, не превышающемъ 1 см. дл.; костянки сидятъ очень скученно, косо-обратно-яйцевидныя, съ тупымъ килемъ, слегка морщинистыя, около 2 мм. дл., съ прямымъ носикомъ. Цвѣты съ $\frac{2}{2}$ іюня, плоды съ конца августа. Въ заводяхъ Клязмы между Черкизовымъ и Каргашиннымъ (П.).—Петровское-Разумовское (Шр.).—Сенежское озеро (М.).—Старое русло р. Учи близъ Липстванъ (С.).

46. *P. mucronatus* Schrad. Пет. Кр. III, стр. 137.—Бух. II, № 492.—Пет., стр. 248.

Potamogeton pusillus L. major Fr. Бух. I, № 455.—Кауф. II, стр. 628.—Кауф. I, стр. 598.

Potamogeton Friesii Rupr.



Potamogeton mucronatus.

Стебель до 1 метра дл., слегка сплюснутый, сильно вѣтвистый, съ многочисленными, укороченными вѣточками въ пазухахъ стеблевыхъ листьевъ; листья линейные, до 2,5 мм. шир., на концѣ тупые или слегка заостренные, съ 3—5 жилками; прилистники около 1 см. дл., впоследствии на концѣ двузубчатые или даже разорванные до основанія; колосъ не густой, часто прерванный, 5—10-цвѣтковый, на цвѣтоносѣ, близъ верхушки замѣтно утолщенномъ, въ 2—4 раза длиннѣе колоса; костянка около 2 мм. дл., гладкая, косо-эллиптическая, съ короткимъ прямымъ носикомъ. Цвѣты съ $\frac{2}{2}$ іюня и $\frac{1}{2}$ іюля, плоды $\frac{2}{2}$ августа. Тулуповская мельница близъ Покровскаго (К.).—Симоновъ монастырь (Гольдб.).—Юрьевское озеро, Пдл. у. (Б.).—Петра подъ Воскресенскимъ, р. Разводня подъ Саввинымъ монастыремъ, Зви. у., Лужки, Срп. у. (П.).

47. *P. pusillus* L. Пет. Кр. III, стр. 137.—F. O. № 8, p. 118.—Пет., стр. 248.—Кауф. II, № 907.—Цил., № 1376.—Кауф. I, стр. 598.—Lind., p. 164.—Ann. C. III, № 256.

Potamogeton pusillum. Дв., № 191.—Макс., № 174.—Hoff. II, № 1197.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 32.—Ad., p. 89.—St. II, p. 11.—St. I, № 112.

Стебли сильно вѣтвистые, рѣже почти простые, не сплюснутые, до 75 см. дл.; листья 0,5—1,5 мм. шир. или ланцетные, заостренные, съ 1—3 жилками; прилистники широкіе, до 1 см. дл., на концѣ съ вычеленнымъ краемъ, но не разорванные; колосы маленькіе, не густые, на цвѣтоносахъ, достигающихъ 3 см. дл.; костянка ромбическо-обратно-яйцевидная, съ короткимъ носикомъ, гладкая или морщинистая. Цвѣты съ

$\frac{2}{2}$ июня и $\frac{1}{2}$ июля, плоды $\frac{2}{2}$ августа. По стоячимъ и медленно текущимъ водамъ.


Встрѣчаются слѣдующія формы:

α *vulgaris* Fr. F. O. № 8, p. 118.—Кауф. II, стр. 628.—Кауф. I, стр. 598.

Щукино, Лизаветино, Братицево, Кунцево (А. п. II.).—Талицы. Дмт. у., Мытлицы (С.).

β. *squarrosus* Aschr. et Gr.

Кунцево, Серпуховъ, Уча близъ Листвянъ; р. Истра подъ Воскресенскимъ, Звн. у. (II.).—Клязьма близъ Черкизова (II. п. С.).



Potamogeton pusillus α. *vulgaris*.



Potamogeton pusillus γ. *tenuissimus*.

γ. *tenuissimus* Mert. et Koch. F. O. № 8, p. 118.—Кауф. II, стр. 628.—Кауф. I, стр. 598.

Небольшое болото по берегу р. Клязьмы близъ Навловскаго посада, Бгр. у. (К.).—Клязьма близъ Каргашина (С.).—Мож. у. (Ф. О.).

1. Промежутки стебля между листьями не длиннѣе 5 мм.

var. squarrosus Aschr. et Gr.

Промежутки стебля 2—5 см. дл. 2.

2. Листья 1—1,5 мм. шир., б. ч. 3 съ жилками.

var. vulgaris Fr.

Листья нитевидные съ 1 жилкой.

var. tenuissimus Mert. et Koch.

48. *P. pectinatus* L. Пер. Кр. III, стр. 138.—F. O. № 8, p. 118.—Пер., стр. 248.—Кауф. II, № 908.—Цин., № 1377.—Кауф. I, стр. 598.—Lind., p. 164.—Ann. C. V, № 64.—Дв., № 188.—Макс., № 173.—Hoff. II., № 1195.

Стебли тонкіе, до 2 метр. дл., б. ч. сильно вѣтвистые, особенно близъ верхушки; листья около 1—2,5 мм. шир., узко-линейные или линейно-шиловидные, длинно-заостренные, съ 1—3 жилками, у основаніи съ длинными влагалищами, спаянными до середины съ прилистниками; колосья не густые, часто прерванные, до 5 см. дл., на длинныхъ,

нитевидныхъ, отъ 4 до 25 см. дл. цвѣтоносахъ; костянка косо-широко-яйцевидная, часто полукруглая, на спинкѣ съ килемъ, рѣже безъ него,



Potamogeton pectinatus α. *scoparius*.



Potamogeton pectinatus β. *interruptus*.

съ прямымъ внутреннимъ краемъ и короткимъ носикомъ. Цвѣт. весь июнь, плоды съ конца іюля. По рѣкамъ и прудамъ.

α. *scoparius* Wallr. Пет. Кр. III, стр. 138.—Мос., № 53.—Кауф. II, стр. 628.—Кауф. I, стр. 598.

Листья съ 1 жилкой; растеніе б. ч. сильно вѣтвистое, особенно близъ верхушки. Сѣтунь, Куцево (А.).—Яуза (Бор.).—Лизаветино, оврагъ между Тушинымъ и Петровымъ (К.).—Заводъ Оки близъ Дракпна. Сри. у. (II.).—Р. Малая Сестра, Кн. у. (Ч.).—Клязьма, близъ Каргашина (П. и С.).—Уча, близъ Листвянъ (С.).—Р. Ока противъ с. Лужняки, Сри. у. (II. и X.).

β. *interruptus* Kit. Пет. Кр. III, стр. 138.—Бух. II, № 493.—Бух. I, № 454.—Кауф. II, стр. 628.—Кауф. I, стр. 598.

Листья съ 3 жилками. Яуза (Гольдб.).—Голландскій прудъ въ Вороновѣ, Пдл. у (В.).

16. *Zannichéllia* L.

Многолѣтнее подводное растеніе съ ползучимъ корневищемъ; цвѣты пазушные, однополые, однодомные; мужскіе — безъ околоцвѣтника, состоятъ изъ одной тычинки на длинной тычиночной нити и 2-гнѣздного пыльника, связникъ вытянутъ въ короткое остріе; женскіе цвѣты съ маленькимъ, зачаточнымъ, перепончатымъ околоцвѣтникомъ, состоятъ изъ 2—6 (чаще всего изъ 4) пестиковъ съ короткими столбиками и рыльцами въ видѣ щитка; плоды по 2—6, сидѣіе или на короткихъ ножкахъ, нѣсколько изогнутые и сплюснутые, кончаются болѣе или менѣе длиннымъ столбикомъ и щитковиднымъ рыльцемъ, края котораго часто слабо зубчатые.

49. *Z. palustris* L. Пет. Кр. III, стр. 139.—Пет., стр. 309.—Кауф. II, № 909. — Цил., № 1364.—Кауф. I, стр. 599.—Hoff. II., № 7388.—Gold. C., p. 22.

Растение подводное; стебли ползучие или плавающие, очень тонкие, нитевидные, сильно ветвистые, 1—30 см. дл.; листья линейные или нитевидные, не шире 1,5 мм., б. ч. заостренные, съ 1 жилкой у основания, расширены въ прозрачное влагалище; сѣмянки на короткой ножкѣ, слегка согнуты, съ зубчатымъ килемъ на спинкѣ; столбикъ въ 2 раза короче сѣмянки. Плоды съ середины юля. Р. Клязьма близъ Черкизова (С.).—Р. Клязьма близъ Каргашина (Ш. и С.).

- α. *repens* Bönng. Пет. Кр. III, стр. 139.—Ф. Б. № 28.

Растение маленькое съ ползучимъ стеблемъ.

- β. *major* Bönng. Пет. Кр. III, стр. 139.

Растения съ плавающими стеблями, прикрепленными лишь только основаніемъ, достигаютъ 30 см. дл.: плоды сидятъ часто по 2.



Zannichellia palustris.

10 сем. Najadaceae Lindl.

Однолѣтнія подводныя растения, однополыя, однодомныя; мужскіе цвѣты съ трубчатымъ околоцвѣтникомъ, охватывающимъ сидячій, рѣже на короткой нити пыльникъ, одногнѣздный или 4-гнѣздный; околоцвѣтникъ къверху суженный, по краю зубчатый, открытый; женскіе цвѣты безъ околоцвѣтника, состоятъ изъ 1 пестика съ очень короткимъ столбикомъ и 2—3 расходящимися рыльцами: плодъ веретенообразная костянка безъ бѣлка и съ прямымъ зародышемъ. Только одинъ родъ.

17. *Najas* L.

50. *N. minor* All. Пет. Кр. III, стр. 139.


Caulinia fragilis Willd. Пет., стр. 163.—Кауф. II, № 910.—Мил., № 11.

Подводное растение; стебли 1—40 см. дл., тонкіе, очень ломкіе вѣтвисто-развѣтвленные, въ нижнихъ узлахъ укореняющіеся; листья по 3 въ ложной мутовкѣ (иногда въ нижней части стебля по 2 супротивныхъ), съ 1 жилкой, по краямъ выемчато-шиповато-зубчатые, б. ч. серповидно-огнутые; влагалища листьевъ рѣсничато-зубчатые; околоцвѣтникъ мужского цвѣтка перепончатый; костянка тонко заостренная, съ остающимся столбикомъ, черновато-сѣрая. Цвѣты и плоды съ начала юля, зрѣлыя сѣмена съ начала августа. Р. Клязьма близъ Черкизова

(С.).—Блязьма близъ Каргашина; Павловскій посадъ, Бгр. у., Ока противъ Бачманова, Кзм. у. (П. и С.).—Въ рѣкѣ Окѣ, противъ с. Лужники, Спр. у. (П. и Х.).

11 сем. Juncagináceae Lindl.

Многолѣтнія болотныя растенія съ очередными, 2-рядными, линейными листьями съ влагалищами; цвѣты обоюполые; околоцвѣтникъ шестерной, состоитъ изъ 2 тройчатыхъ вѣнцовъ; тычинокъ 6, спящихъ су-



Najas minor.

Scheuchzeria palustris.

противъ частей околоцвѣтника; плодниковъ 6, иногда недоразвитыхъ, часто сросшихся, при созрѣваніи снова распающихся; рыльца спячія; плодъ сухой, состоитъ изъ плодниковъ, разверзающихся вдоль внутренняго шва, или простой, распающийся на доли; сѣмена безъ бѣлка, зародышъ прямой.

18. Scheuchzeria L.

Цвѣты въ рѣдкихъ кистяхъ; околоцвѣтникъ 6-листный, остающійся, 3 внутреннихъ листочка околоцвѣтника нѣсколько уже наружныхъ; тычинокъ 6, на длинныхъ нитяхъ, съ выдающимся заостреннымъ связникомъ; завязей 3—6, сросшихся только у основанія, съ спящими, косо насаженными рыльцами; зрѣлые плоды вздутые, раскрываются съ внутренней стороны, съ 1—2 овальными сѣменами, кожура коихъ кожистая.

51. *S. palustris* L. Пет. Кр. III, стр. 66.—Ф. Б., № 103.—Нет., стр. 271.—Кауф. II, № 736.—Цин., № 1380.—Кауф. I, стр. 488.—Линд., p. 166.—Анн. С. V, № 58.—Дв., № 378.—Макс., № 350.—Нотт. II, № 2885.—Голд., Sp. p. 125.

Корневище членистое, ползучее, покрыто остатками влагалищъ отжившихъ листьевъ; листья узко-линейные, туповатые, желобчатые, съ длинными, нѣсколько вздутыми влагалищами; нижніе—сближенные, верхніе—разставленные и короче нижнихъ; цвѣточная кисть верхушечная, не

густая, о 3—10 цвѣтахъ, на торчанцахъ, неравнѣхъ цвѣтоножкахъ, нижніи длиннѣ верхнихъ; прицвѣтники похожи на маленькіе листья; цвѣты желтоватые; листочки околоцвѣтника продолговатые, острые, плоскіе, вниз отогнутые, короче тычинокъ; плоды косо-яйцевидные, желто-зеленые. Цвѣты съ $\frac{2}{2}$ мая, зрѣлыя сѣмена во $\frac{2}{2}$ іюли. По глубокимъ и сплошнымъ торфянымъ и моховымъ болотамъ. Горенки (д-ръ Финшеръ, герб. Гольдб.).—Близъ Сергіевского посада (Макс.).—Горки, Руз. у. (Ч.).—Зыково (Г.).—Васильево, Тимохово. Мож. у. (Ф.).—Раево и Ступь (А.).—Богородское, Мос. у. (М.).—Больш. Мытницы (С.).—Косино, Полецкое озеро, Руз. у., Захаровское озеро, Клі. у., Троестенское озеро, Руз. у., Саввинское озеро, Вер. у., (П.). Озеро Нерское, Мос. у. (П. и С.).

19. *Triglochin* L.

Цвѣты на стрѣлкѣ густой кистью; околоцвѣтникъ шестерной, опадающій; 3 внутренніе листочка околоцвѣтника нѣсколько приподняты надъ 3 наружными; тычинокъ 6, связникъ не выдается. нити короткія; завязей 3—6, сросшихся въ общій плодникъ, несущій 3 перистыхъ рылецъ; плоды отдѣляются отъ плодового стержня снизу вверхъ; сѣми однопочное, веретенообразное.

52. *T. maritima* L. Пет. Кр. III, стр. 66.—Пет., стр. 294.—Кауф. II, стр. 738.—Гор., № 77.—Цин., № 1378.

Растеніе въ 20—90 см.; основаніе стебли густо покрыто остатками влагалнщъ отжившихъ листьевъ; листья только корневыя, нѣсколько мя-



Triglochin maritima.



Triglochin palustre.

систые, линейные, желобчатые; кисть длинная, густая, б. ч. безъ верхушечнаго цвѣтка; плоды яйцевидные, подъ верхушкой перетянутые, сидятъ на нѣсколько отклоненныхъ плодonoжкахъ и распадаются на 6 мѣшечковъ. Цвѣты весь іюнь. плоды съ начала августа. На трясины, окру-

жающей Тростенское озеро, Ряз. у. (Ч. п П.). — Близъ Клементьева, Ряз. у. (Сюз.).

53. **T. palustris L.** Пет. Кр. III, стр. 66.—Бух. II, № 405.—Бух. I, № 376.—F. O. № 7., p. 102.—Пет., стр. 294.—Кауф. II, № 737.—Цин., № 1379.—Pinz., p. 18.—Кауф. I, стр. 489.—Lind., p. 164.—Ann. C. IV, № 53.—Дв., № 351.—Hoff. H., № 2887.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 66.—St. II, p. 23.—St. I, № 246.

Растение 15 — 60 см. съ волокнистымъ корнемъ, осенью даетъ длинныя побѣги, оканчивающіеся небольшою луковичкой съ однимъ листомъ; всѣ листья корневые, узко-линейные, полуцилиндрическіе, у основанія расширенныя въ желобчатую влагалища; цвѣточный стебель длиннѣе листьевъ, несетъ довольно рѣдкую кисть. б. ч. съ верхушечнымъ цвѣткомъ; плоды сидятъ на короткихъ, вверхъ торчащихъ плодоножкахъ, прижатыхъ къ стеблю, линейно-булавовидные, книзу суженные, распадаются на 3 мѣшечка. Цвѣты съ $\frac{2}{2}$ мая, весь июнь, плоды съ начала августа. По сырымъ лугамъ и торфинымъ болотамъ, часто. Хорошово, Иваньково, близъ Петрова, Ростокино (К.).—Больш. Мытщи (С.).—Кусково, Воробьевы горы (П.).

12 сем. Alismatáceae Lam.

Многолѣтнія, болотныя или водяныя растенія съ сѣтчатыми жилками на листьяхъ; подводныя листья черешковые съ широкой пластинкой, подводныя линейныя; цвѣты обоеполые или однополые; цвѣторасположеніе—мутовчатая кисть или мутовчатая метелка; околоцвѣтникъ 6-лиственный, нижніе 3 листка въ видѣ чашечки, б. ч. зеленые, верхніе 3 въ видѣ вѣника, б. ч. окрашены; тычинокъ б. ч. 6, сидящихъ по 2 супротивъ 3 верхнихъ листочковъ околоцвѣтника, или тычинокъ много; завязей 6 или много (у нашихъ родовъ б. ч. не сросшихся), одногнѣздныхъ, съ 1—2 сѣмечками; столбикъ съ боковымъ рыльцемъ; плодъ сложный, состоитъ изъ многихъ одногнѣздныхъ, неразверзающихся плодиковъ; сѣмя безъ бѣлка, съ подковообразнымъ зародышемъ.

20. Alisma L.

Цвѣты въ мутовчатыхъ метелкахъ, обоеполые; тычинокъ 6, сидящихъ по 2 супротивъ 3 верхнихъ листочковъ околоцвѣтника; плоды сидятъ кружкомъ на плоскомъ, нѣсколько выпукломъ цвѣтоложѣ, односѣменные, съ опадающимъ столбикомъ.

54. **A. Michalétii Aschr. et Gr.** Пет. Кр. III, стр. 64.

Alisma Plantago L. Бух. II, № 402.—Бух. I, № 373.—F. O. № 7, p. 102.—Пет., стр. 132.—Кауф. II, № 733.—Цин., № 1381.—Кауф. I, стр. 486.—Lind., p. 166.—Дв., № 381.—Макс., № 362.—Hoff. H., № 2896.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 66.—Hoff., № 82.—St. II, p. 23.—St. I, № 247.—Pal., № 752.

Основаніе стебли сильно утолщенное; стеблей 1 или нѣсколько.



Alisma Michaletii.

прямостоящихъ, достигающихъ 80 см.; листья только корневые, на длинныхъ или короткихъ черешкахъ, б. ч. яйцевидные, заостренные, у основанія б. или м. сердцевидные или округлые, рѣже листья ланцетные; метелка съ 5—7 мутовками торчащихъ вѣтвей по 6—9 въ мутовкѣ; цвѣты бѣлые; лепестки въ 2 раза длиннѣ чашелистиковъ; тычинки въ 2 раза длиннѣ плодниковъ; пыльники продолговатые; столбики длиннѣ завязей, прямостоящіе или слегка отогнутые кнаружи; плодики расположены такъ, что оставляютъ свободный промежутокъ и образуютъ неправильный треугольникъ. Цвѣты во $\frac{2}{2}$ іюня и въ іюль, зрѣлыя сѣмена во $\frac{2}{2}$ августа, иногда второе цвѣтеніе въ сентябрѣ. По канавамъ, по берегамъ рѣкъ и прудовъ и по сырымъ мѣстамъ.

2. *latifolium* Kunth.

Листья широко-яйцевидные, у основанія сердцевидные или округлые. Воробьевы горы, близъ Хорошова, Фили (П.). — Мытищи (С.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).

3. *stenophyllum* Aschr. et Gr.

Alisma Plantago L. lanceolatum Норре. Кауф. II, стр. 502.—Кауф. I, стр. 486.—Макс., № 362. 3.—Mart., p. 66.

Alisma Plantago L. angustifolium Ledb. Цин., стр. 413.—Mart., p. 66.

Листья широко- или узко-ланцетные, основаніе ихъ постепенно переходитъ въ черешокъ. Близъ села Нары, Вер. у. (Макс.). Въ р. Окѣ, противъ с. Лужняки, Срп. у. (П. и Х.).

55. *A. arcuatum* Michalet. Пет. Кр. III, стр. 63.

Основаніе стебля утолщено слабо; стебли 10—50 см., съ приподнимающимся основаніемъ, прямостоящіе, иногда почти лежачіе; листья продолговато-эллиптическіе или ланцетные, на слабыхъ экземплярахъ почти линейные, равномерно заостренные къ обоимъ концамъ; метелка съ 2—5 мутовками б. ч. отогнутыхъ вѣтвей; цвѣты блѣдно-розовые; лепестки въ $1\frac{1}{2}$ раза длиннѣ чашелистиковъ; тычинки равны плодникамъ; пыльники округлые; столбики значительно короче завязей, отогнуты кнаружи крючкомъ; плодики образуютъ правильный треугольникъ, соприкасаются внутри между собой, не оставляя свободного промежутка. Берегъ р. Оки близъ Серпухова, въ плодахъ $\frac{1}{2}$ августа (С.). Въ р. Окѣ, противъ с. Лужняки, Срп. у. (П. и Х.).



Alisma arcuatum.

21. *Sagittaria* L.

Цветы въ мотовчатыхъ кистяхъ, однополые, однодомные; тычинокъ много; плоды крылатые, образуютъ родъ шаровидной головки на вышукломъ, почти шаровидномъ плодоложѣ; столбикъ остается.

56. *S. sagittifolia* L. Пет. Кр. III, стр. 65.—Бух. II, № 403.—Бух. I, № 374.—
F. O. № 7 p. 102. — Пет. стр. 264. — Кауф. II № 734. —
Цинн., № 1382.—Кауф. I, стр. 487.—Lind., p. 166. — Дв.,
№ 887.—Макс., № 890. — Hoff. H., № 7555. — Gold. C.,
p. 23.—Mart., p. 170.—St. II, p. 53.—St. I, № 657.—Pal.,
№ 2053.

Sagittaria natans. Mart., p. 170.

Корневище короткое, дающее изъ пазухи листьевъ побѣги; подводные листья линейные, плавающие, на концѣ округлые; надводные—на длинныхъ, 3-гранныхъ черешкахъ, стрѣловидные, конецъ листа и его лопасти длинно-заостренные, съ выдающимися продольными жилками; лопасти равны или нѣсколько длиннѣ пластинки листа; цветочный стебель



Sagittaria sagittifolia.



Butomus umbellatus.

3-гранный, несетъ клетчатое соцветіе, иногда внизу вѣтвистое; цветы сидятъ мтовками, б. ч. по 3; женскіе почти сидячіе, мужскіе—на длинныхъ цветоножкахъ; лепестки округлые, бѣлые, у основаніи темно-пурпуровые; плоды косообратно-яйцевидные, съ короткимъ носикомъ. Все растеніе бываетъ отъ 30 см. до 1 метра. Цветы съ $\frac{2}{2}$ июня, зрѣлыя съмена съ $\frac{2}{2}$ августа. По берегамъ рѣкъ и прудовъ, очень часто.

а. *Böllei* Aschr. et Gr. Растеніе во всѣхъ частяхъ менѣе крупное; пластинка листа и его лопасти линейно-ланцетныя, основаніе ихъ б. ч. не шире 5—6 мм. Круглое озеро близъ д. Рыбаки, Мос. у. (П. и С.).

13 сем. Butomáceae Gray.

Многолѣтнія болотныя растенія съ корневыми, 3-гранными листьями; околоцвѣтникъ 6-листный; 3 внутренніе листочка лепестковидные, окрашены, въсколько шире 3 наружныхъ, съ внутренней стороны окрашенныхъ, съ наружной — зеленыхъ; тычинокъ 9, изъ нихъ 6 сидятъ по 2 противъ наружныхъ листочковъ и 3 — по 1 противъ внутреннихъ; плодниковъ 6, сросшихся только основаніемъ, одногнѣздныхъ, многосѣменныхъ, съ сѣменами, сидящими на внутренней сторонѣ плодника; плодъ листовка: разверзающаеся по внутреннему краю; сѣмена безъ бѣлка, съ прямымъ зародышемъ. Только 1 родъ.

22. Butomus L.

57. *B. umbellátus* L. Бух. II, № 404.—Бух. I, № 375.—F. O. № 7, p. 102.—Пет. стр. 151.—Кауф. II, № 735.—Цин., № 1383. — Кауф. I, стр. 488.—Lind., p. 166.—Дв., № 411.—Макс., № 388.—Нотт. Н., № 3058.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 74.—St. I № 276.—Pal., № 811.

Корневище толстое, горизонтальное; все растеніе 60—150 см. выш., до половинны погруженное въ воду; листья очень длинныя, линейныя, 3-гранныя, у основанія желобчатыя; цвѣточный стебель длиннѣ листьевъ, цилиндрическій, выходитъ изъ пазухи листа, оканчивается ложнымъ зонтикомъ съ неравными лучами; обвертка зонтика 3-листная, листочки ея яйцевидно-ланцетные, перепончатые; цвѣты крупныя, блѣдно-розовыя, снаружи липоватыя; лепестки обратно-яйцевидные, коротко-заостренныя. Цвѣты съ $\frac{2}{2}$ июня, зрѣлыя сѣмена съ $\frac{2}{2}$ августа. По берегамъ рѣкъ и прудовъ, очень часто.

14 сем. Hydrocharitáceae Aschers.

Многолѣтнія водяныя растенія съ очередными или мутовчатыми листьями и выступающими надъ водой однополыми, двудомными цвѣтами; иногда стебель укороченъ, и тогда листья собраны въ розетку; цвѣты заключены сначала въ чехоль, имѣють 3-лиственную чашечку и 3-листный, въ почкосложеніи смятый вѣнчикъ; тычинокъ 3 или много, но въ кратномъ числѣ отъ 3, нѣкоторые тычинки часто не развиты (стаминодій); женскіе цвѣты съ нижней завязью, съ 3—6 двураздѣльными рыльцами и съ стаминодіями; завязь 3—6-гнѣздная, рѣдко вслѣдствіе недоразвитія перегородокъ 1-гнѣздная, съ большимъ числомъ сѣмепочекъ, сидящихъ на перегородкахъ и стѣнкахъ завязи; плодъ — иногда; сѣмена безъ бѣлка, съ прямымъ зародышемъ.

1. Листья сидятъ мутовками (по 3—4), прозрачныя, маленькія; цвѣты очень мелкіе (только женскіе).

Elodea Rich. et Mchx.

Листья расположены розетками, непрозрачные; цветы крупные (мужские и женские). 2.

2. Листья ланцетные, по краям колюче-зубчатые.

Stratiotes L.

Листья почковидно-сердцевидные, цельнокрайние.

Hydrocharis L.

23. Elodéa Rich. et Mchx.

Цветы двудомные и обоеполые (у нас только женские); чашечка с очень длинной нитевидной трубкой, 3-раздельная; венчик 3-раздельный; мужские цветы с 3—9 тычинками; женские—с 3 сидячими рыльцами и часто с 3 стаминодиями; завязь одногнёздная, малосъёмная, с прямыми съёмпочками.

58. *E. canadensis* Rich. et Mchx. Пет. Кр. III, стр. 63.—Ф. Б., № 102.—Пет., стр. 182.—Кауф. II, № 732.—Гор., № 75.—Цви., стр. 415.

Helodea Canadensis Aschr. et Gr.—*Udora canadensis* Nutt.—*Anacharis Alsinastrum* Bab.



Elodea canadensis.

Подводное растение, достигает 1 метра; стебель ветвистый, ломкий, у основания укореняющийся и пускающий длинные, плавающие корни; листья мутовчатые, по 3—4 в мутовке, продолговатые или линейно-ланцетные, коротко-заостренные, по краям с очень мелкими зубчиками; прилистники чешуйчатые, очень маленькие, скоро опадающие; цветы (у нас только женские) пазушные, на очень длинных цветоножках, выходящих из двураздельного пленчатого покрывала, концы покрывала заостренные. Цветы в концѣ юля и $\frac{1}{2}$ августа. По ручьям, рѣкамъ и прудамъ, часто. Противъ Бачманова, Клм. у., Бѣлые Колодези, Клм. у. (П.).—Рѣка Сестра близъ Впрева, близъ Сенежскаго озера, Клм. у., близъ Серпухова, заводъ р. Пахры близъ Дракина, Срп. у. (П.

и С.).—заводъ р. Учи близъ Пушкина, заводъ р. Клязмы близъ Хомутова, Вгр. у. Выково Брн. у. (С.).—Рѣка Лопасня, Срп. у. (П.).

latifolia Aschr. et Gr. Мутовки сближены; листья яйцевидные или овальные, с округлой тупой верхушкой. Мос.-Брянск. жел. дор. ст. Суково, въ р. Сѣтунь (Х.).

24. *Stratiotes L.*

Цветы двудомные, до распускания заключены в двулистный чехолъ; мужские—по нѣскольку въ одномъ чехлѣ, женские—по одному; ты-

чинокъ 11—15 съ линейными пыльниками, между ними много линейныхъ стаминодій; женскіе цвѣты имѣютъ 6 двураздѣльныхъ рылецъ и много стаминодій; плодъ продолговатый, 6-гнѣздный, сидитъ горизонтально или отклоненъ внизъ; сѣмена сидятъ на перегородкахъ.

59. *S. Aloides* L. Пет. Кр. III, стр. 63.—Бух. II, № 400.—Бух. I, № 371.—Ф. О., № 7, р. 102.—Пет., стр. 287.—Кауф. II, № 730.—Цин., № 1385.—Кауф. I, стр. 485.—Lind., р. 166.—Дв., № 923.—Макс., № 921.—Hoff. II, № 7761.—Gold. C., р. 23.—Mart., р. 178.—St. I, № 359.—Pal., № 1125.

Растеніе до половины погружено въ воду, пускаетъ короткіе побѣги; листья собраны розеткой, ярко-зеленые, нѣсколько мясистые, ломкіе, линейно-ланцетные, заостренные, на спинкѣ по килу и по краямъ съ колючими, острыми зубцами; цвѣты пазушные; цвѣтоносъ и обертка сплюснутые; листья обертки съ килемъ по краямъ мелко- и колюче-



Stratiotes Aloides.



Hydrocharis morsus ranae.

зубчатые; лепестки округло-обратно-яйцевидные, бѣлые, достигаютъ 2 см. У насъ, кажется, встрѣчаются только мужскія особи. Цвѣты съ половини іюня и весь июль. По болотамъ въ стоячихъ водахъ и по заводямъ рѣкъ. Кунцево, Симоновъ монастырь, Студенецъ, Щукрино, Братцово (К.).—Мп-хайловское. Пдл. у. (Б.).—Р. Уча близъ Пушкина, Быково Бри. у. (С.).—Кузьминки, Косино—Черное озеро (П.).

25. *Hydrócharis* L.

Цвѣты двудомные; женскіе—одиночные, съ однолистнымъ чѣхломъ; мужскіе—большую частью по 3, съ 2-листнымъ чѣхломъ; тычинокъ 12, сросшихся до половины нитями попарно; обѣ тычиночныя нити, сидящія противъ чашелистиковъ, несутъ по пыльнику; сидящія противъ лепестковъ имѣютъ пыльники только наружныя, внутреннія же безъ пыльниковъ (стаминодій); у женскихъ цвѣтовъ 6 двураздѣльныхъ рылецъ и

3 двураздѣльные стаминодія; плодъ овальный, 6-гнѣздный, съ сѣменами сидящими на перегородкахъ.

60. *H. morsus ranae* L. Пет. Кр. III, стр. 63. — Бух. II, № 401. — Бух. I, 372. — F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 203. — Кауф. II, № 731. — Цин., № 1384. — Кауф. I, стр. 485. — Lind., p. 166. — Ann. C. V, № 57. — Дв., № 922. — Макс., № 920. — Hoff. H., № 7758. — Gold. C., p. 23. — Mart., p. 178. — St. II, p. 55. — St. I, № 680.

Стебель нитевидный, плавающий, несетъ пучки листьевъ и длинныя, тонкія корни; листья плавающіе на поверхности воды, сердцевидно- или округло-почковидныя, съ очень глубокой выемкой у черешка, цѣльно-крайніе; главныя жилки ихъ отходятъ дугообразно отъ основанія пластинки по обѣ стороны средней жилки и пересѣкаются тонкими поперечными; прилистники широко-ланцетные, перепончатые; обертка у мужскихъ цвѣтовъ сплюснутая, содержитъ большею частью 3 цвѣтка; женскіе цвѣты одиночныя; лепестки округлыя, бѣлыя, до 12 мм. дл. Цвѣт. весь июль и начало августа. По прудамъ, канавамъ и стоячимъ водамъ, очень часто.

Порядокъ *Glumiflorae*.

15 сем. *Graminéae* Juss.

Травянистыя стебель узловатый, междоузлія часто полые, цилиндрическія или сплюснутыя; листья 2-рядныя, съ длинными, большею частью открытыми влагалищами; на мѣстѣ перехода влагалища въ пластинку большею частью находится пленчатый придатокъ, именуемый язычкомъ; соцвѣтіе колосовидное или метельчатое; цвѣты большею частью обоюполые, рѣже однополые, собраны въ одно—много-цвѣтковые колоски; колоски состоятъ изъ чешуекъ: двѣ наружныя чешуйки (рѣдко 1—0 или болѣе двухъ) безплодныя, называются кроющими чешуйками—наружной и внутренней; слѣдующія за ними: двѣ прицвѣтныя чешуйки—наружная и внутренняя; наружная большею частью съ срединной и часто боковыми жилками и внутренняя безъ срединной жилки и почти всегда съ 2 боковыми; прицвѣтныя чешуйки заключаютъ 2 или болѣе очень маленькія, нѣжныя чешуйки, такъ называемыя околоцвѣтныя; 3 тычинки (рѣдко 2) на длинныхъ тонкихъ нптяхъ, прикрѣпленныхъ къ срединѣ 2-гнѣздныхъ, колеблющихся пыльниковъ, по концамъ съ расходящимися гнѣздами; одинъ пестикъ съ 2 (очень рѣдко съ 1) столбиками, оканчивающимися б. ч. длинными перистыми рыльцами; завязь одногнѣздная; плодъ сухой съ приросшимъ къ сѣмени тонкимъ околоплодникомъ и рѣдко сросшійся съ прицвѣтными чешуйками (зерно); сѣмя съ мучнистымъ бѣлкомъ и зародышемъ, лежащимъ у основанія сѣмени, но не на срединной линіи, а на вѣвшей выуклой поверхности околоплодника, т.е. параллельно бѣлку; при прорастаніи сѣмедоля остается въ сѣмени.

Подсемейства.

Кроющихъ чешуекъ болѣе 2 (иногда ихъ нѣтъ, *Oryza*); колоски болѣею частью одноцвѣтковые, иногда въ колоскѣ еще 1 или 2 нижнихъ мужскихъ цвѣтка; сѣмя безъ желобка.

Panicoideae.

Кроющихъ чешуекъ 2 (у *Lolium* одна наружная, у *Nardus* ихъ нѣтъ); колоски 1—много-цвѣтковые, болѣею частью съ однимъ или нѣсколькими верхушечными мужскими цвѣтками или совершенно безъ верхушечныхъ (рѣдко мужскіе колоски нижніе: у *Arrhenatherum* и *Arundo*); ось колоска часто продолжена надъ послѣднимъ цвѣткомъ въ видѣ столбца.

*Poëoideae.*Подсемейство *Panicoideae.*

1. Колоски сжаты съ боковъ. 2.

Колоски сжаты со спинки. 3.

2. Колоски въ метелкѣ, обыкновенно опадаютъ вмѣстѣ съ прицвѣтными чешуйками; у нашихъ растений кроющихъ чешуекъ нѣтъ; внутренняя прицвѣтная чешуйка съ одной срединной жилкой; рыльце перистое, выставляется со стороны внутренней прицвѣтной чешуйки; зерно съ боковъ сплюснутое, плотно облегается наружной и внутренней прицвѣтной чешуйкой.

I. Oryzeae.

Кроющихъ чешуекъ 4; 2 верхнія маленькія, часто въ пазухахъ несутъ мужскіе цвѣты; прицвѣтныя чешуйки подъ конецъ кожистыя или хрящеватыя; внутренняя прицвѣтная чешуйка безъ срединной жилки; рыльца выступаютъ изъ верхушки цвѣтка; зерно не плотно облегается прицвѣтными чешуйками.

II. Phalarideae.

3. Прицвѣтныя чешуйки кожистыя или тонко-кожистыя; внутренней иногда нѣтъ; кроющія чешуйки травянистыя или слегка кожистыя, перепончатые или хрящеватыя; цвѣты однополые, однодомные, но въ разныхъ соцвѣтіяхъ.

III. Maydeae.

Прицвѣтныя чешуйки болѣею частью хрящеватыя, кожистыя или пергаментныя; наружная кроющая чешуйка много короче двухъ внутреннихъ, иногда ея нѣтъ; всѣ кроющія чешуйки много нѣжнѣе и меньше прицвѣтныхъ; зерно сплюснутое со спинки.

*IV. Paniceae.*Подсемейство *Poëoideae.*

1. Колоски сдавлены съ боковъ, на короткихъ ножкахъ, очередные, сидятъ 2 сближенными рядами; столбики длинныя; зерно безъ бороздки, сплюснуто съ боковъ, выпадаетъ вмѣстѣ съ прицвѣтной чешуйкой.

V. Chlorideae.

Колоски болѣею частью съ замѣтными ножками (рѣдко почти сидячіе), 6. или м. въ густыхъ метелкахъ, колосовидныхъ ме-

телкахъ съ двурядными супротивными вѣтвями или же въ колосьяхъ (рѣдко одностороннихъ—*Nardus*). 2.

2. Колоски одноцвѣтковые. 3.

Колоски 2—много-цвѣтковые (рѣдко одноцвѣтковые). 4.

3. Колоски въ поперечномъ разрѣзѣ округлые или слегка сжатые со спинки, собраны въ метелку; столбикъ короткій или его нѣтъ; рыльце перистое, высовывается съ боку колоска; зерно веретеновидное, съ внутренней стороны со слабымъ желобкомъ, плотно охватывается прицвѣтной чешуйкой. VI. *Stupeae*.

Колоски сплюснуты съ боковъ, съ осью колоска, часто продолженной въ видѣ столбца, собраны почти всегда въ метелку.

VII. *Agrostideae*.

4. Прицвѣтныя чешуйки большею частью короче кроющихъ, на спинкѣ большею частью съ колѣнчатой остью, рѣдко конецъ чешуйки переходитъ въ ость или совсѣмъ безъ ости, и тогда всегда съ 2 другъ противъ друга сидящими цвѣтками безъ продолженной осп колоска. 5.

Прицвѣтныя чешуйки длиннѣе кроющихъ; ось колоска почти всегда безъ волосковъ; прицвѣтныя чешуйки безъ ости или продолжены въ прямую ость (у *Festuca elatior* и *Bromus* ость выходитъ не изъ верхушки); столбики короткіе или ихъ нѣтъ; рыльце высовывается съ боку цвѣтка. X. *Festuceae*.

5. Верхняго цвѣтка въ колоскѣ часто нѣтъ; кроющія чешуйки большія, почти равны всему колоску; наружная прицвѣтная чешуйка на спинкѣ со скрученной, часто колѣнчатой остью; околоцвѣтныхъ чешуекъ 2; столбиковъ большею частью нѣтъ или очень короткіе; рыльца высовываются у основанія цвѣтка.

VIII. *Aveneae*.

Кроющія чешуйки короче нижняго цвѣтка; ось колосковъ покрыта длинными шелковистыми волосками, при созрѣваніи разламывается на членики и отпадаетъ вмѣстѣ съ цвѣткомъ; прицвѣтныя чешуйки безъ остей или съ конечными остями; завязь голая; столбики длинныя; рыльца высовываются съ боковъ колоска (часто пурпуровыя); зерно эллиптическое, въ разрѣзѣ круглое, свободное.

IX. *Arundineae*.

Обзоръ сем. Graminéae.

Подсемейство *Panicoideae*.

I. *Oryzeae*.

Родъ *Oryza*.

II. *Phaladideae*.

Роды: *Phalaris*, *Anthoxanthum*, *Hierochloa*.

III. *Maydeae*.

Родъ *Zea*.

IV. Paniceae.

Роды: *Panicum*, *Setaria*.*Подсемейство Poëoideae.*

V. Clorideae.

Родъ *Beckmannia*.

VI. Stupeae.

Роды: *Milium*, *Stipa*.

VII. Agrostideae.

Роды: *Nardus*, *Phleum*, *Alopecurus*, *Agrostis*, *Apera*, *Calamagrostis*.

VIII. Aveneae.

Роды: *Holcus*, *Arrhenatherum*, *Avena*, *Trisetum*, *Deschampsia*.

IX. Arundineae.

Роды: *Arundo*, *Molinia*.

X. Festuceae.

Роды: *Melica*, *Koeleria*, *Dactylis*, *Poa*, *Briza*, *Catabrosa*, *Glyceria*, *Atropis*, *Scolochloa*, *Festuca*, *Cynosurus*, *Bromus*, *Brachypodium*, *Triticum*. *Secale*, *Hordeum*, *Lolium*.

1. Всѣ цвѣты однополые; мужскіе собраны въ верхушечное кистистое соцвѣтіе, женскіе—початками въ пазухахъ листьевъ.

Zea.

Цвѣты обоеполые, рѣже однополые, но тогда одинъ и тотъ же колосокъ содержитъ тѣ и другіе цвѣты. 2.

2. Одиночный верхушечный колосъ: настоящій, т.-е. съ колосками или цвѣтами вполнѣ сидячими на цвѣточномъ стержнѣ, или ложный, т.-е. съ цвѣтами на очень короткихъ ножкахъ, замѣтныхъ только при отгибаніи колосковъ. 3.

Метелка съ вѣвистымъ цвѣточнымъ стержнемъ, боковые цвѣтоносы котораго несутъ колоски на длинныхъ ножкахъ и образуютъ настоящую метелку, или на короткихъ ножкахъ и составляютъ ложные колосы или кисти метельчато-расположенные. 15.

3. Колосъ широко-овальный; кроющія чешуйки съ широкимъ крылатымъ килемъ.

Phalaris.

Колосъ другой формы; кроющія чешуйки безъ крылатого кила. 4.

4. Всѣ колоски вполнѣ сидячіе на зубцахъ цвѣточного стержня, образуютъ настоящій одиночный колосъ, однобокій или 2 — многорядный. 5.

Всѣ колоски на очень короткихъ ножкахъ, замѣтныхъ лишь при отгибаніи колосковъ, образуютъ одинъ сложный колосъ или колосовидную метелку. 9.

5. Стебель безъ узловъ: колосъ однобокій, тонкій; кроющихъ чешуекъ нѣтъ.

Nardus.

Стебель съ узлами; колосъ 2—многорядный; кроющія чешуйки есть—одна или двѣ. 6.

6. Колоски обращены ребромъ къ стержню колоса, съ одною кроющею чешуйкой, кромѣ макушечнаго, о двухъ чешуйкахъ.

Lolium.

Колоски обращены плоской стороною къ стержню колоса; всѣ колоски съ 2 кроющими чешуйками. 7.

7. Колоски сидятъ по 3 вмѣстѣ: средній обоеполый, боковые—мужскіе или тоже обоеполые; наружныя кроющія чешуйки въ видѣ остей, расположены накрестъ къ внутреннимъ прицвѣтнымъ чешуйкамъ.

Hordeum.

Колоски одиночные, 2—многоцвѣтковые; кроющія чешуйки сидятъ противъ прицвѣтныхъ. 8.

8. Колоски 2-цвѣтковые съ третьимъ зачаточнымъ цвѣткомъ въ видѣ столбца; кроющія чешуйки не похожи на прицвѣтныя.

Secale.

Колоски 3—многоцвѣтковые; кроющія чешуйки похожи на прицвѣтныя.

Triticum.

9. Колоски длинныя, узко-ланцетныя или почти цилиндрическіе, многоцвѣтковые, образуютъ сжатый колосъ; колоски на очень короткихъ ножкахъ.

Brachypodium.

Колоски мелкіе, 1—5-цвѣтковые, скучены въ густой сложный колосъ. 10.

10. Колоски двухъ родовъ: безполые, состоящіе изъ линейно-ланцетныхъ чешуекъ, расположенныхъ гребенчато-перисто-двурядно. и плодущихъ, 3—5-цвѣтковыхъ.

Cynosurus.

Колоски однородные. 11.

11. Колоски на короткихъ ножкахъ, съ длинными острошершавыми щетинками.

Setaria.

Колоски на ножкахъ, безъ щетинокъ. 12.

12. Колосъ плотный, частый, ровный, цилиндрическій. 13.

Колосъ рѣдкій, 6. или м. лопастной, часто внизу прерванный. 14.

13. Колосъ мягкій, гладкій остистый; кроющія чешуйки при основаніи сросшіяся, прицвѣтная чешуйка одна—наружная, свернутая; столбики 6. ч. сросшіеся.

Alopecurus.

Колосъ жесткій, шершавый; кроющія чешуйки не сросшіяся; прицвѣтныхъ чешуекъ 2; столбики не сросшіеся. *Phleum.*

14. Колоски съ однимъ вполне развитымъ цвѣткомъ; между кроющими и прицвѣтными чешуйками есть еще 2 чешуйки съ остями, одна ость выдается изъ цвѣтка; тычинокъ 2.

Anthoranthum.

Колоски 2—4-цвѣтковые; остей нѣтъ; только кроющія и прицвѣтныя чешуйки; тычинокъ 3.

Koeleria.

15. Соцветіе состоитъ изъ 2—5 колосовидныхъ вѣтвей, пальчато расположенныхъ на верхушкѣ стебля. *Panicum*.
Соцветіе лное. 16.
16. Вѣтви метелки, обыкновенно попеременно расположенны по цвѣточному стержню, несутъ на короткихъ ножкахъ много колосковъ, скученныхъ пучками или ложными колосьями (колосовидными кистями), и образуютъ однобокое лопастное соцветіе или лопастной ложный колосъ. 17.
Вѣтви метелки, обыкновенно мутовчато-расположенные по цвѣточному стержню, несутъ на своихъ развѣтвленіяхъ колоски, не скученные пучками, а одиночные, на 6. или м. длинныхъ ножкахъ, и образуютъ развѣсистую или сжатую метелку. 20.
17. Колоски только съ 1 обоимъ цвѣткомъ, другой цвѣтокъ въ зачаточномъ видѣ, или онъ мужской. 18.
Колоски съ 2—5 обоимъ цвѣтками. 19.
18. Колоски сжатые съ боковъ, у основанія прицвѣтныхъ чешуекъ по 2 линейно-шиловидныхъ волосистыхъ чешуекъ (недоразвитые цвѣты). *Phalaris*.
Колоски нѣсколько сжаты со спинки; прицвѣтныя чешуйки кожистыя, безъ волосистыхъ чешуекъ у основанія. *Panicum*.
19. Колоски скучены пучками и образуютъ лопастную однобокую метелку; чешуйки сплюснутыя, клеватые. *Dactylis*.
Колоски на очень короткихъ ножкахъ или отчасти сидячіе, собраны 2-рядными колосьями, расположенными въ свою очередь длиннымъ колосовиднымъ или при основаніи метельчато-вѣтвистымъ соцветіемъ: кроющія чешуйки вздутыя, кожистыя. *Beckmannia*.
20. Колоски съ длинными волосками, превышающими ширину чешуекъ. 21.
Колоски голые или ось ихъ подъ прицвѣтными чешуйками покрыта короткими волосками, не достигающими ширины чешуекъ. 22.
21. Колоски 3—7-цвѣтковые, нижній цвѣтокъ безъ волосковъ, мужской; остальные съ волосками, обоимъ. *Arundo*.
Колоски одноцвѣтковые, иногда съ зачаточнымъ вторымъ цвѣткомъ въ видѣ волосистаго столбца. *Calamagrostis*.
22. Колоски одноцвѣтковые, безъ кроющихъ чешуекъ; прицвѣтныя чешуйки сильно сплюснуты, по килу съ длинными щетинками. *Oryza*.
Колоски 1—много-цвѣтковые, съ кроющими чешуйками. 23.
23. Колоски сплюснутые со спинки; рыльца на очень длинныхъ столбикахъ. *Panicum*.
Колоски сплюснутые съ боковъ; рыльца сидячія или на короткихъ столбикахъ. 24.

24. Наружныя прицвѣтныя чешуйки оканчиваются длинной остью, въ верхней части перисто-волосистой, во много разъ превышающей чешуйку. *Stipa.*

Прицвѣтныя чешуйки безъ ости или съ остью, но пныхъ размѣровъ и формы. 25.

25. Наружная прицвѣтная чешуйка оканчивается 3 тонкими зубцами, изъ которыхъ средній иногда походить на ость.

Scolochloa.

Наружная прицвѣтная чешуйка цѣльная или двузубчатая. 26.

26. Колоски 1—3-цвѣтковые, длиннѣе 5 мм., съ булавовиднымъ зачаткомъ недоразвитого цвѣтка. *Melica.*

Колоски безъ булавовиднаго зачатка, если же онъ есть, то колоски не длиннѣе 3 мм. 27.

27. Колоски одноцвѣтковые. 28.

Колоски 2—много-цвѣтковые (иногда въ метелкѣ бываютъ и одноцвѣтковые колоски вмѣстѣ съ 2-цвѣтковыми, или же въ двуцвѣтковыхъ колоскахъ одинъ цвѣтокъ обоеполый, другой мужской). 30.

28. Колоски вздутые, мало сплюснутые, на спинкѣ округлые; чешуйки хрящеватыя. *Milium.*

Колоски сжатые съ боковъ, съ килемъ на спинкѣ; чешуйки перепончатыя, не хрящеватыя. 29.

29. Кроющія чешуйки равны прицвѣтнымъ или длиннѣе; если есть ость, то она не превышаетъ чешуйки болѣе чѣмъ вдвое.

Agrostis.

Кроющія чешуйки короче прицвѣтныхъ; ость всегда есть, и она въ 3—4 раза длиннѣе чешуекъ. *Apera.*

30. Колоски тусклые, густо покрыты отстоящими волосками.

Holcus.

Колоски б. ч. лоснящіеся, если же покрыты пушкомъ, то рѣдкимъ и прижатымъ. 31.

31. Прицвѣтныя чешуйки съ остями, выходящими со спинки. 32. Прицвѣтныя чешуйки безъ остей или съ остями, выходящими изъ верхушки чешуйки между зубчиками, или чешуйки прямо переходить въ ость. 35.

32. Наружная прицвѣтная чешуйка на верхушкѣ усѣченная и по усѣченному краю зубчатая; колоски мелкіе, двуцвѣтковые.

Deschampsia.

Наружная прицвѣтная чешуйка не усѣченная или двузубчатая; колоски б. ч. крупные, 2—много-цвѣтковые. 33.

33. Изъ 2 цвѣтковъ, сближенныхъ въ колоскѣ, нижній — мужской, съ длинною колѣнчатой остью, верхній — обоеполый, безъ ости, или съ короткою прямою остью. *Arrhenatherum.*

Все цвѣты въ колоскѣ обоеполые, раздвинуты по оси колоска, обыкновенно на спинкѣ наружной прицвѣтной чешуйки со скрученною остью. 34.

34. Колоски крупные, длиннѣе 1 см., на спинкѣ округлые; завязь на верхушкѣ пушистая; зерно съ желобкомъ, отваливается вмѣстѣ съ охватывающей его прицвѣтной чешуйкой. *Avena*.

Колоски мелкіе, не достигаютъ 1 см., на спинкѣ съ килемъ; завязь голая; зерно безъ желобка, выпадаетъ безъ чешуйки.

Trisetum.

35. Кроющія чешуйки длиннѣе прицвѣтныхъ. *Hierochloa*.

Кроющія чешуйки равны прицвѣтнымъ или короче ихъ. 36.

36. Колоски почти сердцевидные, шпрокіе; кроющія чешуйки сильно выпуклыя. *Briza*.

Колоски продолговатые или иногда почти цилиндрическіе; кроющія чешуйки слабо выпуклыя. 37.

37. Пыльники, рыльца и колоски темно-фіолетовые или съ фіолетовымъ отливомъ; колоски очень маленькіе, съ булавовиднымъ придаткомъ. *Molinia*.

Пыльники и рыльца не окрашены въ фіолетовый цвѣтъ; булавовиднаго придатка нѣтъ. 38.

38. Кроющія чешуйки много короче прицвѣтныхъ: наружная много короче внутренней, на верхушкѣ выемчатая; внутренняя много шире наружной, на верхушкѣ округлая или съ волнистымъ выемчатымъ краемъ. *Catabrosa*.

Кроющія чешуйки по своей формѣ мало разнятся между собой, хотя и бываютъ неравныя. 39.

39. Колоски на спинкѣ съ острымъ килемъ; у основанія прицвѣтной чешуйки б. ч. шерстистый пушокъ. *Poa*.

Колоски на спинкѣ округлые, иногда средняя жилка выдается наподобіе кия, но все-таки самъ колосокъ не килеватый и безъ шерстистаго пушка. 40.

40. Кроющія чешуйки тупыя. 41.

Кроющія чешуйки острые. 42.

41. Наружныя прицвѣтныя чешуйки съ 5—9 ясно выдающимися жилками; околоцвѣтныя чешуйки мясистыя, сросшіяся; листовыя влагалища по всей длинѣ закрытыя. *Glyceria*.

Наружныя прицвѣтныя чешуйки съ 5 едва замѣтными жилками; околоцвѣтныя чешуйки не сросшіяся; листовыя влагалища по всей длинѣ открытыя. *Atropis*.

42. Наружныя прицвѣтныя чешуйки на верхушкѣ 2-зубчатые и часто съ остью между зубцовъ; околоцвѣтныя чешуйки обратно-яйцевидныя, свободныя. *Bromus*.


Наружныя прицвѣтныя чешуйки заостренныя, но не 2-зубчатые и часто переходятъ въ ость; околоцвѣтныя чешуйки двулосастныя съ неравными лопастями и часто сросшіяся. *Festuca*.

26. *Oryza* Tourn.

Колоски одноцвѣтковые, безъ кроющихъ чешуекъ; прицвѣтныя чешуйки равной длины, сплюснутыя; наружная—съ 5 жилками, изъ которыхъ средняя мало замѣтная, по килу шиловато-рѣбчатая; внутренняя—съ 3 жилками; зерно обратно-яйцевидное, сплюснутое съ боковъ.

61. *O. clandestina* A. Br. Пет. Кр. III, стр. 106.

Leersia oryzoides Sw. Бух. II, № 448.—Ф. Б., № 115.—Бух. I, № 408.—Пет., стр. 210.—Кауф. II, № 832.—Гор., № 51.—Цин., № 1700.—Кауф. I, стр. 552.



Р. Протва близъ Ольгина, Мож. у. (Ф. Б.).—Р. Нахра противъ д. Конакова и Юрьевское озеро, Идл. у. (В.).—Быково, Брн. у. (Куль.).—По песчаному берегу Оки у Лужьяковъ, Срп. у. (П. и Х.).

27. *Phalaris* L.

Колоски одноцвѣтковые, собраны яйцевиднымъ колосомъ или лопчатой кистью, и тогда у основанія каждой вѣтви сидитъ еще маленькая вѣточка; кроющія чешуйки равной длины; за кроющими сидятъ еще 2 чешуйки—это 2 недоразвитыхъ цвѣтка; потомъ 2 прицвѣтныя съ крылатымъ килемъ или безъ него; околоцвѣтныхъ чешуекъ 2; тычинокъ 3.

62. *P. canariensis* L. Ф. О. № 7, p. 102.—Пет., стр. 237.—Кауф. II, № 821.—Цин., стр. 491.—Кауф. I, стр. 545.—Дв., № 66.—Макс., № 271.—Mart., p. 12.—Ad., p. 29.—St. II, p. 7.—St. I, № 36.—Pal., № 133.

Стебель 15—60 см., простой или у основанія развѣтвленный, прямостоящій или колѣнчато-приподнимающійся, голый; листья шерохова-

тые, широкіе, ярко-зеленые, переходить въ длинныя, вздутыя влагалища особенно верхній; язычокъ длинный, усѣченный; колосъ овальный или продолговатый, плотный; колоски зеленовато-бѣлые, вдоль кия и близъ краевъ съ зелеными полосками, сплюснутые, спереди слегка вышуклые,



Phalaris canariensis.



Phalaris arundinacea.

сзади вогнутые, эллиптическіе; обѣ кроющія чешуйки коротко-заостренныя, съ килемъ и по краямъ съ 1 жилкой; прицвѣтныя чешуйки покрыты прижатыми волосками, наружная—вдвое длиннѣе обѣихъ узко-ланцетныхъ чешуекъ зачаточнаго цвѣтка. Цвѣты въ августѣ. Разводится, около жилья дичаетъ.

63. *P. arundinacea* L. Пет. Кр. III, стр. 103.—Бух. II, № 441.—Бух. I, № 409.—F. O. № 7, p. 102.—Кауф. II, № 822.—Кауф. I, стр. 545.—Ann. C. IV, № 63.—Дв., № 67.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 13.—Hoff., p. 5.—Ad., p. 29—30.

Digraphis arundinacea Trin. Пет., стр. 179.—Цик., № 1688.—Макс., № 72.

Baldingera arundinacea Dumor.—*B. colorata* Fl. Wett.

Корневище даетъ побѣги; стебель 1—2 метра, у основанія часто развѣтвленный, прямостоящій; листья широкіе, остро-шершавые, сизо-зеленые; язычокъ длинный, острый; метелка вѣтвистая, продолговатая, послѣ цвѣтенія сжатая, въ тѣнистыхъ мѣстахъ желто-зеленая, на солнцѣ съ пурпуровымъ или фіолетовымъ оттѣнкомъ; колоски сидятъ сближенно, почти ланцато; кроющія чешуйки ланцетныя, съ 3 жилками, вдоль жилки рѣснитчатые; слѣдующія чешуйки маленькія, линейно-шпоровидныя, волосистыя; прицвѣтныя — яйцевидныя, лоснящіяся, съ слабо-рѣснитчатымъ килемъ. Цвѣты съ $\frac{2}{2}$ іюня и $\frac{1}{2}$ іюля. По берегамъ рѣкъ, прудовъ и по кавамамъ. Ивановково, Лужники (К.). — Раменки, Воробьевы горы; Машино на берегу р. Шеринки, Дмит. у. (П.). — Михайловское, Пдл. у. (В.). — Царицыно, Мытищи (С.). — Серебряный боръ близъ Хорошова; Вязки, Брян. у. (X.).

fol. variegatis.

Phalaris picta L. Дв., № 67.—Hoff. Н., № 506.—Mart., p. 13.

Съ бѣлыми продольными полосками на листьяхъ. Разводится по садамъ.

28. Anthoxánthum L.

Колоски только объ одномъ полномъ цвѣткѣ; кроющія чешуйки неравной длины, наружная объ 1 жилкѣ, вдвое короче внутренней съ 3 жилками; слѣдующія чешуйки короче кроющихъ, на верхушкѣ двуплодныя, покрыты прижатыми волосами, съ остями; ость наружной чешуйки выходитъ близъ основанія и выставляется изъ колоска; ость внутренней выходитъ близъ середины спинки и б. ч. не выставляется изъ колоска; прицвѣтныя чешуйки самыя маленькія, тупыя, съ одной жилкой; околоцвѣтныхъ чешуекъ нѣтъ; тычинокъ 2; рыльца очень длинныя, выставляются изъ колоска.

64. A. odorátum L. Пет. Кр. III, стр. 103.—Бух. II, № 442.—Бух. I, № 410.—Г. О. № 7, 102.—Пет., стр. 137.—Кауф. II, № 824.—Цин., № 1658.—Кауф. I, стр. 547.—Lind., p. 178.—Ann. С. III, № 266.—Дв., № 45.—Макс., № 43.—Hoff. Н., № 296.—Gold. С., p. 17.—Mart., p. 8.—Hoff., № 244.—Ad., p. 15.—St. II, p. 5.—St. I, № 23.—Pal., № 81.

Образуетъ дерновники; стебли прямостоящіе или у основанія при-



Anthoxanthum odoratum.

поднимающіеся, голые, 20—50 см.; листья 2—4 мм. шир., у основанія на верхней сторонѣ съ рѣсничками, очень рѣдко съ обѣихъ сторонъ разсѣяннo-волосистые, съ влагалищами б. или м. волосистыми; язычокъ довольно длинный, усѣченный, иногда вдоль разорванный на части; колосовидная метелка имѣетъ наибольшую ширину нѣсколько ниже середины, сужена къ обоимъ концамъ; двѣ кроющія чешуйки голыя, заостренныя, только вдоль жилки коротко рѣсничкатыя; слѣдующія 2 несутъ ость, волосистыя, немного длиннѣе наружной прицвѣтной чешуйки; наружная прицвѣтная чешуйка округлая. Цвѣты съ $\frac{1}{2}$ мая до половины іюня. По лугамъ и кустарникамъ, часто.

α. villosum Loisel. Пет. Кр. III, стр. 103.

Кроющія чешуйки мохнатыя. Близъ Иванькова (К.).

29. Hieróchloa Gmel.

Колоски 3-цвѣтковые, 2 боковыхъ—мужскіе о 3 тычинкахъ, средний—обоеполюй о 2 тычинкахъ; кроющія чешуйки длиннѣе прицвѣтныхъ, заостренныя, съ клемъ и 3 жилками; прицвѣтныя чешуйки у

мужскихъ цвѣтовъ по краямъ рѣсничатыя, съ короткой остью, выходящей близъ середины или у самой верхушки; внутренняя прицвѣтная чешуйка только съ 2 боковыми жилками, у обоеполаго цвѣтка наружная съ 5 жилками, внутренняя — съ 1 жилкой; околоцвѣтныхъ чешуекъ 2.

65. *H. odorata* Wahlb. Пет. Кр., стр. 103. — Бух. II, стр. 42. — Ф. О. № 7, р. 102. — Кауф. II, № 823. — Кауф. I, стр. 546. — Апп. С. II, № 163.

Hierochloa borealis Röm. et Schult. Пет., стр. 201. — Цан., № 1657. — Дв., № 94.

Holcus odoratus L. Макс., № 85. — Март., р. 17. — Ст. II, р. 56.

Holcus borealis Schrad. Hoff. N., № 7844. — Gold. C., р. 17. — Gold. Sp., р. 140.

Корневище ползучее, даетъ цвѣтушіе стебли и пучки листьевъ; стебли 30—60 см., голые, прямостоящіе, съ листьями только въ нижней своей половинѣ; листья шероховатые, съ верхней стороны зеленые, съ нижней — сѣро-зеленые; язычокъ длинный, острый; метелка въ очертаніи яйцевидная, съ растопыренными вѣтвями, сидящими въ нижней части по 3, въ верхней — по 2; цвѣтоносы пзвильстые; цвѣтоножки подъ колосками утолщенные, голыя, рѣже подъ колоскомъ съ нѣсколькими маленькими, прижатыми щетинками; кроющія чешуйки желтоватыя, лоснящіяся, съ перепончатымъ краемъ; наружная прицвѣтная чешуйка темно-бурая, по краямъ рѣсничатая; у мужскихъ цвѣтовъ близъ верхушки чешуйки съ короткой остью, у обоеполыхъ — безъ остей; растение послѣ высыханія пахучее. Цвѣты въ маѣ, рѣже въ $\frac{1}{2}$ іюня. По болотистымъ лугамъ, рѣже на пескахъ. Раменское, Брн. у. (К.). — Вутырское болото (А.). — Перово, Кусково; Архангельское, Звн. у. (Мар.). — Мытищи — болото; близъ Никифорова, Срп. у., — на пескахъ (С.). — Лужки, Срп. у.; Перерва, Никольское, Флип (П.). — Косино; Бѣлые Колодези, Кзм. у., Ново-Удѣльное, Брн. у. (Х.).



Hierochloa odorata.

* *Zea* L.

Стебель плотный; цвѣты однополые, однодомные; мужскіе — колючіе, въ развѣсистой метелкѣ съ длинными колосовидными вѣтвями; колоски 1—2-цвѣтковые, сидятъ по 2, одинъ сидячій, другой на ножкѣ, состоитъ изъ 2 травянистыхъ кроющихъ чешуекъ, 2 перепончатыхъ прицвѣтныхъ и 2 почти квадратныхъ околоцвѣтныхъ чешуекъ; женскіе цвѣты въ початкахъ, сидящихъ въ пазухахъ листьевъ и заключенныхъ во влагалищные листья; початокъ съ мясистымъ стержнемъ, на которомъ сидятъ косыми рядами цвѣты; женскіе колоски съ верхушечными развитыми и боковыми неразвитыми цвѣтками, съ кроющими и прицвѣтными чешуйками, но безъ околоцвѣтныхъ чешуекъ; рыльце длинное, нитевидное, на верхушкѣ двулопастное; зерно округлое, неравномѣрно сжатое съ боковъ.

* **Z. Mays L.** Пет. Кр. III, стр. 102.—Пет., стр. 309.—Hoff. H., № 7403.—St. II, p. 52.—Pal. № 2004.

Стебель прямостоящий, 1 — 3 метра, б. ч. простой; листья широко-ланцетные, 5 — 12 см. шир., плоские, съ нижней стороны голые, гладкіе, съ верхней — слабо-пушистыя, б. пня м. шероховатыя, по краямъ слегка волнистыя, съ короткими рѣсничками; влагалища гладкія; язычокъ короткій, до 5 мм. дл., разорванный; мужскіе колоски продолговато-яйцевидные, заостренные, 6—8 мм. дл. и 3 мм. шир.; кроющія чешуйки ихъ продолговато-ланцетныя, острые, со многими жилками, пушистыя; женскіе колоски б. ч. короткіе; обѣ кроющія чешуйки мясистыя съ рѣсничками. Цвѣты въ іюлѣ. Разводятся по огородамъ и садамъ.

30. *Panicum L.*

Колоски нѣсколько сжаты со стороны спинки, съ однимъ развитымъ и однимъ мужскимъ или зачаточнымъ цвѣткомъ; кроющія чешуйки маленькія, иногда одна изъ нихъ въ зачаточномъ видѣ; за ними слѣ-



Zea Mays.



Panicum lineare.

дуетъ одна чешуйка съ зачаточнымъ или мужскимъ цвѣткомъ и потомъ уже прицвѣтными кожистыя чешуйки плодущаго цвѣтка; околоцвѣтныхъ чешуекъ 2; тычинокъ 3.

1. Влагалища покрыты длинными отстоящими волосками.

P. miliaceum L.

Влагалища голыя. 2.

2. Ложные колосыя расположены пальчато; язычокъ очень короткій, 1—2 мм. дл.

P. lineare Krock.

Метелка; вѣтви ея расположены не пальчато; язычка нѣтъ.

P. crus-galli L.

66. *P. lineare* Krock. Пет. Кр. III, стр. 101.

Panicum glabrum Gaud. Пет., стр. 179.—Кауф. II, № 817.—Гор., № 49.—Цин., № 1703.—Рупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 543.

Panicum arenarium M. B. Макс., № 70.

Digitaria filiformis Koeler.—*Digitaria glabra* Roem. et Schult.—*Panicum filiforme* Geke.

Стебли растопыренные, лежащие или колѣнчато-приподнимающиеся. 5—50 см., сидят пучками; листья ланцетные, съ голыми влагалищами, голые, рѣже у основанія съ маленькимъ пучкомъ волосковъ; язычокъ очень маленькій, 1—2 мм. дл., усѣченный; ложные колосья расположены пальчато, по 2—6. ося ихъ покрыты короткими щетинками; колоски яйцевидно-эллиптические, пушистые; кроющей чешуйки пѣть или она въ зачаточномъ видѣ, нижняя прицвѣтная чешуйка равна длиною колоску, третья чешуйка б. ч. о 5 жилкахъ; колоски зеленые или фиолетовые. Плоды $\frac{1}{2}$ августа. По берегамъ рѣкъ на пескахъ. С. Архангельское, Звн. у. (Ген.).—Берегъ Клязьмы—Павловскій посадъ (К.).—Берегъ Москвы р.—Николо-Угрешскій монастырь (Л.).—Серпуховъ—Владычній монастырь (Г.).—Бѣлые Колодези. Кля. у. (П.).—Лужки, Срп. у. (Гей.).—Близъ ст. Ока (С.).—Берегъ Оки противъ с. Лужники, Срп. у. (П. и Х.).

67. *P. crus-galli* L. Вух. II, № 440.—F. O. № 7, p. 102.—Кауф. II, № 818.—Кауф. I, стр. 544.—Lind., p. 182.—Ann. C. I, № 57.—Дв., № 70.—Макс., № 67.—Hoff. H., № 7822.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 12.—Hoff., № 2303.—St. II, p. 7.—St. I, № 40.

Panicum muticum. Mart., p. 12.

Echinochloa Crus-galli P. B. Пет., стр. 180.—Цин., № 1707.

Стебли одиночные или пучками, прямостоящие или колѣнчато-приподнимающиеся, 10—100 см., гладкіе, только въ колосѣ остро-шершавые;



Panicum crus-galli.



Panicum crus-galli v. *longisetum*.

листья широко-линейные. 2—4 мм. шир., съ выдающимися жилками. близъ верхушки шероховатые, по краямъ часто волнистые. съ длинными, го-

лыми влагалищами, верхнее влагалище часто вздутое; язычка нѣтъ, часто вмѣсто него буроватая лямбда; метелка до 20 см. дл., съ вверхъ торчащими вѣтвями; колоски около 3 мм. дл., яйцевидно-эллиптические, покрыты короткими, жесткими щетинками; кроющая чешуйка широко-яйцевидная, острая, о 3 жилкахъ, много короче прицвѣтной о 5 жилкахъ; третья чешуйка о 7 жилкахъ, равна второй. Цвѣты $\frac{2}{3}$ июня, зрѣлыя сѣмена во $\frac{2}{2}$ августа. По огородамъ и по берегамъ рѣкъ на пескахъ. Мячково, Брн. у. (К.).—Быково, Брн. у. (С.).—Лужняки у Москвы р. (П.).

a. longisetum Döll.

Panicum Crus-galli L. *aristata* Rehb. Бух. II, № 440.—Бух. I, № 407.—Кауф. II, стр. 568.—Кауф. I, стр. 544.—Mart., p. 12.
Echinochloa Crus-galli P. B. *aristata* Rehb. Цин., стр. 496.

Третья чешуйка съ очень длинной остью. Михайловскій паркъ, Пдл. у., по сырымъ дорожкамъ (Б.).—Близъ Лужковъ, Срп. у. (С.).—Невѣрово, въ устьѣ р. Медвѣдки, Кзм. у. (Х.).

- * *P. miliaceum* L. Пет. Кр. III, 102.—Пет., стр. 234.—Кауф. II, стр. 568.—Цин., стр. 495.—Кауф. I, стр. 544.—Lind., p. 182.—Дв., № 71.—Макс., № 70.—Hoff. N., № 7834.—Mart., p. 12.—St. II, p. 7.—St. I, № 41.—Pal., № 132.

Стебли прямостоящіе, 20 — 100 см., одиночные или пучками, часто основаніе ихъ приподнимающееся; листья широко-линейные, по краямъ шероховатые, свѣтло-зеленые; влагалища длинныя, покрыты длинными, отстоящими волосками; язычокъ короткій, съ пояскомъ длинныхъ волосковъ; кисть большая, до 20 см. дл., сперва прямостоящая, сжатая, потомъ поникающая, вѣточки ея покрыты короткими щетинками, отчего остро-шершавыя; колоски около 3 мм. дл., на длинныхъ ножкахъ, яйцевидно-эллиптические, заостренные; кроющія чешуйки заостренные, съ выдающимися жилками; нижняя прицвѣтная чешуйка закрываетъ $\frac{2}{3}$ второй, съ 5 жилками; вторая со многими жилками, столь же длинная, какъ и третья; зерно оранжевое или желтое. Цвѣты съ $\frac{2}{2}$ июня, зрѣлыя сѣмена съ $\frac{2}{2}$ августа. Разводится, иногда дичаетъ.



Panicum miliaceum.

31. *Setaria* P. B.

Колоски маленькіе, сплюснутые со спинки, одноцвѣтковые и съ зачаткомъ другого цвѣтка въ видѣ одной чешуйки, сидятъ на короткихъ ножкахъ, снабженныхъ пучкомъ длинныхъ, остро-шершавыхъ щетинокъ; кроющія чешуйки очень неравной длины: наружная много короче внутренней; прицвѣтныя чешуйки хрящеватыя, съ ясными жилками; околоцвѣтныя чешуйки усѣченные; рыльца на длинныхъ столбикахъ.

68. *S. viridis* P. B. Пет. Кр. III, стр. 102.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 278.—Кауф. II, № 819.—Цин., № 1704.—Кауф. I, стр. 544.—Lind., p. 182.—Ann. C. I, № 58.
Panicum viride L. Дв., № 68.—Макс., № 68.—Хоф. Н., № 7840.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 12.—Хоф., № 2314.—St. II, p. 7.—St. I, № 38.

Стебель 5—80 см., лежащий или приподнимающийся, часто изогнутый; колѣнчато, гладкій, только подъ колосомъ шероховатый; листья по краямъ остро-шершавые, часто слегка волнистые, у основанія нѣсколько уже, постепенно заостренные къ верхушкѣ; влагалища голыя, съ ясными продольными жилками; вмѣсто язычка сидятъ короткіе, вверхъ торчащіе волоски; все растеніе зеленое; колосъ цилиндрическій, очень рѣдко у основанія прерванный; щетинки шершавыя б. ч. длиннѣе колосковъ; колоски продолговато-эллиптические; прицвѣтныя чешуйки гладкія, одинаковой длины съ чешуйкой безполога цвѣтка; наружная кроющая чешуйка втрое короче внутренней и чешуйки безполога цвѣтка. Цвѣты во $\frac{2}{2}$ іюня, зрѣлыя сѣмена во $\frac{2}{2}$ іюля. По песчанымъ мѣстамъ, около рѣкъ и по откосамъ желѣзно-дорожныхъ насыпей. Архангельское, Звн. у., Симоновъ монастырь (К.).—Мытищи (С.).—Лужники; Хотѣичи на р. Перской, Вгр. у., Протопоново, Км. у. (П.).—Успенское, Звн. у., Михнево, Брн. у. (X.).



Setaria viridis.

69. *S. glauca* P. B. Пет. Кр. III, стр. 102.—Пет., стр. 278.—Кауф. II, № 820.—Цин., № 1705.—Рупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 544.
Panicum glaucum L. Дв., № 69.—Макс., № 69.—Хоф. Н., № 7829.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 12.—Хоф., № 2306.—St. II, p. 7.—St. I, № 39.

Стебель 5—50 см., прямостоящій, приподнимающийся или лежащій, гладкій, только подъ колосомъ слегка шероховатый; все растеніе сизое; листья съ верхней стороны шероховатые, съ нижней почти гладкіе, у основанія по краямъ съ длинными волосками; вмѣсто язычка короткія, вверхъ торчащія щетинки; колосъ цилиндрическій или почти овальный, густой; щетинки многочисленные, остро-шершавыя, подъ конецъ желтыя или ржаво-желтыя; колоски яйцевидные; прицвѣтныя чешуйки съ ясными поперечными морщинками, вдвое длиннѣе чешуекъ безполога цвѣтка; наружная кроющая чешуйка вдвое короче колоска, внутренняя яйцевидная, немного длиннѣе половины колоска, тупая, о 3 жилкахъ. Цвѣты въ іюль. По паровымъ котламъ и дорогамъ. Невѣ-



Setaria glauca.

рово, Клм. у., Карапчеево, Протопопово, Клм. у. (П.).—Свиблоро (К.).—Воробьевы горы (Гольдб.).—Михево, Брн. у. (Х.).—Быково, Брн. у. (Куль.).

32. Beckmannia Host.

Колоски сплюснутые съ боковъ, тупые, 3-цвѣтковые; боковые цвѣтки обоеполые, срединный на ножкѣ, мужской; кроющія чешуйки равной длины, вздутыя, хрящеватыя; прицвѣтныя—съ 5 слабо замѣтными жилками, съ килемъ, у нижняго цвѣтка съ короткимъ остроконечіемъ, у верхняго безъ остроконечія; околоцвѣтныхъ чешуекъ 2, слегка яйцевидныхъ, зубчатыхъ; тычинокъ 3.

70. *B. eruciformis* Host. Пет. Кр. III, стр. 106. — Бух. II, № 447. — Ф. Б., № 114. — Пет., стр. 145. — Кауф. II, № 831. — Цин., № 1687. — Кауф. I, стр. 551. — Lind., p. 180. — Ann. C. III, № 265. — Дв., № 77. — Макс., № 101. — Mart., p. 14. — Hoff. H., № 542. — Gold. C., p. 17. — Hoff., № 1117. — Ad., p. 33.

Phalaris eruciformis L. Дв., № 77. — Макс., № 101. — Mart., p. 14. — St. I, № 37. *Cynosurus eruciformis* (Georgi). Hoff., № 1117. — St. II, p. 8.



Beckmannia eruciformis.

Корневище даетъ короткіе побѣги; стебли высокіе, 50 — 150 см., основаніе ихъ часто утолщено, съ остатками прошлогоднихъ листьевъ; листья широко-линейные, ярко-зеленые, 4—10 мм. шир., по краямъ шероховатые; язычокъ длинный, острый; соцветіе 10—30 см. двурядный, сложный колосъ у основанія часто съ 2—3 вѣточками; колоски 3 мм. дл.; кроющія чешуйки сильно выпуклыя и шероховатыя на спинкѣ, зеленыя, съ широкими бѣлыми краями, быстро переходятъ въ короткое цетинистое остріе; прицвѣтныя чешуйки нижняго цвѣтка на спинкѣ пушистыя. Цвѣты съ $\frac{2}{2}$ іюня, зрѣлыя сѣмена съ $\frac{2}{2}$ августа. По сырымъ мѣстамъ, лугамъ и канавамъ. Фили, Воробьевы горы (П.).—Мытищи (С.).—Богородское, Симоновъ монастырь; Мячково, Брн. у., Невѣрово, Клм. у. (К.).—Серпуховъ; р. Пахра, Пдл. у. (Б.).—Химки; Бавыкино, Срп. у. (П.).—Между Юдпнской платформой и 34 вер. Брест. ж. д. (Х.).

33. Milium L.

Колоски одноцвѣтковые, округлые или нѣсколько сплюснутые со спинки; кроющія чешуйки нѣсколько длиннѣе прицвѣтныхъ, одинаковой длины, туповатыя, вздутыя; прицвѣтныя чешуйки нѣсколько хрящеватыя, съ 3 едва замѣтными жилками; околоцвѣтныхъ чешуекъ 2; тычинокъ 3.

71. *M. effusum* L. Пет. Кр. III, стр. 111.—Бух. I, № 417.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 224.—Кауф. II, № 840.—Цин., № 1682.—Кауф. I, стр. 557.—Ann. C., II, № 165.—Дв., № 78.—Макс., № 73.—Gold. C., p. 17.—Gold. Sp., p. 121.—Mart., p. 14.—Lon., p. 283.

Корневище ползучее, даетъ побѣги; стебли прямостоящіе, рѣже основаніемъ колѣнчато-приподнимающіеся, до 1 метра; листья плоскіе, ярко-зеленые, 8—15 мм. шир., остро-шершавые, съ длинными, гладкими влагалищами; язычокъ длинный, до 7 мм. дл., усѣченный, часто разорванный; метелка большая, развѣсистая, вѣточки ея неравной длины, въ мутовкѣ по 5—7, гладкія; колоски 3—5 мм. дл.; кроющія чешуйки овальныя, заостренныя, зеленныя, съ 3 жилками и съ бѣлымъ пленчатымъ краемъ; прицвѣтныя чешуйки равны кроющимъ, но уже ихъ. Цвѣты съ начала іюня, зрѣлыя сѣмена съ $\frac{1}{2}$ іюля. Часто по большимъ лѣсамъ и сырымъ, тѣплымъ мѣстамъ. Горенки, Воробьевы горы (Гольдб.).—Лизаветино, Иваньково, Спасское (К.).—Кунцево (П.).—Царичино (Мар.).—Лосинный Островъ, Мытищи (С.).



Milium effusum.

34. *Stipa* L.

Колоски одноцвѣтковые, узко-ланцетные; кроющія чешуйки перепончатые, почти равной длины, съ 3—5 жилками, длинно-заостренныя; прицвѣтныя чешуйки кожистыя; наружная прицвѣтная чешуйка у основанія пушистая, переходитъ въ длинную колѣнчатую ость, нижнее колѣно скручено влѣво, вся верхняя часть ости усажена перисто-двурядно длинными, бѣлыми волосками; по созрѣваніи наружная прицвѣтная чешуйка плотно обвертывается вокругъ зерна и отваливается вмѣстѣ съ нимъ; околоцвѣтныхъ чешуекъ 6. ч. 3; тычинокъ 3.

72. *S. pennata* L. Пет. Кр. III, стр. 111.—Пет., стр. 287.—Кауф. II, № 841.—Гор., № 90.—Цин., № 1686.—Кауф. I, стр. 558.—Borg., p. 700.—Дв., № 136.—Макс., № 82.

Stipa pennata Aschr. et Gr.

Образуетъ дерновины; основаніе стебли и листьевъ окружено бурозѣрыми или буро-желтыми, болѣею частью досыхающими остатками отмершихъ листьевъ; листья сѣро-зеленые, узкіе, 1—2 мм. шир., жесткіе, по краямъ болѣею частью шероховатые, сложенные вдоль или свернутые въ трубку, съ 7 продольными жилками; стеблевые листья съ длинными, голыми, нѣсколько развернутыми влагалищами; язычокъ верхнихъ листьевъ узкій, длинный; метелка малоцвѣтковая, основаніемъ своимъ часто заключена во влагалище верхняго листа; кроющія чешуйки ланцетно-шило-

видныя, о 3—5 жилкахъ, заострены въ длинную ость, раза въ 2—3 превышающую чешуйку; прицвѣтныя чешуйки въ 3 раза короче кроющихъ,



Stipa pennata.

наружная—линейно-ланцетная,низу большею частью о 5 рядахъ шелковистыхъ волосковъ,верху—голая, ость ея колѣнчатая, нижнее колѣно ости 5—9 см. дл., твердое, скрученное, голое, верхнее—очень длинное, до 20 см. дл., тонкое, усажено волосками, вначалѣ прижатыми, потомъ перисто-расходящимися. Наше растеніе больше всего подходитъ къ *S. Joannis* Cel.—Листья свернутые, стеблевые, съ легко-развертываемой пластинкой, заостренные или туповатые, но не вытянутые въ длинное нитевидное остріе, гладкіе (у нашего растенія листья часто шероховатые, особенно близъ кончика); влагалище нижняго листа прижато къ стеблю; язычокъ удлинненный, у верхняго листа очень узкій; кроющая чешуйка почти въ 2 раза короче ея ости (у нашего растенія въ 2—3 раза); прицвѣтныя чешуйки 1,5 мм. дл., рѣже длиннѣе. Цвѣты съ поло-

вины мая. По песчанымъ холмамъ и по опушкѣ кустарниковъ между Лужками и устьемъ Лопасни, Срп. у.

35. *Nárdus* L.

Колоски линейно-шпловидные, одноцвѣтковые, собраны въ односторонній простой колосъ; кроющихъ чешуекъ нѣтъ; наружная прицвѣтная чешуйка вытянута въ длинную шпловидную ость, совершенно обвертывается внутреннюю и длиннѣе ея; рыльце очень длинное, выступаетъ изъ цвѣтка.

73. *N. stricta* L. Мос., № 51.—F. O., № 8, p. 118.—Пет., стр. 226.—Кауф. II, № 890.—Цвл., № 1583.—Кауф. I, стр. 589.—Ann. C. V, № 89.—Дв., № 65.—Макс., № 62.—Нoff. H., № 499.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 11.—Ад., p. 28.—St. II, p. 7.—St. I, № 33.

Образуетъ густой дернъ съ плотными переплетающимися корнями; стебель примоторчащій. 10—30 см., гладкій, близъ верхушки шероховатый, съ листьями только у основанія, которые вмѣстѣ съ корневыми листьями образуютъ утолщеніе наподобіе луковицы; листья сѣро-зеленые, щетиновидные, очень узкіе, свернутые, по краямъ остро-шершавые, съ длинными влагалищами; у корневыхъ листьевъ влагалища соломенно-желтаго цвѣта; язычокъ до 2 мм. дл.; колосъ односторонній; колоски ланцетные, сперва прижаты къ осп, потомъ отогнуты, до 12 мм. дл., сѣро-фіолетовые; прицвѣтныя чешуйки линейно-ланцетныя, длинно-заостренные почти въ ость, съ 3 жилками, по жилкамъ рѣсничато-остро-шершавыя. Цвѣты съ конца мая и $\frac{1}{2}$ іюня, зрѣлыя сѣмена съ $\frac{1}{2}$ іюля. Часто по открытымъ лугамъ и по кустарникамъ; любитъ песокъ, рѣже на торфѣ.

36. *Phléum* L.

Колоски одноцвѣтковые или иногда съ зачаточнымъ вторымъ цвѣткомъ, собраны въ цилиндрическое соцвѣтіе; кроющія чешуйки равныя, сплюснутыя съ боковъ, съ килемъ, верхушка ихъ быстро переходитъ въ

*Nardus stricta.**Phleum pratense.*

колючку или въ короткую ость; прицвѣтныхъ чешуекъ 2, пленчатыхъ, безъ остей, наружная — облекаетъ внутреннюю; околоцвѣтныхъ чешуекъ большею частью 2; тычинокъ 3; столбики не сросшіеся.

74. *P. pratense* L. Пет. Кр. III, стр. 105.—Бух. II, № 446.—Бух. I, № 413.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 239.—Кауф. II, № 829.—Цин., № 1690.—Кауф. I, стр. 549.—Lind., p. 180.—Ann. C. I, № 60.—Дв., № 72.—Макс., № 66.—Hoff. H., № 527.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 13.—Hoff., № 2438.—St. II, p. 7.—St. I, № 42.—Pal., № 156.

Корневище даетъ короткіе побѣги; стебли прямостоящіе, рѣже у основанія колѣнчато-приподнимающіеся, 20—150 см.; все растеніе ярко-зеленое; листья съ длинными влагалищами; язычокъ у нижнихъ листьевъ 2—3 мм. дл., рѣже его почти нѣтъ, у верхнихъ—иногда достигаетъ 5 мм. дл.; колосъ узко-цилиндрическій, длинный, до 15 см. дл.; рѣже не крупный, тогда слегка яйцевидный; кроющія чешуйки сплюснутыя, продолговатыя, 2—5 мм. дл., на спинкѣ съ острымъ килемъ, вдоль кили съ длинными щетинистыми волосами, усѣченныя, переходятъ въ короткую, жесткую ость; прицвѣтныя чешуйки въ 2 раза короче кроющихъ, бѣлыя, пленчатые, усѣченныя; колосокъ безъ зачаточнаго другого цвѣтка. Цвѣты съ половины іюня до $\frac{1}{2}$ іюля, зрѣлыя сѣмена съ $\frac{1}{2}$ августа. По лугамъ и кустарникамъ, часто.


- α. nodosum* L. (sp.). Кауф. II, № 829.—Кауф. I, стр. 550.—Макс., № 66.—Hoff. H., № 527.

Phleum nodosum L. Pinz., p. 13.—Дв., № 73.—Mart., p. 13.—Ad., p. 30—31.

Стебли у основанія утолщены въ видѣ луковичекъ, не высокіе, около 40 см., часто колѣнчато-приподнимающіеся; колосъ маленький, не длиннѣе 3 см., часто только равенъ 1 см. и не толще 6 мм., удлинненно-яйцевидный. Усово, Звн. у., Вѣлые Колодези. Клм. у., Серебряный боръ близъ Хорошова, Воробьевы горы (П.).

А. А. Хорошковъ нашелъ близъ ст. Сходня, Нпк. ж. д., въ болотѣ форму съ рѣзко выраженнымъ луковичеобразнымъ утолщеніемъ основанія стебля, въ остальномъ же совершенно сходную съ типичной формой.

75. *P. Boehmeri* Wib. Пет. Кр. III, стр. 105.—Ф. Б., № 113.—Пет., стр. 239.—Кауф. II, № 830.—Гор., № 50.—Цин., № 1689.—Рупр., стр. 86.—Кауф. I, стр. 550.—Lind., p. 180.



Phleum Boehmeri.

Корневище коротко-ползучее; стебли 30—60 см.; все растение сѣро-зеленое, иногда съ пурпуровымъ оттѣнкомъ; листья гладкіе или слегка шероховатые; язычокъ короткій, рѣже до 3 мм. дл., усѣченный; колосъ узко-цилиндрической, 2—15 см. дл. и 8 мм. толщ., иногда къ обоимъ концамъ слегка суженный; колоски со вторымъ зачаточнымъ цвѣткомъ; кроющія чешуйки ланцетныя, съ шероховатымъ килемъ, но безъ щетинокъ, на верхушкѣ косо-усѣченные, переходятъ въ жесткую, шиповидную ость, тоже часто шероховатую; прицвѣтныя чешуйки большею частью равны $\frac{2}{3}$ кроющихъ. Цвѣты съ половины іюня и $\frac{1}{2}$ іюля. По опушкамъ лѣсовъ, по откосамъ и по холмамъ, на песчаной и известковой почвѣ. Мякиннино, на Москвѣ р. (К.).—Райки, Вгр. у. (П.).—Серебряный боръ близъ Хорошова; Протопопово, Клм. у., Вѣлы Колодези, Клм. у., Сернуховъ (П.).—Дракино, Срп. у. (Эксп. Бот. Лабор.).

37. *Alopecúrus* L.

Колоски одноцвѣтковые, сроснутые, собраны въ густое цилиндрическое соцветіе; кроющія чешуйки одинаковыя, сросшіяся своимъ основаніемъ иногда до половины своей длины; прицвѣтная чешуйка только одна наружная, свернутая вокругъ завязи и сросшаяся внизу краями, съ длинною остью на спинкѣ; околоцвѣтныхъ чешуекъ нѣтъ; тычинокъ 3; рыльца нитевидныя; столбики большею частью сросшіеся.

1. Кроющія чешуйки острия, сраслись до середины или нѣсколько ниже середины. 2.

Кроющія чешуйки тупыя, сраслись только у основанія. 4.

2. Колосъ рѣдкій, тонкій, суженный къ обоимъ концамъ; кроющія чешуйки сраслись до середины, на спинкѣ слегка крылатыя, съ короткими рѣсничками. *A. agrestis* L.

Колосъ плотный, цилиндрической, тупой; кроющія чешуйки сраслись въ нижней $\frac{1}{3}$, безъ крылатого кля, мохнато-рѣсничатыя. 3.

3. Кроющія чешуйки съ прямыми, не расходящимися концами; ость выходитъ почти у основанія чешуйки. *A. pratensis* L.
Кроющія чешуйки съ расходящимися, иногда отогнутыми кнаружи концами; ость выходитъ близь середины чешуйки.

A. ventricosus Pers.

4. Ость почти въ 2 раза длиннѣе кроющихъ чешуекъ, сверху расходящихся, выходитъ ниже середины острой или тупой прицветной чешуйки. *A. geniculatus* L.

Ость едва выдается изъ кроющихъ чешуекъ, наверху съ прямыми сходящимися или параллельными концами; ость выходитъ изъ середины, рѣже ниже середины тупой прицветной чешуйки.

A. fulvus Sm.

76. *A. agréstitis* L. Пет. Кр., стр. 103.—Пет., стр. 134.—Кауф. II, № 826.—Цин., № 1699.—Pinz., p. 19.—Рупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 548.—Ann. C. I, № 59.—Дв., № 75.—Макс., № 63.—Mart., p. 13.—Pal., № 157.

Alopecurus myosuroides Huds.

Стебли у основанія развѣтвленные, прямостоящіе или колѣнчато-приподнимающіеся, 30—60 см.; листья 3—8 мм. шир., слегка шероховатые, съ длинными, въ верхней части шероховатыми влагалищами, иногда слегка вздутыми; язычокъ около 2 мм. дл., туповатый; колосъ длинный, узкоцилиндрическій, до 12 см. дл., къ обоимъ концамъ суживается; вѣточки



Alopecurus agréstitis.



Alopecurus pratensis.

колоса несутъ по 1—2 колоска; кроющія чешуйки ланцетныя, до половины сросшіяся, съ короткими рѣсничками, бѣловатыя, съ 3 зелеными жилками, на спинкѣ слегка крылатыя; ость прицветной чешуйки вдвое длиннѣе колоска, колѣнчатая, выходитъ изъ нижней $\frac{1}{4}$ ея. Цвѣты въ іюлѣ. По лугамъ. Останкино, Мароино (А.).

77. *A. pratensis* L. Бух. II, № 443.—Бух. I, № 411.—Ф. О., № 7, р. 102.—Пет., стр. 134.—Кауф. II, № 825.—Цин., № 1695.—Кауф. I, стр. 548.—Дв., № 74.—Макс., № 64.—Хофф. II, № 536.—Gold. C., р. 17.—Mart., р. 13.—Hoff., № 118.—Ad., р. 32.—St. II, р. 7.—St. I, № 34.

Корневище коротко-ползучее; стебель 30—100 см., прямостоящий или у основания колѣнчато-приподнимающийся; листья съ верхней стороны шероховатые, переходятъ въ длинныя, часто вздутыя влагалища; язычокъ до 4 мм. дл., тупой; колосъ цилиндрической, 3—10 см. дл.; въ точкахъ колоса несутъ 3—10 колосковъ; колоски широко-яйцевидные; кроющія чешуйки широко-ланцетныя, покрыты б. или м. длинными щетинистыми волосками, верхушки ихъ прямо-заостренныя, съ прямыми или даже сходящимися, часто красноватыми или почти черными кончиками; прицвѣтная чешуйка бѣлая, почти равна кроющимъ; ость длиною до 9 мм. значительно превышаетъ чешуйки, выходитъ почти у основанія. Цвѣты во $\frac{2}{2}$ мая и $\frac{1}{2}$ июня, зрѣлыя сѣмена въ июлѣ. По простымъ и залитымъ лугамъ, часто.

- а. *typicus* Aschr. et Gr. Все растеніе, включая колосъ, зеленое, побѣги короткіе, 3—4 см. дл.; стебель высокій, до 1 метра; колосъ длинно-цилиндрической, до 10 см. дл.

- б. *obscurus* Griseb. Пет. Кр. III, стр. 104.—Кауф. II, № 695.—Цин., стр. 492.—Кауф. I, стр. 548.

Alopecurus nigricans pl. auct. non. Horn. Пет. Кр. III, стр. 104.—Кауф. II, стр. 572.—Кауф. I, стр. 548.

Побѣги до 10 см. дл.; колосъ толстый, цилиндрической, не длиннѣе 5 см., чернѣющий; влагалища верхняго листа большею частью сильно вздуто. Пушкино; Набережная на Клязьмѣ, Бгр. у. (С.).—Белутово, Пдл. у., у платформы Катуаръ, Брянск. ж. д. (Х.).

- в. *glaucus* Sonder. Пет. Кр. III, стр. 104.

Все растеніе сѣро-зеленое; стебель у основанія колѣнчато-приподнимающийся, только 2 послѣднихъ колѣна прямостоящія; побѣги длинныя; колосья тонкіе. Серпуховъ (Рупр.).

78. *A. ventricosus* Pers. Пет. Кр. III, стр. 105.

Alopecurus ruthenicus Weinem. Пет., стр. 134.—Кауф. II, стр. 572.—Гор., № 89.—Цин., № 1696.

Alopecurus nigricans Hornem. Рупр., стр. 62.

Alopecurus pratensis L. *ruthenicus* Weinem. Макс. № 64.

Alopecurus arundinaceus Poir.

Корневище ползучее, даетъ побѣги до 20 см. дл.; стебель прямостоящий или у основанія приподнимающийся, 40—150 см., какъ и листья, сѣро-зеленый; язычокъ длинный, часто до 5 мм. дл.; колосъ толстый, около 5 см. дл., рѣдко длиннѣе; кроющія чешуйки длиннѣе прицвѣтной, съ прижатыми щетинистыми волосками, концы чешуекъ заострены, почти черныя, расходящіяся и часто отогнуты кнаружи; прицвѣтная чешуйка

на концѣ тоже большою частью черная; ость выходитъ близъ середины, мало выступаетъ изъ чешуекъ, рѣже равна имъ. Цвѣты съ $\frac{2}{2}$ июня.

α. exserens **Marsson.** Ость выходитъ нѣсколько ниже середины чешуйки и въ 2 раза длиннѣе ея. Между Щукинымъ и Троицкимъ, Мос. у. (К.).—Серебряный боръ близъ Хорошова (П.).

79. *A. geniculatus* **L.** Пет. Кр. III, стр. 104.—Бух. II, № 444.—Бух. I, № 412.—*F. O.*, № 7, p. 102.—Пет., стр. 134.—Кауф. II, № 827.—Цин., № 1697.—Кауф. I, стр. 548.—*Lind.*, p. 182.—*Ann. C. V.*, № 78.—Дв., № 76.—Макс., № 65.—*Hoff. II.*, № 534.—*Gold. C.*, p. 17.—*Mart.*, p. 13.—*Hoff.*, № 117.—*Ad.*, p. 32.—*St. II.*, p. 7.—*St. I.*, № 35.

Стебли колѣчато-приподнимающіеся, иногда въ колѣнахъ укореняющіеся, 10—45 см.; все растение сѣро-зеленое; листья шероховатые, до



Alopecurus ventricosus.



Alopecurus geniculatus.

5 мм. шир., съ длинными, слабо вздутыми влагалищами; язычокъ до 4 мм. дл., туповатый; колосъ 1—6 см. дл., цилиндрическій, къ концу суживается; вѣточки колоса несутъ 1—2—4 колоска; кроющія чешуйки сросшіяся только у основанія, туповатые, съ расходящимися верхушками; прицвѣтная чешуйка коротко-волосистая, тупая или острая, равна кроющимъ чешуйкамъ, съ остью вдвое длиннѣе колоска, выходящей почти у основанія чешуйки; пыльники свѣтло-желтые, по опыленіи бурые. Цвѣты съ конца мая, весь июнь и иногда $\frac{1}{2}$ июля, зрѣлыя сѣмена со середины июля. По сырѣмъ мѣстамъ, часто на глинистой почвѣ или на торфѣ. Кусково, Воробьевы горы (П.).—Мытищи (С.).—Вороновскій лѣсъ, Пдл. у. (В.).—Новоіерусалимскій монастырь, Звн. у., д. Рыбаки, Мос. у. (X.).

α. bulbosus **Sonder.** Кауф. II, № 826.—Кауф. I, стр. 549.—*Mart.*, p. 14.
Alopecurus bulbosa *Hoff. Макс.*, № 65 β.

Основаніе стебля утолщено въ видѣ маленькой луковицы.

80. *A. fúlvus* Sm. Пет. Кр. III, стр. 104.—Бух. II, № 445.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 134.—Кауф. II, № 828.—Цин., № 1698.—Кауф. I, стр. 549.

Alopecurus geniculatus L. paludosus Beauv. Макс., Приб., стр. 215.—Макс., герб., № 598.

Стебель прямостоящий или приподнимающийся, 20—40 см.; все растение и особенно влагалище сизо-зеленое; листья до 5 мм. шир., заостренные, съ длинными, часто спльно вздутыми влагалищами; язычок туповатый, до 4 мм. дл.; колосъ цилиндрический, до 6 см. дл.; кроющія чешуйки туповатыя, съ сходящимися или параллельными концами; прицвѣтная чешуйка тупая, равна кроющимъ чешуйкамъ, съ остью, выходящей изъ середины, рѣже выше середины, еще рѣже ниже середины чешуйки и едва выдающейся изъ колоска; пыльники оранжевые. Цвѣт. весь июнь и $\frac{1}{2}$ июля. По канавамъ и болотамъ на торфѣ. Пушкино (Ч.).—Мытищи (С.).—Серебряный боръ близъ Хорошова (П.).



Alopecurus fulvus.

38. *Agróstis* L.

Колоски одноцвѣтковые, нѣсколько сжатые съ боковъ, собраны въ метельчатое, вѣтвистое соцветіе; кроющія чешуйки заостренные, неравной длины, наружная—съ 3 жилками, длиннѣе внутренней; прицвѣтныя чешуйки тоже неравныя, кожистыя, наружная значительно длиннѣе внутренней (иногда внутренней нѣтъ), цѣльная, или верхушка ея зубчатая, и тогда съ остью; подъ прицвѣтными чешуйками часто сидятъ 2 пучка короткихъ волосковъ; околоцвѣтныхъ чешуекъ 2; тычинокъ 3; столбики короткіе.

1. Корневые листья вдоль сложенные; прицвѣтная чешуйка только одна наружная, съ колѣнчатой остью, длиною превышающей чешуйку.

A. canina L.

Корневые листья плоскіе или иногда свернуты трубочкой, но не сложены вдоль; прицвѣтныхъ чешуекъ 2, безъ ости или съ короткой, не колѣнчатой остью. 2.

2. Язычокъ короткій, усѣченный.

A. vulgaris With.

Язычокъ длинный, заостренный.

A. alba L.

81. *A. álba* L. Пет. Кр. III, стр. 107.—Пет., стр. 132.—Цин., № 1677.—Дв., № 81.—Макс., № 76.—Hoff. H., № 564.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 15.—Ad., p. 36.—Pal., № 160.

Agrostis stolonifera L. alba (L.). F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, № 833 β.—Кауф. I, стр. 553.

Agrostis diffusa Host. Gold. Sp., p. 121.

Agrostis capillaris Poll. St. I, № 45.

Корневище даетъ длинныя побѣги; стебли прямостоящіе или колѣнчато-приподнимающіеся, иногда почти лежащіе, 20—150 см.; листья широко-ланцетные, съ длинными слабо-широковатыми влагалищами; язычокъ длинный, до 6 мм. дл., заостренный, часто разорванный; метелка 2,5—30 см. дл., послѣ цвѣтенія съ прижатыми вѣтвями; вѣтви широколанцетные, развѣтвленія ихъ составляютъ острый уголъ; колоски ланцетные, зеленые



Agrostis alba α. *genuina*.



Agrostis alba β. *gigantea*.

или темно-фіолетовые; кроющія чешуйки 2—3 мм. дл., ланцетные, заостренные, на спинкѣ съ короткими щетинками; прицвѣтныя чешуйки немного короче кроющихъ, съ 2 зубчиками или зазубренныя на верхушкѣ, иногда на спинкѣ съ короткой остью, сидящей близъ верхушки чешуйки. По песчанымъ мѣстамъ и по берегамъ рѣкъ. Цвѣты во $\frac{2}{2}$ іюня и $\frac{1}{2}$ іюля.

α. *genuina* Aschr. et Gr. Стебли прямостоящіе, не выше 50 см.; рѣже длиннѣе; имѣетъ 2 формы: *flavida* Aschr. et Gr.—колоски блѣдно-зеленые или желтые и—*diffusa* Host. (sp.)—колоски темно-фіолетовые. Кусково, Воробьевы горы, Троицкое-Каппарджик: Заозерье на берегу Москвы р., Брин. у. (П.).—Пушкино (С.).

β. *gigantea* Mey. Пет. Кр. III, стр. 108.—Макс., № 76.

Agrostis stolonifera L. *gigantea* Roth. Кауф. II, стр. 578.—Кауф. I, стр. 553.

Agrostis gigantea Roth. Дв., № 82.—Mart., p. 15.

Agrostis varia Host. Gold. Sp., p. 121.—Ad., p. 36.

Стебли прямостоящіе или колѣнчато-приподнимающіеся, до 150 см., толстые; листья широкіе, до 11 мм. шир.; метелки спѣшно вѣтвистыя, часто до 20 см. дл. Въ гербаріи Анненкова.—Мытищи на Щелковской вѣтви ж. д. (С.).

γ. *prorépens* Koch.

Agrostis stolonifera L. *patula* Gaud. Пет. Кр. III, стр. 108.—Кауф. II, стр. 578.—Кауф. I, стр. 553.

Стебли почти лежащие, вѣтвистые, иногда укореняющіеся, съ длинными побѣгами; листья плоскіе, мягкіе; метелка большею частью короткая, сжатая. Гербарій Анненкова.

- δ. *coarctata* Hoffm. Пет. Кр. III, стр. 108.—Кауф. II, стр. 578.—Кауф. I, стр. 553. Метелка сжатая, частая; листья узкіе, почти щетиновидные. Гербарій Максимовича.

82. *A. vulgaris* With. Пет. Кр. III, стр. 107.—Пет., стр. 131.—Цин., № 1678.—Lind., p. 180.—Ann. C., IV, № 64.—Дв., № 80.—Макс., № 75.—Hoff. H., № 593.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 14.

Agrostis stolonifera L. *vulgaris* With. Бух. II, № 449.—Бух. I, № 415.—F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, № 833 а.—Кауф. I, стр. 553.

Agrostis capillaris Leers. Hoff., № 590.—St. I, № 45.

Agrostis tenella Hoffm. Mart., p. 14.

Agrostis hispida Willd. St. II, p. 8.

Корневище даетъ очень короткіе побѣги, не длиннѣе 5 см.; стебли большею частью прямостоящіе или приподнимающіеся, 15—50 см., рѣдко



Agrostis vulgaris.



Agrostis canina.

выше; листья не шире 4 мм., часто почти щетиновидные, шероховатые, съ влагалищами часто совершенно гладкими; язычокъ очень маленькій, усѣченный, не длиннѣе 2 мм., часто онъ совершенно отсутствуетъ; метелка 4—15 см. дл., съ растопыренными вѣтвями и послѣ цвѣтенія; вѣточки ея большею частью совершенно гладкія, не шероховатые; колоски ланцетные, фіолетовые, рѣже зеленые; кроющіе чешуйки ланцетныя, на спинкѣ только въ верхней $\frac{1}{3}$ шероховатые или совершенно гладкія; при-

цвѣтныя чешуйки большею частью совершенно безъ остей. Цвѣты съ конца іюня и іюль. По берегамъ рѣкъ, часто.

α. *genuina* Schur. Листья плоскіе, 2—4 мм. шир.; метелка шпиральная.

β. *arenicola* Aschr. de Gr. Листья щетиновидные, свернутые въ трубку, б. ч. 1 мм. шир.; метелка узкая, почти цилиндрическая, не шире 2 см.; прицвѣтныя чешуйки иногда съ короткой остью.

γ. *umbrosa* Schur. То же, что и у *genuina*, но колоски зеленые или слегка съ фіолетовымъ оттѣнкомъ и узко-ланцетные.

83. *A. canina* L. Пет. Кр. III, стр. 108.—Бух. I, № 414.—F. O. № 7, p. 102.—Пет., стр. 131.—Кауф. II, № 834.—Цин., № 1680.—Кауф. I, стр. 554.—Ann. C. V, № 79.—Дв., № 83.

Trichodium caninum Schrad. Gold. C., p. 17.—Gold. Sp., p. 121.—Mart., p. 15.—Ad., p. 37.

Корневище дернистое, дает короткіе побѣги; все растеніе сѣро-зеленое; стебли прямостоящіе или приподнимающіеся, 30—60 см.; листья, особенно коричные, вдоль сложенные, стеблевые—часто плоскіе, съ длинными, гладкими или слабо шероховатыми влагалищами: язычекъ до 2 мм. дл., заостренный, иногда зазубренный; метелка по отцвѣтаніи съ прижатыми вѣтвями; колоски ланцетные, б. ч. фіолетовые, рѣже желтоватые; кроющія чешуйки широко-ланцетныя, до 2 мм. дл., часто неравныя, на спинкѣ рѣсничато-шероховатыя; прицвѣтныя чешуйки тупыя, на концѣ зазубренныя, на $\frac{1}{4}$ короче кроющихъ, съ колѣнчатой остью, выходящей ниже середины и б. ч. превышающей колосокъ; внутренней прицвѣтной чешуйки нѣтъ, или она въ зачаточномъ видѣ. Цвѣты во $\frac{2}{2}$ іюня или $\frac{1}{2}$ іюля. По сырýmъ лугамъ, часто.

α. varians Aschr. et Gr.

Agrostis canina L. pallida Rehb. Пет. Кр. III, стр. 108.—Кауф. II, стр. 579.—Кауф. I, стр. 554.

Колоски соломенно-желтые; ость короткая. Иваньково (К.).—Косино (Куль.).

β. arida Schlecht. Всѣ листья щетиновидные, вдоль сложенные. Бѣлопесочная слобода, Срп. у., по холмамъ на пескахъ (X.).—Косино по дорогѣ къ Св. озеру (II.).



Agrostis Spica venti.

39. *Agrostis* Adans.

Колоски одноцвѣтковые, очень маленькіе, на спинкѣ ребристые; кроющія чешуйки неравныя: наружная короче и уже внутренней; наружныя прицвѣтныя чешуйки съ 5 жилками, съ волосками у основанія и съ длинной остью, выходящей нѣсколько ниже ея верхушки; околоцвѣтныя чешуйки широко-ланцетныя.

84. *A. Spica venti* P. B. Пет. Кр. III, стр. 108.—Мос., № 48.—F. O. № 7, р. 102.—Пет., стр. 138.—Кауф. II, № 835.—Цин., № 1681.—Кауф. I, стр. 554.—Lind., p. 180.—Ann. C. IV, № 65.

Agrostis Spica venti L. Дв., № 79.—Макс., № 74.—Hoff. II, № 587.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 14.—Hoff., № 69.—Ad., p. 34.—St. II, p. 7.—St. I, № 43.

Стебель 40—90 см., прямостоящій, или колѣнчато-приподнимающійся, гладкій; листья съ обѣихъ сторонъ шероховатыя, до 3 мм. шир., съ длинными, гладкими или слегка шероховатыми влагалищами: язычекъ длинный, до 6 мм. дл., зазубренный; метелка большая, до 25 см. дл., сильно вѣтвистая, вѣточки ея шероховатыя; колоски зеленые или грязно-пурпу-

ровые; кроющія чешуйки ланцетныя, заостренныя, около 2,5 мм. дл., наружная длиннѣе внутренней, на спинкѣ нѣсколько шероховатая; прицвѣтныя чешуйки короче кроющихъ, по жилкамъ съ рѣсничками, близъ верхушки съ длинной колѣчатой остью, которая въ 3—4 раза длиннѣе самой чешуйки. Цвѣты съ конца іюня, весь июль, зрѣлыя сѣмена съ начала августа. По посѣвамъ и паровымъ полямъ, очень часто.

40. *Calamagrostis* Roth.

Колоски одноцвѣтковые, или часто съ зачаточнымъ вторымъ цвѣткомъ въ видѣ цилиндрическаго столбца, покрытаго волосами, въ метельчатомъ соцвѣтіи; кроющія чешуйки почти равной длины, значительно превышаютъ длиною прицвѣтныя; прицвѣтныя чешуйки неравныя: наружная—съ 3 жилками, на верхушкѣ съ 2 или 4 зубчиками и съ остью, выходящей изъ ея спинки или изъ вырѣзки верхушки; внутреннія—съ 2 жилками; у основанія прицвѣтныхъ чешуекъ сидятъ 6. или м. длинныя прямые волоски, длина которыхъ всегда болѣе ширины чешуекъ; околоцвѣтныхъ чешуекъ 2; столбики короткіе.

1. Волоски длиннѣе прицвѣтныхъ чешуекъ или равны имъ. 2.

Волоски короче прицвѣтныхъ чешуекъ. 4.

2. Прицвѣтныя чешуйки съ 3 жилками. *C. epigeios* Roth.

Прицвѣтныя чешуйки съ 4—5 жилками. 3.

3. Язычокъ длиною до 10 мм.; ость выходитъ изъ выемки, въ 2 раза длиннѣе боковыхъ зубцовъ. *C. purpurea* Trin.

Язычокъ тупой, 3 мм. дл., ость выходитъ изъ выемки, б. ч. равна или нѣсколько длиннѣе боковыхъ зубцовъ.

C. lanceolata Roth.

4. Ость колѣчатая, далеко выдается изъ колоска; прицвѣтныя чешуйки въ 4 раза длиннѣе волосковъ.

C. arundinacea Roth.

Ость прямая, не выдается или мало выдается изъ колоска, прицвѣтныя чешуйки въ 2 раза длиннѣе волосковъ.

C. neglecta P. B.

85. *C. lanceolata* Roth. Пет. Кр. III, стр. 109.—F. O. № 7, p. 102.—Пет., стр. 152.—Кауф. II, № 836.—Цин., № 1674.—Кауф. I, стр. 555.—Lind., p. 180.—Ann., C. IV, № 66.—Макс., № 78.

Calamagrostis breviseta Goldb. Гербарій Гольдбаха.

Arundo Epigeios L. *breviseta* Goldb. Гербарій Максимовича, № 6043.

Arundo Calamagrostis L. Pal., № 201.

Calamagrostis Calamagrostis Karst.

Корневище ползучее, пускаетъ тонкіе побѣги; стебли прямостоящіе, иногда у основанія вѣтвистые, въ нижней части гладкіе, въ верхней—шероховатые, 60—150 см.; листья ярко-зеленыя, шероховатые, 2—7 мм. шир., плоскіе или иногда почти щетиновидные; язычокъ до 3 мм. дл., тупой, часто разорванный; метелка длиною до 20 см., б. ч. съ поникающей

верхушкой и длинными нижними ветвями; цветоносы и цветоножки остро-шершавые; колоски фиолетовые или грязно-пурпуровые, очень редко зеленоватые; кроющие чешуйки около 4 мм. дл., ланцетные; прицветные—въ $1\frac{1}{2}$ короче кроющих, верхушка их выемчатая, и изъ выемки



Calamagrostis lanceolata.



Calamagrostis purpurea.

выходитъ короткая ость, равная или нѣсколько длиннѣе зубцовъ чешуйки. Цвѣты съ конца мая до середины июня. По торфянымъ болотамъ и сырým лугамъ. Близъ Иванцова, Дмит. у., подъ Звенигородомъ, Серебряный боръ близъ Хоропова, Бутырки (П.).—Мытищи (С.).—Близъ Захарова, Косино—Св. озеро (К.).—Горенки (Гольдб.).—Дер. Вялки, Брян. у. (Х.).

α. canescens Aschr. et Gr.

Calamagrostis Gaudiana Rehb. Пет. Кр. III, стр. 109.—Кауф. II, стр. 580.—Кауф. I, стр. 556.

Колоски зеленоватые; метелка сильно поникающая. Кусково (П.).

86. *C. purpurea* Trin. Пет. Кр. III, стр. 109.—Мос., № 49.

Calamagrostis phragmitoides Hartm.

Стебли прямостоящіе, шероховатые только подъ метелкой, б. ч. выше 1.5 метра; листья плоскіе, до 9 мм. шир., съ нижней стороны остро-шершавые; язычокъ очень длинный, до 10 мм, часто разорванный; метелка очень большая, до 20 см. дл., нижнія вѣточки ея до 9 см. дл.; цветоносы и цветоножки остро-шершавые; колоски тупые, свѣтло-красные, рѣже темно-фиолетовые; кроющія чешуйки неравной длины: наружныя 5 мм. дл., переходить въ длинное остріе наподобіе ости, обѣ чешуйки на спинкѣ остро-шершавыя; прицветныя чешуйки на верхушкѣ выемчатая, съ остью, спидцей между выемкой и серединой спинки, вдвое длиннѣе боковыхъ зубцовъ. Берегъ острова на Юрьевскомъ озерѣ, Пдл. у. (Мос.).

87. *C. neglecta* P. B. Пет. Кр. III, стр. 110.—Пет., стр. 152.—Цин., № 1670.

Calamagrostis stricta Spr. Ф. Б., № 117.—Кауф. II, № 838.—Кауф. I, стр. 556.

Arundo stricta Timm. Дв., № 133.—Макс., № 79.—Ноеф. II., № 834.—Gold. С., p. 18.—Gold. Sp., p. 121.—Ad., p. 63—64.

Корневище даетъ очень длинныя побѣги: стебли прямостоящіе, 30—100 см., только подъ метелкой шершавые; листья б. или м. шероховатые, узкіе, 1—3 мм. шир., очень рѣдко 5 мм. шир.; язычокъ б. ч. разорванный, до 4 мм. дл.; метелка почти цилиндрическая, во время цвѣтенія съ растопыренными вѣтвями, потомъ вѣтви прижимаются къ цветоносу; цвѣтоносы и цвѣтоножки остро-шершавые; колоски свѣтло-пурпурово-бурые, рѣже фіолетовые; кроющія чешуйки широко-яйцевидныя, заостренныя, около 3 мм. дл.; прицвѣтныя чешуйки около 2,5 мм. дл., на концѣ усѣченныя и зазубренныя, немного длиннѣе волосковъ; ость прямая, выходитъ нѣсколько ниже середины и едва длиннѣе прицвѣтной чешуйки, но короче кроющей. Цвѣты въ $\frac{1}{2}$ іюня, иногда до начала іюля. По торфянымъ болотамъ. Измайловскій звѣринецъ (Гольдб.).—Сѣтунь (Н.).—Трошенское озеро, Руз. у. (Ф. О.).—Мытщи (П.).—Красниковское болото—въ 7 верстахъ за Мытщами (П. и С.).

Calamagrostis neglecta.

***a. interrupta* Wahlb.**

Calamagrostis stricta Spr. *interrupta* Wahlb. Кауф. II, стр. 581.—Кауф. I, стр. 556. Метелка очень длинная, вѣтви ея удалены другъ отъ друга такъ, что верхушка нижнихъ не доходитъ до основанія слѣдующихъ. Измайловскій звѣринецъ (Гольдб.).

88. *C. arundinacea* Roth. Пет. Кр. III, стр. 111.

Calamagrostis silvatica D.C. Бух. II, № 451.—F. O. № 7, p. 102.—Пет.. стр. 152.—Кауф. II, № 839.—Цвл., № 1669.—Кауф. I, стр. 557.—Lind., p. 180.—Макс., № 80.

Arundo silvatica Schrad. Дв., № 134.—Hoff. II, № 835.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 24.—Ad., p. 64.

Agrostis arundinacea L. St. II, p. 8.—St. I, № 44.—Pal., № 159.

Корневище ползучее, образуетъ дерновинки и пускаетъ побѣги; стебли 60—150 см., только подъ метелкой шероховатые; листья плоскіе, по краямъ шероховатые до 10 мм. шир., съ шероховатыми влагалищами; язычокъ усѣченный или округлый, короткій, до 2 мм. дл.; метелка до 30 см., почти цилиндрическая, во время цвѣтенія съ оттопыренными вѣтвями, потомъ вѣтви прижимаются къ оси метелки; вѣтви ея шероховатыя; колоски бѣлые, зеленоватыя, рѣже съ фіолетовымъ или пурпуровымъ оттѣнкомъ; кроющія чешуйки ланцетныя, постепенно заостренныя, около 5—6 мм. дл.; прицвѣтныя чешуйки въ 4 раза длиннѣе волосковъ и на 1 мм. короче кроющихъ, на концѣ зазубренныя; ость колѣчатая, выходитъ изъ нижней $\frac{1}{4}$ чешуйки, достигаетъ 7 мм. дл. Цвѣты съ конца іюня, весь іюль, зрѣлыя сѣмена

Calamagrostis arundinacea.

въ $\frac{1}{2}$ августа. По лѣсамъ и кустарникамъ, часто. Контево, Покровское, Братово, Иваново; Раменское, Брн. у. (К.).—Мытищи (С.).—Кузьминки, Богородское. Серебряный боръ близъ Хорошова; Невѣрово, Кал. у., Усоево, Звн. у., Иваново, Срп. у. (П.).—Дарьино. Звн. у., Ново-Удѣльное, Брн. у. (X.).

89. *C. epigaeus* Roth. Пет. Кр. III, стр. 109.—Бух. II, № 450.—Бух. I, № 416.—
 F. O. № 7, p. 102.—Ф. Б., № 25 (ошибочно подъ *C. phragmitoides* Hartm.).—Иер., стр. 152.—Кауф. II, № 837.—
 Цин., № 1676.—Кауф. I, стр. 556.—Lind., p. 180.—Ann.,
 C. II, 164.—Макс., № 77.

Arundo Epigaeus L. Дв., № 132.—Hoff. H., № 827.—Gold. C., p. 18.—Mart.,
 p. 23.—Ad., p. 62—63.—St. II, p. 9.—St. I, № 77.

Корневище толстое, длинное, съ побѣгами; стебли въ верхней части остро-шершавые, 60—150 см., прямостоящіе; листья сѣро-зеленые, до 10 мм. шир., шероховатые, съ длинными, остро-шершавыми влагалищами; язычокъ тупой, часто разорванный, до 7 мм.; метелка длинная, до 30 см. дл., съ толстыми, вверхъ торчащими вѣтвями, иногда нижнія вѣтви достигаютъ до 10 см. дл.; колоски сучены въ односторонніе лучки, зеленые, съ фиолетовымъ или пурпуровымъ оттѣнкомъ; кроющія чешуйки равныя, около 5 мм. дл., на спинкѣ остро-шершавыя, заостренныя наподобіе короткой ости; прицветныя чешуйки равны $\frac{1}{3}$ кроющихъ, на верхушкѣ съ 2 зубцами; ость выходитъ около середины спинки, длиннѣе зубцовъ, и верхушка ея почти достигаетъ $\frac{2}{3}$ кроющей чешуйки; волоски почти равны кроющей чешуйкѣ. Цвѣты съ конца іюня, весь іюль, зрѣлыя сѣмена со $\frac{2}{2}$ августа. Часто по вырубкамъ, сухимъ кустарникамъ, песчанымъ мѣстамъ и по сухимъ торфянымъ болотамъ.



Calamagrostis epigaeus.

- а. *Huebneriana* Schb. (sp.). Ость очень короткая, мало превышаетъ длиною зубцы чешуйки; все растеніе сѣро-зеленое, кроющія чешуйки тоже зеленныя, съ очень узкимъ, свѣтло-фиолетовымъ краемъ, метелка же кажется зеленой. Близъ дер. Верей—на опушкѣ Михневскаго соснового лѣса, Брн. у. (X.).
- б. *paralia* Fries. Нижнія влагалища шерстисто-волосистыя съ волосками, обращенными внизъ. Близъ ст. Сходня, Никол. ж. д., въ болотѣ (X.).

41. *Hólcus* L.

Колоски двучвѣтковые, нижній обоеполюй безъ ости, верхній мужской съ остью и часто съ продолженіемъ оси колоска; кроющія чешуйки острыя, съ боковъ сжатыя, наружная—съ 1 жилкой, уже и нѣсколько короче внутренней о 3 жилкахъ; прицветныя чешуйки неравныя, короче кроющихъ. наружная—о 5 жилкахъ, у мужского цвѣтка съ остью, вы-

ходящей нѣсколько ниже верхушки; околоцвѣтныхъ чешуекъ 2; тычинокъ 3; столбиковъ почти нѣтъ.

90. *H. lanátus* L. Пет. Кр. III, стр. 114.—Пет., стр. 201.—Кауф. II, № 846.—Цин., № 1659.—Рупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 561.—Lind., p. 178.—Borg., p. 700.—Макс., № 87.

Holcus mollis L. Дв., № 92.—Макс., № 84.—Mart., p. 17.—Hoff., № 1649.—St. II, p. 56.—St. I, № 46.—Pal., № 2158.



Holcus lanatus.

Стебли прямостоящіе, б. ч. у основанія колѣнчато-приподнимающіеся, 40—90 см., подъ и надъ узлами пушистые; листья 6—8 мм. шир., плоскіе, шероховатые, съ обѣихъ сторонъ покрыты короткимъ, бархатистымъ пушкомъ; влагалища пушистыя отъ внизъ обращенныхъ волосковъ; язычокъ около 2 мм. дл., разорванный; метелка около 10 см. дл., продолговатая, съ коротко-пушистыми, почти горизонтальными вѣтвями; колоски продолговато-яйцевидные, бѣлые или слегка красноватые; кроющія чешуйки около 4 мм. дл., быстро сужены въ короткое остріе, очень коротко-пушистыя, по краямъ и вдоль спинки рѣсничаты; ость загнута кнаружи крючкомъ, не превышаетъ кроющихъ чешуекъ. Цвѣты въ августѣ. По лугамъ и опушкамъ лѣсовъ. Останкино (А.).—Петровское-Разумовское (II. и С.).

42. *Arrhenatherum* P. B.

Колоски 2-цвѣтковые, нижній — мужской, верхній — обоеполый; ось колоска между цвѣтами волосистая, продолжена въ стебельчатый, недоразвитый цвѣтокъ; кроющія чешуйки неравныя, равны прицвѣтнымъ, внутреннія — съ 3 жилками; прицвѣтныя чешуйки съ 5—7 жилками; у мужского цвѣтка наружная чешуйка съ длинной колѣнчатой остью, выходящей ниже середины спинки; у обоеполаго — съ прямой остью, выходящей близъ вершины; околоцвѣтныхъ чешуекъ 2, ланцетныхъ или съ ланцетнымъ боковымъ придаткомъ; тычинокъ 3; завязь пушистая, почти безъ столбиковъ.

91. *A. elátius* M. et K. Пет. Кр. III, стр. 114.—Бух. II, № 455.—Ф. Б., № 116.—Пет., стр. 140.—Кауф. II, № 847.—Гор., № 52.—Цин., № 1661.—Рупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 562.

Arrhenatherum Avenaceum P. B. Дв., № 93.

Holcus avenaceus Scop. Макс., № 86.—Mart., p. 17.

Avena elatior L. Макс., № 86.—Mart., p. 17.—Hoff., № 452.

Стебли 60—130 см., прямостоящіе или колѣнчато-приподнимающіеся, гладкіе, лоснящіеся; листья 4—8 мм. шир., плоскіе, нѣсколько шероховатые, съ гладкими влагалищами; язычокъ короткій, усѣченный; метелка всесторонняя, удлиненная, узкая, до 25 см., во время цвѣтенія съ рас-

кдистыми вѣтвями, потомъ съ прижатыми; колоски свѣтло-зеленые, иногда съ фиолетовымъ оттѣнкомъ; кроющія чешуйки продолговато-ланцетныя, на килѣ рѣзничато-шероховатыя; наружная — обѣ 1 жилкѣ, уже и почти вдвое короче внутренней — о 3 жилкахъ; прицвѣтныя чешуйки о 7 жилкахъ, на верхушкѣ коротко-2-зубчатая; ость вдвое длиннѣ чешуекъ. Цвѣты съ начала іюня. По опушкамъ и по лужайкамъ. Царицыно, Кунцево (Ш.). — Сокольники (М.). — Близъ Крылатскаго (Н.). — Петровское-Разумовское (Шр.). — Софьино, Брн. у. (П.). — Близъ ст. Лопасня, Срп. у. (Н.). — Михайловское, Пдл. у. (Б.).

43. Avena L.

Колоски 2—6-цвѣтковые, цилиндрическіе, потомъ сжатые съ боковъ, б. ч. нѣсколько длиннѣ 1 см., расположены раскидистой метелкой; кроющія чешуйки перепончатая, съ килемъ, наружная нѣсколько длиннѣ внутренней; ось колоска у основанія цвѣтковъ волосистая; прицвѣтныя чешуйки на спинкѣ закругленныя, на концѣ съ 2 зубчиками или б. м. глубоко расщеплены, съ колѣнчатой остью; околоцвѣтныя чешуйки двуллопастныя; завязь наверху покрыта волосками; зерно съ желобкомъ, плотно охвачено остающейся кожистой прицвѣтной чешуйкой.



Arrhenatherum elatius.

1. Кроющія чешуйки съ 9—11 жилками. 2.
Кроющія чешуйки съ 3 жилками. 5.
2. Ость у основанія не скрученная, почти прямая; метелка скатая, однокрая. *A. orientalis* Schreb.
Ость у основанія скрученная, рѣже ости нѣтъ; метелка развѣсистая. 3.
3. Ость только у нижняго цвѣтка или ости совершенно нѣтъ; ось колоска только у нижняго цвѣтка съ пучкомъ волосковъ.

A. sativa L.

Всѣ цвѣты въ колоскѣ съ остями; подѣ каждымъ цвѣткомъ спидитъ по пучку волосковъ. 4.

4. Прицвѣтныя чешуйки у основанія покрыты волосками, верхушка ихъ раздвоена и зубцы заострены въ длинныя, тонкія ости.

A. strigosa Schreb.

Прицвѣтныя чешуйки голыя, верхушка ихъ съ зубцами, но не вытянутыми въ ости.

A. fatua L.

5. Волоски у основанія второго цвѣтка равны по крайней мѣрѣ $1\frac{1}{2}$ прицвѣтной чешуйки; метелка съ длинными, нѣсколько отогнутыми вѣтвями.

A. pubescens L.

Волоски у основанія второго цвѣтка въ нѣсколько разъ короче чешуекъ, метелка узкая, съ вверхъ торчащими вѣтвями.

A. pratensis L.

* **A. sativa L.** Пет., стр. 145.—Кауф. II, стр. 591.—Цин., стр. 484.—Кауф. I, стр. 566. — Дв., № 128. — Макс., № 90. — Mart., p. 23.—Ad., p. 60.—St. II, p. 9.—St. I, № 74.—Pal., № 194.

Корневище дает пучокъ прямостоящихъ или приподнимающихся голыхъ стеблей; листья постепенно заостренные, съ обѣихъ сторонъ и особенно по краямъ шероховатые; язычокъ короткій, яйцевидный, часто



Avena sativa.



Avena sativa *var. orientalis.*

расщепленный на треугольные участки; метелка развѣсистая, съ неравными, обращенными во всѣ стороны, шероховатыми вѣтвями; колоски б. ч. 2-цвѣтковые, третій цвѣтокъ не развитъ; кроющія чешуйки кожистыя, вздутыя, съ сильно выдающимися жилками, длиннѣе прицвѣтныхъ; ось колоска голая или подъ нижнимъ цвѣткомъ пушистая; прицвѣтныя чешуйки туповатые, 2-зубчатые, только у чешуйки нижняго цвѣтка ость

***var. orientalis* Schreb. (sp.).**

Avena orientalis Schreb. Пет. Кр. III, стр. 117. — Пет., стр. 144. — Кауф. II, стр. 591.—Цин., стр. 484.—Кауф. I, стр. 565.

Метелка однобокая, сжатая; ость прямая, не скрученная у основанія. Попадаетъ въ посявкахъ овса.

A. fatua L. et A. strigosa Schreb.

Въ Московской губ., какъ кажется, не встрѣчаются; ихъ нѣтъ и въ сосѣднихъ губерніяхъ.

92. **A. pubescens Huds.** Пет. Кр. III, стр. 116.—Бух. II, № 456. Пет., стр. 145.—Кауф. II, № 849.—Гор., № 54.—Цин., № 1663.—Кауф. I, стр. 564.

Корневище даетъ короткіе побѣги; стебли до 1 метра, въ верхней частн голые, прямостоящіе или колѣнчато-приподнимающіеся; листья до 8 мм. шир., туповатые, почти голые или, какъ и влагалища, покрыты короткими, отстоящими волосками; язычокъ треугольно-продолговатый, 4—6 мм. дл.; метелка продолговатая, до 20 см. дл., съ прижатыми вѣтвями и слегка поникающей верхушкой; нижнія вѣточки метелки сидятъ по 4—8 пучкомъ; колоски по 1—5 на вѣточкѣ, 2—4-цвѣтковые; наружная кроющая чешуйка съ 1 жилкой, нѣсколько короче внутренней о 3 жилкахъ, обѣ съ бѣлой перепончатой каймой; ось колоска покрыта волосками, у основанія второго цвѣтка сидитъ пучокъ волосковъ почти равный цвѣтку;

прицветныя чешуйки съ широкимъ, бѣлымъ, перепончатымъ краемъ, на концѣ расщепленныя, у основанія буроватыя или фіолетовыя, рѣже почти зеленыя, паружная несетъ на спинкѣ, нѣсколько выше середины, колѣбчатую ость до 2 см. дл. Цвѣты съ 2_{-2} мая и весь июнь. По сухимъ и б. ч.



Avena pubescens.



Avena pratensis.

песчанымъ мѣстамъ и по опушкамъ лѣсовъ. Софоново, Пдл. у., Мякиннино; между Кошелевымъ и Соколовымъ на Окѣ, Срп. у. (К.). — Останкино (А.). — Петровское-Разумовское (Шр.). — Быково. Брн. у. (С.). — Ромашково (М.). — Березино за Срп., Серебряный боръ близъ Хорошова; Никифорово, Срп. у. (П.). — Тропцкое-Бутурлино (Н.).

α. *glabrēscens* Rchb. Пет. Кр. III, стр. 116.

Влагалища сильно сплюснутыя, какъ и листья, совершенно голыя. За Туровымъ къ Никифорову, Срп. у., у Лужковъ, Срп. у., Серебряный боръ близъ Хорошова (П.), — Старое село по р. Протвѣ, Мож. у. (Мос.).

β. *amethystīna* Clarion (sp.). Обѣ кроющія чешуйки съ 3 жилками, въ нижней $\frac{1}{3}$ б. ч. фіолетовыя; прицветныя чешуйки съ очень широкимъ перепончатымъ краемъ: ость сидитъ въ среднѣй или нѣсколько ниже середины спинки. Боровскій курганъ на р. Москвѣ. Брн. у. (X.).

93. *A. pratensis* L. Пет. Кр. III, стр. 116. — Бух. I, № 420. — Пет., стр. 145. — Кауф. II, № 850. — Цил., № 1664. — Рупр., стр. 88. — Кауф. I, стр. 564. — Дв., № 130. — Макс., № 94. — Mart., p. 23. — Ad., p. 61—62. — St. II, p. 9.

Образуетъ густыя дерновишки; стебли примостоящіе или слегка приподнимающіеся, въ верхней части шероховатыя; листья около 4 мм. шир., съ нижней стороны и по краямъ шероховатыя такъ же, какъ и сетка вздутое влагалище; язычокъ около 5 мм. дл., часто расщепленный; метелка узкая, б. ч. не превышаетъ 15 см. дл., скатая; вѣточки несутъ

1—2 колоска; колоски 3—5-цвѣтковые, около 2 см. дл.; обѣ кроющія чешуйки съ 3 жилками, серебристо-бѣлыя съ зеленой или свѣтло-пурпуровой полоской; прицвѣтныя чешуйки на спинкѣ шероховатыя, иногда слегка пурпуровыя съ широкимъ, бѣлымъ, перепончатымъ краемъ; ость выходитъ почти изъ середины спинки, до 2 см. дл. Цвѣты во $\frac{2}{2}$ июня. По лугамъ и полямъ. Останкино (А.).

44. *Trisetum Pers.*

Колоски 2—4-цвѣтковые, б. ч. сжатые съ боковъ и достигающіе 1 см. дл.; кроющія чешуйки неравной длины, съ 1—3 жилками; ось колоска и основанія цвѣтовъ волосистыя; прицвѣтныя чешуйки съ килемъ, на концѣ съ 2 зубцами, вытянутыми въ длинныя остроконечія, спинка чешуекъ снабжена колѣнчатой остью; околоцвѣтныя чешуйки двулопастныя или двузубчатыя; завязь голая; зерно нѣсколько сплюснутое, но безъ желобка, свободное, не охвачено прицвѣтной чешуйкой.

94. *T. flavescens* P. B. Пет. Кр. III, стр. 115.

Avena flavescens L. Бух. II, № 457. — Ф. В., № 118. — Бух. I, № 41. — Пет., стр. 145. — Кауф. II, № 848. — Мил., № 42. — Гор., № 53. — Цин., № 1666. — Кауф. I, стр. 563. — Макс., № 93.



Trisetum flavescens.

Корневище ползучее, даетъ одинъ или нѣсколько прямыхъ или у основанія колѣнчато-изогнутыхъ стеблей, достигающихъ 80 см.; листья линейные, по краямъ шероховатыя, съ обѣихъ сторонъ б. или м. покрыты прижатыми волосками; язычокъ короткій, тупой, 1—2 мм. дл., часто разорванный; метелка до 20 см. дл., продолговатая, немного сжатая и часто съ слегка поникающей верхушкой, вѣтви ея шероховатыя; колоски 2—4-цвѣтковые, ось колосковъ съ одной стороны пушистая; кроющія чешуйки на спинкѣ часто съ короткими щетинками, короче прицвѣтныхъ, наружная—объ 1 жилкѣ, внутренняя—о 3; волоски у основанія прицвѣтныхъ чешуекъ короткіе; прицвѣтныя чешуйки голыя, на спинкѣ нѣсколько выше середины съ длинной остью до 7 мм. дл. Цвѣтетъ въ июнѣ, рѣже $\frac{1}{2}$ июля. По кустарникамъ и по опушкамъ лѣсовъ. Царицыно (К.).—Кунцево (Ш.).—Близъ Жуковки (М.).—Серпуховъ (Г.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Райки, Бгр. у., Отрада, Срп. у. (П.).—Тимошеево, Дмт. у., Б. Мытищи, Богородское, Мос. у. (П.).—Петраково, Дмт. у., Красниковское болото за Мытищами (С.).

1. *lutescens* Aschr. Пет. Кр. III, стр. 116.

Колоски золотисто-желтые.

3. *variegatum* Aschr. Пет. Кр. III, стр. 116.

Колоски фіолетовые или темно-желтые съ темно-фіолетовыми полосками. Б. Мытищи (П.).

45. *Deschampsia* P. B.

Колоски двучѣтковые, цвѣты колоска отдѣлены другъ отъ друга волосистымъ осевымъ колѣномъ, продолженнымъ надъ верхнимъ колоскомъ въ видѣ пущистаго стебелька; расположеніе колосковъ раскидистое, метельчатое; кроющія чешуйки неравныя, перепончатыя, почти равныя прицвѣтнымъ; наружная прицвѣтная чешуйка на верхушкѣ усѣченная, много-зубчатая, съ короткой остью, выходящей ниже середины спинки; у основанія прицвѣтныхъ чешуекъ сидятъ 6. или 8. длинныя волоски; околоцвѣтныя чешуйки ланцетныя, иногда близъ верхушки по одному краю зубчатые.

95. *D. flexuosa* Trin. Пет. Кр. III, стр. 113.—Пет., стр. 177.—Цин., № 1667.
Aira flexuosa L. Кауф. II, № 845.—Гор., № 91.—Кауф. I, стр. 560.—Дв., № 84.—Макс., № 95.—Mart., p. 15.—Hoff., № 73.—Ad., p. 39.—St. II, p. 8.—St. I, № 49.
Aera flexuosa Aschr. et Gr.

Образуетъ дерновинки съ ползучимъ корневищемъ; стебли прямостоящіе или приподнимающіеся, голые, 30—70 см.; листья сѣро-зеленые, почти щетинистые, вдоль сложенные, слегка шероховатые, съ гладкими, прижатыми влагалищами; язычокъ продолговатый, около 2 мм. дл., у нижнихъ листьевъ усѣченный, у верхнихъ заостренный; метелка въ очертаніи почти овальная, съ очень тонкими, длинными и извилистыми вѣтвями, слегка отклоненными отъ общаго цвѣтоноса; колоски около 5 мм. дл., свѣтло-бурые, иногда съ фіолетовымъ оттѣнкомъ, рѣже почти бѣлые, лоснящіеся; кроющія чешуйки съ 1 жилкой; ость колѣнчатая, длиннѣе прицвѣтной чешуйки и выступаетъ изъ колоска, основаніе ея буроватое, скрученное. Цвѣты въ іюнѣ. Серебряный боръ близъ Хорошова (К.).—Петровское-Разумовское (Шр.).—Шевелкино, Вгр. у. (П. И.).



Deschampsia flexuosa.

2. *Legei* Richt. Колоски свѣтлые, бѣловатые; кроющія чешуйки прозрачныя, серебристо-бѣлыя. Серебряный боръ.
96. *D. caespitosa* P.B. Пет. Кр. III, стр. 113.—Пет., стр. 117.—Цин., N 1668.
Aira caespitosa L. Бух. II, № 454.—Бух. I, № 418.—F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, № 844.—Pinz., p. 19.—Кауф. I, стр. 560.—Ann. C. V, № 80.—Макс., № 88.—Hoff. H., № 607.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 15.—Ad., p. 38.—St. II, p. 8.—St. I, № 48.—Pal., № 161.
Koeleria caespitosa. Дв., № 85.
Aera caespitosa Aschr. et Gr.

Образуетъ густыя дерновинки, иногда почти кочки; стебли 30—100 см., прямостоящіе, рѣже приподнимающіеся, гладкіе, иногда подъ метелкой шероховатые; листья зеленые, гладкіе или съ верхней стороны шерохо-

ватые, съ ясно выдающимися жилками, 1,5—3 мм. шпр.; язычокъ около 8 мм. дл., заостренный; метелка развѣсистая, широко-пирамидальная, съ горизонтально-отстоящими, часто извилистыми вѣтвями; колоски на короткихъ или длинныхъ ножкахъ, 4—5 мм. дл., буроватые съ фіолетовымъ оттѣнкомъ, лоснящіеся, рѣже зеленые; кроющія чешуйки острыя: наружная—5 мм. дл., съ 1 жилкой, внутренняя—около 3 мм. дл., съ 3 жилками; ость почти прямая, бѣловатая, не длиннѣе прицвѣтной чешуйки и не выступаетъ изъ колоска; прицвѣтныя чешуйки на концѣ зубчатые. Цвѣтетъ съ конца іюня, весь іюль. По лугамъ и кустарникамъ, часто.



Deschampsia caespitosa.

α. altissima Aschr.

Aira caespitosa L. *pallida* Koch. Пет. Кр. III, стр. 113. — Кауф. II, стр. 585. — Кауф. I, стр. 560.

Растеніе очень высокое; метелка съ многочисленными колосками; колоски желтовато-зеленые. Форма тѣнистыхъ мѣстъ.

46. *Arundo* Tourn.

Колоски 3—7-цвѣтковые, съ боковъ сжатые; нижній цвѣтокъ мужской или безполый, голый, всѣ остальные—обоеполые, съ длинными волосками у основанія; кроющія чешуйки короче прицвѣтныхъ, неравныя; наружная вдвое короче внутренней; наружныя прицвѣтныя чешуйки почти шиловидныя, въ 2—3 раза длиннѣе внутреннихъ; околоцвѣтныя чешуйки широкія, съ закругленной широкой верхушкой; рыльца кисточками, темно-красныя, съ довольно длинными столбиками.

97. *A. Phragmites* L. Lind., p. 178. — Дв., № 135. — Макс., № 81. — Hoff. Н., № 831. — Gold. С., p. 18. — Mart., p. 23. — Ad., p. 62. — St. II, p. 62. — St. I, № 76. — Pal., № 200.

Phragmites communis Trin. Бух. II, № 453. — Бух. I, № 422. — F. О., № 7, p. 102. — Пет., стр. 239. — Кауф. II, № 842. — Цин., № 1647. — Кауф. I, стр. 559. — Ann. С. III, № 267.

Phragmites Phragmites Karst.

Корневище толстое, ползучее, 3—4 см. толщ.; стебли прямостоящіе, голые, 1—4 метра, рѣже выше; листья плоскіе, сѣро-зеленые, 1—3 см. шпр., сверху гладкіе, снизу слабо-шероховатые, по краямъ остро-шершавые, съ длинными, прижатыми къ стеблю влагалищами; язычка нѣтъ, вмѣсто него рядъ короткихъ волосковъ; метелка большая, 15—50 см. дл., во время цвѣтенія раскидистая, потомъ съ прижатыми вѣтвями и часто съ поникающей верхушкой; вѣтви ея слегка шероховатые; колоски 6—9 мм. дл., темно-бурые или буро-фіолетовые; кроющія чешуйки продолговато-ланцетныя, заостренныя, внутреннія—длиннѣе наружной; при-

цвѣтныя чешуйки линейно-шиловидныя. Цвѣты съ $\frac{1}{2}$ іюля до средины августа. По болотамъ, берегамъ рѣкъ и прудовъ, очень часто.

47. *Molinia* Schrank.

Колоски 2—5-цвѣтковые, б. ч. съ булавовиднымъ недоразвитымъ верхушечнымъ цвѣткомъ, собраны въ длинное, прерванное, метельчатое соцветіе; кроющія чешуйки нѣсколько короче прицвѣтныхъ, съ одною



Arundo Phragmites.



Molinia coerulea.

жилкой, нѣсколько неравныя; наружная прицвѣтная чешуйка на спинкѣ округлая, выпуклая, съ 5 жилками, нѣсколько длиннѣе внутренней; ось колоска коротко-пушистая; околоцвѣтныя чешуйки косо-клиновидныя, усѣченныя, съ слабо выемчатой верхушкой; пыльники фіолетовые.

98. *M. coerulea* Moench. Пет. Кр. III, стр. 124.—Пет., стр. 225.—Кауф. II, № 867.—Мил., № 44.—Гор., № 56.—Цип., № 1648.—Кауф. I, стр. 577.—Макс., № 99.

Enodium coerulea Gaud. Дв., № 91.

Melica coerulea L. Hoff. II., № 623.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 16.

Корневище короткое, толстое, покрыто чешуйками, даетъ короткіе тонкіе побѣги; стебли 30—120 см., гладкіе, покрыты листьями только въ нижней части, прямостоящіе; листья гладкіе, рѣже слегка шероховатыя. 3—5 мм. шир., рѣже шире; влагалища гладкія; язычокъ очень короткій, съ длинными шерстистыми волосками; метелка прерванная, очень длинная, узкая, б. ч. съ прижатыми, шероховатыми вѣтвями, рѣже вѣтви слегка отклонены; колоски 6—8 мм. дл., 2—3-цвѣтковые, синевато-фіолетовые, рѣже зеленые; кроющія чешуйки до 2 мм. дл. туповатия или коротко-заостренныя; прицвѣтныя чешуйки 3—6 мм. дл. съ 3 выдающимися жилками, тоже тупыя или заостренныя. Цвѣты съ $\frac{1}{2}$ іюля. По болотамъ и на сырыхъ мѣстахъ по кустарникамъ. Больш. Мытниц (К.).—Тростенское озеро, Руз. у. (Ч. и П.).—Петровское-Разумовское (Шр.).—

Берегъ р. Сосенки близъ Черкизова, Мос. у., за Лужкамп, Серп. у. (М.).— Руза (Макс.).—Висерово оз., Бгр. (П. Н.).

α. arundinacea Aschr.

Molinia coerulea Moench *arundinacea* Schr. Цин., стр. 480.

Molinia coerulea Moench. var. *altissima* Link. Пет. Кр. III, стр. 125. — Ф. Б., № 21.—Кауф. II, стр. 603.

Достигаетъ 150 см.; листья широкіе, до 9 мм. шир.; боковыя вѣтви метелки очень длинныя, отклоненныя отъ ея оси; колоски б. ч. зеленые, рѣже слабо окрашены.

48. *Mélica* L.

Колоски 1—2-цвѣтковые, съ булавовиднымъ зачаткомъ недоразвитаго цвѣтка; кроющія чешуйки съ 3—5—7 жилками, выпуклыя, неравныя и нѣсколько короче прицвѣтныхъ; наружная прицвѣтная чешуйка заостренная, хрящеватая, вверху перепончатая, выпуклая, со многими жилками на спинкѣ; околоцвѣтныя чешуйки часто сросшіяся, округлыя, мясистыя.

99. *M. altissima* L. Пет. Кр. III, стр. 118. — Ф. Б., № 119. — Пет., стр. 223.—Кауф. II, № 852.—Гор., № 92.—Цин., № 1652.



Melica altissima.

Корневище ползучее; стебли 90—150 см., прямостоящіе или колѣнчато-приподнимающіеся, въ верхней части шероховатыя отъ внизъ обращенныхъ волосковъ; листья широкіе, до 1½ см., постепенно заостренные, шероховатыя, такъ же какъ и влагалища; язычокъ почти цилиндрической, около 4 мм. дл.; метелка цилиндрическая, до 20 см. дл., въ нижней части прерванная (если по всей своей длинѣ прерванная, то это форма: *interrupta* Rchb.); нижнія вѣтви иногда достигаютъ 5 см. дл.; колоски повислые, на короткихъ цвѣтоножкахъ въ 7—8 мм. дл.; кроющія чешуйки продолговато-яйцевидныя, неравной длины, наружная—съ 5—7 жилками длиннѣе внутренней; прицвѣтныя чешуйки кожистыя, шероховатыя, съ очень короткимъ остриемъ, наружная—съ 7 жилками; колоски бѣловатыя или съ пурпуровымъ оттѣнкомъ. Цвѣты съ конца іюня, зрѣлыя сѣмена съ начала августа. По берегамъ ручьевъ и по сырýmъ мѣстамъ между кустарниками. Близъ Серпухова (М.).—По берегу ручья, впадающаго въ Оку ниже Борисова, Серп. у. (П. и С.).—По кустамъ близъ озера въ 2 верстахъ отъ ст. Ока (С.).

100. *M. nütans* L. Бух. II, № 458.—Бух. I, № 421.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 222.—Кауф. II, № 851.—Цин., № 1653.—Pinz., p. 19.—Кауф. I, стр. 566.—Lind., p. 178.—Ann. C. V, № 81.—Дв., № 89.—Макс., № 97.—Hoff. H., № 624.—Gold, C., p. 17.—Mart., p. 16.—Ad., p. 41.—St. II, p. 8.—St. I, № 52.

Корневище ползучее, даетъ длинныя побѣги; стебли 30—60 см., шероховатые; листья около 4 мм. шир., по краямъ шероховатые, съ верхней стороны съ волосками, влагалища ихъ шероховатыя отъ обращенныхъ внизъ короткихъ щетинокъ; язычокъ очень маленький; соцветіе—однобокая кисть до 10 см. дл.; колоски повислые, на короткихъ цветоножкахъ, одиночные, 6—7 мм. дл.; кроющія чешуйки тупыя, нѣсколько короче прицвѣтныхъ, пурпурово-бурья, верхній край ихъ бѣловато-перепончатый; прицвѣтныя чешуйки тупыя, съ узкимъ бѣлымъ краемъ, зеленоватыя, съ ясными 7—9 жилками; развитыхъ цвѣтовъ въ колоскѣ 2, третій неразвитый, булавовидный, буро-желтый. Цвѣты во $\frac{2}{2}$ мая и началѣ іюня, зрѣлыя сѣмена съ конца іюня. По лѣсамъ и кустарникамъ, часто.



Melica nutans.

49. Koeléria Pers.

Колоски 2—3-цвѣтковые, сжатые съ боковъ, лоснящіеся; кроющія чешуйки почти равны прицвѣтнымъ, наружная съ одной жилкой, нѣсколько короче внутренней съ 3 жилками; прицвѣтныя чешуйки съ килемъ, безъ остей, заостренныя, съ 3 жилками; околоцвѣтныя чешуйки косо-широко-клиновидныя, часто съ выемкой, отчего кажутся 2-зубчатыми.

101. *K. cristata* Pers. Пет. Кр. III, стр. 112. — Пет., стр. 207. — Кауф. II, № 843. — Цин., № 1655. — Рупр., стр. 86. — Кауф. I, стр. 559. — Borg., p. 700. — Макс., № 100.

Catabrosa cristata. Дв., № 87.

Aira cristata (L.) Mart., p. 15.

Корневища образуютъ маленькія дерновинки; стебли 20—60 см., прямостоящіе, рѣже колѣнчато-приподнимающіеся, близъ колоска б. ч. густо и коротко-пушистые; листья зеленые, плоскіе или вдоль сложенные, по краямъ рѣсничатые, влагалища ихъ тоже коротко-пушистыя; язычокъ очень короткій, рѣсничатый; метелка продолговато-цилиндрическая, 4—15 см. дл., иногда прерванная; колоски продолговатые, 5—7 мм. дл., 2—4-цвѣтковые, бѣловато-желтые, иногда съ фіолетовымъ оттѣнкомъ, лоснящіеся; кроющія чешуйки острые, на спинкѣ шероховатые, иногда пушистыя; прицвѣтныя чешуйки тоже заостренныя. Цвѣты съ начала іюня. По сухимъ песчанымъ мѣстамъ и склонамъ, по опушкамъ лѣсовъ, иногда по известнякамъ.



Koelera cristata.

α. genuina Aschr et. Gr. Метелка густая, цилиндрическая. Между Кошелевымъ и Соколовымъ, Сил. у. (К.).—Между

Лужкамъ и Збровымъ, Срп. у. (М.).—Между Прилукамъ и Бѣлопесочкой слободой, Срп. у., Бачманово, Протопопово, Клм. у. (П.).—Ст. Коспно, М.-Ряз. ж. д. на полотнѣ (С.).

3. *pyramidata Pers.* Растеніе очень высокое; листья б. ч. плоскіе; метелка очень длинная, лопастная, въ нижней части иногда прерванная. Близъ Прилукъ, Срп. у. (С.).

102. *K. glauca D.C.* Пет. Кр. III, стр. 113.



Koeleria glauca.

Образуетъ густыя дерновинки; основаніе листьевъ и стеблей окружено тонкими волокнами отмершихъ листьевъ; стебли 30—60 см., голые, прямостоящіе; листья узкіе, сизо-зеленые, иногда почти щетинovidные, гладкіе или шероховатые; влагалища ихъ голыя; язычокъ маленькій, усѣченный; метелка продолговатая, 5—12 см. дл.; колоски около 5 мм. дл., 2—3-цвѣтковые, свѣтло-зеленые или бѣловато-желтые, слабо-лоснящіеся, сидятъ или на короткихъ ножкахъ; цвѣтоносы шероховатые; прицвѣтныя чешуйки тупыя, кончики ихъ округлые или быстро переходятъ въ очень короткое остріе. Цвѣты со середины іюня. Хотѣичи, по пескамъ р. Нерской, Бгр. у. (X.).

4. *intermedia Almq.* (опредѣлялъ К. Domin). Основаніе стеблей и пучковъ листьевъ окружено влагалищами и вздуто луковичеобразно; корневище иногда даетъ короткіе побѣги. Стебли прямоторчащіе. Листья б. ч. изогнуты серповидно, короткіе, жесткіе, ко-

лючіе. Бѣлопесочкая слобода на Окѣ по песчанымъ холмамъ, Срп. у. (X.).

50. *Dáctylis L.*

Колоски 3—5-цвѣтковые, съ боковъ сплюснутые, верхушечный цвѣтокъ часто недоразвитый; всѣ чешуйки съ острымъ килемъ; кроющія чешуйки короче прицвѣтныхъ, неравныя, съ одной жилкой, заостренныя; прицвѣтныя чешуйки заострены почти въ ость, часто неравностороннія, съ 3—5 жилками; ось колоска разламывается на части и отваливается вмѣстѣ съ цвѣтами; околоцвѣтныя чешуйки двулопастныя.

103. *D. glomerata L.* Бух. II, № 466.—Бух. I, № 430.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 175.—Кауф. II, № 868.—Цин., № 1624.—Pinz., p. 20.—Кауф. I, стр. 577.—Lind., p. 176.—Ann. C. V, № 86.—Дв., № 110.—Макс., № 112.—Hoff. H., № 694.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 20.—Hoff., № 1137.—Ad., p. 50.—St. II, p. 8.—St. I, № 60.

Образуетъ густыя дерновинки; стебли 30—120 см., прямостоящіе или у основанія колѣчато-приподнимающіеся, гладкіе; листья линейные, иногда достигаютъ 10 мм. шир., б. ч. шероховатые, особенно по срединной жилкѣ; влагалища сплюснутыя, шероховатые; язычокъ продолговатый, часто расщепленный, до 4 мм. дл.; метелка съ обращенными въ одну сто-

рону вѣтвями, косо-пирамидальная, съ колосками, собранными почти клубочками; колоски продолговато-яйцевидные, около 7 мм. дл.; наружная кроющая чешуйка на спинкѣ съ жесткими щетинками; прицвѣтныя чешуйки шероховатыя, по килю съ жесткими рѣсничками, заостренныя, рѣже кроющія и прицвѣтныя чешуйки продолжены въ короткую ость. Цвѣты съ конца мая, весь июнь и до половины июля, съмена съ начала сентября. По лугамъ и кустарникамъ, очень часто.

51. Poa L.

Колоски сплюснутые съ боковъ, мелкіе, 2—10-цвѣтковые; кроющія чешуйки съ килемъ, заостренныя, съ 1—3 жилками, почти равны прицвѣтнымъ; прицвѣтныя чешуйки тоже съ килемъ, заостренныя, по краямъ б. ч. перепончатыя, безъ остей, наружная—съ 5 жилками, у основанія покрыта б. или м. густо шерстистыми волосками; околоцвѣтныя чешуйки часто зазубренныя; зерно отваливается вмѣстѣ съ прицвѣтной чешуйкой.



Dactylis glomerata.

1. Основанія стеблей съ расширенными влагалищами, утолщены въ видѣ луковичекъ. *P. bulbosa* L.

Стебли у основанія не утолщены въ луковички. 2.

2. Язычка нѣтъ или онъ едва замѣтенъ. *P. nemorosa* L.

Язычокъ длинный или не короче 1 мм. 3.

3. Влагалища всѣхъ листьевъ остро-шершавыя. 4.

Влагалища гладкія или едва шероховатыя. 5.

4. Листья широкіе, 7—15 мм. шир., язычокъ маленькій.

P. Chaixii Vill.

Листья не шире 4 мм., язычокъ до 5 мм. дл.

P. trivialis L.

5. Стебель сплюснутый, въ разрѣзѣ эллиптическій, у нижнихъ влагалищъ съ 2 острыми клями. *P. compressa* L.

Стебель цилиндрическій или очень слабо сплюснутый, иногда съ выдающейся линіей вмѣсто кля. 6.

6. Наружныя прицвѣтныя чешуйки безъ выдающихся боковыхъ жилокъ. *P. palustris* (L.) Roth.

Наружныя прицвѣтныя чешуйки съ ясно выдающимися боковыми жилками. 7.

7. Наружная прицвѣтная чешуйка косо-усѣченная; стебли низенькіе, однолѣтніе; язычокъ у верхняго листа до 2 мм. дл., длиннѣе остальныхъ. *P. annua* L.

Наружная прицвѣтная чешуйка заостренная; стебли высокіе, многолѣтніе; язычокъ у всѣхъ листьевъ одинаковый, длиною около 1 мм. *P. pratensis* L.

104. *P. annua* L. Пет. Кр. III, стр. 119. — Бух. II, № 460. — Бух. I, № 423. — Ф. О. № 7, p. 102. — Пет., стр. 243. — Кауф. II, № 855. — Цин., № 1630. — Кауф. I, стр. 569. — Lind., p. 176. — Ann. C. IV, № 68. — Дв., № 102. — Макс., № 102. — Hoff. H., № 632. — Gold. C., p. 17. — Mart., p. 19. — Ad., p. 46—47. — St. II, p. 8. — St. I, № 57. — Pal., № 69.

Образует дерновинки; стебли 5—30 см., прямостоящие или приподнимающиеся, реже лежащие; листья гладкие или с слегка шероховатыми краями и гладкими, несколько сплюснутыми влагалищами; язычки нижних листьев короткие, едва достигают 1 мм. дл., усеченные; язычок верхнего листа продолговатый, заостренный, до 2 мм. дл.; метелка не крупная, пирамидальная, несколько однобокая, до 8 см. дл., с отстоя-



Poa annua.



Poa bulbosa.

щими, часто отогнутыми книзу и в одну сторону ветвями; колоски 3—5-цветковые, около 3 мм. дл., зеленые, реже с фиолетовым оттенком; кроющие чешуйки острые или туповатые, неравные, с перепончатым краем; прицветники — у основания слегка шерстистые, туповатые, с широким перепончатым краем и выдающимися жилками. Цветы с середины мая до осени. Около жилья по огородам, по садам на дорожках, очень часто.

- α. polystachya* Kauffm. Пет. Кр. III, стр. 119. — Кауф. II, стр. 596. — Кауф. I, стр. 570.

Колоски крупные, 6—9-цветковые. На высохшем торфяном болоте близ Никольскаго (К.).

105. *P. bulbosa* L. Пет. Кр. III, стр. 120. — Пет., стр. 243. — Кауф. II, № 856. — Цин., № 1626. — Рупр., стр. 88. — Кауф. I, стр. 570. — Дв., № 96. — Макс., № 106. — Mart., p. 18.

Стебли прямостоящие, 10—30 см., у основания утолщены в виде луковичек; все растение сизо-зеленое; листья почти щетиновидные, вдоль сложенные, на стебле иногда плоские, гладкие, как и влагалища, или по

краймъ шероховатые; язычокъ продолговатый, до 3 мм. дл., метелка продолговатая или яйцевидная, до и послѣ цвѣтенія съ прикатыми вѣтвями, около 8 см. дл.; вѣточки расположены по 2—3 вмѣстѣ, шероховатые; колоски около 6 мм. дл., продолговато-яйцевидные, 4—6-цвѣтковые, зеленые или съ фіолетовымъ оттѣнкомъ; кроющія чешуйки около 4 мм. дл., заостренныя, на спинкѣ шероховатые; прицвѣтныя — обильно-шерстистыя, ланцетныя, заостренныя. Цвѣты съ $\frac{2}{2}$ мая до половины іюня. У насъ чаще встрѣчается:

- α. vivipara* L. Всѣ колоски обращены въ луковичеобразныя почки. По опушкамъ лѣсовъ и на песчаной почвѣ. Влѣзъ Симонова монастыря (Кар. и П.).—Кунцево, Воробьевы горы (Мар.).—Боровскій курганъ, Бри. у. (X.).—Ст. Вирлево, Павелецкой жел. дор. (Куль.).

106. *P. nemoralis* L. Пет. Кр. III, стр. 121.—Пет., стр. 244.—Кауф. II, № 861.—Цин., № 1629.—Pinz., p. 20.—Кауф. I, стр. 573.—Ann. C. V, № 82.—Дв., № 105.—Макс., № 103.—Hoff. H., № 653.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 19.—Ad., p. 48.—Lon., p. 282.

Poa nemorosa L. Lind., p. 176.

Образуетъ дерновинки и даетъ короткіе побѣги; стебли слабыя 30—90 см., листья узкіе, не шире 2 мм., гладкіе или слегка шероховатые такъ же, какъ и влагалища; язычокъ очень короткій или его нѣтъ; метелка продолговатая, часто съ поникающей верхушкой, во время цвѣтенія съ раскидистыми, потомъ прижатыми, шероховатыми вѣтвями; колоски 2—5-цвѣтковые, 4—6 мм. дл., продолговатые, зеленые, часто съ буроватымъ или фіолетовымъ оттѣнкомъ; кроющія чешуйки ланцетныя, заостренныя; прицвѣтныя чешуйки ланцетныя, туповатыя, рѣже заостренныя, въ нижнихъ $\frac{2}{3}$ по спинкѣ, и по краямъ коротковолосистыя. Цвѣты съ $\frac{2}{2}$ іюня, весь іюль, иногда въ $\frac{1}{2}$ августа, зрѣлыя сѣмена съ $\frac{2}{2}$ іюля. По лѣсамъ и торфянымъ болотамъ, часто.



Poa nemoralis.

- α. vulgaris* Gaud. Пет. Кр. III, стр. 122.—F. O. № 7, p. 102.—Кауф. II, стр. 600.—Кауф. I, стр. 574.

Колоски 1—2-цвѣтковые.

3. *firmula* Gaud. Пет. Кр. III, стр. 122.—Бух. II, № 464.—Бух. I, № 428.—F. O. № 7, p. 102.—Кауф. II, стр. 600.—Кауф. I, стр. 574.

Колоски 3—5-цвѣтковые; влагалища гладкія.

- γ. *rigidula* herb. Goldb. Пет. Кр. III, стр. 122.—F. O. № 7, p. 102, Кауф. II, стр. 600.—Кауф. I, стр. 576.

Poa serotina Schrad. Макс., № 104.

Колоски 3—5-цвѣтковые; влагалища, особенно у нижнихъ листьевъ, шероховатые.

δ. *vivipara*. Все колоски превращены въ луковицеобразныя почкп.
По берегу р. Сестры, противъ Бирева, Кн. у. (П. и С.).¹

107. *P. palustris* (L.) Roth. Пет. Кр. III, стр. 192. — Дв., № 104. — Макс., № 109. — Mart., p. 19.

Poa fertilis Host. F. O. № 7, p. 102. — Кауф. II, № 862. — Кауф. I, стр. 574. — Макс., № 109.

Poa serotina Ehrh. Пет., стр. 244. — Цин., № 1628. — Gold. C., p. 17. — Ad., p. 45.

Образуетъ дерновники; стебли 30—60 см., прямостоящіе или пзъ лежащаго основанія приподнимающіеся, у основанія часто вѣтвистые; листья не шире 3 мм., шероховатые, рѣже почти гладкіе; язычокъ длинный, до 3 мм. дл., заостренный; метелка съ остро-шершавыми, отстоя-



Poa palustris.



Poa compressa.

щими, рѣже прижатыми вѣтвями; колоски яйцевидно-ланцетные, около 5 мм. дл., 3—7-цвѣтковые, желтовато-зеленые, иногда съ буроватыми или фиолетовыми краями; кроющія чешуйки ланцетныя, около 3 мм. дл., заостренныя; прицвѣтныя—почти голыя или на спинкѣ и по краямъ только до половины покрыты короткими волосками. Цвѣты со середины іюня. По сырымъ мѣстамъ и около рѣкъ. Иваново, Кусково (П.).—Мож. у. (Ф. О.).

108. *P. compressa* L. Пет. Кр. III, стр. 121. — Бух. II, № 463. — Бух. I, № 427. — F. O. № 7, p. 102. — Пет., стр. 243. — Кауф. II, № 860. — Цин., № 1627. — Кауф. I, стр. 573. — Lind., p. 176. — Ann. C. V, № 85. — Дв., № 103. — Hoff. II, № 640. — Gold. C., p. 17. — Mart., p. 19. — Ad., p. 47. — St. II, p. 8. — St. I, № 58.

Даетъ длинныя побѣги; стебли б. ч. колѣнчато-приподнимающіеся, 20—80 см., сплюснутые вмѣстѣ съ влагалищами; листья 2—5 мм. шир., гладкіе или шероховатые, сѣровато-зеленые; верхній стеблевой листъ короче своего влагалища; язычокъ короткій, усѣченный, рѣдко достигаетъ 3 мм. дл.; метелка продолговатая, во время цвѣтенія съ отстоящими, по-

томъ прижатыми, шероховатыми вѣтвями; колоски продолговато-яйцевидные, около 4 мм. дл., 5—8, рѣже 11-цвѣтковые, зеленые, или край чешуекъ съ буроватымъ или фіолетовымъ оттѣнкомъ; кроющія чешуйки ланцетныя, нѣсколько неравныя, на спинкѣ шероховатыя; прицвѣтныя—ланцетныя, туповатыя, съ перепончатыми краями и у основанія съ небольшимъ количествомъ шерстистыхъ волосковъ. Цвѣты съ конца іюня, іюль и $\frac{1}{2}$ августа. По открытымъ мѣстамъ, лугамъ и на пескѣ.

a. typica Aschr. et Gr. Растеніе 20—45 см.; метелка около 5 см. дл.; колоски 5—8-цвѣтковые. Пункино, Снаеское; Денисьево, Зви. у., Подольскъ (К.).—Протопоново, Кзм. у., Хотѣичи, Бгр. у. (П.).—Павшино, Мос. у. (Х.).

3. Langiana Koch. Пет. Кр. III, стр. 121.—Кауф. II, стр. 599.—Кауф. I, стр. 573. Болѣе высокое растеніе, 50—80 см.; листья до 5 мм. шир.; язычокъ до 3 мм. дл.; метелка большая, до 10 см. дл.; колоски 8—11-цвѣтковые. Близъ Иванькова (К.).—Молоди, Пдл. у. (Ч.).—Мытищи, Пушкино (С.).

109. *P. Chaixii* Vill. Пет. Кр. III, стр. 120.

Poa sudetica Haenke. Пет., стр. 243.—Кауф. II, № 858.—Цин., № 1633.—Кауф. I, стр. 571.—Дв., № 101.—Макс., № 105.—Пфф. II, № 667.—Mart., p. 18.—Ad., p. 46.—Lon., p. 282.

Poa quadripedalis Ehrh. Ann. C. V, 83.

Poa silvatica Vill.

Образуетъ густыя дерновинки и иногда даетъ побѣги; стебли высокіе, 50—150 см., шероховатые; листья быстро заострены и стянуты въ колпачокъ, широкіе, 7—15 мм. шир., по краямъ шероховатые такъ же, какъ и влагалища; язычокъ очень маленкій, тупой, до 1 мм. дл.; метелка до 25 см. дл., раскидистая; нижнія вѣточки сидятъ по 4—5; колоски 3—5-цвѣтковые, 8—9 мм. дл., зеленые, рѣже съ фіолетовымъ оттѣнкомъ; кроющія чешуйки ланцетныя, около 4 мм., неравной длины и ширины; прицвѣтныя чешуйки съ сильно выдающимися шероховатыми жилками, у основанія слегка шерстистыя. По сырымъ лѣсамъ. Цвѣты въ іюнѣ.

a. remota Fries. Пет. Кр. III, стр. 121.—Кауф. II, стр. 597.—Цин., стр. 477.—Кауф. I, стр. 571.

Poa laxa Aschr. et Gr.

Метелка съ очень длинными, развѣсистыми вѣтвями, верхушка ея поникающая; нижніе листья длинно-заостренные. Горенки (Юндеев. герб. Гольдбаха).—По дорогѣ къ Звенигороду (Макс.).—Лосинный Островъ (Л.).—Въ канавѣ близъ Раверской дорожки (М.).—Шевелкино, Бгр. у. (П. И.).



Poa Chaixii.

110. *P. trivialis* L. Пет. Кр. III, стр. 120.—Бух. II, № 462.—Бух. I, № 425.—
 F. O. № 7, p. 120.—Пет., стр. 243.—Кауф. II, № 857.—
 Цил., № 1632.—Кауф. I, стр. 570.—Lind., p. 176.—Дв.,
 № 97.—Макс., № 108.—Hoff. H., № 671.—Gold. C., p. 17.—
 Mart., p. 18.—Ad., p. 44.—St. II, p. 8.—St. I, № 54.—
 Pal., № 167.

Образует дерновники безъ побѣговъ; стебли 30—90 см., прямостоя-
 щіе, цилиндрическіе, шероховатые; листья до 4 мм. шир., плоскіе, съ
 килемъ, остро-шероховатые такъ же, какъ и нѣсколько сплюснутое вла-
 галище; язычокъ заостренный, до 5 мм. дл.; метелка съ шероховатыми,
 раскидистыми вѣтвями, продолговато-пирамидальная; колоски около 4 мм.
 дл., широко-яйцевидные, 2—4-цвѣтковые, зеленые, часто съ буроватымъ



Poa trivialis.



Poa pratensis.

или фиолетовымъ оттѣнкомъ; кроющія чешуйки 2—3 мм. дл., неравной
 длины; прицвѣтныя чешуйки продолговато-ланцетныя, острые, у основа-
 нія съ шерстью, на спинкѣ и по краямъ съ серебристыми волосками и
 ясными жилками. Цвѣты въ $\frac{1}{2}$ іюня, весь іюль. По лугамъ и тѣнистымъ
 мѣстамъ.

α. vulgaris Rebh.

Poa trivialis L. *coarctata* Kauffm. Пет. Кр. III, стр. 120.—Бух. II, № 461.—
 Бух. I, № 425.—Кауф. II, стр. 597.—Кауф. I,
 стр. 571.

Poa trivialis L. *mosquensis*, Hoff. H.

Нижнія вѣточки метелки сидятъ по 5; метелка частая; колоски
 6, ч. 3-цвѣтковые. Плесково, Пдл. у. (В.).—Новый Іерусалимъ,
 Звенигородъ, Воробьевы горы (II.).—Мытищи, Пушкино; берегъ
 Троицкого озера, Руз. у. (С.).

3. *effusa* Aschr. et Gr. Нижнія вѣточки въ метелкѣ по 5, сильно удли-
 ненныя, отстоятъ почти горизонтально; метелка не густая. Лосин-
 ный Островъ, тѣневая форма (II.).

γ. *semineútra* Trin.

Poa trivialis L. *microstachya* Kauffm. Пет. Кр. III, стр. 120. — Бух. II, № 461. — Бух. I, № 425. — Кауф. II, стр. 597. — Кауф. I, стр. 571.

Колоски 1—2-цветковые. Близъ Зюзина (К.). — Подольскъ, каменистомъ (В.).

δ. *multiflora* Rehb.

Poa trivialis L. *elatior* Kauffm. Пет. Кр. III, стр. 120. — Кауф. II, стр. 597. — Кауф. I, стр. 571.

Нижнія вѣточки метелки короткія, сидятъ по 8—11, пзъ которыхъ нѣкоторыя несутъ колоски почти отъ основанія; стебель высокій, достигаетъ 1 метра. Иваньково; Воскресенскъ, Звн. у. (К.).

111. *P. pratensis* L. Пет. Кр. III, стр. 121. — Бух. II, № 462. — Бух. I, № 426. — Ф. О. № 7, р. 102. — Пет., стр. 244. — Кауф. II, № 859. — Цин., № 1631. — Pinz., р. 20. — Кауф. I, стр. 572. — Lind., р. 176. — Ann. V, № 84. — Дв., № 99. — Макс., № 107. — Hoff. II., № 657. — Gold. C., р. 17. — Mart., р. 18. — Hoff., № 2535. — Ad., р. 44—45. — St. II, р. 8. — St. I, № 56. — Pal., № 168.

Даетъ длинныя побѣги; стебли 20—100 см., б. ч. цилиндрическіе, рѣже слегка сплюснутые, гладкіе; листья плоскіе или щетиновидные, свернутые, не шире 4 мм., б. ч. гладкіе, рѣже на спинкѣ слегка шероховатые; влагалища цилиндрическія, рѣже съ маленькимъ килемъ; язычокъ короткій, усѣченный, около 1 мм. дл.; метелка пирамидальная, до 20 см. дл., вѣтви ея шероховатыя, нижнія по 4—5; колоски 5—6 мм. дл. ищевидные, 3—5-цветковые, зеленые или съ фіолетовымъ оттѣнкомъ; кроющія чешуйки почти одинаковой длины, около 4 мм.; прицвѣтныя чешуйки продолговатыя, заостренныя, съ довольно ясными пушистыми жилками и обильной шерстью. Цвѣты съ конца мая до середины іюля. По лугамъ и кустарникамъ, рѣже по сухимъ торфянымъ болотамъ. У насъ различаются слѣдующія формы:

α. *vulgaris* Aschr. et Gr.

β. *Léjeunii* Dum. (sp.).

- γ. *angustifolia* Sm. Пет. Кр. III, стр. 121. — Бух. II, № 461. — Бух., I, № 426. — Кауф. II, стр. 598. — Кауф. I, стр. 572. — Макс., № 107.

Poa angustifolia L. Дв., № 100. — Hoff. II., № 631. — Mart., р. 18. — St. I, № 55.

- δ. *strigosa* Hoffm. Пет. Кр. III, стр. 121. — Кауф. II, стр. 599. — Кауф. I, стр. 572. *Poa strigosa* Hoffm. Дв., № 98. — Макс., № 107. — Mart., р. 18.

- ε. *pubescens* Goldb. Пет. Кр. III, стр. 121. — Бух. II, № 462. — Бух. I, № 426. — Кауф. II, стр. 599. — Кауф. I, стр. 572.

1. Стебли и листья покрыты пушкомъ.

pubescens Goldb. (*hirtula* Aschr. et Gr.).

Стебли и листья голые. 2.

2. Всѣ листья плоскіе. 3.

Всѣ листья или только корневые щетиновидные, свернутые. 4.

3. Стебли достигаютъ 60—80 см.; листья широкіе; колоски зеленые.

vulgaris Aschr. et Gr.

Растеніе средней величины; листья узкіе; колоски съ темно-фіолетовымъ оттѣнкомъ.

Lejeunii Dum. (sp.).

4. Стеблевые листья плоскіе, корневые—щетиновидные.

angustifolia Sm.

Всѣ листья щетиновидные.

strigosa Hoffm.

52. Briza L.

Колоски почти сердцевидные, широкіе, сплюснутые съ боковъ, 5—9-цвѣтковые; кроющія чешуйки съ 3 жилками, почти равныя, сильно-выпуклыя, у основанія почти сердцевидныя, короче прицвѣтныхъ; прицвѣтныя чешуйки тоже сильно выпуклыя, со многими жилками, наружная—внизу съ сердцевидными ушками, охватываетъ внутреннюю; околоцвѣтныя чешуйки продолговатыя, иногда съ одного края лопаются или зубчатыя.

112. **B. média** L. Пет. Кр. III, 119. — Бух. II, № 459. — Бух. I, № 423. — F. O. № 7, p. 102. — Пет., стр. 149. — Kayf. II, № 854. — Цин., № 1622. — Pinz., p. 19. — Kayf. I, стр. 568. — Lind., p. 176. — Ann. C. IV, № 67. — Дв., № 109. — Макс., 110. — Hoff. II., № 680. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 20. — Hoff., № 539. — Ad., p. 50. — St. II, p. 8. — St. I, № 59. — Pal., № 175.

Корневище даетъ короткіе побѣги; стебли примостоящіе, 20—70 см., рѣже основаніе ихъ приподнимающееся; листья шехероватые, до 4 мм. шир., влагалища ихъ гладкія; язычокъ очень короткій, усѣченный; метелка пирамидальная съ горизонтально отстоящими, гладкими вѣтвями; колоски почти сердцевидные, 5—7 мм. дл.; кроющія чешуйки обратно-яйцевидныя, около 3 мм. дл.; прицвѣтныя чешуйки яйцевидно-сердцевидныя; колоски зеленовато-бѣлые или чаще фіолетовые, края ихъ зеленовато-бѣлые. Цвѣты со середины іюня до середины іюля, зрѣлыя сѣмена съ конца іюля. По лугамъ и кустарникамъ, часто.



Briza media.

α. *typica* Aschr. et Gr. Колоски фіолетовые или буро-фіолетовые, края ихъ зеленовато-бѣлые.

β. *albida* Lejeune. Всѣ колоски зеленовато-бѣлые.

53. Catabrosa P. B.

Колоски маленькіе, сплюснутые, б. ч. 2-цвѣтковые; кроющія чешуйки много короче прицвѣтныхъ, наружная много короче внутренней, на верхушкѣ выемчатая; внутренняя много шире наружной, на верхушкѣ

округлая или съ слегка волнисто-выемчатый край; наружная прицветная чешуйка на спинѣ округлая, но съ сильно выдающимися срединной и двумя боковыми жилками, между которыми съ каждой стороны еще по одной жилкѣ, но слабо выдающейся; верхушка чешуйки нежно 3-зубчатая; околоцветныя чешуйки яйцевидныя, туповатыя; листовыя влагалища полукрѣпытыя.

113. *C. aquática* P.B. Ист. Кр. III, стр. 124. — Мос., № 50. — Ист., стр. 163. — Цин., № 1649. — Дв., № 88.

Glyceria aquatica Presl. Кауф. II, № 866. — Pinz., p. 20. — Кауф. I, стр. 576. — Ann. C. II, № 166. — Макс., № 926.

Aira aquatica L. Hoff. II., № 603. — Gold. C., p. 17. — Mart., p. 16. — Ad., p. 38. — St. II, p. 8. — St. I, № 47.

Корневина ползучая, съ побѣгами; стебли съ лежащими или коленчато-приподнимающимся основаніемъ, прямостоящіе, въ узлахъ часто укореняющіеся, 20—70 см.; листья 4—7 мм. шир., быстро заостренные или туповатыя, гладкіе, рѣже слегка шероховатыя; влагалища гладкія, до половины раскрытыя; язычокъ яйцевидный, до 4 мм. дл., тупой, рѣже заостренный; метелка 20—30 см. дл., съ гладкими, во все стороны обращенными вѣтвями, послѣ цвѣтенія иногда опущенными внизъ; колоски до 3 мм. дл., продолговато-яйцевидныя, зеленые или съ фіолетовымъ оттѣнкомъ, 1—3-цвѣтковые; кроющія чешуйки неравныя, въ 2 раза короче прицвѣтныхъ. Цвѣты съ половины іюня и весь іюль. По болотамъ и канавамъ. Покровское, Петрово, Гальево, Кусково (К.). — Симоновъ монастырь, Лужники; Бѣлые Колодези, Кал. у. (П.). — Мытищи (С.). — Вилки, Бри. у., с. Перемисово, Дир. у., часть колосковъ съ 3 общими цвѣтами (X.).



Catabrosa aquatica.

54. *Glyceria* R. Br.

Колоски 3—многоцвѣтковые, продолговатыя или цилиндрическія; кроющія чешуйки на спинѣ округлыя, съ 1—3 жилками, неравныя, короче прицвѣтныхъ; наружныя прицвѣтныя чешуйки тоже на спинѣ округлыя, тупыя, на концѣ часто округлыя, съ ясными 5—9, чаще всего съ 7 жилками, но жилкамъ б. ч. шероховатыя, верхній край перепончатый; внутреннія прицвѣтныя чешуйки на спинѣ вдоль волнистыя и по ихъ краямъ коротко-пушистыя; околоцветныя чешуйки малыя, узколанцетныя, сросшіяся; листовыя влагалища по всей длинѣ закрытыя.

114. *G. fluitans* R. Br. Ист. Кр. III, стр. 123. — Бух. II, № 465. — Бух. I, № 429. — F. O. № 7, p. 102. — Пет., стр. 196. — Кауф. II, № 864. — Цин., № 1644. — Кауф. I, стр. 575. — Lind., p. 178. — Дв., № 108. — Макс., № 923.

Poa fluitans Scop. Hoff. II., № 647. — Gold. C., p. 17. — Mart., p. 18.

Festuca fluitans L. Ad., p. 43—44. — St. II, p. 8. — St. I, № 67. — Pal., № 184.

Корневище ползучее, даетъ побѣги; стебли 40—120 см., прямостоящіе съ приподнимающимся основаніемъ; листья плоскіе, 5—10 см. шпр., постепенно заостренные, б. ч. шероховатые, особенно съ нижней стороны; влагалища гладкія или слегка шероховатые; язычокъ туповатый, до 5 мм. дл., часто расщепленный; метелка длинная съ вѣтвями, обращенными въ одну сторону, до и послѣ цвѣтенія прижатыми къ оси метелки; колоски длинно-цилиндрическіе, до 2 см. дл., 7—11-цвѣтковые, свѣтло-зеленые; цвѣты въ колоскѣ нѣсколько отдалены другъ отъ друга; кроющія чешуйки очень маленькія, кожистыя; прицвѣтныя чешуйки въ 3 раза длиннѣе ширины, заостренные, съ бѣлымъ перепончатымъ краемъ и ясно выдающимся жилками. Цвѣты съ $\frac{1}{2}$ іюня до половины іюля, зрѣлыя сѣмена съ $\frac{2}{2}$ іюля. По берегамъ рѣкъ и ручьевъ, очень часто.



Glyceria fluitans.

115. *G. aquatica* Wahlb. Пет. Кр., стр. 122.

Glyceria spectabilis M. et K. Пет., стр. 196.—Кауф. II, № 863.—Цив., № 1645.—Кауф. I, стр. 575.—Ann. C. III, № 268.—Макс., № 924.

Poa aquatica L. Дв., № 95.—Hoff. H., № 633.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 17.—Hoff., № 2530.—Ad., p. 43.—St. II, p. 8.—St. I, № 53.

Корневище длинное, ползучее; стебли высокіе, достигаютъ 2 метр., прямостоящіе, толстые; листья плоскіе, б. ч. шероховатые, до 14 мм. шпр.; влагалища съ килемъ, шероховатые; язычокъ усѣченный или закругленный, короткій, до 3 мм. дл.; метелка большая, часто съ поникающей верхушкой, развѣсистая во все стороны; вѣтви ея и ось шероховатые; колоски продолговатые, до 8 мм. дл., 5—8-цвѣтковые, зеленые, потомъ бурые, часто съ фіолетовымъ оттѣнкомъ; цвѣты нѣсколько удалены другъ отъ друга; кроющія чешуйки 2—3 мм. дл., туповатые или заостренные; прицвѣтныя—продолговатые, туповатые, съ ясными 7 жилками, шероховатые и съ узкимъ перепончатымъ краемъ. Цвѣты съ конца іюня до середины августа. По берегамъ рѣкъ. Мытищи—Яуза; Выково, Бри. у. (С.).—Лужки, Сри. у., Серпуховъ, Серебряный боръ близъ Хорошова (Ш.).—Успенское, Звн. у. (Х.).



Glyceria aquatica

α. arundinacea (M. B.) Aschr.

Glyceria spectabilis M. et K. *gracilis* Kauffm. Кауф. II, стр. 691.—Кауф. I, стр. 575.

Метелка рѣдкая, сильно поникающая; колоски 3—5-цвѣтковые. Братцово (К.).

55. *Atropis* Griseb.

Колоски маленькіе, 3—7-цвѣтковые, продолговатые; кроющія чешуйки съ 1—3 жилками, перепончатые, неравныя, короче прицвѣтныхъ; наружная прицвѣтная чешуйка на свѣжѣ выпуклая, съ 5 слабо замѣтными жилками, близь верхушки перепончатая; околоцвѣтныя чешуйки не сросшіяся; листовыя влагалища открыты почти по всей своей длинѣ.

116. *A. distans* Griseb. Пет. Кр. III, стр. 123.—Пет., стр. 144.—Цвл., № 1641.

Glyceria distans Wahlb. Кауф. II, № 865.—Кауф. I, стр. 576.—Макс., № 925.

Poa distans L. Дв., № 106.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 19.—Ad., p. 49.

Корневище дернистое; стебли 15—50 см., гладкіе, прямостоящіе или колѣнчато-приподнимающіеся; листья около 3 мм. шир., шероховатые; влагалища нѣсколько вздутыя, открытыя почти до основанія; язычокъ короткій, усѣченный, около 2 мм. дл.; метелка рѣдкая, не длиннѣе 10 см., съ вѣточками, обращенными во всѣ стороны и послѣ цвѣтенія отогнутыми внизъ; колоски линейно-ланцетные, около 5 мм. дл., 4—7-цвѣтковые, зеленые, иногда съ фіолетовымъ оттѣнкомъ; кроющія чешуйки неравной длины, тупыя, срединная жилка не доходить до края; прицвѣтныя чешуйки продолговато-яйцевидныя, съ 5 неясными жилками, на концѣ съ мелкими зубчиками, у основанія покрыты разсѣянными, короткими волосками. Цвѣты въ іюнѣ, зрѣлыя сѣмена въ іюлѣ. По канавамъ и по берегамъ рѣкъ. Воробьевы горы (Ген.).



Atropis distans.

56. *Scolóchloa* Link.

Колоски нѣсколько сплюснутые, 3—5-цвѣтковые; кроющія чешуйки почти равныя: наружная съ 3, внутренняя съ 5 жилками; у основанія прицвѣтныхъ чешуекъ спадать б. или м. длинныя волоски; наружная прицвѣтная чешуйка съ 7 жилками, на верхушкѣ съ 3 зубцами, срединъ зубецъ похожъ на остъ; внутренняя—на концѣ 2-зубчатая, по жилкамъ съ густыми рѣсничками; околоцвѣтныя чешуйки зубчатые или съ боковой лопастью; зерно на верхушкѣ пушистое, съ желобкомъ.

117. *S. festucácea* Link. Пет. Кр. III, стр. 118.—Пет., стр. 272.—Цвл., № 1646.

Donax borealis Trin. Ф. Б., № 120.—Кауф. II, № 853.—Гор., № 55.—Кауф. I, стр. 567.—Gold. C., p. 18.

Festuca borealis. M. et K. Макс., № 116.

Arundo borealis. Hoff. H., № 824.

Arundo festucacea W. Макс., № 116.

Graphephorum arundinaceum Aschr.

Корневище ползучее; стебли прямостоящие, до 1,5 метра, слегка шероховатые, в нижней части съ прижатыми, не цвѣтущими вѣтвями; листья 6—12 мм. шир., плоскіе, длинно-заостренныя, остро-шершавые, особенно по краймъ; язычокъ продолговатый, до 6 мм. дл., часто разорванный; метелка большая, до 40 см. дл., развѣсистая; вѣтви шероховатыя, нижнія—



Scolochloa festucacea.

достигаютъ 15 см. дл., каждая несетъ не болѣе 9 колосковъ; колоски продолговатые, 7—10 мм. дл.; кроющія чешуйки продолговатыя, заостренныя почти въ остъ; прицвѣтныя чешуйки продолговатыя, нѣсколько длиннѣе кроющихъ. Цвѣты съ $\frac{1}{2}$ іюня, почти весь іюль. По берегамъ озеръ и прудовъ. Три горы, Горенки (Гольдб.).—Серебряный боръ близъ Хорошова, близъ Новодѣвичьяго монастыря (К.).—Тростенское озеро, Руз. у. (Ф. О.).—Медвѣжки озера, Мос. у. (И.).

57. *Festuca L.*

Колоски 3—много-цвѣтковые, сжатые съ боковъ; кроющія чешуйки короче прицвѣтныхъ: наружная—большею частью съ 1, внутренняя—съ 3 жилками, на спинкѣ съ килемъ; наружныя прицвѣтныя чешуйки на спинкѣ округлыя, большею частью съ 5 жилками и со срединной, сильно выступающей наподобіе кили; верхушки чешуекъ заостренныя, часто переходятъ въ остъ; внутреннія прицвѣтныя чешуйки на верхушкѣ 2-зубчатыя, съ 2 жилками, по жилкамъ рѣсничатыя; околоцвѣтныя чешуйки кожистыя, часто сросшіяся основапіями, двулопастныя съ неравными лопастями.

1. Прицвѣтная чешуйка съ длинной остью, вдвое превышающей самую чешуйку. *F. gigantea Vill.*

Прицвѣтная чешуйка безъ ости или съ короткой остью, не длиннѣе половины чешуйки. 2.

2. Всѣ листья плоскіе, широко-линейные. 3.
Всѣ листья щетиновидные или узко-линейные. 4.
3. Колоски эллиптическіе, ланцетные; чешуйки линейно-ланцетныя, тонко-заостренныя; язычокъ длинный. *F. silvatica Vill.*

Колоски продолговатые; чешуйки продолговато-ланцетныя, съ сухимъ, бѣловатымъ, перепончатымъ кончикомъ; язычокъ короткій. *F. pratensis Huds.*

4. Всѣ листья щетиновидные, большею частью свернутые; образуетъ дерновинки безъ побѣговъ. *F. ovina L.*

Стеблевые листья узко-линейные, плоскіе; даетъ ползучіе побѣги. *F. rubra L.*

118. *F. ovina* L. Пет. Кр. III, стр. 125. — Бух. II, № 468. — Бух. I, № 434. — Пет., стр. 188. — Кауф. II, № 870. — Цин., № 1607. — Кауф. I, стр. 579. — Анн. С. IV, № 70. — Дв., № 112. — Макс., № 113. — Hoff. II, № 742. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 20. — Hoff., № 1367. — Ad., p. 53. — St. II, p. 8. — St. I, № 62.

Все растение сѣро-зеленое или зеленое, образуетъ густыя дерновники, состоящія изъ цвѣтущихъ стеблей и пучковъ листьевъ; стебли прямостоящіе, очень рѣдко основаніемъ приподнимающіеся, 15—60 см., гладкіе или у основанія метелки шероховатые; листья узкіе, часто щетиновидные, 0,4—1 мм. шир., вдоль сложенные или свернутые, гладкіе или шероховатые; язычокъ очень короткій, не превышающій 1 мм., съ маленькими ушками; метелка узкая, часто однобокая, до и послѣ цвѣтенія съ прижатыми вѣтвями, ось и вѣточки ея большею частью шероховатые; колоски яйцевидные или продолговатые, 5—7 мм. дл., 3—6-цвѣтковые, зеленые или грязно-фіолетовые; кроющія чешуйки неравныя, 2,5—3 мм. дл., заостренныя; прицвѣтныя чешуйки часто шероховатые, съ неясными жилками; линейно-ланцетныя, заостренныя или вытянутыя въ короткую ость; завязь голая. Цвѣты съ начала іюня до начала іюля. По открытымъ мѣстамъ, лугамъ и кустарникамъ, особенно пышно развивается на песчаной почвѣ, часто.



Festuca ovina α. genuina. *Festuca ovina* β. duriuscula.

- α. *genuina* Hackel. Стебель 15—30 см., тонкій; листья щетиновидные, шероховатые, 0,4—0,5 мм. шир., съ 5 жилками; метелка продолговатая, нижнія ея вѣточки въ 3 раза короче всей метелки; колоски 4—6 мм. дл.; прицвѣтныя чешуйки 3—3,5 мм. дл.

- β. *duriuscula* (L.) Koch. Пет. Кр. III, стр. 125. — F. O., № 8, p. 118. — Кауф. II, стр. 606. — Цин., стр. 469. — Кауф. I, стр. 579.
Festuca duriuscula L. Дв., № 113. — Макс., № 114. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 20. — Ad., p. 53. — St. II, p. 8. — St. I, № 64.

Стебель высокій, достигаетъ 70 см., гладкій, такъ же какъ и листья, достигающіе 0,6—1 мм. шир.; колоски 6—10 мм. дл.; прицвѣтныя чешуйки 4—6 мм. дл.

- 119, *F. rubra* L. Пет. Кр. III, стр. 125. — Бух. II, № 469. — Бух. I, № 435. — F. O., № 8, p. 118. — Пет., стр. 188. — Кауф. II, № 871. — Цин., № 1609. — Кауф. I, стр. 579. — Lind., p. 176. — Дв., № 114. — Макс., № 115. — Hoff. II, № 752. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 21. — Ad., p. 54. — St. II, p. 8. — St. I, № 63.

Даетъ б. или м. длинныя побѣги и образуетъ не густыя дерновинки; стебли гладкіе, 40—90 см.; листья болѣею частью гладкіе, съ 5—9 жилками, щетиновидные, свернутые или иногда плоскіе; нижніе стеблевые очень маленькіе, почти чешуйчатые; верхніе, сидящіе не выше средины стебля, длинныя; влагалища тоже болѣею частью гладкія: метелка во время цвѣтенія развѣсистая, съ одной или двумя нижними вѣточками; колоски 8—11 мм. дл., 4—6-цвѣтковые, съ фіолетовымъ или синеватымъ



Festuca rubra.



Festuca pratensis.



Festuca pratensis β. subspicata.

оттѣнкомъ; кроющія чешуйки неравной длины: прицвѣтныя—шероховатыя или иногда покрыты б. или м. длинными волосками, заостренныя, переходятъ въ б. или м. длинную ость. Цвѣты съ начала іюня до средины іюля. По кустамъ и лѣснымъ опушкамъ, часто.

α. *vulgaris* Gaud. Листья узкіе, около 0,7 мм. шир., щетиновидные; метелка рѣдкая; колоски 7—8 мм. дл.; чешуйки гладкія или шероховатыя.

β. *barbata* Hackel. Пер. Кр. III, стр. 125.

Festuca rubra L. *arenaria* Osbeck. F. O., № 8, p. 118. — Кауф. II, стр. 606. — Кауф. I, стр. 580.

Походитъ на *vulgaris*, но чешуйки покрыты б. или м. длинными волосками. Дорога изъ Иванькова въ Братцово (К.).

γ. *planifolia* Trautv. Листья плоскіе, стеблевые—до 2,5 мм. шир.; чешуйки, особенно по краямъ, съ длинными волосками. Мытищи (С.).

120. *F. pratensis* Huds. Пер. Кр. III, стр. 126. — Дв., № 115. — Hoff. II., № 748. — Mart., p. 21. — Ad., p. 54.

Festuca elatior L. Бух. II, № 471. — Бух. I, № 433. — F. O., № 8, p. 118. — Пер., стр. 188. — Кауф. II, № 873. — Цян., № 1610. — Кауф. I, стр. 580. — Дв., № 116. — Hoff. II., № 721. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 21. — Hoff., № 1365. — Ad., p. 55. — St. II, p. 8. — St. I, № 65.

Иногда даютъ короткіе побѣги; стебли 40—100 см., гладкіе, часто съ приподнимающимся основаніемъ, большею частью несутъ 3 стеблевыхъ листа; листья слегка шероховатые, 3—5 мм. шир., у основанія съ маленькими ушками; влагалища гладкіи; язычокъ очень короткій; метелка во время цвѣтенія раскидистая, до и послѣ цвѣтенія сжатая; нижнія вѣточки съ 4—6 колосками и одна вѣточка съ 1—2 колосками; колоски продолговатые или ланцетные, 9—11 мм. дл., 3—12-цвѣтковые, желтовато-зеленые или съ фіолетовымъ отблѣскомъ; кроющія чешуйки ланцетныя, съ бѣловатымъ сухимъ краемъ; прицвѣтныя чешуйки ланцетныя, съ слабыми жилками и бѣлымъ перепончатымъ краемъ. Цвѣтетъ весь іюнь. По лугамъ и кустарникамъ, часто.

2. *typica* Hackel. Нижнія вѣточки метелки несутъ 3—6 колосковъ, только одна изъ нихъ съ 1 или 2 колосками.

3. *subspicata* Aschr. et Gr. Пет. Кр. III, стр. 126.

Festuca pseudololiacea Fr.

Метелка линейная; всѣ вѣточки метелки, а также и нижнія 1-колосковыя, рѣже нѣкоторыя съ 2 колосками. Серебряный боръ близъ Хорошова (П.).—Клещевскій лѣсъ, Клн. у., Игнатьево, Клм. у. (П. и С.).

121. *F. gigantea* Vill. Пет. Кр. III, стр. 125.—Бух. II, № 470.—Бух. I, № 432.—F. O., № 8, p. 118.—Пет., стр. 188.—Кауф. II, № 872.—Цин., № 1612.—Кауф. I, стр. 580.—Ann. C. V, № 87.—Макс., № 117.

Bromus giganteus L. Дв., № 124.—Hoff. H., № 774.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 22.—Hoff., № 547.—Ad., p. 59.—St. I, № 73.

Стебли высокіе, 60—125 см., у основанія часто приподнимающіеся, гладкіе, съ 3—5 стеблевыми листьями; листья широко-линейные, 5—15 мм. шир., съ нижней стороны и по краямъ шероховатые, у основанія съ ушками; метелка развѣсистая, часто поникающая; вѣточки очень тонкія, поникающія; колоски 3—9-цвѣтковые, 10—13 мм. дл., линейно-ланцетные, свѣтло-зеленые; кроющія чешуйки линейныя, заостренныя, неравныя, 5—7,5 мм. дл.; прицвѣтныя чешуйки широко-ланцетныя, съ неясными 5 жилками, на спинкѣ шероховатые, на концѣ съ бѣлымъ перепончатымъ краемъ; ость длинная, извилистая, выходитъ близъ верхушки чешуйки. Цвѣты съ конца іюня до начала августа, зрѣлыя сѣмена съ конца іюля. Часто по сырымъ лѣсамъ. Иваново, Кунцово, Соколово, Киреево, Семеновское, Братцово (К.).—Воробьевы горы (П.).—Мытниця (С.).—Дарьино, Звин. у., Новый Іерусалимъ (Х.).



Festuca gigantea.

122. *F. silvática* Vill. Пет. Кр. III, стр. 126. — Пет., стр. 188. — Кауф. II, № 874. — Гор., № 10. — Цин., стр. 471. — Lind., p. 176.

Дать короткіе побѣги: корневище короткое, горизонтальное, покрыто чешуйками; стебли 70—150 см., прямостоящіе, часто поникающіе, гладкіе или слегка шероховатые, внизу съ бѣловатыми чешуйчатыми влагалищами, большею частью съ 3 стеблевыми листьями; листья 6—14 мм. шир., длинно-заостренные, шероховатые; влагалища открыты почти до основанія, шероховатыя; метелка большая, яйцевидная, 10—20 см. дл., раскидистая, съ гладкими вѣточками; колоски эллиптическіе, 2—5-цвѣтковые, 6—7 мм. дл., зеленые или желто-зеленые; ось колоска извиллстая, шершавая; кроющія чешуйки неравныя, 2.5—4 мм. дл., тонко-заостренные, линейно-ланцетныя; прицвѣтныя чешуйки слегка шероховатыя, линейно-ланцетныя, тонко-заостренные, съ сильно выдающейся срединной жилкой и двумя боковыми у края чешуйки. Цвѣты съ половины іюня, весь июль. Большія Мытищи—Лосинный Островъ (С.).

58. *Cynosúrus* L.

Колоски двухъ родовъ: безиолые, состоящіе изъ линейно-ланцетныхъ чешуекъ, расположенныхъ гребенчато-перисто-двурядно, и плодущіе, 3—5-цвѣтковые, съ боковъ сплюснутые и сидящіе на ножкахъ; кроющія чешуйки равныя, почти равны прицвѣтнымъ, заострены почти



Festuca silvatica.



Cynosurus cristatus.

въ остъ, на спинкѣ съ жилкѣ; прицвѣтныя чешуйки съ 3—5 жилками, на спинкѣ округлыя, заостренные въ короткую остъ или на верхушкѣ выемчатые и въ выемкѣ съ остью; околоцвѣтныя чешуйки 2-лопастныя съ неравными лопастями.

123. *C. cristatus* L. Бух. II, № 467. — Бух. I, № 431. — F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 174. — Кауф. II, № 869. — Цин., № 1606. — Pinz., p. 20. — Кауф. I, стр. 578. — Ann. C. IV, № 69. — Дв., № 111. — Макс., № 111. — Hoff. II, № 691. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 20. — Ad., p. 51. — St. II, p. 8. — St. I, № 61.

Стебли прямостоящие 20—60 см., гладкие, какъ и влагалища, иногда только кончикъ листа шероховатый; язычокъ очень короткій, едва достигаетъ 1 мм. дл., усѣченный, по бокамъ съ ушками; соцветіе линейное, 2—7 см. дл., двурядное, ось его извилистая; вѣточки во время цвѣтенія отклонены, каждая вѣточка несетъ плодущіе и безплодные колоски; чешуйки безплодныхъ колосковъ линейныя, острые, на спинкѣ шероховатыя; плодущіе колоски зеленые, до 3 мм. дл.; кроющая чешуйка заострена почти въ остъ; прицвѣтныя—съ короткой остью. Цвѣты съ начала іюня, зрѣлыя сѣмена въ концѣ іюля. По лугамъ и кустарникамъ, часто.

59. *Brómus* L.

Колоски нѣсколько сплюснутые, многоцвѣтковые, крупные; кроющая чешуйка неравная, короче прицвѣтныхъ; наружныя прицвѣтныя чешуйки съ 5—7 жилками, большею частью травянистыя, на спинкѣ округлыя, рѣже съ килемъ, по верхнему краю перепончатые, на верхушкѣ двузубчатые и между зубцовъ съ прямой или отогнутой остью, рѣже безъ ости; внутреннія прицвѣтныя чешуйки съ двумя жилками, по жилкамъ рѣбчатые; околоцвѣтныя чешуйки кожистыя, обратно-яйцевидныя; рыльца выходятъ по бокамъ завязи, а не изъ верхушки; завязь на верхушкѣ большею частью пушистая.

1. Влагалища листьевъ голыя. 2.

Влагалища листьевъ покрыты б. или м. густыми волосками. 3.

2. Наружная кроющая чешуйка съ 1, внутренняя—съ 3 жилками.

B. inermis Leyss.

Наружная кроющая чешуйка съ 3—5, внутренняя—съ 7—9 жилками.

B. secalinus L.

3. Наружная кроющая чешуйка съ 1, внутренняя—съ 3 жилками. 4.

Наружная кроющая чешуйка съ 3—5, внутренняя—съ 7—9 жилками. 7.

4. Колоски клиновидные, къ основанію сужены; метелка развѣсистая, потомъ поникающая. 5.

Колоски въ средней своей части наиболѣе широкіе; метелка большею частью съ прижатými вѣтвями, прямостоящая, иногда потомъ поникающая. 6.

5. Колоски покрыты мягкими волосками.

B. tectorum L.

Колоски безъ волосковъ.

B. sterilis L.

6. Метелка прямоторчащая, съ прижатыми вѣтвями; листья узколинейные; влагалища съ рѣдкими волосками; язычокъ большею частью разорванный. *B. erectus* Huds.

Метелка поникающая; листья широкіе, плоскіе, до 1,5 см. шир.; язычокъ цѣльный; влагалища густо покрыты отстоящими волосками. *B. ramosus* Huds.

7. Колоски голые. *B. arvensis* L.

Колоски б. или м. густо покрыты волосками. 8.

8. Метелка уже во время цвѣтенія сжатая; прицвѣтныя чешуйки въ зрѣломъ колоскѣ прилегаютъ одна къ другой и черепичато покрываютъ однѣ другія; ость прямая или нѣсколько извилистая. *B. mollis* L.

Метелка лишь по отцвѣтаніи сжата и вѣточки ея отклонены въ одну сторону; наружныя прицвѣтныя чешуйки въ зрѣломъ колоскѣ расходятся и не прилегаютъ одна къ другой; ость отогнута кнаружи. *B. patulus* M. et K.

124. *B. ramósus* Huds.

Bromus asper Murr. Пет. Кр. III, стр. 127.—Бух. II, № 472.—Ф. Б., № 122.—Пет., стр. 150.—Кауф. II, № 875.—Цин., № 1613.—Рупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 582.—Нолл., № 544.

Корневище даетъ короткіе побѣги; стебли прямостоящіе, 60—150 см., слегка шероховатые; листья широкіе, до 1,5 см. шир., плоскіе, острошершавые; у основанія съ короткими ушками; влагалища, особенно нижнее, покрыты внизъ обращенными щетинистыми волосками; язычокъ яйцевидный, тупой, до 2 мм. дл.; метелка развѣсистая, поникающая, 15—20 см. дл., съ остро-шершавыми, отогнутыми вѣтвями; колоски ланцетные, 4—9-цвѣтковые, зеленые; кроющія чешуйки ланцетныя, заостренныя въ ость, длиною безъ остей до 16 мм., шероховатая, особенно вдоль жилки, по краямъ съ длинными прижатыми волосками; ость до 10 мм. дл. Цвѣты во $\frac{2}{3}$ іюня до средины іюля, зрѣлыя сѣмена съ конца іюля. По лѣсамъ и по склонамъ, покрытымъ лѣсомъ. Братцово (К.).—Куново (II и Ч.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Воробьевы горы (II и С.).—Мытищи—Лосинный Островъ; Барановка—близъ ст. Мухино. Руз. у., Останкино (С.).—Новый Іерусалимъ (Х.).



Bromus ramosus.

125. *B. eréctus* Huds. Пет. Кр. III, стр. 129.—Пет., стр. 150.—Кауф. II, № 876.—Гор., № 93.—Цин., № 1604.

Очень рѣдко даетъ короткіе побѣги; стебли прямостоящіе, 30—100 см., гладкіе; листья узколинейные, часто свернутые съ верхней стороны, такъ же какъ и влагалища, покрыты рѣдкими, отстоящими волосками, иногда у основанія по краямъ съ рѣдкими рѣсничками; язычокъ корот-

кий, разорванный; метелка узкая, съ прижатými вѣтвями, несущими 1—3 колоска; колоски ланцетные, 5—7-цвѣтковые, желто-зеленые; кроющія чешуйки ланцетные, длинно-заостренныя; прицвѣтныя чешуйки ланцет-



Bromus erectus.



Bromus inermis.

ныя, съ ясными 5—7 жилками, по жилкамъ остро-шершавыя, такъ же какъ и кроющія чешуйки, переходятъ въ остъ, болышую часть равную $\frac{1}{2}$ чешуйки. Цвѣты $\frac{2}{2}$ июня и $\frac{1}{2}$ июля. Петровское-Разумовское (Шр.).

126. *B. inermis* Leyss. Пет. Кр. III, стр. 127.—Бух. II, № 473.—Бух. I, № 436.—F. O., № 8, p. 118.—Пет., стр. 149.—Кауф. II, № 877.—Цин., № 1615.—Pinz., p. 20.—Кауф. I, стр. 582.—Lind., p. 176.—Ann. C. II, № 167.—Дв., № 120.—Hoff. II, № 777.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 22.—Ad., p. 57—58.—St. II, p. 8.—St. I, № 187.—Pal., № 187.

Festuca inermis D.C. Макс., № 118.

Корневище длинно-ползучее, даетъ длинныя побѣги; стебли прямо-стоящія, 30—100 см., гладкіе; листья 5—8 мм. шир., голые, по краямъ остро-шершавые, рѣже съ рѣдкими рѣсничками; влагалища голыя, рѣже съ рѣдкими волосками; язычокъ продолговатый, часто нѣсколько длиннѣе 2 мм.; метелка короткая и широкая; колоски 3—10-цвѣтковые, зеленые, съ фиолетовымъ или буроватымъ оттенкомъ; прицвѣтныя чешуйки до 12 мм. дл. широко-ланцетныя, тупыя или заостренныя иногда въ короткую остъ, голыя, по краямъ коротко рѣсничатыя, рѣже сильно покрыты короткими волосками. Цвѣты $\frac{2}{2}$ июня и $\frac{1}{2}$ июля. зрѣлыя сѣмена съ 1-го июля. По лугамъ, кустарникамъ и около жилья, часто.

- α. aristatus* Kauffm. (Schur). Пет. Кр. III, стр. 127.—Бух. II, № 473.—Бух. I, № 436.—Кауф. II, стр. 610.—Кауф. I, стр. 582.

Прицвѣтныя чешуйки съ длинной остью въ 2—3 мм. дл. Иваньково (К.).—Михайловское, Пдл. у. (В.).—Мытщи (С.).—Колонецъ, Брн. у.; платформа 17-я верста, Брянск. ж. д. (X.).

3. *pubescens* Kauffm. Пет. Кр. III, стр. 127.—Кауф. II, стр. 610.—Кауф. I, стр. 583.

Прицветные чешуйки вдоль жилкок пушистые. Найдено доктором Эвансом и находится в гербарии Гольдбаха.

B. sterilis L. посѣтъ Максимовича нѣкъмъ болѣе найдено не было.

127. *B. tectorum* L. Пет. Кр. III, стр. 127.—Ф. Б., № 123.—Пет., стр. 150.—Кауф. II, № 878.—Цин., № 1616.—Рупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 583.—Дв., № 122.—Макс., № 126.—Mart., p. 22.—Hoff., № 565.—Ad., p. 58—59.—St. I, № 72.



Bromus tectorum

Стебли 15—50 см., прямостоящие или колючато-приподнимающиеся, в верхней части коротко-пушистые, сидят пучкомъ; листья 3—8 мм. шир., коротко-волосистые, шероховатые, по краямъ съ рѣсничками; влагалища покрыты короткими, курчавыми волосками; язычокъ 1—3 мм. дл., расщепленный; метелка развѣсистая, съ вѣтвями, обращенными часто въ одну сторону; вѣтви длинныя, до 10 см. дл., очень коротко-пушистыя; колоски до 1,5 см. дл., 4—10-цвѣтковые, линейно-клиновидные, зеленые или пурпурово-фиолетовые; кроющія чешуйки 8—12 мм. дл., ланцетныя, съ широкимъ перепончатымъ краемъ; прицветныя чешуйки около 12 мм. дл., ланцетныя, покрыты волосками или только шероховатые, съ неясными жилками, съ широкимъ перепончатымъ краемъ и длинною, достигающею 2 см., остро-шершавою остью. Цвѣты съ конца іюля.

Близъ устья р. Сѣтунн (III.). — Лопасня, ж.-д. мостъ (II.). — Быково, Брн. у. (Куль.).


128. *B. secalinus* L. Пет. Кр. III, стр. 128.—Бух. II, № 476.—Бух. I, № 438.—F. O., № 8, p. 118.—Пет., стр. 149.—Кауф. II, № 882.—Цин., № 1621.—Кауф. I, стр. 584.—Lind., p. 176.—Ann. C. I, № 61.—Дв., № 117.—Макс., № 121.—Hoff. II, № 790.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 21.—Hoff., № 560.—Ad., p. 55—56.—St. II, p. 8.—St. I, № 68.

Растетъ пучками; стебли 40—100 см., прямостоящие, рѣже колючато-приподнимающиеся, гладкіе; листья шероховатые, 5—10 мм. шир., покрыты, особенно съ верхней стороны, б. или м. густо волосками или почти голые; влагалища почти голыя, съ сильно выдающимися продольными жилками; язычокъ короткій, часто разорванный; метелка большая, узкая, съ вверхъ торчащими вѣтвями, потому нѣсколько поникающая; вѣтви ея остро-шершавыя; колоски 5—15-цвѣтковые, 2—2,5 см. дл., обратно-яйцевидно-ланцетные, зеленые или желто-зеленые; кроющія чешуйки 5—7 мм. дл.: наружная—ланцетная, внутренняя—почти яйцевидная, туповатая; прицветныя чешуйки 8—11 мм. дл., продолговатыя или яйцевидно-ланцетныя, тѣныя или слегка заостренныя, съ 2 тупыми зуб-

чиками на концѣ, зеленые, съ бѣлыми перепончатыми краями, во время плодоношенія заворачивающимися внутрь; ость короткая, часто извилистая,



Bromus secalinus.



Bromus arvensis.

выходить близъ верхушки чешуйки, иногда ей нѣтъ. Цвѣты съ начала іюля, зрѣлыя сѣмена съ конца іюля. По посѣвамъ и паровымъ полямъ.

2. submuticus Hagenbach. Пет. Кр. III, стр. 129.

Bromus secalinus L. muticus. Hoff., № 560.

Прицвѣтныя чешуйки безъ остей. Пушкнно (С.).—Косино; за Хмѣтьевымъ, Клин. у. (П.).

129. B. arvensis L. Пет. Кр. III, стр. 128.—Бух. II, № 474.—Бух. I, № 437.—F. O., № 8, p. 118.—Пет., стр. 150.—Кауф. II, № 880.—Цив., № 1618.—Кауф. I, стр. 534.—Lind., p. 176.—Ann. C. III, № 269.—Дв., № 123.—Макс., № 124.—Hoff. H., № 764.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 22.—Hoff., № 543.—Ad., p. 58.—St. II, p. 8.—St. I, № 71.

Bromus arvensis L. multiflorus. Макс., № 124.

Bromus multiflorus Weig. Дв., № 118.—Mart., p. 21.—St. II, p. 8.

Корневине даетъ пучокъ примостоящихъ или у основанія колѣнчато-приподнимающихся стеблей, достигающихъ 1 метра; листья 6—10 мм. шир., по краямъ шероховатые, покрыты рѣдкими, курчавыми волосками, рѣже почти голые; влагалища, особенно нижнее, мягко-пушисты; язычокъ до 2 мм. дл., большею частью разорванный; метелка большая, до 20 см. дл., во время цвѣтенія развѣтвистая, потомъ часто поникающая, вѣточки ея очень длинныя, тонкія, острошершавыя; колоски 1,5—3,5 см. дл., ланцетные, 5—10, рѣже 15-цвѣтковые, зеленые съ фиолетовымъ отѣнкомъ, рѣже все фиолетовые; кроющія чешуйки 4—5—6 мм. дл., ланцетныя, заостренныя; прицвѣтныя чешуйки широко-ланцетныя, на концѣ съ 2 зубчиками, по жилкамъ шероховатыя, съ длинной, достигающей 9 мм., остро-шершавой остью. Цвѣты съ начала іюля, зрѣлыя сѣмена съ конца іюля. По лугамъ, посѣвамъ и паровымъ полямъ, часто.

130. *B. mollis* L. Пет. Кр. III, стр. 128.—Бух. II, № 475.—Бух. I, № 439,—
F. O., № 8, p. 118.—Пет., стр. 150.—Кауф. II, № 881.—Цин.
№ 1617.—Кауф. I, стр. 584.—Lind., p. 176.—Ann. C. I, № 62.—
Дв., № 119.—Макс., № 122.—Hoff. H., № 781.—Gold. C.,
p. 18.—Mart., p. 22.—Hoff., № 554.—Ad., p. 56—57.—St. II.
p. 8.—St. I, № 69.—Pal., № 186.

Bromus hordeaceus L.



Bromus mollis.

Растетъ пучками; стебли 10—60 см., прямостоящіе или колѣнчато-приподнимающіеся, листья до 6 мм. шир., слегка шероховатые, покрыты длинными, нѣсколько курчавыми волосками; влагалища бархатисто-пушисты; язычокъ короткий, б. ч. расщепленный; метелка узкая, прямостоящая, сжатая, съ короткими вѣточками, покрытыми длинными волосками; колоски около 2 см. дл., 6—10-цвѣтковые, зеленые; кроющія чешуйки 6—8 мм. дл., внутренняя широко-яйцевидная; прицвѣтныя чешуйки яйцевидно-эллиптическія, 9—10 мм. дл., на концѣ съ 2 зубчиками, б. или м. густо покрыты мягкими волосками, зеленые, съ сильно выдающимися жилками и бѣлымъ перепончатымъ краемъ; ость до 10 мм. дл. Цвѣты съ середины іюня, зрѣлыя сѣмена съ половины іюля. По сырымъ лугамъ и дорогамъ. Тушино, Иваново; Хотьково, Дмит. у. (К.).—За Дорогомиловской заставой (Ш.).—Кунцово, Николо-

Угрешскій монастырь, Саввинскій монастырь, Измайловскій звѣринецъ (П.).—Мытищи—близъ Рупосова (С.).

131. *B. patulus* M. et K. Пет. Кр. III, стр. 129.—Пет., стр. 150.—Кауф. II, № 879.—Гор., № 94.

Bromus multiflorus Host, *Bromus japonicus* Thunb.



Bromus patulus.

Растетъ пучками; стебли 15—50 см., прямостоящіе или колѣнчато-приподнимающіеся, голые; листья 1,5—5 мм. шир., слегка шероховатые, покрыты длинными, курчавыми волосками; влагалища тоже покрыты курчавыми, часто отогнутыми книзу, довольно длинными волосками; язычокъ короткий; метелка во время цвѣтенія раскидистая, потомъ обращена въ одну сторону, съ нѣсколько извилистыми, поникающими, шероховатыми вѣточками; колоски продолговато-ланцетные, до 2,5 см. дл., 6—12-цвѣтковые; кроющія чешуйки 6—7 мм. дл., внутренняя — продолговато-яйцевидная; прицвѣтныя чешуйки эллипческо-ланцетныя, иногда почти ромбическія, около 9 мм. дл., на концѣ съ 2 острыми зубчиками, сѣро-зеленые съ широкой, бѣлой, перепончатой каймой и мало выдающимися

жилками: ость выходитъ близъ верхушки наружной чешуйки, отогнута кнаружи, у верхнихъ цвѣтовъ до 12 мм. дл., у нижнихъ много короче, иногда только въ видѣ острія. Цвѣты съ середины июня, весь июль; зрѣлыя съмена съ конца июля. У насъ пока только форма:

α. velutinus Parl. Пет. Кр. III, стр. 129.

Чешуйки густо покрыты мягкими, довольно длинными волосками. По известникамъ Оки подъ Карапчевымъ и Протопоповымъ, Калм. у. (П.).

60. *Brachypodium* P. B.

Колоски сидятъ на короткихъ толстыхъ ножкахъ, 6—многоцвѣтковые, слегка сплюснутые; кроющія чешуйки на спинкѣ округлы, неравной длины: наружная—съ 3—5 жилками, внутренняя—съ 6—7 жилками; наружная прицвѣтная чешуйка переходитъ въ короткую ость, на спинкѣ округлая, съ 7 жилками; внутренняя прицвѣтная чешуйка съ 2 жилками, по жилкамъ жестко-рѣбчатая; околоцвѣтныя чешуйки съ рѣбчиками; завязь голая или пушистая, съ рыльцемъ, выходящимъ изъ ея верхушки.

132. *B. pinnatum* P. B. Пет. Кр. III, стр. 129.—Ф. Б., № 124.—Пет., стр. 148.—Кауф. II, № 883. — Мил., № 45. — Гор., № 57.—Цив., № 1604.—Кауф. I, стр. 585.

Bromus pinnatus L., Дв. № 125.

Festuca pinnata Moench. Макс., № 20.

Festuca pinnata Schrad. Hoff., № 745.

Корневище ползучее; стебли прямостоящіе, рѣже колѣнчато-приподнимающіеся, 50—100 см., голые, только на узлахъ покрыты густыми волосками; листья 5—13 мм. шир., б. ч. разсѣянно-волосистые, остро-шершавые; влагалища голые или покрыты волосками; язычокъ около 2 мм. дл., тупой, часто разорванный; колосъ двурядный, до 15 см. дл., прямоторчащій; колоски линейные, 8—20-цвѣтковые, 2—3 см. дл., иногда нѣсколько дугообразно согнутые, сидятъ такъ, что покрываютъ одинъ другой; кроющія чешуйки ланцетныя или линейно-ланцетныя, 7—9 мм. дл., шероховатыя; прицвѣтныя чешуйки продолговато-ланцетныя или линейно-ланцетныя, заостренныя, очень рѣдко усѣченныя, 9—11 мм. дл., покрыты волосками и по краямъ рѣбчатая; ость 2—7 мм. дл. Цвѣты съ начала июня. По кустарникамъ и лѣснымъ склонамъ. Мякнино; Денисьево, Зви. у. (Гольдб.). — Близъ Серпухова (М.).—Прилуки. Сри. у. (П.).—Ромашково, Серебряный боръ близъ Хорошова; противъ Краснаго стана, Руз. у.; Невѣрово. Калм. у.; Бѣлые Колодези. Калм. у. (П.).—Сѣтунь. Хаваниха, между Ромашковымъ и Черкизовымъ (Н.).



Brachypodium pinnatum.

133. *B. silvaticum* Roem. et Schult. Пет. Кр. III, стр. 130.—Бух. II, № 477.—
Ф. Б., № 125.—Бух. I, № 440.—Пет.,
стр. 148.—Кауф. II, № 884.—Гор., № 95.—
Цин., № 1605.

Bromus silvaticus Host. Hoff., № 564.

Bromus gracilis Weig. Hoff., № 564.

Образует густыя дерновники; стебли 50—120 см., прямостоящие или у основания колычато-приподнимающиеся, на узлахъ съ длинными, густыми волосками; листья мягкіе, плоскіе, 6—10



Brachypodium silvaticum.

мм. шпр., вдоль жилокъ съ рѣдкими волосками; влагалища б. или м. густо покрыты обращенными внизъ волосками; язычокъ до 4 мм. дл., тупой; колосъ двурядный, рѣдкій, поникающій; колоски 17—25 мм. дл., узкіе, прямые, 6—12-цвѣтковые, свѣтло-зеленые; кроющія чешуйки 10—12 мм. дл., узко-ланцетныя, на спинкѣ шероховатыя; прицвѣтныя чешуйки 11—12 мм. дл., узко-ланцетныя, постепенно заостренныя, голыя или покрыты рѣдкими волосками, по краямъ рѣсничатыя; ость длинная, у конечныхъ цвѣтовъ равна или превышаетъ длиною прицвѣтную чешуйку. Цвѣты съ начала іюня, зрѣлыя съмена съ начала августа. По лѣсамъ. Лѣсъ близъ Колодкина, Вер. у. (Экс. Бот. Лаб.).—Сokolovo (К. и П.).—Мытищи—Лосинный

Островъ (С.).—Измайловскій звѣринецъ; Новѣрово, Кал. у., Бѣлые Колодези. Кал. у. (П.).—Между Утпцей и Семеновымъ и между Колычевымъ и Зап. нымъ, Мож. у. (Ф. Б.).—Малинки и Грачевники, Идл. у. (Б.).—Петровское-Разумовское (Шр.).

61. *Triticum* L.

Колоски 3—5-цвѣтковые, б. ч. сплюснутые, сидятъ на выступахъ колычатою осн колоса; верхній цвѣтокъ въ колоскѣ б. ч. безплодный; кроющія чешуйки почти равныя, кожистыя. уже прицвѣтныхъ, притупленныя или вытянутыя въ остріе, рѣже въ ость; наружная прицвѣтная чешуйка кожистая, на спинкѣ округлая, на верхушкѣ съ остію или быстро заострена и иногда загнута или же срезана, съ 5—7 жилками, изъ которыхъ средняя выдается какъ бы килемъ; внутренняя прицвѣтная чешуйка по двумъ ея жилкамъ рѣсничатая, короче наружной; околоцвѣтныя чешуйки рѣсничатыя.

1. Колосъ 4-гранный, черепичатый.

T. vulgare L.

- Колосъ двурядный. 2.

2. Колоски отогнуты отъ осн почти подъ прямымъ угломъ, сидятъ гребенчато; колосъ сплюснутый.

T. cristatum Schreb.

Колоски прижаты къ осп. 3.

3. Кроющія чешуйки тупыя, часто усѣченныя.

T. intermedium Host.

Кроющія чешуйки б. ч. заостренныя, иногда продолжены въ ость. 4.

4. Колосъ длинный, тонкій, съ поникающей верхушкой; наружная прицвѣтная чешуйка всегда вытнута въ тонкую, слегка пзвил-листую ость, нѣсколько длиннѣе самой чешуйки.

T. caninum L.

Колосъ прямой, торчащій; наружная прицвѣтная чешуйка туповатая или заостренная, съ остью или безъ ости, но ость всегда короче чешуйки. 5.

5. Кроющія чешуйки тупыя или острые, длиннѣе $\frac{1}{2}$ колоска; все растеніе зеленое или сѣро-зеленое.

T. repens L.

Кроющія чешуйки равны $\frac{1}{2}$ или короче $\frac{1}{2}$ колоска, туповатыя или слегка заостренныя, съ широкимъ перепончатымъ краемъ; все растеніе всегда спзо- или сѣро-зеленое.

T. intermedium Host a. *campestre* Aschr. et Gr.

134. **T. caninum** L. Пет. Кр. III, стр. 131.—Бух. II, № 479.—F. O., № 8, p. 118.—Пет., стр. 295.—Кауф. II, № 887.—Цин., № 1595.—Кауф. I, стр. 587.—Ann. C. V, № 88.—Hoff. II, № 872.—Gold. C., p. 18.—Ad., p. 69—70.

Agropyrum caninum P.B. Дв., № 139.—Макс., № 131.

Elymus caninus L. Mart., p. 24.—Hoff., № 1266.—St. II, p. 9.—St. I, № 80.—Pal., № 206.

Образуетъ дерновинки безъ ползучихъ побѣговъ; стебли 1—2 метра. прямостоящіе или у основанія колѣнчато-приподнимающіеся, гладкіе.

Рѣже близъ верхушки шероховатые; листья плоскіе, шероховатые, сверху сѣро-зеленые, снизу темно-зеленые, лоснящіеся; язычокъ очень короткий; колосъ длинный, часто поникающій, до 20 см. дл.; членики осп колоса по гранямъ съ короткими щетинистыми рѣсничками; колоски прилегаютъ къ осп, ланцетные, около 18 мм. дл., 3—6-цвѣтковые, свѣтло-зеленые; кроющія чешуйки ланцетныя, 9—10 мм. дл., съ 3—5 жилками; наружная—съ длинною остью до 3 мм. дл., внутренняя—безъ ости или съ такой же остью; прицвѣтныя чешуйки около 11 мм. дл., съ 5 жилками и съ нѣсколько пзвилистой остью, достигающей 25 мм. дл. Цвѣты съ середины іюня до середины іюля, зрѣлыя сѣмена съ конца іюля.

По лѣсамъ и кустарникамъ. Ивановское, Перерва, Соколово, Спасское (К.).—Спасское, Дмт. у. (Ш.).—Михайловское, Идл. у. (Б.).—Мытищи.—Лосинный Островъ, Царцыно (С.). Куркино и



Triticum caninum.

Соколово по р. Ухидиѣ. Воробьевы горы (П.).—Невѣрово, Кзм. у., платформа 17 версты, Брянск. ж. д. (X.).

135. **T. répens L.** Пет. Кр. III, стр. 131.—Бух. II, № 478.—Бух. I, № 441.—F. O., № 8, p. 118.—Пет., стр. 295.—Кауф. II, № 885.—Цин., № 1596.—Кауф. I, стр. 586.—Hoff. H., № 895.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 26.—Hoff., № 3350.—Ad., p. 70.—St. II, p. 9.—St. I, № 87.—Pal., № 219.

Agropyrum repens P.B. Дв., № 140.—Макс., № 130.



Triticum repens.

Корневище ползучее, даёт длинные побѣги: стебли прямостоящіе или у основанія приподнимающіеся; листья плоскіе или свернутые, съ верхней стороны б. ч. остро-шершавые; влагалища голыя, гладкія; язычокъ очень короткій; колосъ длинный, достигаетъ 20 см., прямо-стоящій; колоски яйцевидно-ланцетные или широко-яйцевидные, 8—17 мм. дл., 2—5—10-цвѣтковые, свѣтло-зеленые, рѣдко съ слабымъ фіолетовымъ оттѣнкомъ; кроющія чешуйки 7—9 мм. дл., превышаютъ $\frac{1}{2}$ длины всего колоска, ланцетныя, заостренныя, съ 5 жилкамъ, часто переходятъ въ ость; прицвѣтныя чешуйки ланцетныя, до 11 мм. дл., туповатыя или заостренныя въ ость; ось колоска остро-шершавая. Цвѣты съ средины іюня до середины іюля, зрѣлыя сѣмена съ на-

чала сентября. По лугамъ и около жилья, часто. У насъ встрѣчаются слѣдующія формы:

1. Влагалища голыя. 2.

Нижнее влагалище покрыто внизъ обращеннымъ волоскамъ.

caesium C. Bolle.

2. Все растеніе спозо- или сине-зеленое. (Бѣлопесочная слобода, Срн. у., П. и X.).

glaucescens A. Engler.

Все растеніе зеленое. 3.

3. Прицвѣтныя чешуйки тупыя или заостренныя.

vulgáris Döll (рис. I).

Прицвѣтныя чешуйки переходятъ въ б. или м. длинную ость. 4.

4. Ость короткая.

subulátum Schreb. (рис. II).

Ость равна $\frac{2}{3}$ чешуйки или еще длиннѣе.

Leersiánum Rchb. (рис. III).


136. **T. intermédium Host.** Пет. Кр. III, стр. 130.

Triticum rigidum Schrad. Пет., стр. 293.—Кауф. II, № 886.—Мил., № 46.—Гор., № 96.—Цин., № 1598.

Triticum glaucum L. Кауф. II, стр. 616.

Triticum elongatum Host. Кауф. II, стр. 616.

Корневище ползучее съ короткими побѣгами; все растеніе сизо- или сѣро-зеленое; листья 4—7 мм. шир., плоскіе или свернутые, только на концѣ слабо-шероховатые; влагалища б. ч. голыя, гладкія; колосъ прямо-торчащій, часто прерванный, достигаетъ 20 см. дл.; колоски прижатые къ оси. 7—20 мм. дл., 3—7-цвѣтковые; кроющія чешуйки продолгато-



Triticum intermedium a. campestre.



Triticum cristatum.

овальные или овально-линейныя, 6—8 мм. дл., часто усѣченные, длиною б. ч. менѣ $\frac{1}{2}$ всего колоска; прицвѣтныя чешуйки 7—10 мм. дл., совершенно тупыя, усѣченные, съ широкимъ краемъ, иногда быстро переходятъ въ очень короткое остріе. У насъ пока только форма:

- a. campéstre Aschr. et Gr.** Стебли не высокіе, б. ч. примостоящіе; листья съ верхней стороны остро-шершавые, плоскіе; колосъ частый; кроющія чешуйки равны $\frac{1}{2}$ всего колоска, нѣсколько заостренные, часто съ яснымъ остріемъ и срединной жилкой, выдающейся почти килемъ. Цвѣты въ іюнѣ. На пескахъ близъ Придубукъ, Сри. у. (К.).—Карапчеево, Кзм. у. (П.).

137. T. cristatum Schreb. Пет. Кр. III, стр. 131.—Ф. Б., № 26.

Стебли примостоящіе или у основанія колѣнчато-приподнимающіеся. 30—60 см., листья узкіе, до 4 мм. шир., сѣро-зеленые, часто свернутые; влагалища гладкія; колосъ густой, сплюснутый, до 7 см. дл., съ колосками, сидящими гребенчато; колоски 8—15 мм. дл., 3—5, рѣже 10-цвѣтковые, желто-зеленые, иногда съ фіолетовымъ оттѣнкомъ; ось колоса извилистая, пушистая; кроющія чешуйки около 7 мм. дл., изъ широкаго основанія постепенно переходятъ въ ось; прицвѣтныя чешуйки 5—6 мм. дл., ланцетныя, только на концѣ съ ясными 3 жилками, у основанія жилокъ не видно; ось 2—4 мм. дл. Цвѣты съ начала іюня до середины іюля. На ж. д. насыпи близъ моста черезъ р. Медвѣжку, недалеко отъ ст. Воскресенскъ. Кзм. у. (П. и С.).—Полотно ж. д. между ст. Удѣльная и Малаховка, Моск. Ряз. ж. д. (Куль.).


* *T. vulgare* Vill. Пет., стр. 295.—Кауф. II, стр. 614.—Кауф. I, стр. 586.—
Ad., p. 69.

Triticum Cereale Schrank. Макс., № 132.

Корневище одно-дву-лѣтнее, даёт одинъ или нѣсколько прямо-стоящихъ стеблей, 60—125 см.; листья широкіе, темно-зеленые, нѣсколько шероховатые; влагалища гладкія, съ продольными жилками; язычекъ короткий, тупой, бока его переходятъ въ ушки; колосъ 4-гранный, плотный, черенчатый, на гибкомъ цветоносе; колоски 2—3-цвѣтковые; кроющія и прицвѣтныя чешуйки широко-яйцевидныя, неравнобокія, на спинкѣ



Triticum vulgare.



Secale cereale.

закрученные или съ килемъ, на концѣ косо срезанныя, быстро переходятъ въ короткое, кривое остріе или ость; жилки на нихъ слабо замѣтны; семя свободное, не облечено въ пленки. Цвѣты въ колѣ. Разводятся

α. *aestivum* L.

Triticum aestivum L. Кауф. II, стр. 615.—Кауф. I, стр. 586.—Дв., № 146.—
Макс., № 132.—Mart., p. 25.—St. II, p. 9.—St. I, № 85.

Прицвѣтныя чешуйки безъ остей или съ короткими остями.

β. *hibernum* L.

Triticum hibernum L. Кауф. II, стр. 615.—Кауф. I, стр. 586.—Дв., № 146.—
Макс., № 132.—Mart., p. 25.—St. II, p. 9.—St. I, № 86.—
Pal., № 214.

Прицвѣтныя чешуйки съ длинными остями.

* *Secale* L.

Колоски 2-цвѣтковые съ зачаточнымъ третьимъ цвѣткомъ, сидящимъ на продолженіи оси колоска; кроющія чешуйки шиловидныя, съ 1 жилкой и килемъ; наружныя прицвѣтныя чешуйки съ 5 жилками, переходятъ въ длинную ость; по килю съ гребенчато сидящими рѣсничками; около-цвѣтныя чешуйки рѣсничатыя; зерно на верхушкѣ пушистое.

S. cereale L. Нет., стр. 274.—Кauf. II, стр. 616.—Цип., стр. 465.—Кauf. I, стр. 587.—Lind., p. 174.—Дв., № 145.—Маке., № 133.—Mart., p. 26.—Ad., p. 68.—St. II, p. 9.—St. I, № 81.—Pal., № 208.

Стебли сидят пучкомъ, 50—200 см., прямостоящіе или у основанія колѣнчато-прислоняющіеся, гладкіе; все растение сѣро-зеленое; листья плоскіе, остро-шершавые; язычокъ короткій, съ маленькими ушками; колосъ сперва сѣро-зеленый, потомъ желтый, поникающій; кроющія чешуйки шерховатыя на спинкѣ, длинно-заостренныя почти въ остъ; прицвѣтныя чешуйки ланцетныя, съ 3 жилками и съ килемъ, по килю и по краю съ щетинистыми волосками, переходятъ въ длинную, остро-шершавую остъ; сѣмь нѣсколько сжатое съ боковъ, и только верхушка его покрыта короткимъ пучкомъ. Цвѣты въ июнѣ. Разводится.

* *Hórdeum L.*

Колоски сидятъ по 3 вмѣстѣ; средній обоимъ съ зачаточнымъ цвѣткомъ; оба боковые обоимъ или мужскіе, иногда на ножкахъ; кроющія чешуйки почти равныя, шиловидныя; наружныя—въ видѣ остей, расположены накрестъ къ внутреннимъ прицвѣтнымъ; наружныя прицвѣтныя чешуйки вытянуты въ длинную остъ, на спинкѣ выпуклыя, съ 3—5 жилками; внутреннія прицвѣтныя чешуйки по двумъ жилкамъ коротко рѣсничатыя; околоцвѣтныя чешуйки косо-обратно-яйцевидныя, мысцетныя, пушистыя и рѣсничатыя; завязь въ верхней части пушистая.

* *H. sativum* Jessen.

Стебли прямостоящіе, цилиндрическіе, 40—90 см.; листья широкіе, по краямъ шерховатые; влагалища гладкія; язычокъ очень короткій.



Hordeum distichon.



Hordeum vulgare, H. hexastichon.

бока его переходятъ въ длинныя, охватывающія весь стебель ушки; колосъ прямостоящій или поникающій, до 12 см. дл.; кроющія чешуйки

узко-ланцетныя, переходятъ въ ость: прицвѣтныя чешуйки съ 5 жилками, на спинкѣ выпуклыя, широко-эллиптическія, переходятъ въ очень длинную, остро-шершавую ость. Цвѣты въ іюлѣ. Разводятся у насъ чаще всего слѣдующія формы:

- α. *Hordeum vulgare* L. Пет. Кр. III, стр. 131. — Пет., стр. 202. — Кауф. II, стр. 617. — Цин., стр. 464. — Кауф. I, стр. 538. — Дв., № 142. — Макс., № 134. — Hoff. II., № 7867. — Mart., p. 25. — St. II, p. 9. — St. I, № 82. — Pal., № 209.
- β. *Hordeum hexastichon* L. Пет. Кр. III, стр. 131. — Пет., стр. 202. — Кауф. II, стр. 616. — Цин., стр. 464. — Кауф. I, стр. 587. — Дв., № 143. — Макс., № 135. — Hoff. II., № 7858. — Mart., p. 25. — St. II, p. 9. — St. I, № 83. — Pal., № 210.
- γ. *Hordeum distichon* L. Пет. Кр. III, стр. 131. — Пет., стр. 202. Макс., № 136. — Hoff. II., № 7856. — Pal., № 211.

1. Колосъ сплюснутый, 2-рядный; плодущій средний колосокъ вверхъ торчащій съ торчащею остью; боковые колоски мужекіе, на короткихъ ножкахъ, безъ остей. *distichon* L. (sp.).

Колосъ не сплюснутый, изъ 6 рядовъ плодущихъ колосковъ; всѣ колоски сидячіе, остистые. 2.

2. Средніе колоски прижаты, боковые выдаются, отчего колосъ кажется 4-граннымъ. *vulgare* L. (sp.) (рис. I).

Всѣ колоски одинаково выдаются, и потому колосъ 6-гранный. *hexastichon* L. (sp.) (рис. II).

62. *Lolium* L.

Колоски сплюснутые, многоцвѣтковые, обращены ребромъ къ оси колоса; кроющія чешуйки съ 5—9 жилкамъ, почти кожистыя; колоски имѣютъ только наружную кроющую чешуйку, сидящую на наружной сторонѣ колоска, исключая макушечнаго, который съ 2 равными кроющими чешуйками; прицвѣтныя чешуйки на спинкѣ округлыя, кожистыя, съ остью или безъ нея; околоцвѣтныя чешуйки широко-ланцетныя, часто неравно-лопастныя.

1. Кроющія чешуйки длиннѣе всего колоска.

L. temulentum L.

Кроющія чешуйки короче колоска, рѣже равны ему. 2.

2. Прицвѣтныя чешуйки эллиптическія; стебли только плодущіе; листья въ почкосложеніи свернутые.

L. remotum Schrank.

Прицвѣтныя чешуйки ланцетныя; стебли плодущіе и безплодные (съ однимъ только листомъ); листья въ почкосложеніи вдоль сложенные.

L. perenne L.

138. *L. temuléntum* L. Пет. Кр. III, стр. 132.—Ф. О., № 8, p. 118.—Пет., стр. 216.—Кауф. II, № 889.—Цви., № 1603.—Кауф. I, стр. 589.—Lind., p. 176.—Дв., № 138.—Макс., № 129.—Нoff. II, № 844.—Gold. C., p. 18.—Mart., p., 24.—Hoff., № 1937.—Ad., p. 66—67.—St. II, p. 9.—St. I, № 79.

Стебли 40—100 см., прямостоящие или основаніе ихъ колѣнчато-приподнимающееся, въ верхней части шероховатые; листья около 6 мм. шпр., верхняя сторона шероховатая, нижняя—гладкая; влагалища шероховатая; язычокъ короткій, разорванный; колосъ длинный, до 25 см. дл., прямоторчаній, рѣдкій, съ остро-шершавой осью; колоски 6—8-цвѣтковые, удалены другъ отъ друга такъ, что верхушка колоска достигаетъ основанія слѣдующаго, супротивъ сидячаго; кроющія чешуйки равны всему колоску или длиннѣе его, длинно-ланцетныя, постепенно-заостренныя, слабо шероховатая; прицвѣтныя чешуйки до 8 мм. дл., продолговатая, съ остію, часто извилистой, короче или длиннѣе самой чешуйки. Цвѣты въ іюлѣ. По посѣвамъ Лапково, Руз. у.; подъ Серпуховымъ, Больш. Алексѣевское, Клм. у., Воробьевы горы, Вертлинское, Клн. у. (II).—Мытищи (С.).



Lolium temulentum.

139. *L. remótum* Schrank. Пет. Кр. III, стр. 132.

Lolium arvense Schrad. Кауф. II, стр. 618.—Кауф. I, стр. 589.—Дв., № 141.—Макс., № 128.

Lolium linicola Sond. Цви., стр. 468.

Lolium linicolum A. Br., Ф. Б., № 27.

Стебли одиночные или пучкомъ, 30—60 см., прямостоящие или у основанія колѣнчато-приподнимающиеся, гладкіе или только близъ верхушки шероховатые; листья около 3 мм. шпр., гладкіе, рѣже верхняя сторона слабо шероховатая, скоро отмираютъ; влагалища гладкія; колосъ рѣдкій, прямоторчаній, состоитъ изъ 9—12 колосковъ; колоски маленькіе, около 9 мм. дл., 4—6-цвѣтковые; кроющія чешуйки 7—9 мм. дл., равны или короче колоска; прицвѣтныя чешуйки 4—5 мм. дл., продолговатая, туповатая, рѣже съ короткой остію; все растеніе желто-зеленое. Цвѣты въ іюлѣ. Въ посѣвахъ льна и овса.

- а. *complanátum* Schrad. Пет. Кр. III, стр. 132.

Колоски 7—9-цвѣтковые, нѣсколько отогнуты отъ оси, съ растопыренными цвѣтами.

- б. *laeve* Aschr. Растеніе во всѣхъ частяхъ гладкое.

Объ формы вмѣстѣ: Вертлинское, Клн. у., Хмѣтьево, Клн. у., Лапково, Руз. у. (II).—Близъ Тростенскаго озера, Руз. у. (II. п С.).—Собольки, Мож. у. (Мос.).



Lolium remotum.

140. *L. perénne* L. Пет. Кр. III, стр. 132.—Бух. II, № 480.—Бух. I, № 442—
F. O., № 8, p. 118. — Пет., стр. 216. — Кауф. II, № 888.—
Цин., № 1601.—Кауф. I, стр. 589. — Lind., p. 176. — Ann.
C. IV, № 71.—Дс., № 137.—Макс., № 127.—Hoff. H., № 842.—
Gold., C., p. 18.—Mart., p. 24.—Hoff., № 1935.—Ad., p. 66.—
St. II, p. 9.—St. I, № 78.—Pal., № 202.

Lolium latum Roth. Пет. Кр. III, стр. 132.—Mart., p. 24.



Lolium perenne.

Образуетъ густыя дерновины; корневище даетъ плодущіе и бесплод-
ные стебли, прямостоящіе, 30—60 см., часто
съ колѣнчато-приподнимающимся основаніемъ,
гладкіе; листья съ гладкими влагалищами,
не шире 4 мм., гладкіе или только съ верх-
ней стороны слегка шероховатые, въ почко-
сложеніи вдоль сложенные; язычокъ короткій,
около 1 мм. дл.; колосъ слегка поникающій,
рѣдкій; колоски 8—10-цвѣтковые, желто-зеле-
ные; ось колоса гладкая; кроющія чешуйки
8—9 мм. дл., съ 7—9 жилками, острья, въ $1\frac{1}{2}$
раза длиннѣе прицвѣтныхъ чешуекъ; прицвѣт-
ныя чешуйки 6—7 мм. дл., туповатыя или
острыя. Цвѣты со середины іюня до конца
іюля. По лугамъ. Спасское, Дмт. у. (Ш.).—Михай-
ловское, Идл. у. (Б.).—Пушкино, Мытниц. (С.).—
Хмѣтѣво, Кн. у. (П.).

16 сем. Cyperáceae Juss.

Цвѣты обоеполые или однополые, почти всегда однодомные, сидятъ
въ пазухахъ кроющихъ чешуекъ, собраны въ конечные колоски, или ко-
лоски сидятъ однобочнымъ пучкомъ, или же въ сложномъ соцвѣтіи;
околоцвѣтника нѣтъ, или онъ въ видѣ щетинокъ и волосковъ; завязь съ
одной сѣменочкой; столбикъ одинъ, оканчивается 2—3 длинными ните-
видными рыльцами; плодъ 2—3-гранный орѣшекъ; сѣмя съ бѣлкомъ и
маленькимъ зародышемъ у основанія; стебель часто 3-гранный; листья
3-рядные, съ закрытыми влагалищами.

1. Плодъ заключенъ въ мѣшечекъ; околоцвѣтника нѣтъ.

Carex.

Плодъ—орѣшекъ, не заключенъ въ мѣшечекъ; околоцвѣтникъ со-
стоитъ изъ щетинокъ, рѣже его нѣтъ. 2.

2. Кроющія чешуйки и самые колоски расположены въ 2 ряда;
столбикъ безъ утолщенія у основанія. 3.

Кроющія чешуйки расположены спирально. 4.

3. Околоцвѣтныхъ щетинокъ нѣтъ; рылецъ 3.

Cyperus.

Околоцвѣтныхъ щетинокъ 3—6; рылецъ 2.

Blasmus.

4. Колоски малоцвѣтковые, только 2—3 плодущихъ цвѣтка; нижнія 3—4 кроющія чешуйки безъ цвѣтковь, много короче остальныхъ; рылецъ 2. *Rhynchospora*.

Колоски многоцвѣтковые; только 2 нижнія кроющія чешуйки безъ цвѣтвъ, но не короче остальныхъ, иногда даже крупнѣе; рылецъ большею частью три. 5.

5. Околоцвѣтныя щетинки гладкія, по опыленіи вырастаютъ въ длинныя бѣлыя волоски, образуя пуховку. *Eriophorum*.

Околоцвѣтныя щетинки короткія, съ назадъ обращенными зубчиками, не вырастаютъ и не образуютъ пуховки; щетинокъ по 2—6 въ каждомъ цвѣткѣ. 6.

6. Колосъ одинъ, конечный; столбикъ у основанія утолщенъ и отдѣленъ отъ завязи перетяжкой. *Heleocharis*.

Колосковъ много, рѣдко одинъ; столбикъ у основанія утолщенъ, но не отдѣленъ перетяжкой отъ завязи. *Scirpus*.

63. *Cyperus* L.

Колоски многоцвѣтковые, сплюснутые съ боковъ, состоятъ изъ чешуекъ, расположенныхъ двурядно; нижнія 2 чешуйки нѣсколько короче остальныхъ, безплодныя; колоски собраны въ головчатые или зонтикообразныя соцвѣтія съ неравными лучами; 3 тычинки, рѣдко ихъ 2 или 1; околоцвѣтныхъ щетинокъ нѣтъ; завязь съ нитевиднымъ, опадающимъ столбикомъ и съ 2—3 рыльцами; плодъ чечевицеобразный или 3-гранный орѣшекъ

141. *C. fuscus* L. Пет. Кр. III, стр. 79. — Пет., стр. 174. — Кауф. II, № 767. — Гор., № 84. — Цин., № 1499.

Корневище даетъ нѣсколько неравныхъ, остро-3-гранныхъ стеблей, 5—25 см., у основанія которыхъ находятся не длиннѣе 3 см. красноватобурые прикорневые листья; стеблевые листья плоскіе, по краямъ, особенно близъ верхушки шероховатые, безъ кля; обертка состоитъ изъ 3 листьевъ неравной длины, въ 2 раза длиннѣе зонтика; пучки колосковъ сидятъ на неравныхъ цвѣтоносахъ, срединный—почти сидячій; колоски до 7 мм. дл., темно-бурые, линейно-продолговатые; кроющія чешуйки съ зеленой полоской на кля; 2 тычинки; 3 рыльца; орѣшекъ продолговато-эллиптическій, къ обоимъ концамъ заостренный, остро-3-гранный. Село Семеновское, Сри. у. (Макс.). — Берегъ Москвы р. близъ Николо-Угренскаго монастыря, въ цвѣту въ $\frac{1}{2}$ августа (Л.). — На песчаномъ берегу р. Оки противъ с. Лужники, Сри. у. 15 августа. (П. и Х.).



Cyperus fuscus.

64. *Rhynchospora* Vahl.

Колоски не крупные, съ кроющими чешуйками, расположенными спирально, нижнія 3—4 меньше остальных, пустыя. 2—3 слѣдующія съ обоеполыми и 1—2 верхнія съ мужскими цвѣтами; околоцвѣтникъ состоитъ изъ 5—13 зубчатыхъ щетинокъ; 2—3 тычинки; столбикъ съ 2 рыльцами, утолщеніе столбика остается на сжатомъ съ боковъ орѣшкѣ.

142. *R. álba* Vahl. Пет. Кр. III, стр. 79.—Пет., стр. 259.—Кауф. II, № 768.—Цин., № 1523.—Кауф. I, стр. 509.—Mart., p. 9.—Ad., p. 20.
Schoenus albus L. Дв., № 51.—Макс., № 57.—Lon., p. 282.

Стебли 3-гранные, 15—60 см.; листья линейные, почти щетинovidные, желобчатые, на спинкѣ съ килемъ, по краямъ слегка шероховатые; цвѣты пучками, на концѣ стебля и иногда въ пазухахъ верхнихъ листьевъ, на длинныхъ цвѣтоносахъ; обертка короче или равна, рѣже слегка превышаетъ пучки цвѣтовъ; кроющія чешуйки яйцевидно-ланцетныя, острые, бѣлыя, потомъ буроватыя; околоцвѣтныя щетинки не длиннѣе орѣшка, числомъ 8—13, по краямъ съ зубчиками, обращенными внизъ; 2 тычинки и 2 рыльца; орѣшекъ сплюснутый, съ носикомъ. Цвѣты съ конца іюня. По торфянымъ моховымъ болотамъ. Горенки (Лондесъ).—Близъ Леонова на берегу Вабошна оз. (Гей.).—Косино; Захаровскій лѣсъ, Кн. у., по просѣлкамъ (II.).



Rhynchospora alba.

65. *Heleócharis* R. Br.

Колосъ конечный, многоцвѣтковый; 2 нижнихъ чешуекъ безъ цвѣтовъ, крупнѣе остальныхъ; стебель безлистный, съ одними влагалищами; 3 тычинки; завязь со столбикомъ, внизу утолщеннымъ и отдѣленнымъ отъ нея перетяжкой, утолщеніе остается при плодѣ; рылецъ 3 или 2; околоцвѣтныхъ щетинокъ 2—6, рѣже ихъ нѣтъ, остро-шершавыхъ отъ обращенныхъ внизъ щетинистыхъ зубчиковъ.

1. Рылецъ 3; стебли 4-гранные, почти нитевидные.

H. acicularis R. Br.

Рылецъ 2; стебли цилиндрическіе или слегка сплюснутые, пнитевидные—болѣе толстые. 2.

2. Кроющія чешуйки широко-яйцевидныя, съ округлой верхушкой; плодъ съ острыми ребрышками. *H. ovata* R. Br.

Кроющія чешуйки продолговато-ланцетныя, заостренныя. 3.

3. Околоцвѣтныхъ щетинокъ 4, рѣже ихъ нѣтъ; длина остатка столбика превышаетъ ширину.

H. palustris R. Br. *a. eupalustris* Lindb.

Околоцвѣтныхъ щетинокъ 5—6; остатокъ столбика сосковидный, ширина его превышаетъ длину.

H. palustris R. Br. *з. mamillatus* Lindb.

143. *H. palustris* R. Br. Пет., стр. 198.—Pinz., p. 19.—Lind., p. 172.—Ann. C. IV, № 59.

Elaeocharis palustris R. Br. Цин., 1502.

Scirpus palustris L. Пет. Кр. III, стр. 80.—Бух. II, № 419.—Бух. I, № 389.—F. O., № 7, p. 102.—Кauf. II, № 769.—Kauf. I, стр. 511.—Дв., № 54.—Макс., № 50.—Hoff. II, № 486.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 10.—Ad., p. 21.—St. II, p. 7.—St. I, № 27.

Корневище горизонтальное, ползучее, членистое, дает пучки цветущих и безцветковых стеблей: стебли 15—60 см., цилиндрические или слегка сплюснутые, зеленые или сине-зеленые, съ тонкими продольными



Heleocharis palustris α. *eupalustris*.



Heleocharis palustris β. *mamillatus*.

линіями. безлистные. только у основанія съ 2 влагалищами; колоски продолговато-ланцетные или яйцевидно-ланцетные, у основанія съ 2 пустыми чешуйками, охватывающими своимъ основаніемъ только $\frac{1}{2}$ колоса; чешуйки продолговато-ланцетныя, заостренныя, каштаново-бурыя, съ широкой бѣлой каймой и съ зеленой полоской на спинкѣ; рылецъ 2; околоцвѣтныхъ щетинокъ 4—6. рѣдко ихъ совершенно нѣтъ; плодъ 3-гранный, сплюснутый, съ тупыми округлыми гранями. Цвѣты съ середины іюня, зрѣлыя сѣмена съ начала августа. По берегамъ рѣкъ, прудовъ и по сырымъ болотистымъ мѣстамъ, часто.

α. *eupalustris* Lindb. fil. (sp.). Стебель въ сухомъ видѣ гладкій или съ тонкими продольными линіями; орѣшекъ обратно-яйцевидный: утолщенное основаніе столбика ясно отшнуровано, булавовидное, и длина его превышаетъ ширину; околоцвѣтныхъ щетинокъ 4 (forma typica), или ихъ нѣтъ (forma nulliseta), длина ихъ не превышаетъ остатка столбика (низкорослая форма съ маленькимъ, почти яйцевиднымъ колосомъ и съ очень маленькими стеблями есть forma arenarius Sonder.). Мытищи (С.).—Симоновъ монастырь, Воробьевы горы (П.).—arenarius Sonder.—Бѣлые Колодези, Кал. у. (П.).—Ильинское, Звн. у. (К.).—Котельники (Куль.).

3. *mamillátus* Lindb. fil. (sp.). Стебли въ сухомъ видѣ съ ясными продольными бороздками; утолщенное основаніе столбика низкое, почти сидячее, сосковидное, ширина его превышаетъ длину; околоцвѣтныхъ щетинокъ 5, рѣже 6, длина ихъ превышаетъ плодъ съ остаткомъ столбика. Берегъ Тростенскаго озера у Анофріева, Ряз. у. (П. и С.).

144. *H. ováta* R. Br. Пет., стр. 198.—Рур., стр. 88.

Elaeocharis ovata R. Br. Цин., № 1506.

Scirpus ovatus Roth. Пет. Кр. III, стр. 80.—Кауф. II, № 770.—Кауф. I, стр. 511.—Макс., № 51.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 10.

Scirpus multicaulis Gmel. Дв., № 55.—Gold. Sp., p. 120.—Ad., p. 22.

Стебли разной вышины сидятъ пучкомъ, отъ 2 до 25 см., съ тонкими продольными бороздками, у основанія съ свѣтло-бурыми влагалищами; колосья овальный, 2—7 мм. дл. у основанія полушаровидный, ржаво-бурый; кроющія чешуйки широко-яйцевидныя, съ округлой верхушкой и съ широкимъ перепончатымъ краемъ; плодъ съ острымъ реб-



Eleocharis ovata.



Eleocharis acicularis.

рами, съ боковъ сплюснутый, носикъ его 3-угольный; рылецъ 2; щетинки равны плоду. Цвѣты въ колѣ. По берегамъ прудовъ и по сырымъ мѣстамъ. С. Ахтырки, Дмт. у. (Ген.).—Сѣтунъ въ Давыдовѣ (А.).—Измайловскій зверинецъ (Гольдб.).—Горенки, Б. Мытши (П.).—Дорога изъ Ромашкова въ Мамоново (С.).

145. *H. aciculáris* R. Br. Пет., стр. 197.—Ann. C. III, № 263.

Elaeocharis acicularis R. Br. Цин., № 1501.

Scirpus acicularis L. Бух. II, № 420.—Бух. I, № 390.—F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, № 771.—Кауф. I, стр. 511.—Lind., p. 172.—Дв., № 56.—Макс., № 52.—Hoff. H., № 572.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 10.—Ad., p. 22—23.—St. II, p. 7.—St. I, № 28.

Образуетъ густыя ярко-зеленыя дерновники; корневище ползучее, несетъ пучки неравныхъ, 4-гранныхъ, тонко-бороздчатыхъ стеблей, въ

2—14 см.: влагалища у основанія стебля свѣтло-бурыя, иногда красноватыя; колосъ маленький, 2—4 мм. дл., малоцвѣтковый, продолговато-овальный, острый; кроющія чешуйки яйцевидныя, притупленныя, свѣтло-бурыя съ широкой зеленой полоской на спинкѣ, самая нижняя охватываетъ все основаніе колоса; рылецъ 3; плодъ 3-гранный, съ продольными ребрышками и съ коническимъ основаніемъ столбика; околоцвѣтныя щетинки короче плода, числомъ 2—4. Цвѣты съ начала іюня, зрѣлыя сѣмена въ концѣ августа. По сырýmъ мѣстамъ и по берегамъ стоячихъ водъ, часто.

66. *Scirpus* L.

Колоски многоцвѣтковые, только конечные или чаще въ сложномъ соцвѣтѣ: 2 нижнія чешуйки безъ цвѣтковъ, крупнѣе остальныхъ; стебель покрытъ листьями, рѣже безъ нихъ; тычпочекъ 3, рѣдко 2; завязь съ нитевиднымъ столбикомъ, часто утолщеннымъ у основанія, но никогда не отдѣленнымъ перетяжкой отъ плода; рылецъ 3; околоцвѣтныя щетинокъ обыкновенно 6 или ихъ нѣтъ.

1. Стебли цилиндрическіе, безъ листьевъ, съ одними только влагалищами у основанія. 2.

Стебли покрыты листьями. 3.

2. Соцвѣтіе съ неравными вѣтвями; кроющія чешуйки выемчатая и въ выемкѣ съ остриемъ.

S. lacustris L.

Стебель кончается однимъ колосомъ; кроющія чешуйки продолговатояйцевидныя, слегка заостренныя.

S. pauciflorus Lightf.

3. Колоски въ соцвѣтѣ сидятъ поодиночкѣ на длинныхъ цвѣтоножкахъ.

Колоски въ соцвѣтѣ сидятъ пучками. 4.

4. Колоски крупныя, 8—17 мм. дл., коричневыя; кроющія чешуйки на верхушкѣ выемчатая и въ выемкѣ съ остриемъ.

S. maritimus L.

Колоски мелкіе, не крупнѣе 4 мм., грязно-черно-зеленыя; кроющія чешуйки продолговато-яйцевидныя, съ остроконечіемъ, но безъ выемки.

S. silvaticus L.



Scirpus pauciflorus.

S. radicans Schk.

146. *S. pauciflorus* Lightf. Макс., № 557².

Корни волокнистыя, образуютъ дерновинки; стебли 5—25 см., прямо-стоящіе, тонкіе, цилиндрическіе, съ тонкими продольными бороздками, у основанія съ 1—2-трубчатыми красно-бурыми влагалищами; колосъ конечный, продолговато-яйцевидный, каштаново-бурый, съ маленькимъ,

не превышающимъ колосъ прицвѣтнымъ листомъ; кроющія чешуйки продолговато-яйцевидныя, каштановаго цвѣта съ бѣлымъ краемъ и съ зеленой или свѣтлой полоской на спинкѣ; 2 нижнія чешуйки много шире остальныхъ; рылецъ 3; околоцвѣтныхъ щетинокъ 6, столь же длинныхъ, какъ и 3-гранный орѣшекъ, вдоль пунктированно-полосатый и съ остающимся столбикомъ. Въ гербаріи Максимовича, собрано въ Москвѣ у Краснаго пруда; теперь это мѣстонахождение болѣе не существуетъ.

147. *S. lacustris* L. Бух. II, № 421.—Бух. I, № 391.—Ф. О., № 7, p. 102.—Пет., стр. 271.—Кауф. II, № 772.—Цип., № 1510.—Кауф. I, стр. 512.—Ann. C. III, № 264.—Дв., № 58.—Макс., № 53.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 10.—Ad., p. 23—24.—St. II, p. 7.—St. I, № 29.

Корневище толстое, ползучее, членистое; стебли безлистные, 1—2,5 метра, толстые, цилиндрическіе, постепенно утончающіеся къ верхушкѣ, съ тонкими продольными линиями; у основанія стебля нѣсколько красно-бурыхъ влагалищъ, рѣдко переходящихъ въ очень короткую пластинку; соцветіе конечное, пѣсть 1—2 прицвѣтныхъ листа, изъ которыхъ одинъ у основанія желобчатый, превышаетъ соцветіе, вверхъ торчащій, отчего соцветіе кажется боковымъ; колоски яйцевидно-продолговатыя, красно-бурые, сидятъ пучками на длинныхъ и неравныхъ цветоносахъ; кроющія



Scirpus lacustris.



Scirpus maritimus.

чешуйки овальныя, по краямъ рѣсничатыя, на верхушкѣ выемчатыя и въ выемкѣ съ остриемъ; околоцвѣтныхъ щетинокъ 6 съ назадъ направленными зубчиками; рылецъ 3; орѣшекъ сплюснутый, 3-гранный. Цвѣты съ половины іюня, зрѣлыя сѣмена съ половины августа. Часто по берегамъ рѣкъ и прудовъ.

148. *S. maritimus* L. Пет. Кр. III, стр. 81.—Ф. Б., № 106.—Пет., стр. 272.—Кауф. II, № 773.—Мил., № 35.—Цип., № 1511.—Кауф. I, стр. 512.—Lind., p. 172.—Ann. C. V, № 69.—Hoff. II., № 481.—Gold. C., p. 17.—Gold. Sp., p. 120.—Ad., p. 24.

Корневище горизонтальное, съ длинными, ползучими подземными побѣгами, на концѣ утолщенными въ шаровидные клубни; стебли до 1 метра, 3-гранные, покрыты листьями; листья линейные, сверху плоскіе, снизу съ килемъ, по краямъ остро-шершавые отъ очень маленькихъ, обращенныхъ впередъ зубчиковъ; прицвѣтные листья такіе же, какъ и стеблевые, во много разъ длиннѣе соцветія, обыкновенно въ числѣ 3; соцветіе конечное, состоитъ изъ пучковъ колосковъ, сидящихъ на длинныхъ и неравныхъ цвѣтоносахъ; колоски крупные, малочвѣтковые, 8—17 мм. дл., въ нижней своей части безплодные; кроющія чешуйки бурья съ зеленой или желтой срединной жилкой, яйцевидныя, на верхушкѣ глубоко-выемчатая съ длиннымъ остриемъ въ выемкѣ; околоцвѣтныхъ щетинокъ обыкновенно 5, рѣже 4 или 6; орѣшекъ коричневый, лоснящійся, съ одной стороны плоскій, съ другой — выпуклый, немного короче щетинокъ; рылецъ обыкновенно 3. Цвѣты съ начала іюля. По берегамъ рѣкъ и ручьевъ. Сѣтунъ близъ Давыдова (А.).—На Лонасѣ близъ Давидовой пустыни. Спр. у. (II.).—Противъ Карапчеева на островѣ. Кзм. у., Софьинскій шлюзъ на Москвѣ р., Брн. у. (II.).—Быково по озерамъ. Брн. у. (I.). Берегъ р. Оки противъ с. Лужняки, Спр. у. (II. и X.).

149. *S. silvaticus* L. Бух. II, № 422.—Бух. I, № 392.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 272.—Кауф. II, № 774.—Цин., № 1512.—Кауф. I, стр. 513.—Lind., p. 172.—Дв., № 59.—Макс., № 54.—Hoff. II., № 490.—Mart., p. 10.—Ad., p. 25.—St. II, p. 7.—St. I, № 30.

Корневище ползучее, съ побѣгами, даетъ какъ цвѣтушіе стебли, такъ и пучки листьевъ; стебли 60—125 см., 3-гранные, близъ верхушки остро-шершавые; листья съ влагалищами, плоскіе, широко-линейные, по краямъ и по килю остро-шершавые; прицвѣтные листья въ числѣ 3, рѣже 5, похожи на стеблевые, одинъ изъ нихъ обыкновенно длиннѣе соцветія, остальные равны или короче его; при вторичномъ развѣтвленіи соцветія находятся еще прицвѣтнички, но только маленькіе, почти пленчатые; соцветіе крупное, конечное, 2—3-сложное, съ длинными и неравными лучами; цвѣтоносы 3-гранные, остро-шершавые, колоски пучками по 3—5, яйцевидные, не крупнѣе 4 мм.; кроющія чешуйки продолговато-яйцевидныя, слабо-килеватыя, съ остроковечіемъ, грязно-черно-зеленыя съ ярко-зеленой полоской на спинкѣ; околоцвѣтныя щетинки прямые, внизъ зазубренныя, числомъ до 6, равны округло-3-гранному орѣшку; ры-



Scirpus silvaticus.

лець 3. Цвѣты съ начала іюня. По болотистымъ лѣсамъ, по канавамъ и по берегамъ рѣкъ, очень часто.

150. *S. radicans* Schk. Пет. Кр. III, стр. 81.—Бух. II, № 423.—F. O., № 7, р. 102.—Пет., стр. 272.—Кауф. II, № 775.—Цив., № 1513.—Кауф. I, стр. 513.—Дв., № 60.—Макс., № 55.—Hoff. II, № 487.—Gold. C., p. 17.—Ad., p. 25.

Корневище даетъ нѣсколько, пучкомъ сидящихъ, цвѣтущихъ и не цвѣтущихъ стеблей, которые осенью вырастаютъ въ длинные побѣги, дугою пригибающіеся къ землѣ и верхушкой укореняющіеся; стебли



Scirpus radicans.

60—125 см., 3-гранные, по гранямъ остро-шершавые; листья плоскіе, широко-ланцетные, по краямъ и по килу остро-шершавые; прицвѣтные листья какъ у *S. silvaticus* L.; соцвѣтіе крупное, раскидистое, 2-сложное, б. ч. съ гладкими, 3-гранными цвѣтоносами; колоски продолговато-ланцетные, почти всѣ одиночные, до 8 мм. дл., на ножкахъ, кромѣ срединныхъ, которые сидячіе; кроющія чешуйки безъ кила, на концѣ округлыя, безъ остроконечія, черно-зеленыя съ ярко-зеленой полоской на спинкѣ; околоцвѣтные щетинки извилистыя, гладкія, въ 2—3 раза длиннѣе обратно-яйцевидныхъ, 3-гранныхъ орѣшковъ. Цвѣты съ начала іюня. По выемкамъ торфяныхъ бо-

лотъ, по берегамъ заводей рѣкъ и на болотистой почвѣ. Ивановско. Давыдково, Раменское (К.)—Горенки (Гольдб.).—Юрьевское озеро. Пдл. у. (Б.)—Близъ Черкизова на Клизмѣ. Красниковское болото за Больш. Мытищами (С.).—По берегу р. Перекой подъ Левинымъ; берегъ Глубокаго озера, Руз. у. (П.).—Берегъ рѣки Пехорки. Брн. у. (Куль.).—Долгое озеро близъ дер. Рыбаки, Мос. у. (П. и С.).

67. *Blýsmus* Panz.

Колосъ сложный, верхушечный, 2-рядный; 3 тычинки со связникомъ, расширеннымъ въ лопатчатый, по краямъ зубчатый выростъ; околоцвѣтныхъ щетинокъ 3—6, вдвое длиннѣе плода; рылецъ 2.

151. *B. compressus* Panz. Пет., стр. 148.—Цив., № 1524.

Scirpus compressus Pers. Пет. Кр. III, стр. 81.—Мос., № 40.—Кауф. II, № 776.—Кауф. I, стр. 513.—Ann. C. V, № 70.

Scirpus caricinus Schrad. Дв., № 57.—Макс., № 56.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 10.

Scirpus Caricis Retz. Hoff. II., № 476.—Ad., p. 23.—St. II, p. 7.

Carex uliginosa L. St. I, № 632.

Корневище горизонтальное, бурое, членистое, съ бурыми чешуйками на сочлененіяхъ; стебли 10—40 см., въ нижней части почти цилиндрическіе, слегка сплюснутые, въ верхней—слабо 3-гранные, иногда изогнутые

дугобразно: листья линейные, на спинкѣ съ килемъ, по краямъ нѣсколько рѣзущіе; соцветіе конечное, двуряднымъ колосомъ; колоски продолговатые, сплюснутые, 6—10-цвѣтковые, въ числѣ 5—12, нижній — иногда отдаленъ отъ остальныхъ: прицвѣтный листъ равенъ колосу или превышаетъ его; каждый колосокъ имѣетъ маленький, яйцевидный, короткозаостренный прицвѣтникъ длиною въ $\frac{1}{2}$ колоска; кроющія чешуйки продолговато-ланцетныя, острые, лоснящіяся, ржаво-бурыя со свѣтлымъ краемъ и зеленой или желтой полоской на спинкѣ; рылецъ 2; околоцвѣтныя щетинки съ назадъ обращенными зубчиками; орѣшекъ округло-эллиптической, короче щетинокъ. Цвѣты съ $\frac{1}{2}$ іюня. По сырымъ лугамъ и близъ канавъ. Петрово, Останкино, Звенигородъ (К.).—Воробьевы горы, Три горы (Гольдб.).—Троицкое, Мож. у., берегъ р. Разводни у Саввинскаго монастыря, Зви. у. (П.).—Берегъ канала у Сенежскаго озера подъ Загорьемъ (П. и С.).



Blysmus compressus.

68. Eriophorum L.

Колоски довольно крупныя, многоцвѣтковые; кроющія чешуйки сидятъ спирально, нижнія безъ цвѣтковъ; околоцвѣтникъ состоитъ изъ многочисленныхъ волосковъ, которые послѣ опыленія завязи сильно разрастаются, во много разъ длиннѣе плода, образуя большую бѣлую пуховку; 3 тычинки; столбикъ нитевидный, опадающій, съ 3 рыльцами; орѣшекъ сплюснутый, 3-гранный.

1. Только одинъ верхушечный колосъ. *E. vaginatum* L.

Колосковъ нѣсколько, пучкомъ, подъ конецъ повислыхъ. 2.

2. Листья 3-гранныя, только у основанія желобчатые; кроющія чешуйки сперва зеленыя, внизу съ 5—7 жилками; соцветіе о 2—4 колоскахъ.

E. gracile Koch.

Листья плоскіе или только близъ верхушки 3-гранные; кроющія чешуйки красно-бурыя или почти черныя, съ 1 жилкой; соцветіе о 3—12 колоскахъ. 3.

3. Ножки колосковъ голыя или только близъ верхушки шероховатые; волоски пуховки на концѣ округлые.

E. angustifolium Roth.

Ножки колосковъ сверху до низу шероховатые; волоски пуховки на верхушкѣ съ 2, рѣже съ 3 толстостѣбными остроконечіями.

E. latifolium Hoppe.

152. *E. vaginatum* L. Пет. Кр. III, стр. 82.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 184.—Кауф. II, № 777.—Цип., № 1514.—Кауф. I, стр. 514.—Lind., p. 172.—Ann. C. II, № 161.—Дв., № 61.—Макс., № 58.—Hoff. II., № 493.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 11.—Ad., p. 26—27.—St. II, p. 7.—St. I, № 31.—Pal., № 131.

Образуетъ обширныя, очень плотныя дерновины, часто кочки; корни толстые, длинныя, очень крѣкіе, перецветающіеся; корневыя листья линейные, 3-гранные, сверху желобчатые, къ концу нѣсколько шероховатые, переходятъ въ красно-бурыя влагалища, окруженныя волокнами; стебли 15—50 см., голые, цилиндрическіе, только близъ верхушки тупо-3-гранные, оканчиваются однимъ колосомъ; стеблевыхъ листьевъ нѣтъ, но только 2—3 нѣсколько вздутыхъ влагалища съ сильно выдающимися продольными жилками; колосъ продолговато-эллиптической, во



Eriophorum vaginatum.



Eriophorum angustifolium.

время цвѣтенія 2—2.5 см. дл.; кроющія чешуйки пленчатые, продолговатые, длинно-заостренныя, сѣро-черныя съ сѣро-серебристыми краями; пуховка крупная, почти полушаровидная, 4,5—5,5 см. въ діаметръ; орѣшекъ съ остроколючемъ. Цвѣты въ концѣ апрѣля, зрѣлыя сѣмена съ начала іюня. По торфянымъ болотамъ, часто.

153. *E. angustifolium* Roth. Пет. Кр. III, стр. 82.—Бух. II, № 424.—Бух. I, № 394.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 184.—Кауф. II, № 779.—Цин., № 1516.—Кауф. I, стр. 515.—Lind., p. 172.—Ann. C. V, № 71.—Дв., № 63.—Макс., № 60.—Hoff. II., № 493.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 11.—Ad., p. 27—28.—St. I, № 32.

Eriophorum polystachyon a. L.

Корневище часто даетъ длинныя побѣги; стебли 20—70 см., въ нижней части цилиндрическіе, близъ верхушки слабо 3-гранные; листья линейные, желобчатые, съ килемъ, заостренныя въ длинный, 3-гранный кончикъ, по краямъ гладкіе или шероховатые, съ длинными влагалищами; прицвѣтный листъ длинный, у основанія часто буроватый; стебель оканчивается простымъ соцветіемъ, состоящимъ изъ 3—7 колосковъ на неравныхъ, гладкихъ или только близъ колоса шероховатыхъ цвѣтоножкахъ; колоски во время цвѣтенія 10—15 мм. дл., кроющія чешуйки яйцевидно-ланцетныя, красно-бурыя, въ верхней части свѣтло-коричневыя, съ

широкимъ бѣлымъ пленчатымъ краемъ; пуховка крупная, волоски ея на концѣ округлые, безъ остроконечій. Цвѣты съ конца апрѣля и въ началѣ мая, зрѣлыя сѣмена съ начала іюня. По болотамъ и болотистымъ лугамъ, часто. Михайловское. Под. у. (Б.).—Мытищи. Серебряный боръ близъ Хорошова (С.).—Косино; Бирево, Клин. у. (П.).

154. *E. latifolium* Норре. Пет. Кр. III, стр. 82.—Бух. I, № 393.—F. O., № 7, р. 102.—Пет., стр. 184.—Кауф. II, № 778.—Цин., № 1515.—Pinz., р. 19.—Кауф. I, стр. 514.—Lind., р. 172.—Дв., № 62.—Макс., № 59.—Hoff. II, № 494.—Gold. C., р. 17.—Mart., р. 11.—Ad., р. 27.

Eriophorum polystachion β. L. Hoff. II., № 495.—St. II, р. 7.—St. I, № 32.—Pal., № 132.

Корневище толстое, почти деревянистое, безъ побѣговъ; стебель 20—70 см., тупо-3-гранный; листья линейные, плоскіе, на спинкѣ съ килемъ, заостренные въ 3-гранный кончикъ, по краямъ и на спинкѣ шероховатые; стеблевые — съ длинными влагалищами; прицвѣтные листья у основанія почти черныя; стебель оканчивается соцветіемъ, часто сложнымъ, о 5—12 колоскахъ; колоски во время цвѣтенія 6—9 мм. дл., на ножкахъ разной длины, по всей своей длинѣ шероховатыхъ отъ короткихъ и мелкихъ зубчиковъ; кроющія чешуйки яйцевидно-ланцетныя, туповатые, зеленовато-черныя, съ темно-бурымъ кончикомъ и узкой бѣлой каймой; пуховка не большая, волоски ея оканчиваются на верхушкѣ 2, рѣже 3 толстостѣбными остроконечіями. Цвѣтетъ весь май, зрѣлыя сѣмена съ начала іюля. По болотистымъ лугамъ, кустарникамъ и по просѣкамъ болотистыхъ лѣсовъ. Б. Мытищи, болото близъ Кузьминокъ, Косино (П.).—Казенный лѣсъ близъ Бирева, Клин. у. (П. и С.).—Быково, Брн. у. (Гей). На берегу озера Нерскаго близъ с. Озерецкаго, Мос. у. (П. и X.).



Eriophorum latifolium.

155. *E. gráatile* Koch. Пет. Кр. III, стр. 83.—F. O., № 7, р. 102.—Пет., стр. 184.—Кауф. II, № 780.—Гор., № 46.—Цин., № 1517.—Кауф. I, стр. 515.—Дв., № 64.—Макс., № 61.

Eriophorum triquetrum Норре. Дв., № 64.—Макс., № 61.

Корневище даетъ длинные побѣги; стебель 20—40 см., гладкій, слабо-3-гранный; листья 3-гранные, только близъ основанія желобчатые, б. ч. гладкіе; стеблевые съ длинными влагалищами и съ вверху торчащей пластинкой; прицвѣтный листъ маленький, у основанія часто буроватый; соцветіе простое, состоитъ изъ 2—4 колосковъ; цвѣтоножки по всей своей длинѣ густо покрыты короткими волосками; колоски во время цвѣтенія 6—9 мм. дл.; кроющія чешуйки яйцевидныя, заостренныя, съ продольными жилками, сперва зеленые, потомъ буроватыя; пуховка не боль-

шай. волоски ея на концѣ округлые, безъ остроконечій. Цвѣтетъ весь май. По болотистымъ лугамъ и торфянымъ болотамъ. Иваньково, Зыково, Захарово, близъ Петрова (К.).—Бутырки (Траутн.).—Горенки (Гольдб.).—Тростенское озеро, Руз. у. (Ч. и П.).—С. Бисерово, Бгр. у. (П. П.).—Мытищи (С.).—Косино; Захаровскій казенный лѣсъ, Кля. у., берегъ Глубокаго озера, Руз. у. (П.).



Eriophorum gracile.

69. *Cárex* L.

Цвѣты однополые; мужскіе состоятъ изъ 3 тычинокъ на длинныхъ нитяхъ; женскіе—изъ завязи, замкнутой въ пузырчато-раздутое предлѣстие, именуемое мѣшечкомъ; столбикъ съ 2—3 нитевидными рыльцами; околоцвѣтника въ видѣ волосковъ или щетинокъ нѣтъ; мужскіе и женскіе цвѣты сидятъ въ пазухахъ кроющихъ чешуекъ; каждый цвѣтокъ прикрытъ 1 чешуйкой; плодъ—орѣшекъ, заключенный въ 2—3-гранный мѣшечекъ; цвѣторасположеніе очень разнообразное въ сложныхъ колосьяхъ: то мужскіе колоски сидятъ наверху стебли и подъ ними сидятъ женскіе колоски, то колосья смѣшанные—въ верхней части колоска мужскіе цвѣты, въ нижней женскіе или наоборотъ.

A. Psyllóphorae Loisel. Только одинъ конечный колосъ; мѣшечки голые, съ притупленнымъ, слегка выемчатымъ носикомъ.

1. *Dioécae* Fries. Растенія двудомныя; 2 рыльца.

C. dioica.

2. *Rupéstris* Fries. Однодомныя; 3 рыльца.

C. obtusata, C. pauciflora.

B. Homostáchyae Fries. Колоски обоеполые, б. или м. скученные, многочисленные.

I. Vigneae P. B. Колоски собраны въ простой или сложный, б. или м. головчатый колосъ; колоски обоеполые.

1. *Chordorrhizae* Fries. Колоски собраны головкой, длина головки нѣсколько менѣе чѣмъ въ 2 раза превышаетъ ширину; колоски 5—12-цвѣтковые, на концѣ мужскіе.

C. chordorrhiza.

2. *Arenáriae* Aschr. Длина колоска болѣе чѣмъ въ 2 раза превышаетъ ширину; колоски многоцвѣтковые.

C. disticha, C. praecox.

II. Acrárrhenae Fries. Колоски на верхушкѣ съ мужскими цвѣтами, у основанія съ женскими; мѣшечки вытянуты въ 2-зубчатый, по краямъ шероховатый носикъ.

1. *Vulpinae* Kunth. Мѣшечки плоско-выпуклые, 3 мм. дл., длиннѣе кроющей чешуйки.

C. vulpina, *C. contigua*, *C. echinata*, *C. Leersii*.

2. *Paniculatae* Kunth. Мѣшечки съ обѣихъ сторонъ выпуклые, съ острыми краями.

C. paradoxa, *C. paniculata*, *C. teretiuscula*.

III. *Pyriperhenae* Eries. Цвѣты въ колоскѣ у основанія мужскіе, на верхушкѣ женскіе.

1. *Ovales* Kunth. Мѣшечки по краямъ крылатые.

C. leporina.

2. *Stellulatae* Aschr. et Gr. Мѣшечки не крылатые.

C. stellulata, *C. elongata*, *C. canescens*, *C. vitilis*, *C. loliacea*, *C. tenella*.

3. *Remotae* Aschr. Нижній колосокъ далеко отодвинутъ отъ остальныхъ, у основанія съ длиннымъ прицвѣтнымъ листомъ, превышающимъ все соцвѣтіе.

C. remota.

C. *Heterostachyae* Fries. Колоски разнополые въ одномъ соцвѣтіи. верхіе—мужскіе.

I. *Limnonastes* Aschr. et Gr. Два рыльца; нижній прицвѣтный листъ травянистый, безъ влагалища; мѣшечки при сильномъ увеличеніи пунктированные.

1. *Caespitosae* Fries. Растенія даютъ короткіе побѣги, несущіе только листья и дающіе только на слѣдующій годъ цвѣтушія стрѣлки; нижній колосокъ безъ прицвѣтнаго листа, только съ влагалищемъ или съ очень короткимъ прицвѣтнымъ листомъ.

C. stricta, *C. caespitosa*.

2. *Vulgares* Aschr. Нижній женскій колосокъ съ прицвѣтнымъ листомъ.

C. gracilis, *C. Goodenoughii*.

II. *Cyrtostomae* Fries. Три рыльца; мѣшечки безъ носика или съ короткимъ носикомъ.

1. *Montanae* Fries. Мѣшечки покрыты пушкомъ; колоски почти сидячіе или на короткихъ ножкахъ.

C. globularis, *C. montana*, *C. ericetorum*, *C. caryophyllae*.

2. *Limosae* Fries. Мѣшечки голые, сплюснутые, чечевицеобразные; прицвѣтные листья почти безъ влагалищъ; корневище ползучее.

C. limosa.

3. *Pilosae* Aschr. et Gr. Мѣшечки обратно-яйцевидные, 3-сторонніе; прицвѣтные листья съ влагалищами; листья по краю съ рѣсничками; корневище ползучее.

C. pilosa.

4. *Glaúcae* Aschr. Прицвѣтные листья съ длинными влагалищами, по краю безъ рѣсничекъ; корневище ползучее.

C. panicea, *C. vaginata*.

5. *Palléscentes* Fries. Безъ побѣговъ, растутъ дерновинками; колоски сидятъ сжато.

C. pallescens.

6. *Digitátae* Fries. Мѣшечки пушистые; колоски б. или м. длинные, на ножкахъ.

C. pediformis, *C. digitata*.

III. *Odontóstomae* Aschr. et Gr. Мѣшечки съ б. или м. длиннымъ, двузубчатымъ носикомъ; 3 рыльца.

1. *Strigósaе* Fries. Носикъ не длинный, съ прямо-торчащими зубчиками; женскіе колоски тонкіе, длинные, отклоненные; колоски разставленные.

C. silvatica.

2. *Fulvéllae* Fries. Носикъ такой же, какъ у *Strigosae*; женскіе колоски плотные, густые, прямостоящіе.

C. distans, *C. flava*, *C. Oederi*.

3. *Revérsae* Aschr. Носикъ длинный, съ зубцами расходящимися и отогнутыми; растутъ дернинками безъ побѣговъ; мужской колосокъ одинъ.

C. Pseudocyperus.

4. *Vesicáriae* Fries. Носикъ какъ у *Reversae*; растеніе съ побѣгами; мужскихъ колосковъ нѣсколько; мѣшечки голые.

C. rostrata, *C. vesicaria*, *C. acutiformis*, *C. riparia*.

5. *Lasiocárpae* Fries. Какъ *Vesicariae*, но мѣшечки съ волосками или пушистые.

C. filiformis, *C. hirta*, *C. aristata*.

1. Колоски одинаковой формы, заключаютъ почти всегда мужскіе и женскіе цвѣты, или растеніе двудомное. 2.

Колоски разной формы: верхніе—мужскіе, нижніе—женскіе. 24.

2. Растеніе двудомное. *C. dioica* L.

Растенія однодомныя. 3.

3. Колосъ одинъ, простой, конечный. 4.

Колосъ одинъ, конечный, но сложный, состоитъ изъ 2—3 маленькихъ, скученныхъ колосковъ, или же колосъ состоитъ изъ нѣсколькихъ разставленныхъ колосковъ. 5.

4. Мѣшечки ланцетные, отгибаются книзу, по отцвѣтаніи цвѣточныя чешуйки отваливаются. *C. pauciflora* Lightf.

Мѣшечки продолговато-эллиптическіе, иногда почти шаровидные; чешуйки остаются при плодахъ. *C. obtusata* Liljebl.

5. Верхніе и нижніе колоски въ сложномъ колосѣ женскіе, средніе—мужскіе. *C. disticha* Huds.

Всѣ колоски заключаютъ мужскіе и женскіе цвѣты. 6.

6. Колоски сильно разставлены, состоятъ изъ 1—3 мѣшечковъ мѣшечки овально-эллиптическіе, выпуклые съ обѣихъ сторонъ лоснящіеся, съ неясными продольными жилками; стебель и листья тонкіе, слабые. *C. tenella* Schkur.

Колоски сидятъ б. или м. скученно, если же сидятъ разставленно, то состоятъ изъ большого числа мѣшечковъ, если и встрѣчаются съ 3 мѣшечками, то тогда мѣшечки съ ясными продольными жилками или бороздками, сплюснутые и не лоснящіеся. 7.

7. Колоски въ верхней своей части несутъ мужскіе, въ нижней—женскіе цвѣты, а потому книзу шире, кверху уже. 8.

Колоски въ верхней своей части несутъ женскіе, въ нижней—мужскіе цвѣты, а потому книзу уже, кверху шире. 15.

8. Колоски въ числѣ 3—5, скучены въ яйцевидную или продолговатую головку. *C. chordorrhiza* Ehrh.

Колосковъ много, ясно замѣтныхъ, въ сложномъ, часто метельчатомъ колосѣ. 9.

9. Мѣшечки съ обѣихъ сторонъ выпуклые, въ зрѣломъ видѣ короче кроющихъ чешуекъ. 10.

Мѣшечки плоско-выпуклые, въ зрѣломъ видѣ длиннѣе кроющихъ чешуекъ. 11.

10. Основаніе листьевъ окружено темно-бурыми волокнами отъ отмершихъ листьевъ; мѣшечки тусклые, съ 9—11 продольными жилками; кроющія чешуйки съ узкимъ бѣлымъ краемъ.

C. paradoxa Willd.

Основаніе листьевъ безъ волокнистыхъ остатковъ; мѣшечки лоснящіеся, только въ нижней части слегка бороздчатые; кроющія чешуйки съ широкимъ бѣлымъ краемъ. *C. paniculata* L.

11. Стебель остро-3-гранный съ вогнутыми гранями, вдоль реберъ остро-шершавый; колосъ очень частый, внизу метельчатый; мѣшечки съ ясными 6—7 жилками. *C. vulpina* L.

Стебель 3-гранный съ плоскими или нѣсколько выпуклыми гранями; мѣшечки гладкіе или только внизу съ неясными бороздками. 12.

12. Мѣшечки гладкіе, лоснящіеся, вытянуты въ крылатый носикъ. *C. teretiuscula* Good.

Мѣшечки вытянуты въ носикъ, но не крылатый, гладкіе или только внизу съ неясными бороздками. 13.

13. Язычокъ листа съ узкой свѣтло-бурой каймой.

C. Leersii F. Schultz.

Язычокъ листа безъ каймы, одноцвѣтный. 14.

14. Мѣшечки съ длиннымъ, 2-зубчатымъ носкомъ; язычокъ листа

айцевидно-ланцетный, притупленный. длина его превышает ширину.

C. contigua Horpe.

Мѣшечки съ короткимъ, 2-зубчатымъ носикомъ; язычокъ листа короткій, треугольный, ширина его превышаетъ длину.

C. echinata Murr.

15. Корневище ползучее.

C. praecox Schreb.

Корневище дернистое. 16.

16. Мѣшечки плоско-выпуклые, по краямъ съ широкой каймой.

C. leporina L.

Мѣшечки безъ каймы или съ узкой каймой. 17.

17. Нижніе 2—4 колоска сильно удалены одинъ отъ другого, сидятъ въ пазухахъ длинныхъ прицвѣтныхъ листьевъ, превышающихъ длиною весь колосъ.

C. remota L.

Все колоски въ пазухахъ короткихъ прицвѣтныхъ листьевъ или простыхъ прицвѣтниковъ, не превышающихъ длиною колоса. 18.

18. Мѣшечки безъ носика, сплюснутые, продольно-бороздчатые; колоски сильно разставлены.

C. loliacea L.

Мѣшечки съ б. или м. длиннымъ носикомъ, съ продольными жилками или безъ нихъ, но не бороздчатые. 19.

19. Мѣшечки въ колосѣ сидятъ растопыренно. 20.

Мѣшечки въ колосѣ прижаты къ его оси. 22.

20. Колоски почти шаровидные, съ звѣздчато-растопыренными мѣшечками; мѣшечки плоско-выпуклые, вытянуты въ длинный носикъ, равный самому мѣшечку.

C. stellulata Good.

Колоски продолговатые, мѣшечки слегка оттопырены, но не звѣздчато, съ обѣихъ сторонъ выпуклые, вытянуты въ короткій носикъ, длина котораго короче самого мѣшечка. 21.

21. Колосковъ 6—12, многоцвѣтковыхъ; кроющія чешуйки буроватые съ бѣлымъ краемъ и зеленой срединной жилкой.

C. elongata L.

Соцвѣтіе состоитъ изъ 4—6 колосковъ; колоски маленькіе, иногда 0,5 см. дл., 4—6-цвѣтковые; кроющія чешуйки почти бѣлыя съ зеленой или бурой полоской на спинкѣ.

C. elongata L. *α. Gebhardi* Willd.

22. Мѣшечки переходить въ 2-зубчатый носикъ средней длины, расщепленный вдоль почти до самаго основанія; стебли и листья тонкіе, слабые.

C. vilis Fr.

Мѣшечки переходить въ очень короткій, 2-зубчатый, не расщепленный носикъ; стебли жесткіе, прямоторчащіе или слегка дугообразные. 23.

23. Стебли высокіе, нѣсколько наклоненные; колосъ состоитъ изъ 4—8 колосковъ; колоски овальные, многоцвѣтковые, сидятъ довольно сближенно.

C. canescens L.

Стебли и листья жесткіе, прямоторчащіе, не высокіе; колосъ со-

стоитъ изъ 3—5 колосковъ; колоски разставлены, почти шаровидные, малоцвѣтковые. *C. canescens* L. *a. strictifolia*.

24. Прицвѣтные листья съ длинными влагалищами, иногда только одно влагалище, а пластинки пѣть. 25.

Прицвѣтные листья безъ влагалищъ или съ очень короткимъ влагалищемъ, б. ч. съ длинной, зеленой пластинкой. 30.

25. Мужской колосокъ линейный; верхній — женскій, сидятъ близъ мужского и перерастаетъ его. 26.

Мужской колосокъ булавовидный; женскіе колоски отодвинуты отъ мужского. 27.

26. Цвѣточные стебли выходятъ изъ пазухъ густого пучка листьевъ, окруженныхъ при основаніи красно-бурыми влагалищами; корневище дернистое. *C. dilatata* L.

Цвѣточные стебли выходятъ изъ середины пучка листьевъ, окруженныхъ бурыми или фіолетовыми влагалищами; корневище горизонтально-восходящее, почти деревянистое.

C. pediformis C. A. M.

27. Мѣшечки б. или м. пушистые.

C. hirta L.

Мѣшечки голые. 28.

28. Листья по краямъ длинно-рѣсничатые. *C. pilosa* Scop.

Листья безъ рѣсничекъ. 29.

29. Цвѣточный стебель при основаніи съ пучкомъ короткихъ спящихъ листьевъ; мѣшечки съ продольными жилками, заостренные въ короткій, толстый, тупой носикъ; кроющія чешуйки темно-пурпурово-бурыя съ узкой бѣлой каймой.

C. panicea L.

Цвѣточный стебель покрытъ у основанія влагалищами съ короткими зелеными пластинками; мѣшечки съ слабыми продольными жилками, заострены въ нѣсколько удлинненный, на верхушкѣ косою и выемчатый носикъ; кроющія чешуйки красно-бурыя безъ бѣлой каймы.

C. vaginata Tausch.

30. Рылецъ два. 31.

Рылецъ три. 34.

31. Влагалища сѣтчато-волокнистыя; корневище дернистое, безъ побѣговъ. 32.

Влагалища цѣльные, не сѣтчато-волокнистыя; корневище съ подземными побѣгами. 33.

32. Мѣшечки съ явственными 5—7 продольными жилками.

C. stricta Good.

Мѣшечки безъ продольныхъ жилокъ.

C. caespitosa L.

33. Листья стрѣло-зеленые; женскіе колоски б. ч. торчащіе; нижній прицвѣтный листъ равенъ или короче всего соцветія; мѣшечекъ плоско-выпуклый.

C. Goodenoughii Gay.

Листья зеленые; женскіе колоски обыкновенно повислые; ниж-

ний прицветный листъ превышаетъ длиною все соцветіе; мѣшечекъ съ обѣихъ сторонъ выпуклый. *C. gracilis* Curt.

34. Мѣшечки пушистые или покрыты б. или м. рѣдкими волосками. 35.

Мѣшечки голые. 40.

35. Женскіе колоски сидятъ разставленно, нижній иногда значительно удаленъ отъ остальныхъ. 36.

Женскіе колоски сидятъ скученно, иногда нижній нѣсколько удаленъ. 38.

36. Листья плоскіе, широкіе, тесьмовидные.

C. aristata R. Br.

Листья узкіе, иногда почти щетиновидные. 37.

37. Колоски маленькіе, шаровидные; стебли тонкіе, часто дугообразно пригнутые къ землѣ; корневище даетъ вѣтвистые побѣги; кроющія чешуйки яйцевидныя. *C. globularis* L.

Колоски продолговатые, средней величины; стебли прямостоящіе, 3-гранные; корневище безъ побѣговъ; кроющія чешуйки ланцетныя. *C. lasiocarpa* Ehrh.

38. Кроющія чешуйки обратно-яйцевидныя, тупыя, съ широкой бѣловатой, спереди бахромчатой каймой.

C. ericetorum Poll.

Кроющія чешуйки острые. 39.

39. Листья жесткіе, согнутые; колоски яйцевидно-продолговатые, нижній иногда нѣсколько отодвинутъ; корневище даетъ побѣги.

C. caryophyllea Latour.

Листья ярко-зеленые, мягкіе, вверхъ торчащіе, не согнутые; колоски шаровидные, все скучены близь мужского; корневище дернистое, почти деревянистое, безъ побѣговъ.

C. montana L.

40. Женскіе колоски шаровидные, овальные или продолговатые. 41.

Женскіе колоски цилиндрическіе или длинно-цилиндрическіе. 45.

41. Мѣшечки безъ носика или съ очень короткимъ носикомъ. 42.

Мѣшечки съ длиннымъ, 2-зубчатымъ носикомъ. 43.

42. Мѣшечки сплюснутые, чечевичеобразные, матовые, съ 5 жилками на спинкѣ; листья сизо-зеленые, узкіе. *C. limosa* L.

Мѣшечки продолговато-овальные, вздутые, лоснящіеся; листья широко-линейные, желто-зеленые. *C. pallescens* L.

43. Листья сѣро-зеленые, съ язычкомъ, сидящимъ супротивъ пластинокъ; прицветные листья вверхъ торчащіе.

C. distans L.

Листья темно-зеленые, безъ язычка супротивъ пластинокъ листа; прицветные листья отстоящіе, иногда отогнуты книзу. 44.

44. Женскіе колоски округло-овальные; мѣшечки оттопыренные, нижніе отклонены внизъ и сужены въ длинный, отогнутый носикъ. *C. flava* L.

Женскіе колоски шаровидные, маленькіе; мѣшечки сужены въ довольно короткій, прямой носикъ. *C. Oederi Ehrh.*

45. Всѣ женскіе колоски на длинныхъ, поникающихъ ножкахъ. 46. Всѣ женскіе колоски сидячіе или на короткихъ ножкахъ, а нижній на 6. или м. длинной, иногда поникающей. 47.

46. Женскіе колоски сидятъ скученно. *C. Pseudocyperus L.*
Женскіе колоски сидятъ спльно разставленно.

C. silvatica Huds.

47. Кроющія чешуйки длинно заострены или вытянуты почти въ ость, по краямъ остро-пильчато-шершавыя. 49.

Кроющія чешуйки заостренныя, по краямъ не пильчато-шершавыя. 48.

48. Стебель тупо-3-гранный; листья узкіе, сѣро-зеленые; мѣшечки почти шаровидные, 4—5 мм. дл., быстро вытянуты въ носикъ.

C. rostrata Willh.

Стебель остро-3-гранный; листья широкіе, ярко-зеленые; мѣшечки яйцевидно-коническіе, вздутые, около 7 мм. дл., постепенно переходятъ въ носикъ.

C. vesicaria L.

49. Кроющія чешуйки блѣдно-зеленыя, по созрѣваніи плода блѣдно-желтоватыя.

C. aristata R. Br.

Кроющія чешуйки черно-бурыя или свѣтло-красно-бурыя съ зеленой полоской на спинкѣ. 50.

50. Листовыя влагалища сѣтчато-расщепленныя; женскіе колоски торчащіе, почти сидячіе; нижнія чешуйки въ мужскихъ колоскахъ тупыя, остальные—острыя. *C. acutiformis Ehrh.*

Листовыя влагалища цѣльныя; нижній женскій колосокъ 6. ч. отодвинуть, на длинной, поникающей ножкѣ; всѣ кроющія чешуйки въ мужскомъ колоскѣ вытянуты въ острый.

C. riparia Curt.

156. **C. dióica L.** Пет. Кр. III, стр. 83.—Ф. Б., № 107.—Пет., стр. 156.—Кауф. II, № 781.—Дил., № 1525.—Кауф. I, стр. 520.—Lind., p. 172.—Ann. C. V, № 72.—Дв., № 846.—Макс., № 836.—Gold. C., p. 22.—Gold. Sp., p. 137.—Mart., p. 161.—St. I, № 629.—Pal., № 2006.

Корень даетъ длинныя подземныя побѣги; стебель цилиндрическій. въ верхней части тупо-3-гранный, съ тонкими продольными линиями. 8—45 см.; листья тонкіе, щетиновидные, 3-гранные или слегка желобчатые, корневыя—съ свѣтло-бурыми влагалищами; колосъ одинъ, конечный. вверхъ торчащій, либо мужской, либо женскій, рѣдко у основанія мужского колоса сидятъ 2—3 женскихъ цвѣтка; мужской колосъ линейно-цилиндрическій, женскій—эллиптическо-цилиндрическій или яйцевидный: кроющія чешуйки красновато-бурыя, по краямъ съ блѣлой каймой и съ зеленой полоской на спинкѣ; чешуйки женскаго колоска нѣсколько темнѣе мужскаго: рылецъ 2; мѣшечки яйцевидные, соединенныя съ продольными жилками. заостренныя въ короткій носикъ, края котораго остро-


шершавые. Цвѣты съ начала мая. плоды въ июнѣ. зрѣлые—съ начала августа. По торфянымъ моховымъ болотамъ. Перово. Три горы (Гольдб.).—



Carex dioica.



Carex pauciflora.



Carex obtusata.

Лоспінный Островъ (А.).— Б. Мытниця (П. и С.).— Марьино (Генн.).— Косино. близъ Богородскаго. Мос. у. лѣсъ близъ Захаровскаго озера. Кля. у. (П.).

157. *C. pauciflora* Lightf. Пер. Кр. III, стр. 84.—Ф. Б., № 18.

Корень ползучій; стебель 5—20 см., 3-гранный, какъ и листья шероховатый; листья почти ланцетные. съ завернутыми краями. отчего кажутся 3-гранными. короче стебля. нижніе — съ свѣтло-бурыми влагалищами; колосъ конечный. состоитъ не болѣе какъ изъ 6 цвѣтовъ, изъ которыхъ конечный мужской: кроющія чешуйки блѣдно-желтыя. ланцетныя. при женскихъ цвѣтахъ туповатыя. при мужскихъ—заостренныя и въсколько темнѣе окрашены; по отцвѣтаніи всѣ чешуйки отваливаются и мѣшечки отгибаются книзу; 3 рыльца; мѣшечки ланцетно-шпловидные. слабо-3-гранные. свѣтло-бурые или буро-желтые. съ неясными продольными жилками. Плоды со середины іюня. Моховое болото у села Захарова вокругъ Захаровскаго озера. Кля. у. и близъ Вертлннскаго (недалеко отъ Подсолнечнаго), Кля. у. (П.).

158. *C. obtusata* Liljebl. Пет. Кр. III, стр. 84.

Carex spicata Schk. Ф. Б., № 17.

Корневище ползучее, покрыто темно-бурыми чешуями и даетъ мало цвѣточныхъ стеблей и очень много пучковъ листьевъ; листья линейные. плоскіе. по краямъ шероховатые. съ пурпурово-бурыми влагалищами. по отмираніи влагалища дѣлаются темно-бурыми; стебли 5—20 см., болѣею частью не превышаютъ листья. тупо-3-гранные. въ верхней части шероховатые; колосъ одинъ. конечный, во время цвѣтенія 5—15 мм. дл. узко-цилиндрическій, по отцвѣтаніи часть съ женскими цвѣтами сильно утолщается; кроющія чешуйки яйцевидныя. туповатыя. желтовато-

бурии съ широкимъ бѣлымъ перепончатымъ краемъ; мѣшечки до 2.5 мм. дл., тупо-3-гранные, продолговато-эллиптическіе, лоснящіеся, желто- или темно-бурые, съ неясными продольными жилками (на незрѣлыхъ мѣшечкахъ жилки ясно замѣтны) и съ короткимъ, 2-зубчатымъ носикомъ; рылецъ 3. Цвѣтетъ съ начала мая, плоды съ конца мая и въ началѣ іюня. На песчаныхъ холмахъ за Лужками. Спр. у., у опушки лѣса (Мил.). Коншинскій лѣсъ за Борисовымъ, Спр. у., по опушкѣ (П. и С.).

159. *C. chordorrhiza* Ehrh. Пет. Кр. III, стр. 85.—Ф. Б., № 108.—Пет., стр. 156.—Кауф. II, № 782.—Мил., № 36.—Гор., № 47.—Цав., № 1528.—Кауф. I, стр. 521.—Дв., № 849.—Макс., № 838.—Нoff. II, № 7421.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 161.—Lon., p. 282.

Даетъ очень длинныя, свѣтло- или темно-бурыя побѣги, годовалыя окапчиваются цвѣтущимъ стеблемъ и на всѣхъ узлахъ съ пучками листьевъ; стебель 10—30 см., цилиндрическій или слабо-гранистый, прямостоящій или слегка восходящій; листья съ свѣтло- или темно-бурыми влагалищами, узко-линейные, по краямъ слабо-шероховатые, заостренные, короче стебля; колосъ конечный, состоитъ изъ 3—5 маленькихъ колосковъ, верхушечные цвѣты которыхъ мужскіе, часто колоски сидятъ такъ скученно, что колосъ кажется не сложнымъ; кроющія чешуйки широко-яйцевидныя, красно-бурыя съ широкимъ, бѣлымъ перепончатымъ краемъ и иногда съ зеленой полоской на спинкѣ; мѣшечекъ яйцевидный или округло-эллиптическій, около 4 мм. дл., красно-бурый, рѣже зеленоватый, гладкій, съ продольными жилками и съ короткимъ, двузубчатымъ носикомъ. Цвѣты съ $\frac{2}{2}$ мая, зрѣлые плоды съ $\frac{2}{2}$ іюля. По тонкимъ моховымъ торфянымъ болотамъ. Влнзъ Церова, Измайловскій звѣринецъ (Гольд.).—Горенки (Лондесъ).—Плѣніе Ольгино. Карженъ. Моск. у. (Ф. Б.).—Глубокое озеро, Ряз. у. (Г. О. и Ф. В.).—Тростенское озеро, Ряз. у. (Ч. и П.).—В. Мытищи (П. и Г. М.).—Болото вокругъ Саввинскаго (Полецкаго) озера. Вер. у. Косино—Черное озеро; Захаровское озеро. Кал. у. Вертлинское озеро. Кал. у. (П.).—Перское озеро. Моск. у. (П. и С.).




Carex chordorrhiza.

160. *C. disticha* Huds. Пет. Кр. III, стр. 91.—Кауф. II, стр. 541.—Кауф. I, стр. 536.—Нoff. II, № 7432.
Carex intermedia Good. Пет., стр. 156.—Цви., № 1530.—Дв., № 851.—Макс., № 839.—Mart., p. 161.

Корневище ползучее, покрыто черными или буро-черными чешуйками; стебли 15—40 см., 3-гранные, въ верхней части шероховатые, во

время цвѣтенія равны листьямъ или нѣсколько длиннѣе ихъ: листья съ бурыми или черно-бурыми влагалищами, желобчатые. 3—4 мм. шир., по краямъ и по спинкѣ шероховатые; цвѣты расположены сложнымъ, 6. или м. прерваннымъ, часто метельчатымъ колосомъ, достигающимъ 4 см. дл.; колоски яйцевидные, въ нижней и въ верхней своей части состоятъ изъ женскихъ, въ средней изъ мужскихъ цвѣтовъ; кроющія чешуйки продол-



Carex disticha.



Carex praecox.

говатые, заостренныя, красно-бурныя съ бѣлымъ краемъ; мѣшечки яйцевидные, нѣсколько длиннѣе кроющихъ чешуекъ, съ острымъ краемъ, вытянуты въ острый, 2-зубчатый носикъ, зрѣлые—темно-бурые или красно-бурые. Находится въ гербаріи Гофмана.

161. **C. praecox Schreb.** Петр. Кр. III, стр. 83.

Carex Schreberi Schrank. Петр., стр. 157.—Кауф. II, № 788.—Цил., № 1545.—Рупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 523.—Ann. C. I, № 52.—Дв., № 856.—Макс., № 840.—Gold. C., p. 22.—Gold. Sp, p. 138.—Mart., p. 162.—St. II, p. 52.

Carex arenaria L. Mart., p. 161.—St. I, № 631.—Pal., № 2007.

Carex brizoides L. Gold. Sp., p. 141.—Mart., p. 162.—St. I, № 44.—Pal., № 2009.

Корневище бурое или черно-бурое, ползучее, даетъ стебли и пучки листьевъ; стебли 10—60 см., 3-гранные, только близъ верхушки шероховатые, тонкіе, длиннѣе листьевъ; листья съ бурыми влагалищами, узкіе, часто только 1 мм. шир., шероховатые; колосъ сложный, состоитъ изъ 3—6, сперва эллиптическо-ланцетныхъ, потомъ овальныхъ колосковъ, у которыхъ нижніе цвѣты мужскіе; кроющія чешуйки яйцевидныя, заостренныя, красно-бурныя, часто съ зеленой полоской на спинкѣ, съ бѣлымъ краемъ, нѣсколько короче мѣшечковъ или равны имъ; мѣшечки около 2 мм. дл., широко-яйцевидные, красно-бурые, съ жилками, спереди выуклые, сзади плоскіе, быстро переходятъ въ двузубчатый носикъ, бока котораго отъ основанія мелко-зубчатые. Цвѣты съ начала мая до начала іюня. зрѣлые плоды съ конца мая. По песчанымъ холмамъ и откосамъ. Ку-

еково; Ильинское, Зви. у. (К.).—Воробьевы горы, Серебряный боръ близъ Хорошова; Вѣлые Колодези, Кзм. у. (П.).—По всему побережью Оки на пескахъ.

α. pallida Lang. (sp.) non curvata Knauf. Пет. Кр. III, стр. 83.

Съ сильно удлиненными стеблями и листьями, достигающими длину стебля, б. ч. дугообразно наклоненными къ землѣ; колосъ прерванный; кроющія чешуйки свѣтло-красно-бурыя или почти бѣлыя. Пар. Перекой противъ Губина, Бри. у. и Серебряный боръ близъ Хорошова (П.).—Молоди, по опушкѣ лѣса (К.).—Пушкино по откосу р. Учи (С.).

162. *C. vulpina* L. Бух. II, № 425.—Бух. I, № 400.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 157.—Кауф. II, № 783.—Цин., № 1533.—Кауф. I, стр. 521.—Lind., p. 172.—Дв., № 852.—Макс., № 843.—Hoff. II., № 7481.—Gold. C., p. 22. Gold. Sp., p. 138.—Mart., p. 162.

Корневище толстое, съ многочисленными, толстыми, перенлетающимися корнями; стебли 30—90 см., 3-гранные, съ вогнутыми сторонами и остро-шероховатыми углами; листья тесьмовидные, 4—9 мм. шир., по краямъ остро-шероховатыя, съ влагалищами; корневыя—окружены темно-бурыми, волокнистыми остатками отмершихъ листьевъ; колосъ цилиндрическій, сложный, у основанія часто метельчатый; колоски яйцевидные, сидятъ б. ч. очень плотно другъ къ другу; кроющія чешуйки овальныя, длинно-заостренныя, красно-бурыя съ зеленой полоской на спинкѣ; мѣшечекъ около 5 мм. дл., съ 5—7 продольными жилками, нѣсколько темнѣе кроющихъ чешуекъ, яйцевидный, постепенно переходитъ въ длинный, 2-зубчатый носикъ, равный почти $\frac{1}{3}$ всего мѣшечка, по краямъ остро-шероховатый. Цвѣты со середины мая, зрѣлые плоды съ начала юля. По болотамъ. у ручьевъ и по сырымъ мѣстамъ. Кунцово, Остапкинское (К.).—Вороново, Пдл. у. (Б.).—Серебряный боръ, Кусково (П.).—Мытищи, Рупосово, Мос. у., Измайловскій звѣринецъ (С.).



Carex vulpina.

α. nemorosa Rebert. (sp.). Кауф. II, стр. 542.—Цин., стр. 452.—Кауф. I, стр. 521.

Колосъ прерванный, часто метельчатый, съ длинными прицветными листьями, пзъ которыхъ нижній длиннѣе всего колоса. Все растеніе значительно тоньше и меньше типичной формы (форма тѣннстыхъ мѣстъ).

163. *C. contigua* Hoppe. Пет. Кр. III, стр. 85.

Carex muricata L. Бух. II, № 426.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 157.—Кауф. II, № 784.—Цин., № 1534.—Кауф. I, стр. 522.—Lind., p. 172.—Ann. C. V, № 73.—Дв., № 813.—Макс., № 844.—Hoff. H., № 7458.—Gold., C., p. 22.—Gold. Sp., p. 138.—Mart., p. 162.—St. II, p. 52.—St. I, № 635.

Корневница даёт много переплетающихся корней; стебли 15—60 см., прямостоящие или косо-приподнимающиеся, остро-3-гранные, шероховатые. у основанія окружены темно-бурыми, волокнистыми остатками отмерших листьев; листья, особенно корневые, съ длинными, свѣтло-бурыми влагалищами, б. ч. не шире 3 мм., плоскіе; язычокъ листа яйцевидно-ланцетный, притупленный, длина его превышаетъ ширину, съ узкимъ перепончатымъ, б. ч. разорваннымъ краемъ; колосъ сложный, цилиндрическій, б. ч. не прерванный, рѣже нѣсколько прерванный; колоски 8—10-цвѣтковые, мало растопыренные; кроющія чешуйки овальныя, длинно-заостренныя, свѣтло-коричневая съ зеленой полоской на спинкѣ; мѣшечки



Carex contigua.



Carex echinata.

почти 5 мм. дл., яйцевидные, безъ жилокъ или съ жилками только у основанія, зеленые, потомъ буроватые, лоснящіеся, переходятъ въ длинный, 2-зубчатый носокъ, по краямъ шероховатый. Цвѣты съ конца мая, плоды съ конца іюня. По кустарникамъ и по опушкамъ. часто. Михайловское, Пдл. у. (Б.). Воробьевы горы; Бѣлые Колодези, Кзм. у. (П.).—Липовая роща близъ Игнатьева, Кзм. у. (П. и С.).

164. *C. echinata* Murr. (Kükenthal. *C. fulva* Good und *C. echinata* Murr. All. Bot. Zeit. 1905, № 3, pag. 45).

Carex Pairaei F. Schultz. Пет. Кр. III, стр. 86.

Стебли 40—75 см., тупо-3-гранные, въ нижней части гладкіе, въ верхней—шероховатые; листья плоскіе, по краямъ шероховатые, до 4 мм. шир.; влагалища не разорванныя—цѣльныя; язычокъ короткій, треугольный, ширина превышаетъ его длину, съ узкимъ, бѣлымъ перепончатымъ, не разорваннымъ краемъ; колосъ рѣдкій, б. ч. прерванный; мѣшечки въ колоскахъ звѣздчато растопырены; прицвѣтныя листья б. ч. короче колосковъ, очень рѣдко превышаютъ ихъ; кроющія чешуйки яйцевидно-ланцетныя, заостренныя, свѣтло-коричневая съ широкой зеленой полоской на спинкѣ; мѣшечки широко-яйцевидныя, съ короткимъ, 2-зуб-

чатымъ носикомъ, зрѣлые — почти черные. Незрѣлые плоды въ концѣ юня. Близъ Саввинскаго монастыря, Звн. у. (П. п С.). — Хмѣтвево, Клн, у. (П.).

165. *C. Leersii*. F. Schultz. Пет. Кр. III, стр. 86.

Carex remota. Hoff. H., № 7470.

Стебель 30—100 см., тонкій, слабый, тупо-3-гранный; листья плоскіе, до 4 мм. шир., по краямъ шероховатые, съ длинными влагалищами; язычокъ коротко-треугольный, ширина его превышаетъ длину, съ узкой, свѣтло-бурой, не разорванной каймой; колосъ длинный, цилиндрическій, прерванный на большіе промежутки; мѣшечки въ колоскахъ мало расто-



Carex Leersii.



Carex paradoxa.

пырены; прицвѣтные листья б. ч. щетинovidные, длиннѣе колосковъ; кроющія чешуйки блѣдныя; мѣшечки 5 мм. дл., яйцевидные, лоснящіеся, заостренныя въ носикъ средней длины, по краямъ шероховатый. Находится въ гербаріи Гофмана подъ № 7470.

166. *C. paradoxa* Willd. Пет. Кр. III, стр. 87.—Пет., стр. 157.—Кауф. II, № 787.—Мил., № 37.—Цив., № 1536.—Кауф. I, стр. 523.—Макс., № 850.—Hoff. H., № 7462.—Gold. C., p. 22.—Gold. Sp., p. 138.

Carex diandra Schr. Hoff. H., № 7462.

Корневища образуютъ дерновинки или кочки; стебли прямостоящіе или дугообразно отогнутые, 30—70 см., 3-гранные, остро-шершавые, основание ихъ, какъ и основаніе листьевъ, окружено черно-бурыми волокнистыми остатками отжившихъ листьевъ; листья остро-шероховатые, короче стеблей; колосъ 2-сложный, часто метельчатый, то съ прижатными, то съ отстоящими вѣточками; кроющія чешуйки яйцевидныя, заостренныя, красно-бурыя, съ узкимъ бѣлымъ краемъ, иногда и безъ него; мѣшечки округло-яйцевидные, тусклые, съ 9—11 жилками, бурые или темно-бурые, быстро переходятъ въ длинный, почти цилиндрическій, 2-зубчатый носикъ. Цвѣты со середины мая, зрѣлые плоды съ конца юня. Часто по

берегамъ прудовъ, по канавамъ и по болотамъ на торфяной почвѣ. Люблино (Гольд.).—Богородское (М.).—Захарово. Блн. у., Тростенское озеро, Руз. у., Машино по р. Ширникъ, Дмит. у., Косино—Черное озеро, Мытищи; между Никифоровымъ и р. Лопасней, Сри. у. (П.).

167. *C. paniculata* L. Пет. Кр. III, стр. 86. — Мос., № 41. — Пет., стр. 157. — Кауф. II, № 786. — Цин., № 1537. — Рупр., стр. 88. — Кауф. I, стр. 522. — Дв., № 860. — Макс., № 851. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 163. — St. I, № 638.

Корневища образуютъ плотныя дерновинки; стебли 40—90 см. дл., длиннѣе листьевъ, 3-гранные, остро-шершавые, основаніе ихъ окружено черно-бурыми, лоснящимися, жесткими влагалищами; листья тесьмовидные, до 5 мм. шир., остро-шершавые; соцветіе—двусложный, метельчатый колосъ съ боковыми нижними вѣточками, достигающими 4 см. дл.; колоски сидятъ густо; кроющія чешуйки овальныя, свѣтло-коричневыя, съ широкимъ бѣлымъ, перепончатымъ краемъ, отчего весь колосъ кажется блѣдно-



Carex paniculata.



Carex teretiuscula.

окрашеннымъ; мѣшечки яйцевидные, около 3 мм. дл., лоснящіеся, по созрѣваніи темно-бурые, только въ нижней части слегка бороздчатые, переходятъ въ плоскій, 2-зубчатый носикъ, края котораго остро-шершавые отъ мелкихъ зубчиковъ. Близъ пруда с. Остафьева, Пдл. у. (Мос.).

168. *C. teretiuscula* Good. Пет. Кр. III, стр. 86. — Бух. II, № 427. — Бух. I, № 399. — Пет., стр. 157. — Кауф. II, № 785. — Цин., № 1535. — Кауф. I, стр. 522. — Lind., p. 174. — Ann. C. V, № 74. — Дв., № 850. — Макс., № 849. — Gold. C., p. 22. — Gold. Sp., p. 138.

Carex diandra Schr. Hoff. II, № 7428.

Корневища даютъ нѣсколько стеблей, основаніе которыхъ окружено бурыми или черно-бурыми остатками листьевъ; стебли 30—60 см., 3-гранные, только въ верхней части съ нѣсколько выпуклыми гранями, шероховатые; листья узкіе, около 2 мм. шир., шероховатые, б. ч. равны стеблю;

колосъ цилиндрической. сложный. иногда у основанія метельчатый. б. ч. не длиннѣе 3 см.; кроющія чешуйки овальныя, заостренныя, красно-бурья съ бѣлымъ перепончатымъ краемъ и зеленой полоской на спинкѣ; прицвѣтный листъ б. ч. щетиновидный, шероховатый; мѣшечки продолговато-яйцевидныя, около 3 мм. дл., у основанія съ неясными жилками, лоснящіяся, каштаново-бурья или почти черныя, вытянуты въ длинный, крылатый носикъ, по краямъ остро-шершавый и на самомъ концѣ цѣльно-крайний, двузубчатый. Цвѣты со середины мая, плоды со середины іюня. По болотамъ и болотистымъ лугамъ. Лосипный Островъ, Иваньково, Строгино, Темниковъ, Пушкино (К.). — Перово, Три горы (Гольдб.). — Марьино (Генн.). — Юрьевское озеро, Пдл. у. (В.). — Тростенское озеро, Руз. у.; Мытищи, Косино (П.).

169. *C. leporina* L. Пет. Кр. III, стр. 89. — Бух. II, № 428. — Бух. I, № 398. — F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 157. — Кауф. II, № 791. — Цин., № 1539. — Кауф. I, стр. 524. — Borg., p. 700. — Дв., № 854. — St. II, p. 52. — St. I, № 633. — Pal., № 2008.
Carex ovalis Good. Ann. C. I, № 51. — Макс., № 842. — Hoff. II, № 7451. — Gold. C., p. 22. — Gold. Sp., p. 138. — Mart., p. 162.

Образуетъ густыя дерновинки, даетъ короткіе побѣги; стебли прямо-торчащія, 3-гранные, только близъ верхушки шероховатые; листья около 3 мм. шир., по краямъ шероховатые, б. ч. короче стеблей; корневыя — окружены темно-бурьями, часто волокнистыми остатками отмершихъ листьевъ; колосъ состоитъ изъ 4—6 обратно-яйцевидныхъ, въ молодости почти веретенообразныхъ колосковъ, сидящихъ б. ч. очень близко одинъ къ другому; кроющія чешуйки яйцевидно-ланцетныя, слегка лоснящіяся, бурья, съ бѣлой каймой и зеленой полоской на спинкѣ; мѣшечки вверхъ торчащія и прижатые одинъ къ другому, крылатые, съ слегка завернутыми внутрь краями, около 4 мм. дл., равны кроющимъ чешуйкамъ, плоско-выпуклые, овальныя, съ тонкими жилками, вытянуты въ 2-зубчатый носикъ, достигающій 1 мм. дл., по краямъ остро-шершавый. Цвѣты со середины мая, послѣдніе зрѣлые плоды въ началѣ августа. По сырýmъ мѣстамъ, канавамъ и по дорогамъ, часто. Иваньково (К.). — Михайловское, Пдл. у. (В.). — Пушкино близъ Учи, Мытищи (С.).



Carex leporina.

2. *capitata* Sonder (sp.). Колоски очень крупныя, во время плодоношенія сидятъ очень скученно, почти головчато. Павловскій посадъ, Воробьевы горы (П.). — Мытищи (С.).
 3. *argyroglochis* Hornem. Пет. Кр. III, стр. 88. — Мос., № 42. — Кауф. II, стр. 546. — Цин., стр. 453. — Кауф. I, стр. 525.

Растеніе съ очень высокими, слабыми стеблями и длинными, часто дугообразно отогнутыми листьями; колоски нѣсколько удалены одинъ отъ другого; кроющія чешуйки свѣтло-бурья, почти бѣлыя.

(Форма тѣпистыхъ мѣстъ). Мытищи удѣльный лѣсъ (С.).—Тѣсныя дачи Шебалды и Грачевники. пмѣние гр. Шереметева. Пдл. у. (Мос.).

170. *C. stellulata* Good. (non *C. echinata* Murr.) Пет., стр. 158.—Кауф. II, № 790.—Цин., № 1543.—Кауф. I, стр. 524.—Дв., № 858.—Макс., № 845.—Gold. C., p. 22.—Gold. Sp., p. 138.—Mart., p. 163.

Carex echinata Murr. Пет. Кр. III, стр. 89.

Carex echinata Ehrh., non Murr. (Kükenthal. *C. fulva* Good. und *C. echinata* Murr. All. Bot. Zeit. 1905, № 3, pag. 45).



Carex stellulata.

Корневище дернистое; стебли 10—40 см., торчащие, шероховатые; листья узкіе, около 2 мм. шир., слабо-шершавые; колосъ состоитъ изъ 3—5, рѣже 7 колосковъ, нѣсколько разставленныхъ; колоски почти шаровидные, съ звѣздчато-растопыренными мѣшечками; верхній колосокъ въ нижней части съ мужскими цвѣтами; прицвѣтные листья щетиновидные, нижній—не превышаетъ колоса; кроющія чешуйки короче мѣшечковъ, яйцевидныя, заостренные или туповатыя, свѣтло-бурыя, съ зеленой полоской на спинкѣ; мѣшечки яйцевидные, около 3 мм. дл., съ наружной стороны выпуклые, съ продольными жилками, съ внутренней—плоскіе, безъ жилокъ, зеленые, по краямъ буроватыя, вытянуты въ длинный, равный самому мѣшечку носикъ, на концѣ 2-зубчатый, по краямъ острошершавый. Цвѣты съ $\frac{2}{2}$ мая, зрѣлые плоды съ начала іюля. По болотамъ и болотистымъ кустарникамъ. Богородское, Строгино, Иваньково (К.).—Воробьевы горы (Гольдб.).—Бутырки (Мар.).—Мытищи—

Лоспинный Островъ (С.).—Косино; болото по р. Шпринкѣ—близъ Машина. Дмт. у., Глубокое озеро, Руз. у., Тростенское озеро, Руз. у. (П.).—Ст. Удѣльная по Моск. Каз. ж. д. берегъ р. Македоновки (Куль.).

171. *C. elongata* L. Пет. Кр. III, стр. 89.—Бух. II, № 429.—Бух. I, № 396.—Пет., стр. 158.—Кауф. II, № 792.—Цин., № 1538.—Кауф. I, стр. 525.—Ann. C. V, № 75.—Дв., № 859.—Макс., № 848.—Gold. C., p. 22.—Gold. Sp., p. 138.—Mart., p. 163.

Carex loliacea. St. II, p. 53.—St. I, № 636.—Pal., № 2010.

Образуетъ дерновникъ; стебли 30—70 см., гнѣзкіе, 3-гранные, острошершавые; листья съ свѣтло-бурыми влагалищами, по краямъ острошершавые, ярко-зеленые, отъ 2 до 5 мм. шир.; колосъ удлинненный, до 7 см. дл., состоитъ изъ 4—12 б. или м. сближенныхъ колосковъ; колоски продолговатые, до 1 см. дл., многоцвѣтковые; кроющія чешуйки овальныя, коротко-заостренные, буроватыя, съ бѣлымъ краемъ и зеленой жилкой на спинкѣ; мѣшечки продолговато-ланцетные, зрѣлые—слегка оттопырены, около 3 мм. дл., съ обоихъ сторонъ выпуклые, съ продольными выдающимися жилками, зеленовато-бурые или бурые, вытянуты въ короткій носикъ, по краямъ слегка острошершавый и на концѣ съ 2 очень

маленькими зубчиками. Цвететъ весь май, зрѣлые плоды съ $\frac{2}{2}$ июня. По берегамъ рѣкъ, по лѣсамъ и болотистымъ мѣстамъ. Перово, Три



Carex elongata.



Carex elongata α . *Gebhardi.*



Carex canescens.

горы (Гольдб.).—Раменское, Брн. у. (К.).—Пушкино берегъ р. Учи, Косино (С.). — Тростенское озеро, Руз. у. (П. и С.). — Троицкое-Кайнарджи, Богородское, Мос. у., Звенигородъ (П.).

α . Gebhardi Willd. Пет. Кр. III, стр. 90.

Стебли 15—35 см.; колосъ состоитъ изъ 5—6 колосковъ; колоски далеко разставлены, такъ что нижній иногда отстоитъ отъ слѣдующаго на 1 см., очень маленькіе, иногда только 4 мм. дл., 4—6-цвѣтковые; кроющія чешуйки почти бѣлыя, съ зеленой или бурой полоской на спинкѣ; мѣшечки яйцевидные, съ короткимъ носикомъ, зрѣлые—бурые. Хотѣлич—болотистый еловый лѣсъ по правому берегу р. Нерской, Втр. у., и Впорево, Кля. у., въ еловомъ болотистомъ лѣсу (П. и С.).

172. ***C. canescens* L.** Пет. Кр. III, стр. 90.—Бух. II, № 430.—Бух. I, № 397.—
F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 158.—Кауф. II, № 793.—
Цил., № 1540.—Кауф. I, стр. 525.—Дв., № 857.

Carex curta Good. Ann. C. I, № 53.—Borg., p. 700.—Макс., № 847.—Нoff. II,
№ 7424.—Gold. C., p. 22.—Gold. Sp., p. 138.

Стебли нѣсколько дугообразно наклоненные, 3-гранные, съ 2 гранями остро-шершавыми и 1 гранью гладкой, 20—60 см.; листья съ красновато-бурыми или свѣтло-бурыми влагалищами, 2—4 мм. шир., мягкіе, слегка остро-шершавые; колосъ продолговатый, 2—7 см. дл., состоитъ изъ 4—8 колосковъ; колоски овальные, многоцвѣтковые, сближены настолько, что верхушка нижняго колоска касается основанія слѣдующаго, или же б. или м. разставлены; кроющія чешуйки широкия, почти округлыя, съ короткимъ остриемъ, бѣловатыя, потомъ свѣтло-буровато-желтыя, съ зеленой полоской; мѣшечки зеленоватые или свѣтло-желтые, яйцевидные

или слегка продолговатые, около 2 мм. дл., съ тонкими продольными жилками и съ очень короткимъ носкомъ, оканчивающимся 2 маленькими зубчиками. Цвѣты съ $\frac{2}{2}$ мая, зрѣлые плоды съ конца іюня. По



1427 85. *Carex canescens* v. *strictifolia*.



Carex vitilis.

болотамъ, болотистымъ дугамъ и по берегамъ рѣкъ, часто. Грачевники, Вороново, Пдл. у. (Б.).—Мытищи. Пушкино—берегъ р. Учи (С.).—Раменское, Брн. у.; Косино, Богородское, Мос. у. (П.).

α. *strictifolia*.

Carex canescens L. *subulsiacea* Laest. Пет. Кр. III, стр. 90 ¹⁾.

Стебли торчащіе; листья жесткіе, тоже торчащіе; колосъ состоитъ изъ 3—5 колосковъ, б. ч. разставленныхъ; колоски почти шаровидные, малоцвѣтковые. Мытищи—Лосинный Островъ (С.).—Серебряный боръ близъ Хорошова (П. и С.).—Косино, Воробьевы горы, Богородское, Мос. у., Быково, Брн. у., Раменское, Брн. у., Новинки, Звн. у. (П.).

173. *C. vitilis* Fr. Пет. Кр. III, стр. 91.—Пет., стр. 158.

Carex canescens L. *brunnascens* Koch. Кауф. II, стр. 547.—Кауф. I, стр. 526.

Carex Persoonii Sieb. Ф. Б., № 19.

Стебли тонкіе, 30—60 см., слабые, шероховатые, то длиннѣе листьевъ, то равны имъ; листья узкіе, мягкіе; колосъ прерванный, особенно нижній колосокъ отстоитъ нѣсколько дальше, чѣмъ остальные между собой; колоски почти шаровидные, въ числѣ 3—8; кроющія чешуйки овальныя, постепенно заостренныя, почти бѣлыя, рѣже свѣтло-буроватыя, съ

¹⁾ Эта осока собрана А. Н. Петунниковымъ для гербарія А. Кнеускер и издана послѣднимъ за № 99 подъ именемъ *C. canescens* L. *subulsiacea* Laest., потомъ въ All. Bot. Zeit., 1904, p. 169, переименована въ *C. canescens* L. *laetevirens* Aschr. Къ var. *laetevirens* она не подходитъ главнымъ признакомъ, а именно: у *laetevirens* стебель и листья должны быть слабыми, гибкими, склоняющимися (*schlaff*); у нашей же осоки и стебель и листья жесткіе, торчащіе, и ни къ одной изъ описанныхъ разновидностей *C. canescens* она не подходитъ, потому я предлагаю назвать ее *strictifolia*.

зеленой полоской и белой каймой; общий цветъ колоска бѣловато-зеленый: мѣшечки яйцевидные, нѣсколько длиннѣе кроющихъ чешуекъ, переходятъ въ 2-зубчатый носикъ средней длины, расщепленный вдоль почти до самаго его основанія, по краямъ остро-шершавый; зрѣлые мѣшечки свѣтло-бурые. Цвѣтетъ въ маѣ, зрѣлые плоды съ конца іюня. По сырýmъ лѣсамъ. Захарково (К.). — Пушкино — лѣсъ близъ Братовицныи. Мытищи—Лосинный Островъ (С.).—Косино; Раменское, Брн. у., Бѣлва, Бгр. у. (П. и С.). — Серебряный боръ близъ Хорошова (П.). — Близъ Клина (Ч.).

174. *C. loliacea* L. Пет. Кр. III, стр. 92.—Пет., стр. 158. — Кауф. II, № 794. — Гор., № 85.

Образуетъ не густыя дерновники съ тонкими, не длинными побѣгами; стебли тонкіе, 3-гранные, въ верхней части шероховатые, 20—50 см., б. ч. превышаютъ листья; листья узкіе, рѣдко достигаютъ 2 мм. шир., мягкіе, слабо шероховатые, съ свѣтлыми, желтовато-бурыми влагалищами; колосъ состоитъ изъ 3—5, б. ч. сильно разставленныхъ колосковъ; колоски состоятъ изъ нижнихъ мужскихъ и 2—6 женскихъ цвѣтовъ; кроющія чешуйки широко-яйцевидныя, тупыя, бѣлыя перепончатыя, иногда съ зеленой полоской на спинкѣ, слегка лоснящіяся, вдвое короче мѣшечка; мѣшечки сплюснутые, около 3 мм. дл., яйцевидные или эллиптическіе, съ тупымъ кончикомъ и сильно выдающимся продольнымъ жилкамъ, сидятъ въ колоскѣ растопыренно, вначалѣ зеленые, потомъ чернo-бурые, матовые. Въ плодахъ въ іюнѣ. По болотистымъ еловымъ лѣсамъ. Раменское, Брн. у. (П.)—Въ лѣсу, по дорогѣ изъ дер. Меленки въ с. Раменье, Дмит. у., лѣсъ близъ Бирева, Клин. у., Хотѣичи—болотистый лѣсъ по правому берегу р. Нерекы, Бгр. у. (П. и С.).




Carex loliacea.

175. *C. tenella* Schkur. Пет. Кр. III, стр. 92.—Ф. Б., № 20.

Образуетъ густыя дерновники: стебли 20 — 60 см., очень тонкіе, слабые, часто дугообразно наклоненные, 3-гранные, шероховатые; листья мягкіе, узкіе, около 1 мм. шир., равны стеблямъ или короче ихъ; колосъ состоитъ изъ 2—4 колосковъ, очень удаленныхъ одинъ отъ другого, промежутки между ними иногда достигаютъ 3 см.; колоски маленькіе, состоятъ изъ 1—3 женскихъ и 1—2 верхушечныхъ мужскихъ цвѣтовъ, конечный колосокъ состоитъ только изъ мужскихъ цвѣтовъ; мужскіе цвѣты иногда только съ 2 тычинкамъ; прицвѣтный листъ щетиновидный, почти всегда длиннѣе колоска; кроющія чешуйки яйцевидныя, заостренныя, бѣлыя перепончатыя, съ зеленой полоской на спинкѣ; мѣшечки до 3 мм. дл., овально-эллиптическіе, выпуклые съ обѣихъ сторонъ, часто почти цилиндрическіе, лоснящіяся, съ неясными продольными жилками, быстро переходить въ очень короткій носикъ, зрѣлые—красновато-бурые. Плоды съ

$\frac{2}{3}$ июня. По болотистымъ словымъ лѣсамъ. Между д. Меленки и с. Раменье, Дмит. у.; лѣсъ близъ Бирева, Кал. у., Хотьичи по правому берегу



Carex tenella.



Carex remota.

р. Переконь, Бр. у. (П. и С.).—Клещевскій казенный лѣсъ, Кал. у., лѣсъ близъ с. Захарова, Кал. у. (П.).

176. *C. remota* L. Пет. Кр. III, стр. 88. — Пет., стр. 157. — Кауф. II, № 789. — Цин., № 1544. — Кауф. I, стр. 524. — Дв., № 855. — Макс., № 846. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 163. — St. I, № 637.

Образуетъ густыя дерновики; стебли 30—60 см., тонкіе, часто дугообразно-согнутые, слабо-3-гранные, только близъ колоса шероховатые, рѣдко гладкіе; листья рѣдко шире 2 мм., шероховатые, нижніе—съ свѣтло-бурымъ влагалищами; колосъ съ сплывъ разставленными колосками, 2—3 нижнихъ колоска отстоятъ одинъ отъ другого на 3—5 см.; прицвѣтные листья очень длинныя, нижній—превышаетъ длину всего колоса; колоски яйцевидные или продолговато-яйцевидные, 8—10 мм. дл.: нижніе цвѣты мужскіе; кроющія чешуйки широко-яйцевидныя, около 3 мм. дл., быстро сужены въ остріе, пленчатые бѣлыя, рѣже слегка буроватыя, съ зеленой полоской на спинкѣ; мѣшечки продолговато-яйцевидныя, 3 мм. дл., длиннѣе кроющихъ чешуекъ, съ внутренней стороны плоскіе, съ наружной—выпуклые, зеленые, быстро вытянуты въ 2-зубчатый носикъ, по краямъ шероховатый. По сырымъ лугамъ и кустарникамъ и по желѣзистымъ ручьямъ. Находится въ гербаріи Гольдбаха, найдено Геннингсомъ.


177. *C. stricta* Good. Пет. Кр. III, стр. 94. — Пет., стр. 162. — Кауф. II, № 795. — Гор., № 86. — Цин., № 1572. — Кауф. I, стр. 527. — Дв., № 862. — Макс., № 866. — Gold. C., p. 23. — Gold. Sp., p. 138.

Образуетъ плотныя, трудно разрываемыя дерновины, часто кочки; стебли 45—90 см., прямостоящіе, длиннѣе листьевъ, 3-гранные, по краямъ остро-шершавые; листья сѣро-зеленые, основаніе ихъ окружено свѣтло-желтовато-бурымъ, лоснящимся, заостренными влагалищами; ши-

рина листьевъ 3—5 мм., края и киль ихъ остро-шершавые; нижній прицветный листъ короче всего колоса, у основанія съ короткимъ влагалищемъ; женскіе колоски продолговато-цилиндрическіе, 3 — 5 см. дл., въ числѣ 2 — 3; мужскіе — конечные, сильно удлинённые, цилиндрическіе, до 7 см. дл.; кроющія чешуйки продолговато-ланцетныя, около 3 мм. дл., черно-бурыя съ зеленой полоской на спинкѣ, б. ч. короче мѣшечковъ; мѣшечки эллиптическіе, сплюснутые, съ 5—9 ясными продольными жилками, зеленые или сѣрые, быстро сужены въ очень короткую ножку. Цвѣты со середины мая, зрѣлые плоды съ конца іюня. По берегамъ



Carex stricta.



Carex caespitosa.

прудовъ, озеръ и по торфянымъ канавамъ. Петровское-Разумовское, Б. Мытищи (К.).—Въ Мож. у. (Ф. О.).—Серебряный боръ близъ Хорошова (Ц.).—Косино; Тростенское озеро, Руз. у. (Ц.).

178. *C. caespitosa* L. Пет. Кр. III, стр. 92.—Пет., стр. 162.—Цин., № 1570.—Pinz., p. 19. — Дв., № 861. — Макс., № 865. — Hoff. II, № 7420. — Gold. C., p. 23. — Gold. Sp., p. 138. — Mart., p. 166.—St. I, № 644.—Pal., № 2014.

Carex vulgaris Fr. β. Dreyeri Lang. Кауф. II, стр. 548.—Кауф. I, стр. 527.

Образуетъ дерновинки съ толстыми переплетающимися корнями, безъ побѣговъ; стебли 15—50 см., равны или длиннѣе листьевъ, 3-гранные, остро-шершавые, основаніе ихъ, какъ и основаніе корневыхъ листьевъ, окружено красно-бурыми, сѣтчато-волокнуистыми влагалищами; листья около 3 мм. шир., остро-шершавые, свѣтло-зеленые, края ихъ при высыханіи завертываются наружу; нижній прицветный листъ очень маленькій, часто щетиновидный, короче всего колоса; женскихъ колосковъ 1—3, чаще всего 2, б. ч. сближенныхъ, овальныхъ или продолговато-цилиндрическихъ, около 2 см. дл.; нижнія кроющія чешуйки продолговатыя, верхнія — яйцевидныя, туповатыя, въѣ почти черныя, съ красно-бурой или зеленоватою полоской на спинкѣ, короче мѣшечковъ;

мѣшечки зеленые или желто-зеленые, эллиптические, около 2 мм. дл., сплюснутые, съ обѣихъ сторонъ слегка выпуклые, иногда съ слабо завернутыми краями, безъ продольныхъ жилокъ. Цвѣты съ начала мая, плоды въ июнѣ. По болотамъ и болотистымъ кустарникамъ. Б. Мытшица, Серебряный боръ близъ Хорошова, Косино; Захарово. Клн. у., Бирево. Клн. у. (П.). — Близъ Бѣлопесочкой слободы на Окѣ, Срп. у. (П. и С.).

z. fuliginosa Doell. Кроющія чешуйки и не закрытая ими часть мѣшечка черно-бурые. Захарово, Клн. у. (П.).

179. *C. grácilis* Curt. Пет. Кр. III, стр. 93.

Carex acuta L. Бух. II, № 432. — Бух. I, № 402. — F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 162. — Кауф. II, № 797. — Цин., № 1573. — Кауф. I, стр. 527. — Ann. C. IV, № 61. — Дв., № 863. — Макс., № 868. — Hoff. H., № 7408. — Gold. C., p. 23. — Gold. Sp., p. 139. — Mart., p. 167. — St. II, p. 53. — St. I, № 645. — Pal., № 2015.

Carex acuta L. *β. rufa* L.

Образуетъ густыя дерновинки и кочки, а также пускаетъ побѣги; стебли 40 — 130 см., по всей своей длинѣ остро-шершавые, 3-гранные, поникающіе верхушкой; листья тесьмовидные, 3—9 мм. шир., остро-шер-



Carex gracilis.



Carex gracilis β. tricostata.

шавые, ярко-зеленые, у основанія окружены свѣтло-бурыми, иногда красноватыми, но не сѣтчатыми влагалищами; колосъ состоитъ изъ 3—5 женскихъ и 2—3 мужскихъ колосковъ; женскіе колоски узкіе, цилиндрическіе, до 10 см. дл., часто повислые, нижніе—иногда на ножкахъ, рѣже сидячіе, торчащіе; прицвѣтные листья длинныя, травянистые, нижній—превышаетъ весь колосъ; кроющія чешуйки продолговаты, б. ч. заостренныя, рѣже туповатыя, черныя, съ зеленой полоской на спинкѣ; мѣшечки яйцевидные или округлые, 2 — 3 мм. дл., б. ч. съ обѣихъ сторонъ выпуклые, съ продольными жилками, зеленые или бурые. По берегамъ рѣкъ, прудовъ и по канавамъ, очень часто. Цвѣты съ начала мая, плоды съ начала июня.

2. *corynóphora* Peterm.

Carex acuta L. *fluviatilis* Hartm. Ф. Б., № 24.

Стебли очень высокіе, верхушка ихъ при созрѣваніи поникающая; листья 5—9 мм. шир.; колоски узко-цилиндрическіе, б. ч. поникающіе, нижній — на длинной ножкѣ; кроющія чешуйки равны или длиннѣе мѣшечковъ.

3. *tricostata* Fries. Стебли не столь высокіе, б. ч. торчащіе; листья узкіе, не шире 5 мм.; женскіе колоски сравнительно короткіе, толстые, б. ч. сидячіе, вверхъ торчащіе; мѣшечки болѣе выпуклые съ наружной стороны, чѣмъ съ внутренней; кроющія чешуйки яйцевидныя, короче мѣшечковъ. Лужняки, подѣ Симоновымъ монастыремъ (П.).180. *C. Goodenoughii* Gay.

Carex vulgaris Fr. Пет. Кр. III, стр. 92.—Бух. II, № 431.—Бух. I, № 403.—
F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 162.—Кауф. II, № 796.—
Цин., № 1571.—Pinz., p. 19.—Кауф. I, стр. 526.—Ann. C.
IV, № 60.

Carex acuta L. *α nigra* L.

Образуетъ дерновинки, часто съ довольно длинными побѣгами; стебли 10—70 см., примостоящіе, только въ верхней части шероховатые, 3-гранные; листья у основанія окружены свѣтло-или темно-бурыми, но не съгнатыми влагалищами. сѣро-зеленые, шероховатые 2—5 мм. шир.; нижній прицвѣтный листъ травянистый, равенъ всему колосу или нѣсколько короче его; колосъ состоитъ изъ 2—4 женскихъ и 1, рѣдко 2 мужскихъ колосковъ; женскіе колоски б. ч. цилиндрическіе, не длиннѣе 3 см., торчащіе, сидячіе или на короткихъ ножкахъ; кроющія чешуйки продолго-



Carex Goodenoughii α. curvata.



Carex Goodenoughii β. elatior.



Carex Goodenoughii γ. polygama.

вато-яйцевидныя, туповатыя, черныя, съ зеленой полоской на спинкѣ, короче мѣшечка; мѣшечки около 2 мм. дл., округло-яйцевидные, съ наружной стороны выпуклые, съ внутренней — плоскіе, со слабыми про-

дольными жилками быстро сужены въ очень короткую ножку. Цвѣты съ начала мая, плоды съ начала іюня. По болотамъ и болотистымъ лугамъ, часто.

α. *curvata* Aschr. et Gr.

Carex vulgaris Fr. typica Meinsh.—*Carex vulgaris* Fr. genuina Schmalh.

Стебель 10 — 30 см.; листья сизо-зеленые, торчащіе, отогнутые; колоски сидятъ б. ч. сближенно, сидячіе или почти сидячіе. Воробьевы горы (П.).—Клементьево, Ряз. у. (Сюз.).—Мытищи (С.).

β. *elatior* Aschr. et Gr.

Carex vulgaris Fr. var. *elatior* Lang. Пет. Кр. III, стр. 93.

Carex vulgaris Fr. var. *juncella* Fr. Ф. Б., № 23.


Стебли 30—70 см.; листья тонкіе, гибкіе, б. ч. очень длинныя; колоски сидятъ разставленно. нижній часто на ножкѣ. Косино. Б. Мытищи (П.).

γ. *polygama* Rchb. Женскіе колоски на концѣ съ мужскими цвѣтами. Лапково, Ряз. у. (П.).

181. *C. globularis* L. Пет. Кр. III, стр. 94.—Ф. Б., № 22.

Carex tomentosa L. Пет., стр. 161.—Кауф. II, № 799.—Мил., № 39.—Цин., № 1563.—Кауф. I, стр. 528.

Корневище тонкое, покрыто красно-бурыми чешуйками, даетъ вѣтвящіеся побѣги, съ пучками листьевъ; стебли тонкіе, приподнимающіеся, при созрѣваніи плодовъ часто дугообразно пригибающіеся къ землѣ, шероховатые, 20—50 см.; листья узко-линейные, сизо-зеленые, около 2 мм. шир., часто тоже дугообразно пригнутые, съ свѣтло-бурыми или буропурпуровыми влагалищами; колосъ состоитъ изъ 1 верхушечнаго мужского и 2 — 3 женскихъ



Carex globularis

колосковъ, изъ которыхъ нижній [значительно удаленъ отъ остальныхъ; женскіе колоски короткіе, шаровидные или яйцевидные, малочвѣтковые, 5—8 мм. дл., б. ч. сидячіе; нижній прицвѣтный листъ не превышаетъ длиною всего колоса; кроющія чешуйки яйцевидныя, темно-красно-бурыя, съ свѣтлой полоской на спинкѣ, короче мѣшечковъ; мѣшечки яйцевидные, заострены въ короткій носикъ, съ явственными, тупыми ребрышками и жилками, около 2 мм. дл., покрыты не густымъ пушкомъ. Въ плодахъ съ

начала іюня. По хвойнымъ лѣсамъ и опушкамъ. Близъ Бѣлосоецкой слободы, Срп. у. (Мил.).—Косино (Г. М.).—Троицкое-Кайнарджки (Ц.).—Починки, Алексѣево, Соболевки, Запивно, Мож. у. (Ф. Б.).—Между Медвѣжьей Пустыней и Нижней Слободой, Дмит. у., близъ дер. Клевсеево, Кал. у. (П. и С.).—Карачарово, Кал. у., Раменское, Брнл. у., село Витенево по окраинѣ торфяного болота, Мос. у. (П.).

182. *C. montána* L. Пет. Кр. III, стр. 95. — Ф. Б., № 110. — Пет., стр. 160. — Мил., № 40. — Лор., № 87. — Цин., № 1561. — Дв., № 866. — St. I, № 640.

Carex disjuncta Kauffm. Кауф. II, № 801.

Carex collina Willd. Макс., № 853. — Mart., p. 164.

Корневище толстое, почти деревянистое, образуетъ маленькія дерновишки съ спльно переплетающимися корнями; стебли 10—30 см., прямоторчащія, слегка шероховатые, во время цвѣтенія длиннѣе листьевъ, потомъ равны имъ или нѣсколько короче ихъ; листья ярко-зеленые, не шире 2 мм., съ свѣтло- или красно-бурыми влагалищами, окружены бурыми волокнистыми остатками отмершихъ листьевъ; колосъ состоитъ изъ 1 верхушечнаго мужского и 1—2, очень рѣдко 3 женскихъ колосковъ; женскіе колоски шаровидно-овальные, 5—7 мм. дл., сидятъ скученно близъ мужского; прицвѣтный листъ похожъ на кроющую чешуйку, стеблеобъемлющій, часто съ короткимъ, травянистымъ кончикомъ; кроющія чешуйки обратно-яйцевидныя, заостренныя, черно-бурыя съ свѣтлой полоской на спинкѣ и иногда съ болѣе свѣтлымъ краемъ, короче мѣшечковъ; мѣшечки продолговато-обратно-яйцевидныя, около 4 мм. дл., слабо-3-гранные, густо покрыты пушкомъ, быстро вытянуты въ короткій носикъ. Цвѣты съ начала мая, плоды съ начала іюня. Почти по всему побережью р. Оки, по опушкамъ лѣсовъ; известняковый склонъ р. Пахры при впаденіи Десны подъ Дубровицами, Пдл. у. (Мпл.).



Carex montana

α. *palléscens* Doell. Пет. Кр. III, стр. 96.

Кроющія чешуйки свѣтло-коричневыя. Серпуховъ, около Бычкова (К. и II.).

β. *refléxa*.

Carex disjuncta Kauffm.

Женскіе колоски отодвинуты отъ мужского, такъ что мужской кажется сидящимъ на отогнутой цвѣтоножкѣ. Вместе съ типичной формой (К. и II.).

183. *C. ericetórum* Poll. Пет. Кр. III, стр. 96. — Пет., стр. 160. — Кауф. II, № 800. — Цин., № 1562. — Кауф. I, стр. 529. — St. I, № 641.

Carex ciliata Willd. Ann. C. I, № 55. — Дв., № 867. — Макс., № 854. — Gold. C., p. 22. — Gold. Sp., p. 138. — Mart., p. 164. — St. II, p. 53.

Корневище даетъ короткія побѣги, покрытыя свѣтло- или темно-бурыми чешуйками; стебли прямые или дугообразно приподнимающіеся, совершенно гладкіе или только близъ верхушки шероховатые, тупо-гранистые, 10—30 см., длиннѣе листьевъ; листья жесткіе, слегка шероховатые, отогнутые, темно-зеленые, около 3 мм. шир., съ бурыми или красно-бурыми влагалищами, окружены волокнистыми остатками отмершихъ листьевъ; колосъ состоитъ изъ 1 верхушечнаго мужскаго и 1—2, рѣдко 3

сближенныхъ женскихъ колосковъ; прицвѣтные листья съ короткой пластинкой, часто только влагалищные; женскіе колоски овальные или продолговато-овальные, 7—11 мм. дл.; кроющія чешуйки темно-бурыя, обратно-яйцевидныя, на концѣ округлыя, съ широкимъ, бѣловатымъ, спереди бахромчатымъ краемъ; мѣшечки съ 3 тупыми гранями, обратно-яйцевидные, пушистые, съ короткимъ усѣченнымъ носикомъ. Цвѣты съ конца



Carex ericetorum.



Carex caryophyllaea.

апрѣля, въ плодахъ съ $\frac{2}{3}$ мая. По открытымъ и сухимъ мѣстамъ, по кустарникамъ, на песчаной и глинистой почвѣ. Серебряный боръ близъ Хорошова, Воробьевы горы, Косино, Всесвятское; Павловскій посадъ, Бгр. у. (П.).—Коншинскій лѣсъ близъ Серпухова (П. и С.).

184. *C. caryóphyllaea* Latour. Пет. Кр. III, стр. 97.—Мос., № 43.

Carex praecox Jacq. Пет., стр. 160.—Кауф. II, № 802.—Мил., № 41.—Цин., № 1560.—Рупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 529.—Нoff. Н., № 7467.

Carex verna Vill. Пет. Кр. III, стр. 97.

Корневище тонкое, даетъ длинныя побѣги, покрытыя бурными чешуйками; стебли примоторчащіе, 10—30 см., гладкіе, рѣже близъ верхушки шероховатые, во время цвѣтенія длиннѣе листьевъ, потомъ равны имъ или короче ихъ; листья 2—3 мм. шир., шероховатые, со свѣтло-бурыми влагалищами и темно-бурыми волокнистыми остатками отмершихъ листьевъ; колосъ состоитъ изъ 1 мужского конечнаго колоска и 1—3 женскихъ; женскіе колоски яйцевидно-продолговатые, нижній — часто отодвинутъ и иногда на короткой ножкѣ; мужской — широко-булавовидный, красно-бурый; прицвѣтные листья, особенно нижній, влагалищные, съ травянистой пластинкой, прижатой къ колоску; кроющія чешуйки яйцевидныя, острые, бурыя, б. ч. съ узкимъ, бѣлымъ краемъ, рѣже безъ него; мѣшечки обратно-яйцевидные, слегка 3-гранные, около 2 мм. дл., пушистые, съ короткимъ, слегка выемчатымъ носикомъ. Цвѣты съ конца апрѣля, плоды съ $\frac{2}{3}$ мая. По сухимъ холмамъ и по опушкамъ. Серебряный боръ близъ Хорошова,

Останкино; Бѣлые Колодези, Кал. у.. Никифорово, Срп. у. (П.).—Глизиъ Лужковъ, Срп. у. (В. п С.).—Варварино, Пдл. у. (Мос.).

185. *C. limosa* L. Ф. Б., № 109.—Пог., стр. 160.—Кауф. II, № 798.—Мил., № 38.—Цин., № 1567.—Кауф. I, стр. 528.—Lind., p. 172.—Дв., № 874.—Макс., № 864.—Hoff. II., № 7453.—Gold. C., p. 22—23.—Gold. Sp., p. 138.—Mart., p. 166.—St. II, p. 53.—St. I, № 643.—Pal., № 2013.

Корневище толстое, бурое, съ остатками сѣро-бурыхъ отмершихъ чешуекъ; стебли 3-гранные, въ верхней части шероховатые, тонкіе, 15—45 см. равны или нѣсколько длиннѣе листьевъ; все растеніе сизо-зеленое; листья щетиновидные, вдоль сложенные, рѣдко шире 1 мм., шероховатые, съ бурыми влагалищами; колосъ состоитъ изъ 1 мужского колоска и 1—2, рѣдко 3 женскихъ; женскіе колоски овальные или эллиптическіе, многоцвѣтковые, 1—2 см. дл., на очень длинныхъ, достигающихъ 3 см., повислыхъ ножкахъ; прицвѣтный листъ б. ч. короче колоса; кроющія чешуйки яйцевидныя, постепенно или быстро заостренныя, красно-бурыя, съ зеленой полоской на спинкѣ, рѣже въ красно-бурыя; мѣшечки эллиптическіе, чечевичкообразные, сплюснутые, сѣро-зеленые, зрѣлые — часто красно-бурыя, съ 5 жилками на спинкѣ, б. ч. короче кроющихъ чешуекъ, съ короткимъ, но замѣтнымъ носкомъ. Цвѣты съ мая, плоды съ конца іюня, зрѣлые въ $\frac{1}{2}$ іюля. По моховымъ торфянымъ болотамъ. Измай-



Carex limosa.



Carex pilosa.

ловскій звѣринецъ, Горенки (Гольдб.).—Бутырки (Гени.).—Мытницы (С.).—Косино; Полецкое озеро, Вер. у., Захаровское озеро, Кал. у. (П.). Перское озеро, Круглое озеро, Мос. у. (П. п С.).

186. *C. pilosa* Scop. Бух. II, № 433.—Бух. I, № 395.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 159.—Кауф. II, № 805.—Цин., № 1551.—Рупр., стр. 68.—Кауф. I, стр. 531.—Анн., С. I, № 56.—Дв., № 872.—Макс., № 858.—Hoff. II., № 7465.—Gold. C., p. 22.—Gold. Sp., p. 138.—Mart., p. 165.—Lon., p. 114.

Даетъ длинные побѣги; стебли 30—60 см., у основанія окружены, какъ и листья, темно-красно-бурыми влагалищами; листья тесьмовидные, 4—7 мм. шир., темно-зеленые, по краямъ и вдоль жилокъ длинно-рѣснчато-волосистые; колосъ состоитъ изъ 2—3 женскихъ колосковъ и 1 мужского; женскіе колоски длинные, во время цвѣтенія почти втѣвдные, сидятъ очень разставленно, на длинныхъ, часто поникающихъ ножкахъ; цвѣты у основанія колоска сидятъ разставленно; прицвѣтные листья съ короткой, прижатой къ стеблю пластинкой и длиннымъ трубчатымъ влагалищемъ; кроющія чешуйки на женскихъ цвѣтахъ продолговато-овальные, быстро заостренные, бурья или красно-бурья, съ широкой зеленой полоской на спинкѣ и съ узкимъ бѣлымъ краемъ, короче мѣшечковъ: мѣшечки около 4 мм. дл., зеленые, продольно-бороздчатые, почти шаровидные, быстро вытянуты въ длинный, нѣсколько искривленный носикъ, на концѣ съ 2 острыми зубчиками. Цвѣты съ конца апрѣля, плоды въ июнѣ. По лѣсамъ, очень часто.

187. *C. panicea* L. Пет. Кр. III, стр. 98.—Ф. Б., № 111.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 159.—Кауф. II, № 806.—Цян., № 1552.—Кауф. I, стр. 531.—Borg., p. 700.—Дв., № 870.—Макс., № 860.—Нол. Н., № 7460.—Mart., p. 165.—St. II, p. 53.

Даетъ побѣги; стебли 10—40 см., гладкіе, длиннѣе листьевъ; листья сѣро-зеленые, 3—6 мм. шир., постепенно заостренные, слабо шероховатые; колосъ состоитъ изъ 1 мужского и 1—2 женскихъ колосковъ; женскіе колоски на ножкахъ, примоторчащіе, 2—3 см. дл.; нижній прицвѣтный листъ превышаетъ длину колосокъ; кроющія чешуйки яйцевидныя, слегка заостренные, темно-пурпурово-бурья, почти черныя, съ зеленой полоской на спинкѣ и съ узкой бѣлой каймой или безъ нея; мѣшечки вздутые, округло-яйцевидные, крупныя, иногда длиннѣе 4 мм., слегка 3-гранныя, съ продольными жилками, желто-зеленые или верхушка ихъ красно-бурья, быстро переходятъ въ короткій, тупой носикъ. Последніе цвѣты во $\frac{2}{2}$ мая. На торфяной почвѣ по берегу Тороповскаго озера, Мож. у. (Ф. В.).—Косино—Выхнянское болото (II.).—По р. Искони близъ Клементьева, Руз. у. (Сюз.).



Carex panicea.

188. *C. vaginata* Tausch. Ф. Б., № 21.—Пет., стр. 159.—Гор., № 48 (ошибочно *C. panicea*).

Carex sparsiflora Steud. Пет. Кр. III, стр. 98.

Даетъ побѣги; стебли 30—60 см., въ верхней частѣ шероховатые, несутъ 1—2 листа, не считая прицвѣтныхъ; стеблевые листья съ небольшою пластинкой и съ длиннымъ трубчатымъ влагалищемъ; корневыя листья ярко-зеленые, 4—5 мм. шир., плоскіе, съ сильно выдающимися продольными жилками, по краямъ шероховатые, основаніе ихъ окружено свѣтло-

или темно-бурыми остатками отмерших листьев; колосъ состоитъ изъ 1 мужского и 1—2 женскихъ разставленныхъ колосковъ; женскіе колоски 1—2 см. дл., на длинныхъ ножкахъ, превышающихъ прицветные листья или равныхъ имъ; кроющія чешуйки овальныя, слегка заостренныя, красно-бурыя, съ зеленой полоской на спинкѣ, но безъ бѣлаго края; мѣшечки яйцевидныя, зеленые, съ слабыми продольными жилками, переходить въ



Carex vaginata.



Carex pallescens.

довольно длинный, нѣсколько искривленный носикъ, наверху выемчатый. Цвѣты съ начала мая, зрѣлые плоды въ началѣ июля. По лѣсамъ. Серебряный боръ близъ Хорошова (К.).—Озера, Ккм. у., Зиброво, Сри. у. (П. и С.).—Тужки, Сри. у. (Ф. Б.).—Быково—лѣсъ къ Михневу, Бри. у.; лѣсъ близъ Бѣлва, Вгр. у. (С.).—Соколыпки (П.)

189. *C. pallescens* L. Бух. II, № 434.—Бух. I, № 401.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 160.—Кауф. II, № 807.—Цин., № 1566.—Кауф. I, стр. 532.—Дв., № 871.—Макс., № 863.—Hoff. II., № 7459.—Gold. C., p. 22.—Gold. Sp., p. 138.—Mart., p. 166.—St. II, p. 53.

Образуетъ небольшія дерновинки; стебли 20—60 см., 3-гранные, шероховатыя, б. ч. длиннѣе листьевъ; листья съ свѣтло- или темно-красновато-бурыми влагалищами, вмѣстѣ съ ними покрыты короткими, по частыми волосками, плоскіе, 2—4 мм. шир.; колосъ состоитъ изъ 1 мужского и 2—3 женскихъ колосковъ; женскіе колоски коротко-цилиндрическіе, б. или м. скученные, 1—2 см. дл., на ножкахъ, торчащія, по созрѣваніи поникающіе; прицветные листья травянистыя, длиною превышаютъ весь колосъ; кроющія чешуйки яйцевидныя, шпоровидно-заостренныя, желтовато-бѣлыя, съ зеленой полоской на спинкѣ, короче мѣшечковъ; мѣшечки продолговато-овальныя, вздутые, около 3 мм. дл., нѣсколько сплюснутые, лоснящіяся, съ продольными жилками, желто-зеленые, безъ носика. Цвѣты съ $\frac{2}{2}$ мая, зрѣлые плоды съ $\frac{2}{2}$ июня. Часто, по сырымъ кустарникамъ, по лѣсамъ и около дорогъ.

190. *C. pediformis* C. A. M. Пет. Кр. III, стр. 97.—F. O., № 7, p. 102.—
Пет., стр. 159.—Кауф. II, № 803.—Цви.,
№ 1550.—Кауф. I, стр. 530.

Корневище толстое, ползучее, въ верхней части не рѣдко развѣтвленное, густо покрыто черно-бурыми остатками отмершихъ листьевъ; стебли 30—60 см., прямостоящіе или приподнимающіеся, 3-гранные, шероховатые, б. ч. длиннѣе листьевъ: листья темно-зеленые, линейные, не шире 3 мм., по краямъ шероховатые, съ бурыми, иногда почти фиолетовыми влагалищами; колосъ состоитъ изъ 1 мужского и 2—4 женскихъ колосковъ; женскіе колоски разставлены, особенно отдаленъ нижній и на длинной ножкѣ, мужской тоже на ножкѣ; прицвѣтные листья трубчатые, косо-усѣченные, съ широкимъ, бѣлымъ перепончатымъ краемъ; кроющія чешуйки красно-бурыя, съ зеленой полоской на спинкѣ и бѣлымъ перепончатымъ краемъ, нижніе—ланцетные, верхніе—яйцевидно-ланцетные,



Carex pediformis.



Carex digitata.

всѣ заостренныя; мѣшечки обратно-яйцевидные, книзу сужены почти въ ножку, до 3 мм. дл., тупо-3-гранные, коротко-пушистые, съ короткимъ, слегка выемчатымъ носикомъ. Цвѣты съ $\frac{1}{2}$ мая, зрѣлые плоды съ $\frac{1}{2}$ июня. По лѣсамъ и опушкамъ. Кунцово (Гольдб.).—Серебряный боръ близъ Хорошова (А.).—Лизаветино, Воробьевы горы; Раменское, Брн. у. (К.).—Мытищи—Лосинный Островъ (С.).—Озера, Кал. у. (П. и С.).—Останкино; Григорово, Руз. у. (П.).

191. *C. digitata* L. Мос., № 44.—Пет., стр. 159.—Кауф. II, № 804.—Цви.,
№ 1548.—Кауф. I, стр. 530.—Ann. C. I, № 54.—Дв., № 865.—
Макс., № 855.—Hoff. H., № 7429.—Gold. C., p. 22.—Gold.
Sp., p. 138.—Mart., p. 164.—St. II, p. 53.

Стебли 10—30 см., б. ч. равны листьямъ, только близъ верхушки шероховатые; листья линейные, до 6 мм. шир., по краямъ шероховатые, съ пурпуровымъ влагалищамъ; колосъ состоитъ изъ 1 мужского и 2—3 женскихъ колосковъ; женскіе колоски 5—10-цвѣтковые, б. ч. на ножкахъ,

разставлены, верхній—часто сидячий, приближенъ къ мужскому и длиннѣе его; прицвѣтные листья трубчатые, пурпуровые, съ бѣлой каймой; кроющія чешуйки обратно-яйцевидныя, тупыя или быстро сужены въ очень короткое остріе, красно-бурыя, съ бѣлой каймой и иногда съ зеленой полоской на спинкѣ; мѣшечки тупо-3-гранные, обратно-яйцевидныя, покрыты рѣдкимъ пушкомъ, рѣже почти голые, быстро сужены въ короткий носикъ. Цвѣты съ конца апрѣля, плоды въ началѣ юня. По болотистымъ лѣсамъ и по гористымъ мѣстамъ, покрытымъ лѣсомъ, на перегнойной почвѣ, часто.

192. *C. distans* L. Пет. Кр. III, стр. 99.—Кауф. II, стр. 556.—Цян., № 1556.—Кауф. I, стр. 533.—Дв., № 869.—Макс., № 859.

Стебли примостоящіе, 15—60 см., тупо-3-гранные, гладкіе или близъ верхушки шероховатые; листья у основанія окружены бурыми влагалищами, сѣро-зеленые, гладкіе, около 5 мм. шир., съ язычкомъ, сидящимъ супротивъ пластинки; колосъ состоитъ изъ 1 мужского и 3 женскихъ колосковъ; женскіе колоски на короткихъ ножкахъ, овальные или цилиндрическіе, около 2 см. дл., сидятъ разставленно; прицвѣтные листья съ длинными влагалищами и длинной пластинкой, но нижній не достигаетъ верхушки мужского колоска; кроющія чешуйки яйцевидныя, острые или туповатые, грязно-зеленыя или бурые, съ зеленой полоской, короче мѣшечковъ; мѣшечки вверхъ торчащіе, 3-гранно-эллиптическіе, около 4 мм. дл., желтоватые или бурые, съ продольными жилками, быстро вытянуты въ длинный, 2-зубчатый носикъ, съ шероховатымъ по внутреннему краю зубцами. Находится въ гербаріи Гофмана.



Carex distans.

193. *C. flava* L. Бух. II, № 435.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 161.—Кауф. II, № 808.—Цян., № 1558.—Кауф. I, стр. 532.—Дв., № 868.—Макс., № 856.—Нойф. II., № 7439.—Mart., p. 164.—St. I, № 639.—Pal., № 2011.

Стебли 15—60 см., въ нижней части съ листьями, примостоящіе, гладкіе или иногда близъ верхушки шероховатые, 3-гранные, длиннѣе листьевъ; листья желто-зеленые, у основанія окружены свѣтло-бурными влагалищами, плоскіе, шероховатые, около 5 мм. шир.; колосъ состоитъ изъ 1 мужского и 1—3 женскихъ колосковъ; женскіе колоски шарообразные или яйцевидные, б. ч. не длиннѣе 2 см., нижній часто на ножкѣ; прицвѣтные листья травянистые, длинные, б. ч. отстоятъ отъ стебля подъ прямымъ угломъ или совершенно отогнуты книзу; кроющія чешуйки продолговатыя или обратно-яйцевидныя, туповатые, ржаво-бурыя, съ зеленой полоской на спинкѣ, короче мѣшечковъ; мѣшечки яйцевидные, взду-

тые, съ продольными жилками, желтоватые, быстро переходя въ длинный, особенно въ нижнихъ мѣшечкахъ, отогнутый носикъ, оканчивающійся 2 острыми зубчиками. Цвѣты со срединъ мая, плоды въ июлѣ. По сырýmъ лугамъ и торфянымъ болотамъ. Перерва, Ивановское, Богородское (К.).—По берегу р. Разводни — у Саввинскаго монастыря, Воскресенское



Carex flava.



Carex Oederi.

на берегу р. Пстры, Зви. у., Тростенское озеро, Руз. у., Абушково, Зви. у., Троицкое, Мож. у., Хмѣльево, Клин. у., Серпуховъ (П.).—Каналь у Сенежскаго озера (П. и С.).—Мытищи (С.).

194. *C. Oederi* Ehrh. Пет. Кр. III, стр. 98.—Пет., стр. 161.—Кауф. II, стр. 556.—Цин., № 1558.—Кауф. I, стр. 533.—Макс., № 857.

Стебли не высокіе, 8—15 см., прямостоящіе, тупо-3-гранные, короче листьевъ или равны имъ; листья не шире 3 мм., по краямъ и вдоль спинки шероховатые; женскіе колоски шарообразные, сидячіе, рѣже нижній на короткой ножкѣ, б. ч. скучены; кроющія чешуйки бѣловатыя, съ широкимъ ржаво-бурымъ краемъ и зеленой полоской на спинкѣ; мѣшечки маленькіе, около 2 мм. дл., вздутые, шарообразно-яйцевидные, съ продольными жилками, быстро вытянуты въ прямой, короткій носикъ, б. ч. равный 1 мм., на концѣ 2-зубчатый. Находится въ гербаріи Максимовича.

195. *C. silvatica* Huds. Бух. II, № 436.—Бух. I, № 405.—Пет., стр. 162.—Кауф. II, № 809.—Цин., № 1555.—Рупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 533.—Дв., № 873.—Макс., № 861.—Mart., p. 165.

Carex Drymeia Ehrh. Gold. C., p. 22.—Gold. Sp., p. 139.—St. II, p. 53.

Стебли 30—60 см., тонкіе, поникающіе; листья у основанія стебля окружены свѣтло-бурыми влагалищами, ярко-зеленые, 5—8 мм. шир., плоскіе, только близь верхушки шероховатые; колосъ состоятъ изъ 1 мужского и 3—6 женскихъ колосковъ; женскіе колоски сидятъ разставленно на длинныхъ поникающихъ ножкахъ, около 4 см. дл., верхній—

иногда почти сидячий; прицветные листья съ длинными влагалищами и длинной пластинкой, нижній—иногда равенъ всему колосу; кроющія чешуйки ланцетныя, заостренныя, зеленныя или буроватыя, иногда съ бѣлымъ краемъ, короче мѣшечковъ; мѣшечки продолговато-эллиптическіе, 3-гранныя, около 4 мм. дл., гладкіе, безъ жилокъ, зеленныя, потомъ черно-зеленныя, вытянуты въ длинный, 2-зубчатый носикъ. Цвѣты съ начала



Carex silvatica.



Carex Pseudocyperus.

іюня, плоды съ начала іюля. По лѣсамъ, на перегнойной почвѣ. Свблдово (Траутш.).—Михайловское, Пдл. (Б.)—Воронцово, за Калужской заставой, Воробьевы горы, Кунцово; Софьино—на Москвѣ р., Брн. у. (П.).

196. *C. Pseudocyperus* L. Мос., № 45.—Петл. стр. 162.—Кауф. II, № 810.—Цин., № 1569.—Кауф. I, стр. 533.—Макс., № 862.—Hoff. II., № 7468.—Gold. C., p. 22. — Gold. Sp., p. 138.—Mart., p. 165.

Стебли 40—90 см., прямостоящіе, 3-гранные, съ острыми, рѣжущими ребрами; листья у основанія окружены свѣтло-бурыми влагалищами, ярко-зеленныя, потомъ желто-зеленныя, 5—10 мм. шир., плоскіе, остро-шершавые; колосъ состоитъ изъ 1 мужского и 3—6 женскихъ колосковъ; женскіе колоски сперва примоторчащіе, потомъ поникающіе, на длинныхъ ножкахъ, сидятъ скученно (иногда одинъ колосокъ сильно отставленъ). Цилиндрическіе, до 5 см. дл.; прицветные листья съ очень короткими влагалищами и съ очень длинными пластинками, во много разъ превышающими весь колосъ; кроющія чешуйки ланцетныя, острыя, свѣтло-зеленныя, края ихъ близъ верхушки зазубренныя; мѣшечки продолговато-ланцетные, около 5 мм. дл., лоснящіеся, съ продольными выдающимися жилками, вытянуты въ длинный, 2-зубчатый носикъ, края котораго зазубрены; зрѣлыя мѣшечки отогнуты кверху, особенно въ нижней части колоска. Цвѣты со средины іюня, зрѣлыя плоды съ $\frac{2}{3}$ іюля. По берегамъ рѣкъ, по канavamъ и въ разрабатываемыхъ торфяныхъ болотахъ, часто. (Студенецъ

(Генн.).—Воробьевы горы (Гольдб.).—Раменское, Бри. у. (К.).—Захарово, Кли. у., Кузьминки, Кусково (Ш.).—Между Мытищами и Перловкой; близъ дер. Звягино на Клязьмѣ; близъ дер. Петраково, Дмит. у. (С.).

197. *C. rostrata* With. Пет. Кр. III, стр. 99.

Carex ampullacea Good. Мос., № 46.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 162.—
Кауф. II, № 811.—Цин., № 1579.—Кауф. I стр. 534.—
Апп. C. V., № 76.—Дв., № 878.—Макс., № 871.—
Gold. C., p. 23.—Gold. Sp., p. 139.—Mart., p. 167.

Carex vesicaria L. β. Hoff. II., № 7414.

Carex obtusangula Ehrh.



Carex rostrata.

Стебель тупо-3-гранный, прямостоящій, 40—60 см., гладкій, только иногда близъ колосковъ шероховатый, б. ч. короче листьевъ; листья у основанія окружены бурыми или пурпуровыми влагалищами, слегка шероховатые, сѣро-зеленые, 3—5 мм. шир., иногда свернуты въ трубку; колосъ состоитъ изъ 2—5 мужскихъ и 2—3 женскихъ колосковъ; женскіе колоски сидятъ разставленно, цилиндрическіе, 4—10 см. дл., верхніе сидячіе, нижній часто на короткой ножкѣ; прицвѣтные листья безъ влагалищъ или съ очень короткими, нижній—иногда превышаетъ длиною весь колосъ; кроющія чешуйки продолговатыя, острыя, свѣтло-бурья, иногда красноватыя, съ свѣтлой или зеленой полоской на спинкѣ и бѣлымъ краемъ, короче мѣшечковъ; мѣшечки почти шарообразные, 4—5 мм. дл., зеленые, потомъ буро-зеленые, съ передней стороны съ 7 жилками, быстро переходятъ въ длинный, нѣсколько сплюснутый носикъ, на концѣ съ 2 расходящимися зубцами. Цвѣты съ $\frac{2}{2}$ мая, плоды въ июнѣ, зрѣлые въ началѣ июля. По берегамъ рѣкъ и по болотамъ, очень часто.

198. *C. vesicaria* L. Бух. II, № 437.—Бух. I, № 406.—F. O., № 7, p. 102.—
Пет., стр. 162.—Кауф. II, № 812.—Цин., № 1578.—Кауф.
I, стр. 534.—Апп. C. V, № 77.—Дв., № 877.—Макс.,
№ 870.—Hoff. II., № 7480.—Gold. C., p. 23.—Gold. Sp.,
p. 139.—Mart., p. 167.—St. II, p. 53.—St. I, № 646.

Стебли остро-3-гранные, прямостоящіе, 30—60 см., остро-шершавые; листья у основанія окружены бурыми или пурпуровыми влагалищами, остро-шершавые, ярко-зеленые, 4—7 мм. шир., плоскіе; колосъ состоитъ изъ 2—3 женскихъ и 2—3 мужскихъ колосковъ; женскіе колоски овальные или цилиндрическіе, 4—7 см. дл., сидятъ разставленно, верхніе—почти сидячіе, нижніе—б. ч. на длинныхъ ножкахъ, во время созрѣванія поникающіе; прицвѣтные листья съ очень короткими влагалищами, нижній—б. ч. равенъ всему колосу, рѣже превышаетъ его; кроющія чешуйки ланцетныя, заостренныя, темно-бурья, съ свѣтлой полоской на спинкѣ, короче мѣшечковъ; мѣшечки яйцевидно-коническіе, около 7 мм. дл., зеленые или буро-желтые, съ ясно выдающимися продольными жилками,

постепенно переходить въ довольно длинный носикъ, оканчивающійся 2 расходящимися зубчиками. Цвѣты во $\frac{2}{2}$ мая, плоды въ концѣ июня. По канавамъ, болотамъ и по берегамъ рѣкъ, очень часто.



Carex vesicaria.



Carex acutiformis.

199. ***C. acutiformis* Ehrh.** Пет. Кр. III, стр. 100.

Carex paludosa Good. Бух. II, № 438.—Ф. Б., № 112.—Бух. I, № 404.—Пет., стр. 163.—Кауф. II, № 813.—Цин., № 1575.—Кауф. I, стр. 535.—Borg., p. 700.—Дв., № 876.—Макс., № 869.—Mart., p. 167.

Carex spadicea Roth.

Стебли прямостоящіе, 40—100 см., 3-гранные, остро-шершавые; листья спзо-зеленые, плоскіе, шероховатые, 5—8 мм. шир., иногда съ завернутыми краями, у основанія окружены свѣтло-бурыми или пурпуровыми влагалищами, перепончатая часть которыхъ волокнистая; колосъ состоитъ изъ 2—4 женскихъ и 2—3 мужскихъ колосковъ; женскіе колоски сидятъ разставленно, цилиндрическіе, до 7 см. дл., верхніе—сидячіе, нижніе—на короткихъ ножкахъ, иногда поникающіе; прицвѣтные листья почти безъ влагалищъ, нижній—превышаетъ длиною весь колосъ; кроющія чешуйки ланцетныя, заостренныя въ зубчатое острокопечіе, черно-бурыя, съ зеленой полоской, короче мѣшечковъ; мѣшечки продолговато-яйцевидные, около 4 мм. дл., сплюснuto-3-гранные, съ сильно выдающимся продольными жилками, переходятъ въ короткій, 2-зубчатый носикъ. Плоды со срединныя июня. По торфянымъ болотамъ. Б. Мытищи, Куеково: Вѣдонецкая слобода (Срп. у., Захаровское озеро, Кн. у. (П.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Тростенское озеро, Руз. у. (Ф. О.).—Близъ Осинова монастыря, Влк. у., Воскресенскъ, Звн. у. (Ч.).

200. ***C. riparia* Curt.** Пет. Кр. III, стр. 100. — Пет., стр. 163. — Кауф. II, № 814.—Гор., № 88.—Цин., № 1574.

Стебель примостоящій, 60—125 см., 3-гранный, остро-шершавый, листья свзо-зеленые, остро-шершавые, 8—15 мм. шир., у основанія окру-

жены свѣтло-бурымъ, не волокнистыми влагалищами; колосъ состоитъ изъ 3—4 женскихъ и 3—5 мужскихъ колосковъ; женскіе колоски длинндровчскіе, до 10 см. дл., нѣсколько разставлены, сидятъ или на короткихъ ножкахъ, нижній часто значительно удаленъ отъ остальныхъ и на болѣе длинной ножкѣ, иногда поникающій; прицвѣтные листья безъ влагалищъ, нижній превышаетъ длиною весь колосъ; кроющія чешуйки ланцетныя, вытянуты въ длинное, по краямъ зазубренное остроконечіе, свѣтло-красно-бурыя, съ зеленой полоской, равны или нѣсколько длиннѣ мѣшечковъ; мѣшечки яйцевидно-коническіе, тупо-3-гранные, съ обѣ-



Carex riparia.



Carex lasiocarpa.

ихъ сторонъ выпуклые, около 5 мм. дл., съ тонкими, продольными жилками, темно-бурые, переходить въ короткій, 2-зубчатый носикъ. Цвѣты съ $\frac{2}{2}$ мая, плоды съ $\frac{2}{2}$ июня и $\frac{1}{2}$ июля. По берегу Глубокаго озера, Ряз. у., по берегу р. Ширенки близъ Машина, Дмит. у. (П.).—Между Борисовымъ и Лужками по берегу ручья, Спб. у. (П. и С.).—Мытищи—болото близъ Лосиннаго Острова (С.).

201. *C. lasiocarpa* Ehrh.

Carex filiformis L. F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 161.—Кауф. II, № 815.—Цин., № 1582.—Кауф. I, стр. 535.—Дв., № 875.—Макс., № 867.—Ной. Н., № 7436.—Gold. C., p. 23.—Mart., p. 166.—Lon., p. 282.—St. I, № 642.—Pal., № 2012.

Стебли 40—100 см., прямостоящіе, 3-гранные, въ верхней части шероховатые; листья свзо-зеленые, не шире 2 мм., желобчатые, по краямъ и вдоль жилокъ остро-шершавые, у основанія окружены бурымъ или красно-бурымъ влагалищами и остатками прошлогоднихъ листьевъ; колосъ состоитъ изъ 2—3 женскихъ и 1—3 мужскихъ колосковъ; женскіе колоски продолговатые, сидятъ разставленно, нижній—иногда на короткой ножкѣ; нижній прицвѣтный листъ съ короткимъ влагалищемъ, равенъ или превышаетъ длиною весь колосъ; кроющія чешуйки ланцетныя, темно-бурыя съ зеленой полоской на спинкѣ, равны мѣшечкамъ; мѣшечки густо-опу-

иенные, продолговато-яйцевидные, тупо-3-гранные, почти безъ жилкоѣ, сѣрые, вытннуты въ короткій, 2 зубчатый носикъ. Цвѣты съ $2\frac{1}{2}$ мая, плоды съ конца юня. По большимъ моховымъ торфянымъ болотамъ, рѣке по берегамъ стоячихъ водъ. Захарово, Бутырки (Гольдб.). Три горы (Гевн.).—Мытищи (С.).—Косино; Глубокое и Тростенское озера, Руз. у., Вѣлнесская слобода, Срп. у. (П.).—Влизъ Клина (Ч.).

202. *C. hirta* L. Бух. II, № 439.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 161.—Кауф. II, № 816.—Цин., № 1581.—Кауф. I, стр. 536.—Ann. C. II, № 162.—Дв., № 879.—Макс., № 872.—Hoff. II, № 7447.—Gold. C., p. 23.—Gold. Sp., p. 139.—Mart., p. 163.—Hoff., № 699.—St. II, p. 53.—St. I, № 647.

Стебли прямоетоніе, 10—60 см., тупо-3-гранные, гладкіе, иногда близъ мужскихъ колосковъ шероховатые; листья ярко-зеленые, около 4 мм. шир., какъ и влагалища, б. или м. густо-мохнато-волосистые; колосъ состоитъ изъ 2—4 женскихъ и 1—3 мужскихъ колосковъ; женскіе колоски овальные или коротко-цилиндрическіе, сидятъ разставленно, около 2 см. дл., б. ч. сидятъ, только нижній на короткой ножкѣ; прицвѣтные листья съ длинными влагалищами, нижній почти равенъ всему колосу; кроющія чешуйки яйцевидно-ланцетныя, съ наружной стороны волосистыя, бурья, съ зеленой полоской и часто съ бѣлымъ краемъ, вытннуты въ длинное, по краямъ зазубренное остроконечіе; мѣшечки яйцевидно-коническіе, около 6 мм. дл., съ продольными жилками, б. или м. волосистыя, желто-зеленые, потомъ бурые, вытннуты въ 2-зубчатый носикъ, края котораго зазубрены. Цвѣты съ $2\frac{1}{2}$ мая, плоды съ конца юня. По песчанымъ дугамъ и по берегамъ рѣкъ и канавъ. Останкино, Лужняки на бер. Москвы р., Симоновъ монастырь; подъ Березенымъ, Срп. у., Яхрома подъ Шустовымъ, Дмит. у. (П.).—Мытищи (С.).—Вороново. Пдл. у. (Б).



Carex hirta.

z. hirtaeformis Pers. F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, стр. 560.—Цин., стр. 464.—Кауф. I, стр. 536.

Мѣшечки разсѣянно-волосистые, все остальное растеніе голое. Петровское-Разумовское (Шр.).—Берегъ Сенежскаго озера (К.).—Воробьевы горы, Кунцово (П.).

203. *C. aristata* R. Br. Пет. Кр. III, стр. 100.

Carex orthostachys C. A. M. Цин., № 1577.

Стебли высокіе, тупо-3-гранные, у основанія слегка вздутые, только близъ мужскихъ колосковъ шероховатые, 60—90 см., не цвѣтущіе—иногда достигаютъ почти 2 метр.; листья 3—7 мм. шир., плоскіе, по краямъ шероховатые, верхняя сторона ихъ голая, нижняя и влагалища покрыты рѣдкими волосами, рѣке тоже голая; основаніе стебли и листья въ окружено темно-красными или красно-бурными влагалищами, часто расщепленными на волокна; колосъ состоитъ изъ 2—4 женскихъ и 3—4 мужскихъ

колосковъ; женскіе колоски цилиндрическіе, примостоящіе, до 7 см. дл., сидятъ разставленно, нижній—на короткой ножкѣ; прицвѣтные листья съ короткими влагалищами, нижній превышаетъ длиною весь колосъ; кроющія чешуйки яйцевидно-ланцетныя, блѣдно-зеленыя, вытянуты въ длинное, по краямъ шероховато-пильчатое остріе, короче мѣшечковъ; мѣшечки продолговато-коническіе или яйцевидныя, почти кожистыя, съ выдающимся жилкамъ, около 7 мм. дл., покрыты рѣдкими волосками, вытянуты въ длинный носикъ, глубоко-расщепленный на два длинныхъ шпловидныхъ зубца, дуговидно расходящихся. Почти зрѣлые плоды въ концѣ іюля. На берегу Тростенскаго озера при впаденіи р. Тростни, Руз. у. (П. и С.) и въ герб. Генгипга.



Carex aristata.

α. glabra Uechtr. Пет. Кр. III, стр. 100.—Мос., № 47.

Все растеніе и мѣшечки совершенно голые. По сѣверному берегу острова на Юрьевскомъ озерѣ, Пдл. у. (Мос.).

Порядокъ *Spathiflorae*.

17 сем. *Araceae* Neck.

Цвѣты въ початкахъ, съ мясистымъ стержнемъ и съ крыломъ. однополые или обоеполые, съ околоцвѣтникомъ или безъ него; тычинокъ столько, сколько долей околоцвѣтника; завязь съ сидящимъ рыльцемъ; плодъ 1—3-гнѣздный, мясистый; сѣмя съ бѣлкомъ и прямымъ зародышемъ; многолѣтнія травы съ толстымъ ползучимъ корневищемъ.

70. *Acorus* L.

Початокъ цилиндрическій, суживающійся къ верхушкѣ, зацвѣтаетъ снизу; околоцвѣтникъ 6-лиственный, съ обратно-яйцевидными долями, верхушки которыхъ быстро заострены и загнуты; тычинокъ 6, съ короткими, вдоль разверзающимися пыльниками, сидятъ супротивъ долей околоцвѣтника; столбикъ очень короткій; завязь 3-гнѣздная; плодъ малосѣмевный.

204. *A. Calamus* L. Бух. II, № 486.—Ф. Б., № 127.—Бух. I, № 449.—Ф. О., № 8, p. 118.—Пет., стр. 130.—Кауф. II, № 898.—Цви., № 1357.—Кауф. I, стр. 594.—Lind., p. 164.—Ann. C. I, № 45.—Дв., № 356.—Макс., № 320.—Hoff. H., № 2799.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 61.—Hoff., № 135.—St. II, p. 22.—St. I, № 227.

Корневище толстое, до 3 см. толщ., горизонтальное; листья мечевидные, до 1 метра дл. и 0,5—3 см. шир., у основания часто красноватые; чехоль такой же, какъ и листья, незамѣтно переходитъ изъ цветоноса и кажется какъ бы его продолженіемъ; початокъ цилиндрической, къ концу нѣсколько суженный, тупой, зеленовато-желтый, отклоненъ, какъ бы боковой; все растение сильно пахучее. Цвѣты съ $\frac{2}{2}$ июня. По берегамъ рѣкъ и прудовъ. Иваново, Покровское, Щукино. Братцево



Acorus Calamus.



Calla palustris.

(К.).—Косино. Лужняки—близъ Воробьевыхъ горъ, Серебряный боръ близъ Хорошова (П.).—Быково по озерамъ, Брн. у. (С.).—Вороново. прудъ. Пдл. у. (В.).

71. *Calla* L.

Початокъ коротко-цилиндрической, на концѣ часто несущій только мужскіе цвѣты съ 6 и болѣе тычинками; тычиночныя нити плоскія, съ короткими пыльниками; цвѣты безъ околоцвѣтника; завязь одногнѣздная; плодъ мясистый, съ 6—8 сѣменами.

205. *C. palustris* L. Бух. II, № 485.—Бух. I, № 448.—Ф. О., № 8, p. 118.—Пет., стр. 152.—Кауф. II, № 897.—Цин., № 1356.—Кауф. I, стр. 593.—Lind., p. 164.—Дв., № 383.—Макс., № 319.—Hoff. H., № 7387 и № 2904.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 67.—Lib. Tr., p. 156.—St. II, p. 23.—St. I, № 620.—Pal., № 2000.

Корневище ползучее, членистое; листья на длинныхъ черешкахъ, лоснящиеся, сердцевидные или широко-сердцевидные, заостренные; основанія черешковъ съ широкими влагалищами, верхушка которыхъ свободная, торчитъ кверху наподобіе прилистника; цветочная стрѣлка не длиннѣе листьевъ; початокъ продолговатый или цилиндрической, 2—2,5 см. дл., тупой; крыло яйцевидное, 6—7 см. дл., быстро заострено въ тонкій, почти нитевидный кончикъ, съ верхней стороны бѣлое, съ нижней зеленое;

плоды ярко-красные. Цветы съ конца мая до конца іюня, зрѣлые плоды въ концѣ августа. По болотамъ, болотистымъ кустарникамъ и канавамъ, часто.

18 сем. Lemnaceae Dumort.


Маленькія, плавающія водяныя растенія со стеблемъ въ видѣ маленькаго, округлаго или продолговатаго листеца безъ развитыхъ листьевъ; цветы однодомные, сидятъ на краю листеца; женскіе—состоятъ изъ бутылчатой завязи съ очень короткимъ столбикомъ и простымъ рыльцемъ, мужскіе—изъ одной тычинки съ нитью; одинъ женскій и два мужскихъ цвѣтка сидятъ какъ бы въ мѣшечкѣ; плодъ не раскрывающійся, содержитъ 1—6 сѣмянъ.

72. *Lémna* L.

Основаніе листеца безъ чешуевидныхъ листочковъ; листецъ съ 1 слабо замѣтной срединной жилкой и иногда съ 1—2 боковыми; корешокъ 1; плодъ 1—6-сѣмennyй.

206. *L. trisúlca* L. Пет. Кр. III, стр. 140.—Бух. II, № 496.—Бух. I, № 459.—Ф. О., № 8, p. 118.—Пет., стр. 211.—Кауф. II, № 913.—Цин., № 1359.—Кауф. I, стр. 601.—Lind., p. 164.—Дв., № 40.—Макс., № 4.—Нолл. II, № 7397.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 159.—St. II, p. 52.—St. I, № 622.

Растеніе прозрачное, подводное, только во время цвѣтенія всплываетъ на поверхность воды; листецы продолговатые, ланцетные, сужен-



Lemna trisulca.

Lemna minor.

ные въ видѣ черенка, спереди слегка зазубренныя, остаются долго связанными между собой, отчего растеніе вѣтвистое. Цвѣтеть съ $\frac{2}{2}$ іюня до глубокой осени. Въ стоячихъ водахъ, очень часто.

207. *L. minor* L. Пет. Кр. III, стр. 139.—Бух. II, № 495.—Бух. I, № 458.—F. O., № 8, p. 118.—Пет., стр. 211.—Кауф. II, № 912.—Гор., № 58.—Цин., № 1358.—Кауф. I, стр. 601.—Lind., p. 164.—Дв., № 41.—Макс., № 5.—Hoff. H., № 7395.—Gold. C., p. 22.—Gold. Sp., p. 137.—Mart., p. 159.—St. II, p. 52.—St. I, № 623.

Растение плавающее на поверхности воды; листецъ обратно-яйцевидный или почти круглый, цѣлюкрайный, не суженный въ черешокъ, толстый, не прозрачный, сверху свѣтло-зеленый, снизу бѣловато- или желтовато-зеленый. Цвѣтеть съ $\frac{2}{2}$ июня до глубокой осени. Въ стоячихъ водахъ и по берегамъ рѣкъ, очень часто.

73. *Spirodéla* Schleid.

Основаніе листца снабжено 2 чешуйчатыми очень маленькими листочками: кромѣ средней, нѣсколько боковыхъ жилковъ; корешковъ нѣсколько, пучкомъ; плодъ односѣменный.

208. *S. polyrrhiza* Schleid. Бух. II, № 494.—Ф. Б., № 129.—Бух. I, № 457.—F. O., № 8, p. 118.—Кауф. II, № 911.—Цин., № 1361.—Кауф. I, стр. 600.—Lind., p. 164.
Lemna polyrrhiza L. Пет. Кр. III, стр. 140.—Пет., стр. 211.—Pinz., p. 18.—Дв., № 43.—Макс., № 7.—Hoff. H., № 7396.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 159.—St. II, p. 52.—St. I, № 625.


Растение плаваетъ на поверхности воды; листецъ округлый, обратно-яйцевидный, цѣлюкрайный, толстый, сверху ярко-зеленый, снизу красновато-лиловый, съ ясными, дугообразными жилками. Цвѣтеть съ $\frac{2}{2}$ июня до глубокой осени. Въ стоячихъ и медленно текущихъ водахъ.



Порядокъ Liliiflorae.

19 сем. Juncaceae Vent.

Околоцвѣтникъ 6-листный, состоитъ изъ 2 вѣнцовъ перепончатыхъ, сухихъ листочковъ, въ каждомъ вѣнцѣ по 3; тычинокъ 6, супротивныхъ листочкамъ околоцвѣтника; завязь верхняя; столбикъ одинъ, съ 3 нитевидными рыльцами; коробочка 3-створчатая, одногнѣзная, съ 3 сѣменами или 3-гнѣзная со многими сѣменами въ каждомъ гнѣздѣ; сѣменная оболочка часто слабо охватываетъ сѣмя и иногда при основаніи или наверху снабжена мѣшеччатымъ выростомъ; растенія со спиральными, узкими или цилиндрическими листьями съ влагалищами; пазушный листъ каждой вѣтви влагалищный.



Spirodela polyrrhiza.

74. *Juncus* L.

Листочки околоцвѣтника у основанія слегка сжаты; тычинокъ 6 или 3; коробочка 3-гнѣздная, многосѣменная, створки посрединѣ отдѣляются перегородками; сѣмена безъ придатковъ; листья цилиндрическіе или слегка сплюснутые, линейно-шиловидные.

1. Стебли безъ стеблевыхъ и корневыхъ листьевъ, съ однимъ только листовымъ влагалищемъ. 2.

Стебель съ 1 или нѣсколькими развитыми листьями. 6.

2. Соцвѣтіе безъ вѣтвей, состоитъ изъ 3—7 цвѣтковъ; стебель очень тонкій. *J. filiformis* L.

Соцвѣтіе состоитъ изъ многихъ цвѣтовъ съ неравными, длинными вѣтвями или соцвѣтіе многоцвѣтковое—клубочкомъ. 3.

3. Стебель связый, внутри съ поперечными перегородками.

J. glaucus Ehrh.

Стебель зеленый или сѣро-зеленый, внутри съ сплошной рыхлой сердцевинной. 4.

4. Соцвѣтіе развѣтвленное, съ длинными, по неравнымъ вѣтвями.

J. effusus L.

Соцвѣтіе сжатое клубочкомъ, безъ выдающихся вѣтвей. 5.

5. Коробочка на верхушкѣ вдавлена, съ короткимъ столбикомъ въ углубленіи; пыльники бѣловатые; околоцвѣтникъ 2—2.5 мм. дл., съ широкимъ перепончатымъ краемъ.

J. effusus L. a. *compactus* Lej et Court.

Коробочка тупая, не вдавленная, съ маленькимъ бугоркомъ на верхушкѣ, на которомъ сидитъ короткий столбикъ; пыльники желтоватые; околоцвѣтникъ 3 мм. дл., съ узкимъ перепончатымъ краемъ.

J. conglomeratus L.

6. Листья цилиндрическіе, сплюснутые, полые, съ поперечными внутренними перегородками. 7.

Листья плоскіе или желобчатые, безъ перегородокъ. 9.

7. Внутренніе листочки околоцвѣтника длиннѣе наружныхъ, во время плодоношенія кончики ихъ отогнуты кнаружи, всѣ длинно-заостренные; коробочка съ длиннымъ носикомъ.

J. acutiflorus Ehrh.

Всѣ листочки околоцвѣтника одинаковой длины; внутренніе—тупые или слегка заостренные; наружные—острые или всѣ тупые; коробочка съ короткимъ или среднимъ носикомъ. 8.

8. Наружные листочки околоцвѣтника ланцетные, острые.

J. lampocarpus Ehrh.

Всѣ листочки околоцвѣтника тупые; наружные—съ округлой верхушкой, быстро переходящей въ очень маленькое острие.

J. alpinus Vill.

9. Листочки околоцвѣтника узко-ланцетные, съ заостренной шпильковидной верхушкой.

J. bufonius L.

Листочки околоцвѣтника овально-ланцетные или овальные, съ туповатой или округлой верхушкой. 10.

10. Коробочка равна околоцвѣтнику; стеблевыхъ листьевъ нѣтъ, только близь соцвѣтїа, похожїй на прицвѣтникъ.

J. squarrosus L.

Коробочка на $\frac{1}{2}$ или на $\frac{2}{3}$ выдается изъ околоцвѣтника; стеблевыхъ листьевъ 1 или 2 близь середины стебля.

J. compressus Jacq.

209. **J. bufonius** L. Пет. Кр. III, стр. 77. — Бух. II, № 416. — Бух. I, № 385. — F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 206. — Кауф. II, № 763. — Цин., № 1495. — Кауф. I, стр. 506. — Lind., p. 172. — Ann. C. I, № 50. — Дв., № 362. — Макс., № 328. — Hoff. II, № 2804. — Gold. C., p. 19. — Mart., p. 21. — St. II, p. 22. — St. I, № 234. — Pal., № 722.

Однолѣтнее растеніе съ тонкими волокнистыми корнями; стебли 5—30 см. развѣтвленные; корневые листья узко-линейные, у основанїя желобчатые, на концѣ длинно-заостренные, съ длинными и широкими влагалищами; стеблевые (2—3) такіе же, какъ и корневые; соцвѣтіе сложное, вѣтви его немногочисленные, развилисто-вѣтвистыя, съ далеко раз-



Juncus bufonius.



Juncus bufonius a. ranarius.

ставленными одинъ отъ другого цвѣтами; цвѣты 3—7 мм. дл., закрытые или открытые; листочки околоцвѣтника равной или неравной длины, узко-ланцетные, съ заостренными шиловидными верхушками, съ 3 жилками, зеленые, съ широкой, бѣлой перепончатой каймой; коробочка короче околоцвѣтника, эллиптическая, около 3.5 мм. дл., тупая, съ довольно длиннымъ носикомъ. Цвѣты съ $\frac{2}{2}$ июня, почти весь июль, зрѣлыя сѣмена съ конца июля. По канавамъ, сырымъ мѣстамъ и около дорогъ, очень часто.

- a. ranarius* Song. et Perrier. Растеніе низкое, 3—10 см., рѣже выше, образуетъ густые пучки; стебли вѣтвистые, часто отогнуты дугой;

нижнія листовыя влагалища красно-бурыя или темно-красныя; пластинка листа часто тоже отогнута дугообразно; цвѣты сидятъ очень сближенно по 2 — 3; внутренніе лпесточки околоцвѣтника, особенно у верхнихъ цвѣтовъ, равны или нѣсколько короче зрѣлой коробочки; наружныя лпесточки околоцвѣтника нѣсколько длиннѣе коробочки; коробочка къ основанію сужена. Въ плодахъ 15 августа. На пескахъ по отмелямъ р. Оки, противъ с. Лужняковъ, Срп. у. (II. и X.).

210. *J. squarrosus* L. Пет. Кр. III, стр. 77. — Кауф. II, стр. 525. — Цин., стр. 443. — Кауф. I, стр. 506. — Дв., № 358. — Макс., № 324. — Mart., p. 62. — St. II, p. 22. — St. I, № 231.

Корневище горизонтальное, многоголовчатое; стебли прямостоящіе, гибкіе, 15 — 30 см., слегка сплюснутые или цилиндрическіе; листья въ 2 раза шире стебля, узко-линейные, гибкіе, желобчатые, длинно-заостренные, съ очень широкими и длинными влагалищами; соцветіе сложное, съ вверху торчащими вѣтвями, въ полузонтикахъ; цвѣты 6 мм. дл.; лп-



Juncus squarrosus.



Juncus compressus.

сточники околоцвѣтника равной длины, овальные, тупые или слегка заостренные, бурые или оливковые, съ широкой, бѣлой перепончатой каймой; коробочка равной длины съ околоцвѣтникомъ, обратно-яйцевидная, 3-гранная, съ короткимъ носикомъ. Находится въ гербаріи Максимовича.

211. *J. compressus* Jacq. Мос., № 38. — F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 206. — Кауф. II, № 762. — Цин., № 1421. — Кауф. I, стр. 506. — Lind., p. 172. — Ann. C. IV, № 58.

Juncus bulbosus L. Дв., № 361. — Макс., № 327. — Hoff. H., № 2805. — Gold. C., p. 19. — Mart., p. 63. — St. II, p. 22. — St. I, № 233. — Pal., № 721.

Корневище ползучее, горизонтальное; стебли прямостоящіе, 10—30, рѣдко 50 см., съ 1 стеблевымъ листомъ; корневыя листья узко-линейные, 5—25 см. дл., 0,75—1 мм. шир., плоскіе, рѣже желобчатые, съ длинными

и широкими влагалищами; стеблевой листъ такой же, какъ и корневыя; соцветіе конечное, сложное или двусложное, полусонтичное, вѣтви его неравныя, развѣистыя; цвѣты 3 мм. дл.; листочки околоцвѣтника равной длины, овально-ланцетные, съ тупой верхушкой, каштановаго цвѣта, съ широкой зеленой полоской на спинкѣ и бѣлымъ перепончатымъ краемъ; коробочка почти шаровидная, на $\frac{1}{2}$ или $\frac{2}{3}$ выдается изъ околоцвѣтника, каштановаго цвѣта, съ очень короткимъ носикомъ. Цвѣты съ начала іюня, зрѣлыя сѣмена съ конца іюля. На песчаной почвѣ, по берегамъ рѣкъ и по сырým лугамъ. Симоновъ монастырь, Строгино, Петровское-Разумовское; Раменское, Брн. у., Серпуховъ (К.). — Мытищи (С.). — Воробьевы горы; Карапчеево, Кзм. у. (П.).

α. dianthélus K. Koch. Кромѣ верхушечнаго соцветія, есть еще вѣтка, равная всему соцветію и выходящая изъ пазухи верхняго листа, сидящаго нѣсколько выше середины стебля. По песчанымъ отмелямъ р. Оки, противъ Лужняковъ, Срп. у. (П. и X.).

212. *J. filifórmis* L. Бух. II, № 414. — Бух. I, № 386. — Ф. О., № 7, р. 102. — Пет., стр. 205. — Кауф. II, № 759. — Цин., № 1486. — Кауф. I, стр. 504. — Lind., р. 170. — Ann. C. IV, № 56. — Дв., № 357. — Макс., № 323. — Hoff. H., № 2809. — Gold. C., р. 19. — Mart., р. 62. — St. II, р. 22. — St. I, № 230. — Pal., № 720.

Корневище тонкое, ползучее, горизонтальное; стебли тонкіе, въ діаметрѣ не толще 1 мм., 10—50 см.; листья влагалищныя; нижніе—желтоватыя или бурые; верхніе, сидящіе не выше нижней четверти стебля, иногда съ короткой желобчатой пластинкой; соцветіе боковое, состоитъ изъ 3—7 цвѣтовъ на неравныхъ цвѣтоножкахъ; листочки околоцвѣтника 3 мм., блѣдно-зеленыя или желто-зеленыя, линейно-ланцетныя, заостренныя, съ узкой перепончатой каймой; коробочка обратно-яйцевидная, равна околоцвѣтнику, съ очень короткимъ носикомъ; тычинокъ обыкновенно 6. Цвѣты съ начала іюня, зрѣлыя сѣмена со середины іюля. По болотамъ и болотистымъ лугамъ очень часто.




Juncus filiformis.

213. *J. effúsus* L. Пет. Кр. III, стр. 75. — Пет., стр. 206. — Цин., № 1483. — Ann. C. III, № 262. — Дв., № 356. — Gold. C., р. 19. — Mart., р. 62. — St. II, р. 22. — St. I, № 229. — Pal., № 719.

Juncus communis E. Mey. *β. effusus* E. Mey. Бух. II, № 413. — Бух. I, № 384. — Ф. О., № 7, р. 102. Кауф. II, № 522. — Кауф. I, стр. 504. — Lind., р. 170. — Макс., № 321.

Juncus communis *β. Ehrh.* Hoff. H., № 2808.

Корневище ползучее, горизонтальное; стебли зеленые, прямостоящие, въ живомъ видѣ безъ бороздокъ, въ сухомъ — съ тонкими продольными линиями, 30 — 120 см.; нижнія листовыя влагалища желто-бурые или бурые; прицвѣтное влагалище узкое; листья въ нѣтъ; соцветіе не густое, многоцвѣтковое, съ длинными, неравными цвѣтоносами. рѣдко соцветіе съ короткими цвѣтоносами; доли околоцвѣтника 2 — 2,5 мм. дл.,



Juncus effusus.



Juncus conglomeratus

ланцетныя, заостренныя, съ широкимъ перепончатымъ краемъ; пыльники бѣловатыя; тычиннокъ б. ч. 3; коробочка обратно-овальная, верхушка ея слегка вдавлена и въ углубленіи сидитъ короткій столбикъ. Цвѣты съ конца іюня, зрѣлыя сѣмена съ конца іюля. По болотамъ, канавамъ, около рѣкъ и по сырымъ мѣстамъ, очень часто.

α. **compactus** Lej. et Court. Пет. Кр. III, стр. 75.

Соцветіе скучено почти клубочкомъ. Кпресво (К.) и въ гербаріи Максимовича.

γ. **pauciflorus** Michel. Съ тонкимъ стеблемъ не толще 2,5 мм.; соцветіе малоцвѣтковое, съ короткими, но не равными цвѣтоносами. Красниковское болото за Б. Мытницами (П.).

214. **J. conglomeratus** L. Пет., стр. 206. — Цин., № 1484. — Дв., № 355. — Макс., № 321. — Mart., p. 62. — St. II, p. 22. — St. I, № 228.

Juncus communis E. Mey. α. *conglomeratus* L. Кауф. II, стр. 522. — Кауф. I, стр. 504. — Lind., p. 170.


Juncus Leersii Marsson Пет. Кр. III, стр. 75.

Корневище ползучее, горизонтальное; стебли 30—75 см., сѣро-зеленые, въ живомъ видѣ съ ясными, продольными бороздками; нижнія листовыя влагалища ржаво-бурые или красно-бурые; листья въ нѣтъ; прицвѣтное влагалище нѣсколько вздутое, раскрытое; соцветіе густое, скатое; доли околоцвѣтника 3 мм. дл., ланцетныя, заостренныя, съ узкимъ перепончатымъ краемъ; тычиннокъ обыкновенно 3; пыльники желтоватыя; коробочка

обратно-овальная, верхушка ея выдается бугоркомъ, на которомъ сидитъ столбикъ. Цвѣты съ конца іюня, весь июль. Серебриный боръ близъ Хорошова (К.).—Засѣмъе, Влк. у. (Ч.).

215. *J. glaucus* Ehrh. Пет. Кр. III, стр. 75.—Пет., стр. 206.—Кауф. II, № 758.—Цин., № 1485.—Рупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 504.—Макс., № 322.—Hoff. II., № 2810.—Gold. C., p. 19.—Hoff., № 1775.

Корневище толстое, почти деревянистое, ползучее; стебли 30—90 см., сплывы, продольно-бороздчатые, внутри съ поперечными перегородками; нижнія листовыя влагалища лоснящіяся, темно-красновато-бурыя; листья вѣтъ; соцвѣтіе рѣдкое, съ неравными, вверхъ торчащими вѣтвями; листочки околоцвѣтника узко-ланцетные, длинно-заостренные, на спинкѣ



Juncus glaucus.



Juncus acutiflorus.

зеленые, по краямъ бурые; внутренніе — нѣсколько короче наружныхъ; тычинокъ 6; коробочка эллиптическая, съ заостренной верхушкой, немного короче околоцвѣтника. Цвѣты съ $\frac{2}{2}$ іюня. Находятся въ гербаріи Анненкова и въ гербаріи Гофмана.

216. *J. acutiflorus* Ehrh. Пет. Кр. III, стр. 77.—Дв., № 360.—Макс., № 320.—Mart., p. 62.—Hoff., № 1777.
Juncus silvaticus Rchb. Пет., стр. 206.—Кауф. II, № 761.—Гор., № 83.—Цин., № 1490.

Корневище довольно толстое, почти деревянистое, ползучее; стебли прямо-торчащіе, упругіе, 30—90 см., до верху съ листьями; листья у основанія стебля только влагалищные или съ очень короткой пластинкой; стеблевые (2—3) — съ длинной пластинкой, шире стебля, сплюснутые, 1—2 мм. шир., съ внутренними поперечными перегородками, иногда слегка дугообразно отклонены отъ стебля; цвѣтрасположеніе многоосное, полузонтичное, съ торчащими вѣтвями; пучки ржаво-бурые, 4—7-цвѣтковые; цвѣты 3 мм. дл.; коробочки 3,5 мм. дл.; листочки около цвѣтника ланцетные, тонко- и длинно-заостренные, внутренніе длиннѣе наружныхъ, во

время плодоношения верхушка ихъ отогнута кнаружи: коробочка ржаво- или темно-бураго цвѣта, длиннѣе околоцвѣтника, овальная, вытянута въ длинный носикъ. По дорогѣ отъ Москвы къ Вереѣ (Макс.).

217. *J. alpinus* Vill. Пет. Кр. III, стр. 76.—Мос., № 37.—Пет., стр. 206.—Цин., № 1487.—Pinz., p. 19.

Juncus lamprocarpus Ehrh. γ. *alpinus* Kauffm. Кауф. II, стр. 523.—Кауф. I, стр. 505.

Корневище горизонтальное; стебли прямостоящіе, цилиндрическіе или сплюснутые, 10—70 см.; корневые листья влагалищные, красноватые или бурые, съ маленькой пластинкой; стеблевые (2—4)—шире стебля, почти цилиндрическіе или сплюснутые, 1—2 мм. шир., съ поперечными внутренними перегородками; влагалища ихъ узкія, на спинкѣ округлыя или сплюснутыя, очень рѣдко съ килемъ; соцветіе прямоторчащее, сложное или многосложное, полузонтитное, съ верху торчащими вѣтвями; пучки 3—6-цвѣтковые, каштаново- или буро-краснаго цвѣта; цвѣты 1—3,5 мм. дл.; листочки околоцвѣтника одинаковой длины, продолговато-овальные; наружные—съ округлой верхушкой, быстро переходящей въ очень короткое остріе, внутренніе—съ округлой верхушкой и съ перепончатымъ краемъ; коробочка 3-гранная, съ тупой верхушкой, на которой сидитъ очень короткій носикъ. Цвѣты со середины іюня, зрѣлыя сѣмена съ конца іюля. По сырымъ лугамъ, канавамъ и по берегамъ рѣкъ. Влѣзъ Тулуновской мельницы за Покровскимъ; болото по опушкѣ лѣса, около Сенежскаго озера, Клин. у. (К.).—Раменки, Б. Мытищи, Путяевъ оврагъ въ Сокольниковѣй рошѣ, Мос. у., за Владычнымъ монастыремъ, Серп. у., Вертинское болото, Клин. у. (П.).—Рыбаки—берегъ Круглаго озера, Мос. у. (П. и С.).—Сѣкирино, Пдл. у. (Мос.).



Juncus alpinus.

218. *J. lamprocarpus* Ehrh. Пет. Кр. III, стр. 77.

Juncus lamprocarpus Ehrh. Бух. II, № 415.—Бух. I, № 383.—F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, № 760.—Pinz., p. 19.—Кауф. I, стр. 505.—Ann. C. IV, № 57.

Juncus lamprocarpus Ehrh. β. *acuminatus* Kauffm. Пет. Кр. III, стр. 76.—Кауф. II, стр. 523.—Кауф. I, стр. 505.

Juncus articulatus L. Пет., стр. 206.—Цин., № 1488.—Hoff. II, № 2803.—Gold. C., p. 19.—Hoff., № 1771.—St. II, p. 22.—St. I, № 232.

Juncus obtusiflorus Ehrh. Цин., стр. 442.—Дв., № 359.—Макс., № 325.—Hoff. II, № 2816.—Mart., p. 62.

Корневище горизонтальное; стебли прямостоящіе или дугообразно согнутые, рѣдко почти лежачіе, 5—45 см., рѣже выше; корневые листья влагалищные, красноватые или буроватые, съ очень короткой пластинкой; стеблевые—съ длинной пластинкой, цилиндрическіе или сплюснутые, около 2 мм. шир., съ внутренними поперечными перегородками, съ длин-

ными влагалищами, на спинкѣ округлыми; соцветіе двусложное, полузонтитичное, съ торчащими и растопыренными вѣтвями; пучки 4—10-цвѣтковые, ржаватаго или каштановаго цвѣта; цвѣты 2,5—3 мм. дл., при плодахъ иногда 4 мм. дл.; всѣ листочки околоцвѣтника одинаковой длины, съ 1—3 жилками; наружные — ланцетные, острые; внутренніе — овално-ланцетные, тупые или острые, съ широкимъ перепончатымъ краемъ; коробочка немного длиннѣе околоцвѣтника, овальная, верхушка ея призматическо-пирамидальная, съ короткимъ носикомъ. Цвѣты со средины іюня, зрѣлыя сѣмена съ конца іюля. По сырымъ лугамъ, канавамъ и болотамъ, очень часто.



Juncus lampocarpus

75. *Lúzula* D.C.

Листочки околоцвѣтника у основанія вполне сросшіеся; тычинокъ всегда 6; коробочка одногнѣздная, 3-сѣменная, разверзается 3 створками; створки безъ перегородокъ; сѣмя съ мѣшечкатымъ придаткомъ; листья широко-ланцевидные, плоскіе, съ длинными бѣлыми волосками.

1. Цвѣты въ соцветіи поодинокіе, на длинныхъ цветоножкахъ.

L. pilosa Willd.

Цвѣты въ соцветіи пучками, по 6—20, на очень короткихъ цветоножкахъ. 2.

2. Соцветіе многосложное, съ длинными тонкими вѣтвями; цвѣты сидятъ по 3—8, лоснящіеся, почти пергаментные, во время плодоношенія иногда красновато-сѣрые. *L. nemorosa* E. Mey.

Соцветіе сложное, съ неравными вѣтвями; цвѣты сидятъ плотными пучками, по 6—20, коричнево-каштановые, иногда почти бѣлые; листочки околоцвѣтника мягкіе, на спинкѣ б. ч. съ полуской. 3.

3. Пучки почти бѣлые, 8—20-цвѣтковые; цвѣты 2 мм. дл.; наружные листочки околоцвѣтника нѣсколько длиннѣе внутреннихъ.

L. campestris D.C. ? *pallens* Wahlb.

Пучки коричневыя или темно-каштановыя; цвѣты 2,5—3 мм. дл.; всѣ листочки околоцвѣтника равны. 4.

4. Стебли высокіе, 30—50 см.; пучки 8—16-цвѣтковые, крупныя, иногда почти цилиндрическіе; коробочка равна околоцвѣтнику или превышаетъ его на $\frac{1}{3}$; сѣмя 1,5—1,7 мм. дл.

L. campestris D.C. ? *multiflora* Čelak.

Стебли 10—20 см.; пучки 6—10-цвѣтковые, шарообразныя или округло-овальныя; коробочка короче околоцвѣтника; сѣмя 2,5 мм. дл.

L. campestris D.C. ? *vulgaris* Gaud.

219. *L. pilósa* Willd. Бух. II, № 417. — Бух. I, № 387. — Ф. О., № 7, p. 102. — Пет., стр. 217. — Кауф. II, № 764. — Цип., № 1481. — Кауф. I, стр. 507. — Lind., p. 170. — Ann. С. II, № 160. — Дв., № 363. — Макс., № 329. — Hoff. H., № 2829. — Gold. С., p. 19. — Mart., p. 63.

Juncus pilosus L. St. II, p. 22. — St. I, № 235. — Pal., № 723.

Корневище даёт нѣсколько стеблей, у основанія которыхъ спятъ красно-бурые влагалищные листья; стебли 15—30 см., прямостоящіе или восходящіе; корневые листья линейно-ланцетные, до 20 см. дл., во время цвѣтенія равны стеблю, 5—10 мм. шир.; стеблевые—только 2—3 см. дл., съ узкими влагалищами; всѣ листья на концѣ съ хрищеватымъ кончикомъ, покрыты довольно рѣдкими, но длинными, бѣлыми волосками; соцвѣтіе полузонтичное; цвѣты 3—4 мм. дл., поодинокѣ, на длинныхъ



Luzula pilosa.



Luzula nemorosa.

цвѣтопожкахъ, по отцвѣтаніи загнутыхъ книзу; листочки околоцвѣтника ланцетные, острые, бурые или красно-бурые, съ бѣлой перепончатой каймой; коробочка яйцевидная, слегка коническая, превышаетъ околоцвѣтникъ; сѣмена на верхушкѣ съ серповиднымъ придаткомъ. Цвѣты въ апрѣлѣ и въ началѣ мая, зрѣлыя сѣмена съ середины іюня. По лѣсамъ и кустарникамъ, очень часто.

220. *L. nemorósa* E. Mey. Пет. Кр. III, стр. 79.

Luzula albidá D.C. Мос., № 39. — Ф. Б., № 16. — Цип., стр. 440. — Дв., № 365. — Макс., № 330.

Juncus albidus Hoffm. Дв., № 365. — Макс., № 330.

Juncus nemorosus Poll.

Корневище горизонтальное или косое, иногда съ побѣгами, стебли спятъ пучкомъ, прямостоящіе или у основанія слегка приподнимающіеся, 30—70 см.; корневые листья 10—30 см. дл. и 3—5 мм. шир., плоскіе, линейные; стеблевые—около 2 мм. шир., съ узкими влагалищами, всѣ листья по краямъ усажены длинными, бѣлыми волосками; соцвѣтіе ко-

печное, сложное, щитковидно-полузонтичное, съ неравными цвѣтоносами; цвѣты сближены по 3—8, мелкіе, около 2,5 мм. дл., бѣлые или грязно-бѣлые, во время плодоношенія околоцвѣтничъ слегка красновато-сѣрый; листочки околоцвѣтника ланцетные, острые, сухіе, слегка пергаментные; коробочка 3-гранно-овально-коническая, остроконечная; сѣмя 1,25 мм. дл., косо-овальное, съ сѣрымъ или желтымъ придаткомъ. Цвѣты съ начала іюня, зрѣлыя сѣмена съ конца іюля. Въ гербаріи Максимовича подъ № 5491. — Райки, Бгр. у. (П.). — Горенки (Ц.). — В. Мытищи во владѣніи Челноковыхъ (С.). — Михайловское, Пдл. у. (Б.).

221. *L. campestris* D.C. Пет. Кр. III, стр. 78. — Пет., стр. 217. — Кауф. II, № 765. — Цин., № 1482. — Pinz., p. 19. — Кауф. I, стр. 507. — Lind., p. 170. — Ann. C. IV, № 62. — Дв., № 364. — Макс., № 331. — Hoff. H., № 2826. — Mart., p. 63.

Juncus campestris L. Hoff., № 1770. — St. II, p. 22. — St. I, № 236.

Корневище даетъ одинъ стебель или цѣлый пучокъ стеблей, прямо-стоящихъ, иногда у основанія слегка приподнимающихся, 5—60 см., съ 2—3 стеблевыми листьями; листья линейные, 2—6 мм. шир., на концѣ туповатые, по краямъ съ рѣдкими, но длинными, бѣлыми волосками, корневые — короче стебля; соцвѣтіе конечное, метелковидное съ неравными лучами; цвѣты 2—3 мм. дл., темно-коричневые или иногда почти бѣлые; листочки околоцвѣтника ланцетные или линейно-ланцетные, острые;



Luzula campestris s. *vulgaris*.



Luzula campestris s. *multiflora*.



Luzula campestris s. *pallescens*.

сѣмена овальные или округло-овальные, съ короткимъ коническимъ придаткомъ. Цвѣты со середины мая, зрѣлыя сѣмена въ концѣ іюля. По кустарникамъ, лѣснымъ полянамъ и сырým лугамъ, часто.

2. *vulgaris* Gaud. Съ 1—3 примостоящими или приподнимающимися стеблями, 10—20 см.; соцвѣтіе сложное, съ неравными, примостоящими или иногда отогнутыми вѣтвями; лучиковъ 3—6, округло-овальныхъ. 6—10-цвѣтковыхъ; прицвѣтными листь равенъ или

короче лучей соцветія; цвѣты 3 мм. дл.; всѣ листочки околоцвѣтника равной длины, ланцетные, заостренные, темно-коричневые, съ узкимъ бѣлымъ краемъ; коробочка слегка 3-гранная, съ короткимъ остриемъ, короче листочковъ околоцвѣтника; сѣмя 2.5 мм. дл., съ придаткомъ въ 0,5 мм. дл. Спасское (К.).—Мытищи (С.).—Раменки, Мос. у. (Б.).

- β. *multiflora* Celak. Пет. Кр. III, стр. 78.—Бух. I, № 388.—F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, стр. 526.—Цип., стр. 440.—Кауф. I, стр. 507.
Lazula erecta Desv. Hoff. H., № 2826.—Gold. C., p. 19.—Gold. Sp., p. 125.
Juncus multiflorus Hoffm.

Стеблей много, прямостоящихъ, 30—50 см., сидятъ пучкомъ; соцветіе сложное, рѣже двусложное, съ торчащими, неравными, длинными вѣтвями: пучковъ 5—10, овальныхъ, 8—16-цвѣтковыхъ, крупныхъ; цвѣты 2.5 мм., рѣже 3 мм. дл.; листочки околоцвѣтника равные, ланцетные, заостренные, темно- или свѣтло-коричневые, съ бѣлымъ краемъ; коробочка округлая или 3-гранная, съ короткимъ остриемъ, равна листочкамъ околоцвѣтника или превышаетъ ихъ на $\frac{1}{3}$; сѣмя 1,5—1,7 мм. дл., съ придаткомъ въ 0,6 мм. дл.

- γ. *pallescens* Wahlb. Пет. Кр. III, стр. 78.—Бух. II, № 418.

Стебли тонкіе, блѣдно-зеленые, 10—45 см., прямостоящіе, растутъ пучкомъ; соцветіе о многихъ пучкахъ, полузонтичное; пучки почти бѣлые, овальные или продолговатые, маленькіе, 8—20-цвѣтковые; цвѣты 2 мм. дл., блѣдные, почти бѣлые; наружные листочки околоцвѣтника ланцетные, длинно-заостренные; внутренніе — овально-ланцетные, короче и тупѣ наружныхъ; всѣ свѣтло-коричневые, почти бѣлые, съ широкимъ, бѣлымъ краемъ, длиннѣе коробочки; сѣмя 1,2 мм. дл., съ придаткомъ въ 0,3 мм. дл. Косино (П.).—Близъ Вѣлива, Вгр. у., лѣсъ близъ Серпухова (С.).

20 сем. Colchicaceae D.C.

Околоцвѣтникъ 6-лиственный, состоитъ изъ 2 вѣнцовъ, по 3 листочка въ каждомъ, колесовидный, вполнѣ открытый или даже отогнутый наружу; тычпковъ 6; пыльники открываются наружу; завязь состоитъ изъ 3 плодолистиковъ, сросшихся только нижней частью, верхушка ихъ свободная; каждый плодолистикъ съ однимъ столбикомъ и короткимъ рыльцемъ; плодъ—коробочка, раскрывающаяся на внутренней сторонѣ по сѣмкамъ плодолистика.

76. *Veratrum* L.

222. V. *album* L. Пет. Кр. III, стр. 66.—Пет., стр. 299.—Кауф. II, № 739.—Цип., № 1480.—Рупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 490.—Дв., № 380.—Макс., № 352.—Mart., p. 66.

Veratrum viride Schk. St. II, p. 56.

Стебель покрытъ листьями, высокій, до 1,5 метра, въ верхней части коротко-пушистый; листья съ влагалищами, широко-эллиптическіе, заостренные, съ ясными продольными жилками, вдоль складчатые, съ нижней стороны пушистые; верхніе листья овально-ланцетные; цвѣточная



Veratrum album a. Lobelianum.



Veratrum nigrum.

метелка густая, вѣтвистая; прицвѣтники равны или почти равны пушистой цвѣтоножкѣ; листочки околоцвѣтника ромбоидально-ланцетные, желтовато-бѣлые. Цвѣты съ конца іюня до середины іюля.

У насъ встрѣчается только:

a. Lobelianum Koch. (Bernh. sp.) Пет. Кр. III, стр. 67.—Кауф. II, № 739.—Pinz., p. 19.—Кауф. I, стр. 490.

Съ желто-зелеными цвѣтами, колокольчатымъ околоцвѣтникомъ и лепестками къ основанію сильно суженными, съ продольными, темными жилками. По заливаемымъ лугамъ Оки, какъ въ Срп. у., такъ и въ Клм. у.

223. *V. nigrum L.* Пет. Кр. III, стр. 67.—Пет., стр. 299.—Кауф. II, № 740.—Мил., № 33.—Гор., № 78.—Цви., № 1479.

Растеніе достигаетъ 1,5 метра; стебли, цвѣтоножки и прицвѣтники шерстисто-войлочные; листья съ обѣихъ сторонъ голые, широко-эллиптическіе, складчатые; верхніе — эллиптическо-ланцетные, заостренные; цвѣточная метелка длинная, только въ нижней части вѣтвистая; листочки околоцвѣтника темно-пурпуровые, обратно-яйцевидные или лопатчатые, почти равны цвѣтоножкамъ; прицвѣтники линейно-продолговатые, б. ч. короче цвѣтоножекъ. Цвѣты съ $\frac{2}{2}$ іюля до середины августа. На песчано-перегноной почвѣ между Лузками и Зибровымъ, Срп. у. (Г.). — На известнякѣ подь Бѣлыми Колодезями, Клм. у. (П.).

21 сем. Liliáceae D.C.

Цвѣты 6-ные, состоятъ изъ 2 вѣнцовъ по 3 листочка въ каждомъ; околоцвѣтникъ лепестковидный, окрашенный, съ свободными или

у основанія сросшимися листками; тычинокъ 6; завязь верхняя, 3-гнѣздная; столбикъ одинъ, рыльце треугольное или 3-лопастное, иногда рыльце сидячее; коробочка раскрывается по створкамъ; гнѣзда многосѣмнные; многолѣтнія растенія съ луковицами; цвѣточный стебель верхушечный; листья мясистые.

1. У основанія на внутренней сторонѣ листочковъ околоцвѣтника находится медовая углубленія; стебель покрытъ листьями или листья только близъ цвѣтовъ. 2.

Медовыхъ углубленій на листочкахъ околоцвѣтника нѣтъ; цвѣточная стрѣлка безлистная или листья только въ нижней части стебля. 4.

2. Пыльники прикрѣплены къ нитямъ спивкой, колеблющіеся.

Lilium.

Пыльники прикрѣплены къ нитямъ концомъ. 3.

3. Цвѣты маленькіе; околоцвѣтникъ раскрытый, съ внутренней стороны желтый, снаружн зеленый.

Gagea.

Цвѣты крупныя, колокольчатые, не желтыя. *Fritillaria.*

4. Цвѣты одиночныя, желтыя, на стрѣлкѣ; пыльники прикрѣплены къ нитямъ концомъ.

Tulipa.

Цвѣты въ ложныхъ головчатыхъ зонтикахъ или въ кистяхъ, не желтыя; пыльники прикрѣплены къ нитямъ спивкой. 5.

5. Цвѣты голубыя, въ 2—5-цвѣтковыхъ кистяхъ. *Scilla.*

Цвѣты другой окраски, въ многоцвѣтковыхъ ложныхъ зонтикахъ, иногда въ ложныхъ головкахъ. *Allium.*

77. *Gagea Salisb.*

Околоцвѣтникъ 6-листный, вполне раскрытый, по отцвѣтаніи вмѣстѣ съ тычинками остается при плодѣ; у основанія каждого листочка околоцвѣтника находится медовая ямочка; тычинки шпловидныя, съ пыльниками, прикрѣпленными къ нитямъ концомъ; столбикъ 3-гранный; рыльце слабо-3-лопастное; коробочка 3-гранная, 3-гнѣздная; сѣмена округлыя, слегка сплюснутыя, свѣтло-сѣро-бурыя.

1. Листочки околоцвѣтника линейно-ланцетные, заостренные; луковица состоитъ изъ 2 луковичекъ, между которыми выходитъ цвѣточный стебель; одна изъ луковичекъ очень маленькая.

G. minima Schult.

Листочки околоцвѣтника продолговатыя, туповатыя; луковица простая. 2.

2. Корневой листъ широколинейный, до 1 см. шир.; листочки околоцвѣтника не сужены къ основанію; пыльники эллиптическіе.

G. lutea Schult.

Корневой листъ линейный, не шире 4 мм., обыкновенно уже; листочки околоцвѣтника къ основанію сужены; пыльники округлыя.

G. erubescens Schult.

224. *G. lútea* Schult. Пет. Кр. III, стр. 71.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 190.—
Кауф. II, № 751.—Цип., № 1438.—Кауф. I, стр. 498.—
Lind., p. 168.—Ann. C. V, № 68.

Ornithogalum silvaticum Pers. Дв., № 344.—Макс., № 343.—Hoff. II, № 2727.—
Gold. C., p. 19.—Gold. Sp., 125.—Mart., p. 60.—
Hoff., № 2263.

Ornithogalum luteum L. Lib. Tr., p. 110.—St. II, p. 21.—St. I, № 220.

Луковица яйцевидная, съ 1 стеблемъ и 1 корневымъ листомъ, широко-линейнымъ, до 1 см. шир., плоскимъ, стянутымъ на верхуникѣ колпачкомъ; стебель слабо-4-гранный, голый, 15—20 см.; цвѣты желтые, на длинныхъ голыхъ цвѣтоножкахъ, въ количествѣ 2—7, собраны полузонтикомъ и окружены 3 прицвѣтными листьями. Изъ которыхъ нижній самый круп-



Gagea lutea.



Gagea erubescens.

ный, длиннѣе соцвѣтія, а послѣдній короткій, линейный, всѣ по краямъ б. или м. съ волосками; листочки околоцвѣтника тупые, не сужены къ основанію, 1—2 см. дл.; пыльники эллиптическіе; коробочка яйцевидная. Цвѣты съ конца апрѣля до середины мая. На перегнойной почвѣ по лѣсамъ и паркамъ, часто.

225. *G. erubescens* Schult. Пет. Кр. III, стр. 70.

Gagea pusilla Schult. Пет., стр. 190.—Кауф. II, № 750.—Цип., № 1439.—Кауф.,
I, стр. 497.—Lind., p. 170.

Оболочка луковицы почти цѣльная, бурая, кожистая; стебель одинъ, съ продольными линиями, 10—20 см.; корневой листъ одинъ, узко-линейный, желобчатый, 1—4 мм. шир.; цвѣты собраны полузонтикомъ, у основанія котораго сидятъ 3 стеблевыхъ листа; между нижнимъ стеблевымъ и слѣдующимъ находится короткое стеблевое колѣно; цвѣты въ числѣ 1—18, на длинныхъ цвѣтоножкахъ, послѣ цвѣтенія поникающихъ; листочки околоцвѣтника къ основанію сужены, съ наружной стороны буровато-красноватые, какъ и основаніе стебли и листья; пыльники округ-
лые. Цвѣты съ конца апрѣля до середины мая, плоды со середины мая.

иногда второе цвѣтеніе во $\frac{2}{2}$ августа. По опушкамъ и на паровыхъ поляхъ. Флп., Кунцово (К.). — Тюфелева роща за Симоновымъ монастыремъ, Три горы (Гольдб.). — Воробьевы горы, Всесвятское; островъ на Окѣ противъ Бачманова, Клм. у. (П.). — Дужки. Зпброво. Никифорово. Срп. у., Карапчеево, Бачманово, Клм. у. (П. и С.).

226. *G. minima* Schult. Пет. Кр. III, стр. 69. — Бух. II, № 411. — Бух. I, № 382. — F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 190. — Кауф. II, № 749. — Цип., № 1440. — Кауф. I, стр. 496. — Lind., p. 170.

Ornithogalum minimum L. Дв., № 347. — Макс., № 345. — Gold. C., p. 19. — Hoff., № 2264. — St. II, p. 21. — St. I, № 221.

Ornithogalum spathaceum W. Дв., № 346. — Hoff. II., № 2725. — Mart., p. 60.



Gagea minima.

Двѣ луковички, изъ коихъ одна очень маленькая, заключены въ общую оболочку; стебель выходитъ между 2 луковичекъ, 7—18 см., голый; корневой листъ 1, линейный, 2—3 мм. шир., плоскій или слегка желобчатый, со спинки выпуклый; стеблевой листъ одинъ, у основанія стеблеобъемлющій, ланцетный, до 8 мм. шир.; остальные листья въ видѣ прицвѣтничковъ, линейные; цвѣты желтые, въ полузонтикѣ, на длинныхъ, голыхъ, иногда вильчатыхъ цвѣтоножкахъ; листочки околоцвѣтника линейно-ланцетные, заостренные; пыльники эллиптическіе или округло-овальные; коробочка обратно-овальная. Цвѣты съ конца апрѣля до середины мая, плоды со середины мая, иногда второе цвѣтеніе во $\frac{2}{2}$ августа. По садамъ, паркамъ и тѣнистымъ мѣстамъ, рѣже на паровыхъ поляхъ. Симоновъ монастырь, Воробьевы горы; Игнатьево, Клм. у. (П.). — Кунцово — Проклятое мѣсто, Пятницкое кладбище (С.). — Михайловское, Пдл. у. (Б.).

78. *Allium* L.

(Околоцвѣтникъ 6-лепестковый, съ свободными или сросшимися только у основанія листками, цвѣты собраны въ ложный зонтикъ, иногда въ ложную шаровидную головку съ 2-листной оберткою, облекающей зонтикъ до его распусканія; околоцвѣтникъ остающійся; тычинокъ 6, съ нптями, кверху расширяющимися, часто основаніемъ сросшимися и прикрытымъ къ нижней части листочковъ околоцвѣтника; иногда у основанія каждой нити съ обѣихъ сторонъ находятся по 6. или м. длинному зубцу; столбикъ вѣдренъ въ середину 3-гнѣздной завязи, нитевидный, остающійся по вскрытіи коробочки; сѣмена гранистыя, черныя, немногочисленныя въ каждомъ гнѣздѣ.

1. Нижняя часть стрѣлки сильно вздутая.

A. Cera L.

Стрѣлка не вздутая. 2.

2. Соцвѣтіе съ луковичками. 3.

Соцвѣтіе безъ луковичекъ, съ одними цвѣтами. 4.

3. Чехоль соцвѣтія 1-лиственный, вытянутъ въ длинный рожокъ; тычиночныя нити съ зубцами. *A. salivum* L.

Чехоль 2-лиственный; тычиночныя нити безъ зубцовъ.

A. oleraceum L.

4. Тычиночныя нити безъ зубцовъ. 5.

Тычиночныя нити съ зубцами. 6.

5. Стрѣлка въ верхней части съ острыми углами; луковицы сидятъ на горизонтальномъ корневищѣ. *A. angulosum* L.

Стрѣлка въ верхней части цилиндрическая; луковицы сидятъ пучкомъ, но безъ корневища. *A. Schoenoprasum* L.

6. Листья узко-линейные; чехоль короткій. 2-лиственный; цвѣты пурпуровые; тычинки короче околоцвѣтника. *A. rotundum* L.

Листья широкіе, плоскіе; чехоль длиннѣе зонтика, съ рожкомъ, 1-лиственный; цвѣты розовые; тычинки длиннѣе околоцвѣтника.

A. Porrum L.

227. **A. Schoenoprasum** L. Пет. Кр. III, стр. 74.—Пет., стр. 133.—Кауф. II, № 756.—Гор., № 82.—Цин., № 1455.—Кауф. I, стр. 502.—Дв., № 343.—Макс., № 338.—Mart., p. 60.—St. II, p. 21.—St. I, № 219.—Pal., № 654.

Луковички продолговатыя, бѣлыя или свѣтло-коричневыя, собраны пучкомъ; стрѣлки цилиндрическія, полныя 15—50 см., къ верхушкѣ становятся тоньше; листья почти цилиндрическіе, полые, иногда слегка сплюснутые; стеблевые—съ очень длинными влагалищами; зонтикъ полушаровидный, иногда почти шаровидный; чехоль почти равенъ зонтику, 2-лиственный; цвѣтоножки короче цвѣтовъ; листочки околоцвѣтника ланцетные, заостренные, розовые или лилово-розовые, съ темной или зеленой жилкой на спинкѣ; тычиночныя нити безъ придатковъ, короче околоцвѣтника. Цвѣты съ конца мая до середины іюня, зрѣлыя сѣмена около половины іюля. Кусково (Кл.).—Около Петровскаго (Мар.).—На лугу за дачей Дмитріева (Дв.).—Бѣлые Колодези, Горы по известнякамъ и по берегу Оки, Клм. у. (Эск. Бот. Лаб.).



Allium Schoenoprasum.

- * **A. Séra** L. Пет. Кр. III, стр. 74.—Пет., стр. 133.—Кауф. II, стр. 519.—Кауф. I, стр. 502.—St. II, p. 21.—Pal., № 656.

Луковица приплюснуто-шаровидная, наружныя чешуи ея ярко-золотисто-коричневаго цвѣта; стрѣлка достигаетъ 80 см., нѣсколько ниже середины сильно вздутая, полая; листья полые, цилиндрическіе, сизо-зеленые, у основанія нѣсколько желобчатые, съ влагалищами; соцвѣтіе шаровидное; цвѣты въ нѣсколько разъ короче цвѣтоножекъ; листочки околоцвѣт-

ника бѣлые, съ зеленой жилкой на спинкѣ; тычиночныя нити нѣсколько длиннѣе околоцвѣтника. такъ что пыльники выдаются; внутреннія ты-



Allium Cepa.



Allium angulosum.

чинки къ основанію расширены и снабжены 2 маленькими зубцами. Цвѣты въ августѣ. Разводится.

228. *A. angulosum* L. Пет. Кр. III, стр. 72.—Пет., стр. 133.—Кауф. II, № 753.—Мил., № 34.—Цин., № 1466.—Рупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 500.

Allium senescens L. Макс., № 341.

Allium acutangulum Schrad.

Луковица продолговатая, мало вздутая, сидитъ на горизонтальномъ, довольно толстомъ корневищѣ; листья линейные, на концѣ плоскіе, у основанія 3-гранные, на спинкѣ съ килемъ; первый корневой листъ съ широкимъ трубчатымъ влагалищемъ; цвѣточная стрѣлка до 50 см., б. ч. превышаетъ листья, близъ верхушки съ острыми ребрами; зонтикъ густой, съ 2—3-раздѣльнымъ чехломъ; доли чехла не заостренныя, вдвое короче цвѣтоножекъ; листочки околоцвѣтника продолговато-ланцетные; слегка заостренные, розовые, въ 3 раза короче цвѣтоножекъ; тычинки равны или короче околоцвѣтника. Цвѣты съ конца мая до конца іюня. По сырымъ заливнымъ лугамъ. Перово (Ключикъ); Мячково, Бри. у. (К.).—Верхніе Котлы (Ш).—Подъ Кревякинымъ, Кал. у., Никифорово, Сри. у., Губино, Бри. у. (П.).—Серебряный боръ близъ Хорошова; Лужки, Сри. у. (П. и С.).—Быково, Бри. у. (Куль).

* *A. sativum* L. Пет. Кр. III, стр. 74.—Пет., стр. 133.—Кауф. II, стр. 518.—Цин., стр. 433.—Кауф. I, стр. 500.—St. II, p. 20.

Луковица состоитъ изъ нѣсколькихъ луковичекъ, заключенныхъ въ одну общую оболочку; стрѣлка цилиндрическая, 30—90 см., верхушка ея до цвѣтенія иногда завернута кольцомъ; листья линейные, плоскіе, заостренные, съ влагалищами, съ нижней стороны съ килемъ; соцвѣтіе со-

стоит почти изъ однихъ луковичекъ и малаго количества цвѣтовъ на длинныхъ цвѣтоножкахъ; листочки околоцвѣтника грязно-бѣлые или блѣдно-розовые, съ жилкой на спинкѣ; тычиночныя нити короче околоцвѣт-



Allium sativum.



Allium Porrum.



Allium rotundum.

ника; внутреннія тычинки по бокамъ съ зубцами; чехоль 1-листный, вытянутый въ длинный рожокъ, опадающій. Цвѣты въ августѣ. Разводится.

* **A. Pórrum L.** Пет. Кр. III, стр. 74. — Пет., стр. 133. — St. II, p. 20. — Pal., № 646.

Луковица шаровидная, немного толще выходящаго изъ нея стебля, достигающаго 1 метра; листья широкіе, линейные, плоскіе, заостренные, съ нижней стороны съ килемъ и съ длинными влагалищами, покрывающими стебель до половины; соцвѣтіе почти шаровидное; чехоль съ длиннымъ рожкомъ, длиннѣ зонтика; околоцвѣтникъ розовый, короче тычинокъ; верхняя часть тычинокъ въ 2 раза короче широкой нижней; листочки околоцвѣтника на спинкѣ шероховатые. Цвѣты съ конца августа до середины сентября. Разводится.

229. **A. rotúndum L.** Пет. Кр. III, стр. 73. — Бух. II, № 412. — Пет., стр. 133. — Кауф. II, № 754. — Цин., № 1452. — Рувр., стр. 88. — Кауф. I, стр. 501. — Дв., № 339. — Макс., № 342. — Hoff. II, № 2660. — Gold. C., p. 19. — Mart., p. 59.

Allium vineale L. Дв., № 341. — Макс., № 339. — Mart., p. 59. — St. II, p. 21. — St. I, № 217. — Pal., № 648.

Луковица яйцевидно-шаровидная, несетъ между бѣлыми перепончатыми чешуями маленькія красноватыя луковички на длинныхъ нитевидныхъ ножкахъ; стрѣлка цилиндрическая, 30—75 см., только въ нижней трети съ листьями; листья узко-линейные, плоскіе или слегка желобчатые, заостренные; зонтикъ почти шаровидный, съ чехлемъ изъ 2 коротко-заостренныхъ листковъ; внутреннія цвѣтоножки длиннѣ наружныхъ; листочки околоцвѣтника пурпуровые, съ зеленоватою или темно-пурпуровою срединною жилкой, на спинкѣ шероховатые; 3 внутреннія тычинки

съ крыловидными придатками, переходящими въ нитевидные зубцы, которые выдаются изъ околоцвѣтника; тычинки короче околоцвѣтника. Цвѣты съ конца іюня весь іюль. По сухимъ лугамъ и посѣвамъ. Тушино, Спасское, Петрово; Архангельское, Звн. у., Невѣрово, Кзм. у., Луж-кл, Срп. у. (К.) — Токарево, Куяцово (Мар.).—Сѣкпринно, Пдл. у. (Б.).—Дракино, Срп., у. (С.).—Бѣлые Колодези, Кзм. у. Карапчеево. Кзм. у., Клычево, Кзм. у. (П.).

230. *A. oleraceum* L. Пет. Кр. III, стр. 72.—Ф. Б., № 105.—Пет., стр. 133.—Кауф. II, № 755.—Цив., № 1459.—Кауф. I, стр. 501.—Дв., № 342.—Макс., № 337.—Mart., p. 59.—St. II, p. 21.—St. I, № 218.—Pal., № 649.

Allium carinatum Poll., non L. Дв., № 340.—Макс., № 340.—Gold. C., p. 19.—Gold. Sp., p. 125.—Mart., p. 59.—St. II, p. 21.

Луковица яйцевидная, съ бѣлыми, пленчатыми чешуями; стрѣлка цилиндрическая, 30—75 см., до половины покрыта листьями; листья линейные, плоскіе или съ верхней стороны желобчатые, съ нижней стороны бороздчатые, у основанія полуцилиндрическіе; зонтикъ съ луковичками и съ 2-листнымъ чехломъ, одинъ листъ котораго длинно-заостренный длиннѣе зонтика; цвѣты часто поникающіе, на очень длинныхъ цвѣтоножкахъ; листочки околоцвѣтника тупые, зеленоватые, съ зеленой жилкой на спинкѣ, иногда околоцвѣтникъ грязно-розовый, послѣ сушки розовый, съ темно-розовой жилкой; тычиночныя нити равны или короче околоцвѣтника. Цвѣты съ конца іюня весь іюль. По сухимъ лугамъ и посѣвамъ. Спасское, Воробьевы горы, Семеновское, Подольскъ (К.).—Гаврилово (Г. С.)—Дракино, Срп. у., Быково, Брн. у. (С.).—Б. Алексѣевское на р. Сѣверкѣ, Кзм. у., Карапчеево, Кзм. у., Бѣлые Колодези, Кзм. у. (П.).—Татарово (А. Ассы). —Райки, Бгр. у. (П.).—На р. Протвѣ близъ Стреева (Ф. Б.).



Allium oleraceum.

79. *Lilium* L.

Околоцвѣтникъ 6-листный, крупный, ярко окрашенный, опадающій, съ отогнутыми и закругленными листками и медовыми ямочками въ видѣ продолговатыхъ бороздокъ; пыльники прикрѣплены спинкой къ длиннымъ нитямъ, колеблющіеся; столбикъ изогнутый, къверху слегка утолщенный, съ 3-лопастнымъ рыльцемъ; коробочка тупо-6-гранная, 3-гнѣздная; сѣмена сплюснутыя, блѣдныя.

231. *L. Mártagon* L. Пет. Кр. III, стр. 68.—Бух. II, стр. 40.—Ф. Б., № 104.—Г. О., № 7, p. 102.—Пет., стр. 213.—Кауф. II, № 748.—Гор., № 81.—Цив., № 1445.—Кауф. I, стр. 496.—Borg., p. 700.—Макс., № 348.—Hoff. H., № 1909.—St. II, p. 21.—Pal., № 663.

Луковица желтая, состоитъ изъ черепичато одна на другой лежащихъ мясистыхъ чешуекъ; стебель 30—80 см., въ верхней части перѣдко шершаво-пушистый и близъ цвѣтовъ пурпурово-красчатый; листья широко-ланцетные или эллиптическо-ланцетные, заостренные, на короткихъ черешкахъ. нижнiе—въ мутовкахъ по 5—8, верхнiе—очередные, много мельче нижнихъ; всѣ съ нижней стороны съ сильно выдающимися продольными жилками и по краямъ шероховато-пушистыя; цвѣты въ 3—15-цвѣтковой конечной кисти; цвѣтоножки дугообразно отогнуты книзу; листочки околоцвѣтника дугообразно отогнуты къ цвѣтоножкѣ, грязно-красноватые съ темными крапинками; пыльники и рыльце буро-пурпуровые. Разводится по садамъ и иногда встрѣчается въ одичаломъ видѣ. Троекурово близъ парка (Г. О.).—Наркѣ въ Циплинѣ, Мож. у. (Ф. О.).—Наркѣ въ Порѣчѣ, Мож. у. (Ф. Б. и Ф. О.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Близъ села Екатериновскаго, Звн. у. (Дуб.).

80. *Fritillaria* L.

Околоцвѣтникъ колокольчатый, опадающiй, 6-листный, у основанiя каждого листочка околоцвѣтника находится продолговатая медовая ямочка; тычинокъ 6, съ пыльниками, прикрѣпленными къ нитямъ концомъ; стол-



Lilium Martagon.



Fritillaria ruthénica.

бикъ нитевидный, съ 3 линейными рыльцами; коробочка яйцевидная, гранистая, 3-гнѣздная; сѣмена сплюснутыя, блѣдно-окрашенныя; луковица состоитъ 6. ч. изъ 2 мясистыхъ чешуй.

232. *F. ruthénica* Wickstr. Пет. Кр. III, стр. 68.—Пет., стр. 190.—Кауф. II, № 747.—Цип., № 1444.—Гор., № 79.—Кауф. I, стр. 495.

Луковица состоитъ изъ 2 мясистыхъ чешуй, сросшихся только у основанiя, съ пазушными луковичками; стебель прямостоящiй, 15—70 см.; нижнiе листья мутовчатые или супротивные, узко-линейные, заостренные; среднiе—очередные; верхнiе—мутовчатые, почти нитевидные, съ очень тон-

кой верхушкой, свернутой спиралью, наподобіе усика; если цвѣтокъ одинъ, то конечный, если ихъ болѣе (2—4), то нижніе — пазушные на короткихъ, отогнутыхъ цвѣтоножкахъ; околоцвѣтникъ снаружи черно-пурпуровый съ болѣе темными жилками, внутри съ неясными желтыми пятнами, расположенными въ шахматномъ порядкѣ; столбикъ съ 3-лопастнымъ рыльцемъ; коробочка на отклоненной ножкѣ, крылато-6-гранная, сверху притупленная. Цвѣты иногда съ конца апрѣля до $\frac{1}{2}$ мая, плоды во $\frac{2}{2}$ мая. По заливымъ лугамъ Оки на песчано-перегнойной почвѣ. Въ Срп. у., начиная съ Лужковъ, Зиброво, Никифорово, Прилуки, до устья р. Лопасни.


81. *Túlipa* L.

Околоцвѣтникъ колокольчатый, 6-листный, крупный, опадающій. безъ медовыхъ ямочекъ у основанія; тычинокъ 6 съ почти шпоровидными нитями и пыльниками, прикрѣпленными концомъ; столбика нѣтъ или почти нѣтъ; рыльце 3-лопастное, сидячее; коробочка 3-гранная, 3-гнѣздная; сѣмена сплюснутыя, съ боковъ плоскія, съ блѣдно-окрашенной кожурой.

233. **T. Biebersteiniána R. et Sch.** Пет. Кр. III, стр. 69.

Tulipa silvestris L. Пет., стр. 295.—Кауф. II, стр. 513.—Гор., № 80.—Кауф. I, стр. 496.—Дв., № 353.

Стебель 15—40 см., несетъ 2 листа, рѣже болѣе; листья линейные или линейно-ланцетные, желобчатые, верхушка ихъ туповатая; все растеніе сизо-зеленое; цвѣтокъ до распусканія поникшій, желтый, 2—3 см. дл.; листочки околоцвѣтника заостренные, внутренніе—у основанія съ наружной стороны пушистые; наружные—съ наружной стороны часто зеленоватые или слегка фіолетовые; тычиночные нити у основанія пушистыя, въ 2—4 раза длиннѣе овальныхъ пыльниковъ; коробочка продолговатая, остроконечная, въ 2—3 раза длиннѣе ширины. Цвѣты въ первыхъ числахъ мая, плоды во $\frac{2}{2}$ мая. Между Никифоровымъ и устьемъ Лопасни, Срп. у. (Экск. Бот. Лаб.).—Между Лужками и Зибровымъ на опушкѣ лѣса, Срп. у. (П. и С.).



Tulipa Biebersteiniána.

82. *Scilla* L.

Околоцвѣтникъ вполне открытый, рѣже слегка колокольчатый, опадающій; тычинокъ 6, основаніе нитей слегка расширено и прикрѣплено къ основанію листочковъ околоцвѣтника; столбикъ 3-гранный; коробочка 3-гранная, 3-гнѣздная; сѣмена почти круглыя или продолговатыя, черно-бурая.

234. **S. cérnua Red.** Пет., стр. 271.—Кауф. II, № 752.—Цин., № 1448.—Кауф. I, стр. 499.—Gold. Sp., p. 125.

Луковица даетъ 2—4 широко-линейныхъ листа въ 1—2 см. шир., на верхушкѣ островатыхъ, стиснутыхъ колпачкомъ; цвѣточные стрѣлки до 20 см., граннестыя, сплюснутыя, несутъ 1—4 поникающихъ цвѣтка; цвѣты лазоревые, съ пріятнымъ запахомъ; цвѣтоножки равны $\frac{1}{2}$ поперечника цвѣтка или еще короче; прицвѣтники очень короткіе, пленчатые; пыльники синіе; стрѣлки и листья послѣ цвѣтенія ложатся на землю; коробочка почти шарообразная; сѣмена безъ придатковъ. Цвѣты съ конца апрѣля, зрѣлыя сѣмена со середины іюня. По садамъ и паркамъ, одичалое.



Scilla cernua

22. сем. Asparagéae Juss.

Цвѣты 6-раздѣльные, рѣдко 4—5-раздѣльные; околоцвѣтникъ б. ч. лепестковидный, сросшійся въ трубку, колокольчатый или свободно-лепестный; тычинокъ 6 или столько, сколько частей околоцвѣтника; завязь верхняя; столбикъ б. ч. длинный, съ треугольными или лопастными рыльцами (у *Paris* рылецъ столько, сколько частей околоцвѣтника); плодъ—ягода 3-гнѣздная; многолѣтнія растенія съ толстымъ мясистымъ горизонтальнымъ корневищемъ и широкими очередными или мутовчатыми листьями, иногда листья бываютъ очень маленькіе, чешуевидные, тогда вѣтви развиваются наподобіе листьевъ.

1. Листьевъ 4—5 въ мутовкѣ близъ верхушки стебля. *Paris*.
Листьевъ 2—3 не въ мутовкѣ, или весь стебель покрытъ листьями. 2.
2. Околоцвѣтникъ 4-раздѣльный. *Majanthemum*.
Околоцвѣтникъ 6-раздѣльный, трубчатый или колокольчатый, съ 6 зубцами. 3.
3. Стебель вѣтвистый, покрытъ чешуйчатыми листьями, въ пазухахъ которыхъ сидятъ укороченныя вѣточки въ видѣ пучковъ узкихъ нитевидныхъ листьевъ. *Asparagus*.
Стебель простой, листья широкіе. 4.
4. Околоцвѣтникъ трубчатый; цвѣты сидятъ въ пазухахъ многихъ очередныхъ листьевъ, сверху покрывающихъ 2-ридно дугообразный стебель. *Polygonatum*.
Околоцвѣтникъ шаровидно-колокольчатый; цвѣты собраны въ безлистной кисти; листьевъ только 2, рѣдко 3 у основанія стебля. *Concallaria*.

83. Asparágus L.

Цвѣты, вслѣдствіе недоразвитія, однополые; въ мужскихъ находится недоразвитая завязь, въ женскихъ—недоразвитыя тычинки; околоцвѣтникъ колокольчатый, глубоко-6-раздѣльный, на отогнутой, сочлененной цвѣто-

ножки, опадающий; тычиночные нити шиловидные, прикреплены у основания листочков околоцветника; столбик короткий, съ 3-лопастным рыльцем; завязь 3-гнѣздная, съ 2 сѣмепочками въ каждомъ гнѣздѣ; плодъ—ягода; стебель покрытъ очень маленькими чешуйчатыми листьями, въ пазухахъ которыхъ сидятъ укороченныя вѣточки въ видѣ пучковъ узкихъ литевидныхъ листьевъ, именуемыхъ кладодіями.

235. *A. officinális* L. Пет. Кр. III, стр. 67.—Пет., стр. 141.—Кауф. II, № 746.—Цин., № 1474.—Рупр., стр. 86.—Кауф. I, стр. 494.—Дв., № 349.—Макс., № 333.—Хоф. Н., № 2757.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 61.—St. II, p. 21.—St. I, № 222.—Pall., № 690.

Корневище даетъ одинъ или нѣсколько прямостоящихъ стеблей, достигающихъ 1.5 метра; стебли очень вѣтвистые, покрыты сидящими чешуевидными листьями, основаніе которыхъ переходитъ въ маленькое отогнутое кнзку, крючковидное остріе; кладодіи по 6—9 въ пучкѣ; цвѣты колокольчатые, глубоко-6-раздѣльные, по 2, пазушные, желтоватые, съ зеленоватою полоской на спинкѣ у каждого листочка; мужскіе цвѣты вдвое крупнѣ женскихъ; тычиночные нити въ нихъ длиною равны пыльникамъ; плодъ шарообразный, лоснящийся, ярко-красный. Цвѣты съ конца мая, весь іюнь, иногда до начала іюля, плоды въ началѣ сентября. На песчаныхъ залпвныхъ лугахъ. Лужки, Серп. у. (К.).—Зиброво, Прилуки.



Asparagus officinális

84. *Majánthemum* Wigg.

У нашего растенія околоцвѣтникъ 4-листный, вполне раскрытый или съ отогнутыми назадъ листочками: 4 тычки прикреплены у основанія листочковъ околоцвѣтника; завязь 2-гнѣздная; столбикъ короткий, толстый; ягода 1—2-сѣменная.

236. *M. bifólium* D.C. Пет. Кр. III, стр. 67.—Бух. II, № 407.—Бух. I, № 378.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 220.—Кауф. II, № 742.—Цин., № 1433.—Кауф. I, стр. 493.—Ann. C. II, № 159.—Дв., № 173.—Макс., № 164.—Mart., p. 30.—Ad., p. 82.
Convallaria bifolia L. Хоф. Н., № 2765.—Gold. C., p. 19.—St. II, p. 22.—St. I, № 226.
Smilacina bifolia Desf. Lind., p. 168.

Корневище тонкое, ползучее, съ побѣгами; стебель прямостоящій, 8—20 см., ребристый, у основанія съ 2—3 пленчатыми влагалищами: два стеблевыхъ листа на короткихъ черешкахъ, глубоко-сердцевидно-яйцевидные, заостренные, сверху голые, снизу, какъ и цвѣтоносъ, коротко-пушистые; цвѣты пахучіе, въ яйцевидно-продолговатой или почти цилиндрической чашечкѣ; околоцвѣтникъ 4-листный, съ отогнутыми листочками; 4 тычки прикреплены у основанія листочковъ околоцвѣтника; завязь 2-гнѣздная; столбикъ короткий, толстый; ягода 1—2-сѣменная.

дрической густой кисти; цветоножки длинные, у основанія съ очень маленькими перепончатыми прицветниками; доли околоцветника тупыя;



Majanthemum bifolium



Polygonatum officinale

ягода сперва бѣловатая, потомъ пурпурово-розовая. Цвѣты съ конца мая до середины іюня, зрѣлые плоды съ конца августа. По лѣсамъ. очень часто.

85. Polygonatum Moench.

Околоцветникъ трубчатый, съ 6 отогнутыми зубцами; тычинки прикрѣплены къ срединѣ трубки околоцветника и заключены въ ней; завязь 3-гнѣздная съ 1—2 сѣмечками въ каждомъ гнѣздѣ; столбикъ нитевидный, съ 3-лопастнымъ рыльцемъ; плодъ—черная ягода.

237. *P. officinale* All. Пет. Кр. III, стр. 67. — Бух. II, № 409. — Бух. I, № 380. —
 F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 245. — Кауф. II, № 744. —
 Цян., № 1430. — Кауф. I, стр. 493. — Lind., p. 168.
Convallaria Polygonatum L., Дв., № 351. — Макс., № 335. — Hoff. H., № 2770. —
 Gold. C., p. 19. — Mart., p. 61. — Hoff., № 975. — St.
 II, 21. — St. I., № 224.

Корневище толстое, мясистое, горизонтальное; стебель прямостоящій или слегка дугообразный, ребристый, у основанія съ 1—3 перепончатыми листовыми влагалищами; листья только въ верхней половинѣ стебли, обращены въ одну сторону, сидячіе, полустеблеобъемлющіе, эллиптическіе, съ верхней стороны зеленые, съ нижней—сѣро-зеленые; все растеніе совершенно голое; цвѣты по 1—2 въ пазухахъ листьевъ, повислые; верхушки зубчиковъ околоцветника пушистыя; тычиночныя нити голыя; ягода шарообразная, синевато-черная. Цвѣты съ $2\frac{1}{2}$ мая и $1\frac{1}{2}$ іюня. По лѣсамъ и кустарникамъ. Лосинный Островъ, Давыдково, Иваньково (К.). — Петровское на Москвѣ рѣкѣ, Кузьминки, Косино; Петрово, Кам. у. (П.). — Михайловское, Пдл. у. (Б.). — Быково, Врн. у. (Куль.).

238. *P. multiflorum* All. Пет. Кр. III, стр. 67. — Бух. II, № 410. — Бух. I, № 381. — F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 245. — Кауф. II, № 745. — Цин., № 1431. — Кауф. I, стр. 494. — Lind., p. 168.

Convallaria multiflora L. Дв., № 352. — Макс., № 336. Hoff. H., № 2769. — Mart., p. 61. — Lib. Tr., p. 24. — St. II, 21. — St. I, № 225.

Корневище толстое, ползучее, горизонтальное; стебель высокий, цилиндрический, не ребристый, 30—70 см.; листья продолговато- или широко-эллиптические, сидячие, реже на коротких черешках, туповатые, сперва вверх торчащие, потом дугообразно-отогнутые, сверху темно-зеленые, снизу сѣро-зеленые; цвѣты повислые, въ пазухахъ листьевъ по 2—5; верхушка зубчиковъ околоцвѣтника и тычиночныя нити пушистыя;



Polygonatum multiflorum.



Convallaria majalis.

околоцвѣтникъ у основанія вздутый; ягода шарообразная, сперва красноватая, потомъ зеленовато- или синеовато-черная. Цвѣты съ конца мая и $\frac{1}{2}$ июня, плоды въ августѣ. По гористымъ лѣснымъ мѣстамъ, реже по кустарникамъ. Воробьевы горы, Раменки, Мос. у., Подольскъ (К.). — Грачевники. Пдл. у. (Б.). — Петровское на Москвѣ рѣкѣ, Ромашково; Григоро-во. Вер. у. (П.). — Боровскій курганъ, Бри. у. (С.). — Дарьино, Зви. у. (Х.).

86. *Convallaria* L.

Околоцвѣтникъ шаровидно-колокольчатый, съ 6 отогнутыми зубцами; завязь 3-гнѣздная; столбикъ короткій, толстый, съ треугольнымъ рыльцемъ; 6 тычинокъ прикрѣплены у основанія околоцвѣтника.

239. *C. majalis* L. Бух. II, № 408. — Бух. I, № 379. — F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 170. — Кауф. II, № 743. — Цин., № 1432. — Pinz., p. 19. — Кауф. I, стр. 433. — Lind., p. 168. — Ann. C. II, № 158. — Дв., № 350. — Макс., № 334. — Hoff. H., № 2768. — Gold. C., p. 19. — Mart., p. 61. — Hoff., № 973. — St. II, p. 21. — St. I, № 223.

Корневище тонкое, горизонтальное или несколько косое, съ многочисленными, вѣтвистыми корнями; листья только корневые, эллиптические, къ обоимъ концамъ заостренные, переходить въ черешокъ, основаніе ихъ заключено въ 3—4 перепончатый влагалища; цвѣточная кисть на длинномъ цвѣтоносѣ, однобокая, состоитъ изъ 6—20 бѣлыхъ, сильно пахучихъ цвѣтовъ; цвѣтоножки длиннѣ пленчатыхъ прицвѣтниковъ; плодъ—ярко-красная, шаровидная ягода. Цвѣты съ $\frac{2}{2}$ мая и $\frac{1}{2}$ іюня, плоды съ конца августа. По лѣсамъ и кустарникамъ, очень часто.

87. *Páris* L.

Околоцвѣтникъ остающійся, 8-лиственный, состоитъ изъ 4 желтыхъ внутреннихъ и 4 зеленыхъ и болѣе широкихъ наружныхъ листочковъ; тычинокъ 8, прикрѣпленныхъ у самого основанія листочковъ околоцвѣтника; связникъ тычинокъ продолженъ въ длинное остроконечіе; завязь 4-гнѣздная; 4 столѣнка, внизу сросшіеся (рѣдко околоцвѣтникъ 10-лиственный, тогда тычинокъ 10, рылецъ 5 и завязь 5-гнѣздная).

240. *P. quadrifolia* L. Пет. Кр. III, стр. 67.—Бух. II, № 406.—Бух. I, № 377.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 235.—Кауф. II, № 741.—Цин., № 1429.—Pinz., p. 19.—Кауф. I, стр. 492.—Lind., p. 168.—Ann. C. III, № 261.—Дв., № 409.—Макс. № 386.—Hoff. H., № 3046.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 73.—Lib. Tr., p. 114.—Hoff. H., № 2327.—St. II, p. 24.—St. I, № 274.—Pal., № 203.

Корневище тонкое, горизонтальное, ползучее; стебель прямостоящій, съ продольными линиями близъ верхушки, у основанія съ перепончатыми влагалищами, несетъ 4-листную мутовку; листья на очень короткихъ черешкахъ, обратно-яйцевидные или эллиптические, коротко-заостренные, съ 3 толстыми, простыми и между ними тонкими, развѣвленными жилками; цвѣтокъ 1, на ребристой цвѣтоножкѣ, выходящей изъ мутовки листьевъ; 4 наружныя доли околоцвѣтника ланцетныя, зеленныя, 4 внутреннія—линейныя, желтоватыя; завязь фиолетовая; ягода черная, съ синеватымъ налетомъ, очень ядовитая (форма съ 5 листьями и 10 долями околоцвѣтника: *P. quinquefolia* Mart.). Въ Мытищахъ мною найдено съ 6 листьями и 8 долями околоцвѣтника. Цвѣты со середины мая и $\frac{1}{2}$ іюня, зрѣлые плоды въ концѣ августа. По лѣсамъ. Воробьевы горы, Царицыно, Лизаветино, Пушкино (К.).—Б. Мытищи—Лосинный Островъ (С.).—Сokolники (П.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).



Paris quadrifolia.

23 сем. Iridáceae Juss.

Цвѣты обоеполые; завязь нижняя; околоцвѣтникъ нѣжный, лепестковидный, правильный или слегка неправильный, вытянутъ въ 6. или м. длинную трубку, 6-раздѣльный, по 3 листочка въ каждомъ вѣнцѣ; 3 тычинки прикрѣплены къ основанію наружныхъ листочковъ околоцвѣтника; пыльники вскрываются наружу; завязь 3-гнѣздная съ 1 столбикомъ и 3, часто лепестковидными рыльцами: коробочка 3-гнѣздная, 3-створчатая; сѣмена сплюснутыя, съ бѣлкомъ и маленькимъ зародышемъ.

88. *Iris* L.

Околоцвѣтникъ правильный, 6-листный, съ длинной трубкой; 3 наружныя доли околоцвѣтника б. ч. отогнуты дугообразно книзу, очень крупныя; 3 внутреннія—менѣ крупныя, торчатъ вверхъ и б. ч. сходятся своими верхушками; всѣ доли у основанія сужены въ ноготокъ; столбикъ 3-раздѣльный, нижняя его часть короткая, 3-гранная, доли его лепестковидныя, слегка отогнуты кнаружи, на спинкѣ съ килемъ, по внутренней сторонѣ желобчатая, къ желобку прижаты тычинки, верхушки долей столбика кончаются 2-лопастными рыльцами; сѣмена сплюснутыя, гранистыя, но не крылатыя; растеніе съ толстымъ, мясистымъ, часто вѣтвистымъ корневищемъ.

241. *I. Pseudacorus* L. Пет. Кр. III, стр. 62.—Бух. II, № 399.—Ф. Б., № 100.—Бух. I, № 370.—Пет., стр. 205.—Кауф. II, № 728.—Цин., № 1421.—Кауф. I, стр. 484.—Lind., p. 168.—Дв., № 49.—Макс., № 47.—Hoff. H., № 420.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 9.—Hoff., № 1760.—Ad., p. 19.—St. II, p. 6.—St. I, № 25.—Pal., № 109.

Iris paludosa. Mart., p. 9.

Корневище толстое, ползучее, цилиндрическое, слегка членистое; стебель прямостоящій, достигаетъ 1 метра, въ верхней части вѣтвистый, не полый; листья мечевидныя, широко-линейно-ланцетныя, заостренныя, съ тонкими продольными жилками, спзо-зеленыя, нижніе—почти достигаютъ верхушки стебля; цвѣты слабо-пахучіе, желтые, выходятъ изъ верхушечныхъ влагалищныхъ листьевъ; внутреннія доли околоцвѣтника едва выдаются, узкія, короче и уже рылецъ, наклоненныхъ къ наружнымъ долямъ; лопасти рылецъ острыя; наружныя доли околоцвѣтника крупныя, обратно-овальныя, съ оранжевымъ пятномъ; трубка околоцвѣтника вдвое короче завязи; коробочка 3-гранная, продолговатая, кончается остріемъ. Цвѣты со середины мая до середины іюня. По берегамъ прудовъ, рѣкъ, по канavamъ и болотамъ. Кунцово, Лужняки; Раменское,



Iris Pseudacorus.

Бри. у. (К.).—Люблино (Маев.).—Между Лужками и Зибровымъ. Сри. у. (С.).—Серебряный боръ близъ Хорошова; болото близъ Боровскаго кургана, Бри. у. (Н. и С.).—Въ Золотой Отокъ близъ д. Алексѣевки, Мож. у. (Ф. Б.).—Успенское, Зви. у. (Г. Г. Петровъ).—Михайловское. Пдл. у. (Б.).

242. *I. sibirica* L. Пет. Кр. III, стр. 62. — Ф. Б., № 101. — Пет., стр. 204. — Кауф. II, № 729. Мил., № 32. — Гор., № 45. — Цин., № 1420. — Рупр., стр. 86. — Кауф. I, стр. 484. — Borg., p. 700. — Дв., № 50. — Макс., № 48. — Hoff. II., № 424. — Mart, p. 9. — Hoff., № 1762. — Ad., p. 19. — St. II, p. 7. — St. I, № 26. — Pal., № 118.

Iris pratensis Lam. Дв., № 50. — Макс., № 48. — Mart., p. 9.

Корневище тонкое; стебель много выше листьевъ, 30—80 см., голый, у основанія съ бурыми волокнами отъ разрушившихся старыхъ листьевъ; листья корневые или только въ нижней части стебля, узко-линейные, съ тонкими продольными жилками, длинно-заостренные, спизовато-зеленые; цвѣты конечные, по 2—4, выходятъ изъ перепончатыхъ прицвѣтниковъ, синіе или слегка лиловато-синіе, съ темными, лиловыми жилками; трубка околоцвѣтника очень короткая; внутреннія доли его выдающіяся, широкія, длиннѣе и шире рылецъ, прижатыхъ къ наружнымъ долямъ; лопасти рылецъ тупыя; коробочка продолговатая или продолговато-овальная, тупая, безъ остроконечія. Цвѣты съ конца мая до конца іюня, плоды въ началѣ августа. По болотамъ и болотистымъ лугамъ. Близъ Лужковъ, Сри. у., Вуньково, Бгр. у. (К.).—Между Зибровымъ и Никифоровымъ, Сри. у. (Экс. Бот. Лаб.).—Между Кунцовымъ и Нѣмчиновскимъ постомъ (Г.).—Пушкино (Арманъ).—Мытищи—тѣсь между Рупосовымъ и Черкизовымъ (С.).—Знаменская, Мож. у. (Ф. О.).—С. Маланьино и Карженъ, Мож. у. (Ф. Б.).—Близъ ст. Бородино (Мос.).—Викторовка, Бгр. у. (Л. В. Лепешкина).—Близъ села Коренева, Мос. у. (Куль.).—Сѣтунь, на лугу (Гей.).—Собольки, Мож. у. (Мос.).



Iris sibirica.

89. *Gladiolus* L.

Околоцвѣтникъ слегка неправильный, 6-листный, съ неравными долями и короткой, согнутой трубкой; тычинки отогнуты къ верхней доли околоцвѣтника; пыльники у основанія слегка стрѣловидные; столбикъ длинный, нитевидный, съ 3 цѣльными, расширенными, почти лопастевидными рыльцами; сѣмена сплюснутыя, крылатыя; растений съ шаровиднымъ, сверху сплюснутыми клубнедуковницами, заключенными въ волокна отъ влагалищъ отмершихъ листьевъ.

243. *G. imbricatus* L. Пет. Кр. III, стр. 62. — Ф. Б., № 99. — Пет., стр. 195. — Кауф. II, № 727. — Гор., № 44. — Цин., № 1428. — Кауф. I, стр. 483. — Lind., p. 168. — Ann. C. V., № 67.

Gladiolus communis L. Дв., № 47.—Маке., № 46.—Mart., p. 9.—Hoff., № 1471.—
Ad., p. 17.—St. II, p. 6.

Gladiolus tenuis M. B. Дв., № 48.—Ad., p. 17.

Клубнелуковица въ оболочкѣ изъ тонкихъ параллельныхъ волоконъ; стебель прямостоящій, 30—50 см., у основанія съ 1—2 влагалищами; листья мечевидные, линейно-ланцетные, нижние—несколько туповатые, съ сильно выдающимися продольными жилками; колосъ однобокій, 4—12-цвѣтковый; прицвѣтники заостренные, травянистые, въ 2 раза короче цвѣтка; цвѣты розовые или малиновые; нижнія доли околоцвѣтника посрединѣ съ бѣлымъ пятномъ; пыльники короче нитей; рыльце рѣсниччатое, съ сосочками; коробочка обратно-яйцевидная, тупо-3-гранная, съ 3 не глубокими бороздками, книзу поперекъ морщинистая, сверху вдавленная; сѣмена широко-крылатая. Цвѣты со середины июня до середины июля, плоды съ $\frac{2}{3}$ августа. По сырымъ лугамъ и кустарникамъ. Влѣзъ Покровскаго—Фили (К.).—Давыдково (А.).—Между Ромашковымъ и Кунцовымъ (Н.).—Влѣзъ Звенигорода (Маев.).—С. Сурмино—по р. Камышевкѣ, Дмит. у., Матѣево, Звени. у.



Gladiolus imbricatus

(Н.).—Одинцово; между Тимоховымъ и Аляуховымъ, Звени. у. (С.).—Влѣзъ д. Соболевки, Мож. у. (Мос.).—Между д. Починки и с. Малянинымъ, Мож. у. (Ф. В.).—Иванино, Звени. у. (Г. С.).—Сѣтунь, на лугу (Гей.).

Порядокъ *Microspermae*.

24 сем. *Orchidaceae* Juss.

Околоцвѣтникъ неправильный, окрашенный, состоятъ изъ двухъ вѣнцовъ по 3 лепестка въ каждомъ: 3 лепестка наружнаго вѣнца и 2 внутренняго б. ч. одинаковой формы, часто образуютъ шлемъ, третій лепестокъ внутренняго вѣнца всегда особой формы—губа, б. ч. крупнѣе остальныхъ и основаніе его нерѣдко углублено и удлинено въ полый отростокъ—шпору; тычинки сидятъ на сторонѣ, противоположной губѣ; изъ 3 тычинокъ развивается только одна—средняя, боковыя же только зачаточныя—стаминодіи, рѣже развиваются двѣ боковыя, средняя же не развивается; тычиночныя нити срались со столбикомъ и образуютъ въ срединѣ цвѣтка столбецъ (*gynnostenium*); пыльники 2-гнѣздные; пыльца б. ч. склеена липкимъ веществомъ въ пыльцевую массу; рыльце въ видѣ желѣзистой ямки, помѣщается со стороны губы; надъ рыльцемъ у основанія гнѣздъ пыльника возвышается носикъ (*rostellum*); завязь нижняя, часто скрученная, одногнѣздная, съ 3 стѣнными сѣменосами; коробочка вскрывается б. ч. 6 продольными щелями; сѣмена очень мелкія, безъ бѣлка и съ зародышемъ безъ сѣмидоли.

Обзоръ сем. Orchidáceae.

Подсемейство Diándrae.

Средняя тычинка не развита, вмѣсто нея джестикообразный стаминодій, 2 боковыя развиты.

Cypripediceae.

Cypripedium.

Подсемейство Monándrae.

Только средняя тычинка развита, вмѣсто 2 боковыхъ — по стаминодию съ каждой стороны.

Ophrigideae.

Пыльники совершенно приросшіе; пыльцевая масса съ б. или м. длинной ножкой.

Orchis, Gymnadenia, Platanthera, Coeloglossum, Herminium.

Пыльники отчасти или совершенно свободные, легко опадающіе; пыльцевая масса безъ ножекъ.

Neottieae.

Листья въ почкосложеніи свернутые (у *Neottia* и *Epipogon* нѣтъ листьевъ).

Epipogon, Cephalanthera, Epipactis, Neottia, Listera, Goodyera.

Liparideae.

Листья въ почкосложеніи сложенные (у *Coralliorrhiza* нѣтъ развитыхъ листьевъ).

Coralliorrhiza, Liparis, Microstylis, Malaxis.

1. Цвѣты очень крупныя, по 1—4 на концѣ стебля, состоятъ изъ 4 листочковъ околоцвѣтника и одной, очень большой, сильно вздутой въ видѣ мѣшка губы; тычинокъ 2 и между ними одинъ лепестковидный стаминодій.

Cypripedium.

Цвѣты не очень крупныя, въ кистяхъ или колосьяхъ, состоятъ изъ 5 околоцвѣтныхъ листочковъ и губы, не мѣшкообразной и не вздутой, но часто имѣющей шпору; тычинка одна средняя и по бокамъ 2 стаминодія. 2.

2. Безъ зеленыхъ листьевъ, съ однимъ чешуевиднымъ стеблевымъ. 3.

Съ б. или м. крупными зелеными листьями. 5.

3. Губа съ мѣшкообразной шпорой, крупная, обращена вверхъ.

Epipogon.

Губа безъ мѣшкообразной шпоры, обращена внизъ. 4.

4. Все растеніе бурое, не исключая и цвѣтовъ; губа длиннѣе листочковъ околоцвѣтника, которые сложены чашевидно.

Neottia.

Все растение зеленоватое; губа почти равна листочкам околоцветника. изъ которыхъ 2 внутреннихъ и срединный наружный стянуты въ шлемъ, 2 же боковыхъ наружныхъ—отстоящiе.

Coralliorrhiza.

5. Губа у основанiя съ ясно выраженной шпорой. 6.

Губа безъ шпоры или иногда только съ мѣшкообразнымъ углубленiемъ. 9.

6. Губа цѣльная или только на верхушкѣ зубчатая. 7.

Губа ясно и глубоко-3-лопастная. 8.

7. Губа цѣльная; 3 листочка околоцветника собраны въ шлемъ, 2—расходящiеся.

Platanthera.

Губа на концѣ зубчатая; всѣ листочки околоцветника собраны въ колокольчатый шлемъ.

Coeloglossum.

8. Губа крапчатая.

Orchis.

Губа одноцвѣтная, не крапчатая.

Gymnadenia.

9. Губа цѣльная. 10.

Губа лопастная или надрѣзная. 13.

10. Цвѣты бѣлые.

Goodyera.

Цвѣты зеленые или желтоватые. 11.

11. Губа тупая, по краямъ мелко-зубчатая.

Liparis.

Губа заостренная, цѣльнокрайняя. 12.

12. Листьевъ 2 — 4, верхнiй листъ у основанiя пластинки вздуть, охватываетъ молодой клубень будущаго года.

Malaxis.

Листъ 6. ч. одинъ, безъ вздутiя и молодого клубня.

Microstylis.

13. Только 2 почти супротивныхъ листа, сидящихъ близъ середины стебля.

Listera.

Стебель покрытъ многими листьями или листья только у основанiя стебля, а на стеблѣ 1 или 2 чешуевидныхъ листа. 14.

14. Цвѣты маленькiе, зелено-желтые; растение съ однимъ шаровиднымъ клубнемъ.

Hermidium.

Цвѣты крупныя, иначе окрашены; растение безъ клубня, но съ мясистыми длинными корнями. 15.

15. Губа языковидно-заостренная, на верхней поверхности съ продольными гребешками; всѣ листочки околоцветника почти равны, собраны въ закрытый шлемъ.

Cephalanthera.

Передняя доля губы округлая или слегка заостренная, но не вытянута въ язычокъ и безъ продольныхъ гребешковъ; всѣ листочки околоцветника расходящiеся и 3 наружныхъ крупнѣе 2 внутреннихъ.

Epipactis.

90. *Cypripedium* L.

Два наружныя листочка околоцветника срастись почти до самой верхушки и образуютъ одинъ, на верхушкѣ двузубчатый листокъ, обра-

щенный внизъ и находящийся подъ губой. остальные 3—расходящиеся; губа вздутая, мышкообразная; столбецъ короткий, несущій наверху лещетковидную пластинку (стаминодій); тычинокъ 2, сидящихъ по бокамъ столбца; тычиночныя нити очень короткія, продолжены надъ пыльниками; пыльца не склеенная.

244. *C. calcéolus* L. Пет. Кр. III, стр. 59. — Бух. II, № 398. — Ф. Б., № 97. — Бух. I, № 369. — F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 175. — Кауф. II, стр. 725. — Гор., № 43. — Цип., № 1416. — Кауф. I, стр. 484. — Lind., p. 168. — Дв., № 838. — Макс., № 819. — Hoff. II., № 7377. — Gold. C., p. 22.

Корневище горизонтальное, довольно толстое, покрыто чешуйками; стебель 30 — 60 см., о 3 — 4 листьяхъ, цилиндрическій, б. бл. м. пушистый, у основанія съ чешуйчатыми влагалищами; листья широко-овальные или овально-ланцетные, заостренные, у основанія съ короткими влагалищами, часто складчатые, съ выдающимися продольными жилками, съ обѣихъ сторонъ коротко-пушистые, по краямъ коротко-рѣснитчатые; прицвѣтники похожи на листья; 1—2—3 цвѣтка расположены однобоко; листочки околоцвѣтника заостренные, красно-бурые; губа короче околоцвѣтныхъ листочковъ, свѣтло-желтая, съ продольными и сѣтчатыми жилками, съ узкимъ устьемъ и внутри съ пурпуровыми точками; завязь на короткой ножкѣ, не скрученная, пушистая. Цвѣты съ конца мая до середины іюня, плоды съ конца іюня. По лѣсамъ на известняковой и перегнойной почвѣ. Зюзино; Невѣрово, Клм. у. (К.). — Волинскій оврагъ (Г.). — С. Ларино — на правомъ берегу р. Рузы (кн. П. Долгорукій). — Въ Шебалахъ. Пдл. у. (Б.). — За Никольскимъ погостомъ близъ Сернухова (Г.). — Карачарово, Клн. у. (И.). — Кунцово; Покровское, Влк. у. (Ч.). — Близъ Ховрина (В. Шатерниковъ). — Порѣчье. Мож. у. (В. и М.). — Лѣсъ близъ Бирева, Клн. у. (П. и С.). — Бѣлые Колодези. Клм. у., Захарово. Клн. у., между Калиновымъ и Ивановымъ, Сри. у. (П.).



Cypripedium calceolus.

245. *C. guttátum* Sw. Пет. Кр. III, стр. 60. — Ф. Б., № 98. — Пет., стр. 175. — Кауф. II, № 726. — Гор., № 42. — Цип., № 1418. — Рупр., стр. 88. — Кауф. I, стр. 482. — Дв., № 837. — Макс., № 820. — Hoff. II., № 7378. — Gold. C., p. 22. — Gold. Sp., p. 137. — Mart., p. 158.

Корневище ползущее, тонкое; стебель цилиндрическій, 12—20 см., пушистый, у основанія съ чешуйчатыми влагалищами, несетъ одинъ цвѣтокъ; листьевъ 2, сидящихъ почти супротивно или одинъ нѣсколько выше другого, эллиптическихъ или яйцевидно-эллиптическихъ, заостренныхъ, съ продольными жилками, съ обѣихъ сторонъ голыхъ, только по краямъ ко-

ротко-рѣсничатыхъ; прицвѣтникъ—маленькій травянистый листъ; верхній листокъ околоцвѣтника эллиптическій или округло-эллиптическій, заостренный, равенъ губѣ, нижній—продолговатый, короче губы, какъ и ланцетные боковые; губа съ широкимъ устьемъ, темно-розовая, съ бѣлыми пятнами, равно какъ и внутренняя сторона верхняго и боковыхъ листочковъ околоцвѣтника; наружная ихъ сторона бѣловато-розовая, съ зелеными жилками; нижній листокъ околоцвѣтника зеленоватый. Цвѣты съ конца мая до середины юня. На глинистой почвѣ, по холмамъ и оврагамъ, покрытымъ кустарникомъ. Ромашково (Н. и Г.).—Близъ Верей (Макс.).—Архангельское, Звн. у. (Бор. и Г. С.).—Близъ имѣнія Грачево на бер. р. Мѣчи, Пдл. у. (М. М. Нечаевъ).



Cypripedium guttatum.

91. *Órchis* L.

Два боковые внутренніе и одинъ верхній наружный или всѣ листочки околоцвѣтника собраны въ шлемъ; губа крапчатая, длиннѣе листочковъ околоцвѣтника, 3-лопастная, у основанія съ б. или м. длинной шпорой; столбецъ короткій, съ короткимъ носикомъ; пыльники параллельные, приросшіе по всей длинѣ къ отростку столбца, между ними маленький отростокъ носика; пыльцевыя массы на длинныхъ ножкахъ съ железками или у обѣихъ ножекъ одна общая железка въ углубленіи (кармашекъ), находящемся на носикѣ столбца.

1. Прицвѣтники объ 1 жилкѣ. 2.

Прицвѣтники о 3 жилкахъ. 4.

2. Листочки околоцвѣтника собраны въ острый шлемъ, буро-пурпуровые, съ зелеными жилками.

O. coriophora L.

Листочки околоцвѣтника розовые или лиловые, съ розовыми или пурпуровыми, но не зелеными жилками, собраны въ туповатый шлемъ, или листочки околоцвѣтника нѣсколько расходящіеся. 3.

3. Средняя лопасть губы б. ч. въ $1\frac{1}{2}$ раза длиннѣе ширины, 2-лопастная, съ остріемъ между лопастями.

O. militaris L.

Ширина средней лопасти губы равна ея длинѣ, 2-лопастная, безъ острія между лопастями.

O. tridentata Scop.

4. Листья (8—15 см. дл. п 0,5—1,5 см. шир.) линейные или линейно-ланцетные, отклонены отъ стебля дугообразно.

O. Russowii Klinge.

Листья ланцетные или широко-ланцетные, нижніе—иногда почти овальные, шире 1,5 см., и если отклонены отъ стебля, то не дугообразно. 5.

5. Листья крапчатые.

O. maculata L.

Листья безъ пятенъ. 6.

6. Прицвѣтники въ 2 раза длиннѣе цвѣтовъ.

O. incarnata L. γ. *strictifolia* Opiz.

Прицвѣтники не болѣе какъ въ $1\frac{1}{2}$ раза длиннѣе цвѣтовъ. 7.

7. Приземлистое растеніе, достигаетъ 30 см., съ прижатыми къ стеблю листьями.

O. incarnata L. α. *lanceolata* Rehb. fil.

Высокое растеніе, достигаетъ 70 см., съ отстоящими отъ стебля листьями.

O. incarnata L. β. *brevicalcarata* Rehb. fil.

246. **O. militaris** L. Ф. Б., № 87.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 232.—Кауф. II, № 704.—Мил., № 31.—Цин., № 1397.—Кауф. I, стр. 467.—Lindl., p. 166.—Ann. C. V., № 65.—Дв., № 819.—Макс., № 801.—Hoff. II., № 7328.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 154.—St. II, p. 52.—St. I, № 605.—Pal., № 1980.

Orchis Rivini Gouan. Her. Kr. III, стр. 49.

Клубень крупный, яйцевидный, кнззу слегка суженный; стебель нѣсколько ребристый, достигаетъ 50 см., у основанія его находится 1—2 чешуйчатыхъ, слегка заостренныхъ листа, остальные листья въ числѣ 2—4, продолговато-эллиптическіе, съ влагалищами, съ продольнымъ жилками, заострены или быстро сужены въ короткій колпачокъ; верхушка стебля безлистная; соцвѣтіе сперва пирамидальное, потомъ цилиндрическое; прицвѣтники заостренные, пленчатые, въ 3—5 разъ короче сидячей, нѣсколько скрученной завязи; губа съ линейными боковыми долями и широкою среднею долей, впереди быстро расширенною и расходящеюся на 2 продолговатыя, спереди слегка зубчатыя лопасти съ короткимъ остріемъ въ выемкѣ; наружные лепесточки шлема яйцевидно-ланцетные, острые, розовые, съ темными жилками; губа блѣдно-пурпуровая, съ темными пятнами; шпора цилиндрическая, въ 2—3 раза короче завязи. Цвѣты съ конца мая до конца іюня. По залпвымъ лугамъ и кустарникамъ. Раменки, между Ивановымъ и Петровымъ (К.).—Волинское (А.).—Останкино (Гольдб.).—Близъ Семенкова, Мож. у. (М.).—Дубровицы, Пдл. у. (Г.).—Между Введенскимъ и Порѣчьемъ, Звн. у., противъ Краснаго Стана, Руз. у., близъ устья р. Лонаси, Срп. у., Раменки, Мос. у. (П.).—Сырой лугъ близъ Хоронова (С.).—Сырой оврагъ противъ дер. Клонова, Звн. у. (П. П. Матиль.).—Заливной лугъ близъ с. Тренарево и д. Ваулиной, Мож. у. (Ф. О.).—На 111 верстѣ, Моск. Бр. ж. д. (Мос.).



Orchis militaris.

247. **O. tridentata** Scop. Пет. Кр. III, стр. 49.

Orchis variegata All. Пет., стр. 232.—Кауф. II, стр. 485.—Цин., № 1396.—Кауф. I, стр. 470.—Hoff. II., № 7342.

Клубни продолговато-округлые; стебель 15—40 см., тонкій, въ верхней части иногда ребристый; листья (4—6) съ влагалищнымъ основаніемъ,

продолговато-ланцетные или продолговатые, на спинкѣ часто съ жилкѣмъ; нижніе—тупые, верхніе—заостренные, спиевато-зеленые; колосъ округло-продолговатый или округло-яйцевидный; прицвѣтники ланцетные, заостренные, равны $\frac{2}{3}$ завязи; листочки околоцвѣтника срались у основанія, яйцевидно-ланцетные, собраны въ шлемъ, свѣтло-лиловые, съ пурпуровыми жилками; губа 3-лопастная, равна или нѣсколько длиннѣ листьевъ околоцвѣтника, бѣлая или блѣдно-розовая съ пурпуровыми точкамъ, боковыя лопасти продолговатыя или иногда почти линейныя. средняя широко-



Orchis tridentata.



Orchis coriophora.

обратно-сердцевидная, съ широко-клиновиднымъ основаніемъ и слегка зубчатой верхушкой; шпора отогнута книзу, равна всей или только $\frac{1}{2}$ завязи. Находится въ гербаріи Гофмана за № 7342.

248. *O. coriophora* L. Пет. Кр. III, стр. 50.—Пет., стр. 232.—Кауф. II, № 705.—Цин., № 1394.—Кауф. I, стр. 468.—Дв., № 815.—Макс., № 798.—Hoff. II, № 7321.—Mart., p. 153.—St. II, p. 52.—St. I, № 602.—Pal., № 1977.

Клубни шаровидные, рѣже нѣсколько удлинненные; стебель 15—40 см., покрытъ доверху листьями; листья линейно-ланцетные или ланцетные, спие-зеленые, края ихъ часто завернутые, нижніе—отогнутые, верхніе—почти прижатые къ стеблю; колосъ цилиндрическій, достигаетъ 7 см. дл.; прицвѣтники линейные или линейно-ланцетные, пленчатые, бѣловатые, съ 1 зеленой жилкой, равны сидячей завязи; листочки околоцвѣтника собраны въ острый шлемъ, буро-пурпуровые съ зеленоватыми жилкамъ; губа отогнута книзу, 3-лопастная, грязно-буро-красная съ темными пурпуровыми крапичками, лопасти ея б. ч. одинаковой величины, рѣже средняя длиннѣе; шпора коническая, загнута дугою внизъ, въ 2—3 раза короче завязи. Цвѣты въ іюнѣ. Находится въ гербаріи Гофмана за № 7321 и въ гербаріи Кауфмана за № 559.

249. *O. incarnáta* L. Пет. Кр. III, стр. 52.—Бух. II, № 392.—Бух. I, № 363.—
F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 231.—Кауф. II, № 709.—
Цип., № 1392.—Кауф. I, стр. 470.—Ann. C. III, № 258.
Orchis latifolia L. Дп., № 820. —Макс., № 802.—Hoff. H., № 7325.—Gold. C.,
p. 22.—Mart., p. 154.—St. II, p. 52.—St. I, № 606.—Pal.,
№ 1981.

Клубни сплюснутые, ланчатые, лопасти переходить въ длинные, толстые корни; стебель 20—70 см., трубчатый, слегка бороздчатый; листья (4—7) прижатые къ стеблю или отстоящiе, ланцетные или широко-ланцетные, у основанiя нѣсколько сужены, влагалищные, длинно-заостренные, почти всегда стянуты колпачкомъ; колосъ сперва коническiй, потомъ цилиндрическiй; прицвѣтники ланцетные, длиннѣе цвѣтовъ, травянистые, б. ч. съ 3 жилками; листочки околоцвѣтника свободные, боковые отклонены назадъ; губа 5—7 мм. дл. и шир., съ неравно-зубчатымъ краемъ,

Orchis incarnata α . lanceata.Orchis incarnata β . brevicarata.Orchis incarnata γ . strictifolia.

рѣже 3-лопастная, средняя лопасть уже боковыхъ; цвѣты лилово-пурпуровые; губа съ темно-пурпуровыми пятнами; шпора 6—7 мм. дл., коническо-цилиндрическая, б. ч. нѣсколько длиннѣе $\frac{1}{2}$ завязи. Цвѣты весь июнь. По сырымъ лугамъ, кустарникамъ и по моховымъ торфянымъ болотамъ.

α . *lanceata* Rchb. fil. Очень крѣпкое приземистое растенiе, достигаетъ 30 см., съ листьями, прижатыми къ стеблю, съ губой не лопастной, но часто зубчатою и шпорою, б. ч. превышающей $\frac{1}{2}$ завязи. Мытищи; близъ Боровскаго кургана, Брян. у. (С.).—Хотѣичи, Врг. у., Куеково, Серебряный боръ близъ Хорошова; близъ Ильинскаго, Звен. у. (П.).

β . *brevicarata* Rchb. fil. Высокое растенiе, достигаетъ 70 см., съ отстоящими отъ стебля листьями, б. ч. 3-лопастной губой и шпорою, равной $\frac{1}{2}$ завязи или короче. Останкино, Мытищи — истоки Нузы; Бирево, Кдн. у. (С.).—Трастенское озеро, Руз. у., Куеково (П.).

γ. *strictifolia* Opiz. (var. *macrophylla* Schur.). Прицветники въ 2 раза длиннѣе цвѣтковь. Сырой лугъ Москвы р. близъ Хорошова (С.).—Бирево, Клн. у. (П.).

250. *O. Rússowii* Klinge. Пет. Кр. III, стр. 51.

Orchis Traunsteineri Sauter. Ф. Б., № 89.—Цин., № 1391.

Orchis latifolia L. β. *angustifolia* Nyland. Кауф. II, стр. 485.—Кауф. I, стр. 470.—Mart., p. 154.

Клубни двулопастные, вздутые, вытнуты въ очень длинные корни; стебель тонкій, б. ч. полый, 20—50 см.; листья (2—5) 8—15 см. дл. и 0,5—1,5 см. шир., отклонены отъ стебля и дугобразно согнуты, нижній—къ верхушкѣ расширенъ, остальные—линейные или линейно-ланцетные, съ тупой или стянutoй колначкомъ верхушкой; колосъ 3—9 см. дл., цилиндрическій или овальный; прицветники короче цвѣтковь, иногда ниж-



Orchis Russowii.



Orchis maculata



Orchis maculata v. *Meyeri.*

нѣ равны имъ; наружные листочки околоцветника отогнуты, шире и длиннѣе остальныхъ; губа 8—12 мм. дл. и 6—9 мм. шир., въ срединѣ шире всего, 3-лопастная, съ средней очень маленькой лопастью; шпора 7—10 мм. дл.; цвѣты пурпуровые или лилово-пурпуровые, съ расписною губою. Цвѣты въ июнѣ.—Тростенское озеро, Ряз. у. (Ф. О.).—Косино—Черное озеро; Глубокое оз., Ряз. у. (П.).

251. *O. maculata* L. Пет. Кр. III, стр. 50.—Бух. II, № 391.—Бух. I, № 362.—Ф. О., № 7, p. 102.—Пет., стр. 232.—Кауф. II, № 707.—Цин., № 1393.—Pinz., p. 18.—Кауф. I, стр. 469.—Lind., p. 166.—Ann. C. II, № 156.—Др., № 821.—Макс., № 803.—Hoff. H., № 7326.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 155.—St. II, p. 52.—St. I, № 607.—Pal., № 1982.

Клубни пальчатые, сплюснутые; стебель высокій, достигаетъ 60 см., плотный, рѣже полый; листья въ числѣ 3—10, нижніе—овальные, б. ч. тупые, средніе—широко-ланцетные, острые; верхніе—ланцетные, маленькіе, схожи съ прицветниками, верхушка верхняго листа не достигаетъ

основанія колоса: верхняя сторона листьевъ темно-зеленая съ многочисленными красно-бурыми пятнами, нижняя—сине-зеленая, лоснящаяся; колосъ вначалѣ коническій, потомъ цилиндрическій; прицвѣтники узко-ланцетные: нижніе—длиніе завязи, средніе и верхніе—равны или короче ея; листочки околоцвѣтника продолговато-ланцетные, боковые наружные—нѣсколько отклонены, потомъ отогнуты назадъ: губа широкая, 3-лопастная, боковыя ея лопасти шире средней; цвѣты розовые или лилово-розовые, съ пурпуровой росписью; шпора равна или нѣсколько короче завязи. Цвѣты съ $\frac{2}{2}$ июня до середины июля. По дѣсамъ и кустарникамъ, часто.

2. *Mejeri* Richb. fil. Кауф. II, стр. 484.—Pinz., p. 18.—Кауф. I, стр. 469.

Стебель выше 60 см., тонкій, полый; колосъ рѣдкій, съ мелкими цвѣтами: губа 3-лопастная, съ вытянутой срединной лопастью; шпора очень тонкая. Косино (П.).—Купавна, Бгр. у. (К.).

3. *albiflora* auct. pl. Пет. Кр. III, стр. 51.—Бух. II, № 391.—Бух. I, № 362.—Mart., p. 155.

Съ совершенно бѣлыми цвѣтами или цвѣты бѣлые съ пурпуровыми точками; листья почти безъ пятенъ. Красниковское болото за Б. Мытищами (С.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).

92. *Gymnadénia* R. Br.

Два боковые внутренніе и одинъ верхній наружный или всѣ листочки околоцвѣтника собраны въ шлемъ; губа одноцвѣтная, не крапчатая, 3-лопастная, длиннѣе околоцвѣтника или равна ему, съ б. или м. длинной, часто почти нитевидной шпорой; столбецъ короткій, съ б. или м. широкимъ носкомъ, длинный отростокъ котораго находится между параллельными приросшими пыльниками и явственно замѣтенъ: пыльцевыя массы на б. или м. длинныхъ ножкахъ съ железками, сидящими по обѣимъ сторонамъ отростка носка, но не въ кармашкѣ.

252. *G. conopéa* R. Br. Бух. II, № 393.—Бух. I, № 364.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 197.—Кауф. II, № 710.—Цин., № 1329.—Pinz., p. 19.—Кауф. I, стр. 471.—Lind., p. 166.—Ann. C. IV, № 54.

Satyrium conopseum Wahlb., Дв., № 826.

Orchis conopsea L. Макс., № 804.—Hoff. H., № 7320.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 155.—St. II, p. 52.—St. I, № 609.

Gymnadenia odoratissima Rich. Gold. Sp., p. 141.—St. I, № 608.—Pal., № 1983.

Клубни сплюснутые, пальчато-раздѣльные; стебель цилиндрическій, рѣже слегка бороздчатый, 25—50 см., полый, у основанія съ буроватыми пленчатыми влагалищами; стеблевые листья линейно-ланцетные, съ шлемъ на спинкѣ, въ числѣ 3—5, верхніе — похожи на прицвѣтники; колосъ длинный, цилиндрическій, 7—17 см. дл.; прицвѣтники съ 3 жилками, овально-ланцетные, вытянуты въ длинный кончикъ, равны цвѣтку съ завязью; листочки околоцвѣтника продолговатые, туные: 3 верхніе—сходятся шлемомъ, 2 боковые расходятся; губа о 3 почти равныхъ, ту-

пыхъ лопастяхъ; шпора нитевидная, раза въ 2 длиннѣ завязи; цвѣты пахучіе, розовые или лилово-розовые, рѣже бѣлые. Цвѣтетъ съ $\frac{2}{3}$ іюня до



Gymnadenia conopsea.



Gymnadenia cucullata

начала іюля, зрѣлыя сѣмена въ концѣ іюля. По сырымъ лугамъ и кустарникамъ, очень часто.

253. *G. cucullata* Rich. Пет. Кр. III, стр. 52.—Пет., стр. 197.—Кауф. II, № 711. — Цин., № 1400.—Рупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 471.—Lind., p. 166.—Ann. C. I, № 48.

Orchis cucullata L. Дв., № 814.—Макс., № 805.—Hoff. H., № 7322.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 153.—Lib. Tr., p. 164.—Hoff., № 2254.—St. II, p. 52.

Клубни почти шаровидные, иногда слегка 2-лопастные; стебель тонкій, гранпстый, 10—30 см., у основанія съ буроватыми влагалищами; 2 листа почти корневые: одинъ эллиптическій, туповатый, другой эллиптическо-ланцетный, острый, съ продольными жилками; стеблевыхъ листьевъ 1—2, линейно-ланцетныхъ, похожихъ на прицвѣтники; прицвѣтники ланцетные, равны завязи, съ 1 жилкой; колосъ односторонній, 8—24-цвѣтковый; цвѣты розовые; листочки околоцвѣтника узко-ланцетные, острые, всѣ собраны шлемомъ; губа 3-раздѣльная на линейныя лопасти; шпора на концѣ утолщена, короче завязи. Цвѣты съ $\frac{2}{3}$ іюля до середины августа, плоды съ конца августа. По большимъ хвойнымъ лѣсамъ. Всевятскій лѣсъ, сосновая роща близъ Покровскаго, Лоспный Островъ (К.).—Перово (Гольдб.).—Архангельское, Звн. у.; Горенки, Кусково, Петровское (Мар.).—Успенское, Звн. у. (X.).—Коншинскій лѣсъ близъ Серпухова (П.).—Подъ Саввинскимъ монастыремъ, Кузьминки, Серебряный боръ близъ Хорошова (П.).—Между Михневымъ и Пехоркой, Брн. у. (Куль.).—Троицкое-Лыково (Гей.).

93. *Platanthéra* Rich.

Два внутренніе листочка околоцвѣтника и одинъ верхній наружный собраны въ шлемъ, остальные—расходящіеся; губа длинная, цѣльная, съ

длинной нитевидной шпорой; столбец короткий, съ мало замѣтнымъ от­росткомъ пестика или безъ него; пыльники съ параллельными или съ рас­ходящимися основаніями; пыцевыя массы на б. или м. длинныхъ нож­кахъ съ щитовидными железами, не заключенными въ кармашекъ.

254. *P. solstitialis* Boennigh. Пет. Кр. III, стр. 54.—Pinz., p. 19.

Platanthera bifolia Rich. Бух. II, № 394.—Бух. I, № 365.—F. O., № 7, p. 102.—

Пет., стр. 242.—Кауф. II, № 713.—Цин., № 1401.—

Кауф. I, стр. 472.—Lind., p. 166.—Ann. C. II, № 157.

Satyrium bifolium Wahlb., Дв., № 825.

Orchis bifolia L. Макс., № 796.—Hoff. II, № 7318.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 153.—St. II, p. 52.—St. I, № 601.

Клубни веретенообразные; стебель 20—50 см., голый, съ острыми ребрами, у основанія съ 1—3 бурыми влагалищами; корневые листья лоснящиеся, яйцевидно-ланцетные или продолговато-обратно-яйцевидные, заострен­ные или тупые, б. ч. ихъ 2, рѣже 3 (var. *trifoliata* Thieles); стеблевые—ланцетные, въ числѣ 1—3, похожи на прицвѣтники; колосъ цилиндрическій, рѣдкоцвѣтный, отъ 6 до 15 см. дл.; прицвѣтники ланцетные или яйцевидно-ланцетные, травянистые, низбагающие, б. ч. о 5 жилкахъ, равны или короче завязи; губа линейная или продол­говато-линейная, тупая, въ $1\frac{1}{2}$ раза длин­нѣ околоцвѣтника; шпора нитевидная, въ 2— $2\frac{1}{2}$ раза длиннѣ завязи; гнѣзда пыль­никовъ почти параллельныя, связникъ ихъ узкій; цвѣты бѣлые, съ зелеными кончиками у листочковъ, сильно пахучіе. Цвѣтеть съ начала іюня до начала іюли. По лѣсамъ и кустарникамъ, очень часто.



Platanthera solstitialis

α. *aceras* Goldb. Пет. Кр. III, стр. 54.—Кауф. II, стр. 488.—Кауф. I, стр. 473.

Всѣ листочки околоцвѣтника расходящиеся; губа линейно-лан­цетная, безъ шпору. Денисьево, Звн. у., въ гербаріи Гольдбаха.

254. *P. chlorántha* Rehb. Пет. Кр. III, стр. 54.—Мос., № 36.—Ф. Б., № 90.—

Пет., стр. 243.—Кауф. II, № 714.—Цин., № 1402.—

Pinz., p. 19.—Рувр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 473.

Клубни веретенообразные; стебель 25—60 см., ребристый, голый, у основанія съ 1—3 ланцетными бурыми влагалищами; корневые листья широко-овальные, верхушка ихъ туповатая или округлая, основаніе су­жено почти въ черешокъ; стеблевые—въ количествѣ 1—3, ланцетные—похожи на прицвѣтники; колосъ рѣдкоцвѣтный, 6—10 см. дл.; прицвѣтники яйцевидно-ланцетные или ланцетные, б. ч. туповатые, со многими жилками; губа почти линейная, мало расширена къ концу, равна околоцвѣтнику или вдвое длиннѣ его; шпора въ $1\frac{1}{2}$ —2 раза длиннѣ завязи, нитевидная, къ

концу булабовидно утолщенная; гнѣзда пыльниковъ книзу расходятся; связникъ широкій; цвѣты почти безъ запаха. Цвѣтеть со середины іюня. Плесенское, Вер. у. (Ринз.).—Коншинскій лѣсъ—за Бычками подъ Серпуховымъ (Г. О.).—Близъ Богородскаго (Ф.).—Петровское-Разумовское (Кл.).—Куяново; Матренки, Дмит. у. (П.).—Мытищи — лѣсъ близъ Рупосова (С.).—Близъ Николо-Угренскаго монастыря (Эск. Бот. Лаб.).—Близъ Романцева, Мож. у. (В.).—Звенигородъ (Ч.).—Сѣкирино, Идл. у. (Мос.).

94. *Coeloglossum* Hartm.

Всѣ листочки околоцвѣтника собраны въ колокольчатый шлемъ; губа длиннѣе листочковъ околоцвѣтника, цѣльная, только на концѣ зубчатая, у основанія съ короткой мѣшкообразной шпорою; столбецъ корот-



Platanthera chlorantha.



Coeloglossum viride.

кій, безъ отростка на носикѣ; пыльники не параллельные, съ расходящимися основаніями; пыльцевыя массы на б. или м. длинныхъ ножкахъ съ крупными щитковидными железками, не заключенными въ кармашекъ.

255. *C. viride* Hartm. Her. Kr. III, стр. 53. — Ф. Б., № 89. — Ф. О., № 7, р. 102.—Кауф. II, № 712.—Кауф. I, стр. 472.

Peristylus viridis Lindl., Her., стр. 236.—Цин., № 1403.

Satyrion viride L., Дв., № 824.—Mart., p. 155.—St. II, p. 52.

Orchis viridis All. Macq., № 797.—Hoff. II., № 7343.—Gold. C., p. 22.

Habenaria viridis R. Br., Hoff. II., № 7343.

Platanthera viridis Lindl.

Клубни слегка сплюснутые, глубоко-2-раздѣльные; стебель 6—30 см., полый, съ тупыми ребрышками, у основанія б. ч. съ 2 прижатymi, заостренными влагалищами; всѣ листья стеблевые, нижній—обратно-яйцевидный или эллиптическій, туповатый, остальные—яйцевидно-ланцетные или ланцетные, заостренные; колосъ узко-цилиндрическій, 2—9 см. дл., б. ч. рѣдкоцвѣтный; прицвѣтники равны цвѣтамъ или нѣсколько длиннѣе ихъ,

травянистые, ланцетные, туповатые; 2 наружные листочка околоцвѣтника яйцевидные, тупые; 2 внутренние—линейные, острые; губа линейная, нѣсколько расширенная, съ 3 зубчиками на концѣ, средній зубецъ короче боковыхъ; шпора очень короткая, скорѣе похожа на мѣшечекъ; цвѣты зеленые или буровато-зеленые; губа желто-зеленая, часто съ красноватымъ или буроватымъ краемъ. Цвѣтеть въ июлѣ и въ началѣ июля. По лѣсамъ и опушкамъ. Раменки; Вараино, Дмит. у., Трепарево, Мож. у. (К.).—Сокольники (Ген.).—Перово, Останкино (Гольдб.).—Собольки, Мож. у. (Мос.).—Близъ Серпухова (Г. О.).—Мытищи—близъ Перловской фермы (С.).—Близъ Тростенскаго озера, Руз. у. (П.).

α. bracteata Rchb. fil. Пет. Кр. III, стр. 53.—Кауф. II, стр. 487.—Кауф. I стр. 472.

Peristylus bracteatus Lindl.

Прицвѣтники въ 2—2½ раза длиннѣе цвѣтовъ; колосъ очень рѣдкій. Въ гербаріи Анненкова.—Сокольники (Ген.).—Романцево, Мож. у. (М.).—Викторовка, Бгр. у. (П.).—Невѣрово, Кзм. у., за Троицкимъ скитомъ по рѣкѣ Торгошѣ, Дмит. у. (П.).

95. *Hermínium* R. Br.

Всѣ листочки околоцвѣтника прямоторчащіе или слегка собраны въ шлемъ; губа у основанія съ мѣшкообразнымъ углубленіемъ, но безъ шпору, съ 3 линейными расходящимися лопастями; столбецъ короткій, съ широкимъ носикомъ; пыльники параллельные; пыльцевыя массы на короткихъ ножкахъ съ крупными железками, сидящими на носикѣ, но не въ кармашкахъ.

256. *H. Monórchis* R. Br. Пет. Кр. III, стр. 54.—Ф. Б., № 91.—Ф. О., № 7, p. 102.—Пет., стр. 199.—Кауф. II, № 715.—Цин., № 1404.—Кауф. I, стр. 473.—Ann. C. III, № 259.—Дв., № 827.

Ophrys Monorchis L. Макс., № 806. —Hoff. Н., № 7347.—Gold. C., p. 22.—St. II, p. 52.—St. I, № 615.

Satyrium Monorchis Pers. Mart., p. 156.

Клубень одинъ, шаровидный, молодой же на длинной ножкѣ; стебель 10—30 см., цилиндрической, съ мелкими продольными линиями, у основанія съ прижатыми влагалищами; корневые листья (2. рѣже 3) яйцевидные, съ клиновиднымъ основаніемъ, или яйцевидно-ланцетные, заостренные, свѣтло-зеленые, на спинкѣ съ килемъ; стеблевой листъ обыкновенно одинъ, посрединѣ стебля, ланцетный, заостренный; колосъ цилиндрической, тонкій, иногда почти односторонній; прицвѣтники линейно-ланцетные, заостренные, б. ч. равны завязи; цвѣты желтовато-зеленые, пахнущіе медомъ, сидятъ почти подъ прямымъ угломъ къ завязи: 2 наружные листочка околоцвѣтника яйцевидно-ланцетные, туповатые, 2 внутренние—уже наружныхъ и длиннѣе ихъ; губа 3-лопастная, боковыя лопасти загнуты къ верхушкѣ и вдвое короче средней; шпору нѣтъ. Цвѣты съ 2½

іюня до конца іюли. По сырѣмъ и болотистымъ мѣстамъ. Давыдково, Иваньково, оврагъ между Иваньковымъ и Петровымъ, Киреево; Протопопово, Клм. у. (К.).—Владыкино. Мос. у. (Г.).—Ваулино. Мож. у. (Ф. О. и Ф. Б.).—Сухаревка, Руз. у. (В. Арнольдъ).—По р. Городнѣ (Баршевѣ).—Завидово, Клн. у. (Шатерниковъ).—Мытищи (С.).—Воскресенскъ, Звн. у., Хмѣтьево, Клн. у., противъ Краснаго Стана, Руз. у., Химки (П.). Подъ Дмитровымъ на луку (П и Х.).

96. *Epipogon* Gmel.

Листочки околоцвѣтника ланцетные, расходящіеся; губа у основанія съ мѣшкообразной шнорой, обращена вверхъ, 3-лопастная, со срединной болѣе крупной и отогнутой лопастью; столбецъ толстый, нѣсколько удли-



Herminium Monorchis.



Epipogon aphyllus.

ненный, съ короткимъ носикомъ; пыльники со связникомъ, наверху утолщеннымъ; пыльцевыя массы съ длинными ножками, сидящими на одной железкѣ.

257. *E. aphyllus* Sw. Пет. Кр. III, стр. 55.

Epipogon Gmelini Rich. Ф. оп., стр. 365.—Ф. Б., № 15.—Кауф. II, стр. 489.—
Кауф. I, стр. 474.

Limodorum Epipogium Sw. Gold. C., p. 22.

Корневище толстое, коралловидное, сильно вѣтвистое; стебель 5—30 см., трубчатый, голый, у основанія нѣсколько вздутый, кверху постепенно становится тоньше, свѣтло-желтый, иногда слегка красноватый; зеленыхъ листьевъ нѣтъ, только короткія влагалища такого же цвѣта, какъ и стебель; кисть малоцвѣтковая (2—8); цвѣты повислые и вслѣдствіе поворота завязи и цвѣточной ножки обращены губой кверху; прицвѣтники яйцевидные, съ 3 жилками, тонкіе, почти просвѣчивающіе, бѣлые; завязь овальная, не скрученная; листочки околоцвѣтника свободные, расходящіеся, свѣтло-желтые: 2 наружные — линейные, 2 внутренніе — нѣсколько шире

наружныхъ и немного длиннѣ ихъ, очень рѣдко съ фиолетовыми крапинками; губа равна или длиннѣ околоцвѣтника, 3-лопастная, боковыя лопасти округлыя, короче средней, желтовато-бѣлая, съ пурпуровыми или фиолетовыми крапинками; шпора короткая и толстая, красноватая или слегка фиолетовая. Въ цвѣту 11 іюля. Въ старомъ елинанномъ слоево-основомъ лѣсу (Сущинъ лѣсъ) близъ Ивоинна, Зви. у. (З. В. Бого-словская).

97. *Cephalanthéra* Rich.

Всѣ листочки околоцвѣтника почти равныя, собраны въ два открытый шлемъ; губа у основанія вогнута почти мѣшкообразно, въ средней своей части быстро сужена, отчего 3-лопастная, средняя лопасть язычкообразная, заостренная, съ продольными гребешками на верхней сторонѣ, двѣ боковыя лопасти округлыя и торчатъ вверхъ; столбецъ удлинненный, съ маленькимъ носикомъ; пыльца не склеенная, порошкообразная, безъ железокъ.

258. *C. longifolia* Fritsch. Ф. ор., р. 362.

Epipactis longifolia Wettst. Пет. Кр. III, стр. 56.

Cephalanthera ensifolia Rich. Бух. II, стр. 39. — Кауф. II, стр. 490. — Цин., № 1407. — Кауф. I, стр. 475.

Serapias grandiflora Gaud. Дв., № 830. — Макс., № 811. — Ст. II, р. 52.

Epipactis pallens Willd. Макс., № 811.

Epipactis grandiflora Gaud. Mart., р. 156.

Serapias lancifolia Smith. St. I, № 617.

Cephalanthera Xiphophyllum Rehb. fil.

Корневище почти горизонтальное; стебель 20—50 см., цилиндрическій, иногда съ тонкими продольными линиями, у основанія съ влагалищами; листья б. ч. вверхъ торчащіе, ярко-зеленые, сближенные, ланцетные, длинно-заостренные, съ выдающимися продольными жилками, верхніе—линейно-ланцетные; колосъ удлинненный, о 3—20 бѣлыхъ цвѣткахъ; прицвѣтники яйцевидно-ланцетные или линейно-ланцетные, съ 1 жилкой, б. ч. короче завязи, нижніе иногда равны ей; завязь сидячая или на короткой вверхъ торчащей цвѣтоножкѣ, б. ч. голая; 2 наружныя листочка околоцвѣтника яйцевидно-ланцетные, острые; 2 внутренніе—туповатые, рѣдко заостренные, короче, рѣже почти такой же длины, какъ наружныя; губа почти въ 2 раза короче околоцвѣтника, съ обѣихъ сторонъ задней ея части находится по треугольной лопасти, передняя часть съ желтымъ пятномъ пмѣять нѣсколько большую ширину, чѣмъ длину. Въ цвѣту 14 іюня. За дер. Сальково, Зви. у.—недалеко отъ Москвы р. на лѣсной полянѣ, найдена лѣсничимъ гр. С. Д. Шереметева.



Cephalanthera longifolia

98. *Epipáctis* Rich.

Всѣ листочки околоцвѣтника расходящіеся или собраны чашевидно, 3 наружные крупнѣе 2 внутреннихъ; губа у основанія вогнута, но не мѣшкообразно, въ средней своей части быстро сужена, отчего 3-лопастная; передняя лопасть округлая, по краямъ городковая, двѣ боковыя—тупотреугольныя; столбецъ короткій, съ широкимъ носикомъ; пыльца не склеенная, порошокватая, съ железкой.

259. *E. latifolia* All. Пет. Кр. III, стр. 55.—Ф. Б., № 92—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 183.—Кауф. II, № 716.—Цин., № 1413.—Кауф. I, стр. 476.—Lind., p. 168.—Ann. C., IV, № 55.—Макс., № 809.—Hoff. II., № 7358.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 156.

Serapias latifolia Willd. Дв., № 828.—St. II, p. 52.—St. I, № 616.—Pal., № 1985.

Корневище съ очень короткими междоузліями; корни толстые, мясистые; стебель прямостоящій, покрытъ 6. или м. густо курчавыми волосками, у основанія съ 2—3 свѣтло-бурыми влагалищами, изъ которыхъ верхнее имѣетъ маленькую пластинку; листья всѣ стеблевые, продолговато-ланцетные или широко-яйцевидные, заостренные, съ короткимъ влагалищемъ и съ сильно выдающимися продольными жилками, часто складчатые; колосъ длинный, съ поникающими цвѣтами, часто односторонній; прицвѣтники широко-линейные или широко-ланцетные, со многими продольными жилками, нижніе—въ 2 раза длиннѣе цвѣтовъ, верхніе—равны имъ; завязь не скрученная, съ 6 ребрышками; листочки околоцвѣтника сперва собраны колокольчато, потомъ всѣ расходящіеся; 2 наружные—яйцевидно-ланцетные, съ 3—5 жилками, 2 внутренние—нѣсколько короче и шире наружныхъ, съ 5—7 жилками; основаніе губы сидитъ подъ тупымъ угломъ къ завязи; цвѣты зеленоватые, иногда съ красноватымъ или фіолетовымъ оттѣнкомъ, задняя часть губы темно-красная. Цвѣты съ конца іюня, весь іюль и въ началѣ августа. По тѣнстымъ сырýmъ мѣстамъ и по опушкамъ.



Epipactis latifolia

α. *varians* Crantz. Пет. Кр. III, стр. 55.—Бух. II, № 395.—Бух. I, № 366.—Кауф. II, стр. 491.—Кауф. I, стр. 476.

Стебель 18—30 см.; листья узкіе, съ частыми продольными жилками, складчатые, матовые. средніе—яйцевидно-ланцетные, въ 4—5 разъ длиннѣе междоузлій; кисть рѣдкоцвѣтная. Кунцово (А.).—Звенигородъ (К.).—Тѣсъ близъ Воронова, Пдл. у. (Б.).—Между Ромашковымъ и Черепковымъ (Н.).

β. *viridans* Crantz. Пет. Кр. III, стр. 55.—Кауф. II, стр. 491.—Кауф. I, стр. 476.

Стебель 25—75 см.; листья очень широкіе, слегка лоснящіеся, нѣсколько длиннѣе междоузлій; кисть частая. Богородское. Раменки;

Певѣрово, Кзм. у. (К.).—Пушкино (А. Асѣ).—Серебряный боръ (Ф. О.).—Романцево, Мож. у. (В.).—Собольки, Мож. у. (Мос.).—Порѣчье, Мож. у. (Ф. В.).—Сухарево, Вер. у. (Г. О.).—Викторовка и Щелково, Бгр. у. (Н.).—Противъ Краснаго Стана, Руз. у. (Н.).—Мытищи (Н. и С.).—Между Быковымъ и Михневымъ, Брн. у. (С.).

260. *E. palustris* Crantz. Пет. Кр. III, стр. 55.—Ф. Б., № 93.—Пет., стр. 183.—Кауф. II, № 717.—Цин., № 1412.—Кауф. I, стр. 476.—Lind., p. 168.—Ann. C. I, № 46.—Макс., № 810.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 156.

Serapias palustris Scop. Дв., № 829.

Serapias longifolia L. St. II, p. 52.

Корневище съ длинными междоузліями. часто ползучее, съ побѣгами; стебель 30—60 см. ребристый, въ верхней части покрытъ пушкомъ. въ нижней—почти голый, у основанія съ влагалищами: листья только стеблевые, сѣровато-зеленые, матовые, съ продольными, сильно выдающимися жилками, иногда складчатые: нижніе—яйцевидно-ланцетные, туповатые или заостренные, средніе—продолговато-ланцетные, заостренные, верхніе—ланцетные, похожи на прилистники; колосъ 8—15-цвѣтковый; прицвѣтники ланцетные: нижніе—равны цвѣтамъ, верхніе или всѣ короче цвѣтовъ; цвѣты поникшіе; листочки околоцвѣтника сперва колокольчато собраны, потомъ расходящіеся: 2 наружные—яйцевидно-ланцетные, грязно-красновато-зеленые; 2 внутренніе—нѣсколько короче наружныхъ, туповатые, бѣлые, у основанія красноватые; губа равна листочкамъ околоцвѣтника, бѣлая, съ свѣтло-розовыми жилками, у основанія съ оранжевыми точками; передняя часть ея плоская, округлая, тупая, волнисто-городковая. задняя—въ видѣ желобка, по бокамъ съ 2 короткими, треугольными лопастями; завязь не скрученная, съ 6 ребрышками, пушистая. Цвѣты съ конца іюня до середины іюля. По болотамъ и болотистымъ лугамъ. Богородское. В. Мытищи, Иваново. Петрово (К.).—Горенки (Шатерниковъ).—Ольгино. Мож. у. (Ф. О.).—По берегу Тороповскаго озера, Мож. у. (В. и В. Ф.).—Болото, близъ Хомутова на Клязьмѣ, Бгр. у. (С.).—Машино, Дмит. у. (П.).



Epipactis palustris.

99. *Neóttia* L.

Всѣ листочки околоцвѣтника, исключая губы, сложены чашевидно; губа много длиннѣе листочковъ околоцвѣтника, на концѣ 2-лопастная, съ расходящимися и загibaющимися кнаружи лопастями, съ каждой стороны губы близъ середины по короткому тупому зубцу; столбецъ длинный.

загнутый впередъ, съ пыльниками, сидящими на немъ и прикрытыми языкообразнымъ придаткомъ носика; пыльца не склеенная, порошкообразная, пристаётъ къ железкѣ, сидящей на носикѣ.

261. *N. nidusavis* Rich. Пет. Кр. III, стр. 57. — Бух. II, № 397. — Бух. I, № 368. — Ф. О., № 7, p. 102. — Пет., стр. 227. — Кауф. II, № 720. — Цин., № 1411 — Кауф. I, стр. 478. — Lind., p. 168. — Ann. C. V, № 66.

Epipactis Nidus avis Crntz. Дв., № 832. — Макс., № 813. — Hoff. H., № 735^a. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 157.

Ophrys Nidus avis L. St. II, p. 52. — St. I, № 612.

Корневище горизонтальное, толстое, съ клубкомъ толстыхъ корней; все растеніе желтовато-бурое; стебель 20—40 см., въ верхней части покрытъ железками; листья только чешуйчато-влагалищные, съ заостренной верхушкой, числомъ 3—5; кисть удлиненная, внизу рѣдкая, къ верхушкѣ болѣе густая; прицвѣтники линейно-ланцетные, заостренные, равны или

короче $\frac{1}{2}$ овальной, голой или железистой завязи; листочки околоцвѣтника обратно-яйцевидно-ланцетные, всѣ равной длины. Цвѣты съ конца мая до середины іюля, зрѣлыя сѣмена со середины іюля. По лѣсамъ. Лосинный Островъ, Марѣино (К.). — Близъ Волинскаго (А.). — Купавна (Вохна), Бгр. у. (Макс.). — Гладышево (Ш.). — Невѣрово, Кзм. у., Шеламово, Вер. у. (Р.). — Останкино (Гольдб.). — Михайловское, Пдл. у. (Б.). — Усово, Звн. у., Григорово, Вер. у., Костино, Руз. у., Воробьевы горы (П.). — Быково, Брн. у. (Куль.). Близъ ст. Волоколамскъ, въ осиновомъ лѣсу (П. и Х.).



Neottia nidus avis.

100. *Listéra* R. Br.

Всѣ листочки околоцвѣтника, исключая губы, сложены шлемомъ или всѣ расходящіяся; губа много длиннѣе листочковъ околоцвѣтника, клиновидно-обратно-яйцевидная, по бокамъ безъ зубцовъ или у основанія съ зубцами, на концѣ 2-лопастная; столбецъ короткій; остальное какъ у *Neottia*.

262. *L. ovata* R. Br. Пет. Кр. III, стр. 57. — Бух. II, № 396. — Бух. I, № 367. — Ф. О., № 7, p. 102. — Пет., стр. 215. — Кауф. II, № 718. — Цин., № 1409. — Кауф. I, стр. 477. — Ann. C. I, № 47.

Epipactis ovata Crntz. Дв., № 833. — Макс., № 814. — Hoff. H., № 7360. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 157.

Ophrys ovata L. St. II, p. 52. — St. I, № 614.

Корневище цилиндрическое, почти горизонтальное, покрыто довольно толстыми корнями; стебель 30—60 см., цилиндрический, въ верхней части покрытъ железистыми волосками, быстро утолщается подъ листьями, у основанія съ влагалищами; листья широко-яйцевидные или широко-эллиптические, тупые, быстро переходятъ въ едва замѣтный кончикъ;

колосъ длинный, рѣдкоцвѣтный; прицвѣтники яйцевидные, заостренные, очень маленькіе, б. ч. короче цвѣтоножекъ; листочки околоцвѣтника собраны въ шлемъ, зеленые; 2 наружные—яйцевидные, туповатые; 2 вну-



Listera ovata



Listera cordata

тренніе—немного короче и почти вдвое уже наружныхъ; губа въ 2 раза длиннѣе околоцвѣтника, желтоватая, клиновидно-обратно-яйцевидная, глубоко-2-лопастная, лопасти ея туповатые; завязь не скрученная. Цвѣты въ іюнѣ до середины іюля, зрѣлыя сѣмена со середины іюля. Часто, по сырымъ лугамъ, лѣсамъ и кустарникамъ.

263. *L. cordata* R. Br. Пет. Кр. III, стр. 57—Пет., стр. 215.—Кауф. II, стр. 719.—Цин., № 1410.—Кауф. I, стр. 477.

Epipactis cordata Schrk. Дв., № 834.—Макс., № 815.—Gold. Sp., p. 137.—Mart., p. 157.—Lib. Tr., p. 124.

Cymbidium cordatum, Lon., p. 283.

Ophrys cordata L. Дв., № 834.—Макс., № 815.—Mart., p. 157.—Lon., p. 283.

Корневище тонкое, ползучее, съ тонкими корешками; стебель 6—25 см., тонкій, въ верхней части слегка ребристый, покрытъ довольно рѣдкимъ пушкомъ, у основанія съ 1—2 влагалищами; листья (2) сидятъ ниже середины стебля, треугольно-сердцевидные, почти сидячіе, съ выдающимися жилками, тупые, съ очень маленькимъ остриемъ, сверху ярко-зеленые, снизу еще-зеленые; кисть маленькая, рѣдкая, 6—12-цвѣтковая; прицвѣтники яйцевидно-треугольные, заостренные, короче очень тонкихъ цвѣтоножекъ; листочки околоцвѣтника продолговатые, туповатые, раскрытые, 2 наружные—зеленые, 2 внутренніе—снаружи зеленые, внутри лилово-пурпуровые; губа тоже лилово-пурпуровая, въ 2 раза длиннѣе околоцвѣтника, удлинненно-язычковидная, у основанія по бокамъ имѣетъ по одному туповатому зубцу, верхушка ея глубоко надрѣзанная на линейныя заостренныя лопасти; завязь веретенообразная, не скрученная. Цвѣты въ концѣ мая. По сырымъ лѣсамъ, Горенки (Лондесъ). — Раменское.

Бри. у., въ хвойномъ лѣсу среди густаго мохового покрова. только два экземпляра (П. и С.).

101. *Goodyera R. Br.*

Два внутренніе листочка околоцвѣтника и срединный наружный собраны шлемомъ, два боковые наружные—отогнуты; губа нѣсколько короче околоцвѣтника, въ нижней своей части съ мѣшкообразнымъ углубленіемъ и съ туповатой или слегка заостренной, отогнутой верхушкой; столбецъ короткій; пыльники сидятъ на короткихъ ножкахъ; носикъ подъ рыльцемъ двурогій; пыльцевыя массы съ железкой.

264. *G. repens R. Br.* Пет. Кр. III, стр. 57.—Ф. Б., № 94.—Ф. О., № 7, р. 102.—Пет., стр. 196.—Кауф. II, № 721.—Цик., № 1415.—Кауф. I, стр. 479.—Ann. C. I, № 49.

Neottia repens Sw. Дв., № 822—Макс., № 807.—Нолл. II., № 7352.—Gold. C., р. 22.—Mart., р. 155.

Satyrium repens L. St. II, р. 52.—St. I, № 611.

Корневище ползучее, членистое, мясистое, пускаетъ длинныя побѣги, оканчивающіеся розеткой листьевъ; стебель у основанія приподнимающійся, потомъ прямостоящій, 10—25 см., весь или только въ верхней части покрытъ короткими, железистыми волосками; листья у основанія стебля и въ нижней



Goodyera repens.

его части продолговатые, яйцевидные или эллиптическіе, б. ч. туповатые, мясистые, переходятъ въ широкій крылатый черешокъ; стеблевые листья похожи на прицвѣтники; кисть длинная, нѣсколько скрученная, однобокая; прицвѣтники линейные, заостренные, съ 1 жилкой, равны завязи; 2 наружные листочка околоцвѣтника продолговато-яйцевидные, туповатые, на спинкѣ съ железистыми волосками, какъ и срединный, 2 внутренніе боковые—на спинкѣ голые; губа равна наружнымъ боковымъ листочкамъ, задняя ея половина образуетъ мѣшечекъ, передняя—сужена въ короткій, язычковидный кончикъ, отогнутый книзу; завязь веретенообразная, съ 3 гранями, покрыта железистыми волосками; цвѣты бѣлые. Цвѣтетъ съ $\frac{2}{2}$ іюля до середины августа. Въ хвойныхъ лѣсахъ. Всесвятская роща, сосновая роща

близъ Иванькова, Лосинный Островъ (К.)—Завидово, Клин. у. (Ш.).—Перово (Гольдб.).—Петровское, Бутырки (Мар.).—Горенки (Шатерниковъ).—Серебряный боръ (Г. О.).—Куровскій лѣсъ, Мож. у. (Ф. О.).—Отрада, Срп. у. (Ш.).—Коншинскій и Шатовскій лѣсъ, Срп. у. (Г. О.).—Лѣсъ близъ Михнева, Бри. у. (П. и С.).—Щекавцево, по р. Дубенкѣ, Бгр. у., (П.).

102. *Coralliorrhiza Hall.*

Два боковые внутренніе листочка околоцвѣтника и срединный наружный стиснуты въ шлемъ; два боковые наружные—отстоящіе и нѣсколько

отогнуты книзу, длиннѣе плема; губа овальная, на верхушкѣ округлая, иногда съ слабой выемкой, съ каждой стороны губы близъ середины находится по одному тупому зубцу; столбецъ длинный, нѣсколько согнутый вперед; половинки гнѣздъ пыльника лежатъ одна на другой.

265. *C. innata* R. Br. Пет. Кр. III, стр. 58.—Бух. II, стр. 39.—Ф. Б., № 95.—Ф. О., № 7, p. 102.—Пет., стр. 170.—Кауф. II, № 722.—Гор., № 41.—Цин., № 1386.—Кауф. I, стр. 479.

Cymbidium Corallorhizon Sw. Дв., № 836.—Макс., № 818.—Gold. C., p. 22.—Gold. Sp., p. 137.—Mart., p. 157.—Lib. Tr., p. 152.—Lon., p. 115.

Корневище почти горизонтальное, очень мясистое, съ развѣтвленіями наподобіе коралла; стебель тонкій, 10—25 см., съ продольными линиями; настоящихъ листьевъ нѣтъ, стебель несетъ только

нѣсколько вздутыхъ влагалищъ, оканчивающихся широко-треугольнымъ остриемъ; цвѣточная кисть рѣдкая, 4—12-цвѣтковая; прицвѣтники очень маленькіе, короче цвѣтоножекъ, пленчатые, треугольные; 2 наружные листочка околоцвѣтника линейно-ланцетные, заостренныя, зеленые, иногда съ бурыми или буро-красными кончиками, какъ и 2 внутренніе; губа бѣлая, вершина ея яйцевидная, часто выемчатая, сверху близъ основанія съ 2 продольными полосками и съ красными крапинками. Цвѣты во $\frac{3}{2}$ мая и въ началѣ іюня. По сырѣмъ лѣсамъ и болотистымъ тѣнистымъ мѣстамъ, рѣже по моховымъ болотамъ. Лосинный Островъ, Кусково; Захарово, Кн. у. (П.).—Купавна, Бгр. у., Соколыки (Ген.).—Петровское-Разумовское (Г.).—



Corallorhiza innata.

Близъ (Ѣкирина, Пдл. у. (Я. В. Байковъ).—Химки (Ф. О. и Ф. Б.).—Аксентьево, Мож. у. (Ф. О.).—Собольки, Мож. у. (Ф. Б. и Мос.).—Карачарово, Кн. у. (П.).—Мытищи между Рупосовымъ и Черкизовымъ въ лѣсу, болото истоковъ Яузы (С.).—Болото близъ Удѣльной, по бер. р. Македоновки, Моск.-Каз. ж. д. (Куль).

103. *Liparis* Rich.

Два наружные и два внутренніе листочка околоцвѣтника линейные, почти равные, срединный внутренній—шире остальныхъ; губа нѣсколько короче боковыхъ, по бокамъ почти у основанія съ выемками и по краямъ мелко-зубчатая; столбецъ длинный и нѣсколько согнутъ вперед; пыльники съ перепончатымъ придаткомъ, половинки его гнѣздъ лежатъ одна возлѣ другой.

266. *Loeselii* Rich. Пет. Кр. III, стр. 58. Пет., стр. 215.—Цин., № 1389.

Sturmia Loeselii Rehb. Ф. Б., № 96.—Кауф. II, № 723.—Пурп., стр. 89.—Кауф. I, стр. 480.

Корневище очень короткое, съ тонкими корнями; стебель 3-гранный, 6—20 см., основаніе его вздуто наподобіе яйцевиднаго, зеленого клубня,

окруженного влагалищами старых листьевъ; всѣхъ листьевъ 5: основаніе стебли окружено 3 влагалищными чешуевидными листьями, надъ которыми сидятъ 2 продолговато-ланцетныхъ, свѣтло-зеленыхъ листа, переходящихъ въ черешокъ; кисть рѣдкоцвѣтная, о 3—8 цвѣтахъ; прицвѣтники маленькіе, пленчатые, треугольные, равны цвѣтоножкамъ или короче ихъ; листочки околоцвѣтника расходящіеся, линейные, рѣже линейно-ланцетные, б. ч. туповатые, зеленые; губа овальная, тупая, равна листочкамъ околоцвѣтника; завязь 3-гранная. Цвѣтетъ весь июнь, плоды съ $\frac{2}{2}$ июля. По моховымъ торфянымъ болотамъ. Богородское (П.).—Тростенское озеро, Руз. у. (Ф. О.), тамъ же обильно (П. и С.).—Озеро Нерское, близъ с. Озерцакаго, Мос. у. (Ф. В.).

104. *Microstylis* Lindl.

Два боковые внутренніе листочка околоцвѣтника линейные, равны двумъ ланцетнымъ наружнымъ; губа вогнутая, ланцетная, короче остальныхъ листочковъ околоцвѣтника, сердцевидно охватываетъ короткій столбецъ; носикъ треугольный, короче пыльниковъ; половинки гнѣздъ пыльника лежатъ одна возлѣ другой.

267. *M. monophyllos* Lindl. Пет. Кр. III, стр. 59. — Ф. О., № 7, p. 102. — Пет., стр. 224. — Цин., № 1387.

Malaxis monophyllos Sw. Кауф. II, № 724. — Кауф. I, стр. 480. — Lindl., p. 168. — Ann. C. III, № 260. — Дв., № 835. — Макс., № 817. — Hoff. H., № 7364. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 157.

Ophrys monophyllos L. St. II, p. 52.

Корневище очень короткое, съ тонкими корнями; стебель 8—40 см., прямостоящій, 3-гранный. у основанія расширенный нано подобіе клубня,



Liparis Loeselti



Microstylis monophyllos

съ чешуевидными влагалищами; листь яйцевидный или продолговатый, заостренный или туповатый, съ многочисленными продольными жилками, желтовато-зеленый (растеніе съ 2 листьями: *M. diphyllus* Lindl.); кисть очень

длинная, 4—18 см. дл., многоцвѣтковая; цвѣты зеленые; прицвѣтники ланцетные, заостренные, короче цвѣтоножекъ; завязь не скрученная, въ 3 раза короче цвѣтоножки. Цвѣтеть съ $\frac{2}{2}$ июня и $\frac{1}{2}$ июля. По сырымъ лѣсамъ. Воробьевы горы, Пяныково, Лоспный Островъ; Кунавна, Бгр. у. (К.).—Спасское, Дмт. у. (Ш.).—Трепарево, Мож. у. (г-жа Армфельдъ).—Кунцово (А.).—Горенки (Гольдб.). Борисовскій словый лѣсъ, Мож. у., между Раманковымъ и Михайловымъ, Мож. у., Кочергино. Матренки. Дмт. у.. Звенигородъ. подъ Шустынымъ, Дмт. у. (П.).—Ст. Удѣльная—близъ Быкова у р. Македоновки, Брн. у. (Куль.).

105. *Malaxis Rich.*

Два наружные листочка околоцвѣтника яйцевидно-продолговатые, много крупнѣе 3 внутреннихъ; два боковые внутреннiе отогнуты и сидятъ подъ прямымъ угломъ къ срединному; губа яйцевидная, вогнутая, слегка вытянутая, сердцевидно охватываетъ короткiй столбецъ, носикъ 3-лопастной, превышаетъ пыльники; половинки гнѣздъ пыльника лежатъ одна на другой.

268. *M. paludosa Sw.* Ф. оз.—Кауф. II, стр. 496.—Цин., № 1388.—Кауф. I, стр. 481.—Макс., № 816.

Корневище очень тонкое, часто горизонтальное, почти безъ корней, клубень яйцевидный, слегка 4-гранный, лежачiй; стебель у основанiя приподнимающiйся, 7—20 см., 5-гранный, съ чешуевидными влагалищами; листьевъ 3—4, верхнiй листъ охватываетъ молодой клубень будущаго года, отчего основанiе его вздуто, остальные листья яйцевидные или продолговатые, б. ч. тупые или слабо-заостренные, нѣсколько толстые, съ 3—7 продольными жилками, желтовато-зеленые; кисть многоцвѣтковая, вначалѣ нѣсколько скрученная, иногда равна $\frac{1}{2}$ всего растенiя; цвѣты маленькiе, желто-зеленые; прицвѣтники изъ клиновиднаго основанiя ланцетные, заостренные, равны цвѣтоножкамъ; завязь не скрученная. Цвѣтеть во $\frac{2}{2}$ июля. По моховымъ тонкимъ болотамъ. Вѣроятно просматривается: все растенiе погружено въ покровъ мха, выставляется изъ него только цвѣточная кисть, имѣющая видъ тонкой засыхающей вѣточки. Озеро Круглое, близъ дер. Рыбаки, Мос. у. (Ф.Б.).—Озеро Перское, близъ с. Озерцаго, Мос. у. (П. и С.).



Malaxis paludosa

Алфавитный указатель семействъ и родовъ.

	<i>Стр.</i>		<i>Стр.</i>
Abies D. C.	58	Convallaria L.	244
Abietineae Rich.	58	Coralliorrhiza Hall.	268
Acorus L.	216	Cupressineae Rich.	63
Agrostis L.	116	Cynosurus L.	150
Alisma L.	86	Cyperaceae Juss.	166
Alismataceae Lam.	86	Cyperus L.	167
Allium L.	234	Cypripedium L.	250
Alopecurus L.	112	Cystopteris Bernh.	38
Anthoxanthum L.	102		
Apera Adans.	119	Dactylis L.	134
Araceae Neck	216	Deschampsia P. B.	129
Arrhenatherum P. B.	124		
Arundo Tourn.	130	Elodea Rich. et Mchx.	90
Asparageae Juss.	241	Epipactis Rich.	264
Asparagus L.	241	Epipogon Gmel.	262
Aspidium Sw.	39	Equisetaceae D. C.	49
Athyrium Roth.	38	Equisetum L.	49
Atropis Griesb.	145	Eriophorum L.	175
Avena L.	125		
		Festuca L.	146
Beckmannia Host.	108	Fritillaria L.	239
Blysmus Panz.	174		
Botrychium Sw.	47	Gagea Salisb.	232
Brachypodium P. B.	157	Gladiolus L.	247
Briza L.	142	Glyceria R. Br.	143
Bromus L.	151	Goodyera R. Br.	268
Butomaceae Gray.	89	Gramineae Juss.	92
Butomus L.	89	Gymnadenia R. Br.	257
Calamagrostis Roth.	120	Heleocharis R. Br.	168
Calla L.	217	Herminium R. Br.	261
Carex L.	178	Hieracium Gmel.	102
Catabrosa P. B.	142	Holcus L.	123
Cephalanthera Rich.	263	Hordeum L.	163
Coeloglossum Hartm.	260	Hydrocharis L.	91
Colchichaceae D. C.	230	Hydrocharitaceae Aschr.	89

	<i>Cmp.</i>		<i>Cmp.</i>
Iridaceae Juss.	246	Panicum L.	104
Iris L.	246	Paris L.	245
		Phalaris L.	100
Juncaceae Vent.	219	Phleum L.	111
Juncaginaceae Lindl.	84	Picea Lk.	59
Juncus L.	220	Pinus L.	61
Juniperus L.	64	Platanthera Rich.	258
		Poa L.	135
Koeleria Pers.	133	Polygonatum Moench.	243
		Polypodiaceae Mart.	37
Larix D. C.	60	Potamogeton L.	73
Lemna L.	218	Potamogetonaceae Aschr.	73
Lemnaceae Dumort.	218	Pteridium Gleditsch.	46
Liliaceae D. C.	231		
Lilium L.	238	Rhynchospora Vahl.	168
Liparis Rich.	269	Sagittaria L.	88
Listera R. Br.	266	Scheuchzeria L.	84
Lolium L.	164	Scilla L.	240
Luzula D. C.	227	Scirpus L.	171
Lycopodiaceae D. C.	54	Scolochloa Link.	145
Lycopodium L.	54	Secale L.	162
		Setaria P. B.	106
Majanthemum Wigg.	242	Sparganiaceae Agardh.	69
Malaxis Rich.	271	Sparganium L.	69
Melica L.	132	Spirodela Schleid.	219
Microstylis Lindl.	270	Stipa L.	109
Milium L.	108	Stratiotes L.	90
Molinia Schrak.	131		
		Thuja Tourn.	63
Najadaceae Lindl.	83	Triglochin L.	85
Najas L.	83	Trisetum Pers.	128
Nardus L.	110	Triticum L.	158
Neottia L.	265	Tulipa L.	240
		Typha L.	68
Onoclea L.	45	Typhaceae Jaum. St. Hilaire	67
Ophioglossaceae R. Br.	46		
Ophioglossum L.	46	Veratrum L.	230
Orchidaceae Juss.	248		
Orchis L.	252	Zannichellia L.	82
Oryza Tourn.	100	Zea L.	103

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ФЛОРА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

СОСТАВИЛЪ
Д. П. Сырейщиковъ.

Подъ редакціей А. Н. Петунникова.

ЧАСТЬ II.



МОСКВА.

Складъ изданія въ книжномъ магазинѣ Торговаго Дома Лахтинъ, Сырейщиковъ и К^о.
Москва, Петровскія линіи, домъ Полякова.

1907.

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ

ФЛОРА

МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

— — —
СОСТАВИЛЪ

Д. П. Сырейщиковъ.

Подъ редакціей А. Н. Петунникова.

—
ЧАСТЬ II.



МОСКВА.

Складъ изданія въ книжномъ магазинѣ Торговаго Дома Лахтинъ, Сырейщиковъ и К^о.

Москва, Петровскія линіи, домъ Полякова.

1907.



МОСКВА.

Типо-литографія Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К^о. Пименовская улича, с. 2.
1907.

Издавая вторую часть Московской Флоры, считаю долгом высказать искреннюю благодарность П. В. Сюзеву, который прислалъ мнѣ изъ Пермской губерніи для просмотра свой московскій гербарій, хотя не могу не пожалѣть, что я могъ располагать лишь частью этого гербарія, большая половина котораго, какъ мнѣ сообщили П. В. Сюзевъ, пропала уже давно при перевозкѣ; тѣмъ не менѣе просмотрѣнный мною остатокъ этого гербарія представилъ богатый научный матеріалъ.

Новымъ матеріаломъ для Московской Флоры, который вошелъ во вторую часть и просмотрѣнъ А. Н. Петунниковымъ, послужилъ гербарій графини Е. Ф. Соллогубъ, превосходно собранный и очень точно опредѣленный.

Всѣ новинки, относящіяся къ первой части, а равно и ко второй, будутъ помѣщены въ концѣ третьей части.

Получая многократно упреки въ томъ, что въ первой части рядомъ съ латинскими названіями растений не были помѣщены русскія, я прилагаю въ концѣ этой книги алфавитный списокъ латинскихъ названій съ соотвѣтствующими русскими названіями растений, вошедшихъ какъ въ первую, такъ и во вторую часть; въ концѣ же третьей части будетъ приложенъ полный алфавитный списокъ всѣхъ русскихъ названій.

Д. Сырейчиковъ.

Москва.

12 апрѣля 1907 г.

Подотдѣль Angiospérmae.

Классъ Dicotylédones.

Подклассъ I. Archichlamýdeae.

1. Цвѣты безъ околоцвѣтника или околоцвѣтникъ простой, не обособленъ въ чашечку и вѣнчикъ. 2.

Цвѣты съ чашечкой и вѣнчикомъ или съ двойнымъ околоцвѣтникомъ. 32.

2. Кусты и деревья. 3.
Травянистыя растенія. 12.

3. Листья супротивные. (A. Negundo) *Aceraceae*.
Листья очередные. 4.

4. Мужскіе и женскіе цвѣты въ длинныхъ, густыхъ колосьяхъ (сережкахъ) или только мужскіе цвѣты въ колосьяхъ, иногда прерванныхъ, а женскіе—одиночные, въ пучкахъ или головкахъ. 5.
Мужскіе и женскіе цвѣты одиночные или скученные, но не въ сережкахъ, или же цвѣты обоеполые. 9.

5. Мужскіе и женскіе цвѣты въ густыхъ однополыхъ колосьяхъ (сережкахъ). 6.

Только мужскіе цвѣты въ густыхъ, повислыхъ колосьяхъ (сережкахъ), иногда прерванныхъ; женскіе цвѣты одиночные или пучками. 7.

6. Растенія однодомныя. *Betulaceae*.
Растенія двудомныя. *Salicaceae*.

7. Листья перистые. *Juglandaceae*.
Листья простые. 8.

8. Листья продолговатыя, выемчато-лопастныя, съ округлыми долями; основаніе плода заключено въ чашевидную плюску. (Quercus) *Fagaceae*.

Листья безъ лопастей, по краямъ пильчато-зубчатыя; весь плодъ заключенъ въ плюску, состоящую изъ листочковъ, основаніе которыхъ нѣсколько мясистое. (Corylus) *Betulaceae*.

9. Цвѣты однополые. (Hippophaë) *Elaeagnaceae*.
Цвѣты обоеполые. 10.

10. Деревья. Цвѣты очень мелкіе; околоцвѣтникъ 5 — 8-зубчатый; плодъ — крылатка. *Ulmaceae*.

Кусты. Отгнѣбъ вѣтчика 4-раздѣльный, розовый или желтый. 11.

11. Цвѣты розовые, появляются до листьевъ; листья зеленые, голые. *Thymelaeaceae*.

Цвѣты желтые или желто-зеленые, распускаются послѣ развитія листьевъ; листья серебристые съ шитовидными чешуйками.

Elaeagnaceae.

12. Болотныя или водяныя растенія съ мутовчатыми листьями. 13. Наземныя или водяныя растенія, но съ листьями не мутовчатыми. 14.

13. Листья линейные, цвѣты обоеполые, тычинка одна.

(*Hippuris*) *Halorrhagidaceae*.

Листья вильчато-раздѣльные, цвѣты однополые, тычинокъ много; растенія подводныя. *Ceratophyllaceae*.

14. Завязь сплюснутая, 4-лопастная, 4-гнѣздная, съ 2 нитевидными столбиками; плодъ изъ 4 орѣшковъ; растенія водяныя.

Callitricheae.

Завязь никогда не бываетъ 4-лопастной и плодъ не состоитъ изъ 4 орѣшковъ. 15.

15. Листья супротивные, иногда только нижніе, а верхніе очередные. 16.

Все листья очередные. 20.

16. Листья цѣльнокрайніе, простые. *Caryophyllaceae*.

Листья простые, сложные или лопастные, но по краямъ зубчатые. 17.

17. Листья дланевидно-раздѣльные или 3—5-лопастные. 18.

Листья простые, не лопастные. 19.

18. Растенія двудомныя, жгучихъ волосковъ нѣтъ. *Moraceae*.

Растенія однодомныя съ жгучими волосками, цвѣты однополые.

Urticaceae.

19. Растеніе покрыто длинными, жгучими щетинистыми волосками; женскіе цвѣты съ простой завязью и сидячимъ рыльцемъ въ видѣ кисточки. *Urticaceae*.

Растеніе безъ жгучихъ волосковъ; женскіе цвѣты съ двугнѣздной завязью и двумя столбиками.

(*Mercurialis*) *Euphorbiaceae*.

20. Листья съ прилистниками или съ раструбомъ, или же у основанія съ 6. или м. длиннымъ, закрытымъ или открытымъ влагалищемъ. 21.

Листья безъ прилистниковъ, раструбовъ или влагалищъ. 24.

21. Листья съ приросшими къ черешку листа прилистниками.

(*Alchemilla*, *Sanguisorba*) *Rosaceae*.

Листья съ влагалищами или съ раструбомъ. 22.

22. Листья съ раструбомъ, охватывающимъ стебель.

Polygonaceae.

Листья у основанія съ влагалищемъ, открытымъ съ наружной стороны 23.

23. Цвѣты въ сложныхъ зонтикахъ или головкахъ, мелкіе; плодъ—вислоплодникъ, распадается вдоль на двѣ сѣмянки.

Umbelliferae.

Цвѣты не въ сложныхъ зонтикахъ и не въ головкахъ, ярко-желтые, или же цвѣты мелкіе въ густыхъ соцветіяхъ, и тогда тычинки сильно выступаютъ изъ околоцвѣтника и часто повислыя; плодъ—не вислоплодникъ. *Ranunculaceae.*

24. Листья, по крайней мѣрѣ нижніе, раздѣльные, дланевидные, перистые или перисто-раздѣльные. 25.

Листья простые, стрѣловидные, копьевидные, рѣдко съ лопастями или у основанія сердцевидные. 26.

25. Пестиковъ нѣсколько. (Anemone) *Ranunculaceae.*
Пестикъ одинъ. *Cruciferae.*

26. Листья полукруглые или почковидные. 27.

Листья не полукруглые и не почковидные. 28.

27. Маленькое растеніе: околоцвѣтникъ правильный, 4-раздѣльный. (Chrysosplenium) *Saxifragaceae.*

Крупное растеніе или вьющійся кустарникъ; околоцвѣтникъ 3-раздѣльный, красно-бурый или съ неправильнымъ, язычковиднымъ отгибомъ, или же околоцвѣтникъ трубчатый, съ 3-лопастнымъ отгибомъ. *Aristolochiaceae.*

28. Цвѣты крупныя, одиночныя, голубыя, съ оберткой изъ 3 листочковъ въ видѣ чашечки, появляются ранней весной до распусканія листьевъ. (Hepatica) *Ranunculaceae.*

Цвѣты мелкіе, невзрачныя. 29.

29. Трехлопастная завязь и 10—12 тычинокъ на ножкахъ окружены общей оберткой колокольчато-бокальчатой формы въ видѣ чашечки съ 4—5 медовымъ железами, образуютъ цвѣточный пучокъ. Растенія съ млечнымъ сокомъ. *Euphorbiaceae.*

Завязь простая; тычинки не сочлененныя. Растенія безъ млечнаго сока. 30.

30. Завязь вполнѣ нижняя. *Santalaceae.*
Завязь верхняя, очень рѣдко полунижняя. 31.

31. Околоцвѣтникъ травянистый или мясистый. *Chenopodiaceae.*
Околоцвѣтникъ сухой, пленчатый. *Amarantaceae.*

32. Вѣнчикъ 6. или м. сростнолепестный, опадаетъ цѣликомъ. 33.

Лепестки въ вѣнчикѣ свободныя, не сросшіеся, опадаютъ врѣзь. 35.

33. Цвѣты правильныя. *Portulacaceae.*

Цвѣты неправильныя. 34.

34. Тычинокъ 8, сросшихся въ 2 пучка; чашечка изъ 2 большихъ листочковъ, окрашенныхъ въ цвѣтъ вѣнчика, и 3 маленькихъ, зеленыхъ; листья простые. *Polygalaceae.*

- Тычинокъ 10, изъ коихъ 9 сросшихся въ трубку и 1 свободная;
чашечка трубчатая, 5-зубчатая; листья тройчатые.
(*Trifolium*) *Leguminosae*.
35. Завязь нижняя или полунижняя. 36.
Завязь вполне верхняя. 43.
36. Кусты и деревья. 37.
Травянистые растенія. 40.
37. Листья очередные. 38.
Листья супротивные. 39.
38. Тычинокъ 5. (*Ribes*) *Saxifragaceae*.
Тычинокъ много. (*Pomoideae*) *Rosaceae*.
39. Тычинокъ много; плодъ—коробочка.
(*Philadelphus*) *Saxifragaceae*.
Тычинокъ 4; плодъ—мясистая костянка. *Cornaceae*.
40. Цвѣты однополые; листья гребенчато-раздѣльные.
Halenorrhagilaceae.
Цвѣты обоеполые. 41.
41. Столбикъ 1; цвѣты 4-ые или двойчатые. *Oenotheraceae*.
Столбиковъ 2; цвѣты пятерные. 42.
42. Соцвѣтіе—сложный зонтикъ; тычинокъ 5; плодъ—всеплодный,
распадается на двѣ сѣмянки. *Umbelliferae*.
Соцвѣтіе—полузонтикъ; тычинокъ 10; плодъ—двурогая коро-
бочка. *Saxifragaceae*.
43. Цвѣты съ 2 или со многими пестиками; пестики не сросшіеся или
сросшіеся между собой только основаніемъ; каждый пестикъ
только съ 1 столбикомъ. 44.
Цвѣтокъ только съ 1 пестикомъ; столбикъ одинъ или ихъ нѣ-
сколько. 46.
44. Листья толстые, мясистые. *Crassulaceae*.
Листья не мясистые. 45.
45. Лепестки и тычинки прикрѣплены къ краю бокальчатаго цвѣ-
толожка или къ внѣшнему краю подпестичнаго диска.
Rosaceae.
Лепестки и тычинки прикрѣплены у основанія пестиковъ.
Ranunculaceae.
46. Цвѣты неправильные. 47.
Цвѣты правильные. 52.
47. Одинъ изъ лепестковъ или чашелистиковъ со шпорой. 48.
Шпоры нѣтъ. 50.
48. Чашелистикъ со шпорой желтый, много крупнѣе остальныхъ ча-
шелистиковъ и лепестковъ. *Balsaminaceae*.
Чашелистики мельче лепестковъ, безъ шпоры; изъ 5 лепестковъ
одинъ со шпорой. 49.
49. Только два маленькихъ чашелистика. скоро опадающихъ; листья
безъ прилистниковъ. *Fumariaceae*.

Чашечка 5-лиственная, остающаяся; листья съ прилистниками.

Violaceae.

50. Чашечка сростнолистная, трубчатая; всѣ 10 тычинокъ срастись въ трубку или 9 срастись и одна свободная.

Leguminosae.

Чашечка свободнолистная; тычинки не срослись. 51.

51. Деревья; листья пальчатые.

Hippocastanaceae.

Травы; листья простые.

(*Epilobium angustifolium*) *Onocheaceae.*

52. Чашечка 2-лиственная, остающаяся или скоро опадающая. 53.

Чашечка изъ 3—4—5 или болѣе листочковъ. 54.

53. Тычинокъ 3; листья нѣсколько мясистые. *Portulacaceae.*

Тычинокъ много; листья не мясистые; растенія съ млечнымъ сокомъ. *Papaveraceae.*

54. Кусты или деревья. 55.

Травянистыя растенія. 61.

55. Тычинокъ 4 или 5, по числу долей околоцвѣтника. 56.

Тычинокъ болѣе пяти. 58.

56. Тычинки чередуются съ долями вѣнчика. *Celastraceae.*

Тычинки супротивны долямъ вѣнчика. 57.

57. Кустъ съ простыми листьями. *Rhamnaceae.*

Выходящій или лазящій кустарникъ съ усиками и съ пальчатыми листьями. *Vitaceae.*

58. Подъ каждымъ листомъ тройчато-раздѣльная колючка.

Berberidaceae.

Колючекъ подъ листьями нѣтъ. 59.

59. Плодъ изъ 2 сросшихся крылатокъ; тычинокъ 8, рѣдко 5—12; отъ недоразвитія цвѣты часто бываютъ то мужскіе, то женскіе; листья б. ч. супротивные. *Aceraceae.*

Плодъ не крылатка; тычинокъ 15 и болѣе; листья очередные. 60.

60. Тычинки и лепестки прикрѣплены къ краю бокальчатаго цвѣтоложа; плодъ—сухая или мясистая костянка.

(*Prunoideae*) *Rosaceae.*

Тычинки прикрѣплены у основанія пестика; плодъ—орѣшекъ; цвѣты въ полузонтикахъ съ прицвѣтнымъ крыломъ у основанія соцвѣтія. *Umbellaceae.*

61. Листья очередные, у основанія съ раструбомъ.

Polygonaceae.

Листья безъ раструба. 62.

62. Листья сложные, тройчатые. *Oxalidaceae.*

Листья простые. 63.

63. Листья съ прилистниками. 64.

Листья безъ прилистниковъ. 66.

64. Чашечка 5-раздѣльная, съ подчашиемъ изъ 3 листочковъ; тычинокъ много, сросшихся нитями въ пучокъ. *Malvaceae.*

- Чашечка безъ подчашія; тычинокъ 3—5—10, свободныхъ или сросшихся только основаніемъ. 65.
65. Листья пальчато-или перисто-раздѣльные или лопастные; плодъ распадается на 5 сѣмянокъ, отдѣляющихся отъ цвѣточнаго столбца снизу вверхъ вмѣстѣ съ остающимся столбикомъ.
Geraniaceae.
- Листья цѣльные и цѣльнокрайніе; плодъ односѣменная или многосѣменная коробочка.
Caryophyllaceae.
66. Чашечка сростнолистная, трубчатая. 67.
Чашечка раздѣльнолистная. 68.
67. Столбикъ 1; тычинокъ 6 или 12.
Lythraceae.
- Столбиковъ 2—5; тычинокъ 10. (Silenoideae) *Caryophyllaceae.*
68. Тычинокъ 6, изъ нихъ 4 длинныхъ и 2 короткихъ; плодъ 6. ч. вскрывающійся стручокъ, рѣже орѣшекъ.
Cruciferae.
- Тычинокъ много, равной или неравной длины, или тычинокъ 5 длинныхъ и 5 короткихъ, или же тычинки срались пучкомъ. 69.
69. Тычинокъ болѣе десяти. 70.
Тычинокъ не болѣе десяти. 72.
70. Растенія водяныя съ плавающими листьями; рыльце блюдчатое, лучистое.
Nymphaeaceae.
- Наземныя растенія; рыльце не лучистое. 71.
71. Тычинки срались въ 3 пучка; завязь съ 3 столбиками.
Guttiferae.
- Тычинки не срались; завязь съ 1 столбикомъ. *Cistaceae.*
72. Между вѣтчикомъ и тычинками коронка изъ 5 пальчато-раздѣльныхъ железистыхъ пластинокъ (стаминодій).
(*Parnassia*) *Sarifragaceae.*
- Пальчато-раздѣльныхъ железистыхъ пластинокъ (стаминодій) нѣтъ. 73.
73. Листья только корневые, въ почкосложеніи свернуты улиткой внутрь, густо усажены стебельчатыми железами.
Droseraceae.
- Листья корневые и стеблевые безъ стебельчатыхъ железокъ. 74.
74. Завязь одногнѣздная.
(*Alsinoideae*) *Caryophyllaceae.*
- Завязь многогнѣздная. 75.
75. Чашелистики основаніемъ сросшіеся; тычинокъ 3, 6 или 8; лепестковъ 3 или 4. Маленькія, 6. ч. водяныя растенія.
Elatinaceae.
- Чашелистики вполне свободные; тычинокъ 8 или 10, половина изъ нихъ безъ пыльниковъ; лепестковъ 4 или 5. Растенія наземныя.
Linaceae.

Archichlamydeae.

Порядокъ Salicales.

25. Сем. Salicaceae Rich.

Деревья или кустарники двудомные, съ очередными, простыми, рѣже лопастными листьями съ прилистниками. Цвѣты въ сережкахъ, т.-е. колоскахъ, цѣликомъ отваливающихся по отцвѣтаніи или созрѣваніи; околоцвѣтника нѣтъ, и тогда его замѣняютъ 1 или 2 железки, или же онъ чашевидный или блюдчатый; тычинокъ 2—30, свободныхъ, рѣже сросшихся; пыльники вскрываются наружу; пестикъ одинъ, состоитъ изъ 2 плодосетиковъ; столбикъ одинъ, съ 2 часто двураздѣльными рыльцами; завязь верхняя, одногнѣздная, съ 2 средними, стѣнными сѣменосами; плодъ—коробочка двустворчатая (рѣже 3—4-створчатая) съ отгибающимися створками; сѣмянъ много, безъ бѣлка, съ хохолкомъ волосковъ у основанія. Два рода: *Salix* и *Populus*.

106. *Salix* L.

Цвѣты въ сережкахъ сидячихъ или на ножкахъ; околоцвѣтника нѣтъ, вмѣсто него 1—2 железки; прицвѣтная чешуйка одна, цѣльная; тычинокъ 2—12; листья простые, съ краями б. ч. пильчатыми, на короткихъ черешкахъ; почки боковыя ¹⁾.

Обзоръ рода *Salix*.

A. Прицвѣтныя чешуйки зеленныя или желто-зеленыя.

I. *Fragiles* Koch. Въ мужскихъ и женскихъ цвѣтахъ по 2 медовыхъ железки.

S. pentandra, *S. fragilis*.

II. *Triandrae* Pax. Въ мужскихъ цвѣтахъ 2 медовыхъ железки, въ женскихъ одна.

S. triandra, *S. alba*.

¹⁾ Для опредѣленія нѣтъ надо имѣть сережки и вполне развитые листья съ тѣхъ же самыхъ кустовъ или деревьевъ, съ которыхъ собраны сережки; для этого весной собираютъ побѣгущія вѣтки и привѣшиваютъ на тѣ же кусты ярлыки съ NN, по возможности безамѣтно, чтобы ихъ кто-либо не сорвалъ; для болѣе легкаго нахожденія помѣщеннаго куста дѣломъ, можно дѣлать еще глубокіе надрѣзы на корѣ и зачерчивать планъ мѣстности; слѣдуетъ брать вполне развитыя годовалыя вѣтви, а не длинныя побѣги, на которыхъ листья и прилистники имѣютъ иную форму и которые не годятся для опредѣленія.

Б. Прицвѣтныя чешуйки двуцвѣтныя: къ верхушкѣ темнѣ окрашены; въ мужскихъ и женскихъ цвѣтахъ по одной медовой железкѣ.

а. Тычиночныя нити свободныя.

III. *Incubacae* Fr. Мелкіе кустарники съ подземнымъ ползучимъ стволѣмъ.

S. repens, *S. myrtilloides*.

IV. *Phylicifoliae* Anders. Маленькія деревца или кустарники безъ ползучихъ стволѣвъ; столбики длинныя; листья болѣе или менѣе голые.

S. nigricans, *S. phylicifolia*.

V. *Cápreae* Anders. Столбикъ короткій или его нѣтъ.

S. livida, *S. aurita*, *S. caprea*, *S. cinerea*.

VI. *Gláuceae* Anders. Столбики длинныя; листья, особенно молодые, съ обѣихъ сторонъ покрыты густымъ войлокомъ.

S. lapponum.

VII. *Pruinósae* Koch. Кусты съ узкими, ланцетными листьями; коробочка голая.

S. acutifolia.

VIII. *Viminales* Koch. Кусты съ узкими, линейными листьями; коробочка опушенная.

S. Gmelinii.

б. Тычиночныя нити сражены до пыльниковъ.

IX. *Purpureae* Koch.

S. purpurea.

Опредѣлитель видовъ ивъ.

1. Цвѣтушія сережки на боковыхъ вѣточкахъ, покрытыхъ развернувшимися листьями; листовые черешки вверху съ железистыми бородавочками; прицвѣтныя чешуйки одноцвѣтныя, желтыя или желто-зеленыя; мужскіе цвѣты съ 2 усѣченными медовыми железками—переднею и заднею короткою. 2.

Цвѣтушія сережки сидѣчія, безъ листьевъ или на короткихъ ножкахъ съ только что развертывающимися листьями; листовая черешокъ безъ железистыхъ бородавочекъ; прицвѣтныя чешуйки двуцвѣтныя,—къ верхушкѣ черповатыя или ржаво-бурыя, очень рѣдко одноцвѣтныя; всѣ цвѣтки только съ одною задней медовой железкой. 11.

2. Листья, какъ молодые, такъ и взрослые, совершенно голые; молодые иногда липкіе. 3.

Листья покрыты б. или м. густо волосами, иногда только молодые покрыты волосами, а взрослые—голые или почти голые. 6.

3. Тычинокъ всегда 2. Высокое дерево. *S. fragilis* L.

Тычинокъ 3—10, очень рѣдко 2, но тогда въ той же сережкѣ

попадаютъ цвѣты съ большимъ числомъ тычинокъ. Кустъ, рѣже не высокое дерево. 4.

4. Кора у вѣтокъ тусклая; тычинокъ всегда 3; у женскихъ цвѣтовъ 1 медовая железка; ножка завязи ¹⁾ въ 3—5 разъ длиннѣе железки; листья нѣсколько кожистые, слегка лоснящіеся или тусклые.

S. triandra L.

Кора у вѣтокъ лоснящаяся; тычинокъ 5—10 (рѣдко въ одной и той же сережкѣ цвѣты съ 2—5 тычинками); у женскихъ цвѣтовъ 2 медовыя железки; ножка завязи равна железкѣ или вдвое длиннѣе ея; листья почти кожистые, съ верхней стороны лоснящіеся. 5.

5. Тычинокъ 5—8—10; прицвѣтныя чешуйки у основанія или до середины коротко-волосистыя, по верхнему краю коротко рѣсничатые; листья въ 2—3 раза длиннѣе ширины.

S. pentandra L.

Тычинокъ 2—5; прицвѣтныя чешуйки по всей поверхности коротко-волосистыя, по верхнему краю съ длинными волосками; листья въ $3\frac{1}{2}$ —4 раза длиннѣе ширины.

S. cuspidata Schultz.

6. Кора на годовалыхъ вѣтвяхъ лоснящаяся. 7.

Кора на годовалыхъ вѣтвяхъ тусклая. 9.

7. Прилистники почковидно-яйцевидные, остаются до осени.

S. alopecuroides Tausch.

Прилистники яйцевидные или продолговато-яйцевидные, рано опадаютъ, при взрослыхъ листьяхъ ихъ нѣтъ. 8.

8. Тычинокъ 3—6 (очень рѣдко 2); железокъ у женскихъ цвѣтовъ двѣ.

S. hexandra Ehrh.

Тычинокъ всегда 2; железокъ у женскихъ цвѣтовъ одна.

S. viridis Fr.

9. Тычинокъ всегда 3; ножка завязи въ 3—5 разъ длиннѣе железки.

S. triandra L.

Тычинокъ всегда 2; ножка завязи короче железки или равна ей. 10.

10. Взрослые листья съ нижней стороны сѣрые или сизо-сѣрые, покрыты прижатыми волосками б. или м. густо, съ верхней—тусклые, б. ч. съ рѣдкими волосками.

S. alba L.

Взрослые листья съ нижней стороны свѣтло-зеленые или сизо-зеленые, голые или почти голые, сверху темно-зеленые или тускло-зеленые, тоже голые.

S. viridis Fr.

11. Молодыя вѣтви и взрослые листья съ обѣихъ сторонъ голые, снизу сизые; молодые листья слегка пушистые или съ рѣдкими шелковистыми волосками, или же голые. 12.

Молодыя вѣтви опушенные, взрослые листья съ обѣихъ сторонъ или только съ одной стороны пушистые; молодые листья сильно

¹⁾ Ножка завязи послѣ опыленія б. ч. начинаетъ удлиняться, и когда говорится о ея длинѣ, то подразумѣвается длина во время цвѣтенія.

пушистые или сплошь шелковистые, или же взрослые листья почти голые, но тогда вѣтви и черешки у листьевъ б. ч. опушенные. 17.

12. Взрослые листья ланцетные; сережки цвѣтутъ до распусканія листьевъ. 13.

Взрослые листья обратно-яйцевидные, эллиптическіе или овальные; сережки цвѣтутъ въ одно время съ распусканіемъ листьевъ. 14.

13. Наибольшая ширина въ верхней трети листа; тычиночныя нити сросшіяся до верхушки; пыльники красные; завязь почти сидячая.

S. purpurea L.

Наибольшая ширина въ срединѣ листа; тычинки не сросшіяся; пыльники желтые, ножка завязи равна медовой железнѣ.

S. acutifolia Willd.

14. Листья крупные, особенно на побѣгахъ, достигаютъ отъ 4 до 13 см., верхняя сторона темно-зеленая, лоснящаяся, нижняя—рѣзко сѣро-зеленая; ножка завязи въ 2—3 раза превышаетъ железу; высокій кустарникъ. 15.

Листья даже на побѣгахъ не бываютъ крупнѣе 3,5 см.; ножка завязи въ 4—8 разъ длиннѣе железки; низкій или средней величины кустарникъ. 16.

15. Всѣ листья совершенно голые; жилки на нижней сторонѣ сильно выдаются; ножка завязи не болѣе какъ въ 2 раза длиннѣе железки.

S. phyllifolia Sm.

Молодые листья пушистые; жилки на нижней сторонѣ листьевъ слабо выдаются; ножка завязи въ 2—3 раза длиннѣе железки.

S. laurina Sm.

16. Листья овальные или яйцевидные, б. ч. съ ясными зубчиками по краямъ; прилистники на всѣхъ вѣтвяхъ; завязь покрыта прижатыми шелковистыми волосками.

S. livida Wahlenb.

Листья эллиптическіе, б. ч. цѣльнокрайніе; прилистники бываютъ рѣдко; завязь голая, съ сизымъ налетомъ.

S. myrtilloides L.

17. Взрослые листья снизу съ шелковистыми или серебристыми волосками, рѣже голые или съ неясно шелковистыми, но тогда молодые листья съ шелковистыми волосками. 18.

Взрослые листья снизу или съ обѣихъ сторонъ тусклые отъ пушка или войлока, или же листья сверху голые, а снизу б. или м. пушистые, но безъ шелковистыхъ волосковъ. 23.

18. У взрослыхъ листьевъ наибольшая ширина выше середины листа. 19.

У взрослыхъ листьевъ наибольшая ширина не выше середины листа. 20.

19. Верхняя сторона у взрослыхъ листьевъ голая, темно-или сине-

вато-зеленая, нѣсколько доснящаяся; тычиночныя нити сросшіяся почти до верхушки. *S. Doniana* Sm.

Верхняя сторона у взрослых листьевъ сѣро-зеленая, слабо пушистая, но не доснящаяся; тычиночныя нити свободныя.

S. subsericea Döll.

20. Взрослые листья узко-ланцетные или линейно-ланцетные. 21.

Взрослые листья широко-ланцетные, продолговатые или эллиптическіе. 22.

21. Низкій кустарникъ съ ползучимъ подземнымъ стволѣмъ; сережки почти шаровидныя, мелкія; завязь на ножкѣ, въ 2—3 раза превышающей железку.

S. repens L. var. *rosmarinifolia* (L.) Koch.

Высокій кустарникъ; сережки цилиндрическія, довольно крупныя; завязь сидячая.

S. Gmelinii Pall.

22. Годовалыя вѣтви голыя; взрослые листья широко-ланцетные, съ клиновиднымъ или округлымъ основаніемъ, достигаютъ, особенно на длинныхъ побѣгахъ, до 15 см.; завязь покрыта густыми, бѣлыми, нѣсколько извилистыми волосками; столбикъ длинный; ножка равна железкѣ или вдвое длиннѣе ея.

S. dasyclados Wimm.

Годовалыя вѣтви въ верхней части бархатистыя; листья продолговато-эллиптическіе, продолговатые или овальные, даже на побѣгахъ не длиннѣе 6 см.; завязь покрыта слегка отстоящими шелковистыми волосками; столбикъ короткій; ножка въ 3 раза длиннѣе железки.

S. subsericea Döll.

23. Верхняя сторона взрослых листьевъ голая, иногда только по краямъ пушистая, часто доснящаяся. 24.

Верхняя сторона взрослых листьевъ покрыта б. или м. густымъ пушкомъ или иногда только по жилкамъ рѣдкими волосками, видными часто только въ луну. 30.

24. Взрослые листья отъ 7 до 10 разъ длиннѣе ширины; ножка завязи короткая.

S. caprea \times *Gmelinii* Teplouch.

Взрослые листья не болѣе 5 разъ длиннѣе ширины; ножка завязи въ 2—3 раза длиннѣе железки. 25.

25. Нижняя сторона листьевъ бархатисто-пушистая. 26.

Нижняя сторона листьевъ почти голая или хотя и покрыта прижатыми волосками, но не бархатистая. 28.

26. Нижняя сторона листьевъ сизо-сѣрая, независимо отъ опушенія. 27.

Нижняя сторона листьевъ только бархатистая, не сизо-сѣрая.

S. caprea L.

27. Верхняя сторона у взрослых листьевъ морщинистая, тускло-зеленая отъ короткаго пушка.

S. Reichardtii Kern.

Верхняя сторона у взрослых листьевъ темно-зеленая, голая, доснящаяся.

S. laurina Sm.

28. Верхняя сторона взрослых листьев тусклая, морщинистая, съ вдавленными жилками. *S. livescens* Döll.
Верхняя сторона взрослых листьев б. ч. лоснящаяся, не морщинистая. 29.
29. Тычиночные нити у основанія или до середины усажены рѣдкими волосками; завязь голая, рѣдко слабо опушенная; листья снизу зеленые или съ сизоватымъ налетомъ и выступающими жилками. *S. nigricans* Sm.
Тычиночные нити голыя; завязь густо покрыта серебристыми волосками или войлокомъ; листья на нижней сторонѣ рѣзко сизо-сѣрые, съ сильно выдающимися желтыми жилками. *S. laurina* Sm.
30. Взрослые листья совершенно цѣльнокрайніе. 31.
Взрослые листья по краямъ зубчатые или въ нижней части цѣльнокрайніе, а близъ верхушки зубчатые. 34.
31. Нижняя сторона взрослых листьевъ съ мало выдающейся сѣткою жилкокъ покрыта очень густымъ бѣлымъ войлокомъ; завязь на ножкѣ, равной половинѣ железки. *S. lapponum* L.
Нижняя сторона взрослых листьевъ съ мягкими, бѣлыми волосками, иногда съ тонкимъ, бѣлымъ войлокомъ только между жилкокъ; сѣтъ жилкокъ на нижней сторонѣ очень сильно выдается; завязь на ножкѣ въ 3—5 разъ длиннѣе железки. 32.
32. Край у взрослых листьевъ съ длинными, прямыми волосками: главные жилки на нижней сторонѣ листа покрыты длинными, прямыми волосками; завязь на ножкѣ въ 3 раза длиннѣе железки. *S. versifolia* Wahlenb.
Край у взрослых листьевъ съ короткими, курчавыми волосками или голые; главные жилки на нижней сторонѣ листьевъ голыя или покрыты короткими, курчавыми волосками; завязь на ножкѣ въ 4—5 разъ длиннѣе железки. 33.
33. Нижняя сторона листьевъ между жилкокъ покрыта тонкимъ войлокомъ; тычиночные нити голыя. *S. rugulosa* Anders.
Нижняя сторона листьевъ голая, съ сизымъ налетомъ или покрыта короткими прижатыми волосками; тычиночные нити у основанія волосистыя. *S. livescens* Döll.
34. Верхняя сторона взрослых листьевъ лоснящаяся, хотя и покрыта короткими разбѣянными волосками. 35.
Верхняя сторона взрослых листьевъ тусклая. 37.
35. Взрослые листья съ нижней стороны бархатистые; тычиночные нити у основанія голыя; завязь покрыта бѣлыми отстоящими волосками. *S. latifolia* Forbes.
Взрослые листья съ нижней стороны хотя и покрыты короткими волосками, но не бархатистыми; тычиночные нити у основанія волосистыя; завязь покрыта прижатыми волосками или голая. 36.
36. Взрослые листья съ самаго основанія по краямъ зубчатые, нап-

большая ширина в срединѣ листа; завязь голая, рѣже покрыта бѣловатыми тусклыми волосами. *S. nigricans* Sm.

Взрослые листья цѣльнокрайніе или только у основанія цѣльнокрайніе, наибольшая ширина выше середины листа; завязь покрыта прижатыми, шелковистыми волосами.

S. livescens Döll.

37. Наибольшая ширина взрослых листьевъ в срединѣ. 38.

Наибольшая ширина взрослых листьевъ выше середины. 39.

38. Молодые листья покрыты съ обѣихъ сторонъ бѣлымъ войлокомъ; прицвѣтныя чешуйки съ черной верхушкой; завязь на очень короткой ножкѣ. *S. canescens* Fr.

Молодые листья, хотя и пушистые, но безъ войлока; прицвѣтныя чешуйки желтоваты или блѣдно-розовы, верхушка ихъ слегка темнѣе, но не черная; завязь на длинной ножкѣ въ 4—8 разъ длиннѣе железки.

S. livida Wahlenb. β . *cinerascens* Wahlenb.

39. Нижняя сторона взрослых листьевъ съ сизымъ или сине-сѣрымъ налетомъ, независимо отъ опушенія. 40.

Нижняя сторона взрослых листьевъ безъ сизаго или сине-сѣраго налета. 44.

40. Нижняя сторона листьевъ съ мало выдающимися жилками; завязь со столбикомъ, равнымъ трети ея. *S. puberula* Döll.

Нижняя сторона листьевъ съ сильно выдающимися жилками; завязь съ очень короткимъ столбикомъ. 41.

41. Нижняя сторона взрослых листьевъ бархатисто-пушистая или густо покрыта толстымъ войлокомъ. 42.

Нижняя сторона взрослых листьевъ голая или опушенная, или же промежутки между жилкахъ покрыты очень тонкимъ войлокомъ. 43.

42. Верхняя сторона взрослых листьевъ слабо опушенная, тусклая или слегка досыпающаяся; листья съ широко-клиновиднымъ или слегка округлымъ основаніемъ, длиною въ $2-2\frac{1}{2}$ раза болѣе ширины. *S. Reichardtii* Kern.

Верхняя сторона взрослых листьевъ пушистая, тусклая, морщинистая, съ длиннымъ и узкимъ клиновиднымъ основаніемъ, длина листа въ $2\frac{1}{2}-4\frac{1}{2}$ раза болѣе ширины. *S. cinerea* L.

43. Нижняя сторона взрослых листьевъ между жилкахъ покрыта тонкимъ войлокомъ; тычиночныя нити голыя.

S. rugulosa Anders.

Нижняя сторона взрослых листьевъ голая или опушенная, но безъ войлока; тычиночныя нити у основанія пушистыя.

S. livescens Döll.


44. Длина взрослых листьевъ не болѣе 2-хъ разъ превышаетъ ширину. *S. aurita* L.

Длина листьевъ въ 3 раза и болѣе превышаетъ ширину. 45.

45. Годовалыя вѣтви бархатисто-пушистыя; почки бурья; длина столбика равна рыльцу. *S. cinerea* L.

Годовалыя вѣтви голыя или, хотя и коротко-пушистыя, но не бархатистыя; столбикъ очень короткій. *S. multinervis* Döll.

270. *S. pentandra* L. Пет. Кр. III, стр. 39.—Бух. II, № 384.—Пет., стр. 265.—Кауф. II, № 693.—Цин., № 1315.—Кауф. I, стр. 454.—Lind., p. 160.—Ann. C. II, № 153.—Дв., № 902.—Макс., № 897.—Hoff. H., № 7706.—Gold. C., p. 23.—St. II, p. 55.—St. I, № 663.—Pal., № 2105.



Кустарникъ или небольшое деревцо; молодыя вѣтви съ буровато-зеленой, красноватой или оливковой, сильно лоснящейся корой; молодые листья липкіе; взрослые — кожистые, лоснящиеся, снизу свѣтлѣе, яйцевидно-эллиптические, у основанія широко-клиновидные, рѣже округлые, на концѣ б. или м. заостренные, по краямъ мелко-железисто-пильчатые; черешокъ листа съ бородавчатыми железками; сережки на концѣ боковыхъ вѣточекъ толстыя, густыя, цилиндрическія, распускаются послѣ листьевъ; прицвѣтныя чешуйки блѣдно-желтыя, продолговатыя или обратно-яйцевидныя, заостренные или округлыя, иногда зубчатые, у основанія или до середины коротко-волосистыя, по краямъ часто коротко-рѣсничатые (у женскихъ цвѣтовъ рано опадаютъ); тычинокъ 5—8 (форма съ 10 тычинками—*S. polyandra* de Bray); тычиночныя нити въ нижней части волосистыя; завязь голая, узко-коническая, со столбикомъ, не превышающимъ четверть ея длины; железокъ 2 (3); ножка завязи равна железкѣ или въ 2 раза длиннѣе ея.

По болотамъ, болотистымъ кустарникамъ и по опушкамъ болотистыхъ лѣсовъ. Цвѣтетъ съ половины мая, иногда до конца іюня, зрѣлые плоды съ половины августа. Ивановское, Строгино, Зыково, Пушкино, Мытищи; Раменское. Брн. у., Павловскій посадъ, Вгр. у. (К.).—Косино; Захарово, Клин. у. (П.).—Рупосово (С.).—Тростенское озеро, Ряз. у. (П. и С.).—Озеро Нерское (Х.).

S. polyandra de Bray: Марьино (Ген. герб.).—Спасское, Троекурово (М.).—Мытищи (С.).—Рыжеекое болото близъ Михайловскаго. Пдл. у. (Б.).—Близъ Серпухова (Сюз.).

271. *S. frágilis* L. Пет. Кр. III, стр. 37.—П. Сюзевъ. О вѣк. нов. раст. Моск. фл. Отд. отд. изъ Тр. Бот. С. Им. Юр. Ун., стр. 8.—F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, № 692, a. *decipiens* Koch.—Цин., № 1316.—Кауф. I, стр. 453.—Lind., p. 160.—Дв., № 904.—Hoff. H., № 7688.—Gold. C., p. 23.—Mart., p. 174.—St. II, p. 55.—St. I, № 666.—Pal., № 2107.

Высокое дерево; годовалыя вѣтви крайне ломкія у основанія. Голыя съ буроватой или зеленовато-желтой, лоснящейся корой; взрослые листья яйцевидно-продолговатые или яйцевидно-ланцетные, съ длинно-заостренной верхушкой и широко-клиновиднымъ основаніемъ, по краямъ мелко- и железисто-зубчатые, сверху темно-зеленые, снизу блѣдно-зеленые или слегка сизоватые, всегда съ обѣихъ сторонъ голые; молодые листья нѣсколько линкіе; черешокъ листа съ бородавчатыми железами; прилистники рано опадающіе, полусердцевидные, рѣдко округлые, туповатые, зубчатые; сережки на концахъ короткихъ боковыхъ побѣговъ съ цѣльнокрайними листьями; мужскія—цилиндрическія, на короткихъ опушенныхъ ножкахъ; прицвѣтныя чешуйки язычковидныя, тупыя или слегка заостренныя, желтыя, сплошь покрыты длинными и короткими волосками. у женскихъ цвѣтовъ рано опадаютъ; тычиночныя нити до половины длины волосистыя; завязь узко-коническая, съ яйцевиднымъ основаніемъ, голая, со столбикомъ, равнымъ трети ея длины; медовыхъ железокъ 2; ножка завязи въ 3 раза длиннѣе внутренней железы.



Salix fragilis.

Отдѣльными деревьями по влажнымъ мѣстамъ. Цвѣтетъ съ конца апрѣля до середины мая, рѣдко весь май. Петровское-Разумовское (Шр.).—Воробьевы горы (П.). —Лужки. Срп. у. (П. и С.).—Б. Мытщи (С.). Влнзъ Серпухова (Сюз.).—Кучино (Куль.).

× *S. cuspidata* Schultz. = *S. fragilis* × *pentandra* Wimm.

Пет. Кр. III, стр. 40.—П. Сюзевъ. О нѣк. нов. раст. Моск. фл. Отд. Труд. Бот. С. Им. Юр. Ун., стр. 9.

Кустарникъ или небольшое деревцо; годовалыя вѣтви съ зелено-желтой или желто-бурой, лоснящейся корой; взрослые листья продолговатые, продолговато-ланцетные или широко-ланцетные, съ широко-клиновиднымъ основаніемъ и острой, вытянутой верхушкой, рѣже листья равномерно суженные къ обоимъ концамъ, по краямъ ровно- и железисто-пильчатые, съ верхней стороны лоснящіяся, темно-зеленые, съ нижней—свѣтло-зеленые, съ обѣихъ сторонъ голые; черешокъ листа 10—12 мм., въ верхней части съ бородавчатыми желе-




Salix cuspidata.

ками; сережки на концахъ боковыхъ вѣточекъ на опушенныхъ цвѣтоножкахъ; прицвѣтныя чешуйки обратно-яйцевидныя, слабо заостренныя или округлыя, на спинкѣ волосистыя и по верхнему краю съ длинными волосками; тычинокъ 2—5; тычиночными нити у основанія волосистыя; завязь коническая, съ яйцевиднымъ основаніемъ; столбикъ равенъ трети или четверти завязи; медовыхъ железокъ 3; ножка равна железкамъ или нѣсколько длиннѣ ихъ.—Съ обликкомъ *S. pentandra* L. отъ которой отличается меньшимъ числомъ тычинокъ (2—5; у *S. pentandra* менѣе 5 не бываетъ) и очень длинными волосками по краю прицвѣтныхъ чешуекъ.

Подъ Серпуховымъ въ мужскихъ особяхъ, въ полномъ цвѣту 8 мая 1891 г. (Сюз.).

272. *S. triandra* L. Пет., стр. 265.—Макс., № 895.—Hoff. II., № 7719.—St. II, p. 55.

Salix amygdalina L. Пет. Кр. III, стр. 36.—Кауф. II, № 690.—Цин., № 1318.—Кауф. I, стр. 452.—Lind., p. 160.—Дв., № 901—Макс., № 896.—Mart., p. 173.—St. I, № 665.—Pal., № 2106.



кустарникъ или небольшое дерево съ сѣрой корой; годовалыя вѣтви голыя, буровато- или красновато-зеленыя; взрослые листья продолговатыя, ланцетные или яйцевидно-ланцетные, съ железисто-зубчатыми краями; основаніе ихъ коротко-клиновидное или округлое, верхушка коротко- или длинно-заостренная, верхняя сторона темно-зеленая, нижняя—свѣтло-зеленая или сизо-сѣрая; прилистники крупные, косо- или яйцевидно-почковидные, зубчатые; сережки на концахъ короткихъ боковыхъ побѣговъ, тонкія, длинныя; прицвѣтныя чешуйки желтоватыя или зеленоватыя, въ молодости сплошь, потомъ только у основанія покрыты курчавыми волосками, у женскихъ цвѣтовъ остаются до созрѣванія плода; тычинокъ 3; тычиночные нити у основанія курчаво-волосистыя; завязь яйцевидно-

коническая, голая, съ очень короткимъ столбикомъ; ножка завязи въ 3—5 разъ длиннѣ железки.

По берегамъ рѣкъ и прудовъ, по береговымъ пескамъ и по сырымъ мѣстамъ. Цвѣтетъ весь май.

α. *concolor* Koch.

Salix triandra L. Дв., № 900.—Макс., № 895.—Hoff. II., № 7719.—St. II, p. 55.

Salix triandra L. *virescens*. Gold. C., p. 23.

Salix amygdalina L. *β. concolor* Koch. Пет. Кр. III, стр. 36.—Бух. II, № 378.—Бух. I, № 353.—F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, № 467.—Цин., стр. 393.—Кауф. I, стр. 452.

Листья иногда лоснящіеся, снизу свѣтло-зеленые, у основанія б. ч. округлыя; мужскія сережки въ 7—12 разъ длиннѣ ширины. Форма.

найденная въ Кусковѣ (П.), съ почти цѣльнокрайними листьями.
S. lignstrina Host. Перерина, Ворообьевы горы (К.).—Михайловское.
 Пдл. у. (В.).—Щемчиновскій постъ (С.).

3. *discolor* Koch.

Salix triandra L. *glaucescens*. Gold. C., p. 23.

Salix amygdalina L. *z. discolor* Koch. Пет. Кр. III, стр. 36.—F. O., № 7, p. 102.—
 Кауф. II, стр. 467.—Цинл., стр. 393.—Pinz.,
 p. 18.—Кауф. I, стр. 452.—Дв., № 901.—
 Макс., № 896.—Mart., p. 173.—St. I, № 665.

Salix amygdalina auct. pl.

Листья съ нижней стороны сизаго или блѣловатаго цвѣта, б. ч.
 съ широко-клиновиднымъ основаніемъ; мужскія сережки въ 4—5
 разъ длиннѣе ширины. Петровское-Разумовское (П.). Зиброво.
 Срп. у. (С.).

× *S. alopecuroides* Tausch = *S. fragilis triandra* Wimm.

S. speciosa Host.

Кустарникъ съ буро-желтой, лоснящейся корой, рѣже кора бываетъ
 зеленоватая; молодые листья и вѣтви коротко-пушстые; взрослые листья
 совершенно голые, продолговато-лан-
 цетные, отъ середины постепенно за-
 остренные или къ обоимъ концамъ по-
 степенно суженные, рѣже къ верхнему
 концу быстро суженные въ короткій, вы-
 тянутый кончикъ; основаніе листа б. ч.
 коротко-клиновидное, края шильчатые,
 б. ч. съ неравными зубчиками; длина
 листа превосходитъ ширину въ 3—4 ра-
 за; прилистники почковидно-яйцевид-
 ные или продолговатые, шильчатые, дол-
 го остаются при листьяхъ; мужскія се-
 режки длинныя, цилиндрическія, густыя,
 на концахъ короткихъ боковыхъ вѣт-
 чекъ; прицвѣтныя чешуйки желтоватыя,
 покрыты курчавыми волосками, верхуш-
 ка же и края—длинными, прямыми волосками; тычинокъ по 2—3 въ од-
 ной и той же сережкѣ; завязь продолговато-коническая, свѣтло-рыжеватая,
 съ ясно-замѣтнымъ столбикомъ; рыльце съ короткими крестообразно рас-
 ходящимися лопастями; ножка въ 2—4 раза длиннѣе железки. У насъ
 найдена пока только въ мужскихъ особяхъ.



Salix alopecuroides.

Цвететъ съ конца апрѣля и въ первыхъ числахъ мая. Ст. Растор-
 гуево по Павленцкой ж. д., Пдл. у.; Кузино, близъ Салтыковской плат-
 формы Пвж. ж. д.; Быково, Врп. у. (Куль.).

273. *S. álba* L. Пет. Кр. III, стр. 37 и 39.—Бух. II, № 380.—F. O., № 7, p. 102.—
 Пет., стр. 265.—Кауф. II, № 691.—Цин., № 1317.—Кауф. I,
 стр. 453.—Lind., p. 160.—Дв., № 916.—Макс., № 899.—Hoff.

II., № 7674.—Gold. C., p. 23.—Gold. Sp., p. 140.—Mart., p. 175.—St. II, p. 55.—St. I, № 673.—Pal., № 2112.

Salix vitellina L. Дв., № 903.—Макс., № 900.—Hoff. II., № 7723.—Mart., p. 173.—St. II, p. 55.—St. I, № 664.

Высокое дерево; молодые вѣтви густо покрыты серебристыми волосками. годовалыя—почти голыя. желтоватыя. буроватыя или красно-бурый.



Salix alba.

глубкія; листья ланцетные, рѣже широко-ланцетные, суженные равномерно къ обоимъ концамъ, рѣже листья у основанія широко-клиновидные, по краямъ часто- и железисто-зубчатые; молодые листья съ обѣихъ сторонъ густо покрыты серебристыми, прижатыми волосками, взрослые—сверху тускло-зеленые, покрыты рѣдкими волосками или голые, снизу сѣрые или сизые, б. или м. густо покрыты прижатыми волосками; прилистники ланцетные, рано опадаютъ; сережки на концахъ боковыхъ короткихъ побѣговъ съ цѣлюкрайними или слегка зубчатыми листьями; прицвѣтныя чешуйки продолговато-яйцевидныя, желтыя или красноватыя, въ верхней части

голыя и только у основанія съ короткими курчавыми волосками. иногда по краямъ коротко-рѣсничатыя; мужскіе цвѣты съ 2 железками; тычиночныя нити въ нижней части волосистыя; завязь яйцевидно-копическая. голая. съ короткимъ столбикомъ; медовая железка у женскихъ цвѣтовъ одна. иногда двулопастная; ножка завязи короче железки или завязь сидячая.

Около жилья, по берегамъ рѣкъ и прудовъ. часто. Цвѣтетъ весь май.
***α. argentea* Wimm.**

Взрослые листья съ обѣихъ сторонъ густо покрыты серебристыми волосками. Петровское-Разумовское (II.).—Сокольники (С.).

***β. coerúlea* Wimm.**

Взрослые листья съ нижней стороны сизые и съ рѣдкими волосками, верхняя сторона тускло-зеленая. почти голая. Влизъ Павловскаго посада, Бгр. у. (II. и С.).

× ***S. viridis* Fr. = *S. alba* × *fragilis* Ritschl.**

Иер. Кр. III, стр. 37.—Бух. II, № 381.—П. Сюзевъ. О вѣк. нов. раст. Моск. фл. Отд. отд. Труд. Бот. С. Им. Юр. Ун., стр. 8.—Ф. Б., № 14.—Бух. I, № 355.

Salix fragilis L. Макс., № 901.—Gold. Sp., p. 140.

Salix fragilis × *alba* Wimm.

Высокое дерево; молодые вѣтви покрыты серебристыми волосками. потомъ голыя съ зелено-желтой или бурой, лоснящейся корой, то глубкія, то ломкія; листья на черешкахъ съ бородавчатыми железками, ланцетные, длинно-заостренные, по краямъ мелко- и железисто-пильчатые. въ моло-

дости съ обѣихъ сторонъ покрыты серебристыми волосками. Потомъ голые, сверху темно-зеленые, снизу свѣтло-зеленые или сѣро-зеленые; прилистники яйцевидные, заостренные, рано опадающіе; сережки на концахъ боковыхъ вѣточекъ съ листьями то цѣльнокрайними, то зубчатыми; прицвѣтныя чешуйки по своему опушенію то ближе подходятъ къ *S. alba*, то къ *S. fragilis*, желтоватыя, продолговатыя; завязь копическая; медовая железка одна; ножка завязи равна железкѣ. — Эта помѣсь своими признаками то приближается къ *S. [alba L. = forma albescentis Anders., то къ S. fragilis L. = forma fragilior Anders.*

Часто у рѣкъ, близъ жилья и по сырымъ мѣстамъ. Цвѣтетъ весь май.

α. glabra Wimm.

Salix excelsior Host. Бух. II, № 382.

Взрослые листья голые, сверху ярко-зеленые, лоснящіеся, снизу сизо-зеленые, молодые — слабо-опушенные. Близъ Серпухова (Сюз.).

Петровское-Разумовское на плотинѣ (II.). — Кусково (Куль.). — Косино (X.).

β. vestita Wimm.

Salix palustris Host.

Молодые листья густо покрыты серебристыми волосками, потомъ голые, сверху тускло-зеленые, снизу сизоватые или сѣро-зеленые.

Петровское-Разумовское (II.). — Кучино (Куль.).

× *S. hexandra* Ehrh. = *S. alba* × *pentandra* Ritschl.

Пет. Кр. III, стр. 40. — П. Сюзевъ. О нѣк. нов. раст.

Моск. фл. Отд. отд. изъ Труд. Бот. С. Имп. Юр. Ун., стр. 9.

Salix pentandra : *alba* Wimm.

Не высокое дерево; на годовалыхъ вѣтвяхъ съ буровато-зеленой, слегка лоснящейся корой; молодыя вѣтви покрыты прижатымъ пушкомъ; молодые листья съ нижней стороны густо покрыты шелковистыми волосками, взрослые — сверху голые или съ очень рѣдкими, прижатыми волосками, темно-зеленые, лоснящіеся, снизу свѣтло-зеленые, чаще съ сѣрымъ или сизымъ налетомъ, ланцетные, у основанія клиновидные, на концѣ вытянуты въ длинный, часто кривой кончикъ, по краямъ мелко- и железисто-пильчатые; сережки на концѣ боковыхъ вѣточекъ съ листочками,



Salix viridis.



Salix hexandra

по краямъ мелко-пильчатыми; тычинокъ 3—6 (очень рѣдко 2); тычиночные нити у основанія волосистыя; завязь коническая съ короткимъ столбикомъ; железокъ 2 (3); ножка завязи равна железкамъ или вдвое длиннѣ ихъ.—Отъ *S. alba* L. отличается голой или почти голой, слегка доснищейся верхней стороной листьвъ и числомъ тычинокъ. Отъ *S. pentandra* L.—опушеніемъ молодыхъ листьевъ и нижней стороной взрослыхъ.

Подъ Серпуховымъ, въ полномъ цвѣтѣ 25 апрѣля 1892 г., только въ мужскихъ особяхъ (Сюз.).

274. *S. repens* L. var. *rosmarinifolia* (L.) Koch. Пет. Кр. III, стр. 19.—
Кауф. II, стр. 460.

Salix repens L. var. *angustifolia* Wulf. Кауф. II, стр. 460.—Ф. О. № 7, p. 102.

Salix repens L. Ф. Б., № 84.—Пет., стр. 267.—Гор., № 39.—Цин., № 1331.

Salix rosmarinifolia Koch. Кауф. I, стр. 445.—Дв., № 908.—Макс., № 907.—
Mart., p. 174.—Lon., p. 114.

Salix angustifolia Wulf. Кауф. I, стр. 445.

Salix ambigua Ehrh. Pinz., p. 18.

Salix incubacea Willd. Дв., № 907.—Макс., № 905.—Mart., p. 114.—St. II,
p. 55.—St. I, № 770.

Низкій кустарникъ отъ 40 см. до 1 м., съ толстымъ подземнымъ стволемъ и красно-оурой или желтоватой корой; молодые побѣги часто пушистые; листья линейные или линейно-ланцетные, отъ 3 до 6, рѣже до 10 разъ длиннѣ ширины, съ прямо-заостренной верхушкой, пѣльнокрайніе, рѣже съ нѣсколькими железками по краямъ; развитые листья съ верхней стороны почти голые или съ очень рѣдкими параллельными срединной жилкѣ волосками; съ нижней—6. или м. густо покрыты прижатыми серебристо-шелковистыми волосками; сережки почти шаровидныя на очень короткихъ ножкахъ съ короткими листочками у основанія; прицвѣтныя чешуйки продолговатолопатчатая, на концѣ округлая или заостренная, съ длинными волосками, верхушка ихъ красноватая, потомъ чернѣетъ;



Salix repens var. *rosmarinifolia*.

тычинокъ 2, съ голыми нитями и чернѣющими пыльниками; завязь на длинной ножкѣ, которая въ 2—3 раза длиннѣ железки, коротко и узко-коническая, покрытая густымъ войлокомъ, рѣже почти голая; столбикъ очень короткий; рыльце продолговатое, съ 2, рѣже 4 короткими малиновыми лопастями.

По торфянымъ болотамъ и сырымъ торфянистымъ лугамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ конца апрѣля до половины мая.

275. *S. myrtilloides* L. Пет. Кр. III, стр. 21.—П. Сюзевъ. О. нѣк. нов. раст. Мос. фл. Отд. отд. изъ Тр. Бот. Сад. Имп. Юр. Ун., стр. 10.—Ф. Б., № 85.—Пет., стр. 266.—Кауф. II, № 680.—Мил., № 30.—Цин., № 1330.—Кауф. I, стр. 446.—Дв., № 910.—Макс., № 904.—Gold. C., p. 23.

Низкій кустарникъ, не выше 80 см., съ подземнымъ стволомъ и бурой корой: листья эллиптическіе или эллипческо-ланцетные, отъ 7 до 30 мм. дл. и отъ 5 до 12 мм. шир., на обоихъ концахъ округлые или у основанія округлые, а съ верхняго конца слегка заостренные, съ обоихъ сторонъ голые, съ верхней стороны зеленые или слегка сине-зеленые, съ нижней — сизые, съ сильно выступающими жилками; мужскія сережки округлыя, въ 1—2 см. дл., на ножкахъ съ маленькими листочками или чешуйками; тычинокъ 2, нити голыя; пыльники пурпуровые, потомъ золотисто-желтые и подъ конецъ черно-фіолетовые; прицвѣтныя чешуйки лопатчатыя, желтоватыя, съ красноватою верхушкой и длинными волосками, у женскихъ цвѣтовъ почти голыя; женскія сережки не густыя, 1.5—2 см. дл., на облиственныхъ ножкахъ; завязь на длинной ножкѣ, коническая или узко-коническая, къ основанію часто вздутая, голая, съ сизымъ налетомъ, часто буро-фіолетовая или красноватая; столбикъ очень короткій, съ 2—4-лопастнымъ красноватымъ рыльцемъ; ножка завязи въ 4—6 разъ длиннѣ медовой железки.



Salix myrtilloides.

По тонкимъ моховымъ, торфянымъ болотамъ. Цвѣтеть въ началѣ мая. Захарьково, Мытищи (К.). — Болото по берегу Глубокаго озера, Руз. у. (Г. О. и Ф. В.). — Болото между д. Петровка и д. Пуршево, Руз. у. (Юз.). — Болото за д. Рупосово, Мос. у. (С.). — Большой моховый болота близъ Завидова, Кал. у.; Красниковское болото за Мытищами; болото по берегу Круглаго озера близъ дер. Рыбаки, Мос. у. (П. и С.). — Болото близъ Машина, Дмит. у.; Косино — Св. озеро (П.).

× *S. rugulôsa* Anders. = *S. aurita* × *myrtilloides* Wimm. Нер. Кр. III, стр. 21.
Salix onusta Bess.

Кустарникъ до 1 м., съ сѣрой или буро-сѣрой корой и вверхъ торчащими вѣтвями, въ молодости пушистыми; листья на короткихъ пушистыхъ черешкахъ, овальные или яйцевидно-ланцетные, къ основанію б. ч. суженные, верхушка заостренная или округлая, быстро переходитъ въ короткій кончикъ; край б. ч. загнутъ внутрь и снабженъ рѣдкими, неравными зубчиками, рѣже цѣльнокрайніе; верхняя сторона ярко-зеленая, б. ч. опушенная, морщинистая, нижняя — съ сильно выдающимися жилками, по жилкамъ густо-пушистая, между жилокъ часто покрыта тонкимъ, бѣлымъ войлокомъ; сережки, особенно женскія, на длинныхъ ножкахъ, у основанія съ б. или м. крупными листочками; прицвѣтныя чешуйки лопатчатыя или обратно-яйцевидныя, желтоватыя съ темной верхушкой, покрыты волосками; завязь коническая, голая или пушистая, на ножкѣ въ 4—5 разъ

длинные медовой железки; столбикъ очень короткій: тычинкокъ 2. съ голыми нитями и бурлящими пыльниками.

Въ гербаріи Кауфмана за № 535 изъ В. Мытищъ. Болото въ лѣсу между Рупосовымъ и Черкизовымъ, Мос. у. (С.).

276. *S. nigricans* Sm. Пет. Кр. III, стр. 23.—Бух. II., № 375.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 267.—Кауф. II, № 684.—Цин., № 1325.—Кауф. I, стр. 448.—Макс., № 913.

Salix myrsinites L. Дв., № 907.—Макс., № 903.—Mart., p. 174.—St. II, p. 55.—St. I, № 668.—Pal., № 2109.

Salix pyriformis Goldb. Hoff., № 7711.

Salix cerasifolia Goldb. Hoff. II., № 7682.

Salix Amanniana Willd. Gold. Sp., p. 139.

Кустарникъ вышиною до 3 метровъ, съ буро-сѣрой корой; годовалыя вѣтви буро-зеленыя или бурья, лоснящіяся, голыя. рѣже слабо опушен-



Salix rugulosa.



Salix nigricans.

ныя, молодыя — красно-бурья. б. или м. густо опушенныя; листья очень разнообразны: округлыя, овальныя, продолговатыя, эллиптическія и продолговато-обратно-лицевидныя, по краямъ неравно-зубчатыя; основаніе ихъ округлое или округло-клиновидное, верхушка постепенно или быстро заостренная; молодыя листья голыя или съ обѣихъ сторонъ опушенныя, взрослые — сверху б. ч. голыя, темно-зеленыя, нѣсколько лоснящіяся, рѣже покрыты пушкомъ, снизу только вдоль жилокъ коротко-опушенныя или голыя, свѣтлѣе или съ снѣговатымъ налетомъ и съ выдающимся жилками; прилистники б. ч. остаются, почковидныя или яйцевидно-ланцетныя; сережки, какъ мужскія, такъ и женскія, очень разнообразной формы и величины; у основанія ихъ б. ч. маленькія листочки; прицвѣтныя чешуйки продолговатыя или яйцевидныя, съ острой или тупой верхушкой, рыжеватыя, одноцвѣтныя или на концѣ темнѣе; тычинки у основанія б. ч. волосистыя; завязь узко-коническая, б. ч. голая, рѣже покрыта

бѣловатыми волосками; столбикъ длинный, равенъ $\frac{3}{4}$ завязи; ножка голая или усажена волосками, въ 3—4 раза длиннѣе железки.

Очень часто по опушкамъ, по кустарникамъ и торфянымъ болотамъ. Цвѣтетъ съ конца апрѣля до середины мая.

2. *lanceifolia* Wimm. Листья продолговато-ланцетные, коротко-заостренные, пильчатые, снизу свѣтло-зеленые, голые. Красниковское болото за Мытищами; Павловскій посадъ, Бгр. у. (П. и С.).
3. *parvifolia* Wimm. Листья мелкіе, голые, ярко-зеленые, снизу съ сизоватымъ налетомъ; сережки очень короткія, яйцевидныя; завязь голая. Мытищи (С.).
4. *crassifolia* Wimm. Листья почти округло-яйцевидные, быстро переходить въ короткій кончикъ, снизу сѣровато-зеленые, слегка опушенные; завязь голая. Мытищи (С.). — Петровское - Разумовское (П.). — Кусково (Куль.).
5. *hermaphrodítica* L. (sp.).

Salix hermaphrodítica L. Дв., № 899. — Макс., № 894. — Mart., p. 173. — Lon., p. 114. — St. I, № 662. — Pal., № 2104.

Въ одной и той же сережкѣ какъ мужскіе, такъ и женскіе цвѣты.

277. *S. phyllicifolia* (L.) Sm. Пет. Кр. III, стр. 24. — Пет., стр. 266. — Цин., № 1329. — Pinz., p. 18. — Ann. C. III, № 254. — Дв., № 912. — Макс., № 914.

Salix Weigeliana Willd. Gold. Sp., p. 139.

Salix bicolor Ehrh.

Кустарникъ до 2 м. съ буро-сѣрой корой; годовалыя вѣтви желтовато-бурыя, голыя; взрослые листья продолговато-овальные, эллиптическіе или обратно-яйцевидные, часто съ клиновиднымъ основаніемъ и быстро-заостренной верхушкой, по краямъ выемчато-пильчатые или съ едва замѣтными зубчиками; верхняя сторона голая, темно- или ярко-зеленая, лоснящаяся, нижняя — рѣзко сизо-сѣрая, голая, съ ясно выдающимися желтыми жилками; прилистники рано опадаютъ; сережки на очень короткихъ ножкахъ съ чешуйками у основанія; прицвѣтныя чешуйки продолговатыя, заостренныя или туповатыя, иногда зубчатые, буроватыя, съ почти черной верхушкой; тычиночныя нити голыя; завязь яйцевидно-коническая, густо покрыта бѣлыми или желтоватыми волосками; ножка въ 2 раза превышаетъ продолговатую, почти квадратную железку. *)

По болотистымъ лугамъ, рѣдко. Цвѣтетъ въ началѣ мая. Въ гербаріи Анненкова С. III, № 254. — Близъ Архангельскаго, Звн. у. (Шр.). — По болотистому берегу р. Ихромы, близъ Дмитрова (П. и Х.). — Косино — въ канавѣ Выхинскаго болота (Куль.).

*) А. А. Хорошковъ нашелъ близъ Косина промежуточную ферму между *S. phyllicifolia* и *S. laurina*. Отъ первой она отличается ножкой завязи, которая въ 3 раза длиннѣе железки и нижней стороной листьевъ, опушенныхъ по жилкамъ. Отъ второй — тоже нижней стороной листьевъ, которая должна быть у *S. laurina* опушенная, даже иногда бархатистая. Такія нечетныя *S. phyllicifolia* замѣчены мною на экземплярахъ, присланныхъ мнѣ изъ-за границы и у Ann. C. III, № 254.

× *S. laurina* Sm. = *S. caprea* × *phylicifolia* Wimm.

Пет. Кр. III, стр. 25.

Отличается от *S. phylicifolia* Sm. молодыми пушистыми листьями (у *S. phylicifolia* Sm. голые) и мало выдающимися мелкими жилками на



Salix phylicifolia.

Salix laurina.

нижней сторонѣ листьевъ (у *S. phylicifolia* ясно виднотся); ножкой завязи, которая въ 2 - 3 раза длиннѣ железки (у *S. phylicifolia* не длиннѣ 2 разъ). Отъ *S. caprea* L. отличается рѣзкимъ спизо-сѣрымъ налетомъ на нижней сторонѣ листьевъ и ножкой завязи, которая у *S. caprea* въ 3 и болѣе разъ длиннѣ железки.

Близъ Архангельскаго, Звн. у., только одинъ разъ въ женской особн (Шр.).

278. *S. livida* Wahlenb. Пет., стр. 266.—Макс. герб. за № 491¹—492².

Salix depressa L. Пет. Кр. III, стр. 21.—Бух. II, № 372.—Бух. I, № 357.—
F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, № 681.—Цип., № 1328.—
Pinz., p. 18.—Кауф. I, стр. 446.

Salix Starkeana Willd. Ann. C. III, № 253.

Salix vagans Anders.

Salix depressa L. × *amygdalina* L. Бух. II, № 379 есть *S. livida* Wahlenb. сообщ. А. Н. Петуниновымъ.

Кустарникъ до 1,5 м., съ растопыренными вѣтвями и желтой или красновато-бурой, въ старости сѣро-бурой корой; листья на короткихъ, желтоватыхъ, голыхъ черешкахъ, яйцевидные, овальные, продолговато-овальные или обратно-яйцевидные съ вѣсколку суженнымъ основаніемъ и быстро заостренной, иногда косой верхушкой; взрослые листья сверху ярко-зеленые, голые или съ очень рѣдкими волосками, снизу — съ ясно выступающими желтоватыми, опушенными жилками, между жилокъ часто голые, блѣднѣ окрашены, спие-зеленые или сѣро-зеленые, по краямъ мелко- и неравно-зубчатые, у основанія часто цѣльноподкрайніе; сережки на короткихъ ножкахъ, у мужскихъ — съ чешуйками при основаніи; женскія —

рѣдкоцѣтныя, у основанія б. ч. съ листочками; прицѣтныя чешуйки продолговатыя, б. ч. острые, желтоватыя или блѣдно-розовыя, на концѣ нѣсколько темнѣе, съ обѣихъ сторонъ усажены б. или м. длинными волосками; тычинокъ 2, съ длинными, голыми нитями; пыльники желтые; завязь яйцевидно-коническая, покрыта прижатыми шелковистыми волосками; почка въ 4—8 разъ длиннѣе железки.

Очень часто по кустарникамъ и опушкамъ. Цвѣтетъ съ половины мая.

2. *bicolor* Fr. F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, стр. 461.—Кауф. I, стр. 447.

Взрослые листья почти кожистые, съ верхней стороны темно-зеленые, голые, съ нижней — свѣто-зеленые или сѣро-зеленые, съ крупными, почковидными, по краю зубчатыми прилистниками; годовалыя вѣтви голыя.

3. *cinerascens* Wahlenb. Pinz., p. 18.

Salix depressa L. *z. velutina* Fr. Кауф. II, стр. 461.—Кауф. I, стр. 446.

Верхняя поверхность взрослыхъ листьевъ тусклая отъ прижатыхъ, довольно густыхъ волосковъ и съ выдающимся мелкими жилками; съ нижней стороны листья тоже пушистые, рѣже голые, сѣро-зеленые; годовалыя вѣтви пушистыя.

279. *S. aurita* L. Пет. Кр. III, стр. 22.—Бух. II, № 373.—Бух. I, № 354.—F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, № 682.—Цин., № 1327.—Кауф. I, стр. 447.—Дв., № 911.—Hoff. II., № 7678.—Макс., № 908.—Gold. C., p. 23.—Mart., p. 174.—St. II, p. 55.—St. I, № 669.

Salix cinerea L. *β. aquatica* Sm. Ann. C. III, № 252.

Кустарникъ до 2 м.: молодыя вѣтви тонкія, пушистыя, сѣрыя; годовалыя—голыя или почти голыя, красно-бурыя; почки красноватыя, оваль-



Salix livida.



Salix aurita.

ныя, короткія; листья вдвое длиннѣе ширины, обратно-яйцевидные или обратно-яйцевидно-ланцетные, съ клиновиднымъ основаніемъ и почти округлой верхушкой, быстро переходящей въ короткій кончикъ, рѣже листья широко-ланцетные, по краямъ мелко- и неравно-зубчатые, верхняя сторона

морищинистая, съ вдавленными мелкими жилками, тусклая отъ короткихъ, прижатыхъ волосковъ, нижняя—сѣрая, войлочно-пушистая, съ выдающимися желтыми жилками; прилистники косые или почковидные, крупные, съ зубчатымъ краемъ; сережки сидячія или на очень короткихъ ножкахъ, у основанія съ мелкими листочками; прицвѣтныя чешуйки язычковидныя, заостренныя или округлыя, ржаво-желтыя, на концѣ бурья, на сипикѣ и по краямъ съ нѣсколько курчавыми волосками; тычиночныя нити у основанія волосистыя; завязь яйцевидно-коническая, покрыта шелковистыми волосками; столбика почти нѣтъ; медовая железка въ 4 раза короче ножки.

По кустарникамъ, опушкамъ и сырымъ лугамъ, очень часто. Цвѣтеть съ конца апрѣля до конца мая.

S. livescens Döll. = *S. aurita* > *livida* Wimm.

Пет. Кр. III, стр. 22 (ошибочно названа *S. coerulescens* Döll). П. Сюзевъ. О нѣк. нов. раст. Моск. фл. Отд. отд. изъ Труд. Бот. С. Им. Юр. Ун., стр. 10.

Salix aurita L. β . *sublivida* Laestad. Fries. Nov. Suec. Mant. I, p. 56 (1832).

Молодыя вѣтви пушистыя, годовалыя—голыя, красно-бурья или буро-сѣрыя; листья продолговато-обратно-яйцевидные или продолговато-оваль-



Salix livescens

ные, съ клиновиднымъ основаніемъ и округлой быстро-заостренной верхушкой, цѣльнокрайніе или б. или м. крупно-зубчатые, верхняя сторона тусклая, съ рѣдкими волосками или слегка лоснящаяся, съ вдавленными мелкими жилками, нижняя—сизо-или сине-зеленая, голая или опушенная; прилистники косые, яйцевидные или почковидные, зубчатые, пушистые; тычиночныя нити у основанія волосистыя. — По своему виду то приближается къ *S. aurita* L., то къ *S. livida* Wahlenb.; отъ первой отличается сине-зеленой нижней стороной, отъ второй — вдавленными жилками на верхней сторонѣ листа, тогда какъ у *S. livida* жилки не вдавлены.

Бутырское болото подъ Москвой (Шр.).—Мытищи—болото близъ Лосиннаго Острова (С.).—Лѣсъ близъ Невѣрова, Кал. у. (П.).—Близъ д. Спиридова, Дмит. у. (Х.).

280. **S. caprea** L. Пет. Кр. III, стр. 22.—Бух. II, № 374.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 267.—Кауф. II, № 683.—Цин., № 1326.—Кауф. I, стр. 447.—Lind., p. 160.—Дв., № 913.—Макс., № 909.—Hoffm. H., № 7681.—Gold. C., p. 23.—Mart., p. 175.—St. II, p. 55.—St. I, № 671.—Pal., № 2110.

Salix acuminata Hoffm. Hoff. H., № 7681.

Не высокое дерево въ 3—4 м., рѣже кустарникъ, съ сѣрой корой; годовалыя вѣтви голыя, зеленоватыя или буро-желтыя, молодые побѣги

пушистые: листья очень разнообразны: продолговато-ланцетные, овальные, иногда яйцевидные, но наибольшая ширина въ срединѣ, рѣже нѣсколько ниже середины листа, въ нижней частѣ округлые или слабо суженные, верхушка постепенно или быстро заостренная, б. ч. съ косымъ кончикомъ, края неравно-зубчатые, верхняя сторона у взрослыхъ листьевъ голая, темно-зеленая, слегка лоснящаяся, нижняя—съ выступающими жилками, сѣро-зеленая отъ густыхъ курчавыхъ волосковъ; черешокъ листа до 2 см. дл., пушистый; прилистники крупные, косо-почковидные, зубчатые; сережки почти сидячія; мужскія — овальныя, у основанія съ чешуйками; женскія — цилиндрическія, у основанія съ маленькими листочками; прицвѣтныя чешуйки съ обѣихъ сторонъ покрыты длинными волосками, рыжеватыя съ темной округлой верхушкой или продолговатыя съ острымъ кончикомъ; тычиночныя нити голыя; завязь узко-коническая, мохнатая или шелковисто-войлочная; ножка въ 3 раза длиннѣе широкой медовой железы.



Salix caprea.

По опушкамъ и по кустарникамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины апрѣля до половины мая.

× *S. latifolia* Forbes. = *S. caprea* × *nigricans* F. Brunner.

Пет. Кр. III, стр. 24.—П. Сюзевъ. Опѣк. нов. раст. Моск. фл. Отд. отд. изъ Труд. Бот. С. Им. Юр. Ун., стр. 10.

Молодыя вѣтви покрыты сѣрымъ пушкомъ, потомъ голыя, бурозеленыя, иногда красно-бурія; листья б. или м. кожистые, овальные, округло-овальные, округло-яйцевидные или яйцевидно-продолговатые, наибольшая ширина въ срединѣ или выше середины, къ верхушкѣ зубчатые, основаніе листа почти цѣльнокрайнее, верхняя сторона у взрослыхъ листьевъ покрыта разсыпными волосками, темно-зеленая, слегка лоснящаяся; нижняя—мягко-пушистая, съ сизоватымъ налетомъ и сильно выдающимися желтыми жилками; прилистники полусердцевидные или яйцевидные, слегка зубчатые; тычиночныя нити голыя; завязь яйцевидно-коническая, покрыта бѣлыми отстоящими и шелковистыми волосками, иногда почти голая; столбикъ равенъ трети или половине завязи; ножка въ 3—5 разъ длиннѣе



Salix latifolia.

железки.—Отъ *S. nigricans* Sm. отличается голыми тычиночными нитями; отъ *S. caprea* L.—сизымъ налетомъ на нижней сторонѣ листьевъ.

Близъ Петровскаго-Разумовскаго (Ф. А. Теплоуховъ).—Лѣсъ близъ Невѣрова, Кзм. у. (Сюз., П. и С.), найдена въ женскихъ особяхъ.

× *S. canescens* Fr. = *S. caprea* × *lapponum* Wimm.

Salix Laestadiana Hartm. *), Пет. Кр. III, стр. 22.

Salix Laestadiana Hartm. α. *canescens* Anders. Ф. Б., № 11.

Кустарникъ съ пушистыми вѣтвями; молодыя вѣтви покрыты бѣлымъ войлокомъ; молодые листья покрыты съ обѣихъ сторонъ густымъ бѣло-



Salix canescens.

ватымъ войлокомъ, взрослые — сверху зеленые, съ короткими прижатыми волосками, снизу сѣровато-или бѣло-войлочные, съ желтоватою срединною жилкою, продолговато-овальные или овально-ланцетные, къ обоимъ концамъ равномерно заостренные, въ нижней части цѣльнокрайніе, близъ верхушки б. ч. зубчатые; прицвѣтныя чешуйки продолговато-яйцевидныя, съ треугольной черной верхушкой, съ обѣихъ сторонъ покрыты густыми волосками; завязь узко-коническая, переходитъ въ столбикъ, покрыта бѣлымъ войлокомъ прижатыхъ и отстоящихъ волосковъ; железка въ 2 раза короче ножки.

Въ Клинскомъ у. (Ч.).—Красниковское болото за Мытищами. (П.).

281. *S. cinerea* L. Пет. Кр. III, стр. 25.—Бух. II, № 377.—Бух. I, № 356.—Ф. О., № 7, р. 102.—Пет., стр. 267.—Кауф. II, № 685.—Цин., № 1324.—Pinz., р. 18.—Кауф. I, стр. 449.—Lind., р. 160.—Ann. C. III., № 252.

Salix cinerea L. β. *aquatica* Sm. Бух. II, № 377.—Бух. I, № 356.—Кауф. II, стр. 464.—Кауф. I, стр. 449.

Salix acuminata Hoffm. Дв., № 919.—Макс., № 910.—Hoff. II., № 7672.—Gold. C., р. 23.—Mart., р. 175.—Lon., р. 114.

Salix spatulata Willd., гербарій Гевингга.

S. caprea-cinerea Бух. II, № 376 есть *S. cinerea*. Сообщилъ А. Н. Петунниковъ.

Молодые вѣтви толстыя, бархатисто-пушистыя, сѣрыя; годовалыя—тоже пушистыя, сѣро-зеленыя или сѣро-бурыя; почки бурыя, сваружи вздутыя, съ внутренней стороны плоскія; взрослые листья втрое длиннѣе ширины, обратно-линейные или продолговато-обратно-яйцевидные, съ клиновиднымъ основаніемъ и быстро-заостренной верхушкой, наибольшая ширина выше середины листа, края завернуты внутрь, зубчатые, верхняя

*) А. Н. Петунниковъ въ Крит. обзорѣ Моск. Фл. III, р. 22, эту помѣсь ошибочно назвалъ *S. Laestadiana* Hartm.; последнее названіе относится къ помѣси *S. cinerea-lapponum*, а не *caprea-lapponum*.

сторона тусклая, б. или м. пушистая, морщинистая, съ вдавленными жилками; нижняя—бархатисто-пушистая, часто войлочная, сѣрая, иногда слегка синеватая, съ свѣтло-желтыми выдающимися жилками; прилистники полудлунные или почковидные, цѣлюкрайніе или слегка зубчатые; сережки почти сидячія, у основанія съ чешуйками или съ очень мелкими шелковистыми листочками; прицѣпныя чешуйки лопатчатые, желтыя, верхушка ихъ красноватая или черно-бурая; тычиночныя нити у основанія покрыты волосками; завязь яйцевидно-длинно-коническая, съ нѣсколькими вздутымъ основаніемъ, сѣро- или бѣло-войлочная, съ короткимъ столбикомъ; почка въ 4—6 разъ длиннѣе железки.

По болотамъ, болотистымъ мѣстамъ, канавамъ и по опушкамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины апрѣля и до половины мая.

α. *spuria* Wimm. Пет. Кр. III, стр. 25.

Листья ланцетные, верхушка ихъ треугольная, длинно-заостренная. Влнзъ Серпухова (Сюз.). Въ гербаріи Максимовича и въ гербаріи Геннинга подъ названіемъ *S. nigricans* (сообщилъ Ф. А. Теплоуховъ).

× *S. Reichardtii* A. Kern. = *S. caprea* × *cinerea* Wimm.

Пет. Кр. III, стр. 22.—П. Сюзевъ. О нѣк. нов. рас. Моск. Фл. Отд. отг. изъ Труд. Бот. С. Им. Юр. Ун., стр. 7.

Salix laurifolia Wesmael. Ф. В., № 10.

Salix aquatica Sm.

Годовалыя вѣтви пушистыя; листья продолговато-обратно-яйцевидные или продолговато-овальные, но наибольшая ширина выше середины листа,



Salix cinerea.



Salix Reichardtii.

основаніе клиновидно-округлое, верхушка быстро сужена въ косой кончикъ или туповатая, верхняя сторона листьевъ б. ч. морщинистая, зеленая, тусклая отъ короткаго пушка, рѣже голая, нижняя—бархатисто-пушистая, сизо-сѣрая, съ выступающими желтоватыми жилками; прилист-

ники косые или почковидные, б. ч. цѣлюкрайніе, рѣже зазубренные, иногда заостренные; тычинки у основанія слегка волосистыя; завязь узко-коническая, позднѣе у основанія яйцевидная.

Близъ Серпухова (Сюз.).—Петровское-Разумовское (Ф. А. Теплоуховъ).—(В. Богородское, Мос. у. (Шр.).—Куково (Куль.).—Серебряный боръ близъ Хорошова (Х.).

× *S. multinervis* Döll. = *S. aurita* × *cinerea* Wimm.

Salix lutescens Kern. Пет. Кр. III, стр. 25.

Тонкими годовалыми почти голыми вѣтвями походить на *S. aurita* L., но отличается болѣе крупными срезками и столбикомъ, хотя и короткимъ, но ясно замѣтнымъ; листья по очертанію и окраскѣ походить на *S. cinerea* L., но весьма измѣнчивы въ отношеніи длины къ ширинѣ, отъ полутора до трехъ разъ; верхніе листья на одной и той же вѣтви болѣе походить на *S. cinerea* L., нижніе—на *S. aurita* L.

Близъ Архангельскаго, Звн. у. (Шр.).

× *S. pubérula* Döll = *S. cinerea* × *nigricans* Wimm. Пет. Кр. III, стр. 24.

Salix nigricans Sm. β. *eriosarpa* Koch. Кауф. II, стр. 463.—Кауф. I, стр. 448.

Молодые вѣтви сѣрые, бархатисто-пушистыя, годовалыя—бурые, голыя или слегка-пушистыя; листья на короткихъ, толстыхъ черешкахъ, продолговато-обратно-яйцевидные, овальные или широко-ланцетные, наибольшая ширина выше средины листа, основаніе б. ч. клиновидное, часто



Salix multinervis.



Salix puberula.


цѣлюкрайнее, верхушка постепенно или быстро сужена въ короткій кончикъ, по краямъ зубчатая, иногда листья зубчатые почти отъ основанія; верхняя сторона взрослыхъ листьевъ грязно-зеленая, тусклая, разсѣинно-волосистая, нижняя—съ мало выдающимися жилками, б. или м. густо покрыта волосами и съ низымъ или голубоватымъ налетомъ; прилистники полувзрослые или яйцевидные, косые; тычиночные нити почти голыя,

завязь покрыта б. или м. густыми, сфероватыми, доснивающимися волосками; столбикъ съ рыльцемъ почти равнымъ трети завязи; ножка въ 3 раза длиннѣе железки. — Отличается наибольшей шириной листа выше середины, тогда какъ у *S. nigricans* Sm. наибольшая ширина у середины, и длиною столбика; отъ *S. cinerea* L. — сизымъ или синеватымъ налетомъ на нижней сторонѣ листьевъ.

Берегъ пруда за Останкпнымъ. Петровское-Разумовское (К.). — Архангельское, Звн. у. (Шр.).

× *S. subsericea* Döll. = *S. cinerea* × *repens* Wimm. Пет. Кр. III, стр. 22. — Ф. Б., № 13.

Кустарникъ съ вверхъ торчащими вѣтвями; кора годовалыхъ вѣтвей буроватая, въ верхней части бархатистая, молодые вѣтви сферовато-пушистыя; молодые листья покрыты серебристо-шелковистымъ пушкомъ, взрослые — сверху зеленые, слегка пушистые, снизу сизовато-сѣрые, шелковисто-пушистые, продолговато-эллиптическіе, продолговатые или почти овальные, отъ середины къ обоимъ концамъ равномерно суженные или наибольшая ширина выше середины листа, по краямъ съ рѣдкими, неровными, мелкими зубчиками, иногда слегка волнистые; сережки на короткихъ ножкахъ съ чешуйками у основанія; прицвѣтныя чешуйки язычковидныя или лопатчатые, коротко-заостренные, съ обѣихъ сторонъ покрыты бѣловатыми волосками, свѣтло-бурые, верхушка ихъ черповатая; завязь узко-коническая, покрыта слегка отстоящими, шелковистыми волосками; столбикъ короткій; ножка равна половинѣ всей завязи и въ 3 раза длиннѣе железки. — Отличается отъ *S. cinerea* L. шелковистыми волосками на молодыхъ листьяхъ и на нижней сторонѣ старыхъ; отъ *S. repens* L. — формою листьевъ и сильно выступающими жилками на нижней сторонѣ ихъ.



Salix subsericea.

Подъ именемъ *S. aurita* L. въ гербаріи Никитина.

282. *S. lapponum* L.

Salix Lapponum L. Пет. Кр. III, стр. 18. — Ф. Б., № 83. — Пет., стр. 266. — Кауф. II, № 678. — Гор., № 38. — Цин., № 1332. — Кауф. I, стр. 444.

Salix limosa Wahlenb. Borg., p. 700. — Дв., № 909. — Макс., № 906. — Gold. C., p. 23.

Salix speciosa Londres. Hoff. II., № 7718.

Не высокій кустарникъ съ красновато-бурой корой; листья продолговатые, эллиптическіе или продолговато-яйцевидные, у основанія округлые или равномерно къ обоимъ концамъ заостренные, отъ 3 до 7 см. дл. и отъ 7 до 30 мм. ш., цѣльнокрайніе, часто съ слегка завернутыми внутрь краями.

въ молодости съ обѣихъ сторонъ густо покрыты бѣлыми, прямыми и курчавыми волосами, потомъ съ верхней стороны часто почти голые, темно-



Salix lapponum.

зеленые; мужскія сережки сидячія, овальныя, густыя, 1,5—2,5 см. дл.; женскія сережки на ножкахъ; прицвѣтныя чешуйки обратно-яйцевидныя, б. ч. острыя, у основанія бурья, къ верхушкѣ почти черныя, съ обѣихъ сторонъ усажены длинными волосами; тычинокъ 2, съ голыми нитями и съ фіолетово-желтыми пыльниками; завязь покрыта тонкимъ войлокомъ, длинно-коническая, съ расширеннымъ, округлымъ основаніемъ, на очень короткой ножкѣ, на половину короче медовой железки; столбикъ вмѣстѣ съ рыльцемъ равенъ завязи или двумъ третямъ ея.

По большимъ торфянымъ болотамъ и торфянымъ болотистымъ лугамъ. Цвѣтетъ до листьевъ съ конца апрѣля, иногда въ началѣ мая.

Б. Мытищи, Захарково (К.).—Бутырки (Кар.).—Анинское болото (Гум.).—Богородское, Мос. у. (М.).—Красинковское болото за Б. Мытищами: озера: Круглое, Долгое и Нерское, Мос. у. (П. и С.).—Захарово. Клин. у. (П.).—Пуршево, Руз. у. (Сюз.).—Глубокое озеро, Руз. у. (Г. О. и Ф. В.).—Болото близъ Каржени, Мож. у. (Ф. В.).—Грибаново, Влж. у. (Ч.).

× *S. versifolia* Wahlenb. = *S. lapponum* × *myrtilloides* Wimm.

Иет. Кр. III, стр. 19 и 21.—Макс., № 912.

Кустарникъ до 1 м., съ желтоватой или красно-бурой корой; молодые вѣтви пушистыя; листья на короткихъ пушистыхъ черешкахъ, овальные



Salix versifolia.

или продолговато-овальные, цѣльнокрайніе съ слегка завернутымъ внутрь краемъ, основаніе ихъ округлое или слегка суженное, верхушка коротко-заостренная; молодые листья съ обѣихъ сторонъ и по краямъ пушистыя, позднѣ верхняя сторона съ рѣдкими волосами, темно-зеленая, нижняя—покрыта густыми, мягкими волосами, сизоватая; сережки продолговатыя, у основанія съ маленькими листочками; прицвѣтныя чешуйки продолговато-обратно-яйцевидныя, желтоватыя, съ розовой, потомъ чернѣющей верхушкой, покрыты длинными волосами; тычинокъ 2, съ голыми нитями, пыльники чернѣютъ; завязь коническая или узко-

коническая, голая или пушистая; ножка въ 3 раза длиннѣе медовой железки; столбикъ короткій съ 2-лопастными рыльцами.

По болыпимъ моховымъ торфянымъ болотамъ, рѣдко; пока только въ мужскихъ особяхъ. В. Мытницѣ близъ Лосиннаго Острова, въ цвѣту 15 мая 1893 г. (П. и С.).

283. *S. acutifolia* Willd. Пет. Кр. III, стр. 34.—Макс., № 898.—Gold. C., p. 23.

Salix acutifolia Willd. livonica. Gold. Sp., p. 139.

Salix daphnoides Vill. Кауф. II, № 689.—Цин., № 1319.—Кауф. I, стр. 451.

Salix daphnoides Vill. *acutifolia* Willd. F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, стр. 466.—Кауф. I, стр. 451.

Salix daphnoides Vill. *a. praecox* Норре. Кауф. II, стр. 466.—Кауф. I, стр. 451.

Salix pruinosa Wendl. Ф. В., № 12.—Пет., стр. 266.

Кустарникъ или маленькое деревцо; годовалыя вѣтви красно-бурыя или темно-бурыя, съ густымъ низымъ налетомъ, рѣже вѣтви зеленовато-бурыя; взрослые листья ланцетные, длинно-заостренные, б. ч. съ коротко-клиновиднымъ основаніемъ, по краямъ часто- и железисто-зубчатые, верхняя сторона темно-зеленая, лоснящаяся, нижняя — свѣтло-зеленая, иногда съ сизоватымъ налетомъ; прилистники б. ч. ланцетные или широко-ланцетные, зубчатые; сережки разставлены; прицвѣтныя чешуйки яйцевидныя, заостренныя, рѣже двупластныя, къ верхушкѣ темно-бурыя или почти черныя, съ обѣихъ сторонъ съ длинными бѣлыми волосками; тычиночныя нити голыя; завязь голая, яйцевидно-коническая, съ боковъ сплюснутая, съ довольно длиннымъ столбикомъ; ножка завязи короткая, часто пушистая, равна медовой железкѣ.



Salix acutifolia.

По берегамъ рѣкъ, на пескахъ. Цвѣтеть до листьевъ въ апрѣлѣ.

Павловскій посадъ—близъ дер. Городки, Вгр. у. (К.).—За Лужками. Сrp. у. (Мпл.).—Близъ Серпухова по р. Серпейкѣ (Сюз.).—Карачеево. Кзм. у. (П.).

284. *S. Gmelinii* Pall. Пет. Кр. III, стр. 28.—П. Сюевъ. О вѣк. нов. раст. Моск. фл. Отд. отд. изъ Тр. Бот. Сад. Им. Юр. Ун., стр. 10.

Salix viminalis L. F. O., № 7, p. 102.—Дв., № 915.—Макс., № 911.—Gold. C., p. 23.—Mart., p. 175.—St. II, p. 55.—St. I, № 672.—Pal., № 2111.

Salix stipularis Sm. F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 268.—Кауф. II, № 686.—Цин., № 1322.—Кауф. I, стр. 449—50.

Кустарникъ до 2 м., съ желтоватой корой; молодыя вѣтви, какъ и почки, то опушенные, то голыя; взрослые листья узко-ланцетные, въ 7—14 разъ длиннѣе ширины, равномерно суженные къ обѣимъ концамъ, съ короткимъ, иногда косымъ кончикомъ; верхняя поверхность ихъ слегка

опушенная, сѣровато-зеленая. нижняя—густо покрыта серебристыми волосками; сережки цилиндрическія, на короткихъ ножкахъ, съ 2—3 листочками у основанія, у мужскихъ иногда только съ чешуйками, зацвѣтають одновременно съ появленіемъ листьевъ; прицвѣтныя чешуйки на концѣ широко-закругленныя или выемчатыя; завязь всегда сидячая, коротко-коническая, почти яйцевидная, покрыта частымъ, бѣлымъ войлокомъ; столбикъ б. или м. короткій и толстый, съ рыльцемъ въ нѣсколько разъ длиннѣе столбика.



Salix Gmelinii.

По берегамъ рѣкъ и въ низинахъ по заливнымъ лугамъ.

Цвѣтеть съ половины апрѣля до половины мая.

2. *subviminalis* Teplouch. Пет. Кр. III, стр. 29.

Верхніе листья укороченныхъ вѣтвей удлинненно-ланцетные, въ 7—12 разъ длиннѣе ширины, вытянутые въ довольно длинный, тонкій конецъ, нижніе—нѣсколько уширены къ концу, въ 5—7 разъ длиннѣе ширины, съ короткимъ кончикомъ; все листья сверху тускло-зеленые, снизу покрыты частыми, бѣлыми волосками съ серебристымъ отливомъ; мужскія сережки почти сидячія, съ чешуевидными листочками или безъ нихъ; вѣтви, почки и черешки почти голые.

Спаское; Денисьево, Зви. у. (К.). — Петровско-Разумовское — у пруда (П.).

3. *pseudostipularis* Teplouch. Пет. Кр. III, стр. 29.

Salix stipularis Sm. Пет., стр. 268.—Кауф. II, стр. 686.—Кауф. I, стр. 449—50.

Верхніе листья удлинненно-ланцетные или линейно-ланцетные, въ 10—14 разъ длиннѣе ширины, вытянуты въ короткій или довольно длинный кончикъ, нижніе—нѣсколько уширены къ концу, въ 6—9 разъ длиннѣе ширины; все листья сверху сѣровато-зеленые, снизу густо покрыты серебристыми волосками, образующими нерѣдко шерстистый войлокъ; мужскія сережки на короткихъ ножкахъ; молодые побѣги и почки нерѣдко покрыты густымъ пушкомъ и кажутся какъ бы осыпанными мукой.

Симоновъ монастырь (К.).—С. Архангельское. Зви. у.; Павшино и Тушино (Шр.).—Ст. Ока (Сюз.).—Дракино, Срп. у. (С.).

7. *Wobstii* (Schroed.) Teplouch. Пет. Кр. III, стр. 30.

Верхніе листья укороченныхъ побѣговъ ланцетные, въ 7—10 разъ длиннѣе ширины, равномерно суженные къ обоимъ концамъ, съ короткимъ кончикомъ; нижніе—уширенные выше середины, въ 5—8 разъ длиннѣе ширины, съ короткимъ кончикомъ, или притуп-

ленные; всё листья сверху тускло-сѣровато-зеленые, снизу густошерстистые, съ серебристымъ отливомъ. Кора вѣтвей ярко-желтая, на прошлогоднихъ вѣтвяхъ голая; черешки листьевъ, почки и верхушки молодыхъ вѣтвей слегка опушенные или голые. Окрестности Петровскаго-Разумовскаго (Вобсть).—Близъ Павловскаго посада, Бгр. у. (П. и С.).

S. caprea × Gmelinii Teplouch. Пет. Кр. III, стр. 31.

Salix viminalis L. Пет., стр. 268.—Кауф. II, № 687.—Кауф. I., стр. 450.

Кустарникъ до 2 м.; молодые вѣтви съ буро-желтой корой, на концѣ покрыты легко опадающимъ, шерстистымъ, рѣдкимъ пушкомъ, годовалыя—голыя; съ желтой корой; взрослые листья удлинненно-ланцетные, неравнобокіе, 110 мм. дл., 12—16 мм. ш., часто съ косымъ кончикомъ, заостренные, къ основанію клиновидные, цѣлюкрайніе или иногда къ верхушкѣ по загнутому внутрь краю съ железистыми зубчиками, сверху синевато-зеленые, покрыты рѣдкими шерстистыми волосками, жилки желто-бурыя, сильно выдающіяся; прилистники серповидные, съ нѣсколькими зубчиками по наружному краю, на побѣгахъ очень крупныя; цвѣтетъ въ началѣ развертыванія листьевъ; сережки очень длинныя, цилиндрическія, до 5 см. дл., густыя, на короткой, густошерстистой ножкѣ съ 2 листочками у основанія; прицвѣтныя чешуйки обратно-яйцевидныя, заостренныя, темно-бурыя, съ черноватымъ кончикомъ, покрыты очень длинными, густыми волосками; завязь яйцевидно-коническая, покрыта частымъ шерстистымъ войлокомъ; столбикъ длинный, почти равенъ завязи; почка равна желѣзкѣ или короче ея. Найдено пока только въ женскихъ особяхъ.



Salix caprea

Gmelinii

Эта помѣсь, по сообщенію Ф. А. Теплоухова, ошибочно названа Кауфманомъ *S. viminalis* L. и указана подъ Симоновымъ монастыремъ и въ Денисьевѣ, Звн. у.

285. **S. dasýclados Wimm.** Пет. Кр. III, стр. 33. — П. Сюзевъ. О нѣк. нов. раст. Мос. фл. Отд. отт. изъ Тр. Бот. Сад. Им. Юр. Ун., стр. 10.

Salix acuminata Sm. F. O., № 7, p. 102. — Кауф. II, стр. 733 примѣч. 44.—Гор., № 74.—Цив., стр. 395—Дв., № 914.—Макс., № 910.—Gold. C., p. 23. — Mart., p. 175.

Salix longifolia Host. Кауф. II, стр. 733, примѣч. 44.—Гор., № 73.

Кустарникъ съ бурой или буро-желтой корой; годовалыя вѣтви голыя, молодые—покрыты пушкомъ; взрослые листья широко- или узко-ланцетные, съ клиновиднымъ или округлымъ основаніемъ, иногда неравнобокіе, на короткихъ б. или м. пушистыхъ черешкахъ, края слегка завернуты внутрь, цѣлюкрайніе или иногда, особенно на побѣгахъ, железисто зубчатые, верхняя сторона б. ч. голая, съ желтоватыми, вдавленными жил-

кам, нижняя—б. ч. слабо шелковистая от прижатых волосков и съ выступающими жилками; молодые листья съ обѣихъ сторонъ пушистые;



Salix dasyclados.

длина листа 8—18 см., ширина 1,5—3,5 см.; сережки крупныя, почти сидячія, съ чешуйками у основанія; прицвѣтныя чешуйки свѣтло-бурыя, съ почти черной верхушкой, покрыты очень длинными, густыми волосками, у мужскихъ цвѣтовъ съ треугольной верхушкой, у женскихъ—съ округлой; тычиночныя нити голыя; завязь узко-коническая, покрыта густыми, бѣлыми, нѣсколько извилистыми волосками; столбикъ длинный, у основанія пушистый, ножка завязи равна железкѣ или вдвое длиннѣе ея.

По канавамъ и сырýmъ мѣстамъ. Цвѣтеть съ половины апрѣля и въ началѣ мая. Свиблово, Мос. у. (Ф. А. Теплоуховъ).—Архангельское, Звн. у.; Петровское - Разумовское (Шр.).—Воробьевы горы, Симоновъ монастырь (П.).—Подъ Серпуховымъ (Сюз.).—Черкизово на Клязьмѣ (С.).—Новый Иерусалимъ у монастыря, Звн. у. (Х.).

286. *S. purpurea* L. Пет. Кр. III, стр. 33.—Бух., II, № 383.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 265.—Кауф. II, № 688.—Гор., № 40.—Цин., № 1320.—Кауф. I, стр. 451.

Salix purpurea L. α. Helix Koch. Кауф. II, стр. 466.—Кауф. I, стр. 451.

Salix monandra Hoffm. Дв., № 905.—Макс., № 902.—Gold. C., p. 23.—Mart., p. 174.—St. II, p. 55.

Salix Helix L. St. I, № 667.—Pall., № 2108.

Кустарникъ до 2 м., съ сѣрой корой; молодыя вѣтви длинныя, прутьевидныя, голыя, съ желтой или красноватой корой; взрослые листья ланцетные, наибольшей ширины въ верхней трети листа, коротко-заостренныя, къ основанію постепенно суженныя, въ нижней части цѣльнокрайніе, близъ верхушки зубчатые, съ обѣихъ сторонъ съ сильно выдающимися жилками, верхняя сторона голая, темно-зеленая, слабо-лоснящаяся, нижняя—сизо-зеленая, голая; прилистники рано опадаютъ; сережки сидячія, съ очень маленькими листочками у основанія; прицвѣтныя чешуйки обратно-яйцевидныя, округлыя или слегка заостренныя, волосистыя, желтыя или свѣтло-пурпуровыя съ темно-пурпуровымъ или черноватымъ кончикомъ; тычиночныя нити голыя, срос-



Salix purpurea.

ниися до верхушки; пыльники шаровидные, желто-красные, потомъ чернѣютъ; завязь яйцевидная или яйцевидно-коническая, бѣло-войлочная, съ очень короткимъ столбикомъ и желтоватыми или пурпуровыми рыльцами; ножка завязи равна или короче железки.

По берегамъ рѣкъ и по болотамъ, рѣдко. Цвѣтетъ въ концѣ апрѣля и до середины мая. Бутырки (Ген.). — На песчаномъ островѣ противъ Бачмапова, Кзм. у. (С.). — Бѣлые Колодези, Кзм. у.; берегъ р. Оки за Лужками противъ Пущина, Сри. у. (Н.). — Вороново, Пдл. у. (В.). — Контевское болото близъ Петровскаго-Разумовскаго (Шр.).

× *S. Doniána* Sm. = *S. purpurea* × *repens* Wimm. Пет. Кр. III, стр. 34.

Кустарникъ съ молодыми, слегка пушистыми вѣтвями; взрослые листья яйцевидно-ланцетные или узко-ланцетные (наибольшая ширина выше середины листа) съ заостренной верхушкой и постепенно суженные къ основанію, края слегка завернуты внутрь, въ нижней части пѣльнокрайніе, близъ верхушки зубчатые, верхняя сторона въ молодости шелковистопушистая, потомъ голая, нѣсколько лоснящаяся, темно- или синевадно-темно-зеленая, нижняя — сине-зеленая, покрыта б. или м. густо волосками, рѣже голая; прилистниковъ нѣтъ или они маленькіе, линейные, рано опадающіе; сережки сидячія, съ маленькими листочками у основанія; прицвѣтныя чешуйки лопатчатые или продолговатые, б. ч. съ округлой верхушкой, покрыты волосками, желтовато-пурпуровыя, съ черноватой верхушкой; тычиночныя нити сросшіяся не до самой верхушки, у основанія слегка волосистыя; завязь яйцевидно-коническая, покрыта густыми, бѣловатыми, лоснящимися волосками; столбикъ очень короткий; ножка завязи въ 2—2½ раза длиннѣе железки. — Отъ *S. purpurea* L. отличается тычиночными нитями, сросшимися не до самой верхушки, внутрь загнутыми краями листьевъ и длинной ножкой завязи.



Salix Doniana.

Болото близъ Контева подъ Москвой, въ женскихъ особяхъ (Шр.).

107. *Pópulus* L.

Цвѣты до распусканія листьевъ въ густыхъ цилиндрическихъ, потомъ удлинненныхъ, повислыхъ сережкахъ; околоцвѣтникъ у женскихъ цвѣтовъ чашевидный, косо срѣзанный или блюдчатый; кроющія чешуйки надрѣзныя или зубчатые; тычинокъ 4—30; листья б. ч. на длинныхъ черешкахъ, простые или лопастные, на корневыхъ побѣгахъ иной формы, чѣмъ на вѣтвяхъ; прицвѣтники и прилистники рано опадаютъ.

1. Нижняя сторона листьевъ и молодые вѣтви густо покрыты бѣлымъ войлокомъ. *P. alba* L.
Войлока нѣтъ. 2.
2. Черешки листьевъ сплюснутые. 3.
Черешки листьевъ цилиндрическіе. 6.
3. Почкп пушистыя. листья почти округлыя, края ихъ неровновыемчато-зубчатыя. *P. tremula* L.
Почкп голыя; листья иной формы, съ зубчатыми, но не выемчатыми краями. 4.
4. Вѣтви, особенно на побѣгахъ, съ сильно выдающимися ребрами; листья 6—13 см. дл.; околоцвѣтникъ охватываетъ только основаніе завязи. *P. angulata* Ait.
Вѣтви и побѣги цилиндрическіе или съ едва замѣтными гранями; листья не длиннѣе 8 см.; околоцвѣтникъ охватываетъ $\frac{1}{2}$ или $\frac{3}{4}$ завязи. 5.
5. Черешокъ листа короче пластинки; завязь о 4 бороздкахъ, почти вполне заключена въ околоцвѣтникъ. *P. nigra* L.
Черешокъ листа равенъ или длиннѣе пластинки; завязь о 6 бороздкахъ, только наполовину заключена въ околоцвѣтникъ. *P. canadensis* Moench.
6. Листья яйцевидно-овальные или широко-эллиптическіе, б. ч. быстро заострены въ короткій кончикъ. *P. balsamifera* L. a. *suaveolens* Loud.
Листья постепенно заострены или вытянуты въ довольно длинный кончикъ. 7.
7. Молодые вѣтви цилиндрическія или только на концѣ вѣтви съ едва замѣтными ребрышками. 8.
Молодые вѣтви сильно ребристыя, особенно ясно на побѣгахъ. 9.
8. Листья 5—12 см. дл. и 2,5—7 см. ш., яйцевидно-продолговатыя или широко-яйцевидныя, съ округлымъ или слегка клиновиднымъ основаніемъ; околоцвѣтникъ охватываетъ завязь до половины. *P. balsamifera* L.
Листья очень крупныя, 6—15 см. дл. и 5—12 см. ш., на побѣгахъ еще крупнѣе, основаніе ихъ округлое, усѣченное или слегка сердцевидное; околоцвѣтникъ охватываетъ только основаніе завязи. *P. candicans* Ait.
9. Черешки листьевъ 1—2 см. дл.; зубцы листьевъ округлыя, съ мало замѣтными железками. *P. moscoviensis* Schroeder.
Черешки листьевъ 3—4,5 см. дл., очень рѣдко 2 см.; зубцы листьевъ съ ясно-замѣтными железками. 10.
10. Дерево съ раскидистыми вѣтвями; листья узко-эллиптическіе или яйцевидно-ланцетныя, 6—14 см. дл., 2,5—4,5 см. ш., края ихъ иногда волнистыя. *P. laurifolia* Ledeb.
Пирамидальное дерево; листья округло-яйцевидныя или яйцевидныя, съ б. или м. вытянутымъ кончикомъ, 4—8 см. дл. и 3—4,5 см. ш. *P. berolinensis* C. Koch.

* *P. álba* L. Пет. Кр. III, стр. 40. — Пет., стр. 247. — Кауф. II, № 696. — Цип., № 1333. — Кауфм. I, стр. 456.

Высокое дерево съ сѣрою корой; молодыя вѣтви, черешки и нижняя сторона листьевъ густо покрыты бѣлым войлокомъ; почки вначалѣ покрыты красно-бурымъ пушкомъ; листья на цилиндрическихъ черешкахъ, округло-яйцевидные или яйцевидно-треугольные, у основанія слегка сердцевидные, угловато-выемчато-зубчатые, верхняя сторона у взрослыхъ листьевъ голая, темно-зеленая, лоснящаяся; на побѣгахъ листья часто бываютъ яйцевидно-широко-треугольные, почти лопастные; сережки распускаются до листьевъ; прицвѣтные чешуйки неравно- и коротко-зубчатая, ржаво-красныя, слегка мохнатыя; пыльники пурпуровые, на короткихъ нитяхъ; завязь продолговатая съ темнымъ рыльцемъ.



Populus alba.

Цвѣтетъ съ половины апрѣля. Разводится, сѣвернѣе Москвы—страдаетъ отъ морозовъ, особенно на тяжелой глинистой почвѣ.

287. *P. trémula* L. Пет. Кр. III, стр. 40. — Бух. II, № 385. — Бух. I, № 352. — Р. О., № 7, p. 102. — Пет., стр. 247. — Кауф. II, № 695. — Цип., № 1334. — Pinz., p. 18. — Кауф. I, стр. 456. — Lind., p. 160. — Ann. C. IV, № 51. — Дв., № 919. — Макс., № 917. — Hoff. H., № 7752. — Gold. C., p. 23. — Mart., p. 177. — Hoff., № 2567. — St. II, p. 55. — St. I, № 677. — Pall., № 2127.

Высокое дерево съ сѣрой корой, на молодыхъ вѣтвяхъ съ оливково-сѣрой корой; листья на длинныхъ, сплюснутыхъ черешкахъ, почти округлые или округло-треугольные, иногда съ слегка сердцевиднымъ основаніемъ, края неравно- выемчато-зубчатые, съ верхней стороны блѣдно-зеленые, съ нижней—сѣро- или сизо-зеленые, взрослые—съ обѣихъ сторонъ голые; на побѣгахъ листья часто бываютъ сердцевидно-треугольные, съ длинно-заостренной верхушкой и съ нижней стороны покрыты пушкомъ; сережки распускаются до листьевъ; прицвѣтные чешуйки темно-бурыя, надрѣзочно-зубчатая, покрыты, какъ по краямъ, такъ и по поверхности длинными волосками; пыльники пурпуровые, спядчѣе; завязь съ пурпуровыми рыльцами; почки пушистыя.



Populus tremula.

Образуетъ лѣса и отдѣльными деревьями между другими породами, очень часто. Цвѣтетъ съ половины апрѣля и до половины мая.

288. **P. nigra L.** Пет. Кр. III, стр. 40. — Ф. Б., № 9. — Пет., стр. 247. — Кауф. II, № 694. — Цип., № 1335. — Кауф. I, стр. 456. — Дв., № 920. — Макс., № 918. — Hoff. II, № 7751. — Gold. C., p. 23. — Mart., p. 177. — Hoff., № 2566. — St. II, p. 55. — St. I, № 678.

Дерево съ сѣрой корой, кора на молодыхъ вѣтвяхъ сѣровато-желтая, нѣсколько лоснящаяся; листья на длинныхъ, сплюснутыхъ черешкахъ,



Populus nigra.

нѣсколько кожистые, яйцевидно-треугольные, съ широко-клиновиднымъ основаніемъ, рѣже основаніе почти срѣзано, верхушка ихъ заострена, края железисто-зубчатые, зубчики загнуты къ верхушкѣ листа; почки голыя, при распусканіи клейкія, сильно ароматчныя; сережки распускаются до листьевъ; прицвѣтныя чешуйки глубоко-надрѣзные, голыя, рѣже съ короткими рѣсничками; тычинки на короткихъ нитяхъ; пыльники пурпуровые; завязь о 4 бороздкахъ, заключена почти вся или до трехъ четвертей въ бокальчатый околоцвѣтникъ; рыльца желтыя, 2-лопастныя, отогнутыя.

По берегу р. Оки, на пескахъ. Цвѣтетъ съ половины апрѣля и въ первыхъ числахъ мая. За Лужками, Срп. у. (С.). — Зиброво, Срп. у. (П. и С.). — На песчаномъ островѣ противъ Бачманова, Бѣлые Колодези, Клм. у. (П.). — Граворны по р. Коломенкѣ, Клм. у. (Дв.).

* **P. canadensis Moench.** Пет. Кр. III, стр. 42.

Populus canadensis Desf. Пет., стр. 247.

Не высокое дерево, сильно вѣтвистое; молодыя вѣтви голыя, буроватыя или буро-зеленыя, цилиндрическія или слегка ребристыя; черешки листьевъ




Populus canadensis.

длинные, сплюснутые, голые, часто съ 2 железками; листья плотные, пергаментные, округло-треугольные, у основанія очень широко-клиновидные или усѣченные, къ верхушкѣ вытянутые въ короткій кончикъ, длина листа 3—8 см., ширина 3—6 см. (на женскихъ особяхъ листья крупнѣе), съ обѣихъ сторонъ одинаково окрашены или снизу нѣсколько свѣтлѣе, по краямъ неравно выщербленно-зубчатые, зубцы округлые, загнуты къ верхушкѣ, съ железкой, края у листьевъ иногда слегка волнистые; мужскія сережки сидятъ, толстыя, цилиндрическія, 6—8 см. дл.; прицвѣтныя чешуйки округлыя, по краямъ глубоко-зубчатыя, рѣсничатыя; тычинокъ 20—30; женскія сережки не густыя, при

плодоношеніи до 15 см. дл.; прицвѣтныя чешуйки ихъ желтоватыя, рано опадаютъ; завязь о 6 бороздкахъ; околоцвѣтникъ охватываетъ завязь до половины. Разводится.

* *P. anguláta* Ait. Пет. Кр., III, стр. 42.


Высокое дерево съ развѣистой кроной; молодыя вѣтви буроватыя или желто-зеленыя, съ сильно выдающимися ребрами; почки длинныя, острыя, буро-зеленыя, мало-клейкія; листья на длинныхъ, желтоватыхъ, голыхъ, сплюснутыхъ черешкахъ, часто съ 2 железками, широко-треугольно-яйцевидные или треугольно-овальные съ срѣзаннымъ основаніемъ и быстро вытянутымъ короткимъ кончикомъ, сверху ярко-зеленыя, снизу нѣсколько свѣтлѣе, по краямъ неравно-зубчатые, зубцы закругленные, съ железкой на концѣ, длина листа 7—15 см., ширина 6—13 см.; мужскія сережки толстыя, цилиндрическія, 8—10 см. дл., съ голыми, цѣльнокрайними или зубчатыми, красно-бурыми прицвѣтными чешуйками и съ 20—30 тычинками; женскія—рѣдкоцвѣтныя, во время плодоношенія до 20 см. длины; околоцвѣтникъ охватываетъ лишь основаніе завязи; рыльца желтыя. Разводится.



Populus angulata.

* *P. cándicans* Ait.

Высокое развѣистое дерево съ сѣрой корой; молодыя вѣтви лоснящіяся, желто-бурія или буро-зеленыя, цилиндрическія, только иногда близъ верхушки съ едва замѣтными возвышенными полосками; почки удлиненыя, острыя, желто-бурія, сильно клейкія и ароматичныя; черешки не сплюснутые, до 5 см. дл., опушенные и б. ч. съ 2 железками; листья яйцевидно-треугольные или широко-яйцевидные, съ округлымъ, усѣченнымъ или слегка сердцевиднымъ основаніемъ и равномерно заостренной верхушкой, края ихъ б. ч. рѣсничатые, неравно-зубчатые, зубцы съ железкой, нѣсколько округлые и загнуты къ верхушкѣ; верхняя сторона темно-зеленая, нижняя—свѣтло- или сѣро-зеленая; самый крупнолистный тополь: длина листа 6—15 см., ширина 5—12 см., на побѣгахъ въ полтора раза крупнѣе; женскія сережки длинныя, рѣдкоцвѣтныя, при



Populus candicans.

плодоношеніи до 12 см. дл.; прицвѣтныя чешуйки рѣсничатыя; завязь съ двуплостнымъ почковиднымъ рыльцемъ; покровъ охватываетъ только основаніе завязи. Разводится.

* *P. balsamifera* L. Пет. Кр. III, стр. 41.—Пет., стр. 247.—Pal., № 2128.

Высокое дерево съ буровато-сѣрой корой; годовалыя вѣтви цилиндрическія съ буровато-каштановой, лоснящейся корой; молодыя вѣтви и почки клейкія, голыя, сильно ароматичныя; листья на длинныхъ, цилиндрическихъ черешкахъ, почти кожистые, широко-яйцевидные или яйце-



Populus balsamifera.



Populus balsamifera v. *suaveolens*.

видно-продолговатыя, иногда овальныя, къ основанію суженныя или округлыя, на концѣ б. ч. длинно-заостренныя, по краямъ железисто-зубчатые, сверху темно-зеленыя съ бѣловатыми жилками, снизу бѣловато- или сѣро-зеленыя, мѣстами съ желтыми смолистыми пятнами; длина листа 5—12 см., ширина 2,5—7 см.; мужскія сережки — 5—7 см. дл., съ широкими, нѣсколько волосистыми желтоватыми прицвѣтными чешуйками и съ 20—30 тычинками въ каждомъ цвѣткѣ; женскія сережки отъ 8 до 15 см. дл., съ скоро опадающими желтыми прицвѣтными чешуйками и пурпуровыми рыльцами; завязь до половины покрыта околоцвѣтникомъ, спящимъ на длинной ножкѣ. Разводится.

α. suaveolens Loud. ¹⁾

Populus suaveolens Fisch. Пет. Кр. III, стр. 41. — Кауф. II, стр. 470. — Цпп., стр. 399. — Кауф. I, стр. 455.

Кора на годовалыхъ вѣтвяхъ сѣрая, на молодыхъ зеленовато- или сѣровато-бурая, нѣсколько лоснящаяся; почки очень клейкія; листья на цилиндрическихъ, слегка опушенныхъ черешкахъ, съ верхней стороны

¹⁾ На разводимыхъ экземплярахъ часто замѣтны коробочки, вскрывающіяся 3—4 створками, вмѣсто обычныхъ у всѣхъ *Salicaceae* 2 створок; эта аномалія послужила Фишеру главнымъ основаніемъ къ выдѣленію данной разновидности въ самостоятельный видъ: *P. suaveolens* Fisch.

желобчатыхъ, яйцевидно-овальные, овальные или широко-эллиптическіе, у основанія округлые, рѣже слегка сердцевидные, съ верхушкою быстро заостренною въ короткій, часто косой кончикъ, по краямъ железисто-зубчатые, сверху темно-зеленые, снизу сѣровато- или сѣро-зеленые, въ молодости иногда слегка пушистые, позднѣе голые; завязь сидячая или почти сидячая; широко-облодчатый околоцвѣтникъ охватываетъ лишь основаніе ея. Разводится.

* *P. laurifolia* Ledb. Пет. Кр. III, стр. 42.

Высокое дерево съ гладкой, свѣтло-сѣрой корой; молодыя вѣтви остро-ребристыя, желтовато-бурые, голыя; почки клейкія; листья на черешкахъ въ 3—4,5 см. дл., 6. ч. слегка пушистыхъ, узко-эллиптическіе, яйцевидно-ланцетные или яйцевидно-продолговатые, у основанія округлые, очень рѣдко слегка сердцевидные, къ верхушкѣ длинно-заостренные, часто суженные равномерно или почти равномерно къ обоимъ концамъ, по краямъ мелко- и часто-зубчатые съ крупною железкой на концѣ зубцовъ, иногда края листьевъ волнистые, сверху ярко-зеленые, снизу свѣтло-сѣрые, 6—14 см. дл. и 2,5—4,5 см. ш., въ молодости часто слегка опушенные, позднѣе голые; женскія сережки на короткихъ ножкахъ, рѣдкоцвѣтныя, съ широкими, обратно-яйцевидными или округлыми прицвѣтными



Populus laurifolia.



Populus moskoviensis.

чешуйками, на концѣ разсѣченными и по краямъ рѣсничатыми; завязь яйцевидная, нѣсколько бородавчатая, до половины заключена въ околоцвѣтникъ, края котораго нѣсколько зазубрены.

Разводится.

P. moskoviensis Schroeder. = *P. suaveolens laurifolia*. (R. Schoeder. In. Pl. Inst. Rur. Mosq. Colunt., p. 43, 1899).—Пет. Кр. III, стр. 42.

Дерево съ развѣсистой кроной; молодыя вѣтви съ желто-бурой корой, слабо ребристыя; почки сильно ароматичныя, клейкія; черешки листа 1—2 см. дл., слабо опушенные, иногда съ 2 железками; листья яйцевид-

ные, съ округлымъ или слегка сердцевиднымъ основаніемъ, часто неравнобокимъ, б. или м. равномерно заостренные съ кончикомъ иногда туповатымъ; съ верхней стороны темно-зеленые, съ нижней—сѣро-зеленые, съ обѣихъ сторонъ голые, б. ч. по краямъ коротко-рѣбничатые и очень мелко- и неравно-зубчатые, зубцы почти округлые, съ слегка завернутымъ внутрь краемъ. Разводится часто на московскихъ бульварахъ.

* × ***P. berolinensis* Dippel.** = *P. italica* Duroi × *laurifolia*.

Populus berolinensis Koch. Пет. Кр. III, стр. 42.



Populus berolinensis

Высокое пирамидальное дерево; молодая вѣтвь желто-сѣрая или желто-зеленая, ребристая; черешки листьевъ 2—4 см. дл., цилиндрическіе, слабо-опушенные; листья округло-яйцевидные, яйцевидные или широко-ланцетные, съ округлымъ основаніемъ и б. или м. вытянутой верхушкой, 4—8 см. дл. и 3—4,5 см. ш., на побѣгахъ крупнѣе, по краямъ мелко- и неравно-зубчатые, зубцы съ загнутымъ впередъ кончикомъ и железкой; взрослые листья съ обѣихъ сторонъ голые, сверху ярко-зеленые, снизу сѣро-зеленые, края ихъ часто съ пушкомъ. Разводится; быстро растущее дерево.

Порядокъ Juglandáles.

* Сем. Juglandáceae DC.

Деревья съ очередными перистыми листьями безъ прилистниковъ, однодомные; цвѣты однополые: мужскіе въ густыхъ боковыхъ сережкахъ; околоцвѣтникъ ихъ б. ч. 4-раздѣльный, вслѣдствіе срастанія съ 2 прицвѣтниками кажется 6-раздѣльнымъ; тычинокъ 6—36; связникъ съ остриемъ, превышающимъ гнѣзда пыльниковъ; женскіе цвѣты по 1—7 въ колосовидномъ соцвѣтѣ; околоцвѣтникъ ихъ 4-раздѣльный; пестикъ съ 2 рыльцами, покрытыми снаружи сосочками; завязь нижняя, съ одной прямой сѣменочкой; плодъ—костянка съ нѣсколькими мясистымъ околоплодникомъ; косточка съ одною настоящею и многими ложными низкими перегородками дѣлится на нѣсколько неполныхъ гнѣздъ, вслѣдствіе чего обѣ мясистыя сѣмеди глубоко морщинистыя; сѣмя безъ бѣлка.

* *Juglans* L.

* ***J. cinérea* L.** Пет. Кр. I, стр. 116.—Пет., стр. 205.

Дерево съ развѣистой кроной; молодая вѣтвь пушистая, клейкая; листья непарно-перистые, о 7—10 парахъ; листочки безъ черешковъ, лан-

цетные или широко-ланцетные, у основаніи закругленные, снизу войлоч-
ные, сверху опушенные, конечный непар-
ный листокъ на черешкѣ; мужскіе цвѣ-
ты въ цилиндрическихъ, густыхъ се-
режкахъ; женскіе — въ рѣдкой кисти о
1—7 цвѣтахъ, съ клейкими цвѣтоно-
сомъ; пестикъ съ короткимъ столби-
комъ и длинными, красными рыльца-
ми; плодъ — костянка лйцевидно-про-
долговатой, заостренной формы, съ нѣ-
сколько мясистой кожурой, покрытой
клейкими железистыми волосами. Раз-
водится.



Juglans cinerea.

Порядокъ Fagales.

26 сем. Betuláceae Rich.

Однодомные деревья и кусты; цвѣты однополые, собраны въ сережки
или колосы; каждая кроющая чешуйка прикрываетъ 1—2—3 цвѣтка;
мужскіе цвѣты безъ околоцвѣтника или онъ 4-раздѣльный; тычинокъ
2—4, расщепленныхъ до основанія, такъ что кажется ихъ 4—8; женскіе
цвѣты голые, съ едва замѣтнымъ околоцвѣтникомъ, или же онъ рано сра-
стается съ кроющей чешуйкой; завязь нижняя, двугнѣздная, съ двумя
нитевидными рыльцами; каждое гнѣздо съ 1—2 сѣмечками; плодъ —
орѣхъ или орѣшекъ. Деревья или кустарники со спирально расположенными
листьями; на побѣгахъ листья иногда двурядные.

1. Мужскіе цвѣты безъ околоцвѣтника, съ одною кроющею чешуй-
кой; плодъ—орѣхъ, окруженный листовидной оберткой.

Corylus.

Мужскіе цвѣты съ околоцвѣтникомъ и кроющей чешуйкой; пло-
ды—мелкіе орѣшки безъ листовидной обертки. 2.

2. Женскіе цвѣты въ нѣсколькихъ короткихъ стебельчатыхъ ко-
лоскахъ; кроющія чешуйки и околоцвѣтникъ въ женскихъ
цвѣтахъ деревянѣютъ, не опадаютъ, образуя шишечки; почки
стебельчатые.

Alnus.

Женскіе цвѣты собраны въ одиночный, цилиндрической колосъ;
кроющія чешуйки и околоцвѣтникъ женскихъ цвѣтовъ опа-
даютъ; почки сидячія.

Betula.

108. *Corylus* L.

Мужскіе цвѣты въ длинныхъ, густыхъ, повислыхъ сережкахъ, пере-
зимовываютъ голыми; цвѣтокъ состоитъ изъ кроющей чешуи и двухъ

прицвѣтныхъ чешуекъ; тычинокъ 4, приросшихъ къ кроющей чешуйкѣ и расщепленныхъ до основанія, такъ что тычинокъ кажется 8; женскіе цвѣты перезимовываютъ въ почкахъ попарно въ пазухахъ чешуйчатыхъ листочковъ; околоцвѣтникъ съ два замѣтны; завязь нижняя, двугнѣздная; гнѣзда съ одной сѣменочкой; столбикъ съ 2 нитевидными, красными рыльцами; плодъ—орѣхъ, окруженъ листовидной плоской.

289. *C. Avellána* L. Бух. II, № 371.—Бух. I, № 351.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 172.—Кауф. II, № 677.—Цин., № 1312.—Кауф. I, стр. 441.—Lind., p. 160.—Ann. C. III, № 251.—Дв., № 895.—Макс., № 883.—Hoff. II, № 7588.—Gold. C., p. 23.—Mart., p. 172.—Hoff., № 1019.—St. II, p. 54.—St. I, № 659.—Pal., № 2062.

Высокій кустарникъ съ сѣрыми, въ молодости съ желѣзисто-шершаво-волосистыми вѣтвями; листья округлые или широко-обратно-яйцевидные, у основанія сердцевидные, на концѣ коротко-заостренные, иногда слегка угловато-лопастные, по краямъ неравно-зубчатые, б. или м. пушистые, особенно съ нижней стороны по жилкамъ; прилистники рано опадающіе; плодовая обертка колокольчатая, раскрытая, съ листочками, разсѣченными на зубцы, немного длиннѣе орѣха; цвѣтеть задолго до появленія листьевъ.



Corylus Avellana.

По лѣсамъ и опушкамъ, очень часто. Цвѣтеть весь апрѣль; зацвѣтаетъ, когда въ лѣсу еще снѣгъ; зрѣлые плоды съ половины августа.

109. *Bétula* L.

Мужскіе и женскіе цвѣты въ сережкахъ; мужскіе—по 3, прикрыты кроющей чешуйкой; каждый цвѣтокъ состоитъ изъ 2 прицвѣтниковъ и 1—2 неравныхъ листочковъ околоцвѣтника, сросшихся съ прицвѣтниками такъ, что околоцвѣтникъ кажется 3—4-листнымъ; тычинокъ 2, раздвоенныхъ; женскіе цвѣты по 2—3, голые; пестикъ о 2 столбикахъ, съ завязью только у основанія двугнѣздной, и въ каждомъ гнѣздѣ съ одною всячею сѣменочкой; чешуйки, срастающіяся съ прицвѣтниками, становятся 3-лопастными, у плодовъ кожистыми, опадающими: плодъ—орѣшекъ съ б. или м. широкими крыльями.

1. Листья заостренные. 2.

Листья притупленные. 3.

2. Молодые вѣтви усеяны смоллистыми бородавками, голые; взрослые листья голые, треугольно-ромбическіе, съ не закругленными боками, основаніе листа клиновидное. *B. verrucosa* Ehrh.

Молодые вѣтви безъ смолистыхъ бородавокъ, б. ч. пушистыя; листья яйцевидные или яйцевидно-ромбическіе, съ закругленными боками; нижній край листа дугобразный; молодые листья б. ч. бархатистые, взрослые—б. ч. въ углахъ жилкохъ бородачатые.

B. pubescens Ehrh.

3. Вѣтви усеяны частыми бородавочками; листья 1,5—2,5 см. дл., округло-яйцевидные или овальные.

B. humilis Schrank.

Вѣтви безъ бородавочекъ; листья 0,5—1 см. дл., округлые, ширина ихъ часто больше длины.

B. nana L.

290. **B. verrucosa Ehrh.** Пет. Кр. III, стр. 42.

Betula alba L. Бух. II, № 386.—Бух. I, № 358.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 147.—Кауф. II, № 697.—Цин., № 1341.—Кауф. I, стр. 457.—Lind., p. 162.—Ann. C. IV., № 52.—Дв., № 893.—Макс., № 875.—Hoff. II., № 495.—Gold. C., p. 23.—Hoff., № 494.—St. II, p. 53.—St. I, № 648.—Pal., № 2020.

Betula alba L. pendula. Hoff. II., № 495.

Betula pendula Roth. Mart, p. 171.

Высокое развѣтвленное дерево; кора гладкая, бѣлая; годовалыя вѣтви съ красно-бурой корой, молодыя — съ смолистыми бородавочками; листья на длинныхъ черешкахъ, иногда покрытыхъ железками, съ обѣихъ сторонъ голые, съ верхней стороны темно-зеленые, съ нижней—свѣтло-зеленые, въ молодости клейкіе, сильно пахучіе, треугольно-овальные или ромбическіе; основаніе клиновидное, цѣлюкрайнее съ прямымъ, рѣже слегка дугобразнымъ краемъ, въ остальной части листа края б. или м. часто-



Betula verrucosa.



Betula verrucosa s. dalearctica.

и doubly-зубчатые; мужскія сережки на концѣ вѣтвей, длинныя съ красно-бурыми рѣснитчатыми чешуйками; женскія — маленькія на укороченныхъ боковыхъ вѣточкахъ, чешуйки ихъ зеленныя; крылья сѣмянки свѣтло-рыжія, въ 2—3 раза шире орѣшка.

Образуетъ лѣса и кустарниковыя поросли, растеть также отдѣльными деревьями, очень часто. Цвѣтеть съ половины апрѣля до половины мая.

α. dalecárica L. Листья глубоко-надрѣзные и двояко-пильчато-зубчатые. Разводится.

β. atropurpúrea Hort. Съ буро-пурпуровыми листьями. Разводится.

291. *B. pubéscens* Ehrh. Пет. Кр. III, стр. 42.—Пет., стр. 147.—Цин., № 1342.

Betula alba L. *β. pubescens* Spach. F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, стр. 472.—Кауф. I, стр. 457.

У насъ 6. ч. только высокій кустъ, цвѣтеть рѣдко; годовалыя вѣтви съ красно-бурой корой; молодые побѣги густо покрыты пушкомъ; мо-



Betula pubescens.



Betula humilis.

дые листья и черенки густо пушстые, взрослые—пушстые только вдоль жилокъ, на нижней сторонѣ въ углахъ жилокъ съ бородавками; очертаніе ихъ яйцевидное или яйцевидно-ромбическое, съ закругленными боковыми углами и нижнимъ дугообразно согнутымъ краемъ; основаніе листа часто почти сердцевидное, края двояко-и остро-пильчатые; мужскія сережки на концѣ вѣтвей по 2 или по 3; чешуйки ихъ зелено-желтыя съ красно-бурой верхушкой; женскія сережки съ пурпуровыми рыльцами; крылья равны или въ полтора раза, очень рѣдко въ два раза шире орѣшка.

Перерва, Зыково (К.).—Опушка болотистаго лѣса между Образцовымъ на Клязьмѣ и Большевымъ, большое дерево (С.).

292. *B. húmilis* Schrank. Пет. Кр. III, стр. 43.—Ф. Б., № 86.—Пет., стр. 147.—

Кауф. II, № 698.—Цин., № 1343.—Кауф. I, стр. 458.

Betula fruticosa L. Макс., № 876.

Betula fruticosa Pall. Hoff. II., № 7577.—Gold. C., p. 23.—Gold. Sp., p. 139.

Betula fruticans. St. II, p. 53.

Кустарникъ до 2,5 м. съ черно-бурой корой; молодыя и годовалыя вѣтви густо покрыты желтоватыми бородавочками; листья на короткихъ черешкахъ, округло-яйцевидные или овальные, съ обѣихъ сторонъ голые,

сверху темно-зеленые, снизу свѣтло-зеленые, къ старости почти сѣро-зеленые съ сильно выдающимися свѣтлыми жилками, по краямъ неравно- и часто doubly-зубчатые, основаніе ихъ цѣльнокрайнее, округлое, клиновидное, очень рѣдко слегка сердцевидное; мужскія сережки конечныя и боковыя, 1—2 см. дл.; женскія—только боковыя, 0.5—1 см. дл.; чешуйки 3-лопастныя съ срединной болѣе крупной лопастью.

По торфянымъ болотамъ. Цвѣтетъ въ маѣ. Обѣ разновидности встрѣчаются вмѣстѣ. Перерва, Колошино, Куеково (К.).—Троицкое-Кайварджи (Гольдбахъ). — Быково, Брн. у. (С.). — Тростенское озеро, Руз. у. (Ч. и Ф. О.).—Круглое озеро близъ д. Рыбаки, Мос. у. (П. и С.).—Косино; болото по р. Яхрому у дер. Тимошеевки, Дмит. у. (П.).

α. *genuina* Regel. Пет. Кр. III, стр. 43.—Кауф. II, стр. 473.—Кауф. I, стр. 458. *Betula oycowiensis* Rehb. *Betula fruticosa* Willd.

Боковыя лопасти плодовыхъ чешуекъ рѣсничаты; листья б. ч. съ крупными зубцами *).

β. *commutata* Regel. Пет. Кр. III, стр. 43.—Кауф. II, стр. 473.—Кауф. I, стр. 458. *Betula fruticosa* Rehb.

Плодовые чешуйки голыя, не рѣсничатыя; зубцы на листьяхъ б. ч. мелкіе.

293. В. *nana* L. Пет. Кр. III, стр. 43.—Пет., стр. 147.—Кауф. II, стр. 733, № 45.—Цил., № 1344.—Кауф. I, стр. 458.—Дв., № 894.—Макс., № 877.—Mart., p. 171.—St. II, p. 53.—St. I, № 649.—Pal., № 2023.

Низкій кустарникъ въ 60—70 см., съ торчащими вѣтвями; кора черно-бурая, на молодыхъ вѣтвяхъ красно-бурая, безъ бородавочекъ; листья на очень короткихъ черешкахъ, округлые, отъ 0.5 до 1 см. дл. и такой же ширины или нѣсколько шире; края городковые, верхняя сторона листа темно-зеленая, лоснящаяся, нижняя—свѣтло- или сѣро-зеленая, съ мелкими просвѣчивающими свѣтлыми жилками; сережки на очень короткихъ ножкахъ, вверхъ торчащія; плодовые чешуйки 3-лопастныя съ почти одинаковыми лопастями; крылья почти вдвое уже орѣшка.

По большимъ торфянымъ болотамъ. Находится въ гербаріи Максимовича за № 504 и въ гербаріи Ворхмана, съ указаніемъ на Горенки, Мос. у. Найдена А. Н. Петуниковымъ въ Тверской губ., Карачевского у., верстахъ въ 10 отъ сѣверо-восточной границы Клин. у.



Betula nana.

*) А. Н. Петуниковъ и А. А. Хорошковъ нашли близъ Спиридова, Дмит. у. эту форму, но у которой срединная лопасть плодовой чешуйки вдвое длиннѣе боковыхъ и края всѣхъ лопастей рѣсничатые.

110. *Álnus Gaertn.*

Мужскіе цвѣты въ длинныхъ повислыхъ сережкахъ, по 3 въ пазухѣ кроющихъ шиловидныхъ чешуекъ съ 4 приросшими прицвѣтниками; околоцвѣтникъ 4-раздѣльный; тычинокъ 4, пыльники раздвоенные; женскіе цвѣты парные, въ пазухахъ неопавшихъ кроющихъ чешуекъ деревяются и образуютъ шишечку; 4-раздѣльный околоцвѣтникъ сростается съ чешуйками; пестикъ съ 2 нитевидными, пурпуровыми рыльцами; плодъ—безкрылый орѣшекъ; листовыя почки стебельчатыя, развертываются послѣ сережекъ.

294. *A. glutinosa* (L.) Gaertn. Пет. Кр. III, стр. 44.—Бух. II, № 388.—Бух. I, № 360.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 134.—Кауф. II, № 700.—Цин., № 1346.—Кауф. I, стр. 459.—Lind., p. 162.—Дв., № 892. Макс., № 874.—Hoff. H., № 7490.—Mart., p. 168.

Alnus glutinosa Willd. Gold. C., p. 23.—Gold Sp., p. 139.

Betula Alnus L. Макс., № 874.—Mart. p. 168.—Hoff., № 493.—St. II, p. 53.—St. I, № 650.—Pal., № 2024.

Высокій кустъ или дерево до 10 м.; старая кора черно-бурая; молодая вѣтвь буро-красная, лоснящаяся, часто съ бѣлыми точками; почки обратно-яйцевидныя, на черешкахъ, клейкія; листья на короткихъ, въ молодости пушистыхъ черешкахъ, округлые или обратно-яйцевидные, основаніе ихъ широко-клиновидное или округлое, верхушка усѣченная или слегка выемчатая, рѣже округлая, края двояко-зубчатые; верхняя сторона темно-зеленая, голая или очень разсѣяннo-волосистая, въ молодости клейкая, нижняя—свѣтло-зеленая съ сильно выдающимися жилками, въ углахъ жилокъ съ свѣтло-желтыми бородавками; мужскія сережки на ножкахъ, по 3—5 на концѣ вѣтвей, 5—7 см. длины; женскіе колоски по 3—5, въ б. ч. на довольно длинныхъ ножкахъ; шишечки почти шаровидныя или продолговато-округлыя, 13—18 мм. дл., почти всегда въ на ножкахъ.



Alnus glutinosa.

По болотамъ и по берегамъ рѣкъ, часто. Цвѣтетъ иногда съ начала апрѣля. Зрѣлыя сѣмена съ половины сентября.

295. *A. incana* (L.) Willd. Hoff. H., № 7491.—Gold. C., 23. Gold. Sp., p. 139.

Alnus incana DC. Пет. Кр. III, стр. 44.—Бух. II, № 387.—Бух. I, № 359.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 133.—Кауф. II, № 699.—Цин., № 1345.—Кауф. I, стр. 459.—Lind., p. 162.—Ann. C. II, № 154.—Дв., № 891.—Макс., № 873.—Макс., Пут. I., стр. 157.

Betula Alnus L. *β. incana* L. Pal., № 2024.

Кустъ, рѣже не высокое дерево съ пенельно-сѣрой корой; молодыя вѣтви пушистыя; почки яйцевидныя или яйцевидно-округлыя, б. ч. пушистыя, не клейкія, на черешкахъ; листья на короткихъ, пушистыхъ черешкахъ, широко-яйцевидные или продолговатые, основаніе ихъ округлое, широко-клиновидное, рѣже слегка сердцевидное, верхушка б. ч. заостренная, края листьевъ двояко-зубчатые, въ молодости съ обѣихъ сторонъ покрыты пушкомъ, не клейкіе, потомъ сверху темно-сѣро-зеленые, вдоль жилокъ покрыты частыми, прижатыми волосками, между жилокъ—рѣдкими, снизу сѣро-зеленые, густо-бархатисто-пушистые; мужскія сережки по 3—5 на концѣ вѣтвей, на пушистыхъ ножкахъ; женскіе колоски почти сидячіе, по 5—10; шишечки яйцевидно-округлыя, 10—15 мм., почти сидячія или только одна нижняя на ножкѣ.



Alnus incana.

По болотамъ, по берегамъ рѣкъ и по сырýmъ мѣстамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины апрѣля; зрѣлыя сѣмена съ половины сентября.


α. acutiloba Koch.

Alnus incana L. f. *pinnatifida*. d. *acuminata* Regel. Mon. d. Betul., p. 158.

Листья перисто-надрѣзные съ длинными, ланцетными, заостренными долями. края которыхъ пильчато-зубчатые. Разводится.

× ***A. pubescens* Tausch.** = *A. glutinosa* × < *incana*.

По общему виду походить на *A. incana* Willd. Кора сѣрая; молодыя вѣтви, черешки и прилистники пушистые; листья широко-яйцевидные, съ заостренной верхушкой, но всегда можно найти на одной и той же



Alnus incana α. *acutiloba*.



Alnus pubescens.

вѣтви листья съ округлой или даже слегка выемчатой верхушкой; верхняя сторона ихъ б. ч. голая или слабо опушенная, нижняя—иногда спозоватая, тоже голая или слабо опушенная, но по жилкамъ б. или м. густо бархатисто-пушистая, со слабо замѣтными бородачками въ углахъ жилокъ; женскіе колоски на ясно замѣтныхъ ножкахъ, по созрѣваніи шишечекъ, когда чешуйки отгибаются, иногда ножки мало замѣтны. Найдено только разъ между поселкомъ Мутановымъ и дер. Чашниково, Мос. у. (X.).

27 сем. Fagaceae Döll.

Однодомныя деревья, цвѣты однополые; мужскіе—въ повислыхъ сережкахъ, съ 6—8-раздѣльнымъ околоцвѣтникомъ и 6—10 тычинками; женскіе—въ прерывчатыхъ колосьяхъ, съ едва замѣтнымъ околоцвѣтникомъ; обертка женскаго цвѣтка изъ чешуйчатыхъ листковъ обращается у плода въ плюску; завязь нижняя, 3-гнѣздная, съ 2 сѣмечками въ каждомъ гнѣздѣ; рыльце 3-лопастное; плодъ—односѣманный желудь. Деревья со очередными, рѣже двурядными листьями, цвѣтутъ одновременно съ появленіемъ листьевъ; соцвѣтія въ пазухахъ листьевъ того же года.

111. Quercus L.

296. Q. robur L.

Quercus Robur L. Пет. Кр. III, стр. 17.—Hoff. H., № 7571.—St. II, 54.—St. I, № 658.—Pal., № 2057.

Quercus pedunculata Ehrh. Бух. II, № 370. — Бух. I, № 350. — F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 254. — Кауф. II, № 676. — Цин., № 1314.—Кауф. I, стр. 440.—Lind., p. 160.—Ann. C. IV, № 50.—Дв., № 890.—Макс., № 885.—Gold. C., p. 23.—Gold. Sp., p. 139.—Mart., p. 171.

Могучее дерево съ вѣтвями сначала слегка пушистыми, потомъ голыми и съ округлыми, голыми почками; листья на короткихъ черешкахъ, кожистые, къ осени почти пергаментные, въ юности, особенно съ нижней стороны, съ шелковистымъ пушкомъ, потомъ голые, обратно-яйцевидные, продолговато-обратно-яйцевидные, рѣдко продолговатые, къ основанію суженные, верхушка листа округлая, края выемчато-лопастные, съ каждой стороны по 4, рѣже по 3 или 5 округлыхъ или слегка заостренныхъ лопастей; женскій ложный колосъ очень рѣдкій, на цвѣтоносѣ, который длиннѣе листового черешка; околоцвѣтникъ мужскихъ цвѣтовъ зеленый; плодоносъ отъ 3 до 8 см. дл., несетъ 1—7 желудей; желудь продолговато-яйцевидный или яйцевидный, б. ч. въ 2—3 см. дл. и 1—1,5 см. ш.



Quercus robur.

По лѣсамъ, на югѣ губ. иногда сплюснутыми рощами. Цвѣтеть съ половины мая, зрѣлые плоды съ половины сентября.

- а. *Annenkóvii* Kauffm. Пет. Кр. III, стр. 18.—Кауф. стр. № 455.—Цин., № 1314.—Кауф. I, стр. 440.

Молодые листья покрыты снизу звѣздчатымъ пушкомъ, пушокъ въ послѣдствіи замѣтный или исчезающій; черешки длиннѣе, чѣмъ у типичной формы, равны цвѣтоносу или едва длиннѣе его; листья при основаніи часто округлые и безъ выемки; желуди цилиндрическо-эллипсоидальные, почти въ полтора раза уже чѣмъ у типичной формы.

Царицыно, Воробьевы горы; Невѣрово, Кям. у. (К.).

Порядокъ Urticales.

28 сем. Ulmáceae Mirbel.

Деревья съ двурядными, очередными листьями, распускающимися послѣ цвѣтовъ; цвѣты обоюполые или однополые; околоцвѣтникъ колокольчатый или ворончатый, 4—8-надрѣзной; тычинки прикрѣплены у основанія околоцвѣтника противъ его долей и по числу ихъ; завязь верхняя, съ 2 рыльцами, 1—2-гнѣздовая, каждое гнѣздо съ 1 яйцечей, обратной или полуобратной сѣмечкой; плодъ—односѣменная крылатка.

112. *Ulmus* L.

297. *U. scábra* Mill. (Gard. Dict. Ed. VII. n. 2. 1759).

Ulmus campestris L. Пет. Кр. III, стр. 16.—Кауф. II, № 674.—Цин., № 1339.—Кауф. I, стр. 438.—Lind., p. 160.—Дв., № 278.—Макс., № 247.—Hoff. Н., № 2066.—Gold. С., p. 18.—Mart., p. 48.—St. II, p. 17.—St. I, № 171.—Pal., № 518.

Ulmus campestris L. а. *nuda* Koch. Кауф. II, стр. 454.

Ulmus montana With. Бух. II, № 369.—Ф. Б., № 8.—Пет., стр. 296.—Гор., № 72.

Дерево съ темно-сѣрой корой. на вѣтвяхъ гладкой; молодые вѣтви покрыты густыми, курчавыми волосами, почти войлокомъ; листья на короткихъ, пушистыхъ черешкахъ, продолговато-яйцевидные или обратно-яйцевидные, съ неравнобокимъ, часто почти сердцевиднымъ основаніемъ и быстро-вытянутой верхушкой, по краямъ 2-пильчато-зубчатые, съ верхней стороны покрыты короткими, прижатыми волосами, отчего поверхность ихъ шероховатая, съ нижней стороны б. ч. по всей поверхности или только вдоль жилокъ пушистые; боковыхъ жилокъ б. ч. 12—14, на концѣ правильно вильчатыхъ; цвѣты въ пучкахъ, на очень короткихъ цвѣтоножкахъ; околоцвѣтникъ 5—6-раздѣльный; тычинокъ 5—6; крылатка овальная или широко-обратно-яйцевидная, почти сидячая, голая; орѣшекъ посрединѣ крылатки.

Изрѣдка отдельными деревьями. Цвѣтеть съ половины апрѣля; зрѣ-

лые плоды съ начала іюня. Воробьевы горы, Петрово (К.). — Близъ д. Алексѣевки въ тѣнистомъ «Ивановомъ оврагѣ», Мож. у. (Ф. Б.). — Близъ села Михайловскаго по берегу р. Пахры, Пдл. у. (Б.). — Боровскій курганъ, Брн. у. (С.).



Ulmus scabra.



Ulmus pedunculata.

298. *U. pedunculata* Foug. Пет. Кр. III, стр. 16.—Пет., стр. 296.—Цин., № 1340.

Ulmus effusa Willd. Бух. II, № 368.—Бух. I, № 349.—F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, № 675.—Кауф. I, стр. 439.—Lind., p. 160.—Ann. C. IV, № 49.—Дв., № 279.—Макс., № 248.—Hoff. II, № 2067.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 48.

Ulmus ciliata. Mart., p. 48.

Дерево съ темно-сѣрой корой на вѣтвяхъ; молодыя вѣтви покрыты б. или м. густымъ пушкомъ; листья на короткихъ, пушистыхъ черешкахъ, яйцевидные, продолговатые или обратно-яйцевидные, у основанія неравнобокіе, на концѣ заостренные, или быстро вытянутые въ короткій кончикъ, по краямъ 2-пильчато-зубчатые, 5—9 см. дл., 3—5 см. ш., въ молодости съ верхней стороны съ рѣдкими волосками, потомъ голые и нѣсколько лоснящіеся, съ нижней стороны по всей поверхности или только вдоль жилокъ мягко-пушистые; цвѣты на длинныхъ цвѣтоножкахъ, въ повислыхъ пучкахъ; околоцвѣтникъ 5-, чаще 8-раздѣльный, съ овальными, по краямъ рѣсничатыми долями; крылатка яйцевидная или овальная, съ глубокимъ надрѣзомъ, по краямъ рѣсничатая, на поверхности голая, съ сѣтчатыми жилками.

По оврагамъ и гористымъ мѣстамъ. Цвѣтеть съ половины апрѣля; зрѣлые плоды съ половины мая. Кунцово, Воробьевы горы (К.).—Шебалы, Грачевники, Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Павловскій посадъ—противъ Юдина, Бгр. у.; за Лужками, Срп. у. (П. и С.).—Бѣлые Колодези, Кзм. у. (П.).—Село Коломенское подъ Москвой (С.).

29 сем. Moráceae Endl.

Травянистыя, двудомныя растенія съ прилистниками. Мужскіе цвѣты съ 5-лиственнымъ околоцвѣтникомъ; тычинокъ 5, даже въ почкѣ съ прямыми нитями; женскіе цвѣты съ очень низкимъ, едва замѣтнымъ чашевиднымъ околоцвѣтникомъ, облекающимъ пестикъ только у основанія; пестикъ съ 2 длинными рыльцами и одногнѣздною завязью, гнѣзда съ одною вспячею, изогнутою сѣменочною; плодъ—орѣшекъ; зародышъ безъ бѣлка, согнуть или завить улиткой.

113. *Húmulus* L.

Тычинки прямоторчащія; женскіе цвѣты въ густыхъ, шишковидныхъ соцвѣтіяхъ, съ черепичатыми прицвѣтниками, по опыленіи разрастающимися и пленчатыми; зародышъ завить улиткой. Многолѣтнее, двудомное, выующееся растеніе.

299. *H. Lúpulus* L. Бух. II, № 367. — Бух. I, № 348. — F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 203. — Кауф. II, № 673. — Цин., № 1336. — Кауф. I, стр. 438. — Lind., p. 160. — Ann. C. IV, № 48. — Дв., № 918. — Макс., № 916. — Hoff. II., № 7736. — Gold. C., p. 23. — Mart., p. 177. — St. II, p. 55. — St. I, № 676. — Pal., № 2124.

Корневище мясистое, ползучее; стебель выующійся, 4-гранный, до 5—6 м., цѣико-шершавый, какъ и все растеніе; листья съ глубоко-сердцевиднымъ основаніемъ, дланевидно-3—5-лопастные, лопасти яйцевидныя, длинно-заостренныя, по краямъ крупно-пильчатыя; цвѣты пазушныя, мужскіе — въ густыхъ, висячихъ полузонтичныхъ метелкахъ; околоцвѣтникъ ихъ желтовато-бѣлый; женскіе цвѣты въ одиночныхъ головкахъ или расположенныхъ кистями; околоцвѣтникъ ихъ зеленый; плодовые головки яйцевидныя, 2—3 см. дл., вспячія; чешуйки треугольно-яйцевидныя, съ сѣтчатыми жилками.

По сырымъ кустарникамъ и около рѣкъ. Цвѣтетъ съ середины іюля. Кунцово, Воробьевы горы, Братцово, Ивановско; Городокъ близъ Павловскаго посада, Бгр. у. (К.).—По берегу р. Пахры, Пдл. у. (Б.).—Мытищи (С.).—По ивнякамъ берега р. Оки, Сри. у. (П. и С.).—Дарьино, Звн. у. (Х.).



Humulus Lupulus.

* *Cánnabis* L.

Тычинки повиселыя; женскій цвѣтокъ, а равно и плодъ, заключенъ въ свернутый прицвѣтникъ; зародышъ согнутый. Однолѣтнее, двудомное растеніе съ прямымъ стеблемъ.

* *C. sativa* L. Пет., стр. 155. — Кауф. II, № 672. — Цин., стр. 399. — Кауф. I стр. 437. — Lind., p. 160. — Mart., p. 176. — St. II, p. 55. — St. I № 675. — Pal., № 2123.

Стебель прямостоящий до 1,5 м., покрыть, какъ и все растеніе, прижатыми, крючковатыми волосками; листья супротивные, на длинныхъ черешкахъ, глубоко-пальчато-раздѣльные, о 5—9 доляхъ; доли узко-ланцетныя, суженныя къ обоимъ концамъ, по краямъ крупно-зубчатыя, съ обѣихъ сторонъ покрыты точечными железками и съ нижней стороны свѣтлѣе; верхніе листья о 3 линейныхъ доляхъ или нераздѣльные; мужскіе цвѣты на верхушкѣ стебля собраны въ метельчатое соцвѣтіе; женскіе цвѣты въ пазухахъ верхнихъ листьевъ въ вѣтвистыхъ скученныхъ колосьяхъ. Растеніе съ тяжелымъ, непріятнымъ запахомъ. Разводится, иногда близъ жилья какъ бы дико.



Cannabis sativa.

30 сем. *Urticaceae* Juss.

Однодомныя или двудомныя травы; цвѣты однополые: мужскіе—съ 4-раздѣльнымъ околоцвѣтникомъ и 4 тычинками, въ почкосложеніи свернутыми внутрь и супротивными долямъ околоцвѣтника; женскіе цвѣты тоже съ 4-раздѣльнымъ околоцвѣтникомъ, но внутреннія доли его нѣсколько крупнѣе наружныхъ, при плодахъ онѣ сильно разрастаются и облекаютъ его; пестикъ съ кистевиднымъ или головчатымъ рыльцемъ; завязь одногнѣздная, съ одной, прямой, стоячей сѣмепочкой; зародышъ прямой; плодъ—орѣшекъ. Растенія съ супротивными листьями съ прилистниками, у насъ только травянистыя съ жгучими волосками.

114. *Urtica* L.

1. Листья глубоко-дланевидно 3—5-раздѣльные.

U. cannabina L.

Листья цѣльные. 2.

2. Растеніе однодомное.

U. urens L.

Растеніе двудомное.

U. dioica L.

300. *U. urens* L. Пет. Кр. III, стр. 16. — Бух. II, № 366. — Бух. I, № 347. — F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 296. — Кауф. II, № 670. — Цин., № 1337. — Кауф. I, стр. 436. — Lind., p. 158. — Дв., № 880. — Макс., № 878. — Hoff. H., № 7502. — Gold. C., p. 23. — Mart., p. 168. — Hoff., № 3380. — St. II, p. 53. — St. I, № 651. — Pal., № 2028.

Растеніе однолѣтнее; стебель 10—60 см., прямостоящій, отъ основанія вѣтвистый, покрытъ, какъ и все растеніе, жгучими, жесткими волос-

ками; листья на длинных черешках, яйцевидно-эллиптические, острые, остро-пильчатые, съ 2 маленькими прилистниками, широко-ланцетными; колосья не длиннѣ листовых черешковъ; цвѣты зеленые, женскіе преобладаютъ.

Сорное, по огородамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ середины іюня до осени.



Urtica urens.



Urtica cannabina.

301. *U. cannabina* L. Пет. Кр. III, стр. 16.—Кауф. II, стр. 452.—Мил., №9.—
Pal., №2030.

Стебель прямостоящій. 4-гранный, б. ч. простой или съ укороченными вѣточками въ пазухахъ нижнихъ листьевъ, покрытъ щетинистыми, жесткими, жгучими и короткими прижатыми волосками; листья глубоко-3—5-дланевидно-раздѣльные: доли ихъ глубоко-зубчато-надрѣзныя, по краямъ съ короткими, прижатыми рѣсничками; верхняя сторона листьевъ густо усеяна точечными выпуклыми железами, нижняя—свѣтлѣе; цвѣты въ длинныхъ прерванныхъ колосьяхъ, собранныхъ пучками на концѣ стебля и въ пазухахъ листьевъ; прицвѣтники женскихъ цвѣтовъ шиловидные, вдвое длиннѣ околоцвѣтника; въ верхней части стебля б. ч. собраны женскіе цвѣты, въ нижней—мужскіе.

Нескучный садъ въ Москвѣ (Л.), одичалое.

302. *U. dioica* L. Пет. Кр. III, стр. 16.—Бух. II, № 365.—Бух. I, № 346.—F. O.,
№ 7, p. 102.—Пет., стр. 297.—Кауф. II, № 671.—Ципп.,
№ 1338. Кауф. I, стр. 436.—Lind., p. 158.—Дв., № 881.—
Макс., № 879.—Хоф. Н., № 7498.—Gold. C., p. 23.—Mart.,
p. 168.—Хоф., № 3378.—St. II, p. 53.—St. I, № 652.—Pal.,
№ 2029.

Корневище деревянистое, ползучее; стебель 1—2 м. прямостоящій. 4-гранный, б. ч. простой, покрытъ, какъ и все растеніе, жесткими, жгучими и короткими простыми волосками; листья яйцевидно-ланцетные, верхніе—иногда ланцетные, съ сердцевиднымъ основаніемъ и крупно-пиль-

чатые по краю, на длинных черешкахъ, съ 2 маленькими ланцетными прилистниками, цѣлюкрайними или слегка зубчатыми; растеніе двудомное; колосья длиннѣ листовыхъ черешковъ. мужскіе—торчащіе, женскіе—по отцвѣтаніи поникающіе; цвѣты зеленые, по краямъ съ рѣсничками.

По полянамъ большихъ лѣсовъ, около жилья, по пустырямъ и по берегамъ ручьевъ, очень часто. Цвѣтетъ съ середины іюня до осени.



Urtica dioica.



Thesium ebracteatum.

Порядокъ Santaláles.

31 сем. Santaláceae R. Br.

Цвѣты съ 5-раздѣльнымъ околоцвѣтникомъ, остающимся при плодѣ; тычинки супротивны долямъ околоцвѣтника и прикрѣплены у основанія его; у каждой тычинки пучекъ волосковъ; завязь нижняя, одногнѣзная, съ 3 сѣмечками, повислыми на свободномъ срединномъ сѣменосѣ; плодъ—орѣшекъ; сѣмя безъ кожеры, но съ мясистымъ бѣлкомъ. Зеленые паразиты, живущіе на корняхъ растеній. къ которымъ прикрѣпляются своеобразными корневыми сосочками.

115. *Thesium* L.

303. *T. ebracteatum* Hayne. Пет. Кр. III, стр. 48.—Пет., стр. 290.—Кауф. II, № 667.—Гор., № 71.—Цин., № 1285.

Корневище ползучее, съ подземными побѣгами и съ однимъ, рѣже съ нѣсколькими прямыми, простыми стеблями въ 10—25 см.; листья линейные, съ срединной и 2 боковыми жилками у самого края; соцвѣтіе—простая кисть; цвѣты на длинныхъ цвѣтоножкахъ, при каждомъ цвѣткѣ одинъ прицвѣтникъ, подобный листу; верхушка цвѣточной кисти оканчивается хохолкомъ прицвѣтниковъ; околоцвѣтникъ внутри желтоватый, не длиннѣ завязи, бока которой съ ясными жилками.

По кустарникамъ и по опушкѣ лѣсовъ, на песчаной почвѣ.

Цвѣтетъ съ первыхъ чиселъ мая. Между Лужками и Никифоровымъ, Срп. у.

Порядокъ Aristolochiáles.

32 сем. Aristolochiáceae Juss.

Цвѣты обоеполые; околоцвѣтникъ 3-лопастной или трубчатый, съ косымъ языковиднымъ отгибомъ; тычинокъ 6, и тогда онѣ срастлись со столбикомъ, или тычинокъ 12—свободныхъ; завязь нижняя, съ 3—6-лопастнымъ или звѣздчатымъ рыльцемъ, обыкновенно 6-гнѣздная, съ сѣмечками, прикрѣпленными въ внутреннихъ углахъ гнѣздъ; плодъ—коробочка; сѣмя съ бѣлкомъ и маленькимъ зародышемъ безъ сѣмодолей.

116. Aristolochia L.

Околоцвѣтникъ трубчатый, съ косымъ или 3-лопастнымъ отгибомъ, опадаетъ; тычинокъ 6, сросшихся со столбикомъ; коробочка вскрывается вдоль перегородокъ; сѣмена сплюснутыя.

304. **A. Clematítis** L. Пет. Кр. III, стр. 15.—Пет., стр. 140.—Кауф. II, № 668.—Цин., № 1289. — Кауф. I, стр. 434. — Рупр., стр. 88.—Borg., p. 700.—Дв., № 839.—Макс., № 821.—Mart., p. 158.—St. II, p. 52.—St. I, № 619.—Pal., № 1993.

Корневище толстое, ползучее; стебель простой бороздчатый, прямо-стоящій, прямой или нѣсколько извилистый, до 70 см.; листья двурядные, на длинныхъ черешкахъ, сердцевидные, почти кожистые, по краямъ слегка шероховатые, сверху зеленые, снизу синне-зеленые; цвѣты довольно крупные, свѣтло-желтые, малоцвѣтковыми пучками въ пазухахъ листьевъ; плодъ крупный, грушевидный, повислый.

По опушкамъ лѣсовъ, по склонамъ и по каменистымъ мѣстамъ, покрытымъ кустарникомъ. Цвѣтетъ съ половины мая до половины июня. Карапчеево, Протопопово, Невѣрово, Клм. у.; Лужки Срп. у. (К.).—Бѣлые Колодези, Клм. у.; близъ Борисова, Срп. у. (Ш. и С.). Между Бѣлопесоцкой слободой и Старой Кашпирой, Срп. у.; между Елинымъ и Коневымъ бродомъ по берегу Москвы р., Клм. у. (X.).



Aristolochia Clematitis.

* **A. macrophylla** Lam. Пет. Кр. III, стр. 15.

Siphisia macrophylla Aschers. Пет., стр. 280.

Стебель выходящійся до 10 м.; листья крупные, сердцевидные, слегка заостренные, 20—25 см. ш., на длинныхъ черешкахъ; только черешки и

нижняя сторона листьев покрыты разсыпанным пушком; цветы бурые или желто-бурые, съ сильно изогнутой трубкой и 3-лопастным краемъ, назушные, на длинныхъ цветоножкахъ, ниже середины которыхъ съ однимъ прицветникомъ; плодъ на длинной плодоножкѣ, всякій, крупный, походить на огурецъ. Разводится.



Aristolochia macrophylla.



Asarum europaeum.

117. *Asarum* L.

Цветы съ 3-лопастнымъ, колокольчатымъ околоцветникомъ; тычинокъ 12 съ длиннымъ выступающимъ связникомъ, 6 тычинокъ короткихъ и 6 длинныхъ; пыльники раскрываются съ наружной стороны; коробочка вскрывается неправильно.

305. *A. europaeum* L. Бух. II, № 364.—Бух. I, № 345.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 141.—Кауф. II, № 669.—Цин., № 1288.—Pinz., p. 18.—Кауф. I, стр. 435.—Lind., p. 158.—Ann. C. I, № 44.—Дв., № 556.—Макс., № 450.—Hoff. II, № 3535.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 83. Hoff., № 353.—St. II, p. 28.—St. I, № 317.—Pal., № 931.

Корневище ползучее, обыкновенно съ 2—3 продолговато-округлыми чешуями и съ 2—3 почковидными листьями, при основаніи сердцевидными, верхняя сторона которыхъ лоснящаяся покрыта короткими щетинистыми волосками, нижняя—свѣтлѣе; черешки длинные, какъ и стебель, мохнатые; цветы одиночные на короткихъ поникающихъ цветоножкахъ; околоцветникъ снаружи буроватый, внутри грязно-желто-красный; доли его быстро сужены въ согнутый кончикъ; пыльники съ шиловиднымъ придаткомъ на верхушкѣ. Все растение 5—10 см., съ запахомъ, напоминающимъ перецъ.

По лѣсамъ на перегнойной почвѣ, очень часто. Цвететъ съ конца апрѣля до середины лѣта.

Порядокъ Polygonales.

33 сем. Polygonaceae Juss.

Цвѣты обоеполые или однополые, б. ч. на сочлененныхъ цвѣтоножкахъ; околоцвѣтникъ 4—6-раздѣльный или надрѣзной, однорядный или двурядный, и тогда по 3 листочка въ каждомъ ряду, по опыленіи внутренній рядъ разрастается и охватываетъ плодъ; тычинокъ 5—8, прикрѣпленныхъ у основаніи околоцвѣтника; завязь съ одною сѣмечкою и 2—3 столбиками; рыльца головчатые или кистистые; плодъ—орѣшекъ съ мучнистымъ бѣлкомъ и прямымъ или согнутымъ зародышемъ. Травы съ очередными листьями и прилистниками, сросшимися во влагалище, которое охватываетъ стебель (раструбъ).

1. Рыльца кистисты; околоцвѣтникъ 6-раздѣльный, изъ 2 рядовъ по 3 листка въ каждомъ; по опыленіи 3 внутренніе листка разрастаются. *Rumex.*

Рыльца головчатые; околоцвѣтникъ 5—4-раздѣльный. 2.

2. Околоцвѣтникъ по отцвѣтаніи облекаетъ 3-гранный орѣшекъ только при основаніи; стебель примостоящій, съ треугольно-сердцевидными или стрѣловидными листьями. *Fagopyrum.*

Околоцвѣтникъ по отцвѣтаніи вполне облекаетъ 2—3-гранный орѣшекъ; листья ланцетные или продолговатые, если же они треугольно-сердцевидные, то стебель выходящійся.

Polygonum.

118. *Rumex* L.

Цвѣты обоеполые, рѣже однополые; околоцвѣтникъ 6-раздѣльный, изъ 2 рядовъ по 3 листка въ каждомъ; внутренний рядъ по опыленіи разрастается и охватываетъ плодъ; часто всѣ листки внутреннего околоцвѣтника или только одинъ листокъ съ деревянистымъ желвачкомъ; тычинокъ 6; столбиковъ 3, съ кистистыми рыльцами; плодъ—3-гранный орѣшекъ.

1. Листья съ клиновиднымъ, округлымъ или сердцевиднымъ основаніемъ; всѣ цвѣты или большинство ихъ обоеполые. 2.

Листья съ стрѣловиднымъ или копьевиднымъ основаніемъ; цвѣты однополые; растеніе двудомное. 13.

2. Внутреннія доли околоцвѣтника по краямъ съ треугольными, шнеловидными или щетиновидными зубчиками. 3.

Внутреннія доли околоцвѣтника цѣлокрайнія или слегка зазубренныя. 6.

3. Нижніе листья широко-продолговато-сердцевидные; доли околоцвѣтника съ 1—3 короткими зубчиками. *R. obtusifolius* L.

Нижніе листья узкіе; доли околоцвѣтника съ длинными щетиновидными зубчиками. 4.

4. Внутреннія доли околоцвѣтника съ 3 зубчиками съ каждой стороны; листья на длинныхъ черешкахъ. *R. ucranicus* Fisch.

Внутреннія доли околоцвѣтника съ 2 зубчиками съ каждой стороны; листья на короткихъ черешкахъ. 5.

5. Зубчики на внутреннихъ доляхъ околоцвѣтника въ 2—4 раза превышаютъ ширину долей; цвѣточные мутовки сближены въ густыя соцвѣтія.

R. maritimus L.

Зубчики на внутреннихъ доляхъ околоцвѣтника не болѣе полутора раза превышаютъ ширину долей; цвѣточные мутовки б. или м. разставлены.

R. limosus Thuill.

6. Нижніе листья при основаніи клиновидно сужены, широко-ланцетные, очень мелко и ровно зубчатые.

R. Hydrolapathum Huds.

Нижніе листья съ округлымъ или сердцевиднымъ основаніемъ, но не клиновидные, цѣлюкрайніе или неравно-зубчатые, верхніе иногда съ клиновиднымъ основаніемъ и часто съ волнистыми краями. 7.

7. Всѣ внутреннія доли околоцвѣтника безъ желвачковъ. 8.

Желвачки на всѣхъ доляхъ или только на одной, иногда желвачекъ очень маленькій. 10.

8. Нижніе листья широко-сердцевидно-треугольные съ плоскими краями.

R. aquaticus L.

Нижніе листья продолговато-ланцетные или яйцевидно-ланцетные, съ округлымъ или слегка сердцевиднымъ основаніемъ и б. ч. съ волнистыми краями. 9.

9. Внутреннія доли околоцвѣтника треугольно-округлая, съ слегка заостренной верхушкой; наружныя доли отстоятъ горизонтально, почти равны половинѣ ширины внутреннихъ.

R. crispus L. a. nudivalvis Meisn.

Внутреннія доли околоцвѣтника округло-почковидныя, съ округлой верхушкой; наружныя доли б. ч. отогнуты книзу и значительно короче половины ширины внутреннихъ.

R. domesticus Hartm.

10. Нижніе листья продолговато-ланцетные съ сильно волнистыми краями.

R. crispus L.

Листья съ плоскими или съ почти плоскими краями. 11.

11. Внутреннія доли околоцвѣтника треугольно-сердцевидныя; нижніе листья при основаніи тупые или слегка сердцевидные, съ нижней стороны совершенно голые.

R. maximus Schreb.

Внутреннія доли околоцвѣтника округло-сердцевидныя; нижніе листья при основаніи глубоко-сердцевидные, съ нижней стороны, особенно вдоль жилокъ, покрыты короткими прижатыми волосками. 12.

12. Нижніе листья продолговато-сердцевидные; желвачекъ б. ч. на одной внутренней долѣ, высокій, очень сильно развитъ; на остальныхъ доляхъ либо ихъ нѣтъ, либо очень мелкіе.

R. confertus Willd.

Нижние листья широко-треугольно-сердцевидные; желвачекъ только одинъ, очень мелкій, не болѣе 1 мм., на остальныхъ доляхъ желвачковъ совершенно нѣтъ. *R. confertus* \times *aquaticus*.

13. Наружныя доли околоцвѣтника по опыленіи прижаты къ внутреннимъ; внутреннія—равны плоду или только слегка превышаютъ его. *R. Acetosella* L.

Наружныя доли околоцвѣтника по опыленіи отгибаются книзу; внутреннія разрастаются и становятся много крупнѣе плода.

R. Acetosa L.

306. *R. marítimus* L. Пет. Кр. III, стр. 7 и 12. — Пет., стр. 263. — Кауф. II, № 648. — Цил., № 1250. — Кауф. I, стр. 424. — Lind., p. 156. — Ann. C. V, № 50. — Дв., № 371. — Макс., № 358. — Gold. C., p. 19. — Gold. Sp., p. 125. — Mart., p. 65. — Hoff., № 2744. — St. II, p. 23. — Pal., № 738.

Стебель прямостоящій. 10—60 см., б. ч. почти отъ основанія вѣтвистый, бороздчатый; корень однолѣтній; корневые листья яйцевидно-ланцетные, равно отмираютъ, нижние стеблевые—ланцетные, съ обоихъ концовъ суженные, съ плоскимъ или волнистымъ краемъ, переходятъ въ короткій черешокъ, верхніе—почти линейные; цвѣты въ шаровидныхъ мутовкахъ, сближенныхъ въ почти непрерывную, до верху покрытую листьями метелку; внутреннія доли околоцвѣтника яйцевидно-треугольныя, съ острымъ вытянутымъ концомъ, 2,5—3,5 мм. дл. и 1,5—2 мм. ш., всѣ съ узкими, не высокими, спереди заостренными желвачками, по краямъ съ 2, рѣдко съ 4 шетиновидными зубчиками, которые по крайней мѣрѣ вдвое длиннѣе поперечника околоцвѣтника.



Rumex maritimus.

По разработаннымъ торфянымъ болотамъ, по берегамъ прудовъ и озеръ и по сырымъ мѣстамъ. Цвѣтетъ съ первыхъ чиселъ іюня до половины іюля. Лузники на Москвѣ р.; берегъ Клизмы близъ Павловскаго посада у Городка, Бгр. у.; островъ на Окѣ противъ Бачманова и Бѣлые Колодези, Кля. у. (Н.).—В. Мытищи у новой водокачки, Красниково-е болото за В. Мытищами. Косино; берегъ пруда у Виноградъ—близъ Сергіевскаго посада, Дмит. у. (С.).

307. *R. limósus* Thuill. Пет. Кр. III, стр. 7 и 13.

Rumex palustris Sm. Цил., № 1249.

Rumex maritimus L. β . *palustris* Sm. Макс., № 358.

Стебель прямостоящій, 10—70 см., отъ основанія сильно вѣтвистый, бороздчатый; корень двулѣтній; корневые листья яйцевидно-ланцетные, нижние стеблевые—линейно-ланцетные, цельнокрайніе, съ плоскими или

слегка волнистыми краями; двѣты въ шаровидныхъ мутовкахъ, нѣсколько разставленныхъ, только на самыхъ концахъ вѣтвей сближенныхъ; внутреннїя доли околоцвѣтника продолговато-треугольныя съ узкой и тупой верхушкой. 2,75—3,75 мм. дл. 1—1,5 мм. ш., всѣ съ высокимъ, спереди туповатымъ желвачкомъ и съ 2 прямыми зубчиками съ каждой стороны, которые не болѣе какъ въ полтора раза длиннѣе ширины околоцвѣтника. Часто встрѣчаются промежуточныя формы между *R. limosus* Thuill. и *R. maritimus* L.

По берегамъ прудовъ и озеръ и по сырымъ мѣстамъ. Цвѣтетъ съ начала іюня и до середины іюля. Раменское. Брн. у.. Мытищи въ канавѣ по ж. д. вѣтви на Щелково (С.).



Rumex limosus.



Rumex ucranicus.

308. *R. ucranicus* Fisch. Пет. Кр. III, стр. 11 и 12.—Ф. Б., № 7.

Стебель простертый или приподнимающійся, до 30 см., б. ч. съ самаго основанія вѣтвистый; листья на длинныхъ черешкахъ, продолговато-ланцетные, спереди заостренные, снизу притупленные, съ ушками и съ слегка волнистыми краями; верхніе—почти линейные; цвѣты въ мутовкахъ, нѣсколько разставленныхъ, только конечныя почти соприкасаются; внутреннїя доли околоцвѣтника до 2 мм. дл., яйцевидно-треугольныя, съ острой, длинной верхушкой; всѣ съ очень высокимъ, спереди тупымъ желвачкомъ и съ 3 щетиновидными зубчиками съ каждой стороны, длина которыхъ въ полтора—два раза болѣе ширины околоцвѣтника.

По берегу р. Оки на нескѣхъ подъ Серпуховымъ во $\frac{2}{3}$ августа (Вар. и Сюз.).

309. *R. obtusifolius* L. Пет. Кр. III, стр. 7 и 12. — Бух. II, № 351. — Бух. I, № 333.—Ф. О., № 7, p. 102.—Пет., стр. 263.—Кауф. II, № 649. — Цин., № 1252. — Кауф. I, стр. 424. — Lind., p. 156.—Дв., № 373.—Макс., № 357.—Hoff. II, № 2872.—Gold. C., p. 19.—Gold. Sp., p. 125. — Mart., p. 65.—St. II, p. 23.

Rumex obtusifolius L. β . *agrestis* Fr. Кауф. II, стр. 439.

Rumex maximus Schreb. Бух. II, № 353.—Бух. I, № 334 было опредѣлено неправильно, сообщ. А. Н. Петуниниковъ.

Стебель прямостоящій, до 1,5 м., бороздчатый, въ верхней части сильно вѣтвистый, съ отстоящими вѣтвями; корневые листья на очень длинныхъ черешкахъ, продолговато-яйцевидные, съ сердцевиднымъ основаніемъ и съ тупой верхушкой, рѣже верхушка бываетъ нѣсколько заостренная; средніе листья мельче корневыхъ, верхніе—почти ланцетные, заостренные, всё—съ нижней стороны или вдоль жилокъ покрыты очень короткимъ пушкомъ; мутовки цвѣтовъ нѣсколько разставлены, образуютъ длинные, безлистные соцветія; внутреннія доли околоцвѣтника 3,5—5,5 мм. дл. и 2—3,5 мм. ш., удлинненно-треугольныя, часто съ вытянутой верхушкой и 2—5 треугольно-шиловидными зубцами по краямъ; желвачки на всѣхъ доляхъ околоцвѣтника очень крупныя.



Rumex obtusifolius.

По сырымъ мѣстамъ, по опушкамъ лѣсовъ и по берегамъ рѣкъ. Цвѣтетъ съ половины іюня, весь іюль. Михайловское, дер. Конакова, Пдл. у. (Б.).—Воробьевы горы (П.).—Останкино (П. и С.).—Щелково по берегу Клязьмы, Бгр. у. (С.).—Выково, Брн. у. (Куль.).—Дунино, Звн. у., берегъ Москвы. р. (Х.).

310. *R. Hydrolápathum* Huds. Пет. Кр. III, стр. 10 и 11.—Кауф. II, стр. 441.—Цин., № 1258. Кауф. I, стр. 426.—Дв., № 368.—Макс., № 354.—Mart., p. 64.—St. II, p. 23.

Стебель 80—150 см., прямостоящій, бороздчатый, вѣтвистый; нижнія вѣтви нѣсколько отстоящія, верхнія—прижаты къ стеблю; корневые и нижніе стеблевые листья на черешкахъ, широко-ланцетные, у основанія клиновидно-суженные, по краямъ мелко-зубчатые; верхніе—почти сидячіе, узко-ланцетные и слегка волнистые, всё—нѣсколько кожистые; цвѣточные мутовки сближены; наружныя доли околоцвѣтника равны внутреннимъ или немного превышаютъ половину ширины ихъ, послѣднія—треугольныя съ усѣченнымъ или округлымъ основаніемъ и коротко-заостренной верхушкой, цѣльнокрайнія или у основанія неясно-зубчатые, одна изъ долей съ высокимъ, спереди заостреннымъ желвачкомъ.



Rumex Hydrolapathum.

Подъ Клычевымъ, Клм. у., на межѣ; въ незрѣлыхъ плодахъ въ концѣ іюня (П. и С.).

311. *R. crispus* L. Пет. Кр. III, стр. 8 и 12.—Бух. II, № 352.—Бух. I, № 331.—Ф. О., № 7, p. 102.—Пет., стр. 263.—Кауф. II, № 650.—Цин., № 1255.—Кауф. I, стр. 424.—Дв., № 369.—Макс., № 353.—Hoff. II., № 2856.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 64.—St. II, p. 23.—St. I, p. № 240.—Pal., № 734.

Стебель 40—100 см., прямостоящий, бороздчатый, простой или въ верхней части вѣтвистый, съ прижатыми вѣтвями; корневые и нижніе



Rumex crispus.

стеблевые листья на черешкахъ, продолговато-ланцетные, съ округлымъ или слегка сердцевиднымъ основаніемъ, съ заостренной верхушкой и сильно волнистымъ краемъ; верхніе листья ланцетные, съ б. или м. плоскими краями; цвѣточные мутовки очень сближены, въ густыхъ соцвѣтіяхъ, съ рѣдкими листьями; наружныя доли околоцвѣтника отстоятъ горизонтально или слегка отогнуты, почти равны половинѣ ширины внутреннихъ, послѣднія округло-или продолговато-сердцевидныя, съ нѣсколько заостренной верхушкой, цѣлюкрайнія или у основанія неясно-зубчатыя, 3,5—5 мм. дл. и 3,5—5 мм. ш., на всѣхъ доляхъ по желвачку.

По паровымъ полямъ, лугамъ и сырымъ мѣстамъ, очень часто. Цвѣтеть съ первыхъ чиселъ іюня.

α. unicallosus Peterm. Только одна доля околоцвѣтника съ желвачкомъ, остальные безъ желвачка.

β. nudivalvis Meisn. Пет. Кр. III, стр. 8.

Rumex domesticus Hartm. Бух. I, № 332.—F. O., № 7, p. 102.

Всѣ внутреннія доли околоцвѣтника безъ желвачковъ, б. ч. округло-сердцевидныя. Красниковское болото за Б. Мытищами, Серпуховъ (С.).—Порѣчье, Звн. у. (П.).—Михайловское, Пдл. у., выдавался за *R. domesticus* (Б.).—Между Вишняками и Косинымъ (Х.).

312. *R. domesticus* Hartm. Пет. Кр. III, стр. 9.—Пет., стр. 264.—Кауф. II, № 651.—Цян., № 1257.—Кауф. I, стр. 425.

Стебель 40—100 см., прямостоящий, бороздчатый, вѣтвистый; корневые и нижніе стеблевые листья продолговатой-сердцевидные или ланцетные, въ $2\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ раза длиннѣе ширины, по краямъ слегка волнистые, верхніе—узко-ланцетные, края плоскіе, только у основанія слегка волнистые; цвѣточные мутовки частыя; наружныя доли околоцвѣтника б. ч. отогнуты къ цвѣтоножкѣ, значительно короче половины ширины внутреннихъ долей; послѣднія округло-почковидныя, съ сердцевиднымъ основаніемъ, цѣлюкрайнія или съ слегка неровнымъ краемъ; всѣ безъ желвачковъ. Какъ кажется, очень рѣдко, за *R. domesticus* Hartm. часто выдается *R. crispus* L. *β. nudivalvis* Meisn.



Rumex domesticus.

Иваньково (К.).—Воробьевы горы (П.).

313. *R. máximus* Schreb. Пет. Кр. III, стр. 9 и 12. — Ф. О., № 7, p. 102. — Пет., стр. 263. — Кауф. II, № 652. — Цин., № 1260. — Кауф. I, стр. 425.

Rumex acutus L. Дв., № 372. — Макс., № 359. — Март., p. 65. — Ст. II, p. 23. — Ст. I, № 242.

Стебель примостоящій, до 2 м., бороздчатый, б. ч. вѣтвистый; нижніе листья продолговатые или яйцевидно-ланцетные, съ округлым или слегка сердцевиднымъ косымъ основаніемъ, съ заостренной верхушкой и плоскими краями; черешки длинные, верхняя сторона ихъ плоская, по краямъ съ 2 возвышенными жилками; мутовки цвѣтовъ сближенные, образуютъ длинные безлистные колосы; наружныя доли околоцвѣтника горизонтально-отстоящія, равны половинѣ ширины внутреннѣхъ долей, послѣднія — треугольныя, съ усѣченнымъ или слегка сердцевиднымъ основаніемъ, нѣсколько вытянутой верхушкой, цѣльнокрайнія или у основанія неровно- и мелко-зубчатыя, всѣ съ желвачками.

По тѣнистымъ и сырымъ мѣстамъ, рѣдко. Близъ Семеновскаго (Ст.). — Мож. у., списокъ (Ф. О.).



Rumex maximus.

314. *R. aquáticus* L. Пет. Кр. III, стр. 12. — Мос., № 33. — Ф. О., № 7, p. 102. — Пет., стр. 263. — Кауф. II, № 653. — Цин., № 1261. — Кауф. I, стр. 425. — Дв., № 875. — Макс., № 355. — Gold. С., p. 19. — Март., p. 65. — Ст. II, p. 23. — Ст. I, № 243. — Pal., № 742.

Стебель 80—170 см., примостоящій, бороздчатый, въ верхней части вѣтвистый; корневые и нижніе стеблевые листья на длинныхъ желобчатыхъ черешкахъ, сердцевидно-треугольные, съ нѣсколько вытянутой верхушкой; верхніе — почти сидячіе, широко-ланцетные, съ сердцевиднымъ основаніемъ; мутовки цвѣтовъ сближены; метелка съ прижатыми вѣтвями; наружныя доли околоцвѣтника горизонтально отстоящія, почти равны половинѣ ширины внутреннѣхъ; послѣднія яйцевидно-треугольныя, съ почти усѣченнымъ основаніемъ и часто съ нѣсколько вытянутой верхушкой, цѣльнокрайнія, всѣ безъ желвачковъ.

По берегамъ рѣкъ, прудовъ, по сырымъ мѣстамъ и по болотамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ іюля.



Rumex aquaticus.


315. *R. confertus* Willd. Пет. Кр. III, стр. 9 и 12.—Мос., № 34.—Ф. О., № 7, р. 102.—Пет., стр. 263.—Цпп., № 1262.

Стебель 60—120 см., прямостоящий, бороздчатый, только въ верхней части вѣтвистый; корневые и нижніе стеблевые листья на длинныхъ, сверху желобчатыхъ черешкахъ, продолговато-сердцевидные, по краямъ слегка волнистые; верхніе—яйцевидно-ланцетные, всѣ съ нижней стороны и особенно вдоль жилокъ коротко опушенные; цвѣточные мутовки сближены; метелка съ прижатыми, вверхъ торчащими вѣтвями; наружныя доли околоцвѣтника отстоятъ горизонтально или отогнуты къ цвѣтоножкѣ, нѣсколько менѣе половины ширины внутреннѣхъ долей; послѣднія округло-сердцевидныя, тупыя или заостренныя, цѣльнокрайнія или въ нижней части съ неясными зубчиками; желвачекъ очень развитъ, б. ч. только на одной доль, на остальныхъ двухъ тоже есть желвачки, только очень маленькіе.

По сырѣмъ мѣстамъ, около рѣкъ и по оврагамъ, не часто. Въ поляхъ въ концѣ іюня, по оврагу близъ Клычева, Клм. у. (П. и С.).—По р. Деснѣ въ с. Остафьевѣ, Пдл. у. (Мос.).



Rumex confertus.



Rumex aquaticus \times *confertus*.

R. aquaticus \times *confertus*.

Rumex alpinus L. Пет. Кр. III, стр. 9 и 12.

Rumex confertus Willd. Кауф. II, № 654.—Кауф. I, стр. 426.

Rumex alpinus M. B., non L. Кауф. II, стр. 441.—Кауф. I, стр. 426.

Rumex pseudo-alpinus Hoffm. Кауф. II, стр. 441.—Кауф. I, стр. 426.

Нижніе листья широко-яйцевидные, съ глубоко-сердцевиднымъ основаниемъ, тупой или слегка заостренной верхушкой, нижняя сторона коротко-опушенная; цвѣточные мутовки б. или м. разставлены, только верхушечныя соприкасаются; наружныя доли околоцвѣтника равны или короче половины ширины внутреннѣхъ долей, послѣднія сердцевидныя, 7—8 мм. дл., съ слегка зубчатымъ или цѣльнымъ краемъ, одна изъ долей съ очень маленькимъ, почти округлымъ желвачкомъ въ 1 мм. дл. Эту

помѣсь А. Н. Петунниковъ ошибочно считалъ за *R. alpinus* L., а Кауфманъ выдавалъ за *R. confertus* Willd.

Д. Березна, Срп. у., въ плодахъ 4 іюля (П.).—Быково, Брн. у. (Куль.).

316. *R. Acetosa* L. Пет. Кр. III, стр. 10 и 13.—Бух. II, № 355.—Бух. I, № 336.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 262.—Кауф. II, № 655.—Цин., № 1263.—Кауф. I, стр. 426.—Lind. p. 156.—Дв., № 376.—Макс., № 360.—Hoff. H., № 2844.—Gold C., p. 19.—Mart., p. 65.—Hoff., № 2736.—St. II, p. 23.—St. I, № 244.—Pal., № 748.

Стебель 30—100 см., прямостоящій, бороздчатый; листья нѣсколько мясистые, корневые и нижніе стеблевые на черешкахъ, яйцевидно-продолговатые, съ стрѣловиднымъ основаніемъ и съ туповатымъ концомъ, ло-



Rumex Acetosa.



Rumex Acetosa *var.* *auriculatus.*

пасти ихъ направлены внизъ; стеблевые—въ 2—4 раза длиннѣе ширины, сидячіе, ланцетовидно-стрѣловидные; соцветіе маловѣтвистое; цвѣты однополые, б. ч. розовые; наружныя доли околоцвѣтника женскихъ цвѣтовъ отогнуты къ цвѣтоножкѣ; внутренніе—почти круглыя, 3,5—5 мм. дл., съ сѣтчатыми жилками и съ маленькимъ желвачкомъ.

По лугамъ, откосамъ и по лѣсамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины мая.

var. auriculatus Wallr.

Rumex acetosa L. *var. auriculatus* Koch. Кауф. II, стр. 442. — Цин., № 1263. — Кауф. I, стр. 427.

Rumex auriculatus Wallr. Пет. Кр. III, стр. 13.

Стеблевые листья въ 4—12 разъ длиннѣе своей ширины, лопасти вытнуты и б. ч. загнуты вверхъ или внутрь, края часто волнистые; соцветіе сильно вѣтвистое; внутреннія доли околоцвѣтника женскихъ особей округло-почковидныя, отъ 2,5 до 3,3 мм. дл.; желвачки очень маленькіе. Между Лужками и Зибровымъ, Срп. у.; Быково, Брн. у. (С.).

β. *angulatus* Beck. Листья съ 1—2 короткими зубцами, отчего основаніе листа четырехугольное, какъ бы усѣченное. На сыромъ лугу близъ Дарьина, Звн. у. (X.).

317. *R. Acetosella* L. Пет. Кр., стр. 13. — Бух. II, № 354. — Бух. I, № 335. — F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 262. — Кауф. II, № 656. — Цвл., № 1264. — Pinz., p. 18. — Кауф. I, стр. 427. — Lind., p. 156. — Ann. C. III, № 249. — Дв., № 377. — Макс., № 361. — Hoff. II., № 2845. — Gold. C., p. 19. — Mart., p. 66. — Hoff., № 2737. — St. II, p. 23. — St. I, № 245. — Pal., № 749.

Корневище ползучее; нѣсколько прямостоящихъ, бороздчатыхъ, часто извилистыхъ стеблей до 50 см.; корневые и нижніе стеблевые листья ланцетные, заостренные, съ стрѣловиднымъ основаніемъ, лопасти ихъ загнуты кверху; верхніе стеблевые листья линейно-ланцетные; соцветіе вѣтвистое, съ длинными вѣтвями; цвѣты однополые; наружныя доли околоцвѣтника женскихъ особей прижаты къ внутреннимъ, послѣднія 1 мм. дл., безъ желваковъ, едва превышаютъ плодъ и прилегаютъ къ нему.

По кустарникамъ и открытымъ мѣстамъ, любитъ сухую и песчаную почву. Цвѣтеть съ начала мая.



Rumex Acetosella.



Rumex Acetosella a. multifidus.

α. *multifidus* L. Кауф. II, стр. 442. — Цвл., № 1264. — Кауф. I, стр. 427.
Rumex multifidus L. Mart., p. 66.

Лопастей у основанія листьевъ по 2—4 съ каждой стороны. Близъ Лужковъ, Срп. у. (C.).

β. *integrifolius* Wallr.

Rumex Acetosella L. β. *angustifolius* Koch. Бух. II, № 354. — Бух. I, № 335. — Pinz., p. 18.

Все листья цѣльнокрайніе, ланцетные или линейно-ланцетные, безъ лопастей или иногда одинъ, два листа на всемъ растеніи съ лопастями. Михайловское, Пдл. у. (Б.). — Дарьино, Звн. у. (X.).

γ. *umbrósus* Beck. Вѣтви соцветія тонкія, очень длинныя, рѣдкоцвѣтныя. Растетъ въ тѣни. Филино, Мос. у. (X.).

119. *Polýgonum* L.

Цвѣты обоеполые; околоцвѣтникъ 5—4-раздѣльный или—надрѣзной, по отцвѣтаніи нѣсколько разрастается и вполне облекаетъ плодъ; тычинокъ 5—8; завязь безъ железнатаго кольца или съ железнатымъ кольцомъ; столбикомъ 2—3, свободныхъ или сросшихся у основанія; рыльца головчатые; плодъ—чечевицеобразный орѣшекъ, сжатый съ боковъ, или 3-гранный; зародышъ боковой, согнутый, съ плоскими, узкими сѣмелями.

1. Растеніе водяное съ плавающими листьями.

P. amphibium L.

Растенія наземныя. 2.

2. Стебель вьющійся или распростертый, съ сердцевидно-треугольными листьями. 3.

Стебель прямостоящій или у основанія приподнимающійся, или же лежачій, но тогда листья ланцетные безъ сердцевиднаго основанія. 4.

3. Наружныя доли околоцвѣтника съ бѣловатыми перепончатыми крыльями; стебель голый.

P. dumetorum L.

Наружныя доли околоцвѣтника съ тупымъ килемъ на спинкѣ, безъ крыльевъ; стебель слегка опушенный.

P. Convolvulus L.

4. Стебель и листья съ обѣихъ сторонъ покрыты короткими, прижатыми, щетинистыми волосами.

P. amphibium L. *a. terrestre* Leers.

Стебель и верхняя сторона листьевъ голые, нижняя иногда покрыта прижатымъ пушкомъ, но не щетинистыми волосами. 5.

5. Цвѣты пучками по 2—5 въ пазухахъ листьевъ.

P. aviculare L.

Цвѣты скучены въ верхушечные колосыя. 6.

6. Стебель не вѣтвистый, съ однимъ верхушечнымъ колосомъ.

P. Bistorta L.

Стебель вѣтвистый, съ колосьями на концахъ вѣтвей. 7.

7. Колосыя густыя, довольно толстыя. 8.

Колосыя рѣдкоцвѣтныя, тонкія, часто прерванныя. 10.

8. Раструбы узкія, съ прижатыми волосами и длинными рѣсничками по краю, плотно охватываютъ стебель.

P. Persicaria L.

Раструбы широкія, почти голыя, съ очень короткими рѣсничками или совсѣмъ безъ рѣсничекъ. 9.

9. Край околоцвѣтника при плодахъ съ сильно выдающимися жилками; цвѣтоножки и иногда околоцвѣтникъ б. или м. густо покрыты железками.

P. tomentosum Schrank.

Край околоцвѣтника при плодахъ съ слабо выдающимися жилками; цвѣтоножки и околоцвѣтникъ безъ железокъ или съ очень рѣдкими железками.

P. nodosum Pers.

10. Раструбы почти голые, съ короткими рёсничками по краю или безъ рёсничекъ; околоцвѣтникъ густо покрытъ точечными железками. *P. Hydropiper* L.

Раструбы покрыты прижатыми волосками и съ б. или м. длинными рёсничками по краю; околоцвѣтникъ безъ точечныхъ железокъ или съ рѣдкими железками. 11.

11. Колосья длинные, прерывчатые, б. ч. склоненные; цвѣты 3—3,5 мм. дл.; тычинокъ всегда 6; сѣмена тускляя.

P. mile Schrank.

Колосья не прерывчатые, прямоторчащiе; цвѣты 1,5—2 мм. дл., тычинокъ 5, рѣдко 6; сѣмена лоснящiяся. *P. minus* Huds.

318. *P. Bistorta* L. Пет. Кр. III, стр. 13. — Бух. II, № 356. — Бух. I, 338. — F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 246. — Кауф. II, № 657. — Цин., № 1266. — Кауф. I, стр. 426. — Lind., p. 156. — Ann. C. V, № 51. — Дв., № 404. — Макс., № 376. — Hoff. H., № 3015. — Gold. C., p. 19. — Mart., p. 71. — Hoff., № 2549. — St. II, p. 24. — St. I, № 266.

Корневище толщиною въ палецъ, деревянистое, червеобразно-изогнутое; стеблей 1—2, до 70 см., прямостоящихъ, голыхъ, не вѣтвистыхъ, съ слабыми утолщенiями подъ листьями; корневыя и нижнiе стеблевые листья на длинныхъ крылатыхъ черешкахъ, удлинненно-яйцевидные, съ усѣченнымъ или слегка сердцевиднымъ основанiемъ и заостренной верхушкой, съ нижней стороны сизоватыя, края б. или м. волнистые; верхнiе стеблевые—сидячiе, съ длинными влагалищами, линейно-ланцетные; цвѣты въ густомъ, конечномъ цилиндрическомъ колосѣ; околоцвѣтникъ розовый, рѣдко почти бѣлый; тычинокъ 8, выступающихъ изъ околоцвѣтника; столбикомъ 3; сѣмянка коричневая, лоснящiяся, 3-гранная.



Polygonum Bistorta.

По торфянымъ болотамъ, по сырымъ лугамъ и лѣснымъ полянамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины мая; зрѣлые плоды съ iюля.

319. *P. amphibium* L. Пет. Кр. III, стр. 13. — Пет., стр. 246. — Кауф. II, № 658. — Цин., № 1268. — Кауф. I, стр. 429. — Lind., p. 158. — Дв., № 398. — Макс., № 377. — Gold. C., p. 19. — Mart., p. 71. — Hoff., № 2546. — St. II, p. 24. — St. I, № 267. — Pal., № 791.

Корневище ползучес, вѣтвистое; стебель 30—150 см., покрытъ частыми и одинаковыхъ размѣровъ листьями, отъ продолговатыхъ до линейно-ланцетныхъ; цвѣты въ конечныхъ, продолговатыхъ, густыхъ колосьяхъ; околоцвѣтникъ розовый; тычинокъ 5, выступающихъ изъ околоцвѣтника;

столбиковъ 2, наполовину сросшихся; сѣмя чечевицеобразно-сплюснутое. Цвѣтеть съ половины юня.



Polygonum amphibium α. *natans*.



Polygonum amphibium β. *terrestre*.

α. *natans* Moench. Бух. II, № 357.—Бух. I, № 341.—F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, стр. 444.—Цин., стр. 380.—Кауф. I, стр. 429.

Polygonum amphibium L. α. *aquaticum* Mart. Дв., p. 203.—Mart. p. 71.

Стебли плавающие, вѣтвистые, до 2 м.; листья продолговатые, съ округлымъ или сердцевиднымъ основаніемъ и съ тупой или слегка заостренной верхушкой, сверху лоснящіеся, на длинныхъ черешкахъ, плавающіе.

По рѣкамъ, прудамъ и озерамъ, очень часто.

β. *terrestre* Leers. F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, стр. 444.—Цин., стр. 380.—Кауф. I, стр. 429.—Дв., p. 204.—Mart., p. 17.

Растеніе наземное; стебель прямостоящій, 30—50 см., не вѣтвистый, покрытъ короткими, прижатыми, щетинистыми волосками; листья на короткихъ черешкахъ, ланцетные, заостренные, у основанія округлые или слегка сердцевидные, съ верхней стороны, а равно и съ нижней, особенно вдоль жилокъ, покрыты короткими, прижатыми, щетинистыми волосками, отчего шероховатые.

По берегамъ рѣкъ и прудовъ. Кирѣево, Иваньково, Симоновъ монастырь (К.).—Никольское на Яузѣ, Пушкино по р. Серебрянкѣ (С.).—Берегъ Глубокаго озера, Руз. у. (Ш. и С.).

320. *P. tomentósum* Schrank. Пер. Кр. III, стр. 13.

Polygonum lapathifolium L. F. O., № 7, p. 102.—Пер., стр. 246.—Кауф. II, № 659.—Цин., № 1269.—Кауф. I, стр. 430.—Lind, p. 156.—Ann. C. IV, № 47.—Дв., № 401.—Макс., № 378.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 72.—Hoff., № 2558.

Polygonum lapathifolium L. α. *typicum* Kauffm. Бух. II, № 358α.—Бух. I, № 343α.



Polygonum tomentosum.

Стебель 30—100 см., прямостоящий, голый, вѣтвистый, съ утолщенными узлами; листья эллиптическо-ланцетные или ланцетные, б. ч. заостренные, цѣльнокрайніе, съ нижней стороны голые, съ точечными желтыми железками или опушенные, съ верхней стороны иногда съ маленькимъ, полулуннымъ, красноватымъ пятномъ или безъ него; раструбы у листьевъ широкіе, пленчатые, съ неровнымъ краемъ, но безъ рѣсничекъ, рѣдко съ очень мелкими рѣсничками; цвѣты въ густыхъ, цилиндрическихъ колосьяхъ; околоцвѣтникъ зеленый, по краямъ съ сильно выдающимися жилками; цвѣтоносы, цвѣтоножки, часто и околоцвѣтникъ густо покрыты железками, отчего колосъ часто бываетъ липкій; сѣмя сплюснутое, съ обѣихъ сторонъ вогнутое ¹⁾.

Очень часто какъ сорное и по берегамъ рѣкъ и канавъ. Цвѣтетъ съ іюля.

α. *incanum* Schmidt. Пет. Кр. III, стр. 14.—Макс., № 378.

Polygonum lapathifolium L. β. *incanum* Schmidt. Макс., № 378β.

Polygonum lapathifolium L. β. *incanum* Kauffm. Бух. II, № 358β.—Бух. I, № 343β.—
F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, стр. 445.—Цин., стр. 381 (Ledeb).—
Кауф. I, стр. 430.

Polygonum incanum Schmidt. Mart., p. 72.—St. II, p. 24.

Polygonum tomentosum Schrank. Schedae ad. Herb. Fl. Ross. № 1631.

Нижняя сторона листьевъ покрыта сѣроватымъ пушкомъ или даже войлокомъ. Воробьевы горы; Вертинское, въ овсѣ, Кн. у. (П.).

β. *viride* Litw. Schedae ad. Herb. F. Ross. № 1632.

Листья съ обѣихъ сторонъ зеленые, съ нижней стороны б. или м. густо покрыты точечными желтыми железками. Встрѣчается очень часто.

γ. *prostratum* Aschers. Пет. Кр. III, стр. 14.

Polygonum lapathifolium L. γ. *nodosum* Koch. Бух. II, № 358γ.—Бух. I, № 343γ.

1) *P. tomentosum* Schrank отличается отъ *P. nodosum* Pers. только двумя признаками: у первого цвѣтоножки и околоцвѣтникъ покрыты железками и околоцвѣтникъ при плодахъ съ рѣзко выступающими жилками по краямъ; у послѣдняго железокъ нѣтъ и жилки слабо выступаютъ. Первый признакъ не всегда постояненъ, особенно на околоцвѣтничкѣ, который мнѣ приходилось видѣть безъ железокъ, но жилки при плодахъ всегда очень рѣзко выступаютъ; встрѣчаются экземпляры, на которыхъ можно видѣть въ одномъ и томъ же колосѣ околоцвѣтникъ съ рѣзко выступающими жилками и съ жилками мало замѣтными; при очень тщательномъ изслѣдованіи околоцвѣтничковъ съ мало замѣтными жилками, плодовъ въ нихъ не оказывалось. Такимъ образомъ, точное опредѣленіе этихъ двухъ видовъ возможно только во время плодошенія, а не во время цвѣтенія, если первый признакъ не будетъ ясно выраженъ.

Стебель вѣтвистый, распростертый; листья узкіе; колосы очень короткіе. Михайловское, Пдл. у. (Б.).—На пескахъ по р. Окѣ, противъ Лужниковъ, Срп. у.; Воробьевы горы (П.).

321. *P. nodosum* Pers. Пет. Кр. III, стр. 13 и 14.

Polygonum lapathifolium L. Бух. II, № 358.—Бух. I, № 343.

Polygonum Persicaria L. Макс., № 379.—Hoff. Н., № 3032.—Gold. С., р. 19.—и въ герб. Генинга.

Стебель 30—150 см., прямостоящій, сильно-вѣтвистый, голый, иногда съ красноватыми пятнами и сильно утолщенными узлами; листья продолговатые или ланцетные, сильно заостренные, съ нижней стороны густо покрыты желтыми, точечными железками, съ верхней стороны почти постоянно съ краснымъ пятномъ; раструбы у листьевъ широкіе, голые, иногда очень коротко-рѣсничатые; цвѣты въ длинныхъ, цилиндрическихъ, часто поникающихъ колосьяхъ, бѣлые, зеленоватые или розовые; околоцвѣтникъ съ мало выступающими жилками; цвѣтоносы, цвѣтоножки, а также и околоцвѣтникъ безъ железокъ или съ очень рѣдкими железками; сѣмя сплюснутое, съ обѣихъ сторонъ вогнутое.

По лугамъ, рѣдко. Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Въ гербаріяхъ: Максимовича, Гольдбаха, Генинга и Гофмана.



Polygonum nodosum.



Polygonum Persicaria.

322. *P. Persicaria* L. Пет. Кр. III, стр. 14.—Пет., стр. 246.—Кауф. II, № 660.—Цин., № 1270.—Кауф. I, стр. 430.—Lind., р. 156.—Дв., № 40.2—Mart., р. 72.—Hoff., № 2560.—St. II, р. 24.—St. I, № 269.—Pal., № 793.

Стебель 30—100 см., прямостоящій или приподнимающійся, голый, вѣтвистый; листья на короткихъ черешкахъ, широко-ланцетные, сильно заостренные, съ верхней стороны почти постоянно съ бурымъ пятномъ; раструбы плотно охватываютъ стебель, съ короткими волосками на поверхности и съ длинными рѣсничками по краю; цвѣты въ густыхъ, не длинныхъ колосьяхъ. б. ч. розовые, рѣже бѣлые; цвѣтоносы и цвѣто-

ножки голые, безъ железокъ; сѣмя сплюснутое, съ обѣихъ сторонъ съ плоскими боками, рѣже одинъ бокъ выпуклый. Встрѣчается очень рѣдко. Б. Мытищи (Ч.).

323. **P. Hydró Piper L.** Пет. Кр. III, стр. 13.—Бух. II, № 359.—Бух. I, № 342.—Ф. О., № 7, p. 102.—Петр., стр. 246.—Кауф. II, № 661.—Цин., № 1273—Кауф. I, стр. 430.—Lind., p. 158.—Ann. C. IV, № 46.—Дв., № 399.—Макс., № 381.—Hoff. H., № 3024.—Gold. C., p. 19.—Gold. Sp., p. 125.—Mart., p. 71.—Hoff., № 2557.—St. II, p. 24.—St. I, № 268.—Pal., № 792.

Стебель 20—70 см., прямостоящій, голый, отъ основанія вѣтвистый, съ торчащими вѣтвями; верхнѣе листья сидячіе, нижнѣе—на короткихъ черешкахъ, ланцетные. съ длинно-заостренной верхушкой, съ нижней стороны нѣсколько свѣтлѣе; раструбы пленчатые, красноватые, съ голымъ или коротко-рѣсничатымъ краемъ; колосъ длинный, конечный, прерывчатый; цвѣты по 2—3, на короткихъ цветоножкахъ, выставляются изъ пленчатыхъ раструбовъ, съ голымъ, рѣже коротко-рѣсничатымъ краемъ; околоцвѣтникъ розовый или зелено-розовый, 4—5-раздѣльный, съ наружной стороны густо покрытъ точечными железками; тычинокъ 6, рѣже 8; сѣмя коричневое, мелко-точечное, шереховатое, съ одной стороны слабо, съ другой—сильно-выпуклое, такъ что часто кажется 3-граннымъ.

По берегамъ рѣкъ, прудовъ и по сырымъ мѣстамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ іюля; зрѣлые плоды съ августа.



Polygonum Hydropiper.



Polygonum mite.

324. **P. mite Schrank.** Пет. Кр. III, стр. 14.—Пет., стр. 246.—Цин., № 1271. *Polygonum mite* Coss. et Germ. F. О., № 7, p. 102.—Кауф. II, № 662.—Кауф. I, стр. 431. *Polygonum mite* Coss. et Germ. *s. typicum* Kauffm. Кауф. II, стр. 446.—Кауф. I, стр. 431. *Polygonum dubium* Stein.—*Polygonum hybridum* Chaubard.

Стебель 20—50 см., вѣтвистый, б. ч. прямостоящій; листья почти сидячіе, продолговато-ланцетные, равномерно-суженные къ обоимъ концамъ; листовые и цвѣточные раструбы длинно-рѣсничатые, покрыты короткими прижатыми волосками; цвѣточные колосы длинные, б. ч. прерывчатые, поникающіе; околоцвѣтникъ бѣлый или розовый, 3—3,5 мм. дл. снаружи безъ точечныхъ железокъ или съ очень рѣдкими; тычинокъ всегда 6: три внутреннія—у основанія съ железками, три наружныя—безъ железокъ; сѣмя неясно-точечное, почти тусклое.

По сырымъ мѣстамъ и по берегамъ рѣкъ и прудовъ. Цвѣтетъ съ іюля. Какъ кажется, встрѣчается рѣдко. Вблизи Романцова, Мож. у. (В.).

325. *P. minus* Huds. Пет., стр. 246.—Цин., № 1272.—Lind., p. 158.—Ann. C. V, № 52.—Дв., № 400.—Нoff. Н., № 3029.—Mart., p. 71.

Polygonum minus L. Пет. Кр. III, стр. 14.

Polygonum minus Ait. Макс., № 380.—Gold. C., p. 19.


Polygonum minus Curt. Gold. Sp., p. 125.

Polygonum mite Coss. et Germ. β . *minus* Coss. et Germ. Кауф. II, стр. 446.—Кауф. I, стр. 431.

Polygonum angustifolium Roth. Макс., № 380.

Стебель 15—40 см., вѣтвистый, б. ч. приподнимающійся, часто въ нижнихъ узлахъ укореняющійся, рѣже прямостоящій; листья почти сидячіе, линейно-ланцетные, у основанія округлые, рѣже нѣсколько суженные, до двухъ третей длины съ параллельными краями, потомъ заостренные, по краямъ и на нижней сторонѣ коротко-опушенные; раструбы съ прижатыми, короткими щетинками, по краю длинно-рѣсничатые, какъ и раструбы у цвѣтовъ; цвѣточные колосы тонкіе, но б. ч. не прерывчатые, прямоторчащіе; околоцвѣтникъ розовый, снаружи безъ точечныхъ железокъ, 1,5—2 мм. дл., почти постоянно 5-ной; тычинокъ 5, очень рѣдко 6; сѣмя съ обѣихъ сторонъ выпуклое, черное, лоснящееся.

По сырымъ мѣстамъ и по берегамъ рѣкъ и прудовъ. Цвѣтетъ съ іюля. Дорога изъ Иванькова въ Братцово, Кирѣево (К.).—Воробьевы горы (П.).—Берегъ Глубокаго озера, Руз. у. (П. и С.).—Красниковское болото за Б. Мытищами (С.).



Polygonum minus.

326. *P. aviculare* L. Пет. Кр. III, стр. 15.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 245.—Кауф. II, № 663.—Цин., № 1281.—Кауф. I, стр. 431.—Lind., p. 156.—Ann. C. V, № 53.—Дв., № 405.—Макс., № 282.—Hoff. Н., № 3014.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 72.—Hoff., № 2548.—St. II, p. 24.—St. I, № 270.—Pal., № 795.

Стебель отъ 10 см. до 1 м. б. ч. распростертый, восходящій, рѣже прямостоящій, но тогда очень не высокій, бороздчатый, сильно вѣтвистый;

листья эллиптические, ланцетные или линейно-ланцетные, тупые или заостренные, суженные въ короткій черешокъ; раструбы частью приросшіе къ черешку листа, съ 2 вытянутыми зубцами, потомъ разрываются на нѣсколько частей, по краямъ пленчатые, съ 6—8 продольными жилками; цвѣты пазушные, по 2—5; околоцвѣтникъ зеленый съ широкимъ бѣлымъ или розовымъ краемъ, 5-ной; тычинокъ 8; тычиночныя нити у основанія расширены; сѣмя 3-гранное, тусклое, продольно-бороздчатое.



Polygonum aviculare α. *procumbens*.

Сорное, очень часто. Цвѣтетъ съ іюня.

α. *procumbens* (Gilib.) Ledb. Пет. Кр. III, стр. 15.—F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, стр. 446.—Цпн., стр. 383.—Кауф. I, стр. 431.


Стебель распростертый; листья эллиптич., туповатые. Очень часто.

β. *erectum* Roth. Пет. Кр. III, стр. 15.—Бух. II, № 360.—Бух. I, № 337.—Кауф. II, стр. 447.—Цпн., стр. 383.—Кауф. I, стр. 432.

Стебель прямостоящій; листья эллиптические или широко-ланцетные, б. ч. заостренные. Очень часто.



Polygonum aviculare β. *erectum*.



Polygonum aviculare γ. *neglectum*.

γ. *neglectum* Bess. Пер. Кр. III, стр. 15.

Polygonum aviculare L. *angustifolium* herb. Goldb. F. O., № 7, 102. — Кауф. II, стр. 447.—Кауф. I, стр. 432.—Цпн., стр. 384.

Polygonum aviculare L. *angustissimum* Meisn.

Стебель тонкій, лежачій или приподнимающійся, рѣже почти прямостоящій; листья очень узкіе, почти линейные, сильно заостренные; раструбы при цвѣтахъ съ 2 очень длинными серебристыми зубчиками. Влѣзъ Перова на пашнѣ (Гольдбахъ).—Лѣсъ подъ Борнсовымъ, Срп. у. и по откосу ж. д. подъ Серпуховымъ (С.).

327. *P. Convolvulus* L. Бух. II, № 361.—Бух. I, № 339.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 245.—Кауф. II, № 664.—Цин., № 1275.—Кауф. I, стр. 432.—Lind., p. 156.—Ann. C. V., № 54.—Дв., № 407.—Макс., № 384.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 73.—St. II, p. 24.—St. I, № 272.—Pal., № 799.

Стебель до 1 м., отъ основанія сильно вѣтвистый, б. ч. распростертый или вьющійся, бороздчатый, иногда шероховатый отъ очень короткихъ, прижатыхъ волосковъ; листья на короткихъ, шероховатыхъ черешкахъ, яйцевидно-треугольные, съ сердцевиднымъ основаніемъ и съ заостренной верхушкой; цвѣты повислые, по 3—6 въ пазухахъ листьевъ и въ конечныхъ, рѣдкихъ колосьяхъ; снаружи околоцвѣтникъ зеленый, внутри бѣлый, доли на спинкѣ съ небольшимъ килемъ и съ узкимъ, бѣлымъ, шероховатымъ краемъ; цвѣтоножка короче цвѣтка и сочленена подъ нимъ; сѣмя 3-гранное, черное, тонко-бороздчатое и потому тусклое.

Очень часто какъ сорное по паровымъ полямъ, посѣвамъ, огородамъ и по берегамъ рѣкъ. Цвѣтетъ съ іюня.



Polygonum Convolvulus.

328. *P. dumetorum* L. Бух. II, № 362.—Бух. I, № 340.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 245.—Кауф. II, № 665.—Цин., № 1276.—Pinz., p. 18.—Кауф. I, стр. 432.—Lind., p. 158.—Ann. C. III, № 250.—Дв., № 408.—Макс., № 385.—Ное. Н., № 3019.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 73.—St. I, № 273.

Стебель до 1,5 м., б. ч. вьющійся, тонко-бороздчатый, голый, сильно вѣтвистый; листья на короткихъ, голыхъ черешкахъ, яйцевидно-треугольные, съ вытянутой и заостренной верхушкой и сердцевиднымъ основаніемъ; цвѣты пазушные и въ конечныхъ колосьяхъ, повислые на цвѣтоножкахъ равныхъ околоцвѣтнику и съ сочлененіемъ ниже середины; наружныя доли околоцвѣтника зеленныя, при плодахъ съ широкими, бѣловатыми, перепончатыми крыльями на спинкѣ, низбогающими на плодоножку; сѣмя гладкое, лоснящееся.

По кустарникамъ и по берегамъ рѣкъ, любитъ песокъ. Цвѣтетъ съ начала іюня. Михайловское, по каменоломнямъ, Пдл. у. (Б.). — Берегъ р. Учи у полотна М. - Яр. ж. д.; берегъ Клязьмы у Образцова, Бгр. у.; близъ Лужковъ, Срп. у. (С.). — Воробьевы горы (П.).



Polygonum dumetorum.

* *Fagopyrum* Gaertn.

Цвѣты обоеполые; околоцвѣтникъ 5-раздѣльный, лепестковидный, окрашенный, по опыленіи не разрастается, такъ что сѣмянка значительно выступаетъ изъ него; тычинокъ 8; завязь окружена железистымъ кольцомъ; столбиковъ и рылецъ 3; плодъ — 3-гранный орѣшекъ; зародышъ осевой, съ широкими, поперечно-сложенными листовидными сѣмодолями.

* *F. esculéntum* Moench: Пет., стр. 187.

Polygonum Fagopyrum L. Кауф. II, стр. 447.—Цин., стр. 379.—Кауф. I, стр. 433.—Др., № 406.—Макс., № 383.—Hoff. H., № 3021.—Mart., p. 72.—St. II, p. 24.—St. I, № 271.—Pal., № 798.



Fagopyrum esculentum.

Стебель 30 — 70 см., прямостоящій, вѣтвистый, голый, б. ч. красноватый; листья треугольно-сердцевидные, нѣсколько стрѣловидные, заостренные; нижніе и средніе — на черешкахъ, верхніе — сидячіе; цвѣты розовые, въ пазухахъ и конечныхъ ложныхъ кистяхъ, скученныхъ щитками на длинныхъ цвѣтоносахъ; прицвѣтники яйцевидные, но не раструбомъ, съ каймой; орѣшекъ повислый, 3-гранный, съ острыми цѣльнокрайними ребрами. Разводится.

Порядокъ *Centrospermae*.

34 сем. *Chenopodiaceae* Vent.

Цвѣты обоеполые или однополые; околоцвѣтникъ травянистый, рѣже пленчатый, иногда по опыленіи деревянѣетъ или дѣлается мясистымъ и похожимъ на ягоду, 5-раздѣльный или -надрѣзной, рѣже 1—4-раздѣльный, еще рѣже околоцвѣтника совѣмъ нѣтъ, и тогда цвѣтокъ прикрытъ прицвѣтникомъ или заключенъ въ 2 листочка (предлистья), разрастающихся при плодахъ; тычинокъ по числу долей околоцвѣтника, супротивныхъ долямъ его; завязь верхняя (только у *Beta* завязь полунижняя), одногнѣздная, съ одною сѣмечкою, прикрѣпленную сѣменосомъ ко дну завязи, съ простыми или раздѣльными столбиками и 2—4, б. ч. нитевидными рыльцами; плодъ — сѣмянка; сѣмя съ центральнымъ, мучнистымъ бѣлкомъ или безъ бѣлка и съ окружнымъ кольцевымъ или улиткообразнымъ зародышемъ.

Обзоръ сем. *Chenopodiaceae*.Подсемейство *Cyclólobae* A. C. Mey.

Зародышъ б. ч. кольцообразный окружаетъ обильный бѣлокъ, рѣдко согнутый, лежащій сбоку бѣлка.

I. Chenopodiaceae Moq.—Tand.

Листья плоскіе, широкіе, съ черешкомъ; цвѣты съ околоцвѣтникомъ, б. ч. обоеполые.

Beta, Chenopodium.

II. Spinaciaceae Dumort.

Листья плоскіе, съ черешкомъ; цвѣты б. ч. однополые; пестикъ сжатъ почти всегда съ боковъ; сѣмя почти всегда вертикальное.

Spinacia, Atriplex.

III. Corispermaceae Link.

Листья линейные; цвѣты обоеполые; пестикъ сжатъ со стороны кроющаго листа.

Corispermum.

Подсемейство Spirólobae C. A. Mey.

Зародышъ спиральный; бѣлка нѣтъ или почти нѣтъ.

IV. Salsóleae Volk.

Зародышъ согнутъ спирально по винтовой линіи; кожура сѣмянки б. ч. перепончатая; бѣлка нѣтъ.

Salsola.

Опредѣлитель родовъ.

1. Листья линейные или шиловидные, иногда оканчиваются колючкой. 2.

Листья плоскіе, не шиловидные и всегда безъ колючекъ. 3.

2. Околоцвѣтникъ неравно- 5-раздѣльный, основаніе его хрящеватое; плодъ тѣсно охваченъ околоцвѣтникомъ; доли послѣдняго съ поперечными крыловидными придатками. *Salsola.*

Околоцвѣтника нѣтъ или онъ изъ 1—5 маленькихъ чешуекъ; плодъ голый, сплюснутый, съ внутренней стороны плоскій, съ наружной—выпуклый. *Corispermum.*

3. Околоцвѣтникъ 5-раздѣльный, деревянѣющій; цвѣты по 2—4, сростаются въ клубочекъ, по созрѣваніи отваливающійся; завязь полунижняя. *Beta.*

Околоцвѣтникъ 3—5-раздѣльный, травянистый, мясистый или его нѣтъ; цвѣты не сростаются; завязь верхняя. 4.

4. Растенія двудомныя; женскіе цвѣты съ 2—4-зубчатымъ околоцвѣтникомъ, два супротивныхъ его зубца сростаются, отвердѣваютъ и облекаютъ плодъ. *Spinacia.*

Растенія съ цвѣтками обоеполыми или однополыми,—однодомныя; женскіе цвѣты безъ отвердѣвающихъ зубцовъ. 5.

5. Женскіе цвѣты безъ околоцвѣтника, но съ 2 ромбическими листочками (предлистьями), по отцвѣтаніи разрастающимися; мужскіе цвѣты съ 3—5-раздѣльнымъ околоцвѣтникомъ. *Atriplex.*

Цвѣты обоеполые или равнополые, и тогда въ женскихъ и мужскихъ цвѣтахъ околоцвѣтники одинаковые. *Chenopodium.*

* *Béta* L.

Цвѣты обоеполые, собраны клубочками по 2—4, впоследствии срастаются и отваливаются всё вмѣстѣ; околоцвѣтникъ 5-раздѣльной, деревяниющей; завязь полунижняя, окружена мясистымъ кольцомъ, къ которому прикрѣплены 5 тычинокъ; рылецъ 2—3, рѣдко до 5; плодъ сжатъ сверху, срастается внизу съ околоцвѣтникомъ и вмѣстѣ съ нимъ отваливается; сѣмя горизонтальное.

* *B. vulgaris* L. Пет., стр. 146.—Кауф. II, стр. 434.—Цин., стр. 363.—Кауф. I, стр. 418.—Pal., № 501.



Beta vulgaris.

Стебель до 1,5 м., прямостоящій, ребристо-бороздчатый, вѣтвистый, голый, какъ и все растеніе; корневые листья розеткой на длинныхъ черешкахъ, овальные или яйцевидные, тупые, у основанія б. ч. сердцевидные, по краямъ волнистые; стеблевые—ромбическо-овальные, б. ч. заостренные, суженные въ короткій черешокъ; цвѣты зеленые, въ клубочкахъ, образуютъ прерывчатые, облиственные колосья; рылецъ б. ч. 2, продолговато-яйцевидныхъ.

α. esculénta Salisb.

Beta vulgaris L. *α. Cilca* Koch. Кауф. II, стр. 434.—Кауф. I, стр. 419.

Корень очень мясистый, веретенообразный или шаровидный сплюснутый, кроваво-красный, розовый или почти бѣлый. Разводится по огородамъ.

120. *Chenopódium* L.

Цвѣты б. ч. обоеполые, иногда между обоеполыми цвѣтами встрѣчаются женскіе; околоцвѣтникъ 3—5-раздѣльный, травянистый или при плодахъ мясистый, сочный; тычинокъ б. ч. 5, рѣже 3 или 1; нитевидныхъ рылецъ 2—3 или 5; плодъ—сѣмянка: если овальный и сжатъ съ боковъ, то вертикальный; если округлый и сжатъ сверху, то горизонтальный.

1. Листья цѣльнокрайніе. 2.

Листья по краямъ зубчатые или выемчато-зубчатые. 3.

2. Листья копьевидные, на длинныхъ черешкахъ.

C. bonus *Henricus* L.

Листья б. ч. яйцевидные, съ основаніемъ, переходящимъ въ черешокъ.

C. polyspermum L.

3. Околоцвѣтникъ по отцвѣтаніи сочный, красного цвѣта.

C. foliosum *Aschers.*

Околоцвѣтникъ всегда травянистый. 4.

4. Основаніе листьевъ сердцевидное.

C. hybridum L.

Основаніе листьевъ клиновидное или усѣченное, быстро переходящее въ черешокъ. 5.

5. Основаніе листа прямое, быстро переходящее въ черешокъ.

C. urticum L.

Основаніе листа клиновидное. 6.

6. Листья лоснящіеся, б. ч. голые; доли околоцвѣтника на спинкѣ безъ кля. *C. rubrum* L.

Листья съ обѣихъ сторонъ или только на нижней покрыты б. или м. густымъ, муцистымъ налетомъ; доли околоцвѣтника на спинкѣ съ кляемъ. 7.

7. Листья съ верхней стороны темно-зеленые, съ нижней—покрыты густымъ, синеовато-бѣлымъ, муцистымъ налетомъ; на околоцвѣтничкѣ налета нѣтъ. *C. glaucum* L.

Листья б. ч. съ обѣихъ сторонъ и околоцвѣтникъ покрыты легкимъ муцистымъ налетомъ. *C. album* L.

329. *C. polyspermum* L. Пет. Кр. III, стр. 4. — Бух. II, № 348. — F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 166. — Кауф. II, № 636. — Цан., № 1186. — Кауф. I, стр. 414. — Lind., p. 154. — Ann. C. III, № 248. — Дв., № 274. — Макс., № 261. — Hoff. H., № 2010. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 48. — Hoff., № 853. — St. II, p. 17. — St. I, № 167.

Chenopodium album L. β . *viride* Kauffm. Бух. I, № 329. Сообщ. А. Н. Петунниковымъ.

Стебель 15—50 см., съ 4 слабыми ребрами, прямо-стоящій, простой или сильно вѣтвистый, часто съ лежащими на землѣ вѣтвями, голый, какъ и все растеніе; листья черешковые, цѣлюкрайніе, съ округлой или слегка заостренной верхушкой, нижніе—яйцевидные, верхніе—продолговатые или ланцетные; цвѣты въ развѣсистыхъ полузонтикахъ или въ простыхъ колосовидныхъ метелкахъ, пазушныхъ и конечныхъ; плодоносная чашечка раскрытая, не охватываетъ плода; сѣмена красно-бурые или почти черныя, лоснящіеся.

По огородамъ, дорогамъ и близъ жилья, часто. Цвѣтетъ съ іюля. Братцово, Свиблово (К.).—Лужники на Москвѣ-р. (П.).—В. Мытищи (С.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).



Chenopodium polyspermum.

- α . *cymosum* Chev. Пет. Кр. III, стр. 4.

Chenopodium polyspermum L. α . *cymoso-racemosum* Koch. Кауф. II, стр. 430.—Кауф. I, стр. 145.

Цвѣты въ развѣистой полузонтичной метелкѣ.

- β . *acutifolium* Sm. Пет. Кр. III, стр. 4.—Кауф. II, стр. 430.—Кауф. I, стр. 145.

Chenopodium polyspermum L. β . *spicato-racemosum* Koch.

Цвѣты въ короткихъ колосовидныхъ соцвѣтіяхъ.

330. *C. hybridum* L. Пет. Кр. III, стр. 4.—Пет., стр. 166.—Кауф. II, № 638.—Цин., № 1192.—Кауф. I, стр. 415.—Дв., № 269.—Макс., № 257 Gold. C., p. 18.—Mart., p. 48.—Hoff., № 850.—St. II, p. 17.—Pal., № 492.

Стебель 30—100 см., вѣтвистый, прямостоящій, ребристый, голый; листья на длинныхъ черешкахъ, голые, сверху темно-зеленые, снизу свѣтлѣе, овально-яйцевидные, округло-выемчатые, по краямъ съ 2—4 крупными зубцами; основаніе листьевъ слегка сердцевидное, верхушка сильно вытянуто-заостренная; верхніе листья часто почти ланцетные, цѣльнокрайніе; цвѣты въ полусонтикахъ, расположенныхъ конечною метелкою или кистью, или же въ пазухахъ верхнихъ листьевъ; околоцвѣтникъ въ молодости съ мучнистымъ налетомъ, при плодахъ замкнутый, доли его округлая, съ широкимъ, бѣлымъ или желтымъ краемъ; сѣмена крупные, черныя, тускляя, поверхность ихъ ячеистая.

Какъ сорное по огородамъ и по гористымъ мѣстамъ. Цвѣтетъ съ іюня. Мос. Бот. Садъ (Гольдбахъ).—Москва по р. Яузѣ (Ш.).—Близъ Богородскаго, Мос. у. (П. и С.).—Боровскій курганъ, Брн. у. (С.).—Карачеево и Протопоново, Кал. у.; Лужняки (П.).—Подъ Серпуховымъ (М.).—Салтыковка (Куль.).



Chenopodium hybridum.



Chenopodium urbicum.

331. *C. urbicum* L. Пет. Кр. III, стр. 4.—Пет., стр. 166.—Кауф. II, № 637.—Цин., № 1190.—Кауф. I, стр. 415.—Lind., p. 154.—Дв., № 265.—Макс., № 252.—Hoff. H., № 2015.—Mart., p. 47.—Hoff., № 857.—St. II, p. 17.—St. I, № 161.—Pal., № 487.

Стебель 30—70 см., прямостоящій, вѣтвистый, особенно въ нижней части, голый, ребристо-бороздчатый; листья на черешкахъ, треугольные, основаніе ихъ прямое, быстро переходитъ въ черешокъ, края зубчатые или выемчато-зубчатые, верхняя сторона лоснящаяся; цвѣты въ метельчатыхъ соцвѣтіяхъ, верхушечныхъ или пазушныхъ; околоцвѣтникъ при

плодахъ сомкнутыхъ: сѣмена лоснящіяся, черныя, съ гладкой поверхностью.

Сорное, по огородамъ, очень рѣдко. Цвѣтеть съ іюля.

α. vulgare Ledeb. Пет. Кр. III, стр. 4.—Кауф. II, стр. 430.—Кауф. I, стр. 415.

Край листьевъ зубчатые съ короткими треугольными зубцами.

Находится въ гербаріяхъ Анпенкова, Кауфмана и Гофмана. Подъ Серпуховымъ (М.).

332. *C. album L.* Пет. Кр. III, стр. 3.—Пет., стр. 166.—Кауф. II, № 635.—Цив., № 1188.—Кауф. I, стр. 414.—Lind., p. 154.—Ann. C. III, № 247.—Дв., № 268.—Макс., № 255.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 47.—St. I, № 163.—Pal., № 490.

Стебель 15—90 см., прямостоящій, бороздчатый, б. ч. съ обильными, вверхъ торчащими вѣтвями; все растеніе б. ч. съ бѣлымъ, мучнистымъ налетомъ; листья на длинныхъ черешкахъ; нижніе и средніе—удлиненно-ромбическіе, у основанія цѣлюкрайніе, клиновидные, по краямъ неравно-выемчато-зубчатые; верхніе—почти ланцетные, цѣлюкрайніе; цвѣты въ клубочкахъ сложнымъ колосомъ; доли околоцвѣтника съ килемъ на спинкѣ; сѣмена съ тупымъ краемъ, лоснящіяся.

Сорное, очень часто. Цвѣтеть съ іюня до осени.



Chenopodium album α. typicum.



Chenopodium album β. viride.

α. typicum Kauffm. Бух. II, № 347.—F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, стр. 429.—Кауф. I, стр. 414.

Все растеніе покрыто бѣлымъ налетомъ; клубочки въ ложномъ колосѣ или въ пирамидальной метелкѣ; нижніе и средніе листья по краямъ зубчатые.

β. viride L. Пет. Кр. III, стр. 3.—F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, стр. 429.—Кауф. I, стр. 414.

Chenopodium viride L. Дв., № 271.—Макс., № 256.—Hoff. H., № 2016.—Mart., p. 47.—Hoff., № 856.—St. II, p. 17.—St. I, № 164.—Pal., № 491.

Все растение зеленое, почти безъ налета; всѣ листья почти цѣльно-крайніе или нижніе съ очень рѣдкими неясными зубцами; клубочки въ развѣсистыхъ, почти щитковидныхъ метелкахъ.

7. *Goldbáchi* Kauffm. Пет. Кр. III, стр. 3.—Кауф. II, стр. 429.—Кауф. I, стр. 414. *Chenopodium album* L. non *C. Vulvaria* L. Gold. Sp., p. 123.

Листья, за исключеніемъ самыхъ нижнихъ, совершенно цѣльно-крайніе, продолговато-ланцетные, при основаніи почти овальные, почти зеленые; цвѣточные клубочки вонючіе, расположены какъ у *C. typicum*.

Найдено Гольдбахомъ на дворѣ Практической Академіи въ Москвѣ.

333. *C. glaucum* L. Пет. Кр. III, стр. 5.—Пет., стр. 167.—Цин., № 1189.—Дв., № 270.—Макс., № 259.—Hoff. Н., № 2001.—Gold. С., p. 18.—Mart., p. 48.—St. II, p. 17.—St. I, № 165.

Blitum glaucum Koch. Бух. II, № 349.—Бух. I, № 330.—F. O., № 7 p. 102.—Кауф. II, № 643.—Кауф. I, стр. 418.

Стебель 10—60 см., прямостоящій, приподнимающійся или почти лежачій, б. ч. вѣтвистый, бороздчатый, голый; листья сверху темно-зеленые, снизу покрыты густымъ, спеловато-бѣлымъ мучнистымъ налетомъ, продолговатые, съ клиновиднымъ основаніемъ, по краямъ выемчато-зубчатые, зубцы и верхушка листьевъ б. ч. тупые; цвѣты клубочками въ прерывчатыхъ, конечныхъ и пазушныхъ колосьяхъ, не превышающихъ длину листа; околоцвѣтникъ 2—5-раздѣльный, тычинокъ 1—5; доли околоцвѣтника округлыя, съ килемъ на спинкѣ; сѣмя черно-бурое, гладкое, б. ч. сидитъ горизонтально, но встрѣчаются сѣмена, сидяція и вертикально.



Chenopodium glaucum.

Сорное, по дорогамъ и огородамъ, любитъ торфяную почву. Цвѣтетъ со середины іюля. Мытищи, Звягино на Клязьмѣ (С.).—Лужняки, Мос. у., Воробьевы горы (П.).—Михайловское, Илл. у. (Б.).

- α. *prostratum* Beck. Стебель расprostертый и прижатый къ землѣ; часто листья почти цѣльнокрайніе. По сырому песку берега Оки близъ Бѣлопесочной слободы, Срп. у. (X.).

334. *C. rubrum* L. Пет. Кр. III, стр. 5.—Мос., № 32.—Пет., стр. 167.—Дв., № 266.—Макс., № 253.—Hoff. Н., № 2012.—Gold. С., p. 18.—Mart., p. 47.—Pal., № 488.

Blitum rubrum Rehb. F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, № 642.—Кауф. I, стр. 418.—Lind., p. 154.—Ann. C. V, № 49.

Blitum polymorphum C. A. Mey. Цин., № 1196.

Blitum chenopodioides. Ad., p. 3.

Стебель 30—80 см., прямостоящій, рѣже приподнимающійся, вѣтвистый, угловато-бороздчатый; листья на черешкахъ, нѣсколько мясистые, голые, лоснящіеся, треугольные или ромбическіе, съ клиновиднымъ основаніемъ и съ выемчато-зубчатыми краями; верхушечные листья часто

ланцетные; клубочки въ густыхъ, превывчатыхъ, вверхъ торчащихъ на-
зущныхъ колосьяхъ; околоцвѣтникъ верхушечныхъ цвѣтовъ 5-пой, съ 5
тычинками, боковые цвѣты б. ч. съ 2—3-раздѣльнымъ околоцвѣтникомъ
и 1—2 тычинками; доли околоцвѣтника овальныя, на спинкѣ безъ кили;
сѣмя черное, гладкое, лопнящееся, б. ч. вертикальное.

Сорное по огородамъ и близъ жилья, очень часто. Цвѣтетъ съ іюля.

2. *foliolosum* Wallr. (Wallr. Sched. crit. p. 507.—Sched. ad. Herb. Fl. Ross. № 1589).

Стебель торчащій, съ вѣтвями въ каждой пазухѣ листа; вѣтви
густо покрыты листьями, къ верхушкѣ стебля постепенно укора-
чиваются, почему растеніе имѣетъ пирамидальную форму; листья
б. ч. очень глубоко выемчато-зубчатые. Мытищи. (С.).



Chenopodium rubrum.



Chenopodium foliosum.

335. *C. foliosum* (Moench) Aschers.

Blitum virgatum L. Пет. Кр. III, стр. 5.—Пет., стр. 148.—Кауф. II, № 640.—
Цня., № 1194.—Кауф. I, стр. 417.—Дв.,
№ 4.—Макс., № 2.—Hoff. II, № 38.—
Gold. C., p. 17.—Mart., p. 4.—Hoff.,
№ 511. Ad., p. 3.—St. II, p. 3.—St. I,
№ 4.—Pal., № 12.

Стебель 30—70 см., прямостоящій, голый, б. ч. вѣтвистый, съ длин-
ными, вытянутыми вѣтвями; листья на черешкахъ, продолговато-треуголь-
ные, иногда почти копьевидные, съ почти прямымъ основаніемъ, быстро
переходящимъ въ черешокъ, края крупно-и остро-выемчато-зубчатые; цвѣ-
точные клубочки въ пазухахъ почти всѣхъ листьевъ, сперва желто-зеле-
ные, потомъ ярко-красные; околоцвѣтникъ 3-раздѣльный, съ одной тычин-
кой, при созрѣваніи плода становится мясистымъ, краснымъ; сѣмя сплюс-
нутое, съ острымъ краемъ.

Сорное, не часто. Цвѣтетъ съ іюня. Александровскій садъ въ Москвѣ
(К.).—С. Анненское, Бгр. у. (Гум.).—Воробьевы горы (Адамсъ).—Карап-
чевое, Кзм. у.; за Калужской заставой близъ Мамоновой дачи (П.).—
Близъ Серпухова (Герб. Петр. Акад., соб. П. А. Грузиновъ).

336. *C. bonus* Henricus L.

Chenopodium Bonus Henricus L. Пет. Кр. III, стр. 5.—Пет., стр. 166.—Дв., № 264.—Макс., № 251.—Нoff. II., № 1991.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 47.—Hoff., № 848.—St. II, p. 17.—St. I, № 160.—Pal., № 486.

Blitum Bonus Henricus C. A. Mey. Ф. Б., № 81.—Кауф. II, № 641.—Цин., № 1197.—Кауф. I, стр. 417.—Lind., p. 154.—Ann., C. IV, № 44.

Стебель 20—60 см., прямостоящий или у основанія приподнимающийся, бороздчатый, часто вѣтвистый, съ мучнистымъ налетомъ; листья на длинныхъ черешкахъ, треугольно-копьевидные, цѣльно-крайніе или часто съ слегка волнистыми краями, сверху темно-зеленые, снизу свѣтлѣе, покрыты мучнистымъ налетомъ по всей поверхности или вдоль сильно выдающихся жилокъ; клубочки въ колосьяхъ, собранныхъ на концѣ стебля въ голую или только у основанія облиственную метелку; околоцвѣтникъ 5-раздѣльный, съ 5 тычинками; боковые цвѣты иногда съ 3—4-раздѣльнымъ околоцвѣтникомъ и 2—3 тычинками; доли околоцвѣтника обратно-яйцевидныя, коротко-заостренныя; завязь не длиннѣе околоцвѣтника, съ короткимъ столбикомъ и съ 2 очень длинными рыльцами; сѣмена вертикальныя выдаются изъ околоцвѣтника.



Chenopodium bonus Henricus

Около жилья и по дорогамъ. Цвѣтетъ съ іюля. Ботаническій садъ, Военный госпиталь, Свиблѣво (К.).—Петровское-Лобаново (И.).—Мытщи — Лосинный Островъ у сторожки (С.).

* *Spinacia* L.

Цвѣты двудомныя; женскіе — съ 2—4-зубчатымъ околоцвѣтникомъ, 2 супротивныхъ его зуба сростаются, отвердѣвають и облекаютъ плодъ; рылецъ 4—5, очень длинныхъ, нитевидныхъ; мужскіе цвѣты 4—5-раздѣльные, съ 4—5 тычинками, прикрученными къ ложу; сѣмя вертикальное.

* *S. oleracea* L. Пет., стр. 284.—Цин., стр. 366.—Hoff. II., № 7732.—St. II, p. 55.—Pal., № 2122.

Стебель 20—80 см., прямостоящий, простой или вѣтвистый; все растеніе голое или покрыто слабымъ мучнистымъ налетомъ; листья на черешкахъ продолговато-яйцевидные или треугольно-яйцевидные, заостренные, цѣльнокрайніе или зубчатые; мужскіе цвѣты клубочками въ пазухахъ листьевъ или въ конечныхъ, рѣдкихъ, облиственныхъ колосьяхъ; женскіе — только въ пазухахъ листьевъ. Разводится на огородахъ.

α. *inermis* Moench (sp.).

Spinacia inermis Moench. Пет., стр. 284.—Кауф. II, стр. 434.—Кауф. I, стр. 419.

Верхніе листья продолговатые, при основаніи клиновидные; около-

цвѣтникъ вокругъ плода округлый, почти шаровидный, съ зубцами не колючими.



Spinacia oleracea var. *inermis*.



Spinacia oleracea var. *spinosa*.

β. *spinosa* Moench (sp.).

Spinacia spinosa Moench. Пет., стр. 284.—Кауф. II, стр. 434.—Кауф. I, стр. 419. Верхніе листья треугольные, у основанія копьевидные или съ 1—2 зубцами съ каждой стороны; околоцвѣтникъ вокругъ плода почти 3-гранный, съ 2—4 оттопыренными, твердыми шипиками.

121. *Аtriplex* L.

Растенія однодомныя; цвѣты однополые, рѣже между однополыми встрѣчаются обоеполые; женскіе цвѣты безъ околоцвѣтника, но съ 2 ромбическими прицвѣтниками (предлистьями), но отцвѣтаніи разрастающимися, рѣже нѣкоторые женскіе цвѣты съ околоцвѣтникомъ, какъ у мужскихъ; у послѣднихъ околоцвѣтникъ 3—5-раздѣльный, съ 3—5 тычинками; пестикъ съ 2 нитевидными, не длинными рыльцами; сѣмя вертикальное, у обоеполыхъ цвѣтовъ—горизонтальное.

1. Предлистья у плодовъ яйцевидныя или округло-яйцевидныя, съ сѣтчатыми жилками. 2.

Предлистья у плодовъ копьевидно-ромбическія или ромбическія. 3.

2. Взрослые листья сверху лоснящіеся, снизу съ густымъ, сѣрымъ или бѣлымъ налетомъ. *A. nitens* Schkuhr.

Взрослые листья съ обѣихъ сторонъ почти одноцвѣтныя, тусклые, снизу безъ бѣлаго налета. *A. hortense* L.

3. Предлистья сраслись только основаніемъ. 4.

Предлистья сраслись до половины. *A. laciniatum* L.

4. Нижніе листья треугольно-копьевидные, съ основаніемъ почти прямо-срѣзаннымъ. *A. hastatum* L.


Нижніе листья ромбическіе или треугольно-ромбическіе, основаніе ихъ клиновидное. *A. patulum* L.

337. *A. hortense* L. Пет. Кр. III, стр. 6.—Пет., стр. 144.—Кауф. II, № 644.—Цип., № 1200.—Кауф. I, стр. 420.—Lind., p. 156.—Дв., № 275.—Макс., № 262.—Hoff. II., № 7896.—Mart., p. 46.—St. II, p. 56.—Pal., № 2167.

Стебель 50—150 см., прямостоящий, бороздчатый, часто съ самого низу вѣтвистый, такъ что все растеніе принимаетъ пирамидальную форму; листья тусклые, съ обѣихъ сторонъ почти одноцвѣтные, молодые — съ мучнистымъ налетомъ; нижніе—треугольные или треугольно-кошечковидные, верхушка листа туповатая, не вытянутая, края листьевъ выемчато-короткозубчатые съ острыми зубцами; верхніе листья продолговато-треугольные, часто цѣлюкрайніе; соцвѣтіе—пирамидальная конечная метелка; предлистья у плодовъ округло-овальные, быстро коротко-заостренные, перепончатая, цѣлюкрайнія съ сѣтчатыми жилками.

Изрѣдка, какъ сорное, занесенное. Цвѣтетъ съ половиною іюля.

Гольдбахъ нашелъ у Прѣсенскихъ и Патріаршихъ прудовъ. Находится въ гербаріи Анненкова. Мытищи (С.).—Быково, Брн. у. у станціи (Куль.).



Atriplex hortense.



Atriplex nitens

338. *A. nitens* Schkuhr.

Atriplex nitens Rebert. Ф. Б., № 82.—Пет., стр. 144.—Кауф. II, № 645.—Цип., № 1199.—Рупр., стр. 89.—Кауф. I, стр. 420.—Hoff. II., № 7900.

Atriplex acuminata W. K. Gold. С., p. 18.

Стебель прямостоящий, до 1.5 м. мало вѣтвистый, въ верхней части бороздчатый; листья на черешкахъ, съ верхней стороны зеленые, лоснящіеся, съ нижней—даже взрослые съ густымъ бѣлымъ налетомъ, широко-треугольные, часто почти стрѣловидные, по краямъ выемчато-неравнозубчатые съ тупыми зубцами; верхушка листа вытянутая, цѣлюкрайняя; цвѣточные клубочки образуютъ колосья, расположенные пирамидальной

метелкой; предлистья у плодовъ обратно-яйцевидныя. съ заостренной верхушкой. цѣльнокрайнія, перепончатые. съ сѣтчатыми жилками.

По склонамъ и известнякамъ. Цвѣтетъ съ конца іюля. Симоновъ монастырь; Мицково. Брн. у. Серпуховъ (К.).—Коломенское (Гольдбахъ).—Топасня, у ж. д. моста, Срп. у. (П.).—Между Борисовымъ и Лужками. Срп. у. (С.).—Бѣлонесочская слобода. Срп. у. (Х.).—Быково. Брн. у. (Куль.).

339. *A. patulum* L. Бух. II, № 350.—Бух. I, № 328.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 144.—Кауф. II, № 646.—Цин., № 1205.—Кауф. I, стр. 421.

Atriplex patula L. Ann. C. IV, № 45.—Дв., № 277.—Макс., № 264.—Hoff. H. № 7902.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 46.—Hoff., № 441.—St. II, p. 56.—St. I, № 169.—Pal., № 2169.

Стебель 30—100 см., прямостоящій. сильно-вѣтвистый съ отстоящими вѣтвями. нижними—подъ прямымъ угломъ; нижніе листья на длинныхъ черешкахъ, ромбическіе или широко-ланцетные, съ цѣльнокрайнимъ, клиновиднымъ основаніемъ, края съ однимъ или нѣсколькими зубцами, нижній зубецъ самый крупный и обращенъ впередъ; верхушка листа вытянутая, цѣльнокрайняя; средніе и верхніе листья ланцетные или линейно-ланцетные, цѣльнокрайніе; цвѣточныя клубочки образуютъ сложные, прерывчатые, конечные и пазушные колосы; предлистья у плодовъ копьевидно-ромбическія, цѣльнокрайнія или слегка зубчатые, съ клиновиднымъ основаніемъ, поверхность ихъ гладкая или съ травянистыми зубчиками.



Atriplex patulum.

Сорное, по дорогамъ, у станцій ж. д. и по бесплоднымъ мѣстамъ. Цвѣтетъ со середины іюля. Михайловское, Пдл. у. (Б.).—У ст. Мытищи М.-Яр. ж. д., Рупосово. Мос. у. (С.).—Лужняки на Москвѣ р. (П.).

340. *A. hastatum* L. Пет. Кр. III, стр. 6.—Пет., стр. 144.—Цин., № 1204.

Atriplex hastata L. Дв., № 276.—Макс., № 263.—Hoff. H., № 7895.—Mart., p. 46. Hoff., № 434.—St. II, p. 56.—St. I, № 170.—Pal., № 2170.

Atriplex latifolium Wahlenb. Кауф. II, № 647.—Кауф. I, стр. 421.

Стебель прямостоящій, вѣтвистый. бороздчатый. до 1 м.; нижніе листья треугольно-копьевидные, на длинныхъ черешкахъ, основаніе ихъ почти прямо усѣченное. по краямъ б. ч. зубчатые. часто супротивные. остальные—очередные; верхушечные—ланцетные. почти сидячіе, цѣльнокрайніе; цвѣты клубочками въ конечныхъ и пазушныхъ. прерывчатыхъ колоскахъ. въ одномъ и томъ же колосѣ находятся мужскіе и женскіе цвѣты; предлистья у плодовъ треугольныя. цѣльнокрайнія или съ 1—3 зубчиками съ ка-

ждой стороны; поверхность ихъ гладкая или бугорчатая, иногда покрыта мучнистымъ налетомъ.

По склонамъ, чаще у воды. Цвѣтеть со средины юля. Склонъ къ р. Яузѣ у Военнаго госпиталя (К.).—Виданіа—близъ Сергіевского посада, по берегу пруда. Дмит. у. (С.).—Лужняки, Мос. у., огороды (П.).



Atriplex hastatum



Atriplex laciniatum

341. *A. laciniatum* L. Кауф. II, стр. 437.

Atriplex laciniata L. Пет. Кр. III, стр. 6.—Кауф. I, стр. 422.—Нoff., № 440.—St. I, № 168.—Pal., № 2168.

Стебель до 80 см., очень вѣтвистый, примостоящій или приподнимающійся; нижнія вѣтви часто лежатъ на землѣ; все растеніе сизое или сѣрое, особенно въ молодости, отъ покрывающихъ его чешуекъ, ко времени плодоношенія чешуйки частью осыпаются, и тогда растеніе принимаетъ желто-зеленый цвѣтъ; листья треугольно-копьевидные, неравно- и глубоко-выемчато-зубчатые, зубцы б. ч. тупые, нижніе—крупнѣе и часто отогнуты книзу; верхушечные листья б. ч. ланцетные, цѣлюнокрайніе; цвѣты клубочками въ длинныхъ, сперва густыхъ, потомъ нѣсколько прерывчатыхъ конечныхъ колосьяхъ, собранныхъ метелкой; колосья безъ листьевъ, иногда листья только у основанія; предлистья у плодовъ ромбическія, до половины сросшіяся; наружные края ихъ цѣлюнокрайніе или зубчатые, иногда верхушка ихъ вытянута; наружная половина предлистьевъ съ сильно-выдающимися жилками и бугорчатая, рѣже гладкая.

Сорное, рѣдко. Найдено въ большомъ числѣ экземпляровъ близъ ст. Быково М.-Ряз. ж. д., Брн. у., съ первыми цвѣтами 29 юля (С.). Тамъ же (Куль.).

122. *Corispermum* L.

Цвѣты безъ околоцвѣтника или онъ состоитъ изъ 1—5 маленькихъ, прозрачныхъ пленокъ; каждый цвѣтокъ прикрытъ прицвѣтникомъ; тычинокъ 1—2, рѣже у нижнихъ цвѣтовъ до 5; завязь съ 2 нитевидными


столбиками; плодъ круглый, съ внутренней стороны плоскій, съ наружной-выпуклый, часто крылатый; сѣмя вертикальное, сросшееся съ хрящеватымъ околоцвѣтникомъ.

342. *C. intermédium* Schweigg. Пет. Кр. III, стр. 6.—Кауф. II, № 633.—Гор., № 69.

Corispermum hyssopifolium Juss. Пет., стр. 171.—Pal., № 10.

Стебель 15—80 см., сильно-вѣтвистый, покрытъ, какъ и все растеніе, б. или м. густо, звѣздчатыми волосками; листья линейные, съ тонкимъ, мягкимъ остриемъ; верхніе прицвѣтники съ очень широкимъ, бѣлымъ пленчатымъ краемъ; околоцвѣтника нѣтъ; плодъ почти круглый, 3—4 мм. дл., съ ровнымъ, узкимъ, перепончатымъ ободкомъ, на верхушкѣ безъ выемки, но съ 2 короткими остриями.

По песчанымъ мѣстамъ. Цвѣтетъ съ начала августа. Между Серпуховымъ и Лужками (К.).—Близъ Никифорова, Срп. у. (Г.).—Ст. Ока п у ст. Лопаси М.-Кур. ж. д. Срп. у. (Н.).—Лужники, Срп. у. (П. и Х.).—Въ Кал. у. (Мил.).



Corispermum intermedium.



Corispermum Marschallii.

343. *C. Marschallii* Stev. Пет. Кр. III, стр. 7.—Пет., стр. 171.—Кауф. II, № 632.—Гор., № 70.—Цин., № 1224.


Корень однолѣтний, тонкій, вертикальный; стебель 15—60 см., сильно вѣтвистый, съ дугообразно отходящими вѣтвями, покрытъ въ нижней части слабо, къ верхушкѣ болѣе густо, звѣздчатыми волосками; листья сидячіе, линейные или широко-линейные, заостренные въ очень короткій, мягкій копчикъ, голые или рѣдко-волосистые, нѣсколько мясистые, съ узкимъ бѣлымъ краемъ; прицвѣтники нижнихъ цвѣтовъ похожи на листья, къ верхушкѣ стебля постепенно укорачиваются, становятся шире къ основанію и съ краями широко-перепончатыми; околоцвѣтника нѣтъ; плодъ овальный, до 4 мм. дл., съ широкимъ перепончатымъ ободкомъ, по краю слегка волнисто-зубчатымъ, на верхушкѣ съ выемкой, въ срединѣ которой два остроконечія.

На песчаной почвѣ. Цвѣтетъ съ начала августа. Подъ Серпуховымъ (Вар.).—Ст. Ока, Срп. у. (С.).—Перерва на Москвѣ р.; песчаный островъ противъ Бачманова, Кзм. у.; за Лужками, Срп. у. (П.).—Бѣлопесочная слобода, Срп. у. (П. и Х.).—Быково, берегъ Москвы р., Брн. у. (Куль.).

123. *Salsola* L.

Цвѣты обоеполые, однопочные, рѣже по 2—3 въ пазухахъ верхушечныхъ листьевъ, образуютъ колосовидное соцвѣтіе; каждый цвѣтокъ съ 2 прицвѣтниками (предлѣстьями); околоцвѣтникъ неравно-5-раздѣльный, основаніе его хрящеватое, края перепончатые, доли его послѣ цвѣтенія съ перепончатыми крыловидными придатками; тычинокъ 5, прикрѣпленныхъ къ кольцообразному подпестичному диску; столбикъ едва замѣтный, съ 2 длинными шнелевидными рыльцами; плодъ нѣсколько сжатъ сверху; сѣмя горизонтальное, безъ бѣлка; зародышъ свернуть по винтовой спиралѣ.

344. *S. Káli* L. Пет. Кр. III, стр. 7.—Pal., № 503.



Salsola Kali.

Стебель прямостоящій или лежащій, у насъ до 1 м., вѣтвистый, гладкій или шероховатый; листья шиловидные, оканчиваются бѣловатой колючкой, съ верхней стороны плоскіе, съ нижней—выпуклые, нѣсколько мясистые, съ бѣловатымъ, почти перепончатымъ краемъ и свѣтлой срединной жилкой; цвѣты пазушные, по 1—3, съ 2 прицвѣтниками; околоцвѣтникъ при плодахъ вверху перепончатый, внизу нѣсколько хрящеватый.

Б. Мытищи по полотну ж. д. и на заводѣ Челноковыхъ, въ цвѣту съ половины іюля (С.).—Петровское-Разумовское (Шр.).

35 сем. *Amarantáceae* Juss.

Цвѣты съ прицвѣтниками; околоцвѣтникъ 3—5-раздѣльный, сухой пленчатый, такъ же какъ и прицвѣтники, остается при плодѣ; тычинки прикрѣплены противъ долей околоцвѣтника и число ихъ равно числу его долей; завязь верхняя, одногнѣздная; рылецъ 2—3, сидячихъ; плодъ сухой, односѣменный, раскрывающійся поперекъ крышечкой или не раскрывающійся; сѣмя лоснящееся, съ окружнымъ кольцевымъ зародышемъ и съ срединнымъ мучнистымъ бѣлкомъ.

124. *Amarántus* L.

Околоцвѣтникъ 5-раздѣльный, рѣдко 3-раздѣльный; плодъ односѣменный, раскрывается поперекъ крышечкой.

345. *A. retrofléxus* L. Пет. Кр. III, стр. 1.—Бух. II, № 346.—Ф. О., № 7, p. 102.—
Пет., стр. 135.—Кауф. II, № 631.—Цин., № 1183.—Кауф.
I, стр. 411.—Lind., p. 154.—Макс., № 881.

Стебель 10—80 см., прямостоящій, простой или вѣтвистый, покрытъ, какъ и черешки листьевъ, простыми или курчавыми волосами; листья на длинныхъ черешкахъ, яйцевидные или ромбическіе, на концѣ тупые, быстро переходятъ въ очень маленькое остріе; конечныя и пазушныя, густыя метельчатые соцветія состоятъ изъ клубочковъ зеленыхъ цвѣтовъ; прицвѣтники щетинисто-остистые, зеленые, съ бѣлымъ краемъ, вдвое длиннѣе околоцвѣтника; 5 листочковъ послѣдняго острые, бѣлые, съ зеленой полоской на спинкѣ; плодъ яйцевидный, попереку растрескивающийся, односѣменный.

Сорное, по посѣвамъ и близъ жилья. Цвѣтетъ со середины іюля. Мытищи (С.).—Вачманово, Кзм. у.; огородъ подѣ Москвой у Данилова монастыря, у Симонова монастыря, Сокольники (П.).—Огородъ у Сѣкирина, Пдл. у. (В.).



Amarantus retroflexus

125. *Albérсія* Kunth.

Околоцвѣтникъ 3-раздѣльный, рѣже 5-раздѣльный; плодъ односѣменный, не раскрывающійся.

346. *A. Blitum* Kunth. Пет. Кр. III, стр. 1.

Amaranthus Blitum L. Пет., стр. 135.—Кауф. II, № 630.—Цин., № 1184.—
Кауф. I, стр. 411.—Lind., p. 154.—Дв., № 883.—Макс.,
№ 880.—Gold. C., p. 23.—Mart., p. 169.—Hoff., № 146.—
St. II, p. 53.—St. I, № 654.—Pal., № 2045.

Стебель 20—60 см., сильно-вѣтвистый, лежачій, распростертый или приподнимающійся, голый, какъ и все растеніе; листья яйцевидные, переходятъ въ очень длинный черешокъ, на концѣ тупые, округлые или съ довольно глубокой выемкой; клубочки цвѣтовъ густые, въ пазухахъ листьевъ или образуютъ конечный, нѣсколько прерванный колосъ; прицвѣтники треугольные, ланцетные, безъ остей, короче околоцвѣтника, состоящаго б. ч. изъ 3 ланцетныхъ, туповатыхъ или слегка заостренныхъ листочковъ; плодъ яйцевидный.

По огородамъ и садамъ. Цвѣтетъ съ половины іюля.



Albersia blitum.

36 сем. *Portulacáceae* Juss.

Цвѣты не совѣтъ правильные; чашечка 2-надрѣзная, остающаяся; вѣнчикъ ворончатый, раскрытый вдоль на одной сторонѣ, 5-надрѣзной, съ 2 крупными и 3 менѣ крупными долями; тычинокъ 3, прикрѣпленныхъ къ 3 меньшимъ долямъ вѣнчика; столбикъ очень короткій, съ 3 рыльцами; завязь верхняя; коробочка 3-створчатая, 2—3-сѣменная; сѣмя съ бѣлкомъ и согнутымъ зародышемъ.

126. *Montia* L.

347. *M. rivuláris* Gmel. Пет. Кр. I, стр. 169.—Пет., стр. 225.—Кауф. II, № 282.—Мил., № 13.—Цин., № 537.—Кауф. I, стр. 172.

Montia fontana L. β . *erecta* Pers. Макс., № 45.

Montia fontana L. Hoff. H., № 906.—Gold. C., p. 18.—Gold. Sp., p. 121.

Montia fontana L. *minor* Gmel. Hoff. H., № 906.



Montia rivularis.

Маленькое, голое, слегка мясистое растеніе до 20 см.; стебли лежачіе, потомъ приподнимающіеся, вильчато-развѣтвленные, укореняющіеся; нижніе листья лопатчатые, суженные въ черешокъ, верхніе—линейно-продолговатые, всѣ супротивные; цвѣты въ малоцвѣтковыхъ, б. ч. пазушныхъ и конечныхъ полузонтикахъ, до и послѣ цвѣтенія загнутые книзу, очень мелкіе, бѣлые; чашелистики широко-яйцевидные, тупые; сѣмена черныя, мелко-точечныя, лоснящіяся.

По болотамъ. Цвѣтетъ съ первыхъ чиселъ іюня. Близъ Перова, не далеко отъ Измайловскаго звѣринца (Гольдбахъ).—Въ гербаріи Анненкова.—У села Богородскаго, Мос. у. (М.).—Близъ Боровскаго кургана, Брн. у. (П. и С.).—Пушкино—болото р. Учи у полотна ж. д. (С.).—Быково, берегъ р. Македонки (Куль.).

37 сем. *Caryophylláceae* Rehb.

Цвѣты съ верхнею завязью, правильные, обоюполюые, рѣже однополюые; чашечка 4—5-листная или трубчатая, съ 4—5 зубцами, остается при плодѣ; вѣнчикъ 4—5-листный, свободнопестный; пестикъ изъ 2—3—4—5 плодолистиковъ; тычинокъ столько, сколько чашелистиковъ или вдвое болѣе; завязь одногнѣздная или съ 2—5 не полными гнѣздами; столбиковъ 2—5; плодъ—коробочка, вскрывающаяся на верхушкѣ створками или зубчиками, число коихъ равно числу плодолистиковъ или вдвое болѣе, или же плодъ—сѣмянка, еще рѣже ложная ягода; сѣмя безъ бѣлка или съ бѣлкомъ и съ окружнымъ или боковымъ зародышемъ. Травянистыя растенія съ супротивными простыми листьями, часто нѣсколько сросшимися во влагалище, съ прилистниками или безъ нихъ.

Обзоръ сем. Caryophyllaceae Rehb.

Подсемейство 1. Silenoidéae (DC.) A. Br.

Чашечка снйнолистная трубчатая, съ 5 зубцами или надрѣзами; лепестковъ 5, съ длиннымъ ноготкомъ; тычинокъ 10 или 5; пестикъ на 6. или м. длинной ножкѣ, къ которой прикрѣплены тычинки и лепестки; столбикомъ 2—3—5; коробочка вскрывается 4—6—10 зубчиками, одногвѣзная или до средины 2-5-гвѣзная, рѣже плодъ—ягода; листья безъ прилистниковъ.

I. Lychnidéae A. Br.

Вѣнички съ коронкой, т. е. съ чешуйками при переходѣ пластинки въ ноготокъ; завязь изъ 3—5 плодolistиковъ; зародышъ согнутый.

Cuscutalus, Silene, Viscaria, Melandryum, Lychnis, Agrostemma.

II. Dianthéae A. Br.

Вѣнички безъ коронки (исключая *Saponaria*); завязь изъ 2 плодolistиковъ; зародышъ согнутый или прямой.

Gypsophila, Dianthus, Saponaria, Vaccaria.

Подсемейство 2. Alsinoidéae Engl.

Чашечка 4—5-листная; лепестковъ 4—5, безъ ноготка или съ очень короткимъ ноготкомъ. иногда лепестковъ нѣтъ; тычинокъ 10—5 или 4, прикрѣпленныхъ къ подпестичному железистому диску; завязь безъ ножки, сидячая, одногвѣзная, многосѣменная; коробочка вскрывается зубчиками, число конхъ равно числу столбикомъ или вдвое болѣе.

III. Alsineae Fenzl.

Листья безъ прилистниковъ.

Sagina, Alsine, Moehringia, Arenaria, Stellaria, Cerastium, Malachium.

IV. Sperguléae Fenzl.

Листья съ пленчатыми прилистниками.

Spargula, Spargularia.

Подсемейство 3. Paronychioidéae (St.-Hil.) A. Br.

Чашечка 5-раздѣльная; вѣничка нѣтъ или онъ изъ 5 нитевидныхъ лепестковъ, прикрѣпленныхъ, какъ и 5 тычинокъ, къ подпестичному диску; плодъ сухой, односѣменный, заключенъ въ чашечку.

Herniaria.

Подсемейство 4. Scleranthoidéae Link.

Чашечка до половины 5-раздѣльная, колокольчатая, съ отвердѣвающей трубкой, отваливается вмѣстѣ съ плодомъ; вѣничка пѣтъ; тычинокъ 10 (изъ конхъ 5 безъ пыльниковъ), прикрѣпленныхъ къ кольцообразному диску въ звѣзъ околodвѣтника; плодъ—сѣмянкa.

Scleranthus.

Определитель родовъ.

1. Завязь или плодъ односѣменный. 2.
Завязь или плодъ многосѣменный; коробочка вскрывающаяся створками или зубчиками, или же плодъ—ложная ягода. 3.
2. Листья съ пленчатыми прилистниками. *Herniaria.*
Листья безъ прилистниковъ. *Scleranthus.*
3. Чашечка трубчатая или колокольчатая, зубчатая. 4.
Чашечка раздѣльнолистная. 14.
4. Столбиковъ два—три. 5.
Столбиковъ пять или цвѣты однополые. 11.
5. Чашечка коротко-колокольчатая; плодъ—ложная ягода. *Cucubalus.*
Чашечка цилиндрическая или нѣсколько вздутая; плодъ — коробочка, вскрывающаяся вверху зубчиками. 6.
6. Столбиковъ три. 7.
Столбиковъ два. 8.
7. Коробочка у основанія раздѣлена на 3—5 (7) неполныхъ гнѣздъ; вверху коробочка одногнѣздная. *Silene.*
Коробочка по всей своей длинѣ одногнѣздная. *Melandryum.*
8. Чашечка пятигранная, по отцвѣтаніи 5-крылая. *Vaccaria.*
Чашечка безъ граней. 9.
9. Цвѣты очень мелкіе; зубцы чашечки съ широкимъ, бѣлымъ пленчатымъ краемъ. *Gypsophila.*
Цвѣты б. или м. крупныя; чашечка безъ пленчатого края. 10.
10. Чашечка у основанія съ 1—3 парами остистыхъ чешуекъ или листиковъ; вѣнчикъ безъ коронки. *Dianthus.*
Чашечка безъ остистыхъ чешуекъ; вѣнчикъ б. ч. съ коронкой. *Saponaria.*
11. Лепестки цѣльные или слабо-выемчатые. 12.
Лепестки глубоко-2- или 4-раздѣльные. 13.
12. Цвѣты съ коронкой; зубцы чашечки короткіе. *Viscaria.*
Цвѣты безъ коронки; зубцы чашечки длинныя. *Agrostemma.*
13. Лепестки 4-раздѣльные, безъ коронки. *Lychnis.*
Лепестки 2-раздѣльные, съ коронкой. *Melandryum.*
14. Листья съ пленчатыми прилистниками. 15.
Листья безъ прилистниковъ. 16.
15. Цвѣты розовые; столбиковъ три. *Spergularia.*
Цвѣты бѣлые; столбиковъ пять. *Spergula.*
16. Столбиковъ обыкновенно три. 17.
Столбиковъ четыре или пять. 20.
17. Лепестки 2-раздѣльные. *Stellaria.*
Лепестки цѣльные или слабо-выемчатые. 18.
18. Тычиночныя нити наружнаго ряда у основанія съ 2 железками; коробочка вскрывается 3 створками. *Alsine.*

Тычиночныя нити безъ железокъ; коробочка вскрывается 6 зубчиками или створками. 19.

19. Коробочка вскрывается до половины 6 закручивающимися створками; сѣмена гладкія, съ придаткомъ. *Mochringia.*

Коробочка вскрывается 6 мелкими зубчиками; сѣмена бугорчатая, безъ придатка. *Arenaria.*

20. Лепестки цѣльные, иногда слабо-выемчатые. *Sagina.*

Лепестки двураздѣльные. 21.

21. Коробочка трубчатая, нѣсколько согнутая, вскрывается 10 зубчиками; листья мелкіе. *Cerastium.*

Коробочка прямая, расщепляется до половины на 5 створокъ, на верхушкѣ раздвоенныхъ; листья б. или м. крупныя; растеніе нѣсколько мясистое, ломкое. *Malachium.*

127. Cucúbalus L.

Чашечка коротко-колокольчатая, 5-надрѣзная, при плодахъ нѣсколько вздутая; лепестки постепенно суженные, языковидные, двулопастные; столбиковъ 3; плодъ въ видѣ шаровидной черной ягоды, подъ конецъ сухой; сѣмена почковидныя, лоснящіеся.

348. *C. báccifer* L. Пет. Кр. I, стр. 90.—Бух. II, № 77.—Ф. Б., № 14.—Бух. I, № 73.—Е. О., № 5, р. 70.—Пет., стр. 173.—Кауф. II, № 134.—Мил., № 5.—Цян., № 247.—Кауф. I, стр. 87.—Lind., p. 96.—Апп. С. III, № 209.—Дв., № 443.—Макс., № 414.

Silene baccifera Willd. Mart., p. 78.—St. II, p. 27.

Стебель длинный, 50—200 см., сильно вѣтвистый, лежачій или приподнимающійся; все растеніе покрыто короткими волосами; листья яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, заостренные, цѣльнокрайніе, нижніе и средніе—коротко-черешковые, верхніе—почти сидячіе; цвѣты въ двураздѣльномъ полузонтикѣ, повислые; лепестки узкіе, вверху надрѣзные, зеленовато-бѣлые, съ жилками; чашечка желто-зеленая, коротко-колокольчатая, съ яйцевидно-треугольными туповатыми зубцами; плодъ шаровидный, лоснящійся, походить на ягоду.

Въ кустарникахъ, по берегамъ рѣкъ. Цвѣтетъ съ первыхъ чиселъ іюля. Гаврилково близъ мельницы (Г. С.).—Близъ Симонова монастыря (Ш.).—Близъ Семенова, Мож. у. (М.).—Воробьевы горы (Мил.).—



Cucubalus baccifer.

Кувцово (Ассы).—По берегу р. Клязьмы близъ Черкизова и Соколова (С.).—
 Съкирино—берегъ р. Пахры, Пдл. у. (Б.).—С. Тесово—берегъ Москвы р.,
 Мож. у. (Мос.).—Лужки, Срп. у. (Сюз.).—За Зибровымъ, Срп. у. (П.).—
 Новоселки близъ Лопасни, Срп. у. (П.).—Лужники, Срп. у. (Ф.).—Погость
 Кортно по берегу Москвы р., Руз. у. (Г. О.).

128. *Silène L.*

Цвѣты обоополые, рѣже однополые; чашечка трубчатая, 5-зубчатая;
 лепестковъ 5, вытянутыхъ въ длинный ноготокъ, иногда съ коронкой у
 перехода въ пластинку; тычинокъ 10; столбиковъ 3; коробочка 6. ч. на
 ножкѣ, у основанія 3—5 (7)-гнѣздная, верхушка ея одногнѣздная, вскры-
 вается зубчиками; сѣмена почковидныя, бугорчатая.

1. Все растеніе совершенно голое, сизо-зеленое съ нѣсколько мяси-
 стыми листьями. *S. venosa* Aschers.

Все растеніе опушенное, железисто-или шершаво-пушистое. 2.

2. Стебель лежацій или почти лежацій. *S. procumbens* Murr.

Стебель прямостоящій. 3.

3. Лепестки цѣльные, нераздѣльные, очень мелкіе; цвѣты 6. ч.
 однополые. *S. Olites* Sm.

Лепестки 2-раздѣльные; цвѣты 6. ч. двуполые. 4.

4. Вѣнчикъ безъ коронки. *S. tatarica* Pers.

Вѣнчикъ съ коронкой. 5.

5. Стебли и соцветіе вильчато-вѣтвистые; цвѣты на вѣтвяхъ соцветія
 поодиночкѣ, очередные; чашечка покрыта длинными волосками;
 корень однолѣтній. *S. dichotoma* Ehrh.

Цвѣтоносы въ метелкѣ, супротивные, трехраздѣльные, 3—7-цвѣт-
 ковые; чашечка покрыта короткимъ пушкомъ; корневище много-
 лѣтнее, деревянистое. *S. nutans* L.

349. *S. procumbens* Murr. Пет. Кр. I, стр. 87. — Пет., стр. 278. — Кауф. II,
 № 126. — Гор., № 6. — Цин., № 227. — Рупр., стр. 87. —
 Кауф. I, стр. 84.

Стебель лежацій, 15—30 см., спльно-вѣтвистый, шероховато-коротко-
 опушенный, какъ и все растеніе; листья ланцетные или овально-ланцет-
 ные, длиннѣе ихъ междоузлій; цвѣты одиночныя, пазушные или конеч-
 ные, на короткихъ цвѣтоножкахъ, во много разъ короче чашечки; вѣнчикъ
 съ коронкой; лепестки бѣлые, коротко 2-лопастные; чашечка слегка опу-
 шенная, вздутая, колокольчато-цилиндрическая, съ овальными, тупыми
 зубчиками; ножка у завязи одинаковой съ нею длины.

На пескахъ по берегамъ рѣкъ. Цвѣтеть съ первыхъ чиселъ іюля.

Симоновъ монастырь (Ш. и Вар.).—Невѣрово. Клм. у. (К.).—Подъ
 Серпуховымъ (Ар. и Вар.).—Мячково. Брн. у.; за Лужками. Срп. у.;
 островъ противъ Бачманова. Клм. у.; Петровское на Москвѣ р. за Угре-
 шею (П.).—Бѣлопесоцкая слобода. берегъ р. Окл. Срп. у. (П. и X.).

350. *S. venósa* (Gilib.) Aschers.

Silene inflata Sm. Пет. Кр. I, стр. 87.—Бух. II, № 70.—Бух. I, № 67.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 278.—Кауф. II, № 125.—Цин., № 226.—Pinz., p. 10.—Кауф. I, стр. 84.—Lind., p. 94.—Дв., № 437.—Макс., № 419.

Cucubalus Behen L. Дв., № 437.—Макс., № 419.—Hoff. II., № 3283.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 77.—Hoff., № 1077.—St. II, p. 26.—St. I, № 292.—Pal., № 881.

Cucubalus pallidus. Mart., p. 77.

Стебель 20—80 см., прямостоящий, вѣтвистый, сизо-зеленый, голый, какъ и все растеніе; листья яйцевидно-ланцетные или ланцетные, цѣльно-крайніе, немного мясистые, сверху сильно заостренные; цвѣты бѣлые.



Silene procumbens.



Silene venosa.

рѣже розовые; вѣшчикъ безъ коронки; чашечка о 20 сѣтчато-развѣтвленныхъ жилкахъ, пузырчато-вздутая, яйцевидная, голая съ треугольно-овальными, острыми зубцами; коробочка на длинной ножкѣ.

По лугамъ, межахъ и по паровымъ полямъ, очень часто. Цвѣтетъ съ іюня до середины августа.

351. *S. nūtans* L. Пет. Кр. I, стр. 87.—Мос., № 3.—Бух. II, стр. 14.—Пет., стр. 279.—Кауф. II, № 123.—Цин., № 236.—Pinz., p. 10.—Кауф. I, стр. 83.—Lind., p. 94.—Ann. C. I, № 11.—Дв., № 441.—Макс., № 415.—Hoff. II., № 3349.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 78.—Hoff., № 3042.—St. II, p. 26.—St. I, № 294.—Pal., № 893.

Стебель 30—80 см., прямой, сверху вѣтвистый, у основанія съ не цвѣтущими вѣточками; все растеніе опушенное, сверху клейко-железисто-пушистое; нижніе листья на длинныхъ черешкахъ, обратно-яйцевидные или широко-ланцетные, средніе — на короткихъ черешкахъ, широко-ланцетные, верхніе—сидячіе; цвѣты по 3—7 въ полузонтикахъ, расположенныхъ рѣдкою, продолговатою метелкою съ супротивными вѣтвями, передъ

расцвѣтаніемъ поникшіе. во время цвѣтенія колѣнчато-изогнутые; вѣнчикъ съ коронкою; лепестки грязно-бѣлые, съ линейными долями; чашечка пушистая, съ острыми зубчиками, во время цвѣтенія почти цилиндрическая. при плодахъ булавовидная.

По кустарникамъ, по лѣсамъ и откосамъ, часто. Цвѣтетъ съ первыхъ чиселъ іюня до середины іюля. Царицыно, Серебряный боръ близъ Хорошева (С.).—Откосъ ж. д. между ст. Бутово и Подольскомъ (Мос.).—Кунцово, Воробьевы горы; Бачманово, Клм. у. (П.).



Silene nutans.



Silene tatarica.

352. *S. tatárica* (L.) Pers. Пет. Кр. I, стр. 87.—Пет., стр. 279.—Кауф. II, № 124.—Цин., № 232.—Рупр., стр. 62.—Кауф. I, стр. 83.—Апп. С. V, № 14.—Дв., № 439.—Макс., № 416.

Cucubalus tataricus L. Hoff. H., № 3298.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 78.—Hoff., № 1089.—St. II, p. 26.—St. I, № 293.—Pal., № 883.

Корневище деревянистое; стебли 40—90 см., прямостоящіе, вверху клейкіе, съ укороченными вѣточками въ видѣ пучковъ листьевъ; всѣ листья ланцетные или широко-ланцетные, по краямъ шероховатые, основаніемъ немного сросшіеся; цвѣты во время цвѣтенія отклоненные, на торчащихъ цвѣтопожкахъ, по 1—3 въ полузонтикахъ, расположенныхъ прямою, узкою, длинною, кистевидною метелкою; вѣнчикъ безъ коронки; лепестки съ продолговато-линейными долями, зеленовато- или желтовато-бѣлые; чашечка до 11 мм., голая, съ острыми зубчиками.

По песчанымъ откосамъ, по кустарникамъ и опушкамъ. Цвѣтетъ со середины іюня весь іюль. Кунцово, Воробьевы горы. Строгино; Боровскій курганъ близъ Мячкова, Брн. у., Серпуховъ (К.).—Островъ противъ Бачманова. Клм. у., противъ Губина на р. Нерской. Брн. у.,

Перерва — берегъ Москвы р. (П.).— Быково. Бри. у.. Дракино. Сри. у. (С.).—Борвиха, Звн. у. (X.).

353. *S. Otites* (L.) Sm. Пет. Кр. I, стр. 89.—Пет., стр. 279.—Кауф. II, № 128.—Гор., № 16.—Цви., 229.—Кауф. I, стр. 85.—Lind., p. 94.—Borg., p. 690.—Дв., № 440.—Макс., № 418.

Cucubalus Otites. Pal., № 887.

Корневище почти деревянистое; стебель 30—80 см., прямостоящій, не вѣтвистый, снизу пушистый, вверху клейкій; нижніе листья сближенные, образуютъ почти розетку, лопатчатые, черешковые, пушистые, верхніе—линейные, острые, сидячіе или почти сидячіе; цвѣты на длинныхъ, голыхъ цвѣтоножкахъ, мелкіе, желтовато-зеленые, однополые, собраны въ мутовки, расположенны узкою метелкою; лепестки очень мелкіе, цѣльные, безъ коронки; чашечка голая, колокольчатая, съ тупыми зубчиками; коробочка почти сидячая. Находится въ гербаріи Максимовича за № 93.

354. *S. dichótoma* Ehrh.

Стебли прямостоящіе, 30—90 см., въ верхней части вильчато-вѣтвистые, мягко-пушистые и, кромѣ того, покрыты разсыянными, длинными волосками; корень одволѣтній; нижніе стеблевые и корневые листья лопатчатые, средніе—продолговато-ланцетные, верхніе—ланцетные, всѣ листья покрыты рѣдкими, мягкими волосками и съ 3—5 параллельными жилками; цвѣты бѣлые, съ коронкой, во время цвѣтенія горизонтальные



Silene Otites.



Silene dichotoma.

или поникающіе, на короткихъ цвѣтоножкахъ, съ 2 короткими, широко-ланцетными прицвѣтными листочками, у нижнихъ цвѣтовъ травянистыми, у верхнихъ—пленчатыми; чашечка цилиндрическая, 12—15 мм. дл. съ острыми зубчиками и съ 10 сильно выдающимися продольными жилками, усаженными жесткими волосками; лепестки двураздѣльные, 18,5—21 мм.; зубцы коронки усѣченные, не сросшіеся; тычинки и столбики далеко

выставляются изъ цвѣтка; коробочка на очень короткой ножкѣ; сѣмена плоскія, густо покрыты рядами бугорковъ.

Между Рождественнымъ (Телятсьевымъ) и Московкой. Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ). По запущенному полю близъ д. Роднево. — лѣвый берегъ р. Мочи, Пдл. у. Въ цвѣту 28 мая. послѣдніе цвѣты и зрѣлые плоды 9 іюля 1906 г. (X.).

α. *parviflora* Choroschkov. 1) Чашечка 9,5—11,5 мм. дл.; лепестки 13,5—16,5 мм.

Вмѣстѣ съ типичной формой близъ дер. Роднево, Пдл. у. (X.).

129. *Viscaria* Roehl.

Цвѣты обоеполые. съ коронкой и съ слабо-выемчатой пластинкой столбиковъ 5; коробочка на длинной ножкѣ. у основанія 5-гнѣздная, раскрывается 5 зубчиками.

355. *V. vulgaris* Roehl. Пет., стр. 308. — Цин., № 243. — Pinz., p. 10. — Lind., p. 96.

Lychnis Viscaria L. Бух. II, № 72. — Бух. I, № 68. — F. O., № 5, p. 70. — Кауф. II, № 129. — Кауф. I. стр. 85. — Ann. C. I, № 12. — Дв., 458. — Макс., № 441. — Hoff. H., № 3496. — Gold. C., p. 20. — Mart., p. 81. — Hoff., № 1976. — St. II, p. 27. — St. I, № 309.



Viscaria vulgaris.

Стебель 30—70 см., прямостоящій, голый, подъ верхними узлами клейкій; корневые листья линейно-ланцетные, къ основанію суженные въ черешокъ, стеблевые—сидячіе, съ сросшимся короткимъ влагалищемъ, нижніе края листьевъ у влагалища съ рѣсничками; цвѣты малиновые въ мутовкахъ по 5—7, расположены кистевидной метелкой; чашечка трубчатая, немного вздутая, съ треугольными, туповатыми зубчиками.

По лугамъ и полянамъ, очень часто. Цвѣтеть съ первыхъ чиселъ іюня до половины іюля.

α. *albiflora* (Sweet) Rouy et Fouc. Съ бѣлыми цвѣтами.

130. *Melándryum* Roehl.

Растенія съ цвѣтами обоеполыми или разнополыми, и тогда двудомныя; лепестки съ глубоко-2-раздѣльною пластинкою; столбиковъ 3—5; коробочка на короткой ножкѣ, по всей длинѣ одногнѣздная. вскрывается 5 зубчиками.

1. Столбиковъ три; цвѣты обоеполые. 2.

Столбиковъ пять; цвѣты однополые. 3.

1) *Silene dichotoma* Ehrh. α. *parviflora* var. nov.

Calice 9,5—11,5 mm., petalis 13,5—16,5 mm. longis; tota planta minus dense pilosa quam in forma typica. A. Choroschkov.

2. Вѣнчикъ съ коронкой. *M. noctiflorum* (L.) Fr.
 Вѣнчикъ безъ коронки. *M. viscosum* (L.) Čelak.
3. Стебель вверху железисто-пушистый; цвѣты б. ч. бѣлые; зубчики коробочки прямо-торчащіе. *M. album* (Mill.) Garcke.
 Стебель безъ железистыхъ волосковъ; цвѣты б. ч. малиновые; зубчики коробочки отогнуты и свернуты. *M. rubrum* (Weig.) Garcke.

356. *M. album* (Mill.) Garcke. Pinz., p. 10.

Melandryum pratense Roehl. Пет., стр. 222.—Цин., № 242.—Lind., p. 96.

Lychnis pratensis Spreng. Бух. II, № 74.—Бух. I, № 70.—F. O., № 5, p. 70.—
 Кауф. II, № 131.—Кауф. I, стр. 86.—Дв., № 459.—
 Gold. C., p. 20.—Mart., p. 81.

Lychnis dioica L. Макс., № 443.—Hoff. II., № 3490.—Gold. Sp., p. 126.—
 Mart., p. 81.—Hoff. № 1971.—St. II, p. 27.—St. I, № 310.—
 Pal., № 926.

Lychnis arvensis Roth. Hoff. II., № 3490.

Lychnis alba Mill. Hoff., № 1971.

Lychnis vespertina Sibth. Hoff., № 1971.

Стебель 30—100 см., прямостоящій, вѣтвистый; все растеніе, особенно вверху, железисто-пушистое; чашечки и цвѣтоножки часто клейкія; листья ланцетно-эллиптическіе, заостренные, съ нижней стороны съ сильно выдающимися жилками; соцвѣтіе — двураздѣльный полузонтикъ; цвѣты бѣлые, по вечерамъ душистые; чашечка съ ясно-выдающимися жилками, у мужскихъ цвѣтовъ трубчатая, немного вздутая, до 20 мм. дл., у женскихъ — яйцевидная, до 25 мм. дл.; коробочка съ вверхъ стоящими зубчиками.

По лугамъ, на огородахъ и близъ жилья, очень часто. Цвѣтетъ съ первыхъ чиселъ іюня почти все лѣто. Съ блѣдно-розовыми цвѣтами — по высокому берегу р. Колочи близъ д. Новое. Мож. у. (Куль.).



Melandryum album.

357. *M. rubrum* (Weig.) Garcke.

Melandryum silvestre Roehl. Пет., стр. 222.—Цин., № 241.—Lind., p. 94.

Lychnis silvestris Hoppe. Бух. II, № 75.—Бух. I, № 71.—F. O., № 5, p. 70.—
 Кауф. II, № 132.—Кауф. I, стр. 86.—Дв., № 460.—
 Макс., № 442.—Gold. C., p. 20.—Gold. Sp., p. 126.—
 Mart., p. 81.

Lychnis diurna Sibth. Ann. C. III., № 210.

Lychnis dioica L. а. *rubra* L. Макс., № 442.—Hoff., № 1973.

Стебель 30—100 см., прямостоящій, вѣтвистый; все растеніе покрыто довольно длинными, курчавыми волосками; листья яйцевидные, нижніе и средніе суженные въ черешокъ, верхніе — сидячіе, заостренные; соцвѣтіе — не густой, 2-раздѣльный полузонтикъ; цвѣты малиновые, однополые:

лепестки надрѣзные; чашечка яйцевидная, удлинненная, немного вздутая, съ туповатыми зубчиками; коробочка съ закрученными зубчиками.

По сырымъ и тѣнистымъ мѣстамъ. Цвѣтетъ съ начала іюня весь іюль; плоды съ первыхъ чиселъ іюля. За Давыдовымъ (А.).—Царицыно (С.).—Соколово; Хотьково. Виѣанія. Сергіевскій посадъ. Дмит. у. (Дв.).—Трепарево. Мож. у. (К.).—Лѣсъ между Сенежескимъ озерамъ и Покровскимъ. Клин. у. (П. и С.).—Хмѣтѣво, Клин. у. (П.).—Семеново. Мож. у. (Ч.).—



Melandrium rubrum.



Melandrium noctiflorum.

Шебала, Пдл. у. (Б.).—Близъ Усова и Темникова, Звн. у.; с. Нары-Омнискія. Вер. у.; близъ ст. Икша. Савел. ж. д. (X.).—Красный Станъ. Руз. у. (Сюз.).

358. *M. noctiflorum* (L.) Fr.

Silene noctiflora L. Пет. Кр. I, стр. 87.—Ф. Б., № 13.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 279.—Кауф. II, № 127.—Мил., стр. 11.—Гор., № 7.—Цин., № 235.—Кауф. I, стр. 84.—Lind., p. 94.—Дв., № 442.—Макс., № 420.—Gold. C., p. 20.—Gold. Sp., p. 126.—Mart., p. 78.—Hoff., № 3040.—St. II, p. 27.

Стебель 10—70 см., примостоящій, немного вѣтвистый, какъ и все растеніе, железисто-пушистый; нижніе листья продолговато-обратно-лицевидные, суженные въ короткій черешокъ, верхніе—продолговатые или ланцетные, сидячіе; цвѣты грязно-бѣлые или розовые; чашечка железисто-пушистая, трубчатая,верху суженная, у основанія немного вздутая, съ ясно-выдающимися и развѣтвленными жилками, сильно вздувающаяся при плодахъ, зубцы ея длинные, тонкіе, шпоровидные; ножка коробочки очень короткая.

Какъ сорное, по паровымъ полямъ, огородамъ и близъ жилья. очень рѣдко. Цвѣтетъ съ іюня. Находится въ гербаріи Гольдбаха, собрано Генпипгомъ.—Романцово, Мож. у. (В.).—По склону р. Протвы, противъ дер. Алексѣвки, Мож. у. (Ф. Б.).—Петровское-Разумовское (Казанскій).—Мытищи, на огородѣ (С.).

359. *M. viscosum* (L.) Celak.

Silene viscosa Pers. Пет. Кр. I, стр. 88.—Пет., стр. 279.—Кауф. II, № 122.—Гор., № 15.—Цин., № 233.—Кауф. I, стр. 83.—Дв., № 438.—Макс., № 417.

Cucubalus viscosus L. Mart., p. 78.

Стебель 40—80 см., простой, прямостоящий; все растение мохнатое, клейкое от железистых волосков; нижние листья продолговатые, къ основанію суженные, верхние—ланцетные, у основанія немного сросшіеся, всѣ по краямъ волнистые; 1—3-цвѣтковые полузонтики собраны въ удлиненную торчащую всестороннюю метелку; цвѣты бѣлые, безъ коронки; чашечка до 18 мм. дл., съ тупыми зубчиками, въ срединѣ немного вздутая; ножка въ 2—3 раза короче коробочки.

Встрѣчается рѣдко. Цвѣтетъ въ іюль. Три горы, Воробьевы горы; Купавна, Бгр. у. (Мар.).—Подъ Москвой (Вар.).—Перерва (Гей.).—По дорогѣ къ Перову, такъ называемые Ключики (Л.).—Около д. Поддубино, Пдл. у. (Б.).—Быково, Брн. у. (Куль.).



Melandryum viscosum.

131. *Lýchnis* L.

Цвѣты обоеполые; вѣничекъ безъ коронки; лепестки 4-раздѣльные; столбиковъ 5; коробочка безъ ножки. одногвѣздная. вскрывается 5 зубчиками.

360. *L. flos cuculi* L. Бух. II, № 73.—Бух. I, № 69.—Ф. О., № 5, p. 70.—Пет., стр. 217.—Кауф. II, № 130.—Цин., № 245.—Кауф. I, стр. 86.—Lind., p. 96.—Ann. С. II, № 09.—Дв., № 461.—Макс., № 444.—Hoff. H., № 3492.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 81.—Hoff., № 1974.—St. II, p. 27.—St. I, № 308.—Pal., № 925.



Lýchnis flos cuculi.

Стебель 30—80 см., прямостоящій бороздчатый, вверху вѣтвистый; все растение шероховатое от коротких волосков; нижние листья лопатчато-ланцетные, суженные въ черешокъ, стеблевые—ланцетные, къ верхушкѣ сильно-заостренные, спячіе, съ короткимъ влагалищемъ и съ рѣсничками у основанія; цвѣты въ рѣдкихъ полузонтикахъ, расположенныхъ щитковидною метелкою; лепестки розовые, рѣдко бѣлые, съ 4 расходящимися линейными долями; чашечка почти переночатая, съ ясно выдающимися 10 жилками и съ треугольными островатыми зубчиками, по краямъ съ рѣсничками.

По сырým лугамъ и полянамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины мая до половины юля.

132. *Agrostemma* L.

Чашечка равна вѣнчику или длиннѣе его, 5-раздѣльная, съ длинными, травянистыми зубцами; вѣнчикъ безъ коронки; лепестки слегка выемчатые; тычинокъ 10; столбиковъ 5; рыльца вверху съ сосочками; коробочка безъ ножки, одногнѣздная, вскрывается 5 зубчиками.

361. *A. Githágo* L. Бух. II, № 76.—Бух. I, № 72.—F. O., № 5, p. 70.—Кауф. II, № 133.—Кауф. I, стр. 87.—Ann. C. IV, № 4.—Дв., № 457.—Макс., № 445.—Hoff. II., № 3484.—Gold. C, p. 20.—Mart., p. 81.—Hoff., № 63.—St. II, p. 27.—St. I, № 307.—Pal., № 921.

Githago segetum Desf. Пет., стр. 196.—Цин., № 246.—Lind., p. 96.

Lychnis Githago Lam. Макс., № 445.



Agrostemma Githago.

Стебель 30—70 см., тонкій, прямостоящій, вѣтвистый; все растение покрыто мягкими, тонкими волосками; листья съ 3 продольными жилками линейно-ланцетные, заостренные, основаніемъ немного сросшіеся; цвѣты одиночные на очень длинныхъ цветоножкахъ, довольно крупные, темно-малиновые; чашечка яйцевидная, съ 10 сильно выдающимися жилками и съ очень длинными, линейно-ланцетными зубцами, достигающими 30 мм.

По посѣвамъ, какъ сорное, часто. Цвѣтетъ со середины юля почти до осени.

133. *Gypsóphila* L.

Чашечка съ широкой перепончатой каймой. колокольчатая. 5-зубчатая; вѣнчикъ безъ коронки; лепестки постепенно суженные въ клиновидный ноготокъ; тычинокъ 10; столбиковъ 2; коробочка сидячая, одногнѣздная, вскрывается 4 зубчиками; сѣмена почковидно-шаровидные.

362. *G. paniculáta* L. Пет. Кр. I, стр. 82.—Пет., стр. 197.—Кауф. II, № 113.—Гор., № 13.—Pal., № 862.

Стебель 40—80 см., прямостоящій, почти снизу сильно-вѣтвистый. голый, только у основанія съ мелкими,низу обращенными волосками; листья линейно-ланцетные, сильно заостренные, немного сросшіеся основаніемъ, нѣсколько мясистые; цвѣты бѣлые, въ раскнутомъ вѣтвистомъ полузонтикѣ; лепестки до 3 мм.; чашечка до 2 мм., съ тупыми, пленчато-окаймленными зубчиками; цветоножка въ 2—3 раза длиннѣе чашечки.

Найдено Голенинымъ и Милотипнымъ 9 июня въ нѣсколькихъ экземплярахъ на заливномъ лугу подъ Симоновымъ монастыремъ (это мѣсто теперь занято вѣтвью Казанской ж. д.) и еще разъ въ первыхъ числахъ июня 1906—Кульковымъ на откосѣ ж. д. насыпи между Малаховкой и Удѣльной, Мос.-Каз. ж. д.



Gypsophila paniculata



Gypsophila muralis.

363. *G. muralis* L. Пет. Кр. I, стр. 82.—Бух. II, № 64.—Бух. I, № 64.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 197.—Кауф. II, № 112.—Цин., № 219.—Pinz., p. 10.—Кауф. I, стр. 77.—Lind. p., 94.—Ann. C. II, № 108.—Дв., № 430.—Макс., № 407.—Hoff. II., № 3210.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 76.—St. I, № 287.—Pal., № 867.

Стебель 5—25 см., тонкій, голый, внизу нѣсколько шершавый, почти съ основанія сильно вѣтвистый; листья супротивные, линейные, суженные къ обоимъ концамъ, у основанія съ очень короткимъ, бѣлымъ пленчатымъ влагалищемъ; цвѣты одиночные, розовые, съ темными жилками, на очень длинныхъ и тонкихъ цвѣтоножкахъ; лепестки до 5 мм.; чашечка кверху немного расширенная, до 4 мм. дл., съ 5 тупыми зубчиками и бѣлымъ перепончатымъ краемъ.

По шаровымъ полямъ, по дорогамъ и какъ сорное близъ жилья, очень часто. Цвѣтетъ съ первыхъ чиселъ июня до глубокой осени.

134. *Diáanthus* L.

Чашечка трубчатая, цилиндрическая, у основанія съ 1—3 парами остистыхъ листочковъ или чешуекъ, составляющихъ наружную чашечку; вѣнчикъ безъ коронки; лепестки быстро стиснуты въ длинный ноготокъ, отгибъ ихъ горизонтально отогнутый, зазубренный или глубоко-перисто-надрѣзной; тычинокъ 10; столбикъ 2; коробочка сидячая, одногнѣздная, вскрывается 4 зубчиками; сѣмена щитовидныя, слегка выпукло-вогнутыя, черныя.

1. Лепестки зубчатые. 2.

Лепестки перисто-многораздѣльные. 5.

• 2. Прицвѣтники, состоящіе изъ 2 чешуекъ, отодвинуты отъ наружной чашечки. *D. deltoides L.*

Прицвѣтники, состоящіе изъ 4—6 чешуекъ, плотно придвинуты къ наружной чашечкѣ. 3.

3. Чешуйки наружной чашечки вполне травянистыя.

D. barbatus L.

Чешуйки наружной чашечки кожистыя, по краямъ пленчатые. 4.

4. Листья узко-линейные; влагалища въ 2—5 разъ длиннѣ ширины листа. *D. Borbasii Vandas.*Листья узко-ланцетные или ланцетные; влагалища не длиннѣ ширины листа. *D. collinus W. K.*5. Листья линейно-ланцетные; нижніе притупленные, остальные — острые; чешуйки наружной чашечки втрое короче ея трубки; лепестки блѣдно-розовые. *D. superbus L.*Листья линейные, все острые; чешуйки наружной чашечки вчетверо короче ея трубки; лепестки бѣлые. *D. arenarius L.*

364. *D. barbatus L.* Пет. Кр. III, стр. 83.—Бух. II, № 67.—Ф. О., № 5, p. 70.—Пет., стр. 178.—Кауф. II, № 114.—Гор., № 5.—Цин., № 202.—Кауф. I, стр. 78.—St. II, p. 26.—Pal., № 872.

Стебель 20—50 см., прямостоящій, голый, не вѣтвистый; корневые листья обратно-ланцетные, къверху заостренные, къ основанію суженные въ короткій черешокъ, образуютъ дерновники; стеблевые листья ланцетные, заостренные, съ очень короткимъ черешкомъ, переходящимъ въ короткое влагалище; края всехъ листьевъ шероховатые отъ очень мелкихъ, острыхъ зубчиковъ; цвѣточный пучокъ верхушечный, окруженъ такой же длины отогнутыми, линейно-ланцетными прицвѣтниками, сильно заостренными, зелеными; чешуйки наружной чашечки шиловидно-остистыя, вполне травянистыя, такой же длины какъ вся чашечка съ зубцами; лепестки красные, иногда съ бѣлой росписью, рѣже бѣлые или тѣлесные; пластинка до 8 мм. ш., зубчатая.

*Dianthus barbatus.*

Одичалое, по старымъ паркамъ и прилежащимъ къ нимъ лѣсамъ. Цвѣтетъ съ іюня. Измайловскій звѣринецъ, Зыково, Петровское-Разумовское (К.).—Царицыно (Кр.).—Свиблово; Ивакино, Руз. у.

(М.).—Хмѣтѣево, Кал. у.; Витенево, Мос. у. (П.).—Сергіевскій посадъ—въ лѣсу близъ скита, Дмит. у. (П. и С.).—Близъ Красной Пахры и Михайловскаго, Пдл. у. (Б.).—Введенское, Звн. у. (Маев.).—По берегу Бисерова озера, Вгр. у. (П. П.).—Портъче, Звн. у. (Х.).

365. *D. collinus* W. K. Пет. Кр. I, стр. 85.—Дл., № 492.—Макс., № 409.—Gold. C., p. 20.—Gold. Sp., p. 125.—Mart., p. 77.

Dianthus Seguieri Vill. F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 178.—Кауф. II, № 116.—Цул., № 207.—Pinz., p. 10.—Рупр., стр. 162.—Кауф. I, стр. 79.—Lind., p. 94.—Hoff. H., № 3244.

Dianthus Seguieri Vill. var. *campestris*. Pinz., p. 10.

Dianthus ruthenicus. St. II, p. 26.

Корневище простое или разветвленное, деревянистое; стебель 30—80 см., у основания приподнимающийся, как и листья, б. ч. спизоватый; листья съ 3—5 жилками, ланцетные или линейно-ланцетные, по краямъ пероховатые, съ влагалищемъ въ ширину листа; цвѣты верхушечные, по 2 или



Dianthus collinus α. *silvaticus*.



Dianthus collinus β. *subpaniculatus*.

пучками; прицвѣтники ланцетные: чешуйки наружной чашечки съ травянистою остью; зубцы чашечки острые, по краямъ пленчатые, обыкновенно вся чашечка или только верхняя часть ея буро-красная; лепестки свѣтло- или темно-красные; пластинка до 10 мм. ш., зубчатая.

По кустарникамъ, по опушкамъ и по холмамъ, довольно часто. Цвѣтеть съ половины іюня.

α. *silvaticus* Hoppe. Пет. Кр. I, стр. 85.—Бух. II, № 66.

Dianthus Seguieri Vill. α. *silvaticus* Koch. Кауф. II, стр. 74.—Кауф. I, стр. 79.

Цвѣты б. ч. по 2; наружныя чашечныя чешуйки не длинѣе трети чашечки; все растение почти зеленое. Между Мытищами и Тарасовкой (С.).—Воробьевы горы, Кузьминки, Раменки, Кусково; Березники, Спр. у.; заливной лугъ близъ Заозерья, Брн. у. (П.).—Оздобино, Пдл. у. (Б.).

β. *subpaniculatus* Schur. Пет. Кр. I, стр. 85.

Dianthus Seguieri Vill. β. *collinus* W. K. Кауф. II, стр. 75.—Кауф. I, стр. 79.

Цвѣты собраны пучками; наружныя чашечныя чешуйки не короче половины чашечки. Боровскій курганъ, Брн. у. (С.).—Протопопово, Кзм. у. (П.).

366. *D. Borbásii* Vandas (Oest. bot. Zeit. XXXVI, p. 193, 1886).

Dianthus Carthusianorum L. Пет. Кр. I, стр. 83.—Пет., стр. 178.—Кауф. II, стр. 74.—Гор., № 14.—Цин., № 203.—Рупр., стр. 62.—Borg., p. 690.—Дв., № 433.—Макс., № 411.—Пал., № 873.

Dianthus polymorphus M. B. Цин., № 206.

Dianthus polymorphus M. B. β . *diutinus* Kit. Кауф. II, № 115.—Кауф. I, стр. 78.

Корневище развѣтвленное, деревянистое; все растеніе зеленое или слегка сизо-зеленое; стебли 20—60 см., простые, б. ч. съ 4 гранями, въ нижней части слегка шероховатые, близъ верхушки гладкіе, голые; листья узко-линейные, почти всегда съ 3 жилками, по краямъ шероховатые отъ мелкихъ зубчиковъ; влагалища въ 2—5 разъ превышаютъ ширину листа; цвѣты верхушечные, пучкомъ по 2—8; прицвѣтники пленчатые, верхушка ихъ округлая, быстро стянута въ длинную ость; чешуйки наружной чашечки блѣдныя, буровато-желтыя или соломенно-желтыя, рѣдко верхушка ихъ красноватая, эллиптическія, съ широкимъ пленчатымъ краемъ, постепенно переходятъ въ б. или м. короткую ость; длина чешуекъ равна половинѣ чашечки или нѣсколько длиннѣе; чашечка около 15 мм., съ острыми, слегка расходящимися или прямо-торчащими зубчиками, обыкновенно красно-бурая; пластинка лепестковъ до 9 мм. дл. и 6 мм. ш., ярко-красная, остро-зубчатая.

Dianthus Borbásii.

По холмамъ на пескахъ береговой полосы р. Оки. Цвѣтетъ съ половины іюня. Серпуховъ, Лужки, Прилуки, Бѣлпесоцкая слобода, Срп. у. (К.).—Подъ Коломной (П.).—Новая близъ р. Нары, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

367. *D. deltoides* L. Пет. Кр. I, стр. 85.—Бух. II, № 65.—Бух. I, № 65.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 177.—Кауф. II, № 117.—Цин., № 211.—Pinz., p. 10.—Кауф. I, стр. 80.—Lind., p. 94.—Макс., № 410.—Hoff., H., № 3245.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 77.—Lib. Tr., p. 40.—Hoff., № 1182.—St. II, p. 26.—St. I, № 289.—Pal., № 875.

Корневище даетъ безцвѣтковые и цвѣточныя стебли въ 20—40 см.; все растеніе слегка опушенное; листья линейные или линейно-ланцетные, на безцвѣтковыхъ стебляхъ даже ланцетные, то заостренные, то туповатые; цвѣты красные, одиночные, на длинныхъ цвѣтопожкахъ; лепестки съ клиновидною, остро-зубчатою пластинкою, до 10 мм. дл. и 5 мм. ш.; прицвѣтники отодвинуты отъ наружной чашечки, состоятъ изъ 2 эллиптическихъ, шпловидно-остистыхъ чешуекъ.

По лугамъ, холмамъ и по полянамъ лѣсовъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до осени.

α. réptians Mart. Пет. Кр. I, стр. 85.—Mart., p. 77.

Стебли длинно-ползучие съ побѣгами. Анкипно на Москвѣ р.,
Звн. у. (Ч.).

368. *D. arenarius L.* Пет. Кр. I, стр. 86.—Пет., стр. 178.—Кауф. II, № 118.—
Цин., № 215.—Кауф. I, стр. 80.—Дв., № 436.—Gold. Sp.,
p. 125.—Mart., p. 77.—Hoff., № 1170.—St. II, p. 26.—St.
I, № 291.—Pal., № 879.

Dianthus plumarius L. Макс., № 413.

Корневище деревянистое, сильно вѣтвистое, дасть цвѣтущіе стебли
въ 10—30 см. и много укороченныхъ безцвѣтковыхъ стеблей; все растение
голое; листья линейно-ланцетные, заостренные, по краямъ шероховатые;
стеблевые—сизо-зеленые, корневые—зеленые; цвѣты б. ч. одиночные, бѣ-
лые, душистые; лепестки въ срединѣ съ зеленоватымъ пятномъ и розо-
выми точками. глубоко-надрѣзные, съ линейными долями; чешуйки наруж-
ной чашечки усѣченные, вчетверо короче чашечной трубки.

По пескамъ, очень рѣдко. Преображенское (Дядьковский—Дв.) и въ
гербаріи Макемновича за № 87.



Dianthus deltoides.



Dianthus arenarius.



Dianthus superbus

369. *D. superbus L.* Пет. Кр. I, стр. 85.—Ф. Б., № 10.—Пет., стр. 178.—Кауф. II,
№ 119.—Цин., № 217.—Кауф. I, стр. 80.—Lind., p. 94.—
Дв., № 434.—Макс., № 412.—Gold. C., p. 20.

Стебель 30—80 см., коротко приподнимающійся, съ побѣгами или
прямостоящій, вверху б. ч. вѣтвистый; все растение голое; листья ланцет-
ные или линейно-ланцетные, заостренные, о 3 жилкахъ и съ очень корот-
кимъ влагалищемъ, по краямъ шероховатые, нижніе—туповатые; цвѣты
по 1—2 на концѣ вѣтвей; лепестки крупные, глубоко-надрѣзные, съ тон-
кими, почти нитевидными долями, блѣдно-лиловые или блѣдно-розовые,
съ зеленоватымъ срединнымъ пятномъ, усаженнымъ темно-пурпуровыми,
почти черными волосками; чешуйки наружной чашечки заостренные, ко-

ротко-остистый, втрое короче чашечной трубки; чашечка б. ч. буро-пурпуровая, съ острыми, широко-пленчатыми зубчиками.

По сырým лугамъ и откосамъ, не часто. Цвѣтетъ съ половины іюня. Останкино (А.).—Большево на Клизьмѣ, Лосинный Островъ (М.).—Сокольниковъ (Тор.).—Близъ Жуковки. Мос. у. (Г. О.).—Пушкино; Ивашево, Дмит. у., Карачарово по склону къ Волгѣ, Кал. у. (П.).—Верея (Бор.).—За Талицами по дорогѣ къ Сергіевскому посаду, Дмит. у. (Кар.).—Подъ Гаврилковымъ въ кустахъ, Дмит. у. (П. и С.).—Въ лѣсу близъ Невѣрова, Кал. у. (К.).—Между Райками и Анискинымъ, Бр. у. (И.).

135. *Saponária* L.

Чашечка цилиндрическая; вѣничекъ съ коронкой; лепестки съ длиннымъ ноготкомъ; тычинокъ 10; столбиковъ 2, очень рѣдко 3; коробочка одногнѣздная, вскрывается 4 зубчиками, а при 3 столбикахъ 6 зубчиками; зубчики отгибаются; сѣмена почковидныя.

370. *S. officinális* L. Пет. Кр. I, стр. 87.—Бух. II, № 69.—Ф. Б., № 12.—Бух. I, № 66.—Ф. О., № 5, р. 70.—Пет., стр. 270.—Кауф. II, № 121.—Цин., № 224.—Pinz., р. 10.—Рупр., стр. 87.—Кауф. I, стр. 81.—Lind., р. 94.—Ann. C. I, № 10.—Дв., № 431.—Макс., № 408.—Hoff., H., № 3222.—Mart., р. 76.—Hoff., № 2833.—St. II, р. 26.—St. I, № 288.

Корневище ползучее, вѣтвистое; стебель 30—70 см., примостоящій, снизу голый,верху коротко-опушенный; листья сужены въ короткій черешокъ, верхніе—почти сидячіе, продолговато-эллиптическіе, голые, съ 3 жилками; цвѣты бѣлые или розоватыя, на короткихъ цвѣтоножкахъ въ треть или четверть чашечки длиною, съ линейно-ланцетными прицвѣтниками, скучены пучковидными щитками на концѣ развѣтвленій; отгибъ лепестка до 15 мм.; зубчики чашечки съ остроконечіемъ.



Saponaria officinalis.

По кустарникамъ, по песчанымъ берегамъ рѣкъ, преимущественно Москвы и Оки, иногда по старымъ паркамъ. Цвѣтетъ съ первыхъ чиселъ іюля. Перерва, Хорошово, Тулуповская мельница—близъ Покровскаго, Строгино (К.).—Царицыно; Боровскій курганъ, Бр. у. (С.).—Серпуховъ, берегъ р. Оки; берегъ р. Сѣтуни (П. и С.).—Курниково, Срп. у. (И.).—Архангельское, Звн. у. (Ассъ).—Успенское, Звн. у. (Х.).—По берегу р. Пахры, Пдл. у. (Б.).—Близъ Лужковъ, Срп. у.; Лужники на Москвѣ р.; Карапчеево, Кал. у.; по р. Истрѣ, Звн. у. (П.).

У насъ пока только:

а. *týpica* Beck. Чашечка, стебель и края листьевъ б. или м. густо покрыты волосками.

б. *horténsis* Mart. Пет. Кр. I, стр. 87.—Mart., р. 76.

Съ махровымъ цвѣтамъ.

136. *Vaccária Medik.*

Чашечка съ зубчиками, овально-пирамидальная, 5-гранная, по отцвѣтаніи 5-крылая; вѣничикъ безъ коронки; лепестки съ длиннымъ ноготкомъ; тычинокъ 10; столбиковъ 2; коробочка у основанія 4-гнѣздная, вскрывается 4 зубчиками; сѣмена шаровидныя.

371. *V. pyramidata Medik.* (Philosph. Bot. I, p. 96, 1789).

Vaccaria vulgaris Host. Пет. Кр. I, стр. 87.—Бух. II, стр. 68.—Ф. Б., № 11.—Пет., стр. 297—298.—Кауф. II, № 120.—Цин., № 225.—Кауф. I, стр. 81.

Стебель 40—70 см., прямостоящій, сильно вѣтвистый; все растеніе сизо-зеленое; листья нѣсколько сросшіеся, яйцевидно-ланцетные, у основанія иногда слегка сердцевидные, острые, мясистые; цвѣты розовые; пластинка лепестка до 6 мм., округлая, съ мелкими зубчиками; чашечка до 16 мм. дл., крупная, желтоватая, съ 5 зелеными, крылатыми ребрами; зубчики ея съ бѣлымъ пленчатымъ краемъ.

Цвѣтетъ съ половины іюня. Встрѣчается не часто.

У насъ пока только слѣдующая форма:

α. *grandiflora* Fisch.

Ноготокъ сильно вытянутъ; пластинка слегка выемчатая, равна половинѣ чашечки или нѣсколько больше. Петровское-

Разумовское (А.).—Петровский паркъ (Г. С.).—Симоновъ монастырь (К.).—Мазилово (М.).—Химки (П.).—Между Нѣмчиновскимъ постомъ, Марѣннымъ и Троекуровымъ; близъ Татарова (Ассы).—Горенки (Шатерниковъ).—Руновско, Мос. у., Мытищи близъ ст. (Г.).—Путилково близъ Братцова, около Шеленихи; близъ Никифорова, Срп. у. (Г.).—Зиброво, Срп. у. (Гей.).—Около Сѣкирина, Пдл. у. (Б.).—Влеутово близъ ж. д. моста черезъ р. Пахру, Пдл. у. (Х.).—Клычево—въ посѣвѣ, Кал. у. (П. и С.).



Vaccaria pyramidata α. grandiflora.

137. *Sagina L.*

Чашечка 4—5-лиственная; вѣничикъ 4—5-лепестный; лепестки цѣльные; тычинокъ 4—5 или 10; столбиковъ 4—5; коробочка 4—5-створчатая, многосѣмянная; листья безъ прилистниковъ, сростаются у основанія въ общее влагалище.

372. *S. procumbens L.* Бух. II, № 78.—Бух. I, № 80.—Ф. О., № 5, p. 70.—Пет., стр. 264.—Кауф. II, № 135.—Цин., № 248.—Кауф. I, стр. 87.—Lind., p. 96.—Ann. C. IV, № 3.—Дв., № 192.—Макс., № 176.—Hoff. H., № 1199.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 32.—Ad., p. 90.—St. II, p. 11.—St. I, № 113.

Много прямостоящихъ, приподнимающихся и лежащихъ, укореняющихся стеблей въ 2—8 см.; все растение голое; листья линейные, остро-конечные, съ нѣскольکو сросшимся основаніемъ; цвѣтокъ о 4 бѣлыхъ лепесткахъ; чашечка много длиннѣе лепестковъ; тычинокъ 4; цвѣтоножки очень длинныя, отвѣтствія отогнуты крючкомъ; плодоножки выпрямляются.

По запущеннымъ дорожкамъ, на паровыхъ поляхъ и по пустырямъ, очень часто. Цвѣтетъ съ первыхъ чиселъ іюня до осени.



Sagina procumbens.



Sagina nodosa.

373. *S. nodosa* (L.) Fenzl. Бух. II, № 79.—Бух. I, № 81.—F. O., № 5, p. 70—Пер., стр. 264.—Кауф., II, № 136.—Цан. № 249.—Pinz., p. 10.—Кауф. I, стр. 83.—Lind., p. 94.—Ann. C. I, № 13.

Spergula nodosa L. Дв., № 468.—Макс., № 440.—Нoff. II., № 3528.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 83.—St. II, p. 28.—St. I, № 316.

Стеблей обыкновенно нѣсколько въ 5—20 см., прямостоящихъ или у основанія приподнимающихся, голыхъ или коротко опушенныхъ; корневые листья пучкомъ, линейные, остроконечные, до 25 мм. дл.; стеблевые—постепенно къ верхушкѣ стебля укорачиваются до 1 мм., въ пазухахъ съ укороченными вѣточками въ видѣ пучковъ листьевъ; цвѣты о 5 бѣлыхъ лепесткахъ, вдвое длиннѣе чашечки; чашелистики зеленые съ бѣлымъ перепончатымъ краемъ, туповатые; тычинокъ 10; цвѣтоножки всегда торчащія.

По сырýmъ лугамъ и на торфяной почвѣ, часто. Цвѣтетъ съ середины іюня.

α. pubescens Koch.

Стебель, цвѣтоножки и основаніе чашечки покрыты железистыми волосками; края лепестковъ усажены рѣдкими, почти сидячими железками; пазушные пучочки листьевъ опадаютъ. Д. Бузаева—по берегу Москвы р., Звн. у. (X.).

138. *Alsine* Wahlenb.

Чашечка 5-ти, очень рѣдко 4-листная; вѣнчикъ 5—(4)-лепестный; тычинокъ 10 (8), сидятъ въ 2 ряда, при наружномъ рядѣ тычинокъ у основанія по 2 железки; столбиковъ 3; коробочка вскрывается 3 створками или зубчиками; сѣмена почковидныя.

374. *A. tenuifolia* (L.) Wahlenb. Пет. Кр. I, стр. 92. — Пет., стр. 134. — Кауф. II, № 141. — Цип., № 250. — Рупр., стр. 87.—Кауф. I, стр. 90.

Arenaria tenuifolia L. Дв., № 452.—Макс., № 430.

Стебель примостоящій, отъ самаго основанія вѣтвистый, до 15 см.; листья съ 3 жилками, шиловидные, отъ 6 мм. дл. постепенно уменьшаются къ верхушкѣ стебля до 1 мм.; цвѣтоножки нитевидныя; лепестки бѣлые, вдвое короче чашечки; чашелистики ланцетные, шиловидно-заостренные, съ 3 жилками и перепончатымъ краемъ.

Очень рѣдко. Находится въ гербаріи Максимовича за № 106 п, по сообщенію Кауфмана, по полямъ около Владимірскаго шоссе (герб. Борхмана).



Arenaria tenuifolia



Moehringia trinervia.

139. *Moehringia* L.

Чашечка и вѣнчикъ 5-ные, очень рѣдко 4-ные; тычинокъ 10 (8); столбиковъ обыкновенно 3, рѣдко 2; коробочка вскрывается до половины 6 (4) закручивающимися створками или зубцами; сѣмена гладкія, лоснящіеся, съ придаткомъ у рубчика.

375. *M. trinervia* (L.) Clairv. Бух. II, № 82. — Бух. I, № 83. — F. O., № 5, p. 70. — Пет., стр. 225. — Кауф. II, № 135. — Цип., № 254. — Кауф. I, стр. 89. — Lind., p. 96. — Алл. С. II, № 112.

Arenaria trinervia L. Дв., № 450.—Макс., № 432.—Hoff. H., № 3423.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 79.—Hoff., № 318.—St. II, p. 27.

Стебель 10—30 см., прямостоящий, слабый, у основанія приподнимающийся, сильно вѣтвистый; все растение коротко-опушенное; нижніе листья черешковые овальные, съ короткими остроконечіемъ, остальные—яйцевидные, острые, съ 3—5 жилками, средніе—на короткихъ черешкахъ, верхніе—сидячіе; цвѣты въ пазухахъ листьевъ и развѣтлений стебля на длинныхъ цвѣтоножкахъ; лепестки бѣлые, короче чашечки; чашелистики ланцетные, острые, съ 3 жилками, срединной болѣе толстой.

По сырмъ и тѣнистымъ мѣстамъ. Цвѣтетъ съ середины мая весь іюнь, иногда до середины іюля. Лосипный Островъ (А.).—Иваньково, Лизаветино, Никольское, Братцово (К.).—Серебряный боръ близъ Хорошова, Люблино, Воробьевы горы, Кунцово (П.).—Петровское-Разумовское (С.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Дарьино, Звн. у. (Х.).

376. *M. lateriflora* (L.) Fenzl. Пет. Кр. I, стр. 91.—Бух. II, стр. 15.—Пет., стр. 224.—Кауф. II, № 140.—Гор., № 17.—Цин., № 255.—Кауф. I, стр. 90.

Arenaria lateriflora L. Дв., № 453.—Макс., № 432.



Moehringia lateriflora.

Стебель 5—15 см., опушенный, простой или развѣтленный, съ прямостоящими вѣточками; листья тупые или заостренные, на очень короткомъ черешкѣ, почти сидячіе, обѣ 1—3 жилкахъ, по краямъ и съ нижней стороны по жилкамъ опушенные, овальные, верхніе—продолговатые; 1—2-цвѣтковые полузонтики въ пазухахъ листьевъ на очень длинныхъ цвѣтоножкахъ; лепестки бѣлые, почти вдвое длиннѣе чашелистиковъ, б. ч. тупыхъ, овальныхъ и съ узкой бѣлой каймой.

По опушкамъ, кустарникамъ и по лугамъ, рѣдко. Цвѣтетъ весь іюнь. Находится въ гербаріи Максимовича за № 105.—Близъ Тарутина, Влк. у. (Дв.).—Подъ Серпуховымъ (М.).—Между Зибровымъ и Никифоровымъ, Сри. у. (П.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.). — По Калужской дорогѣ близъ

«Крестовъ» въ лѣсу Лаптева, Пдл. у. (Я. В. Байковъ).

140. *Arenaria* L.

Чашечка 5-листная; вѣнчикъ 5-лепестный; лепестки цѣльные, слабо выемчатые; тычинокъ 10; столбиковъ 3, очень рѣдко 2—4 или 5; коробочка вскрывается 6 мелкими зубчиками, очень рѣдко 4—8 или 10; сѣмена бугорчатая, почковидная, безъ придатка.

377. *A. serpyllifolia* L. Мос., № 4. — F. O., № 5, p. 70. — Пет., стр. 139.—Кауф. II, № 142.—Цин., № 253.—Кауф. I, стр. 90.—Lind., p. 96.—Ann. C. III, № 211.—Дв., № 451.—Макс., № 431.—Hoff. H., № 3417.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 79.—Hoff., № 314.—St. II, p. 27.—St. I, № 301.

Одинъ или нѣсколько стеблей въ 7—20 см., прямостоящихъ или у основанія приподнимающихся, въ верхней части вильчато-вѣтвистыхъ; все растеніе коротко-опушенное, рѣже голое; листья яйцевидные, заостренные, сидѣніе, низшіе — сужены въ черешокъ; цвѣты въ раскидномъ полузонтикѣ; лепестки бѣлые, короче чашечки; чашелистики яйцевидно-ланцетные, заостренные, о 3 жилкахъ; коробочка не длиннѣе чашечки; сѣмена точечныя.

По холмамъ, на паровыхъ поляхъ, по открытымъ и безплоднымъ мѣстамъ, часто. Цвѣтетъ съ первыхъ чиселъ іюня до половины іюля.

α. viscida Loisel.

Верхняя часть стебля, цвѣтоножки и чашечки б. или м. густо покрыты отстоящими железистыми волосками, отчего растеніе въ верхней части слегка клейкое. Успенское, Звн. у. (X.).—Красково. Мос. у. (Куль.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.).



Atriplex repens



Atriplex graminifolia

378. *A. graminifolia* Schrad. Пет. Кр. I, стр. 92.—Пет., стр. 140.—Кауф. II, № 143.—Гор., № 18.

Стебель 15—30 см., прямостоящій, иногда съ приподнимающимися основаніемъ и съ не цвѣтущими вѣтвями; стеблевые листья линейно-шиловидные, по краямъ остро-периохватые, у основанія влагалищно-расширенные, не длиннѣе междоузлій; цвѣты бѣлые, въ вѣтвистомъ полузонтикѣ; чашелистики яйцевидно-округлые, тупые, посредніе зеленые, по краямъ перепончатые, вдвое короче обратно-яйцевидныхъ лепестковъ; коробочка много длиннѣе чашечки.

Найдено въ сосновомъ лѣсу подъ Владимынымъ монастыремъ близъ Серпухова, на песчаной почвѣ (Вар.). — Между Зиборовымъ и Лужками, Срп. у. (Гей.).—Быково, Врн. у. (Куль.).

141. *Stellária* L.

Чашечка 5-лиственная; вѣтчикъ 5-лепестный; лепестки двураздѣльные или глубоко двунадрѣзные; тычинокъ 10, очень рѣдко 5; столбиковъ 3; коробочка вскрывается 6 зубчиками или створками; сѣмена слегка почковидныя, безъ придатка.

1. Стебель цилиндрической; нижніе листья черешковые. 2.

Стебель 4-гранный или ребристый; всѣ листья сидячіе. 3.

2. Стебель съ однимъ рядомъ волосковъ; лепестки не длиннѣе чашелистиковъ. *S. media* (L.) Cyrill.

Стебель кругомъ опушенный, особенно вверху; лепестки вдвое длиннѣ чашелистиковъ. *S. nemorum* L.

3. Листья длинные и узкіе, линейные или ланцетные. 4.

Листья короткіе, продолговатые или овально-ланцетные. 7.

4. Чашелистики съ 3 ясно замѣтными жилками, сходящимися на верхушкѣ; стебель совершенно голый. 5.

Чашелистики безъ жилокъ или съ неясно замѣтными жилками, не сходящимися у верхушки; стебель б. ч. шероховатый. 6.

5. Прицвѣтники зеленые; лепестки вдвое длиннѣ чашечки; цвѣты крупныя. *S. Holostea* L.

Прицвѣтники пленчатые; лепестки не длиннѣ чашечки; цвѣты мелкіе. *S. mosquensis* M. B.

6. Въ нижней части стебля укороченныя, пазушныя вѣтви; лепестки б. ч. не длиннѣ чашечки; пыльники желтые.

S. graminea L.

Въ нижней части стебля никогда не бываетъ укороченныхъ пазушныхъ вѣтвей; лепестки вдвое длиннѣ чашечки; пыльники красноватые. *S. palustris* Retz.

7. Прицвѣтники пленчатые; чашелистики съ 3 ясными жилками; лепестки короче чашечки. *S. uliginosa* Murr.

Прицвѣтники зеленые; чашелистики съ неясными жилками; лепестки б. ч. длиннѣ чашечки или равны ей.

S. crassifolia Ehrh.

379. *S. nemorum* L. Пет. Кр. III, стр. 92. — Бух. II, № 85. — Бух. I, № 77. — F. O., № 5, p. 70. — Пет., стр. 286. — Кауф. II, № 144. — Цин., № 257. — Кауф. I, стр. 92. — Lind., p. 96. — Дв., № 444. — Hoff. H., № 3385. — Gold. C., p. 20. — Mart., p. 79. — St. II, p. 27. — St. I, № 297.

Stellaria Nemorum L. Макс., № 427.

Растеніе съ длинными, тонкими надземными побѣгами; стебель 30—70 см., слабый, приподнимающійся цилиндрической, тонко-бороздчатый, вверху развѣтвленный, б. ч. опушенный, особенно въ верхней части; листья яйцевидные, заостренныя, до развѣтвленія стебля на длинныхъ черешкахъ и съ нѣсколько сердцевиднымъ основаніемъ, верхніе—сидячіе, всѣ по краямъ рѣсничатые; цвѣты на длинныхъ цвѣтоножкахъ въ раз-

вытлеліяхъ стебли и конечные въ полузонтикахъ; лепестки бѣлые, раздвоенные почти до основанія, вдвое длиннѣе чашечки; чашелистики ланцетные, по краямъ перепончатые.

По сырымъ и тѣнистымъ мѣстамъ. Цвѣтеть съ середины мая до конца іюня. Иваньково, Лизаветино, Перерва (К.).—Михайловское, Идл. у. (Б.).—Воробьевы горы, берегъ р. Учи близъ Пушкина (С.).—Лѣсъ по берегу Сенежскаго озера у Богородскаго, Кли. у. (П. и С.).—Дарьино, Зви. у. (Х.).



Stellaria nemorum.



Stellaria media.

380. *S. média* (L.) Cyrill.

Stellaria media Vill. Пет. Кр. I, стр. 92. — Бух. II, № 83. — Бух. I, № 75. —
F. O., № 5, p. 70. — Пет., стр. 286. — Кауф. II, № 145. —
Цви., № 258. — Кауф. I, стр. 92. — Lind., № 96. — Макс.,
№ 426. — Gold. C., p. 19.

Alsine media L. Дв., № 330. — Макс., № 426. — Hoff. H., № 2505. — Mart.,
p. 57. — St. II, p. 19. — St. I, № 210. — Pal., № 600.

Стебель 10—30 см., лежачій, укореняющійся цилиндрической, съ однимъ рядомъ волосковъ; листья яйцевидные, коротко-заостренные, черешковые, верхніе—сидячіе; цвѣты на длинныхъ цвѣтоножкахъ въ пазухахъ листьевъ или въ верхушечныхъ полузонтикахъ, по отцвѣтаніи отогнуты; лепестки бѣлые, столь же длинные, какъ чашечка или короче ея, разсѣченные, иногда безъ лепестковъ; чашелистики яйцевидно-ланцетные, заостренные, опушенные; тычинокъ 3—5.

По лѣснымъ дорогамъ и по огородамъ, очень часто. Цвѣтеть съ середины мая до осени.

α. neglecta (Weihe) Mert. et Koch.

Stellaria media Vill. *β. major* Koch. Кауф. II, стр. 89. — Кауф. I, стр. 92.

Цвѣты съ 10 тычинками. Около Лизаветинской мельницы, по дорогѣ къ Лизаветинской роцѣ (К.).

381. *S. Holóstea* L. Пет. Кр. I, стр. 92. — Бух. II, № 84. — Бух. I, № 76. — Ф. О., № 5, p. 70. — Пет., стр. 286. — Кауф. II, № 146. — Цин., № 259. — Кауф. I, стр. 92. — Lind., p. 96. — Ann. C. V., № 15. — Дв., № 445. — Макс., № 421. — Hoff. H., № 3383. — Gold. C., p. 20. — Mart., p. 79. — Hoff., № 3193. — St. II, p. 27. — St. I, № 299. — Pal., № 906.



Stellaria Holóstea.

Корневище ползучее, съ безцвѣтковыми п цвѣтущими стеблями въ 20—30 см.; стебли прямостоящіе, 4-гранные; листья длинныя, ланцетные или линейно-ланцетные, длинно-заостренные, по краямъ и снизу вдоль жилки остро-шероховатые; цвѣты въ не густомъ полузонтикѣ, бѣлые, на очень длинныхъ цвѣтоножкахъ; лепестки вдвое длиннѣ чашечки, 2-надрѣзные, надрѣзъ до трети лепестка; чашелистики продолговато-заостренные, съ узкимъ бѣлымъ краемъ и безъ ясно-замѣтныхъ жилокъ; прицвѣтники зеленые; коробочка шаровидная, не длиннѣ чашечки.

По лѣсамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ первыхъ чиселъ мая, иногда до половины юня.


382. *S. palustris* Retz. Дв., № 447. — Макс., № 422. — Hoff. H., № 3386. — Gold. C., p. 20. — Mart., p. 79. — St. II, p. 27.

Stellaria palustris Retz. var. *glauca*. Gold. C., p. 20.

Stellaria glauca With. Пет. Кр. I, стр. 92. — Бух. II, № 86. — Ф. О., № 5, p. 70. — Пет., стр. 286. — Кауф. II, № 147. — Цин., № 261. — Кауф. I, стр. 92. — Макс., № 422. — Lon., 283.

Stellaria glauca With. a. *linearis* Frenzl. Бух. I, № 78.

Стебель 20—50 см., слабый, примостонцій, 4-гранный, голый, мало-вѣтвистый, въ нижней части никогда не бываетъ укороченныхъ пазуш-



Stellaria palustris.

ныхъ вѣтвей; листья линейно-ланцетные или линейные, заостренные, по краямъ голые, безъ рѣсничекъ; полузонтикъ о немногихъ цвѣткахъ, обыкновенно съ прямостоящими цвѣтоножками, иногда не бываетъ развѣспытымъ и, влѣдствіе сильнаго развитія верхушки стебля, отклоненъ въ сторону; лепестки бѣлые, б. ч. вдвое длиннѣ чашечки, глубоко-раздѣльные; чашелистики ланцетные, съ 3 жилками и съ перепончатымъ краемъ; пыльники красноватые; коробочка яйцевидно-продолговатая, равна чашечкѣ; съмена крупно-морщинисто-зернистыя; все растеніе б. ч. сизое.

По болотамъ и болотистымъ лугамъ. Цвѣтетъ съ первыхъ чиселъ мая до половины юля. Близъ Михайловскаго, Пдл. у. (В.). — Мытници, истоки р.

Работни близъ дер. Рупосово, Мос. у. (С.).—Тростенское озеро, Ряз. у. (П. и С.).


α. *Dilleniana* Moench. Все растеніе ярко-зеленое. Шиншино, Идл. у., на болѣе сухихъ мѣстахъ (В.).

383. *S. graminea* L. Пет. Кр. I, стр. 93.—Бух. II, № 67.—Бух. I, № 79.—Пет., стр. 286.—Кауф. II, № 148.—Цин., № 262.—Кауф. I, стр. 93.—Lind., p. 96.—Дв., № 446.—Макс., № 423.—Hoff. H., № 3382.—Golg. C., p. 20.—Mart., p. 79.—Hoff., № 3192.—St. II, p. 27.—St. I, № 300.—Pal., № 907.

Stellaria arvensis Hoppe. Макс., № 423.—Mart., p. 79.

Стебель 15—70 см., слабый, приподнимающійся, иногда лежащій, 4-гранный, лоснящійся; листья узко-ланцетные, сидячіе или почти сидячіе, наибольшая ширина ниже средины, иногда у самаго основанія листа; края пленчатыхъ прицвѣтничковъ и края основаній листьевъ часто покрыты рѣсничками; въ пазухахъ нижнихъ листьевъ укороченныя вѣточки; цвѣты въ развѣстномъ полузонтикѣ по отцвѣтаніи съ отогнутыми цвѣтоножками; лепестки бѣлые, глубоко-разсѣченные, б. ч. равны чашелистникамъ, послѣдніе ланцетные, острые, съ 3 ясными, сходящимися у верхушки жилками и съ бѣлымъ пленчатымъ краемъ; сѣмена явственно складчато-морщинистыя.

По лугамъ, паровымъ полямъ и кустарникамъ, очень часто; цвѣтетъ съ половины мая до осени.



Stellaria graminea

α. *lineáris* Fenzl. Пет. Кр. I, стр. 93.—F. O., № 5, p. 70.—Кауф. II, стр. 90.—Кауф. I, стр. 93.

Листья б. ч. линейные, изъ нихъ крупныя б. ч. расшплены къ основанію, а мелкіе часто шловидные; въ сухомъ видѣ края ихъ б. ч. свернуты. Очень часто.

β. *lanceáta* Fenzl. Пет. Кр. I, стр. 93.—F. O., № 5, p. 70.—Кауф. II, стр. 90.—Кауф. I, стр. 93.

Всѣ листья или только крупныя явственно ланцетные, мелкіе же линейные; стебли б. ч. вытянутые, тонкіе, а полузонтикъ развѣсистый, слабый. Иваньково, Соголово, Согольники (К.).—Лукиники, Симоновъ монастырь, Воробьевы горы (П.).—Между Вешняками и Косынымъ (Х.).

γ. *eciliáta* Fenzl. Пет. Кр. I, стр. 93.

Прицвѣтнички и основаніе листьевъ безъ рѣсничекъ. Михайловское, Идл. у. (В.).—Мытницы близъ д. Рупосово (С.).—Ново-Удѣльная Каз. ж. д., между ст. Сходня и Химками Ннк. ж. д. (Х.).

384. *S. mosquensis* M. B. (Marsch. Bieb. ex Schlecht. in Gesellsch. Naturf. Fr. Berl: Mag. VII, p. 195, 1816). Макс., 424.

Stellaria Friesiana Ser. in UC. Prodr. I, p. 397, 1824.

Stellaria longifolia Mühlb. Пет. Кр. I, стр. 93. — Пет., стр. 286. — Кауф. II, № 149. — Цин., № 263. — Кауф. I, стр. стр. 93.

Стебель 15—40 см., слабый, почти лежащий, 4-гранный, кверху шпиль слегка шершавый, с веточками в пазухах всех листьев; листья линейно-ланцетные, сидячие, сужены к основанию, так что наибольшая ширина выше середины листа, острые, у верхнего конца шероховатые; полужонтик 2-раздельный, развесистый; прицветники пленчатые; лепестки белые, глубоко-раздельные, равны чашечке или немного длиннее ее; чашелистики ланцетные, острые, в свежем виде с неясно заметными жилками, в сухом — с срединной жилкой, доходящей до верхушки и двумя боковыми, доходящими до половины и не соединяющимися с срединной; у нас встречается с почти голыми стеблем и листьями.



Stellaria mosquensis

По сырым хвойным лесам и кустарникам, не часто. Цветет с первых чисел июня, почти весь июль. Аннинское — близ границы Бгр. и Брн. у. (Гум.). — Лосинный Остров близ с. Богородского (М.). — Казенный лес близ Бирева, Кн. у.; Хотычн в лесу по ту сторону реки Нерской, Брн. у. (П. и С.).

385. *S. uliginosa* Murr. Пет. Кр. I, стр. 95. — Пет., стр. 287. — Кауф. II, № 151. — Гор., № 19. — Цин., № 264. — Кауф. I, стр. 94. — Дв., № 448. — Gold. C., p. 20. — Mart., p. 79.

Stellaria Alsine Reichardt. Макс., № 425. — Hoff., № 3190.

Stellaria aquatica Pollich. Макс., № 425.



Stellaria uliginosa.

Стебель 10—40 см., 4-гранный, голый, ломкий, простертый или приподнимающийся, с длинными междоузлиями; листья сидячие, продолговато-ланцетные, острые, голые, иногда у основания рёбрачатые, с ясно заметными жилками; цветы в боковых полужонтиках, на длинных цветоножках; прицветники пленчатые, голые; лепестки белые, глубоко-раздельные, короче чашечки; чашелистики с белой каймой, ланцетные, острые, с 3 ясными жилками, равны коробочке; цветоножки по отцветании отогнуты.

По болотам и болотистым берегам в тени, очень редко. В цвету и плодах в половине июля. Сокольники, по ручью близ церкви (С.). — Лосинный Остров близ с. Богородского (М.).

386. *S. crassifolia* Ehrh. Пет. Кр. I, стр. 94. — F. O., № 5, p. 70. — Пет., стр. 287. — Кауф. II, № 150. — Цин., № 260. — Кауф. I, стр. 93. — Авт. С. V, № 16. — Gold. C., p. 20.

Стебель 5—30 см., слабый, голый, 4-гранный, простертый или приподнимающийся; листья мясистые, эллиптически-ланцетные, заостренные, сидячие, голые; цветы одиночные, въ вильчатых развѣтвленіяхъ стебля, на длинныхъ цветоножкахъ, при плодахъ отогнутыхъ; прицвѣтники зеленые, не пленчатые; лепестки бѣлые, немного длиннѣ чашечки; чашелистики ланцетные, острые, съ бѣлой каймой и съ неясными жилками; коробочка яйцевидная, немного длиннѣ чашечки.



Stellaria crassifolia

По болотамъ и берегамъ рѣкъ, любить торфяную почву. Цвѣтетъ съ конца мая весь июнь и июль. Мытищи—Лосинный Островъ (А.). Хорошово—берегъ Москвы р. (К.).—Косино—Черное озеро, торфяное болото у Тарасовской платформы; Тростенское озеро, Руз. у. (П.).—Пушкино—берегъ р. Серебрянки, ст. Мытищи—торфяное болото близъ Шаранова (С.).—Дарьино, берегъ Москвы р., Зви. у. (Х.).

142. *Cerástium* L.

Чашечка 5-лиственная; вѣнчикъ 5-лепестный; лепестки глубоко двураздѣльные или надрѣзные; тычинокъ 10, рѣдко 5; столбиковъ 5; коробочка трубчатая, несколько согнутая, вскрывается 10 зубчиками; сѣмена безъ придатка.

1. Лепестки въ два раза длиннѣ чашечки. *C. arvense* L.
Лепестки равны чашечкѣ. 2.
 2. Верхніе листья и чашелистики съ бѣлымъ, пленчатымъ краемъ. 3.
Верхніе листья и чашелистики зеленые, безъ пленчатого края.
C. glomeratum Thuill.
 3. Верхніе листья и чашелистики наполовину пленчатые, послѣдніе съ выщербленно-зубчатой верхушкой; лепестки 3,5—4,5 мм.
C. semidecandrum L.
- Верхніе листья и чашелистики съ узкой пленчатой каймой, на концѣ острые; лепестки 5—6,5 мм. *C. caespitosum* Gilib.

387. *C. glomeratum* Thuill.

Cerastium vulgatum L. Пет. Кр. I, стр. 96.—Макс., № 434.

Cerastium viscosum Curt., *Cerastium viscosum* L., non herb.

Одинъ или нѣсколько стеблей въ 10—20 см., съ маленькой розеткой прикорневыхъ листьевъ; листья округлые или овальные, тупые, верхніе—сидячіе, нижніе—коротко-черешковые, съ отстоящими, мягкими простыми

и часто железистыми волосками; цветы скучены въ густые полузонтики; плодoжки не длиннѣе чашечки; верхушечные листья и чашелистики зеленые, безъ бѣлой каймы и на верхушкѣ бородастые, 3—4.5 мм. дл., равны чашечкѣ.

Находится въ гербаріяхъ Гофмана и Максимовича.

388. *C. semidecandrum* L. Пет. Кр. III, стр. 96. — Кауф. II, № 153. — Цин., № 267. — Кауф. I, стр. 95. — Дв., № 463. — Макс., № 436. — Mart., p. 82. — St. II, p. 27. — St. I, № 312. — Pal., № 927.

Одинъ или нѣсколько стеблей въ 5—30 см., прямостоящихъ или у основания приподнимающихся; все растеніе железисто- или просто-пушистое; листья продолговато-эллипсидные, тупые, сидячіе, нижніе—на короткихъ черешкахъ; цветы полузонтикомъ; прицвѣтники и чашелистики наполовину перепончатые, на концахъ выцѣрленно-зубчатые, голые; лепестки 3,5—4,5 мм. дл., бѣлые, не глубоко надрѣзные, равны чашелистикамъ; коробочка вдвое длиннѣе чашечки, на сильно отклоненныхъ плодoжкахъ.

Находится въ гербаріи Максимовича.



Cerastium glomeratum.



Cerastium semidecandrum.



Cerastium caespitosum.

389. *C. caespitosum* Gilib.

Cerastium viscosum L. herb. Пет. Кр. I, стр. 96. — Макс., № 435.

Cerastium triviale Link. Бух. II, № 89. — Бух. I, № 85. — F. O., № 5, p. 70. — Пет., стр. 165. — Кауф. II, № 154. — Цин., № 268. — Кауф. I, стр. 95.

Cerastium vulgatum L. Lind., p. 96. — Дв., № 462. — Hoff. II, № 3525. — Gold. C., p. 20. — Mart., p. 82. — St. II, p. 27. — St. I, № 311.

Одинъ или нѣсколько стеблей въ 10—30 см., прямостоящихъ или приподнимающихся, часто укореняющихся; все растеніе б. или м. опушенное простыми и часто железистыми волосками; листья продолговатые или эллипсидные, верхніе—сидячіе, нижніе—коротко-черешковые, верхушечные

листочники и чашелистики по краямъ и на верхушкѣ узко-пленчатые, острые; плодоножки въ 2—3 раза длиннѣе чашечки, отогнутыя; лепестки 5—6,5 мм. дл. бѣлые, равны чашелистикамъ; коробочка въ 2—2¹/₂ раза длиннѣе чашечки.

По кустарникамъ, опушкамъ, паровымъ полямъ и лугамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ мая до осени.

390. *C. arvense* L. Пет. Кр. I, стр. 97.—Мос., № 5.—Пет., стр. 165.—Кауф. II, № 155.—Цин., № 269.—Кауф. I, стр. 95.—Дв., № 465.—Макс., № 437.—Mart., p. 82.—Hoff., № 802.—St. II, p. 27.—St. I, № 313.

Стебель 10—30 см., опушенный, развѣтвленный, простертый, съ укореняющимися не цвѣтущими и приподнимающимися цвѣтущими вѣтвями; листья линейно-ланцетные или линейные, съ укороченными вѣточками въ пазухахъ; лепестки до 12 мм., вдвое длиннѣе чашечки; вѣнчикъ ворончато-колокольчатый; прицвѣтники и чашелистики съ широкимъ, бѣлымъ перепончатымъ краемъ; цветоножки по отцвѣтаніи вверхъ торчащія, съ отклоненной коробочкой, которая въ 1¹/₂—2 раза длиннѣе чашечки.



Cerastium arvense.

По заливнымъ лугамъ и по берегамъ рѣкъ. Цвѣтетъ съ мая до половины іюня. Строгино, Пушкино (К.).—Нижние Котлы (Ш.).—Покровское близъ с. Люберцы (Маев.).—За Хорошовымъ на Москвѣ р. (П. и С.).—Близъ ст. Перловка, М.-Яр. ж. д., у полотна (С.).—Коломенское (Гей.).—Симоновъ монастырь; Серпуховъ противъ Бѣлаго колодца (П.).—Между с. Успенскимъ и Борками, Звн. у. (Х.).

143. *Maláchium* Fr.

Чашечка 5-лиственная; вѣнчикъ 5-лепестный; лепестки глубоко-двураздѣльные; тычинокъ 10; столбиковъ 5; коробочка вскрывается до половины 5 зубчиками, на верхушкѣ раздвоенными.

391. *M. aquaticum* (L.) Fr. Бух. II, № 88.—Бух. I, № 82.—Пет., стр. 220.—Кауф. II, № 152.—Цин. № 270.—Кауф. I, стр. 94.—Lind., p. 98.

Cerastium aquaticum L. Дв., № 466.—Макс., № 438.—Hoff. II, № 3500.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 82.—Hoff., № 801.—St. II, p. 27.—St. I, № 314.

Стебель 30—80 см., лежачій или приподнимающійся, у основанія укореняющійся, съ короткими не цвѣтущими стеблями, сверху железисто-пушистый; листья вѣжные, сердцевидно-яйцевидные, заостренные, сидячіе; самые нижние и на не цвѣтущихъ стебляхъ коротко-черешковые; полузонтикъ развѣсистый, вильчатый; прицвѣтники зеленые, травянистые;

лепестки белые, длиннее чашечки, глубоко-надрезные, с расходящимися долями; чашелистики яйцевидные, тупые, железисто-пушистые; цветоножки по отцветании отогнуты.

По берегам рек, прудов и ручьев и по очень сырým мѣстамъ, въ тѣни. Цвѣтетъ съ первыхъ чиселъ июня до осени. Давыдково, Лизаветино, лѣсъ близъ Ширяева поля въ Сокольникахъ; Сергѣевскій посадъ, Дмт. у. (К.).—Шишкино, Пдл. у. (Б.).—Воробьевы горы; Коломна—берегъ Оки (П.).—Раменское, въ лѣсу, Бри. у. (С.).—Успенское, Зви. у. (Х.).



Malachium aquaticum.



Spargula arvensis

144. *Spérgula* L.

Чашечка 5-листная; вѣнчикъ 5-лепестный; лепестки белые; тычинокъ 5 или 10; столбикъ 5; коробочка вскрывается 5 створками; сѣмена чечевицеобразныя, съ крылатымъ ободкомъ; листья съ пленчатыми прилистниками.

392. *S. arvensis* L. Пет. Кр. I, стр. 90.—Бух. II, № 80.—Бух. I, № 84.—F. O., № 5, p. 70. — Пет., стр. 284. — Кауф. II, № 137. — Цин., № 548.—Pinz., p. 10.—Кауф. I, стр. 88.—Lind., p. 114.—Ann. C. II, № 110.—Дв., № 467.—Макс., № 439.—Нойс. Н., № 3526.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 82.—Hoff., № 3145.—St. II, p. 28.—St. I, № 315.—Pal., № 929.

Стебель 10—40 см., лежачій, приподнимающійся, рѣдко почти прямо-стоящій, сильно вѣтвистый съ самаго основанія; все растение железисто-пушистое; листья шпатовидные, сверху выпуклые, снизу съ продольной бороздкой, тупые; цвѣты белые; лепестки немного длиннее чашечки; чашелистики съ узкимъ белымъ краемъ, покрыты железистыми волосками; сѣмена черныя, съ узкой, гладкой каймой.

Орное, по дорогамъ, огородамъ, паровымъ полямъ и безплоднымъ мѣстамъ, часто. Цвѣтетъ съ первыхъ чиселъ июня до осени.

α. sativa (Bœnngh.) Mert. et Koch.

Spergula arvensis L. α. *sativa* Bœnngh. Бух. I, № 84а. — Кауф. II, стр. 84. — Кауф. I, стр. 88.

Spergula arvensis L. α. *sativa* Koch. Пет. Кр. I, стр. 90. — Бух. II, № 80а.

Сѣмена черныя, весьма мелко шероховатыя.

β. vulgaris (Bœnngh.) Mert. et Koch.

Spergula arvensis L. β. *vulgaris* Bœnngh. Кауф. II, стр. 85. — Кауф. I, стр. 89.

Spergula arvensis L. β. *vulgaris* Koch. Пет. Кр. I, стр. 90.

Сѣмена мелкія, 1—1,5 мм., съ бѣловатыми бугорками, въ послѣдствіи бурлящими; стебель и листья железистые. Полотно ж. д. близъ ст. Соколово Щелковской вѣтви (С.). — Дарьино, въ овсѣ, Звн. у. (X.).

γ. máxima (Weihe) Mert. et Koch.

Spergula arvensis L. γ. *maxima* Weihe. Бух. I, № 84β. — Кауф. II, стр. 85. — Кауф. I, стр. 88.

Spergula arvensis L. γ. *maxima* Koch. Пет. Кр. I, стр. 90. — Бух. II, № 80β.

Сѣмена вдвое крупнѣе, съ такими же бугорками, какъ у *vulgaris*; стебель и листья б. ч. голые. Кусково; Павловскій посадъ, Вгр. у. (П.).

145. *Spergularia* Pers.

Чашечка 5-листная; вѣнчикъ 5-лепестный; лепестки цѣльные; тычинокъ 10 или 5, у основанія каждой тычинки наружнаго ряда по 2 железки; столбиковъ 3; коробочка вскрывается 3 створками; сѣмена треугольно-яйцевидныя, безъ ободка.

393. **S. rúbra Presl.** Пет. Кр. I, стр. 90. — Бух. II, № 81. — Бух. I, № 74. — F. O., № 5, p. 70. — Пет., стр. 284. — Кауф. II, № 138. — Цин., № 546. — Кауф. I, стр. 89. — Lind., p. 114.

Lepigonum rubrum Wahlenb. Ann. C. II, № 111.

Arenaria rubra L. Дв., № 449. — Макс., № 429. — Hoff. II., № 3415. — Gold. C., p. 20. — Gold., Sp., p. 126. — Hoff., № 313. — St. II, p. 27. — St. I, № 302. — Pal., № 908.

Arenaria campestris All. Hoff. II., № 3393. — Mart., p. 80.

Arenaria campestris All. urbana. Mart., p. 80.

Стеблей б. ч. много, 5—20 см., прямостоящихъ, приподнимающихся и лежащихъ, вверху железисто-пушистыхъ; листья б. ч. плоскіе, нитевидные, остроконечные; прилистники яйцевидно-ланцетные, серебристые, б. ч. расщепленные; прицвѣтники почти не короче стеблевыхъ листьевъ; цвѣтоножка во время цвѣтенія почти равна чашечкѣ, по отцвѣтаніи въ 2—3 раза длиннѣе ея; чашелистики ланцетные, туповатые, съ широкимъ перепончатымъ краемъ, немного длиннѣе обратно-яйцевидныхъ, розовыхъ лепестковъ; коробочка почти равна чашечкѣ.



Spergularia rubra

По паровымъ полямъ, дорогамъ и огородамъ, очень часто. Цвѣтеть съ половины мая до осени.

α. campéstris Fenzl. Пет. Кр. I, стр. 91.

Листья очень тонкіе, плоскіе; прилистники сильно доснящіеся, свѣжно-бѣлые, б. ч. расщепленные; чашечка железисто-пушистая; тычинокъ б. ч. 10.


α. pínquis Fenzl. Пет. Кр. I, стр. 91.

Листья толстоватые. въ разрѣзѣ полукруглые; прилистники часто цѣльные, мало-доснящіеся. грязно-бѣлые; число тычинокъ различно, перѣдко 5 и менѣе.

146. *Herniária* L.

Чашечка 5 (4)-раздѣльная; вѣничка нѣтъ или онъ изъ 5 нитевидныхъ лепестковъ, прикрѣпленныхъ, какъ и 5 (4) тычинокъ, къ поднестичному диску; столбикъ очень короткій; рыльце двулопастное; плодъ сухой, односѣмянный, заключенъ въ чашечку; листья съ пленчатыми прилистниками.

394. *H. glábra* L. Мос., № 8.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 199.—Кауф. II, № 279.—Цин., № 542.—Кауф. I, стр. 171.—Lind., p. 112.—Ann. C. I, № 22.—Дв., № 263.—Макс., № 250.—Hoff. H., № 1981.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 46.—St. II, p. 17.—St. I, № 159.—Pal., № 485.



Herniaria glabra.

Маленькое, сильно вѣтвистое растение съ растопыренными и прижатыми къ землѣ стеблями въ 5—15 см., голое или слегка опушенное; листья яйцевидные или продолговато-яйцевидные, къ основанію суженные, свѣтло-зеленые; прилистники бѣловатые, пленчатые, по краямъ съ маленькими рѣсничками; цвѣты голые, желто-зеленые, въ пазушныхъ 7—10-цвѣтковыхъ клубочкахъ; прицвѣтники очень мелкіе, подходят на прилистники.

По песчанымъ открытымъ мѣстамъ, по дорогамъ и паровымъ полямъ, очень часто. Цвѣтеть съ середины мая до осени.

147. *Scleránthus* L.

Чашечка до половины 5-раздѣльная колокольчатая, трубка ея при плодахъ твердѣетъ и отваливается вмѣстѣ съ плодомъ; вѣничка нѣтъ; тычинокъ 10, изъ коихъ 5 безплодныхъ; всѣ тычинки прикрѣвлены къ кольцеобразному диску въ зѣвѣ околоцвѣтника; завязь въ трубкѣ чашечки съ 2 столбиками; плодъ—сѣмянкa; листья безъ прилистниковъ.

395. *S. ánnuus* L. Пет. Кр. I, стр. 168.—Бух. II, № 159.—Бух. I, № 153.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 272.—Кауф. II, № 280.—Цин., № 539.—Кауф. I, стр. 171.—Lind., p. 112.—Дв., № 428.—Макс., № 405.—Hoff. H., № 3203.—Gold. C., p. 19.—Gold. Sp., p. 19.—Mart., p. 76.

Стебли 5—15 см., сильно-вѣтвистые, прямостоящіе, приподнимающіеся или лежачіе, распростертыя, съ одной стороны голые, съ другой—покрыты мелкими, курчавыми волосками; листья линейные, заостренные, сверху плоскіе, снизу выпуклые, нѣсколько мясистые, сидячіе и сросшіеся основаніями, съ очень узкимъ пленчатымъ влагалищемъ, по краю рѣснитчатымъ; цвѣты зеленые, въ развилкахъ стебля и въ конечныхъ полузонтикахъ; доли чашечки острыя, яйцевидно-ланцетныя, съ узкою, бѣлою, перепончатою каймой; плодосная чашечка открытая.

По паровымъ полямъ и посѣвамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ середины мая до осени.



Scleranthus annuus.

2. *agrésitis* Rupr. Пет. Кр. I, стр. 168.—Кауф. II, стр. 172.—Кауф. I, стр. 171.
Стебли б. ч. лежачіе, растопыренные, съ разставленными цвѣтами въ раскидистомъ полузонтикѣ.
3. *arenárius* Rupr. Пет. Кр. I, стр. 168.—Кауф. II, стр. 172.—Кауф. I, 171.
Стебли б. ч. всѣ приподнимающіеся или прямостоящіе, съ прижатými вѣтвями и со сжатыми цвѣтками въ сжатомъ полузонтикѣ.

Порядокъ Ranáles.

38 сем. Nymphaeáceae DC.

Чашелистиковъ 4—5; лепестковъ много, постепенно переходящихъ въ тычинки; тѣ и другіе прикрѣплены къ подпестичному диску или къ завязи, у которой по отвѣтаніи остаются рубцы на мѣстахъ прикрѣпленія лепестковъ и тычинокъ; рыльце сидячее, лучистое или съ двѣ замѣтными лучами; плодъ—многогѣздная кожистая ягода съ ослизняющей мякотью; сѣмена съ двойнымъ бѣлкомъ и съ зародышемъ, лежащимъ у основанія сѣмени во внутреннемъ бѣлкѣ, сидятъ на перегородкахъ. Водныя растенія съ толстымъ ползучимъ корневищемъ, плавающими на длинныхъ черешкахъ листьями и плавающими или торчащими надъ поверхностью воды ярко окрашенными цвѣтами.

148. Núphar Sm.

Чашечка 5-лиственная, внутри желтая, много длиннѣе лепестковъ, плоскіе съ медовою ямочкою на спинкѣ; завязь вполнѣ верхняя; лепестки

и тычинки прикрѣплены къ подпестичному диску; рыльце по краямъ слегка зубчатое, съ мало замѣтными лучами.

396. *N. luteum* (L.) Sm. Пет. Кр. I, стр. 58.—Бух. II, № 26.—Бух. I, № 26.—
F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 229.—Кауф. II, № 38.—
Цин., № 59.—Кауф. I, стр. 37.—Макс., № 494.

Nymphaea lutea L. Lind., p. 86.—Дв., № 473.—Макс., № 494.—Hoff. H.,
№ 3903.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 92.—Hoff., № 2198.—
St. II, p. 31.—St. I, № 352.—Pal., № 1088.

Nenuphar luteum Hayne. Hoff. H., № 3903.

Чашелистики снаружи желтые, къ основанію зеленые; лепестки также желтые; пыльники продолговато-линейные; рыльце вогнуто воронкою, цѣльнокрайнее, о 10—20 лучахъ, не доходящихъ до его краевъ; листья овально-эллиптическіе, до 27 см. дл. и до 16 см. ш., глубоко сердцевидные, концы лопастей б. ч. тупые; черешки листьевъ 3-гранные.

Въ рѣкахъ, озерахъ и прудахъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до половины августа.



Nuphar luteum.



Nuphar pumilum.

397. *N. pumilum* (Timm.) Sm. Пет. Кр. I, стр. 58.—Пет., стр. 229.—Кауф. II,
№ 39.—Цин. № 60.—Кауф. I, стр. 37.

Чашелистики снаружи зеленые; лепестки оранжевые; пыльники почти квадратные; рыльце выпуклое, съ зубчатымъ краемъ, о 8—10 лучахъ, доходящихъ до края; листья овальные, глубоко-сердцевидные, до 18 см. дл. и до 9 см. ш.; черешки листьевъ плоскіе.

Въ рѣкахъ, прудахъ и озерахъ, не часто. Цвѣтетъ съ половины іюня, весь іюль. Влѣзъ Щукіна, въ Лужникахъ (К.).—Противъ Мамоновой дачи по ту сторону Москвы р. въ прудахъ (Петупскій.). — Прудки по берегу Клязьмы между Черкизовымъ и Каргашинымъ (П. и С.).—С. Кудиново.—Чистое озеро, Вгр. у. (Х.).—Влѣзъ д. Верен, Ври. у. (Куль.).—Красный Ставъ на Москвѣ р., Руз. у. (Сюз.).

149. *Nymphaea* L.

Чашечка 4-листная, зеленая, нѣсколько короче лепестковъ паружнаго ряда; рыльце лучистое; лепестки безъ медовой ямочки прикрѣплены на различной высотѣ, какъ и тычинки, къ стѣнкамъ завязи, доходя почти до самаго рыльца, и по отцвѣтаніи оставляютъ рубцы.

398. *N. cándida* Presl. Пет. Кр. I, стр. 56.

Nymphaea biradiata Sommer. Бух. II, № 25.—Бух. I, № 25.—Кауф. II, № 37.—Кауф. I, стр. 37.

Nymphaea alba L. F. O., № 5, p. 70. — Пет., стр. 229. — Цин., № 58. — Lind., p. 86.—Дв., № 473-2.—Макс., № 493.—Hoff. II, № 3901.—Gold. C., p. 20. — Mart., p. 92. — Hoff., № 2196. — St. II, p. 31.—St. I, № 353.—Pal., № 1089.

Castalia speciosa Salisb. Hoff. II, № 3901.—Mart., p. 92.—Hoff., № 2196.

Цвѣты крупныя, бѣлыя; основаніе чашечки четырехугольное; пяти тычинокъ внутренняго ряда шире пыльниковъ, продолговато-обратно-яйцевидныя; пыльцевыя зерна съ мелко-зернистою поверхностью; звѣздчатое рыльце о 6—14 лучахъ (бываетъ и до 20); окраска рыльца б. ч. карминнаго цвѣта, но бываетъ и желтая, а также и смѣшанной окраски: въ срединѣ желтая, постепенно переходитъ къ концамъ въ карминную; завязь подъ звѣздчатымъ рыльцемъ б. ч. сильно перетянута и въ самой верхней части не покрыта тычинками; листья округло-овальные, съ глубокой и узкой сердцевидной выемкой; лопасти листа почти равнобокія и б. ч. острые; нижняя сторона листа бываетъ то зеленой, то фіолетовой.



Nymphaea candida.

По рѣкамъ и озерамъ, очень часто. Цвѣтеть съ половины іюня до начала августа.

39 сем. *Ceratophyllaceae* S. F. Gray.

Растенія подводныя, однодомныя; цвѣты однополые: мужскіе состоятъ изъ 12-листнаго бѣловатаго околоцвѣтника и 12—24 тычинокъ; листочки околоцвѣтника 2—3-зубчатые; тычинки сидячія, съ толстымъ связникомъ, вытянутымъ надъ пыльниками въ б. или м. длинный, 2-зубчатый выростъ; околоцвѣтникъ женскихъ цвѣтовъ зеленоватый, 8—12-листный; завязь верхняя, одногнѣздная, односѣменная, съ одной прямой, висячей сѣменочкой; плодъ — орѣшекъ съ остающимся и вырастающимъ почти въ колочку столбикомъ; сѣмя безъ бѣлка; зародышъ со стебелькомъ и нѣсколькими листовыми мутовками.

150. *Ceratophyllum* L.

399. *C. demersum* L. Пет. Кр. III, стр. 47.—Бух. II, № 390.—Пет., стр. 165.—Кауф. II, № 703.—Цин., № 521.—Кауф. I, стр. 463.—Lind., p. 112.—Дв., № 884.—Макс., № 887.—Hoff. II, № 7551.—Gold. C., p. 23.—Mart., p. 170.—St. II, p. 53.—St. I, № 655.

*Ceratophyllum demersum.*

Стебель тонкий, 30—100 см., къ осени ломкій; листья мутовчатые, темно-зеленые, жесткіе, вильчато-1—2-раздѣльные на 2—4 лнейныя доли, съ одного края зубчатые, острые верхушки зубчиковъ бѣловато-хрящеватыя; тычиночныя нити съ пыльниками, вытянутыя; связникъ выступаетъ надъ пыльниками 2 зубцами; пыльники почти лнейные или ланцетные; плодъ о 3 шишикахъ, изъ конхъ 2 боковые отогнуты книзу, а макушечный — торчащій, равенъ плоду или немного длиннѣе его.

По рѣкамъ, озерамъ, прудамъ и канавамъ, очень часто. Цвѣтетъ въ іюлѣ, плоды въ августѣ.

400. *C. platyacanthum* Chamiss. Пет. Кр. III, стр. 47.

Ceratophyllum submersum L. Пет., стр. 165.—Кауф. II, стр. 477.—Цин., № 520.—Кауф. I, стр. 463.—Поф. Н., № 7552.

*Ceratophyllum platyacanthum.*

Стебель очень тонкій, въ 30—100 см., листья густые мутовчатые, свѣтло-зеленые, мягкіе, вильчато-1—2-раздѣльные, съ одного края очень часто зубчатые; тычиночныя нити кубарчатые; связникъ мало выдается и на верхушкѣ съ короткими зубчиками; плодъ о 3 шишикахъ, изъ нихъ 2 боковые отходятъ отъ плода подъ прямымъ угломъ, сплюснутые, нѣсколько крылатые, какъ и макушечный, равный плоду или почти въ 2 раза длиннѣе его.

По рѣкамъ и прудамъ, не часто. Цвѣтетъ въ іюлѣ. Находится въ гербаріи Гофмана за № 7552, и въ гербаріи Анненкова. Въ Клязьмѣ и въ прудкѣ по берегу Клязьмы близъ Черкизова (С.).

40 сем. *Ranunculaceae* Juss.

Цвѣты обоеполые, правильные, рѣже неправильные, раздѣльнолепестные (у *Delphinium* *Consolida*—спайнолепестные), съ чашечкой и вѣн-

чикомъ или съ одной чашечкой, ярко окрашенной; вѣнчика же либо совсемъ нѣтъ, либо онъ въ видѣ чешуекъ или нитей; расположеніе частей цвѣтка очень разнообразно: у однихъ только кругомъ, у другихъ только спирально, у третьихъ—и кругомъ, и спирально; чашечка 3—5-многолистная; вѣнчикъ 4—5-много-лепестный; завязь верхняя, б. ч. на сильно выпукломъ цвѣтоножѣ; тычинокъ много, прикрѣпленныхъ къ ложу цвѣтка; гнѣзда пыльниковъ вскрываются долевою щелью; свободные пестики состоятъ изъ отдѣльныхъ плодolistиковъ, обыкновенно въ большемъ числѣ, рѣже ихъ 1—3; завязь съ одной или нѣсколькими сѣмечками, сидящими вдоль брюшного лба; плодъ сборный изъ сѣмянокъ (орѣшковъ) или листовокъ, рѣже плодъ—ягода; сѣмена съ большимъ бѣлкомъ и маленькимъ зародышемъ. Б. ч. травянистыя растенія.

Обзоръ сем. *Ranunculaceae* Juss.

I. Helleboreae DC.

Цвѣты правильные или неправильные; чашечка и вѣнчикъ въ почкосложеніи черепчатые; чашечка лепестковидная; лепестки разнообразной формы, часто ихъ нѣтъ; пыльники вскрываются наружу; плоды—листовки, вскрываются внутрь, или же плодъ—ягода.

Caltha, Trollius, Aquilegia, Delphinium, Aconitum, Actaea.

II. Clematideae DC.

Чашечка лепестковидная, въ почкосложеніи складчато-створчатая; пыльники линейные, вскрываются наружу; плоды—односѣменные орѣшки; сѣмечки висятъ; листья супротивные.

Clematis.

III. Anemoneae DC.

Чашечка и вѣнчикъ въ почкосложеніи черепчатые; лепестковъ нѣтъ или они наподобіе железокъ, или же плоскіе безъ медовыхъ ямочекъ; пыльники вскрываются наружу; плоды—сѣмянки (орѣшки); сѣмечки висятъ.

Thalictrum, Hepatica, Pulsatilla, Anemone.

IV. Ranunculeae DC.

Чашечка и вѣнчикъ въ почкосложеніи черепчатые; лепестки у основанія съ медовой ямочкой; пыльники вскрываются наружу; плоды—сѣмянки (орѣшки); сѣмечки прямостоячія.

Myosurus, Ranunculus.

Опредѣлитель родовъ.

1. Цвѣты неправильные. 2.

Цвѣты правильные. 3.

2. Верхній чашелистикъ со шпорой.

Delphinium.

Верхній чашелистикъ безъ шпоры.

Aconitum.

3. Лепестки или чашелистики со шпорами. 4.

Лепестки и чашелистики безъ шпоръ. 5.

4. Цвѣты крупныя, ярко окрашенныя. *Aquilegia*.
 Цвѣты мелкіе, зеленовато-желтыя, невзрачныя. *Myosurus*.
5. Цвѣты скучены въ кисть, метелку или метельчатый щитокъ. 6.
 Цвѣты одиночныя или по нѣскольку на стеблѣ, но не образуютъ
 скученнаго соцвѣтія. 8.
6. Пестикъ одинъ; плодъ—ягода; цвѣты въ головчатыхъ кистяхъ.
Actaea.
 Пестиковъ нѣсколько; плодъ—сѣмянкa (орѣшекъ); цвѣты въ ме-
 телкахъ, кистяхъ или щиткахъ, но не головчатыхъ. 7.
7. Листья супротивныя. *Clematis*.
 Листья очередныя. *Thalictrum*.
8. Пестики многосѣмныя; плодъ—листовка. 9.
 Пестики односѣмныя; плодъ—сѣмянкa (орѣшекъ). 10.
9. Одна 5-листная, желтая чашечка; вѣнчикъ нѣтъ. *Calltha*.
 Чашечка 6. ч. изъ 10 крупныхъ листковъ, собранныхъ шаромъ;
 лепестки мелкіе линейныя, походятъ на тычинки.
Trollius.
10. Листья только корневые; цвѣты одиночныя въ пазухахъ корне-
 выхъ листьевъ. *Hepatica*.
 Растенія со стеблевыми и корневыми листьями или стеблевые
 листья въ видѣ мучовчатыхъ обвертокъ, по отцвѣтаніи на сре-
 динѣ стебля, во время распусканія—близъ цвѣтка. 11.
11. Цвѣты съ чашечкой и вѣнчикомъ. *Ranunculus*.
 Цвѣты только съ чашечкой, окрашенной въ яркій цвѣтъ. 12.
12. Обертка пальчато-многораздѣльная, внизу сросшаяся во влага-
 лище; плодники съ длиннымъ, остающимся на плодѣ пери-
 стымъ столбикомъ. *Pulsatilla*.
 Обертка на срединѣ стебля изъ тройчатыхъ черешковыхъ листьевъ;
 плодники съ короткимъ, не перистымъ, остающимся столбикомъ.
Anemone.

151. *Calltha* L.

Одна ярко окрашенная, 5-листная чашечка; лепестковъ нѣтъ; плодъ
 изъ 5—10 листковъ на плоскомъ цвѣтоложѣ; медовыя ямочки у основа-
 нія плодolistиковъ; сѣмена въ листовкахъ однорядныя.

401. *C. palustris* L. Бух. II, № 17.—Бух. I, № 17.—F. O., № 5, p. 70.—Пет.,
 стр. 153.—Кауф. II, № 27.—Цин., № 46.—Кауф. I, стр. 32.—
 Lind., p. 84.—Ann. C. III, № 202.—Дв., № 518.—Макс.,
 № 534.—Hoff. H., № 4189.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 98.—
 Hoff., № 624.—St. II, p. 32.—St. I, № 382.—Pal., № 1175.

Стебель 20—50 см., толстый, прямостоящій или приподнимающійся,
 вверху вѣтвистый; листья темно-зеленыя, лоснящіеся, какъ и все расте-
 ніе, совершенно голыя; нижніе—черешковые, округло-сердцевидныя, верх-
 ніе—почковидныя, тупо-зубчатыя. Цвѣты крупныя, ярко-желтыя, лосня-
 щіеся.

По болотамъ, у ручьевъ, рѣкъ и по болотистымъ лугамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ конца апрѣля, весь май, иногда второе цвѣтеніе въ сентябрѣ.



Caltha palustris.



Trollius europaeus.

152. *Trollius* L.

Чашелистиковъ обыкновенно 10, крупныхъ; лепестки мелкіе, линейные, у основанія съ голыми медовыми ямочками; тычинокъ много, похожихъ на лепестки; листовокъ много, собранныхъ головкой на выпукломъ цвѣтоложѣ; сѣмена въ листовкѣ сидятъ двурядно.

402. *T. europaeus* L. Бух. II, № 18.—Бух. I, № 18.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 295.—Кауф. II, № 28.—Цин., № 47.—Кауф. I, стр. 32.—Lind., p. 84.—Ann. C. II, № 102.—Макс., № 533.—Hoff. II, № 4182.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 98.—Hoff., № 3358.—St. II, p. 32.—Pal., № 1170.

Trollius Europaeus L. Дв., № 517.—St. I, № 381.

Все растеніе голое; стебель 20—70 см., примостоящій; корневые и нижніе стеблевые листья на длинныхъ черешкахъ, пальчато-пятираздѣльные, съ ромбическими, остро-зубчато-надрѣзными долями; верхніе листья сидячіе; цвѣты крупные, шаровидные; чашелистики (10—15) блѣдно-желтые, широкіе, вогнутые; лепестки узкіе, оранжевые, длиною равны тычинкамъ; листовки собраны въ довольно крупную головку.

По лугамъ, кустарникамъ и лѣснымъ полянамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины мая до середины іюня.

153. *Aquilegia* L.

Чашелистиковъ 5, окрашенныхъ въ цвѣтъ лепестковъ; вѣнчикъ 5-лепестный; лепестки ворончатые, съ косымъ краемъ, основаніе ихъ продолжено въ загнутую крючкомъ шпору, проходящую между чашелистиками; на двѣ шпоры выделяется медъ; тычинокъ много, расположенныхъ кольцами; внутреннія часто безъ пыльниковъ (стаминодіи); листовокъ 5, внизу нѣсколько сросшихся; сѣмена въ нихъ двурядныя.

403. *A. vulgaris* L. Бух. II, № 19.—Бух. I, № 19.—Ф. О., № 5, р. 70.—Пет., стр. 139.—Кауф. II, № 29.—Цян., № 48.—Pinz., р. 9.—Кауф. I, стр. 33.—Lind., р. 84.—Дв., № 488.—Макс., № 500.—Hoff. H., № 4038.—Mart., р. 94.—Lib. Tr., р. 80.—Hoff., № 289.—St. II, р. 31.—St. I, № 358.—Pal., № 1120.

Стебель 30—70 см., прямостоящий, какъ и все растение, голый; листья на длинныхъ черешкахъ; корневые—тройчато-двусложные, съ округлыми лопастными листочками, лопасти ихъ округло-городковья; средние—тройчато-сложные, съ тройчато-раздѣльными листочками; верхние—трехраздѣльные; цвѣты одиночные, на длинныхъ цвѣтоножкахъ, синіе, лиловые, розовые, рѣдко бѣлые; лепестки тупые, къ верхушкѣ слегка выемчатые; шпора ихъ на концѣ согнута крючкомъ, длиннѣ отгиба, который немного короче тычинокъ; внутреннія тычинки, не несущія пыльниковъ, тупыя; чашелистики продолговато-яйцевидные, острые; листовокъ пять.



Aquilegia vulgaris.

Одичалое, по старымъ паркамъ, по лѣсамъ и лугамъ, прилегающимъ къ старымъ усадьбамъ. Цвѣтеть съ конца мая весь іюнь. Кусково, Царицыно, Петровское-Разумовское, Сокольники (К.).—Измайловскій звѣринецъ; старый паркъ близъ Введенскаго—подъ Звенигородомъ (С.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Дарьино, Звн. у., съ махровыми цвѣтами (Х.).—Витенево, Мос. у. (П.).

154. *Delphinium* L.

Чашечка окрашена въ цвѣтъ вѣнчика, 5-листная, верхній чашелистикъ удлинненъ въ шпору; вѣнчикъ или сростнолепестный, и тогда объ 1 шпорѣ, или же о 4 свободныхъ лепесткахъ, изъ коихъ 2 верхнихъ со шпорами, вложенными въ шпору верхняго чашелистика; листовокъ 1—3—5.

404. *D. Consolida* L. Пет., стр. 177.—Кауф. II, № 30.—Цян., № 49.—Pinz., р. 9.—Кауф. I, стр. 33.—Lind., р. 84.—Hoff. H., № 3972.—Gold. C., р. 20.—Mart., р. 93.—St. II, р. 31.—St. I, № 355.—Pal., № 1107.

Delphinium consolida L. Бух. II, № 20.—Бух. I, № 20.—Ф. О., № 5, р. 70.—Дв., № 476.

Стебель 15—60 см., прямостоящий, съ растопыренными вѣтвями; листья многораздѣченные, съ линейными долями; цвѣточная кисть рѣдкая; цвѣты ярко-синіе, лиловые, рѣдко бѣлые; чашечка лепестковидная, пятилистная, верхній чашелистикъ вытянутъ въ длинную шпору; лепестковъ четыре, мало развитыхъ; сросшихся; все растение покрыто прижатыми бѣлыми волосками.

Въ поѣвахъ, по пашнямъ, часто. Цвѣтеть со середины іюня, весь іюль.

405. *D. elatum* L. F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 177.—Кауф. II, № 31.—Цик., № 51.—Кауф. I, стр. 33.—Ann. C. I, № 4.—Дв., № 477.—Gold. Sp., p. 126.—Mart., p. 93.—St. I, № 356.—Pal., № 1111.

Стебель прямостоящий, до 2 м.; листья на черешкахъ, пальчато-пятираздѣльные, доли ихъ трехлопастныя, надрѣзныя, остро - зубчатыя; цвѣточная кисть конечная, очень длинная, довольно густая; цвѣтоножки съ длинными, почти литевидными прицвѣтниками; цвѣты крупныя, синіе; лепестки свободныя, черноватыя, съ желтыми волосками.

По лѣсистымъ берегамъ рѣкъ, по холмамъ и откосамъ на песчаной, перегнойной и известковой почвѣ. Цвѣтеть со середины іюня до середины августа.

α. intermedium DC. Бух. II, № 21.—Бух. I, № 21.—Кауф. II, стр. 21.—Кауф. I, стр. 33.

Delphinium intermedium Soland. Макс., № 497.—Gold. C., p. 20.—Gold. Sp., p. 126. Листья въ очертаніи округлыя, у основанія сердцевидныя, обыкновенно покрыты волосками. Близъ Медвѣдова, Ампиново, Кунцово,



Delphinium Consolida.



Delphinium elatum α. intermedium.



Delphinium elatum β. cuneatum.

Троицкое, Татарово, Братцово; Мячково, Брн. у. (К.). — Берегъ Клязьмы близъ Черкизова; заливной лугъ между Быковымъ и Заозерьемъ, Брн. у. (С.). — По берегу р. Пахры, Пдл. у. (В.). — Бородино, Мож. у. (В.). — Серебряный боръ близъ Хорошова; Лапково, Красный станъ, Руз. у.; Карачеево, Кал. у.; подъ Качабровымъ по заливному лугу р. Истры, Звн. у. (П.). — Денисьево, Звн. у. (Х.).

β. *cuneatum* DC. Кауф. II, стр. 21.—Рупр., стр. 86.—Кауф. I, стр. 34.

Листья у основанія клиновидные, обыкновенно почти голые. Карпачево, К.м. у. (К.).—Заливной лугъ Оки подъ Дракивымъ, Срп. у. (С.)

155. *Aconitum* L.

Цвѣтокъ неправильный: чашечка окрашенная, 5-листная, верхній чашелистикъ въ видѣ шлема; лепестковъ 8, изъ коихъ 2 верхнихъ въ видѣ загнутыхъ шпоръ на длинныхъ ноготкахъ, заключены въ шлемовидномъ чашелистикѣ, остальные лепестки мало замѣтны или ихъ вовсе нѣтъ; листовокъ 3—5.

406. *A. Anthora* L. Пет. Кр. I, стр. 56.—Пет., стр. 130.—Кауф. II, № 32.—Гор., № 3.—Цин., № 52.

Корень веретенообразный, клубневидный; стебель 40—100 см., прямостоящій, коротко-прижато-пушистый; листья 5—7-дланевидные, доли мелко-разсѣченные, лпнейныя, остроконечныя; цвѣты палевые, довольно крупныя, до 30 мм., опушенныя; шлемъ выпуклый; листовокъ обыкновенно пять.

По кустарникамъ на песчаной почвѣ. Цвѣтетъ въ августѣ. Близъ Мужковъ, Срп. у. (К.).—Близъ Зиброва. Срп. у. (Экс. Бот. Лабор.).



Aconitum Anthora



Aconitum excelsum

407. *A. excelsum* Rehb. Пет. Кр. I, стр. 53.

Aconitum septentrionale Mart. Бух. II, № 22.—Mart., p. 94.

Aconitum septentrionale Külle. Бух. I, № 22.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 130.—Кауф. II, № 33.—Цин., № 53.—Рупр., стр. 90.—Кауф. I, стр. 34.—Дв., № 479.—Макс., № 499.—Hoff. H., № 4021.—Gold. C., p. 20.—Gold. Sp., p. 129.—Hoff. № 31.

Aconitum Lycoctonum L. α. Ann. C. II, № 103.—St. I, № 357.

Aconitum Lycoctonum L. β. flor. coerul. St. II, p. 31.

Aconitum septentrionale Martius, non Koelle.

Стебель высокій, въ 1,5—2,5 м.; листья крупныя, мягкіе, сверху темно-зеленыя, почти голыя, на двѣ трети дланевидно-семипраздѣльные, въ очертаніи сердцевидно-округлыя; доли ихъ широко-ромбическія, зубчато-надрѣзныя; надрѣзы остро-зубчатые, узкіе и длинныя; кисть очень длинная; цвѣты б. ч. на длинныхъ ножкахъ, обыкновенно согнутыхъ дугообразно съ горизонтально оттопыренными волосками, такъ же какъ и на цвѣтоносі и его развѣтвленіяхъ; цвѣты крупныя, грязно-лиловыя; шлемъ высокій, булабовидный; средніе чашелистики внутри слегка волосистые, очень короткіе, много короче передняго конца шлема и нижнихъ чашелистиковъ; пестики и листовки голыя.

По большимъ лѣсамъ и гористымъ мѣстамъ, любятъ сырость и тѣнь. Цвѣтетъ съ начала іюня до середины іюля. Кунцово, Воробьевы горы, Останкино, Лизаветино, Зюзино (К.).—Мытищи—Лосинный Островъ; Новый Іерусалимъ, у ограды монастыря, Звн. у. (С.).—Серебряный боръ близъ Хорошова (П.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Дарьино, Звн. у. (Х.).

408. *A. lasiostomum* Rchb. ¹⁾ Пет. Кр. I, стр. 55.

Aconitum Lycoctonum Jacq. Бух. II, № 23.

Aconitum Lycoctonum L. Пет., стр. 130.—Кауф. II, № 34.—Рупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 34.—Lind., p. 84.—Дв., № 478.—Макс., № 498.—Mart., p. 93.—St. II, p. 31.—St. I, № 357.—Pal., № 1113.

Aconitum pallidum Rchb. Цик., № 54.

Aconitum Lycoctonum Jacq et auct. pl., non L.

Стебель 1—1,5 м., рѣдко выше; листья не крупныя, плотныя, вѣскольکو кожистыя, сѣро-зеленыя, дланевидно-трех-пяти-раздѣльныя; доли ихъ широкія, клиновидныя, значительно расходящіяся, не часто и не глубоко надрѣзныя, съ короткими и широкими зубцами; кисть не длинная; цвѣтоножки б. ч. короткія, съ короткими прижатыми волосками; цвѣты довольно крупныя, желтоватыя; шлемъ высоко-коническій, по отцвѣтаніи становится булабовиднымъ и отогнутымъ; средніе чашелистики внутри густо- и длинно-бородатыя, лишь нѣсколько короче передняго конца шлема и нижнихъ чашелистиковъ; пестики и листовки пушистыя.



Aconitum lasiostomum

По гористымъ мѣстамъ, покрытымъ кустарникомъ, по опушкамъ, оврагамъ и склонамъ. Цвѣтетъ съ конца іюня, весь іюль. Лосинный Островъ; близъ Серпухова (К.).—За Давыдовымъ близъ Прохоровской дачи (А.).—Звенигородъ (Дв.).—

¹⁾ Для выясненія постоянства признаковъ этого вида я выкопалъ найденный мною *Aconitum* близъ Невѣрова. Кам. у., и посадилъ въ свой садъ въ условія совершенно отличныя отъ его первоначальнаго мѣстообитанія: въ Невѣровѣ онъ росъ на склонахъ, обращенномъ къ рѣкѣ, почти открытомъ, на опушкѣ лѣса и на легкой перегнойной почвѣ; въ саду же онъ

Михайловское—Костяковский лѣсъ, Пдл. у. (Б.).—Лѣсъ близъ Дракина, Срп. у. (С.).—Оврагъ противъ Пльна на р. Медвѣдкѣ, Клм. у. (П., С. и Сюз.).—Кузьминки; Невѣрово, Бѣлые Колодези, Клм. у.; Березинка, заливной лугъ Оки за Лужками, Срп. у. (П.).—Борисово, Срп. у.; Роднево, Пдл. у. (Х.).

156. *Actaea L.*

Чашечка окрашенная, 4-листная, скоро опадающая; лепестки узкіе, линейные, походятъ на тычиночныя нити, не длиннѣе ихъ, или же лепестковъ пѣтъ; пыльники вскрываются внутрь; пестикъ одинъ; плодъ—многосѣменная ягода.

409. *A. spicata L.* Бух. II, № 24.—Бух. I, № 24.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 131.—Кауф. II, № 35.—Цин., № 55.—Кауф. I, стр. 35.—Lind., p. 84.—Дв., № 469.—Макс., № 495.—Hoff. II., № 3883.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 91.—Hoff., № 38.—St. I, № 349.—Pal., № 1075.

Actaea spicata L. nigra. St. II, p. 31.



Actaea spicata.

Стебель 30—70 см., прямостоящій, голый, наверху иногда коротко-опушенный, бороздчатый; листья длинно-черешковые, въ очертаніи треугольные, тройчато-двуперистые; листочки обратно-яйцевидные, неравно-выемчато-зубчатые, зубцы заостренные; цвѣточная кисть конечная, на длинномъ цвѣтоножѣ; цвѣты мелкіе, желтоватые, скученные; плодъ—лоснящаяся, черная ягода.

По лѣсамъ и гористымъ мѣстамъ, покрытымъ лѣсомъ, часто. Цвѣтетъ съ половины мая до половины іюня. Кунцово, Лизаветино, Воробьевы горы (К.).—Мытищи—Лосинный Островъ (С.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Микнино, Мос. у., Саввинскій монастырь, Звп. у. (Х.).

былъ посаженъ почти въ тѣни, на почвѣ, хотя тоже перегнойной, но съ большимъ количествомъ парниковой земли. Результаты получались поразительные на слѣдующій же годъ. *Aconitum* измѣнилъ весь свой обликъ и сталъ во всѣхъ признакахъ сходенъ съ *Aconitum pallidum* Rehb. (Illustratio specierum *Aconiti* generis. Lipsiae. 1823—27, Tab. L), который былъ описанъ Рейхенбахомъ съ растенія, выведеннаго имъ изъ сѣмянъ, полученныхъ изъ Россіи. Растеніе же, описанное Рейхенбахомъ подъ именемъ *Aconitum lasiostomum* Rehb., Tab. XLIX, получено имъ отъ Бессера изъ-подъ Медыни, Калужской губ. На этомъ основаніи предпочтительнѣе сохранить названіе *A. lasiostomum* Rehb., данное дико произрастающему растенію, передъ названіемъ растенія, выведеннаго изъ сѣмянъ. Ту же форму *Aconitum*, которая получилась путемъ культуры изъ *A. lasiostomum*, но которая иногда встрѣчается и въ дикомъ состояніи растущую въ тѣни, нельзя признать за самостоятельный видъ, а слѣдуетъ соподчинить послѣднему виду какъ его разновидность, удержавъ видовое за нимъ названіе: var. *pallidum* Rehb. Вообще почва и отѣненіе, мнѣ кажется, играютъ большую роль въ общемъ обликѣ этихъ двухъ формъ.

157. *Clématis L.*

Чашечка окрашенная, 4—5-листная, въ почкосложеніи складчато-створчатая; лепестковъ нѣтъ; пыльники вскрываются наружу; пестиковъ много; сѣмечка въ пестикѣ одна, всякая; плодъ — сѣмянка (орѣшекъ), часто съ перисто разрастающимся столбикомъ.

410. *C. récta L.* Пет. Кр. I, стр. 29.— Пет., стр. 169.— Кауф. II, № 1.— Цин., № 2.— Рулр., стр. 86.— Кауф. I, стр. 15.— Borg., p. 690.

Стебель 60 — 150 см., прямостоящій, голый; листья супротивные, перистые; листочки яйцевидные, заостренные, пѣльнокрайніе, на короткихъ черешкахъ; цвѣты бѣлые, собраны въ конечное, щитовидно-метельчатое соцвѣтіе; чашелистики тупые, голые, по наружному краю опушенные; все растеніе низкое; сѣмянка съ перисто-удлиненнымъ столбикомъ.

По лугамъ и кустарникамъ въ пріокской полосѣ и иногда въ старыхъ паркахъ. Цвѣтетъ съ первыхъ чиселъ іюня до половины іюля. Лужки, Срп. у.; Карапчеево, Клм. у. (К.).—Вачманово, Бѣлые Колодези, Клм. у.; Березина, Никифорово, Срп. у.; Карачарово и Хмѣтьево—въ паркѣ, Клм. у. (П.).—Вѣлонесоцкая слобода, Срп. у. (Х.).



Clematis recta

158. *Thalictrum L.*

Чашечка лепестковидная, окрашенная, 4—5-листная, въ почкосложеніи черепчатая, короче тычинокъ; лепестковъ нѣтъ; пестиковъ нѣсколько, съ сидящими рыльцами; плодъ—сѣмянка (орѣшекъ). б. ч. ребристый или иногда крылатый.

1. Тычиночные нити липовыя, булавовидныя, не уже пыльниковъ или даже шире ихъ; сѣмянки на длинныхъ ножкахъ.

T. aquilegifolium L.

Тычинки съ нитями много цвѣта, тонкими или слегка утолщенными къ верхушкѣ; сѣмянки сидячія. 2.

2. Цвѣты б. ч. поникающіе; метелка пирамидальная или узко-пирамидальная; тычинки повислыя; пыльники на концѣ со связникомъ, вытянутымъ въ маленькое остроконечіе. 3.

Цвѣты не поникающіе; метелка щитовидная; тычинки прямостоящія; пыльники на концѣ округлые, безъ остроконечія. 4.

3. Листья 3—4-перистые; соцвѣтіе раскидистое; листочки къ основанію б. ч. округлые; сѣмянки до 5 мм. *T. minus L.*

Листья 2-перистые; соцвѣтіе узкое, не раскидистое; листочки къ основанію клиновидные; сѣмянки до 2 мм. *T. simplex L.*

4. Листочки сверху досягающіе, линейные или продолговато-линейные; сѣмянки съ 8—10 ребрышками. *T. angustifolium Jacq.*

Листья сверху тусклые; листочки обратно-яйцевидные; сѣмянки съ 6 закругленными ребрышками. *T. flavum* L.

411. *T. aquilegifolium* L. Пет. Кр. I, стр. 33.—Бух. II, № 1.—Бух. I, № 1.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 289.—Кауф. II, № 2.—Цин., № 4.—Pinz., p. 9.—Кауф. I, стр. 17.—Lind., p. 82.—Дв., № 499.—Макс.; № 508.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 95.—Hoff., № 3231.—St. II, p. 32.—St. I, № 367.—Pal., № 1153.

Стебель 50—150 см.; листья 2—3-перистые, съ прилистничками у развѣтвленія черешка; листочки у основанія округлые, спереди крупно-городковые, сизые; тычиночныя нити липовыя, булавовидно-расширенныя; сѣмянки на длинныхъ плодоножкахъ, повзрослыя, крылато-четырегранныя.

На полянахъ, въ сырыхъ и тѣнистыхъ мѣстахъ, часто. Цвѣтеть съ середины июня до середины июля. Зыково, Лосинный Островъ, Соколово, Строгино (К.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Воробьевы горы; Сенежское озеро по берегу р. Сестры, Кал. у. (П.).—Дарьино, Звн. у. (Х.).



Thalictrum aquilegifolium



Thalictrum minus

412. *T. minus* L. Пет. Кр. I, стр. 30.—Пет., стр. 290.—Кауф. II, № 3.—Цин., № 5.—Руур., стр. 62.—Кауф. I, стр. 17.—Дв., № 493.—Макс., № 509.—Макс. Пут. II, p. 91.—Mart., p. 95.—St. I, № 364.—Pal., № 1148.

Thalictrum majus Jacq. Кауф. II, № 4.—Цин., № 7.—Руур., стр. 87.—Кауф. I, стр. 18.—Дв., № 496.—Gold. C., p. 20.—Gold. Sp., p. 129.

Thalictrum majus Jacq. a. *genuinum* Kauffm. Кауф. II, стр. 6.—Кауф. I, стр. 19.

Thalictrum ruthenicum Fisch. Герб. Линнекова.

Thalictrum majus Murray. Макс., № 510.

Корешки снаружи сѣроватыя (у *T. simplex*, *angustifolium* и *flavum*—желтоватыя); стебель бороздчатый, 50—150 см.; листья 3—4-перистые, б. ч. съ прилистниками, голые; листочки къ основанію б. ч. округлые, спереди крупно-зубчатые или надрѣзные, съ нижней стороны съ сильно

выступающими жилками; соцветіе раскидистое; пыльники обыкновенно съ длиннымъ остроконечіемъ; тычинки повислыя; сѣмянки б. ч. съ 8 ребрышками.

По заливымъ лугамъ, кустарникамъ и онуникамъ, на известковой, песчаной или перегнойной почвѣ. Цвѣтетъ съ половины іюня до половины іюля.

α. *procerum* Regel. Пет. Кр. I, стр. 30.—Кауф. II, стр. 5.—Кауф. I, стр. 17.

Листочки снизу сизые, сверху темно-зеленые. Перерва, Миусское кладбище; Сернуховъ (К.).—Вешняки (Х.).—Бѣлые Колодези, Протопоново, Клм. у.; Лужки, Срп. у. (П.).—Дракино, Срп. у.; Быково—опушка Михневскаго лѣса, Врп. у. (С.).

β. *virens* Regel. Пет. Кр. I, стр. 30.—Кауф. II, стр. 5.—Кауф. I, стр. 18.

Листочки съ обѣихъ сторонъ одинаковой окраски или снизу немногo блѣднѣе. Сернуховъ, Перерва (К.).—У Лужковъ, Срп. у. (П.).

γ. *appendiculatum* Regel. Пет. Кр. I, стр. 3.—Кауф. II, стр. 6.—Кауф. I, стр. 18.

Листочки крупные, съ обѣихъ сторонъ зеленые; листья съ прилистничками у развѣтвленія черешка. Тюфелева роща подъ Симоновымъ монастыремъ; по дорогѣ къ Лужкамъ, Срп. у.; Протопоново, Клм. у. (П.).—Дракино, Срп. у. (С.).

413. *T. simplex* L. Пет. Кр. I, стр. 31.—Бух. II, № 2.—Бух. I, № 2.—F. O., № 5, p. 70.—Кауф. II, № 5.—Цви., № 8.—Кауф. I, стр. 19.—Lind., p. 82.—Ann. C. V, № 1.—Макс., № 514.—Hoff. H., № 4119.—Gold. C., p. 20.

Корешки желтоватые; стебель бороздчатый, 40—120 см.; листья 2-перпестые, б. ч. съ прилистниками; листочки къ основанію клиновидные,



Thalictrum simplex.



Thalictrum angustifolium.

продолговатые, спереди съ тремя крупными зубцами, рѣже цѣльные; соцветіе — узкая пирамидальная метелка; цвѣты повисшіе; пыльники съ остроконечіемъ; тычиночныя нити розовыя; рыльце у основанія стрѣльчатое; сѣмянки б. ч. съ 8 ребрышками.

По кустарникамъ, опушкамъ и полянамъ, на сырой почвѣ, очень часто. Цвѣтетъ со середины іюня до середины іюля.

414. *T. angustifolium* Jacq. Пет. Кр. I, стр. 32. — Бух. II, № 3. — Бух. I, № 3. — Пет., стр. 289. — Кауф. II, № 6. — Цин., № 9. — Кауф. I, стр. 19. — Lind., p. 82. — Дв., № 494. — Макс., № 511. — Hoff. H., № 4092. — Gold. C., p. 20. — Mart., p. 95. — Hoff., № 3230. — St. II, p. 32. — St. I, № 362. — Pal., № 1151.

Стебель 50—150 см., бороздчатый, голый или покрытый волосками; листья 2—3-перистые; листочки продолговато-линейные или линейные, сверху лоснящиеся, темно-зеленые, снизу б. ч. покрыты волосками и свѣтлѣе, безъ прилистничковъ у развѣтвленія черешка листа; нижніе листья съ немногомъ вздутымъ, ребристымъ влагалищемъ; околоцвѣтныя и тычиночныя нити желтые; тычинки торчащія: пыльники б. ч. тупые, безъ остроконечія.

По сырымъ лугамъ, кустарникамъ и болотамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюня, весь іюль.

2. *stenophyllum* Koch. Пет. Кр. I, стр. 32.

Thalictrum angustifolium Jacq. 2. *stenophyllum* Jacq. Бух. II, № 3 2. — Бух. I, № 3 2. *Thalictrum angustifolium* Jacq. 2. *stenophyllum* Wimm. et Grab. F. O., № 5, p. 70. — Кауф. II, стр. 7. — Кауф. I, стр. 20.

Thalictrum galioides Nestl. Дв., № 497. — Макс., № 512. Hoff. H., № 4102.

Листочки у нижнихъ листьевъ линейные, заостренные, у верхнихъ — почти ланцетные. Михайловское, Пдл. у. (Б.). — Быково — Михневскій лѣсъ, Брн. у. (С.). — Красниково болото за Б. Мытищами, Раменки, Кузьминки (П.).

3. *heterophyllum* Koch. Пет. Кр. I, стр. 32.

Thalictrum angustifolium Jacq. 3. *heterophyllum* Wimm. et Grab. Бух. II, № 3 3. — Бух. I, № 3 3. — Кауф. II, стр. 7. — Кауф. I, стр. 20.

Thalictrum angustifolium Jacq. 3. *heterophyllum* Gaud. Pinz., p. 9.

Листочки у нижнихъ листьевъ продолговатые, у верхнихъ — линейные, все нераздѣльные или конечные раздѣлены на три доли. Михайловское — Масловскій лѣсъ, Пдл. у. (Б.). — Воробьевы горы (П.).

4. *laserpitifolium* Koch. Пет. Кр. I, стр. 32.

Thalictrum angustifolium Jacq. 4. *laserpitifolium* Willd. Бух. II, № 3 4. — Бух. I, № 3 4. — F. O., № 5, p. 70. — Кауф. II, стр. 8. — Кауф. I, стр. 20.

Thalictrum angustifolium Jacq. 4. *platyphyllum* Goldb. Hoff. H., № 4092.

Thalictrum lucidum L. Дв., № 498. — Макс., № 513.

Листочки на ветвяхъ листьяхъ продолговатые, цѣльные или конечные раздѣленные на три доли или зубчатые. Стрѣнно, Тулуновская мельница, Спаское (К.). — Михайловское — Масловскій лѣсъ, Пдл. у. (Б.). — Воробьевы горы (П.). — Салтыковка (Куль.). — По лѣвому берегу р. Мбчи противъ д. Родневой, Пдл. у. (Х.).

415. *T. flavum* L. Пет. Кр. I, стр. 33. — Бух. II, № 4. — Кауф. II, № 7. — Цин., № 10. — Кауф. I, стр. 20. — Lind., p. 82. — Дв., № 495. — Макс., № 515. — Hoff. H., № 4100. — Gold. C., p. 20. — Mart., p. 95. — Hoff., № 3233. — St. II, p. 32. — St. I, № 366. — Pal., № 1152.

Стебель 80—150 см., бороздчатый, голый; листья 2—3-перистые, съ прилистниками; листочки покрыты железистыми волосками, обратно-лицевидные, къ основанію клиновидные, иногда округлые, спереди крупнозубчатые, сверху темно-зеленые, тусклые, снизу сѣро-зеленые; соцветіе скученное, щитковидное; цвѣты скученные, прямо-торчащія; околоцвѣтникъ бѣловатый; пыльники съ округлыми концами безъ остроконечія; сѣмянки торчащія, съ 6 закругленными ребрышками.

По заливнымъ лугамъ и сырымъ мѣстамъ, покрытымъ кустарникомъ, не часто. Цвѣтетъ весь июль.

2. *genuinum* Regel. Пет. Кр. I, стр. 33.—Кауф. II, стр. 8.—Кауф. I, стр. 20.

Развѣтвленія черенка листа съ прилистниками. Спасское (К.). — Лоспный Островъ (А.). — По берегу р. Пахры, Идл. у. (Б.). — Г. Воскресенскъ, Звн. у. (П.). — Успенское, Звн. у. (Х.).

3. *rufinerve* Regel. Пет. Кр. I, стр. 33.—Бух. I, № 4.—Кауф. II, стр. 8.—Кауф. I, стр. 21.

Развѣтвленія черенка листа безъ прилистничковъ. Серпуховъ (К.). — Лоспный Островъ (А.). — Быково, на заливномъ лугу, Брн. у. (С.).



Thalictrum flavum.



Hepatica triloba.

159. *Hepática* Gilib.

Околоцвѣтникъ лепестковидный, о 5—10 лепесткахъ, съ обверткой изъ 3 зеленыхъ цѣльныхъ листочковъ въ видѣ чашечки, болѣе короткихъ, чѣмъ листочки околоцвѣтника; сѣмянки съ короткимъ столбикомъ.

416. *H. triloba* Gilib.

Hepatica triloba Chaix. Пет. Кр. I, стр. 34.—Пет., стр. 198.—Цин., № 17.—Рупр., стр. 89.—Макс., № 507.—Нoff. II., № 4053.

Anemone Hepatica L. Кауф. II, № 8.—Кауф. I, стр. 22.—Дв., № 486.—Макс., № 507.—Pal., № 1133.

Anemone hepatica L. Ф. Б., № 1.—F. O., № 5, p. 70.

Корневище бурое, покрытое продолговатыми чешуйками; все растение 8—15 см.; цветочные стрѣлки въ пазухахъ прошлогоднихъ листьевъ, мохнатыя, одноцвѣтковые: подъ околоцвѣтникомъ три листика, похожихъ на чашечку; цвѣтки о 5—10 лепесткахъ, на концѣ округлыхъ, б. ч. лиловыхъ, иногда бѣлыхъ или розовыхъ; пыльники бѣлые, на розовыхъ тычиночныхъ нитяхъ; листья появляются послѣ цвѣтенія, сердцевидные, раздѣленные на три овальныя, слегка заостренныя лопасти.

По лѣсамъ и кустарникамъ, не часто. Цвѣтеть съ половины апрѣля и въ началѣ мая. Подъ Клиномъ (Дв.).—За Завидовской ст., Кля. у. (К.).—Кусково (Ш.).—Петровское-Разумовское (Бор.).—Порѣчье, Мож. у. (М. и В.).—Близъ с. Михайловскаго, Звн. у. (Ф. О.).—С. Троицкое, Илл. у. (Руничъ).—Хвостово, Кля. у. (П. и С.).—Карачарово на Волгѣ, Кля. у.; Машино, Дмит. у. (П.).

160. Pulsatilla Tourn.

Околоцвѣтникъ окрашенный, лепестковидный, 5—6-лиственный; обертка при основаніи сросшаяся во влагалище, отодвинута отъ околоцвѣтника; между околоцвѣтникомъ и тычинками иногда находятся медоносныя стаминодіи; плодники съ длинными, перпендикулярными, разрастающимися столбиками.

417. *P. patens* (L.) Mill. Пет. Кр. I, стр. 35.—Пет., стр. 254.—Цин., № 14.—Hoff. Н., № 4054.—Gold. Sp., p. 129.

Anemone patens L. Кауф. II, № 9.—Кауф. I, стр. 22.—Ann. C. I, № 1.—Дв., № 487.—Макс., № 501.—Gold. C., p. 20.—St. II, p. 32.

Pulsatilla vulgaris Mill. Mart., p. 94.

Anemone Pulsatilla L. Кауф. II, стр. 10.—Кауф. I, стр. 23.—Дв., № 488.—Макс., № 502.—Mart., p. 94.—Lib. Tr., p. 2.—St. II, p. 32.—St. I, № 360.—Pal., № 1135.

Pulsatilla pratensis Mill. Mart., p. 94.

Anemone pratensis L. Кауф. II, стр. 10.—Цин., № 16.—Кауф. I, стр. 23.—Дв., № 489.—Макс., № 503.



Pulsatilla patens.

Корневище горизонтальное, деревянистое; корневые листья на длинныхъ черешкахъ, пальчато-раздѣльные, тройчатые, доли ихъ клиновидныя, о двухъ-трехъ зубцахъ или надрѣзахъ; обертка въ срединѣ стебля сросшаяся при основаніи, ланцетовидно-надрѣзная съ узкими линейными надрѣзами; цвѣтокъ одиночный, крупный, широко-колокольчатый, вначалѣ поникшій, потомъ почти торчащій и раскрытый, лиловый, иногда бѣлый или блѣдно-розовый, о 6 лепесткахъ; лепестки, какъ и все растение, покрыты снаружи густыми, длинными серебристыми волосками; растение въ 10—30 см.

По лѣсамъ, кустарникамъ и открытымъ

мѣстамъ. Цвѣтеть съ половины апрѣля и иногда въ первыхъ числахъ мая; плоды съ конца мая; иногда второе цвѣтеніе въ концѣ августа. Кузьминки, Хорошово, Щукино; Серпуховъ (К.).—Лужки, Соколова пустынь, Сри. у. (П.).—Тюфелева роща близъ Симонова монастыря (Х.).

161. *Anemone L.*

Околоцвѣтникъ лепестковидный, окрашенный, 5—6-лиственный; обертка въ видѣ тройчатыхъ стеблевыхъ листьевъ на срединѣ стебля, походить на корневые листья; плодники съ короткими, не перистыми столбиками.

1. Цвѣты желтые.

A. ranunculoides L.

Цвѣты бѣлые или розовые. 2.

2. Растеніе съ стеблевыми и корневыми листьями. *A. silvestris L.*

Растеніе только съ стеблевыми листьями. *A. nemorosa L.*

418. *A. silvestris L.* Пет. Кр. I, стр. 35.—Пет., стр. 137.—Кауф. II, № 10.—Цин., № 13.—Pinz., p. 9.—Рупр., стр. 87.—Кауф. I, стр. 23.—Ann. C. IV, № 1.—Дв., № 490.—Макс., № 505.—Mart., p. 95.—Pal., № 1137.

Корневище короткое, бурое; стебель 15—30 см., съ нѣсколькими корневыми листьями на длинныхъ черешкахъ, 5-раздѣльными, съ ромбическими надрѣзными долями; три стеблевыхъ листа на черешкахъ такіе же, какъ и корневые; стебель, черешки, нижняя сторона листьевъ и лепестковъ пушистые; цвѣты крупные, бѣлые, иногда снизу съ лиловатымъ оттѣнкомъ; лепестки продолговато-яйцевидные, округлые, иногда на концѣ выемчатые; плодники покрыты бѣлымъ войлокомъ.



Anemone silvestris.

По кустарникамъ и холмамъ на глинистой или известковой почвѣ. Цвѣтеть весь май, иногда и въ первыхъ числахъ іюня. Мячково, Брн. у.; Лужки, Сри. у.; Карапчево, Протопопово, Невѣрово, Кзм. у. (К.).—Нижніе Котлы (А.).—Нахрино, Пдл. у. (Ген.).—Роднево, Пдл. у.; Пески, М.-Ряз. ж. д., Кзм. у. (Х.).—Бѣлые Колодези, по берегу р. Коломенки противъ Павлѣва, Кзм. у.; подъ Туровымъ, между Никифоровымъ и Лопасней, Сри. у. (П.).—По берегу Москвы р. противъ Краснаго стана, Руз. у. (Сюз.).—Холмы близъ Боровскаго кургана, Брн. у. (С.).—Рождество на Нарѣ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).

419. *A. nemorosa L.* Пет. Кр. I, стр. 36.—Бух. II, стр. 9.—Ф. Б., № 2.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 137.—Кауф. II, № 11.—Гор., № 1.—Цин., № 12.—Кауф. I, стр. 23.—Lind., p. 82.—Дв., № 491.—Макс., № 504.—Hoff. H., № 4065.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 95.—Lib. Tr., p. 98.—Hoff., № 212.—St. II, p. 32.—St. I, № 361.—Pal., № 1139.

Корневище ползучее, бурое, несколько мясистое, съ глазами от прошлогоднихъ стеблей; стебель одинъ, 10—20 см., безъ корневыхъ листьевъ; все растеніе покрыто рѣдкими, короткими волосками; стеблевые листья сложно-тройчатые, на длинныхъ черешкахъ, равныхъ половинѣ отгиба листа; всѣ доли надрѣзочно-зубчатые, средняя доля иногда 3-раздѣльная, у основанія клиновидная, боковыя — двураздѣльныя, основаніе ихъ неравнобокое; цвѣтокъ верхушечный, одиночный, бѣлый, нижняя сторона его часто бываетъ розовая или свѣтло-лиловая.

По кустарникамъ, лѣсамъ и оврагамъ, любить влажную почву. Цвѣтеть съ половины апрѣля. Михалково близъ Петровскаго-Разумовскаго (Б.). — Ильинское близъ Можайска и Порѣчье — имѣніе гр. Уварова, Мож. у. (В.). — Кля. и Пдл. у. (село Троицкое — Цин.). — Въ Дубровницкомъ лѣсу на правомъ берегу р. Десны, Пдл. у. (Байковъ). — Между Болтинвымъ и Копанью и около Шаликова, Вер. у. (Ф. Б. и Ф. О.). — Около ст. Мухино, Руз. у. (Г.). — Въ Клементьевѣ на берегу р. Исконы и подъ Краснымъ Станомъ, Руз. у.; близъ ст. Кубинка, Вер. у. (Сюз.).

α. *violacea* Mart. Пет. Кр. I, стр. 36. — Mart., p. 95.

Съ свѣтло-лиловыми цвѣтами.



Anemone nemorosa.



Anemone ranunculoides

420. *A. ranunculoides* L. Бух. I, № 5. — F. O., № 5, p. 70. — Пет., стр. 137. — Кауф. II, № 12. — Цин., № 11. — Кауф. I, стр. 24. — Ann. C. I, № 2. — Дв., № 492. — Макс., № 506. — Hoff. II, № 4068. — Gold. C., p. 20. — Mart., p. 95. — Lib. Tr., p. 204. — Hoff., № 216. — St. II, p. 32. — St. I, № 362. — Pal., № 1140.

Anemone Ranunculoides L. Бух. II., № 5.

Корневище горизонтальное; стебель 10—25 см., безъ корневыхъ листьевъ, съ одними стеблевыми; листья б. ч. голые, на очень короткихъ

черешкахъ, тройчатые; доли ихъ надрѣзныя и зубчатые; цвѣты б. ч. одиночные; околоцвѣтникъ желтый, снизу слегка опушенный.

По лѣсамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины апрѣля до середины мая.

162. *Myosúrus* L.

Чашелистиковъ 5, окрашенныхъ и у основанія вытянутыхъ въ короткую шпору; лепестковъ 5, съ длиннымъ нитевиднымъ погонкомъ и медовою ямочкою у основанія узкой пластинки; тычинокъ 5—10; цвѣтоложе цилиндрическое, по отцвѣтаніи сильно вытягивающееся, съ многочисленными, спирально расположенными сѣмянками (орѣшками).

431. *M. mínimus* L. Бух. II, № 6.—Бух. I, № 6.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 226.—Кауф. II, № 13.—Цин., № 20.—Кауф. I, стр. 24.—Апп. С. II, № 101.—Дв., № 338.—Макс., № 318.—Нoff. H., № 2588.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 89.—Нoff., № 2158.—St. II, p. 20.—St. I, № 216.



Myosurus minimus.

Маленькое, однолѣтнее растеніе въ 2—10 см., съ волокнистымъ корнемъ и съ розеткою язычковидныхъ, почти линейныхъ, голыхъ листьевъ; стрѣлки одноцвѣтковыя, въ пазухахъ листьевъ; цвѣтоложе цилиндрическое, нитевидное.

Между посѣвами и по паровымъ полямъ, очень часто. Цвѣтетъ весь май и иногда до половины іюня.

163. *Ranúnculus* L.

Цвѣты съ 5-листной чашечкой и 5-лепестнымъ вѣнчикомъ; лепестки у основанія съ медовою ямочкою, иногда прикрытой небольшою чешуйкою; тычинокъ и пестиковъ много, послѣдніе на выпукломъ цвѣтоложѣ и расположены спирально; плодъ—сѣмянки (орѣшки).

1. Цвѣты бѣлые. 2.

Цвѣты желтые. 4.

2. Листья сидячіе, вѣ воды съ растопыренными сегментами; тычинокъ много—отъ 15 до 21; рыльце усажено булавовидными сосочками; цвѣтоложе на верхушкѣ шаровидное.

R. circinatus Sibth.

Листья черешковые, вѣ воды спадающіеся въ кисть; тычинокъ не выше 11; рыльце усажено цилиндрическими сосочками; цвѣтоложе на верхушкѣ коническое. 3.

3. Цвѣты до 12 мм. въ поперечникѣ; лепестки съ 7 жилками; тычинокъ 9—11.

R. pseudoflaccidus.

Цвѣты 6—7 мм. въ поперечникѣ; лепестки съ 5 жилками; тычинокъ б. ч. 8.

R. confervoides Fr.

4. Всѣ листья цѣльные, не раздѣльные, цѣлюкрайніе или слегка зубчатые. 5.

Все листья, иногда кроме корневыхъ, глубоко пальчато-раздѣльные. 8.

5. Листья мутовчатые, ланцетные; цвѣты очень мелкіе; растеніе водяное; сѣмянки шаровидныя, безъ каймы.

R. polyphyllus W. K.

Листья очередные; сѣмянки б. ч. окаймленные. 6.

6. Листья округло-сердцевидные, лоснящіеся. *R. Ficaria* L.

Листья ланцетные, не лоснящіеся. 7.

7. Стебель приподнимающійся или лежачій; цвѣты мелкіе; сѣмянки съ короткимъ носкомъ.

R. Flammula L.

Стебель прямой, высокій, полый; цвѣты крупныя; сѣмянки съ широкимъ, сплюснутымъ и согнутымъ носкомъ.

R. Lingua L.

8. Цвѣты мелкіе; лепестки не крупнѣе 4 мм.; листья мясистые; сѣмянки очень мелкія, морщинистыя. *R. sceleratus* L.

Цвѣты крупныя; лепестки крупнѣе 4 мм.; листья не мясистые; сѣмянки не морщинистыя. 9.

9. Чашелистики отогнутые, прижатые къ цвѣтоножкамъ; стеблевые листья тройчато-разсѣченные; основаніе стебля или корни утолщены. 10.

Чашелистики не отогнуты, стебель и корни не утолщены. 11.

10. Доли листьевъ 2—3-раздѣльныя, зубчатые; стебель и черешки листьевъ покрыты отстоящими волосками; основаніе стебля утолщено луковицеобразно. *R. bulbosus* L.

Доли листьевъ линейно-ланцетныя, цѣлюкрайнія; все растеніе шелковисто-мохнатое; корни утолщены въ продолговатые клубни.

R. illyricus L.

11. Сѣмянки бархатистыя или волосистыя; корневыхъ листьевъ одинъ или нѣсколько цѣльныхъ, не раздѣльныхъ или 3—5-лопастныхъ, округло-почковидныхъ, очень рѣдко корневые листья раздѣльные; стеблевые листья глубоко пальчато-раздѣльные, какъ бы мутовчатые. 12.

Все корневые листья глубоко пальчато-раздѣльные; сѣмянки голыя. 13.

12. Корневыхъ листьевъ нѣсколько, изъ нихъ 1—2 всегда надрѣзные; стеблевые листья линейные; носикъ у сѣмянокъ съ самаго основанія согнуть крючкомъ. *R. auricomus* L.

Только 1 (2) большой, округлый корневой листъ и нѣсколько пленчатыхъ влагалищъ у основанія стебля; стеблевые листья ромбическо-ланцетные, зубчатые; носикъ у сѣмянокъ длинный, согнутый только на концѣ.

R. cassubicus L.

13. Стебель съ ползучими побѣгами; нижніе листья тройчатые.

R. repens L.

Стебель безъ ползучихъ побѣговъ; все листья пальчато-раздѣльные. 14.

14. Цвѣтоножки глубоко бороздчатыя; плодоложе щетинистое. 15.

Цвѣтоножки гладкія или слабо бороздчатыя; плодоложе голое.

R. acer L.

15. Нижніе листья съ линейными, глубоко-раздѣльными долями; сѣмянки съ сплюснутымъ, короткимъ и загнутымъ крючкомъ носикомъ.

R. polyanthemos L.

Нижніе листья съ широкими, почти ромбическими, 3—5-зубчатыми долями; сѣмянки съ длиннымъ, тонкимъ, скрюченнымъ носикомъ.

R. nemorosus DC.

I. Batrachium DC. Лепестки бѣлые, у основанія желтые, съ медовой ямочкой, не прикрытой чешуйкой; сѣмянки поперекъ морщинистыя.

422. *R. pseudoflaccidus* n. sp.¹⁾.

Ranunculus aquatilis L. Пет. Кр. I, стр. 39-41.—Макс., № 517.—Макс. Пущ. II, р. 91.

Ranunculus aquatilis L. β . *brevifolius* Rossm. Пет. Кр. I, стр. 42.

Ranunculus flaccidus Pers. Бух. II, № 8.—Бух. I, № 8.—F. O., № 5, р. 70.—Пет., стр. 255.—Кауф. II, № 15.—Мил., № 1.—Гор., № 1.—Цин., № 22.

Ranunculus flaccidus Bönning. Pinz., р. 9.

Ranunculus fluitans Lam. Кауф. I, стр. 27.—Дв., № 516.

Ranunculus heterophyllus Wigg. Gold. C., р. 20.

Ranunculus fluvialis Wigg. Mart., р. 98.

Листья почти равны междоузліямъ или длиннѣе ихъ, черешковые съ волосистымъ влагалищемъ короче черешка, повторно — 3-разсѣченные на прямые волосовидныя расходящіяся, мягкія доли, внѣ воды спадающіяся въ кисть; изъ 3 первыхъ сегментовъ средній короче боковыхъ и раздѣленъ на меньшее число долей, концы послѣднихъ съ 2—3, рѣдко 4 щетинками; цвѣты бѣлые, не выше 12 мм. въ поперечникѣ; лепестки обратно-йцевидные, въ $1\frac{3}{4}$ раза длиннѣе ширины, съ 7 жилками; тычинокъ б. ч. 10, рѣже 11 или 9, длиннѣе плодниковой головки почти шаровидной, до 3 мм. въ поперечникѣ, съ большимъ числомъ плодниковъ; рыльца тонкія изогнутыя, усаженные длинными цилиндрическими сосочками; цвѣтоложе на верхушкѣ коническое; плодоложе коническо-цилиндрическое, усаженное длинными щетинками; сѣмянокъ въ головкѣ до 30.



Ranunculus pseudoflaccidus.

¹⁾ *Ranunculus pseudoflaccidus* sp. nov.

Folia omnia submersa, internodiis subaequantia vel longiora, petiolata, vagina auriculata adpresse pilosa petiolo breviora, repetito-trichotoma in segmentis capillaceis diver-

По рѣкамъ и ручьямъ. Цвѣтетъ съ конца мая до конца іюля. Въ р. Сѣтунь (Н.).—На 17 верстѣ Брянской ж. д.—въ р. Сѣтунь; Трутѣево, Руз. у. (Х.).—Въ Кля. у. (Семеновъ).—Близъ с. Екатериновскаго, Звени. у. (Дубровинъ).—Никифорово, Серп. у. (Экс. Бот. Лаб.).—По теченію р. Войны, Колодч. п. р. Москвы и близъ Борпсова, Мож. у. (М.).—Михайловское, Пдл. у. (В.).—Близъ с. Сурмина въ р. Комарихѣ, Дмит. у. (П. и С.).—Въ р. Яхро-мѣ близъ Шустова, Дмит. у.; Карчагино, Захарово, Кля. у.; Сѣкпринно, Пдл. у. (П.).—Красный Станъ, Руз. у. (Сюз.).

α. emersus.

Ranunculus divaricatus Schrank β. *terrestris*. Бух. II, № 7β.—Бух. I, № 7β.

Растеніе очень маленькое съ сильно переплетающимися стеблями и мелкими листыми съ болѣе толстыми, нѣсколько сплюснутыми дольками. Растетъ въ очень мелкой водѣ и заходитъ на прибрежный песокъ внѣ воды. Сѣкпринно въ р. Пахрѣ, Пдл. у. (П.).—Р. Сѣтунь близъ 17 версты М.-Брянск. ж. д. (П. и Х.).

423. *R. confervoides* Fr.

Листья замѣтно короче междуузлій, черешковые, съ влагалищемъ короче черешка, повторно-3-раздѣченные на прямые волосовидныя доли; изъ 3 первыхъ сегментовъ средній короче боковыхъ и раздѣленъ на меньшее число долей, оканчивающихся 2—3, рѣдко 4 щетинками; внѣ воды листья обыкновенно слипаются въ кисти; цвѣты бѣлые, въ поперечникѣ 6—7 мм.; лепестки продолговато-обратно-лицевидные, вдвое длиннѣе шп-

gentibus, mollibus, flaccidis fissa et extra aquam vulgo collabentibus; segmenta media lateralibus breviora et in laciniis minus numerosis divisa, supremis apice setis 2—3, rarius 4 munitis; flores 12 mm. diametro non excedentes; petala obovata, septemnervia; stamina plerumque 10, rarius 9 vel 11, carpellorum capitulum subglobosum, 3 mm. in diametro, superantia; carpella numerosa, achenia in capitulo maturo sub 30; stygma tenuis, recurvata papillis cylindricis obsita; receptaculum florum apice conicum hispidum, fructiferum cylindro-conicum setis longis obsitum.

α. emersus.

Tota planta parva, caulibus dense congregatis, foliis parvis, laciniis crassioribus, subcompressis.

А. Петуниковъ.

Описанный подъ именемъ *R. pseudoflaccidus* видъ выдавался прежде за *R. fluitans*—видъ, переименованный затѣмъ въ *R. fluitans*,—а вполнѣдствіи отнесенъ къ коллективному виду *R. flaccidus* Pers., къ которому, судя по діагнозамъ Персона, можно причислить всѣ виды съ мягкими долями листьевъ, спадающими внѣ воды. По имѣющимся даннымъ (въ письмахъ Фрейна), описанный Мейеромъ подъ названіемъ *R. flaccidus* видъ съ Кавказа долженъ быть отнесенъ къ *R. aquatilis* L. s. st. (= *R. heleophilus* Arvet-Touvet), тогда какъ собранная Клаусомъ форма съ береговъ Волги и Беккеромъ изъ-подъ Сарепты относится къ *R. Rionii* Lagg. Встрѣчающаяся же у насъ форма оказывается широко распространенной по всей средней и восточной Россіи (до Урала) и составляетъ самостоятельную, во многихъ отношеніяхъ характерную и географически обособленную расу изъ той группы видовъ *Batrachium*, у которыхъ тонкія рыльца, усаженные длинными цилиндрическими со-сочками, какъ у *R. paucistamineus* Tausch, и коническое цвѣтоложе, переходящее въ цилиндрическо-коническое плодоложе, какъ у *R. confervoides* Fr., съ которымъ нашъ видъ представляетъ наибольшее сходство, но отличается отъ него: болѣе большимъ числомъ жилокъ на лепесткахъ, ихъ формой, числомъ тычинокъ и числомъ сѣмянокъ въ плодовой головкѣ.

А. Петуниковъ.

рины, съ 5 жилками; тычинокъ б. ч. 8, длиннѣе плодниковой головки; рыльца тонкія, изогнутыя, усаженные длинными цилиндрическими сосочками; цветоложе на верхушкѣ коническое; плодоложе коническо-цилиндрическое, усажено длинными щетинками; сѣмянокъ въ головкѣ до 16.

Въ плодахъ и съ послѣдними цвѣтами 6 августа въ р. Клязьмѣ близъ Черкизова (С.).

а. *terrestris* Freyn, in schedis = *Batrachium admixtum* W. Nyland.

Растеніе очень маленькое, съ сильно переплетающимися стеблями и мелкими листьями съ болѣе толстыми, нѣсколько сплюснутыми дольками. Растетъ въ очень мелкой водѣ и заходитъ на прибрежный песокъ внѣ воды. Въ цвѣтахъ и плодахъ 1 июня по берегу озера въ Серебряномъ бору близъ Хорошова (Ш. и С.).



Ranunculus confervoides.



Ranunculus circinatus.

424. *R. circinatus* Sibth. Пет. Кр. I, стр. 38.

Ranunculus divaricatus Schrank. Бух. II, № 7.—Бух. I, № 7.—Ф. О., № 5, р. 70.—Пет., стр. 255.—Кауф. II, № 14.—Цин., № 24.—Кауф. I, стр. 26.

Ranunculus divaricatus Schrank. *a. aquatilis*. Бух. II, № 7a.—Бух. I, № 7a.

Ranunculus aquatilis auct. fl. Mosq., non L. Дв., № 515.—Hoff. Н., № 4139.—Mart., p. 98.—St. II, p. 32.—St. I, № 380.—Pal., № 1169.

Ranunculus rigidus Hoffm. Gold. С., p. 20.

Листья во много разъ короче междоузлій, сидячіе, съ влагалищемъ, охватывающимъ основаніе листа, повторно-3-разсѣченные на короткія и нѣсколько согнутыя доли, оканчивающіяся 4—7 щетинками; стеблевые листья щитовидные, охватывающіе стебель, обыкновенно дискообразной формы съ растопыренными дольками, не спадающими внѣ воды, расположены въ плоскости перпендикулярной къ стеблю; цвѣты бѣлые, до 15 мм. въ поперечникѣ; лепестки широко-обратно-яйцевидные, съ 7 жилками; тычинокъ много (отъ 15 до 21), расположенныхъ въ два ряда, изъ

коихъ наружные длиннѣе внутреннихъ и въ прѣтѣнность ихъ днѣи густо покрыты рыльцами широкими у основания будагавидными (—очками); цветоножки на верхушкѣ шаровидное, покрытое щетинками.

По рѣкамъ, ручьямъ и прудамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ начала юня до середины августа.


II. *Heliophthalmum* Fr. Лепестки у нашихъ видовъ желтые, у основанія съ медовой ямочкой. б. ч. прикрытой чешуйкой; сѣмянки безъ поперечныхъ морщинокъ.

425. *R. Flammula* L. Бух. II, № 9.—Бух. I, № 9.—F. O., № 5, p. 70.—Пер., стр. 256.—Кауф. II, № 16.—Цин., № 31.—Кауф. I, стр. 27.—Lind., p. 82.—Дв., № 501.—Макс., № 520.—Ной. Н., № 4148.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 96.—St. II, p. 32.—St. I, № 368.

Стебель 15—40 см., прямостоящій или приподнимающійся, толстый или покрытъ рѣдкими, прижатными волосками; корневые и нижне-стеблевые листья на черешкахъ, нижне-или ушко-ланцетные, иногда почти линейные; корневые часто почти лопастные, верхне-стеблевые—линейные; вѣтвинокрайніе или на краяхъ зубчатъ и рѣдкочубуренные; цвѣты до 14 мм. въ поперечникѣ; лепестки б. ч. въ верхушкѣ расширены; сѣмянки



Ranunculus Flammula.



Ranunculus Flammula s. gracilis.

сферично-яйцевидные, толстые съ очень узкой каймой; носикъ очень короткій, прямой, на верхушкѣ едва загнутый.

По дугамъ, лугамъ, напашамъ и на влажныхъ мѣстахъ, очень часто. Цвѣтетъ съ первыхъ чиселъ юня до осени. Крошъ типично:

а. *gracilis* G. Mey. Пер. Кр. I, стр. 48.

Стебель лежачій, въ узлахъ укореняющійся; междоузлія прямые, иногда только первое отъ корня изогнуто дугой; вер-


хушка стебли приподнимающаяся; листья ланцетные или узколанцетные; цветы по одному или по два, не крупнее 9 мм.; лепестки къ верхушкѣ расширены; сѣмянки такіе же, какъ и у типичной формы, но носикъ то прямой, и только верхушка его слегка загнута крючкомъ, то онъ загнутъ почти съ основанія; обѣ формы носика иногда можно найти въ одной и той же головкѣ.

По сырымъ торфянымъ лугамъ и болотамъ. Захарово (К.).—По берегу Клязьмы у д. Черкизово; озеро Долгое близъ дер. Рыбаки. Мос. у. (П. и С.).

β. *reptans* L. (sp.).

Ranunculus reptans L. Ф. оз.—Нер. Кр. I, стр. 48.—Кауф. II, стр. 15.—Цив., № 32.—Макс., № 521.

Растеніе очень пѣзкое; стебель ползучій, въ узлахъ укореняющійся, съ междоузліями изогнутыми дугой; листья узколанцетные, иногда линейные, всегда цѣльнокрайніе; самыя мелкія особи походятъ на *Elatine*; цветы всегда одиночные, не крупнее 7 мм., на длинныхъ цветоножкахъ въ пазухахъ листьевъ; лепестки не расширены, съ параллельными краями и закругленной верхушкой; сѣмянки съ прямымъ, на концѣ загнутымъ носикомъ или носикъ загнутъ отъ основанія. По берегамъ у самой воды на пескѣ. Долгое и Круглое озеро близъ дер. Рыбаки, Мос. у. (П. и С.).



Ranunculus Flammula β. *reptans*.

*) Последнюю разновидность многие авторы, начиная съ Линнея, выдѣляютъ въ самостоятельный видъ; но, опираясь на статью Н. Ross, въ *Verhändl. des Bot. Ver. der Pr. Brand.* 1882. XXIV, p. 80, и на собственные наблюденія, я не могъ найти почти ни одного стойкаго признака, который не замѣчался бы и у предыдущей разновидности. На Долгомъ озерѣ, Мос. у., встрѣчаются все переходы отъ типичнаго *R. Flammula* L. къ *R. reptans* L. последнее растетъ у самой воды на пескѣ и только отчасти заходитъ на берегъ, покрытый травой; въ травѣ растетъ *α. gracilis* G. Mey., а еще далѣе отъ берега *R. Flammula* L. Прямой и согнутый носикъ—признакъ, выдвигаемый нѣкоторыми авторами, можно было наблюдать даже на одной и той же плодовой головкѣ. Единственный боѣе стойкій признак *R. reptans* L.—это дугообразно изогнутыя междоузлія, которыя бываютъ у особей, растущихъ только у самой воды на пескѣ; тѣ же, что растутъ на травѣ, изогнуты не такъ сильно; у *α. gracilis* G. Mey. изогнутости я не нашелъ, исключая перваго отъ корня междоузлія. Fries, въ *Nov. Fl. succ. ed. 2*, p. 173, говоритъ, что взятое имъ настоящее *R. reptans* L. и пересаженное въ садъ въ первый же годъ перерождалось въ типичное *R. Flammula* L. E. Hallier пишетъ, что онъ наблюдалъ много дѣтъ типичное *R. reptans* L., посаженное имъ въ горшокъ и что въ продолженіе всей культуры все признаки оставались стойкими. K. Ruthe, въ *Verh. des Bot. Ver. der Pr. Brand.* 1889. XXXI, p. 237, высказывается за самостоятельность этого вида на томъ основаніи, что *R. reptans* L. — однолѣтнее растеніе, а *R. Flammula* L.—многолѣтнее; этотъ признакъ я не могъ выяснитъ, но какъ тогда объяснить многолѣтній опытъ Hallier?

426. *R. Língua L.* Бух. II, № 10.—Бух. I, № 10.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 255.—Кауф. II, № 17.—Цин., № 30.—Кауф. I, стр. 27.—Ann. C. I, № 3.—Дв., № 502.—Макс., № 519.—Hoff., II, № 4157.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 96.—St. II, p. 32.—St. I, № 369.—Pal., № 1157.

Стебель 50—150 см., примостоящий, цилиндрический полый, у основания съ мутовками бѣлыхъ корней и съ ползучими подземными побѣгами; листья сидячіе, длинно-ланцетные, остроконечные, по краямъ съ рѣдкими зазубринами; цвѣты крупныя; лепестки до 17 мм.; сѣмянки окаймленные, съ загнутымъ, сплюснутымъ носикомъ; растеніе б. ч. голое.

По большимъ болотамъ и по болотистымъ берегамъ рѣкъ и озеръ. Цвѣтетъ съ половины іюня до половины августа. Перово, Хорошово (А.).—Б. Мытищи, Перерва, Покровское-Фили (К.).—Анинское (Гум.).—Купавна, Бгр. у. (Ф.).—Михайловское Юрьевскій прудъ, болото Пальница, Пдл. у. (Б.).—Кузьминки (П.).—По берегу Нерскаго озера, Мос. у.; берегъ Глубокаго озера, Ряз. у. (С.).

α. hirsútus Wallr.

Стебель, листья и чашечки покрыты прижатыми волосками. Романцово, Мож. у. (В.).—Вялки, Брн. у. (Х.).



Ranunculus Língua.



Ranunculus polyphyllus.

427. *R. polyphýllus W. K.* Пет., стр. 255.—Кауф. II, № 18.—Цин., № 33.—Рупр. стр. 167.—Кауф. I, стр. 28.

Стебель 50—150 см., голый, обыкновенно плавающий; нижніе вѣтви и листья мутовчато сближены, верхніе—очередные; подводные листья нитевидные, безъ пластинокъ—одни листовые черенки; надводные—плавающие, цѣльные, продолговато-клиновидные; цвѣты мелкіе; лепестковъ обыкновенно три; чашелистиковъ также три; сѣмянки шаровидныя, съ маленькимъ носикомъ.

Найдена водяная форма только разъ въ р. Ступи близъ Давыдова (А.).

428. *R. illyricus* L. Пет. Кр. I, стр. 47.—Пет., стр. 256.—Кауф. II, стр. 18.—Гор., № 2.

Корневище съ пучкомъ утолщенныхъ, мясистыхъ клубней; стебель 20—50 см., прямостоящій, шелковисто-шерстистый, какъ и все растеніе; нижніе листья на длинныхъ черешкахъ, трех- иногда дву-раздѣльные; доли ихъ иногда трехраздѣльныя, линейно-ланцетныя, заостренныя; верхніе листья сидячіе, трех- или дву-раздѣльные, съ линейными долями; цвѣты блѣдно-желтые; лепестки до 14 мм.; чашелистики снаружи покрыты волосками; цвѣтоложе цилиндрическое; сѣмянки сплюснутыя, съ короткимъ, прямымъ носикомъ.

Найдено только разъ въ цвѣту 18 мая у Шеленхинскаго моста М.-Бр. ж. д., занесенъ (Михайловъ).



Ranunculus illyricus.



Ranunculus auricomus

429. *R. auricomus* L. Пет. Кр. I, стр. 42.—Бух. II, № 11.—Бух. I, № 11.—Пет., стр. 256.—Кауф. II, № 19.—Цин., № 35.—Кауф. I, стр. 28.—Ann. C. III, № 201.—Дв., № 504.—Макс., № 522.—Нотт. Н., № 4142.—Mart., p. 96.—Нотт., № 2638.—St. II, p. 32.—St. I, № 371.—Pal., № 1160.

Ranunculus auricomus L. *a. typicus* Kauffm. Бух. II, № 11 *a.*—Бух. I, № 11 *a.*—F. O., № 5, p. 70.—Кауф. II, стр. 16.—Кауф. I, стр. 28.

Стебель 15—40 см., прямостоящій цилиндрическій, обыкновенно голый; прикорневыхъ листьевъ 2—5, почковидныхъ или сердцевидныхъ, при чемъ одинъ или два изъ нихъ всегда раздѣльные; стеблевые листья сидячіе, до основанія пальчато-раздѣльные; доли ихъ линейныя, съ цѣльными или слегка зубчатыми краями; цвѣты не крупныя, часто недоразвитые; лепестки до 9 мм.; цвѣтоложе круглое; сѣмянки бархатистыя; носикъ согнутъ съ самаго основанія.

По лугамъ, опушкамъ и лѣснымъ полянамъ, очень часто. Цвѣтетъ со середины мая до середины июня.

α. incisifolius (Rehb.) Rupr. Пет. Кр. I, стр. 44.—Бух. II, № 11 γ.—Бух. I, № 11 γ.

Стеблевые листья ланцетовидные или даже продолговато-ланцетные, по краям зубчатые или почти надрезные. Михайловское—болото Черная Грязь, Пдл. у. (Б.).

430. *R. cassubicus L.* Пет. Кр. I, стр. 43.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 256.—Цин., № 36.—Дв., № 503.—Макс., № 523.—Hoff. Н., № 4143.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 96.—Hoff., № 2641.—St. II, p. 32.—St. I, № 372.—Pal., № 1159.

Ranunculus auricomus L. β. cassubicus Kaufm. Бух. II, № 11 β.—Бух. I, № 11 β.—Кауф. II, стр. 16.—Кауф. I, стр. 29.

Ranunculus aconitifolius L. Дв., № 506.—Макс., № 518.—Mart., p. 97.—St. I, № 371.



Ranunculus cassubicus.

Стебель прямостоящий, 20—60 см., у основания окруженъ чешуевидными влагалищами; корневой листъ одинъ, рѣже два, на длинномъ черешкѣ, округлый, у основания сердцевидный, кругомъ крупно-зубчатый; стеблевые листья сидячіе, доли ихъ ромбическо-ланцетныя, зубчатая или надрѣзная; цвѣты крупныя; лепестки до 14 мм.; цвѣтоложе продолговатое; сѣмянки покрыты отстоящимъ пушкомъ; носикъ прямой и только на концѣ загнутый.

Въ густыхъ лѣсахъ, по лѣспытымъ холмамъ и оврагамъ. Цвѣтетъ съ конца апрѣля, весь май. Иваново, Купцово, Воробьевы горы, Свиблово, Марѣнно (К.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Серебряный боръ близъ Хорошова, Мытищи—Лосинный Островъ (С.).—Петровское-Разумовское; Бѣлые Колодези, Клм. у.; Павловскій посадъ, Вгр. у. (П. и С.).—Дарьино, Звн. у. (Х.).

α. fallax Wimm. et Grab. Пет. Кр. I, стр. 44.

Ranunculus auricomus L. δ. elatior Rupr. Бух. II, № 11 δ.—Бух. I, № 11 δ.

Корневыхъ листьевъ нѣсколько (2—3), притомъ перѣдко надрѣзныхъ на три лопасти, но первый листъ маленькій и на короткомъ черешкѣ. Михайловское—болото Пальница, Пдл. у. (Б.).

431. *R. acris L.* Пет. Кр. I, стр. 46.—Пет., стр. 257.—Цин., № 38.

Ranunculus acris L. Бух. II, № 12.—Бух. I, № 12.—F. O., № 5, p. 70.—Кауф. II, № 20.—Кауф. I, стр. 29.—Lind., p. 84.—Ann. C. V, № 3.—Дв., № 511.—Макс., № 525.—Hoff. Н., № 4135.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 97.—Hoff., № 2136.—St. II, p. 32.—St. I, № 377.—Pal., № 1166.

Стебель прямостоящій, 30—80 см., голый или слегка волосистый; корневые листья на длинныхъ черешкахъ, такъ же какъ и стеблевые пальчато-раздѣльные, о пяти доляхъ; доли надрѣзныя и остро-зубчатыя; верхушечныя листья о трехъ доляхъ; цвѣты не крупныя, лепестки до

10 мм.; цветоложе голое; сѣмянки голыя, сплюснутыя, съ узкимъ краемъ и короткимъ, почти прямымъ носикомъ.

По лугамъ и полямъ, очень часто. Цвѣтеть съ іюня до осени.

α. *hortensis* Mart. Пет. Кр. I, стр. 46.—Mart., p. 97.

Съ махровыми цвѣтами. Ивановко (К.).—Мытищи—на заливноиъ лугу близъ Яузы и близъ фермы Перловыхъ (С.).—Обпраловка, Ниж. ж. д.; Ильинское, Мож. у. (Куль).



Ranunculus acer.



Ranunculus polyanthemos.

432. *R. polyanthemos* L. Пет. Кр. I, стр. 44.—Бух. II, № 13.—Бух. I, № 13.—F. O. № 5, p. 70.—Пет., стр. 257.—Кауф. II, № 22.—Цви., № 40.—Pinz., p. 9.—Кауф. I, стр. 30.—Ann. C. V, № 4.—Дв., № 513.—Макс., № 526.—Нoff. Н., № 4167.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 98.—Hoff., № 2652.—St. II, p. 32.—St. I, № 376.—Pal., № 1164.

Стебель прямостоящій, 30—70 см., покрытый, какъ и все растение, щетинистыми отстоящими волосками; корневые и нижніе стеблевые листья пальчато-пятираздѣльные; доли ихъ разсѣченные на глубокия линейныя лопасти; цветовожки глубоко продольно-бороздчатыя; цвѣты крупныя; лепестки до 15 мм.; чашелистики въ почкахъ волосистые; цветоложе щетинистое; сѣмянки съ сплюснутымъ, короткимъ носикомъ, загнутымъ крючкомъ.

По лугамъ, на открытыхъ или слабо отѣненныхъ мѣстахъ, очень часто. Цвѣтеть съ первыхъ чиселъ іюня, весь іюль.

α. *glaber* Wimm. et Grab. Пет. Кр. I, стр. 45.—Кауф. II, стр. 17.—Кауф. I, стр. 30. Все растение голое. Соколыники—Ширяево поле (К.).—Мытищи (С.).—Близъ Саввинскаго Сторожевскаго монастыря, Звн. у. (Х.).
β. *fl. pleno.*

Съ махровыми цвѣтами. Въ гербаріи А. К. Варженевскаго изъ-подъ Романцова, Мож. у., съ густо махровыми цвѣтами, въ срединѣ проросшими и несущими еще бутоны.

433. **R. nemorósus** DC. Пет. Кр. I, стр. 45.—Пет., стр. 257.—Цин., № 41.—
Рупр., стр. 87.—Дв., № 509.—Макс., № 528.

Ranunculus polyanthemus L. *β. nemorosus* Kauffm. Кауф. II, стр. 18.—Кауф.
I, стр. 30.

Стебель примостоящий, 30—50 см.; нижние листья пальчато-раздѣльные, доли широкія, почти ромбическія, 3—5-зубчатые; черенки и стебель густо покрыты отстоящими волосками; цвѣтоножки продольно-бороздчатые; сѣмянки съ длиннымъ, тонкимъ, скрюченнымъ носикомъ.

По лѣсамъ и опушкамъ въ тѣни, очень рѣдко. Цвѣтетъ съ первыхъ чиселъ іюня. Влѣзъ Никольскаго и Захарова подѣ Москвой (К.).—Цушкино—лѣсъ близъ Братовщины (у А. Н. Петунникова ошибочно сказано, что онъ найденъ въ Мытищахъ, С.).—Въ Шведкинтѣ, Бгр. у. (П. И.).



Ranunculus nemorosus.



Ranunculus repens.

434. **R. répens** L. Бух. II, № 14.—Бух. I, № 14.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 257.—Кауф. II, № 23.—Цин., № 42.—Pinz., p. 9.—Кауф. I, стр. 30.—Ann. C. V, № 5.—Дв., № 510.—Макс., № 530.—Hoff. H., № 4173.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 97.—Hoff., № 2655.—St. II, p. 32.—St. I, № 375.—Pal., № 1165.

Стебель 15—60 см., приподнимающійся, съ ползучими и укореняющимися въ узлахъ побѣгами; нижние или все листья тройчатые; листочки на длинныхъ черешкахъ, трехраздѣльные съ надрѣзано-зубчатыми долями; листочки у верхнихъ листьевъ не раздѣльные; цвѣтоножки глубоко-бороздчатые; лепестки 10—12 мм.; чашелистики отстоящіе; сѣмянки усѣяны точками и съ прямымъ носикомъ.

По болотистымъ мѣстамъ, канавамъ и паровымъ полямъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины мая до половины іюля.

435. **R. bulbósus** L. Пет. Кр. I, стр. 45.—Пет., стр. 256.—Кауф. II, № 24.—Цин., № 43.—Рупр., стр. 87.—Кауф. I, стр. 31.—Дв., № 507.—Макс., № 531.—Mart., p. 97.—St. II, p. 32.—St. I, № 374.—Pal., № 1163.

Ranunculus campestris Mart. Mart., p. 97.

Основаніе стебля утолщено луковичеобразно; стебель 15—40 см., нѣсколько вѣтвистый; нижняя часть стебля и черешки листьевъ съ отстоящими волосками, верхняя часть стебля—съ прижатыми; листья 3-раздѣльные, средняя доля листа на довольно длинномъ черешкѣ, доли нижнихъ листьевъ 2—3-раздѣльные и надрѣзочно-зубчатые; чашелистики отогнуты и прижаты къ цвѣтоножкѣ; лепестки до 9 мм.; сѣмянки гладкія, съ короткимъ, сплюснутымъ носикомъ.

По лугамъ на жирной почвѣ. Найденъ въ полномъ цвѣтѣ въ началѣ іюня на лугу передъ селомъ Останкинымъ (К. и П.); тамъ же въ 1903 году вновь найдено студ. Гусевымъ.



Ranunculus bulbosus.



Ranunculus sceleratus.

436. *R. scelerátus* L. Бух. II, № 15.—Бух. I, № 15.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 256.—Кауф. II, № 25.—Цин., № 44.—Кауф. I, стр. 31.—Дв., № 505.—Макс., № 524.—Hoff. II, № 4177.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 96.—Lib. Tr., p. 128.—Hoff., № 2654.—St. II, № 32.—St. I, № 373.

Стебель 15—45 см., прямостоящій, голый; корневые и нижніе стеблевые листья на длинныхъ черешкахъ, лоснящіеся, мясистые, дланевидно-3—5-надрѣзные; доли ихъ зубчатые; верхніе листья сидячіе или на короткихъ черешкахъ, 3-раздѣльные, съ ланейными долями; цвѣтоножки бороздчатые; лепестки очень мелкіе, 2—4 мм.; цвѣтоложе продолговатое; плодоложе цилиндрическое; сѣмянки мелкія, морщинистыя, съ короткимъ носикомъ.

По берегамъ рѣкъ, прудовъ, по болотамъ и иногда по огородамъ, очень часто. Цвѣтетъ со середины мая до осени.

437. *R. Ficária* L. Пет., стр. 255.—Цин., № 29.—Ann. C. Y., № 2.—Дв., № 500.—Макс., № 516.—Hoff. II, № 4147.—Mart., p. 96.—Hoff., № 2644.—St. II, p. 32.—St. I, № 370.—Pal., № 1158.

Ficaria ranunculoides Roth. Бух. II, № 16.—Бух. I, № 16.—F. O., № 5, p. 70.—Кауф. II, № 26.—Кауф. I, стр. 31.—Lind., p. 82.—Макс., № 516.

Ficaria verna Huds. Дв., № 500.—Hoff. II, № 4132.—Mart., p. 96.



Ranunculus Ficaria.

Корни утолщены въ видѣ продолговатыхъ клубней; стебель 15—30 см., приподнимающійся; листья на длинныхъ черешкахъ, округло-сердцевидные, лоснящіеся, мясистые; нижніе—выемчато-городковые, верхніе—угловатые; чашечка о 3 листочкахъ; вѣнчикъ о 8—10 лепесткахъ; сѣмянки пушистыя, съ очень короткимъ носикомъ.

По кустарникамъ, садамъ, лѣсамъ и заливымъ лугамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины апрѣля до половины мая.

41 сем. Berberidáceae Vent.

Цвѣты обоеполые, пѣз двухъ вѣнцовъ чашелистиковъ и двухъ вѣнцовъ лепестковъ, по 3 листка въ каждомъ; чашелистики окрашены въ цвѣтъ вѣнчика; основаніе лепестковъ часто съ 2 железками; 6 тычинокъ супротивны лепесткамъ; пыльники обращены внутрь, вскрываются клапанами; завязь верхняя пѣз одного плодolistика, одногнѣздная съ нѣсколькими стоячими сѣмепочками у основанія брюшного шва; рыльце сидячее, блюдчатое; плодъ—1—3-сѣменная ягода; сѣмя съ бѣлкомъ. У насъ кустарники.

164. Bérberis L.

438. *B. vulgaris* L. Пет., стр. 146.—Кауф. II, № 36.—Гор., № 2.—Цин., № 57.—Кауф. I, стр. 36.—Дв., № 366.—Нoff. II., № 2832.—Mart., p. 64.—Hoff., № 483.—St. II, p. 22.—St. I, № 238.—Pal., № 726.



Berberis vulgaris.

Не высокій кустарникъ съ сѣрой корой, у котораго вѣтви съ укороченными вѣточками въ видѣ пучковъ листьевъ; листья коротко-черешковые, продолговатые, обратно-яйцевидные, колючезубчатые, сверху темно-зеленые, снизу блѣднѣе и съ сильно выдающимися жилкамъ; у основанія пучковъ листьевъ простыя или трехраздѣльныя колючки; цвѣты желтые, пахучіе, въ довольно длинныхъ, повислыхъ кистяхъ; ягода красная.

По песчанымъ открытымъ мѣстамъ и холмамъ, рѣдко, или одичалое въ старыхъ паркахъ. Цвѣтетъ съ первыхъ чиселъ іюня. Близъ Никольской и Лизаветинской рощи, Всесвятская роца (К.).—Лужки, Срп. у. (Г.).—Карачеево, Кзм. у.

(Же. Бот. Лаб.).—Лосинный Островъ у Алексѣевского ручья, одначадомъ; близъ Пикифорова, Срп. у. (П.).—Борисово, Срп. у. (С.).

Порядокъ Rhoeadales.

42 сем. Papaveráceae DC.

Цвѣты обоеполые, съ верхнею завязью; чашечка о 2 чашелисткахъ, рано опадающихъ; лепестковъ 4, въ почкосложеніи черенчатыхъ и неправильно смятыхъ; тычинокъ много, расположенныхъ кругами; пестикъ одинъ, съ звѣздчатымъ или двудопастнымъ сидячимъ рыльцемъ, состоитъ изъ 2 или болѣе плодolistиковъ, дѣлящихъ завязь на нѣсколько неполныхъ гнѣздъ; плодъ — простая коробочка или стручковидная съ большимъ числомъ сѣмянъ, прикрѣпленныхъ къ стѣннымъ сѣменосамъ; сѣмя съ большимъ маслянистымъ бѣлкомъ и маленькимъ зародышемъ. Травянистыя растенія съ млечнымъ сокомъ.

165. Papáver L.

Завязь съ сидячимъ звѣздчатымъ рыльцемъ; тычинокъ много; плодъ—коробочка, образовавшаяся изъ 4—15 плодolistиковъ, края которыхъ загнулись глубоко внутрь и раздѣлили завязь на столько же неполныхъ гнѣздъ. въ сущности плодъ одногнѣздный; коробочка вскрывается у самаго рыльца маленькими клананами, открывающими маленькія отверстія.

439. *P. Rhóeas* L. F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 235.—Кауф. II, № 40.—Цип., № 61.—Кауф. I, стр. 38.—Др., № 472.—Макс., № 491.—Mart., p. 92.—Hoff., № 2321.—St. II, p. 31.—St. I, № 351.—Pal., № 1083.



Papaver Rhoeas.

Стебель, листья и чашелистики съ жесткими, оттопыренными волосками; листья глубоко-перисто-раздѣльные, съ надрѣзанно-зубчатыми, продолговатыми долями, не стеблеобъемлющіе; тычиночныя нити шнуровидныя; коробочка обратно-яйцевидная, у основанія закругленная; 8—12 лопастей рыльца накрываютъ одна другую краями; вѣнчикъ ярко-красный; все растеніе 30—60 см.

Изрѣдка, какъ сорное между посѣвами и на огородахъ. Цвѣтетъ съ первыхъ чиселъ іюня, весь іюль.

P. somniferum L. F. O., № 5, p. 70. — Пет., стр. 235. — Кауф. II, № 41.—Цип., стр. 49.—Кауф. I, стр. 38.—Др., № 473. — Макс., № 492.—Mart., p. 92.—Pal., № 1085.

Стебель и листья голые, сине-зеленые; верхніе листья стеблеобъемлющіе, продолговатые, надрѣзанно-зубчатые; нижніе—къ основанію сужен-

ные, выемчатые и надрѣзочно-зубчатые; цвѣтоножки съ оттопыренными жесткими, рѣдкими волосками; тычиночныя нити вверху расцѣплены: коробочка яйцевидная, почти шаровидная; рыльце городчатое, о 10—15 лучахъ; цвѣтокъ крупный, бѣлый или блѣдно-лиловый съ темнымъ пятномъ у основанія; все растение 30—100 см.

Разводится. Цвѣтетъ съ іюня до начала августа.



Papaver somniferum.



Chelidonium majus α. vulgare.



Chelidonium majus β. laciniatum.

166. *Chelidónium* L.

Завязь съ 2-лопастнымъ сидячимъ рыльцемъ; тычинокъ много; плодъ—одногнѣздная коробочка, похожая на стручекъ, съ 2 створками, вскрывающимися снизу вверхъ и оставляющими по себѣ рамку съ сѣменами; сѣмя съ гребенчатымъ отросткомъ.

440. *C. május* L. F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 166.—Кауф. II, № 42.—Цин., № 62.—Кауф. I, стр. 39.—Линд., p. 86.—Дв., № 470.—Макс., № 490.—Хоф. Н., № 3886.—Голд. С., p. 20.—Март., p. 91.—Хоф., № 843.—Ст. II, p. 31.—Ст. I, № 350.—Пал., № 1078.

Стебель 30—70 см., вѣтвистый, прямостоящій, покрытый, какъ и все растение, рѣдкими волосками; листья глубоко-перисто-раздѣльные, лопасти округлы или эллиптическія, округло-городковыя; верхняя сторона листьевъ свѣтло-зеленая, нижняя—сѣро-зеленая; цвѣты желтые; тычиночныя нити къ верхушкѣ утолщенные; при разрываніи стебля или листьевъ выступаетъ оранжевый млечный сокъ.

Орное, около жилья, очень часто. Цвѣтетъ съ начала мая до осени.

- α. *vulgáris* Kauffm. Бух. II, № 27.—Бух. I, № 27.—Кауф. II, стр. 27.—Кауф. I, стр. 39. Лопастн листьевъ округло-городковыя.

- β. *laciniátum* Koch. Кауф. II, стр. 27.—Цин., стр. 50.—Кауф. I, стр. 39. *Chelidonium laciniatum* Mill. Mart., p. 91.

Chelidonium quercifolium Willement. Дв., № 471.

Доли листьевъ перисто-разсѣченные, верхушечная доля иногда 5—6-раздѣльная; лепестки часто надрѣзные. На берегу Москвы р. и Яузы (Мар.).

43 сем. Fumariaceae DC.

Цвѣты неправильные; чашечка 2-листная, рано опадающая, или снѣтъ; вѣничикъ 4-лепестный, свободный или у основанія сросшійся; верхній лепестокъ вытянутъ въ б. или м. длинную шпору; иногда супротивный ему лепестокъ тоже съ мѣшкообразной шпорой; тычинокъ 6, сросшихся въ 2 пучка по 3 тычинки въ каждомъ, съ боковыми двугрѣзными пыльниками; завязь верхняя; пестикъ одинъ изъ 2 плодолистиковъ; плодъ — орѣшекъ или стручковидная коробочка; сѣмя съ бѣлкомъ. Травы безъ млечнаго сока.

167. *Corydalis* Medik.

Чашечки б. ч. пѣтъ или она 2-листная, рано опадающая; вѣничикъ 4-листный; верхній лепестокъ со шпорой, иногда супротивный ему лепестокъ съ мѣшкообразнымъ выростомъ; плодъ — 2-створчатая стручковидная коробочка, многосѣменная, сплюснутая; сѣмена съ выростомъ. Разстенія съ клубнями.

1. Цвѣты желтые, клубень коническій. *C. Marshalliana* Pers.

Цвѣты фіолетовые, розовые или бѣлые, клубень шарообразный. 2.

2. Прицвѣтники клиновидные, пальчато-надрѣзные; нижній листъ чешуевидный. *C. solida* Sm.

Прицвѣтники яйцевидные, цѣльнокрайніе; стебель безъ чешуевиднаго листа *C. cava* Schw. et Koert.

441. *C. cava* Schw. et Koert. Пет. Кр. I, стр. 58.—Бух. II, № 28.—Бух. I, № 28.—Пет., стр. 171.—Кауф. II, № 43.—Цин., № 65.—Рупр., стр. 87.—Кауф. I, стр. 40.—Lind., p. 86.—Ann. C. III, № 203.

Corydalis Tuberosa DC. Макс., № 653.

Corydalis bulbosa Pers. Gold. C., p. 21.—Mart., p. 122.

Fumaria bulbosa a. L. Mart., p. 122.—Hoff., № 1392.—St. II, p. 41.—St. I, № 472.

Клубень шарообразный, внутри полый; стебель до 40 см., съ двумя листьями; листья двоио-тройчато-раздѣльные; доли 2—3-надрѣзныя, надрѣзы тупо-заостренные; цвѣточная кисть на длинномъ цвѣтоножкѣ; цвѣты на короткихъ цвѣтоножкахъ съ цѣльнокрайними, овальными прицвѣтниками; цвѣты темно-фіолетовые, красноватые или бѣлые, до 24 мм. дл., столбикъ прямой; рыльце зубчатое; плодъ въ три раза длиннѣе плодоножки; сѣмена черныя, лоснящіяся.

По лѣсамъ и лѣсистымъ холмамъ, не часто. Цвѣтетъ съ начала мая; плоды въ концѣ мая. Воробьевы горы, Перерва (К.).—Кунцово (А.).—

Михайловское—въ Шебалахъ п Грачевникахъ, Пдл. у. (Б.). —Съ бѣлыми цвѣтами—Кунцово Проклятое мѣсто (С.).



Corydalis cava.



Corydalis solida

442. *C. sólida* (L.) Sm. Пет. Кр. I, стр. 58.—Бух. II, № 29.—Бух. I, № 29.—
F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 171.—Кауф. II, № 44.—
Цин., № 67.—Кауф. I, стр. 40.—Lind., p. 86.—Ann.
C. III, № 204.

Corydalis Bulbosa DC. Макс., № 654.

Corydalis Halleri Mart. Hoff. H., № 5544.—Макс., № 654.—Gold. C., p. 21.—
Mart., p. 122.

Fumaria solida. Hoff. H., № 1398.

Fumaria Halleri Willd. St. II, p. 41.

Fumaria bulbosa γ. L. Pal., № 1507.

Клубень сплюснuto-шарообразный, плотный; стебель до 40 см., обыкновенно съ тремя листьями; нижній листъ чешуйчатый, два верхнихъ на длинныхъ черешкахъ, двояко-тройчато-раздѣльные, съ глубоко-надрѣзными долями; надрѣзы туповатые; цвѣточная кисть густая; цвѣтоножки очень тонкія; прицвѣтники клиновидные, спереди глубоко-надрѣзные; цвѣты до 20 мм. дл., фиолетово-розовые; завязь у верхушки колѣнчато-изогнута; рыльце почти двулопастное: тычиночныя нити желобчатые, посрединѣ немного согнутыя; сѣмена черныя, лоснящіеся; плодъ такой же длины, какъ плодоножка.

По лѣсамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ конца апрѣля до половины мая; плоды въ концѣ мая.


443. *C. Marschalliana* Pers. Пет. Кр. I, стр. 59.

Клубень коническій, полый, снизу отмирающій; стебель до 35 см., съ двумя листьями; листья двояко-тройчато-раздѣльные, доли простыя или раздѣльныя, б. ч. тупыя; кисть многоцвѣтковая; цвѣты до 25 мм., свѣтло-желтые; прицвѣтники крупные, овальные или яйцевидные, цѣлюнокрайніе; рыльце съ зубчатымъ краемъ; плодъ вогнуто-выпуклый, такой же длины, какъ плодоножка; столбикъ у зрѣлаго плода загнуть крючкомъ.

Цвететъ съ середины апрѣля, иногда до половины мая. Растетъ въ большомъ количествѣ въ липовой рощѣ близъ Игнатъева, Кзм. у., и одинъ экземпляръ найденъ въ Вѣлыхъ Колодезяхъ, Кзм. у. (П.).



Corydalis Marschalliana.



Fumaria officinalis.

168. Fumária L.

Чашечка двулистная, рано опадающая; вѣничекъ 4-лепестный, верхній лепестокъ съ короткой, толстой шпорой; плодь — орѣшекъ. Растеніе безъ клубней.

444. *F. officinális* L. Бух. II, № 30.—Бух. I, № 30.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 190.—Кауф. II, № 45.—Цин., № 68.—Pinz., p. 9.—Кауф. I, стр. 40.—Lind., p. 86.—Дв., № 675.—Макс., № 652.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 122.—Hoff., № 1396.—St. II, p. 41.—St. I, № 473.—Pal., № 1511.

Стебель 20—40 см., прямостоящій, приподнимающійся или лежащій, голый и, какъ все растеніе, сизый; листья перисто-многоложные; доли узко-ланцетныя, туповатые; цвѣточная кисть довольно длинная; прицвѣтники не длиннѣ отклоненныхъ цвѣтоножекъ; чашелистики яйцевидно-ланцетные, зубчатые, втрое короче грязно-малиноваго вѣничка и уже его трубки; наружные лепестки съ тупою, темною верхушкою; орѣшекъ приплюснуто-шаровидный, слегка вверху вогнутый, бугорчато-морщинистый.

Сорное, по огородамъ и пашнямъ, очень часто. Цвететъ съ половины юня до половины августа.

44 сем. Cruciferae Juss.

Цвѣты въ циткахъ или кистяхъ; чашечка 4-листная, опадающая; лепестковъ 4; тычинокъ 6, изъ нихъ 2 короткія, прикрѣпленныя противъ створокъ пестика и 4 длинныя, сближенныя попарно и прикрѣпленныя противъ швовъ пестика; завязь верхняя; пестикъ изъ 2 плодolistиковъ, раздѣленъ на 2 гнѣзда ложною плечатою перегородкою; столбикъ ко-

роткій, съ простымъ головчатымъ или 2-лопастнымъ рыльцемъ; сѣмечки согнутыя; плодъ—стручекъ или стручечекъ; створки его отдѣляются отъ сѣменоса и отъ перегородки снизу вверхъ; рѣже плодъ—стручекъ, распадающійся на одногвѣздные, односѣменные членики, еще рѣже — простой орѣшекъ; сѣмя безъ бѣлка. Однолѣтнія и многолѣтнія травы съ очередными листьями. Исключеніе: у *Lepidium ruderale* только 2 тычинки и лепестковъ нѣтъ.

Для точнаго опредѣленія надо имѣть растеніе не только съ цвѣтами, но и съ хорошо развитыми, хотя и не зрѣлыми плодами, такъ какъ почти всѣ *Cruciferae* опредѣляются по плодамъ.

Обзоръ сем. *Cruciferae* Juss.

Отдѣлъ *Siliquósae* L.

Стручекъ линейный, рѣже продолговатый, длина его въ нѣсколько разъ превышаетъ ширину, раскрывается 2 створками.

I. Arabideae DC. (*Siliquosae pleurorrhizae*).

Корешокъ зародыша прилегаетъ къ краямъ сѣмодолей.

Nasturtium, *Barbarea*, *Turritis*, *Arabis*, *Cardamine*.

II. Sisymbrieae DC. (*Siliquosae notorrhizae*).

Корешокъ зародыша прилегаетъ къ спинкѣ одной изъ сѣмодолей.

Hesperis, *Sisymbrium*, *Erysimum*.

III. Brassiceae DC. (*Siliquosae orthoplocae*).

Сѣмодоли сложены вдоль и корешокъ лежитъ въ складкѣ, образованной сѣмодолями, прилегая къ спинкѣ одной изъ нихъ.

Brassica, *Sinapis*.

Отдѣлъ *Siliculósae* L.

Стручечекъ продолговатый или почти шаровидный, длина его немного превышаетъ ширину или равна ей, при созрѣваніи раскрывается 2 створками.

A. Latiseptae DC.

Стручечекъ сжатъ параллельно перегородкѣ стручка, послѣдняя такой же ширины, какъ и створки стручка.

IV. Alysscae DC. (*Latiseptae pleurorrhizae*).

Корешокъ зародыша прилегаетъ къ краямъ сѣмодолей.

Alyssum, *Berteroa*, *Lunaria*, *Draba*, *Cochlearia*.

V. Camelinae DC. (*Latiseptae notorrhizae*).

Корешокъ зародыша прилегаетъ къ спинкѣ одной изъ сѣмодолей.

Camelina.

В. Angustiseptae DC.

Стручечекъ сжать со стороны реберъ перегородки такъ, что послѣдняя уже ширину створокъ; створки въ видѣ лодочки.

VI. *Thlaspeae* DC. (Angustiseptae pleurorrhizae).

Корешокъ зародыша прилегаетъ къ краямъ сѣмедолей.

Thlaspi.

VII. *Lepidieae* DC. (Angustiseptae notorrhizae).

Корешокъ зародыша прилегаетъ къ спинкѣ одной изъ сѣмедолей.

Lepidium, Capsella.

Отдѣлъ Nucamentaceae DC.

Стручечекъ не раскрывающійся, б. ч. наподобіе орѣшка.

VIII. *Isatideae* DC. (Nucamentaceae notorrhizae).

Корешокъ зародыша прилегаетъ къ спинкѣ одной изъ сѣмедолей; сѣмедоли плоскія.

Neslea, Isatis.

IX. *Buniideae* DC. (Nucamentaceae spirulobae).

Корешокъ зародыша какъ у *Isatideae*, но сѣмедоли свернуты улиткой.

Bunias

Отдѣлъ Lomentaceae DC.

Стручекъ распадается на 2 или на большее число односѣменныхъ члениковъ, расположенныхъ въ одинъ или два ряда, рѣже стручекъ не распадающійся.

X. *Cakileae* DC. (Lomentaceae pleurorrhizae).

Корешокъ зародыша прилегаетъ къ краямъ сѣмедолей.

Chorispora.

XI. *Raphanaceae* DC. (Lomentaceae orthoplacae).

Сѣмедоли сложены вдоль и корешокъ лежитъ въ складкѣ, образованной сѣмедолями.

Raphanus.

Опредѣлитель родовъ Cruciferae.

1. Плодъ—стручекъ, стручечекъ или орѣшекъ, округлый, овальный или иной формы, но длина его не болѣе $2\frac{1}{2}$ разъ превышаетъ ширину. 2.

Плодъ — цилиндрическій или линейный стручекъ, рѣдко стручечекъ, длинно-эллиптическій, но длина его превышаетъ ширину болѣе, чѣмъ въ $2\frac{1}{2}$ раза. 15.

2. Плодъ—орѣшекъ, не разверзающійся створками. 3.

Плодъ—стручечекъ, разверзающійся створками. 4.

3. Плодъ шаровидный, одноплѣздный, односѣменный; стебель и листья шершавые отъ вѣтвистыхъ волосковъ. *Neslea.*

- Плодъ косо-овальный, неравнобокій, о 2—4 односѣменныхъ гнѣздахъ; верхняя часть стебля и плоды покрыты железистыми бородавочками. *Bunias.*
4. Стручечекъ сплюснутый, со стороны реберъ перегородки. 5.
Стручечекъ сплюснутый параллельно перегородкѣ или стручечекъ не сплюснутый. 8.
5. Гнѣзда стручечка односѣмнныя. 6.
Гнѣзда стручечка 2—многосѣмнныя. 7.
6. Стручечекъ повислый. *Isatis.*
Стручечекъ прямоторчащій. *Lepidium.*
7. Стручечекъ по килю съ широкимъ крыломъ. *Thlaspi.*
Стручечекъ съ кплемъ, но безъ крыла. *Capsella.*
8. Всѣ или только короткія тычинчныя нити съ придаткомъ въ видѣ зубцовъ. 9.
Тычинчныя нити безъ придатковъ. 10.
9. Лепестки бѣлые, двураздѣльные; гнѣзда многосѣмнныя. *Berteroa.*
Лепестки желтые или блѣдно-желтые, не раздѣльные; гнѣзда 1—4-сѣмнныя. *Alyssum.*
10. Цвѣты фіолетовые; стручечки очень крупныя. *Lunaria.*
Цвѣты бѣлые или желтые; стручечки мелкія. 11.
11. Столбикъ сидитъ на носикѣ стручечка и опадаетъ вмѣстѣ съ одной изъ створокъ; перегородка остается безъ столбика. *Camelina.*
Столбикъ не опадаетъ, а остается на перегородкѣ послѣ опаденія створокъ. 12.
12. Створки стручечка плоскія, слабо выпуклыя. *Draba.*
Створки стручечка вздутыя, сильно выпуклыя. 13.
13. Стручечекъ покрытъ звѣздчатыми волосками. *Alyssum.*
Стручечекъ голый. 14.
14. Цвѣты желтые. *Nasturtium.*
Цвѣты бѣлые. *Cochlearia.*
15. Стручки длинно-эллиптическія, повислые, на длинной плодоножкѣ; цвѣты фіолетовые. *Lunaria.*
Стручки пной формы, б. ч. торчащія или отклоненныя, но не повислые. 16.
16. Стручекъ не разверзающійся створками, а распадающійся на членики или совсѣмъ не распадающійся. 17.
Стручекъ разверзающійся вдоль створками. 18.
17. Рыльце головчатое; цвѣты б. или м. крупныя; стручекъ не распадается или распадается, и тогда состоитъ изъ одного ряда члениковъ. *Raphanus.*
Рыльце коническое, изъ 2 торчащихъ пластинокъ; цвѣты мелкія; стручекъ распадается на 2 ряда члениковъ. *Chorispora.*
18. Рыльце головчатое, тупое или слабо-выемчатое. 19.

Рыльце двулопастное, съ широкими, прижатыми одна къ другой лопастями. *Hesperis.*

19. Стручекъ безъ продольныхъ жилокъ, иногда съ одною жилкою, но слабо замѣтною только близъ основанія стручка. 20.

Стручекъ съ ясно замѣтными 1—3—5 продольными жилками. 21.

20. Цвѣты бѣлые, фіолетовые или розовые; сѣмена въ гнѣздахъ однопорядныя. *Cardamine.*

Цвѣты желтые; сѣмена въ гнѣздахъ двурядныя.

Nasturtium.

21. Сѣмена въ гнѣздахъ двурядныя. *Turritis.*

Сѣмена въ гнѣздахъ однопорядныя. 22.

22. Стручекъ вытянутъ въ длинный, коническій или сплюснутый носикъ, равный половинѣ всего стручка или даже длиннѣ половинны. 23.

Стручекъ безъ носика или съ короткимъ носикомъ, не достигающимъ трети стручка. 24.

23. Чашелистики во время цвѣтенія горизонтально-отстоящіе; стручекъ съ ясными, 3—5 продольными, почти одинаковыми жилками. *Sinapis.*

Чашелистики во время цвѣтенія прижаты къ вѣнчику; створки стручка съ одной продольною жилкою и двумя тонкими, извилистыми боковыми жилками. *Brassica.*

24. Створки стручка съ одною жилкою. 25.

Створки стручка съ ясными 3 или болѣе жилками. 27.

25. Цвѣты желтые. 26.

Цвѣты бѣлые.

Arabis.

26. Растеніе голое или покрыто рѣдкими, простыми волосками. *Barbarea.*

Растеніе покрыто прижатыми, двураздѣльными, трехраздѣльными или звѣздчатыми волосками. *Erysimum.*

27. Сѣмена съ крыловидной каймой. *Arabis.*

Сѣмена безъ крыловидной каймы. 28.

28. Срединная жилка на стручкѣ сильно выдается наподобіе кия, боковыя—слабо выдаются; все растеніе покрыто 2-раздѣльными, 3-раздѣльными или звѣздчатыми прижатыми волосками. *Erysimum.*

Всѣ три жилки на створкѣ ясно замѣтны; все растеніе голое или

покрыто простыми, но отстоящими волосками, если волоски вѣтвистые, то растеніе съ корневой розеткой листьевъ. *Sisymbrium.*

Sisymbrium.

169. *Nasturtium* R. Br.

Стручекъ линейный, эллиптическій или шаровидный, съ 6. или м. вынуклыми створками; послѣднія безъ жилокъ или только у основанія съ

слабо-замѣтной срединной жилкой; сѣмена въ каждомъ гвѣздѣ двурядныя; лепестки съ очень короткимъ ноготкомъ; чашелистики отстоящіе.

1. Вѣнчикъ не длиннѣ чашечки, блѣдно-желтый.

N. palustre DC.

Вѣнчикъ длиннѣ чашечки, ярко-желтый.

2. Стручечекъ шаровидный. 3.

Стручечекъ эллиптическій, продолговатый или линейный. 4.

3. Стебли трубчатые, полые.

N. amphibium (L.) R. Br.

Стебли плотные, не трубчатые.

N. austriacum Crantz.

4. Листья вполне перисто-разсѣченные. 5.

Листья лировидно-разсѣченные, перисто-надрѣзные или ромбическіе. 7.

5. Стебель трубчатый, легко сплюснывающійся.

N. amphibium R. Br. γ. varifolium DC.

Стебель плотный, не трубчатый, а если трубчатый, то не сплюснывающійся. 6.

6. Корневище ползучее; стручечки эллиптическіе.

N. anceps Rehb.

Корневище не ползучее; стручечки линейные или линейно-ланцетные.

N. silvestre (L.) R. Br.

7. Стебли лежащіе, трубчатые, съ побѣгами, укореняющіеся; въ мѣстахъ укорененія пучки крупныхъ, часто лировидныхъ листьевъ.

N. amphibium R. Br. β. aquaticum L.

Стебли не укореняющіеся, безъ пучковъ листьевъ. 8.

8. Стеблевые листья совершенно голые. 9.

Стеблевые листья съ нижней стороны б. или м. густо покрыты волосами. 10.

9. Листья б. ч. лировидно-надрѣзные или ромбическіе; стебель плотный; корневище ползучее.

N. anceps Rehb.

Все листья не раздѣльные, лопатчатые; стебель полый, съ побѣгами.

N. amphibium R. Br. α. riparium Tausch.

10. Листья лопатчатые или слабо-ромбическіе, суженные въ узко-крылатый черешокъ; стебель безъ побѣговъ и безъ ползучаго корневища.

N. armoracioides Tausch.

Листья лировидно-разсѣченные, рѣже ромбическіе; корневище ползучее.

N. anceps Rehb.

445. **N. austriacum Crantz.** Пет. Кр. 1, стр. 62.—Пет., стр. 227.—Кауф. II, № 50.—Гор., № 3.—Цип., № 73.—Рупр., стр. 62 и 86.

Nasturtium amphibium R. Br. α. riparium Tausch. Кауф. II, стр. 35.—Кауф. I, стр. 47.

Стебель 50—100 см., прямостоящій, вѣтвистый, плотный, не трубчатый, иногда съ подземными побѣгами; листья продолговатые или иногда

почти ланцетные, часто несколько лопатчатые, съ обѣихъ сторонъ совершенно голые; нижніе—переходить въ несколько крылатый черешокъ, сидящій на стеблѣ ушкомъ, неравно-зубчатые, иногда почти надрѣзные, зубцы и надрѣзы то острые, то тупые; средніе и верхніе листья сидячіе, основаніе ихъ переходить въ крупное ушко, верхушка листьевъ округлая или слегка заостренная, край неравно-зубчатые, зубцы чаще туповатые; верхушечные листья дѣльнокрайніе; лепестки до 3 мм., золотисто-желтые, длиннѣе чашечки; стручечекъ шаровидный, во много разъ короче плодоножки; столбикъ такой же длины, какъ стручечекъ.

По заливнымъ лугамъ и паровымъ полямъ, рѣдко. Цвѣтеть въ іюнѣ и іюлѣ; зрѣлые плоды въ августѣ. Близъ Серпухова (Рупр., потомъ Вар.).—Близъ Симанова монастыря (К.).—Ст. Удѣльная, М.-Каз. ж. д., на паровомъ полѣ (П. и С.).



Nasturtium austriacum.



Nasturtium amphibium s. riparium.

446. *N. amphibium* (L.) R. Br. Пет. Кр. I, стр. 62.—Пет., стр. 227.—Кауф. II, № 49.—Цин., № 72.—Кауф. I, стр. 47.

Nasturtium Amphibium R. Br. Макс., № 613.

Sisymbrium amphibium L. Дв., № 644.—Макс., № 613.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 115.—Hoff., № 3075.—St. II, p. 88.—St. I, № 447.—Pal., № 1378.

Стебель 30—100 см., лежачій, приподнимающійся или прямостоящій, съ побѣгами и вѣтвистой верхушкой, трубчатый, особенно вздута та часть его, которая бываетъ погружена въ воду; листья продолговатые или ланцетные, заостренные, зубчатые или надрѣзочно-зубчатые; нижніе—иногда перисто-гребенчато-надрѣзные съ почти нитевидными долями, молодые—съ нижней стороны часто коротко-опушенные, верхніе—къ основанію суженные, сидячіе, иногда съ маленькимъ ушкомъ или безъ него; цвѣты оранжево-желтые; лепестки въ 2 раза длиннѣе чашечки; стручечки эллиптические или почти шаровидные, въ 2—3 раза короче плодоножекъ.

Цвѣтеть съ половины мая весь іюнь.

α. riparium Tausch.

Nasturtium amphibium R. Br. α. *indivisum* DC.—*Nasturtium riparium* Wallr.

Стебли прямостоящие, сильно вѣтвистые, полые, у основанія почти деревянистые; всѣ листья не раздѣльные, только неравно- и остро-зубчатые, иногда нѣкоторые зубцы узкіе и длинныя; во время цвѣтенія до появленія плодовъ походить на *N. austriacum* Crantz, но отъ послѣдняго отличается эллиптическими стручками, слегка



Nasturtium amphibium β. *aquaticum*.



Nasturtium amphibium γ. *variifolium*

трубчатымъ стеблемъ и листьями съ едва замѣтными ушками.

У моста черезъ р. Лопасню, Моск.-Кур. ж. д. (Н.). По пескамъ близъ Вѣлпесодкой слободы, Срп. у. (П. и Х.).

β. aquaticum L.

Nasturtium amphibium R. Br. β. *indivisum* DC. Пет. Кр. I, стр. 62.—Кауф. II, стр. 36.—Кауф. I, стр. 47.

Nasturtium amphibium R. Br. β. *auriculatum* Rehb.

Стебель трубчатый, лежащій, съ побѣгами и съ приподнимающейся верхушкой, укореняющійся и въ мѣстахъ укорененія съ пучками крупныхъ, часто ланцетныхъ листьевъ, пластинки которыхъ переходятъ въ длинныя, слегка крылатые черешки, а нижняя сторона б. или м. густо покрыта короткими волосками; стеблевые листья цѣльныя, неравно-зубчатые.

По берегамъ рѣкъ, озеръ и прудовъ, очень часто. Тюфелева роща, Симоновъ монастырь (К.).—Давыдково (А.)—Озера близъ Серпухова; Серебряный боръ близъ Хоронова, по озеркамъ (П.).—Близъ Никифорова, Срп. у. (С.).

γ. variifolium DC. Пет. Кр. I, стр. 62.—Кауф. II, стр. 36.—Кауф. I, стр. 47.

Nasturtium amphibium R. Br. var. *submersum* Tausch.

Стебель обыкновенно погруженъ въ воду, трубчатый; верхніе листья узко-ланцетные, зубчатые; средніе—перисто-надрѣзные; нижніе—гребенчато-перисто-раздѣльные, у нижнихъ—доли часто ланцетовидныя. У береговъ рѣкъ, озеръ и прудовъ, часто. Симоновъ монастырь;

Пестриково близъ Коломны (К.).—Серебряный боръ близъ Хорошова (П.).—Озеро Кривое близъ Серпухова (С.).

447. *N. armoracioides* Tausch, non Čelak.

Стебли примостоящие. 20—60 см. б. ч. плотные, не трубчатые, вѣтвистые, безъ подземныхъ побѣговъ; листья плотные, по краямъ двояко-неравно- и остро-зубчатые, лопатчатые, спереди нѣсколько заостренные, къ основанію суженные въ б. или м. длинный, часто крылатый черешокъ съ маленькими ушками; рѣдко нѣкоторые листья слегка лировидные; нижняя сторона б. или м. густо покрыта короткими щетинистыми волосками, отчего они шероховатые; лепестки въ 2 раза длиннѣе чашечки; стручечекъ эллиптическій, длина его не болѣе 2 разъ превышаетъ ширину; столбикъ въ 2 раза короче стручечка ¹⁾.



Nasturtium armoracioides

По пескамъ и песчанымъ берегамъ, рѣдко. Цвѣтетъ въ іюнѣ и въ іюлѣ. Близъ Симонова монастыря (К.), экземпляръ хранится въ гербаріи А. Н. Петунникова. Близъ Вѣлпесочной слободы. Срп. у. (П. и Х.).—М.-Курск. ж. д., у моста черезъ Лопасню, Срп. у. (П.).

448. *N. anceps* Rehb.

Nasturtium anceps DC. Пет. Кр. I, стр. 62.—Бух. II, № 35.—Бух. I, № 36.—Ф. О., № 5, р. 70.—Пет., стр. 227.—Кауф. II, № 51.—Цин., № 75.—Рупр., стр. 62 и 87.—Кауф. I, стр. 47.

Nasturtium silvestre R. Br. β . subindivisum Kauffm. Кауф. II, стр. 37.—Кауф. I, стр. 48.

Корневище ползучее, съ примостоящими или приподнимающимися, простыми или вѣтвистыми стеблями въ 30—90 см.; листья очень разнообразны: то перисто- или лировидно-разсѣченные, то почти ромбическіе съ маленькими лировидными дольками у основанія пластинки, которая книзу вытянута въ б. или м. длинный черешокъ; очень рѣдко листья просто ромбическіе съ черешками б. или м. крылатыми и маленькими ушками, и тогда края листьевъ остро- и неравно-зубчатые; когда же

¹⁾ Neilreich, въ Flora von Nieder-Oesterreich, считаетъ этотъ видъ за помѣсь: *austriaco-silvestris*. Что это помѣсь — несомнѣнно, потому что характерные признаки, приводимые Tausch'емъ, въ Bot. Ztg. 23, 2, 707, какъ-то: овальные стручечки и опушеніе нижней стороны листьевъ очень перемѣнчивы. Изъ большого матеріала, собраннаго въ Вѣлпесочной слободѣ и любезно доставленнаго мнѣ А. А. Хорошковымъ и А. Н. Петунниковымъ, можно было найти экземпляры съ листьями почти голыми и густо покрытыми пушкомъ, а равно и съ плодами почти шаровидными и эллиптическими, но были экземпляры, признаки которыхъ вполне подходять къ типичному *N. armoracioides* Tausch.

листья перисто-раздельные, то доли их все-таки несколько изгибаются, отчего средняя жилка листа несколько крылатая; края долей неравнозубчатые и нижняя поверхность листа почти всегда покрыта очень коротким и редким пушком, редко почти голая¹⁾; цветы ярко-желтые; лепестки вдвое длиннее чашечки; стручки продолговато-линейные или эллиптические, с 6. или м. длинным столбиком; в последнем случае столбик иногда достигает половины длины стручка; ножка стручка 6. ч. в 2 раза длиннее последнего, и отходит под острым углом, реже ножка отклонена.

По сырым местам, по берегам рек, около жилья, часто. Цветет с половины июня, весь июль и в начале августа.



Nasturtium anceps.



Nasturtium silvestre

449. *N. silvestre* (L.) R. Br. Бух. II, № 34.—Бух. I, № 35.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 227.—Кауф. II, № 52.—Цип., № 76.—Кауф. I, стр. 48.—Lind., p. 86.—Ann. C. V, № 6.—Макс., № 611.

Nasturtium silvestre R. Br. *s. pinnatipartitum* Kauffm. Кауф. II, стр. 37.—Кауф. I, стр. 48.

Sisymbrium silvestre L. Дв., № 642.—Макс., № 611.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 115.—St. II, p. 38.—St. I, № 446.—Pal., № 1377.

Стебель один или их несколько, в 20—60 см., простых или ветвистых, прямостоящих или иногда почти лежачих; листья перистые; верхние — иногда глубоко-перисто-раздельные; корневые и нижние стеблевые — 6. ч. с 3—6 парами листочков; последние удлиненно-яйцевидные, ланцетные или даже линейные, по краям зубчатые или зубчато-надрезные, иногда у верхних листьев цельнокрайние, конечный листок

¹⁾ В моем экземпляре гербария русской флоры (Herb. Fl. Ross., № 1553) имеется *N. anceps* Rehb., который очень наглядно иллюстрирует неостоянство форм листьев этого вида. Экземпляр этот превосходно выкопан, имеет длинное, ползучее корневище и два стебля, из которых один имеет листья перисто-раздельные, а другой — ланцетные с одной парой нижних долей и с крупною, ромбическою пластинкой.

нѣсколько крупнѣе боковыхъ. рѣже равенъ имъ; всѣ листья б. ч. голые. цвѣты ярко-желтые; лепестки вдвое длиннѣе чашечки; чашелистики желтые; стручекъ съ короткимъ столбикомъ, 7—14 мм. дл. и едва 1 мм. толщ. линейный или продолговато-линейный. равенъ ножкѣ или короче ея. въ поперечномъ разрѣзѣ почти круглый, ножки стручковъ отклонены подъ острымъ угломъ, рѣже отстоятъ горизонтально, а нижнія иногда нѣсколько отогнуты внизъ.

Но сырмъ лугамъ, по берегамъ рѣкъ и канавъ, часто. Цвѣтеть съ половины іюня весь іюль.

450. *N. palustre* DC. Бух. II, № 33.—Бух. I, № 34.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 226.—Кауф. II, № 53.—Цин., № 77.—Кауф. I, стр. 48.—Lind., p. 86.—Макс., № 612.

Sisymbrium palustre L. Дв., № 643.—Макс., № 612.—Hoff. H., № 5013.—Gold. C., p. 21.—Gold. Sp., p. 131.—Mart., p. 115.—St. II, p. 38.

Стебель 20—70 см., вѣтвистый, бороздчатый, голый, прямостоящій, приподнимающійся или лежащій; листья перисто-раздѣльные, на черешкахъ; черешки полустеблеобъемлющіе; доли листа овальные, тупо или округло-городковые; конечная доля въ два раза крупнѣе боковыхъ; цвѣты блѣдно-желтые; лепестки 2 мм., равны чашечкѣ; стручки до 9 мм., сильно вздутые, равны плодonoжкамъ или нѣсколько короче ихъ; столбикъ очень короткій.

По сырмъ мѣстамъ, очень часто. Цвѣтеть съ іюня до половины августа.



Nasturtium palustre

170. *Barbarea* R. Br.

Стручки линейные, цилиндрическіе, съ 4 гранями; створки съ одной жилкой; рыльце простое или выемчатое; сѣмена въ каждомъ гнѣздѣ одноярдныя; лепестки съ ноготкомъ; чашелистики не отогнуты.

451. *B. vulgaris* R. Br. Пет. Кр. I, стр. 63.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 145.—Кауф. II, № 54.—Цин., № 79.—Кауф. I, стр. 49.—Lind., p. 86.—Макс., № 614.—Hoff. H., № 5032.

Erysimum Barbarea L. Дв., № 648.—Макс., № 614.—Hoff. H., № 5032.—Mart., p. 116.—St. II, p. 38.—St. I, № 451.—Pal., № 1388.

Стебель 30—60 см., голый, глубоко-бороздчатый, прямостоящій, вѣтвистый; нижніе стеблевые листья на черешкахъ, ланцетные, съ очень крупною конечною долей, волнисто-выемчатою и у основанія сердцевидною; средніе листья перисто-надрѣзные такъ же, какъ и верхніе сидячіе стрѣльчато-стеблеобъемлющіе, верхніе—только зубчатые; цвѣты до 6 мм., золотисто-желтые, въ густыхъ соцвѣтіяхъ; незрѣлые стручки прямые и косо отходятъ отъ цвѣтоноса.

α. arcuata Wahlenb. Пет. Кр. I, стр. 63.

Barbarea vulgaris R. Br. *β. arcuata* Koch. Бух. II, № 36.—Бух. I, № 37.—Кауф. II, стр. 38.—Кауф. I, стр. 49.

Незрѣлые стручки дугообразно изогнуты и оттопырены отъ цвѣтоноса; конечная доля нижнихъ листьевъ не сердцевидная, иногда даже суженная къ основанію.

По паровымъ полямъ и посѣвамъ, очень часто. Цвѣтеть съ половины мая до половины іюня.



Barbarea vulgaris α. arcuata.



Barbarea stricta

452. *B. stricta* Andrzej. Пет. Кр. I, стр. 64.—Бух. II, № 37.—Бух. I, № 38.—
F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 145.—Кауф. II, № 55.—
Цин., № 80.—Кауф. I, стр. 49.

Стебель 50—100 см., прямостоящій, голый, бороздчатый, вѣтвистый; нижніе листья на очень длинныхъ черешкахъ, лоповидные; конечная доля очень большая, овальная, тупо-городковая, боковыя доли очень маленькія, овальныя или треугольныя, иногда едва замѣтныя; средніе и верхніе листья сидячіе, стеблеобъемлющіе и крупно-городковые; цвѣты блѣдно-желтые; лепестки до 4 мм., немного превышаютъ чашечку; стручки прямо-торчащіе и прижатые къ цвѣтоносу.

По берегамъ рѣкъ, сырымъ и болотистымъ лугамъ, на торфяной почвѣ. Цвѣтеть съ половины мая до конца іюня. Влѣзъ Перервы, Мякишино (К.). — Вороново — островъ на Юрьевскомъ озерѣ, Пдл. у. (Б.). — Б. Мытищи — противъ станціи (П.). — Противъ д. Селюхино на берегу р. Лютенки, Кля. у.; Звенигородъ — Саввинскій монастырь на бер. р. Разводни (П. и С.). — Пушкино на берегу р. Учи влѣзъ Жареновки (С.). — На берегу р. Войны влѣзъ Романцова, Мож. у. (В.).

171. *Turritis* L.

Стручекъ линейный; створки стручка выуклыя, съ сильно выдающеюся срединной жилкой; сѣмена въ каждомъ гнѣздѣ двурядныя.

453. *T. glabra* L. Бух. II, № 38.—Бух. I, № 39.—F. O., № 5, p. 70.—Нет., стр. 296.—Кауф. II, № 56.—Цин., № 82.—Кауф. I, стр. 50.—Lind., p. 86.—Дв., № 653.—Макс., № 615.—Hoff. II, № 5139.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 116.—Hoff., № 3368.—St. II, p. 38.—St. I, № 454.—Pal., № 1402.

Стебель 50—130 см., прямостоящий и, какъ все растеніе, сизый; корневыя листья продолговатыя, сужены въ черешокъ, крупно-и неравно-зубчатые, шершавые отъ трехраздѣльныхъ волосковъ; остальные листья продолговатыя, заостренныя, сидячія, стрѣловидно-стеблеобъемлющія, голыя; цвѣты желтоватыя, почти бѣлыя; лепестки 6 мм., немного длиннѣе чашечки; стручки до 10 см. дл., вверхъ торчащія и прижатые къ цвѣтоносу; плодоножка во много разъ короче стручка.

По открытымъ мѣстамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ первыхъ чиселъ іюня, почти весь іюль.



Turritis glabra

172. *Árabis* L.

Стручки линейныя, б. ч. сплюснутыя; створки съ одной срединной жилкой или же со многими параллельными жилками; рыльце простое или выемчатое; сѣмена въ каждомъ гвѣздѣ однорядныя, сплюснутыя, часто крыловидно-окаймленныя; растенія б. ч. покрытыя вѣтвистыми волосками.

1. Стручки отклонены горизонтально и повислыя; стебель жестковолосистый, волоски на стеблѣ простые. *A. pendula* L.

Стручки прижаты къ цвѣтоносу, прямостоящія: стебель курчавоволосистый съ развѣтвленными волосками. 2.

2. Сѣмена съ пленчатымъ краемъ, огибающимъ половину сѣмени или вѣсколько болѣе половины. *A. hirsuta* Scop.

Сѣмена съ пленчатымъ краемъ, огибающимъ все сѣмя кругомъ.

A. Gerardii Bess.

454. *A. Gerardii* Bess. Мос., № 1.

Стебель 30—50 см., прямостоящий, простой или вѣтвистый, покрытый, какъ и листья, звѣздчатыми волосками; нижніе листья округло-лопатчатые или продолговатыя, суженныя въ черешокъ, зубчатые; стеблевые—сидячія, съ стрѣловиднымъ основаніемъ, крупно-зубчатые, прижаты нижней своей половиной къ стеблю, довольно сближены, такъ что верхняя треть или половина листа заходитъ за слѣдующій листъ; цвѣты бѣлыя; стручокъ до 5 см., съ мало выдающейся срединной жилкой и б. ч. съ ясно замѣтнымъ столбикомъ; сѣмена съ перепончатымъ краемъ, огибающимъ все сѣмя кругомъ.

Опушка старого лиственного леса по берегу р. Десны близъ Лаптевской мельницы на почвѣ, богатой известью, Пдл. у. (Мос.). — На известнякѣ близъ д. Родневой на берегу р. Мѣчи, Пдл. у. (Х.).



Arabis Gerardii.



Arabis hirsuta

455. *A. hirsuta* (L.) Scop. Пет. Кр. I, стр. 64. — Ф. Б., № 3. — Пет., стр. 139. — Кауф. II, № 57. — Гор., № 3. — Цин., № 85. — Кауф. I, стр. 50. — Lind., p. 86.

Turritis hirsuta L. Дв., № 659. — Макс., № 618. — Hoff. H., № 5140. — Mart., p. 117. — St. H., p. 38. — Pal., № 1403.

Стебель 30—50 см., прямостоящій, простой или нѣсколько вѣтвистый, въ нижней части покрытый, какъ и листья, развѣтвленными волосами; корневые листья розеткой, продолговатые, суженные въ черешокъ и б. ч. зубчатые; стеблевые — сидячіе, съ сердцевиднымъ основаніемъ, б. ч. зубчатые, отстоятъ довольно далеко одинъ отъ другого, такъ что только верхняя четверть покрываетъ основаніе слѣдующаго листа; цвѣты бѣлые; лепестки до 5 мм.; чашелистики съ бѣлой каймой, по стцвѣтаніи желтѣютъ; стручки до 3.5 см., вверхъ торчащіе, съ выдающейся срединной жилкой и съ очень короткимъ, почти незамѣтнымъ столбикомъ; сѣмена съ перепончатымъ краемъ, огибающимъ только половину сѣмени или немного болѣе половины.

По берегамъ рѣкъ, рѣдко. Цвѣтеть съ начала іюня; плоды въ августѣ. Воробьевы горы по кустарникамъ (герб. Гольдбаха). — Близъ Жуковки, у шоссе, Мос. у. (Г. О.). — По берегу Москвы р. близъ Картина, Руз. у. (Г. О. и Арнольдъ). — Петровское-Разумовское (Кл.). — С. Клементьево по берегу р. Искони и Красный Станъ по берегу Москвы р., Руз. у. (Сюз.). — Берегъ Москвы р. у Воробьевыхъ горъ; Лапково — берегъ Москвы р., Руз. у. (II.).

456. *A. péndula* L. Пет. Кр. I, стр. 64. — Пет., стр. 139. — Кауф. II, № 58. — Цин., № 86. — Кауф. I, стр. 50. — Ann. C. V, № 7. — Дв., № 652. — Макс., № 618. — Pal., № 1400.

Стебель 30—80 см., прямостоящий, простой или вѣтвистый, бороздчатый, шершаво-волосистый; волоски простые, на листьяхъ развѣтвленные; нижніе листья овальные, суженные въ черешокъ, остальные—сидячіе; немного стеблеобъемлющіе, продолговато-овальные или продолговато-ланцетные, заостренные, зубчатые; цвѣты бѣлые; лепестки до 5 мм.; стручки до 7 см., на длинныхъ плодоножкахъ, горизонтально - отстоящихъ, позднѣе дугообразно отклоненныхъ.



Arabis pendula.

По лѣсистымъ холмамъ и на сырой почвѣ, рѣдко. Цвѣтеть съ половины іюня; плоды въ августѣ. Влнзъ Коломенскаго (Дв.).—Кунцово (А.).—Соколово (К.).—Воскресенскъ подъ стѣнами Новаго Іерусалима, Звн. у. (П.).—Между Клементьевымъ и Пуршевымъ по берегу р. Искови, Руз. у. (Сюз.).—Шебалы, Пдл. у. (Б.).—Куркино, Звн. у. (Шатерниковъ).

173. *Cardamine* L.

Стручекъ липейный; створки плоскія, безъ срединной жилки или съ едва замѣтной срединной жилкой только у основанія; створки разверзающагося стручка отскакиваютъ и эластично свертываются; сѣмена сидятъ въ гнѣздѣ одноордно.

1. Цвѣты мелкіе; лепестки немного длиннѣ чашечки.

C. impatiens L.

Цвѣты крупныя; лепестки въ 3 раза длиннѣ чашечки. 2.

2. Пыльники желтые; стебель съ корневою розеткой листьевъ.

C. pratensis L.

Пыльники фіолетовые; стебель безъ корневой розетки листьевъ.

C. amara L.

457. *C. impatiens* L. Пет. Кр. I, стр. 65.—Бух. II, № 40.—Бух. I, № 41.—
 F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 155.—Кауф. II, № 59.—
 Цин., № 90.—Кауф. I, стр. 51.—Дв., № 636.—Макс.,
 № 623.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 114.—Lon., p. 282.

Стебель 20—50 см., простой или вѣтвистый, бороздчатый, голый, какъ и все растеніе; всѣ листья перистые; нижніе—розеткой, корневые и средніе—черешковые, верхніе—почти сидячіе; доли нижнихъ листьевъ округло-городковыя или округло-надрѣзные; доли верхнихъ—остро-городковыя; непарная доля крупнѣ боковыхъ и часто трехнадрѣзная; основаніе черешка стрѣловидное, иногда рѣсниччатое; цвѣты мелкіе, бѣлые, иногда лепестковъ пять; плодоножки отстоящія, почти горизонтальныя; стручки прямостоящіе, длиною въ 3—4 см.

Въ лѣсахъ по сырѣмъ и тѣнистымъ мѣстамъ. Цвѣтетъ съ половины мая, весь июнь. Кунцово, Воробьевы горы, Лизаветино, Братцово; Архангельское, Зви. у. (К.).—Около рѣки въ Грачевникахъ и Шебалахъ, Пдл. у. (В.).—Лосинный Островъ; Боровскій курганъ—противъ Заозерья, Брн. у. (С.).—Анофриево—въ лѣсу по берегу Тростенскаго озера, Руз. у.; Воскресенскъ подъ стѣнами Новаго Иерусалима, Зви. у. (П.).—Черкизово на Клязьмѣ; д. Медвѣдка у р. Икши, Дмт. у. (Х.). Рождествено, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).



Cardamine impatiens.



Cardamine pratensis.



Cardamine amara.

458. *C. pratensis* L. Пет. Кр. I, стр. 65.—Бух. II, № 41.—Бух. I, № 42.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 156.—Кауф. II, № 60.—Цин., № 88.—Кауф. I, стр. 51.—Lind., p. 86.—Дв., № 639.—Макс., № 620.—Hoff. H., № 4988.—Gold. C., p. 21.—Gold. Sp., p. 131.—Mart., p. 114.—Hoff., № 673.—St. II, p. 38.—St. I, № 444.—Pal., № 1376.

Cardamine pratensis L. *β. dentata* Rehb. Pinz., p. 9.

Стебель 15—40 см., простой или въверху вѣтвистый, тонко-бороздчатый, б. ч. голый; листья перисто-раздѣльные, корневыя—розеткой, на черешкахъ, доли ихъ округло-яйцевидныя, цѣльнокрайнія или угловато-зубчатая; верхушечная доля крупнѣ боковыхъ; стеблевые листья б. ч. сидячіе или нижніе на короткихъ черешкахъ; доли ихъ продолговатыя или продолговато-ланцетныя, тупыя, цѣльнокрайнія или иногда съ однимъ зубцомъ близъ верхушки; цвѣты крупныя, бѣлыя или лиловатыя; лепестки до 14 мм., въ 3 раза длиннѣ чашечки; пыльники желтые; столбикъ толстый, короче ширины стручка; рыльце выемчатое.

По сырѣмъ, болотистымъ лугамъ, по берегамъ рѣкъ и ручьевъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины мая до половины июня.

- a. vivipara* Goldb. Пет. Кр. I, стр. 65. Кауф. II, стр. 41.—Кауф. I, стр. 52.—Gold. Sp., p. 131.

Съ луковичками на нижнихъ листьяхъ, прорастающими въ новыя недѣлимья. Въ гербаріи Гольдбаха.

459. *C. amára* L. Пет. Кр. I, стр. 65.—Бух., II, № 42.—Бух. I, № 43.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 156.—Кауф. II, № 61.—Цив., № 87.—Pinz., p. 9.—Кауф. I, стр. 52.—Lind., p. 86.—Др., № 640.—Макс., № 619.—Hoff. II., № 4981.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 115.—Lon., p. 113.

Стебель 20—50 см., съ побѣгами, бороздчатый, примостоящій, простой или вверху вѣтвистый, боковые стебли приподнимающіеся, иногда почти лежачіе; все растеніе б. ч. голое; листья перистые, прикорневой розетки нѣтъ; корневые листья на черешкахъ, доли ихъ округло-яйцевидныя, выемчато-зубчатые; доли стеблевыхъ листьевъ продолговатыя, угловато-зубчатые; цвѣты бѣлые, крупныя; лепестки до 9 мм., втрое длиннѣе чашечки; пыльники фіолетовыя; стручекъ съ тонкимъ, шиловиднымъ столбикомъ, длина котораго болѣе ширины стручка.

По тонкимъ и тѣнистымъ мѣстамъ и по берегамъ рѣкъ и ручьевъ. Цвѣтетъ съ половины мая до половины іюня. Покровское-Фили, Лизаветино, Воробьевы горы (К.).—Михайловское, Пдл. у. (В.).—Мытищи—Лосинный Островъ; ручей близъ Образцово-Соколово на Щелковской ж. д. (С.).—Кунцово (П.).—Дарьино, Звн. у. (X.).

- α. *hirta* Wimm. et Grab. Пет. Кр. I, стр. 65.—Кауф. II, стр. 41.—Кауф. I, стр. 52. *Cardamine sylvatica* Hartm. Дв., № 638.—Макс., № 621.—Gold. Sp., p. 131.—Mart., p. 114.

Все растеніе покрыто короткими волосками; цвѣтоножки голыя. Воробьевы горы (К.).—Сокольники (герб. Геннинга).—Богородское—Лосинный Островъ (П.).—Валки, Брн. у. (X.).

174. *Hesperis* L.

Стручекъ линейный, почти цилиндрическій, торчащій, бугорчатый или слегка 4-гранный; створки съ 3 жилками, изъ которыхъ срединная сильно выдается; рыльце 2-лопастное съ широкими, прижатыми одна къ другой лопастями; сѣмена въ каждомъ гнѣздѣ однорядныя.

460. *H. matronális* L. Пет. Кр. I, стр. 70. — Пет., стр. 199. — Кауф. II, № 62.—Гор., № 5.—Цив., № 95.—Pal., № 1399.

Стебель 30—100 см., примостоящій, вѣтвистый, какъ и все растеніе, б. ч. съ вѣтвистыми и железистыми волосками; нижніе листья черешковые, яйцевидно-ланцетные, заостренные, зубчатые; верхніе—почти сидячіе, узко-ланцетные; цвѣты крупныя, лиловые, рѣже бѣлые, по вечерамъ душистые; чашелистики посрединѣ съ широкой, зеленой полоской, съ бѣлымъ краемъ и съ отстоящими щетинистыми волосками; стручекъ до 12 см. дл., торчащій, бугорчатый, на отклоненной плодоножкѣ.



Hesperis matronalis.

Рѣдко, б. ч. одичалое. Цвѣтеть въ іюнѣ. На песчаномъ островѣ р. Оки противъ Карапчеева, Калм. у (Н.).—Находится въ гербаріи Мельгунова изъ-подъ Серпухова, подъ именемъ *Lunaria rediviva*.—Дарьино, Звн. у. (Х.).—Салтыковка, Мос. у., близъ жилья (Куль.).

175. *Sisymbrium* L.

Стручекъ цилиндрическій, линейный или слабо- 4-гранный, рѣже шиловидный; створки съ 3 продольными жилками; сѣмена въ каждомъ гвѣздѣ однорядныя.

1. Цвѣты бѣлые. 2.

Цвѣты желтые. 3.

2. Листья крупныя, сердцевидныя, почковидно-сердцевидныя или треугольныя, крупно-зубчатыя. *S. Alliaria Scop.*

Листья мелкія, въ корневой розеткѣ, продолговатыя, ланцетныя или линейно-ланцетныя, мелко-зубчатыя или цѣльнокрайнія.

S. Thalianum Gay et Monn.

3. Листья ланцетныя, зубчатыя. *S. strictissimum L.*

Листья перисто-раздѣльныя, ланцетныя, струговидныя или верхнія ланцетныя или линейныя, цѣльнокрайнія, а нижнія—перистораздѣльныя или ланцетныя, рѣдко цѣльнокрайнія, но тогда всѣ линейныя. 4.

4. Верхнія листья линейныя или ланцетныя. 5.

Всѣ листья перисто-раздѣльныя, струговидныя или ланцетныя. 6.

5. Верхнія листья линейныя, нижнія—въ очертаніи ланцетныя, перисто-надрѣзные; соцвѣтіе не густое, мало-вѣтвистое.

S. junceum M.B.

Верхнія листья ланцетныя, нижнія копьевидныя или струговидныя, надрѣзные, съ треугольными долями; верхняя доля много крупнѣе боковыхъ; соцвѣтіе б. или м. густое вѣтвистое, метельчатое.

S. wolgensae M.B.

6. Всѣ листья 2—3-перисто-раздѣльныя; перегородка стручка съ жилками. *S. Sophia L.*

Листья, по крайней мѣрѣ нижнія, струговидно-перисто-раздѣльныя; перегородки стручка безъ жилокъ. 7.

7. Стручки прижаты къ цвѣтоносу и сужены шиловидно.

S. officinale Scop.

Стручки на отклоненныхъ плодоножкахъ, цилиндрическія. 8.

8. Верхнія листья перисто-раздѣленные, съ узко-линейными, цѣльнокрайними долями; перегородка стручка съ ямочками; цвѣты блѣдно-желтые. *S. sinapistrum Crantz.*

Всѣ листья струговидно-перисто-раздѣльныя; перегородка стручка плоская, безъ ямочекъ; цвѣты желтые. *S. Loeselii L.*

461. *S. officinale* (L.) Scop. Пет. Кр. I, стр. 66.—Бух. II, № 43.—Бух. I, № 44.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 281.—Кауф. II, № 63.—Цин., № 97.—Кауф. I, стр. 53.—Lind., p. 88.—Ann. C. V, № 8.—Макс., № 624.—*Erysimum officinale*. L. Дв., № 647.—Макс., № 624.—Hoff. H., № 5043.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 116.—Hoff., № 1317.—St. II, p. 38.—St. I, № 450.—Pal., № 1387.

Стебель 40—70 см., прямостоящий, сильно вѣтвистый, б. ч. съ горизонтально-отстоящими вѣтвями; все растение опушенное: листья съ черешками, струговидно-раздѣльные; конечная доля большая, стрѣловидная; цвѣты блѣдно-желтые, лепестки до 4 мм.; стручки на короткихъ плодоножкахъ, сужены къ верхушкѣ шпловидно и прижаты къ цветоносу, дл. до 14 мм.

Сорное, по огородамъ, около жилья и по дорогамъ, очень часто. Цвѣтеть съ іюня до осени.



Sisymbrium officinale



Sisymbrium sinapistrum

462. *S. sinapistrum* Crantz.

Sisymbrium pannonicum Jacq. Пет. Кр. I, стр. 66.—Пет., стр. 281.—Кауф. II, № 65.—Мил., № 1.—Цин., № 103. — Кауф. I, стр. 54. — Макс., № 625. — Gold. C., p. 21.—Gold. Sp., p. 131.

Стебель 30—100 см., прямостоящий, сильно-вѣтвистый, только въ нижней части жестко-волосистый, наверху голый; листья глубоко-перисто-раздѣльные, верхніе—сидячіе, съ узко-линейными, цѣльнокрайними долями; доли среднихъ и нижнихъ листьевъ широко-линейныя, продолговатыя или ланцетныя, у нижнихъ съ однимъ или двумя крупными зубцами при основаніи; конечная доля иногда трехраздѣльная; цвѣты грязно-желтые; лепестки до 8 мм.; стручки очень длинныя, до 9 см., на короткой ножкѣ почти такой же толщины, какъ и стручекъ; перегородка стручка съ ямочками для сѣмянъ.

Сорное и по берегамъ рѣкъ, рѣдко. Цвѣтеть съ іюня до осени.

Берегъ Москвы р. близъ лѣснаго рынка (герб. Гольдбаха).—Кусково (герб. Борхмана).—Серпуховъ, на крѣпости (герб. Максимовича).—Люберцы (Тор.).—Ст. Фаустово у полотна ж. д.; близъ Заозерья на берегу Москвы р., Брн. у. (П. и С.).—Ст. Быково, М.-Каз. ж. д., у полотна въ большомъ числѣ (С.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.).

463. *S. Loeselii* L. Пет., стр. 281.—Кауф. II, № 64.—Цин., № 101.—Кауф. I, стр. 53.—Дв., № 646.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 116.—Hoff., № 3082.—St. II, p. 38.—St. I, № 449.—Pal., № 1386.

Turritis Loeselii R. Br. Макс., № 615.

Стебель 30—80 см., прямостоящій, вѣтвистый, какъ и листья, шершаво-волосистый; листья на черешкахъ, струговидно-раздѣльные; доли зубчатые, конечная доля стрѣловидная или треугольная, зубчатая; цвѣты желтые; лепестки до 6 мм.; чашелистики отклонены; стручки до 4 см., вдвое длиннѣ плодоножекъ и толще ихъ; перегородка стручка плоская, безъ ямочекъ для сѣмянъ.

По холмамъ, дорогамъ и по пустырямъ, часто. Цвѣтеть съ половины мая до осени. Петровский паркъ, Симоновъ монастырь, Перерва (К.).—Ст. Быково, М.-Каз. ж. д. (С.).—Заозерье, Брн. у. (П.).—У платформы Юдинской и на 34 верстѣ М.-Бр. ж. д. (Х.).



Sisymb. irio. Loeselii



Sisymbrium wolgense.

464. *S. wolgense* M.B.

Стебель прямостоящій, до 75 см., б. ч. сильно вѣтвистый, съ ползучими подземными побѣгами; все растеніе совершенно голое, сизоватое; нижніе листья копьевидные или струговидно-надрѣзные, съ боковыми треугольными долями и конечною долею много крупнѣ боковыхъ; верхніе листья ланцетные или линейно-ланцетные, цѣльнокрайніе; всѣ листья толстые, нѣсколько кожистые; цвѣты въ метельчатомъ, вѣтвистомъ соцвѣтѣ; лепестки ярко-желтые, до 7 мм., длиннѣ чашечки; чашелистики вверхъ торчащіе; стручекъ 3—5 см. дл., нѣсколько бугорчатый, вверхъ торчащій, на плодоножкѣ въ 4—7 разъ короче стручка иверху нѣсколько утолщенной.

Цвѣтеть съ іюня; сорное, занесено. Найдено въ большомъ числѣ въ концѣ іюля съ послѣдними цвѣтами по откосамъ полотна М.-Каз. ж. д. близъ ст. Быкова (С.); тамъ же (Куль.).

465. *S. Sôphia* L. Бух. II, № 44.—Бух. I, № 45.—F. O., № 5, p. 70.—Her., стр. 281.—Кауф. II, № 66.—Цин., № 104.—Кауф. I, стр. 55.—Lind., p. 90.—Дв., № 645.—Макс., № 626. Hoff. II., № 5021.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 115.—Hoff., № 3090.—St. II, p. 38.—St. I, № 448.—Pal., № 1384.

Стебель 20—70 см., прямостоящій, вѣтвистый; все растеніе коротко-опушенное; листья тройко-перисто-раздѣльные, доли ихъ узко-ланцетныя или ланцетныя; верхніе листья сидячіе, нижніе—на короткихъ черешкахъ; цвѣтоножки въ 2—3 раза длиннѣе чашечки; лепестки сѣрно-желтые, 2 мм., равны чашелистикамъ или короче ихъ; плодовыежки отстоятъ почти горизонтально, въ полтора раза короче вверхъ торчащихъ и немного согнутыхъ стручковъ, длина которыхъ доходитъ до 24 мм.; перегородка стручка съ жилками.

Около жилья, по пустырямъ и огородамъ, очень часто. Цвѣтеть съ половины мая до осени.



Sisymbrium Sophia



Sisymbrium strictissimum.

466. *S. strictissimum* L. Пет. Кр. I, стр. 67.—Ф. Б., № 4.

Стебель 60—130 см., прямостоящій, вѣтвистый; все растеніе коротко-пушистое; нижніе листья продолговатые, зубчатые или глубоко-зубчатые, коротко-черешковые; верхніе—сидячіе, продолговато-ланцетные или ланцетные, остро- и неравно-зубчатые; цвѣты свѣтло-желтые; лепестки до 8 мм.; у двухъ противоположныхъ чашелистиковъ имѣется по зубцу; стручки до 7 см., очень тонкіе, голые, согнутые и отстоящіе.

Найдено только разъ 8 іюля 1895 г. въ являкѣ по берегу р. Протвы, въ имѣніи Ольгино, Мож. у., между Алексѣевкой и Стреевымъ (Ф. Б.).

467. *S. juncum* M.B. Пет. Кр. I, стр. 67.

Стебель 50—100 см., прямостоящий, вѣтвистый, сизый, сверху голый, внизу немного волосистый; верхніе листья линейные, цѣльнокрайніе, нижніе—продолговатые, зубчатые или перисто-надрѣзные; доли ихъ линейныя; цвѣты желтые; лепестки до 9 мм.; стручки до 35 мм., косо вверхъ торчащіе на почти горизонтально отстоящихъ плодоножкахъ.

Занесено; найдено въ 1894 г. на откосѣ полотна Николаевской ж. д. (П. И.).

*Sisymbrium juncum.**Sisymbrium Thalianum.*

468. *S. Thalianum* (L.) Gay et Monn. Пет. Кр. I, стр. 66.—Бух. II, № 46.—
Бух. I, № 47.—F. O., № 5, p. 70.—
Пет., стр. 280.—Кауф. II, № 68.—
Цин., № 107.—Кауф. I, стр. 55.—
Lind., p. 90.—Ann. C. IV, № 2.

Arabis Thaliana L. Дв., № 651.—Макс., № 617.—Hoff. H., № 5131.—Gold. C.,
p. 21.—Mart., p. 116.—Hoff., № 302.—St. II, p. 38.

Одинъ или нѣсколько прямостоящихъ, простыхъ или вѣтвистыхъ стеблей въ 10—40 см., внизу шершавыхъ, сверху голыхъ, сизыхъ; корневые листья розеткой, прилегающіе къ землѣ, продолговатые, суженные въ черешокъ, цѣльнокрайніе или неравно-зубчатые; стеблевые листья мельче корневыхъ, сидячіе; цвѣты бѣлые; лепестки въ 2 мм., немного длиннѣ чашелистиковъ; стручки слегка сплюснутые и согнутые, на столь же длинныхъ, очень тонкихъ, отклоненныхъ плодоножкахъ.

По паровымъ полямъ, дорогамъ и сухимъ холмамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ первыхъ чиселъ мая до половины июня.

469. *S. Alliaria* (L.) Scop. Пет. Кр. I, стр. 66.—Бух. II, № 45.—Ф. Б., № 5.—
Бух. I, № 46.—Пет., стр. 280.—Кауф. II, № 67.—
Цин., № 106.—Рупр., стр. 87.—Кауф. I, стр. 54.—
Lind., p. 90.

Erysimum Alliaria L. Дв., № 649.—Макс., № 629.—Gold. C., p. 21.—Gold. Sp., p. 132.—Mart., p. 116.—Hoff., № 1313.—St. II, p. 38.—St. I, № 452.

Alliaria officinalis Andr. Макс., № 629.

Стебель 20—100 см., прямостоящий, простой или вѣтвистый, внизу немного волосистый, вверху голый; всѣ листья на черешкахъ; нижніе—сердцевидно-почковидные, средніе—сердцевидно-треугольные, верхніе—треугольные, иногда съ клиновиднымъ основаніемъ; всѣ листья неравно- и крупно-зубчатые; цвѣты бѣлые; лепестки до 5 мм.; стручки до 7 см., торчащіе, толстые, округло-4-гранные, съ 1 толстой и 2 тонкими жилками; ножки короткія, почти такой же толщины, какъ стручки; сѣмена продолговатыя, продольно-бороздчатые; все растеніе пахнетъ чеснокомъ.



Sisymbrium Alliaria

По гористымъ и сырымъ мѣстамъ въ тѣни. Цвѣтетъ съ половины мая до іюля. Воробьевы горы (Гольдбахъ).—Лизаветино (К.).—Дворцовый садъ (Ф.).—За Калужской заставой близъ Семеновскаго (Ч.).—Сѣкиринскій лѣсъ близъ Михайловскаго, Пдл. у. (Б.).—Пушкино (Ассъ).—По берегу ручья въ оврагѣ близъ имѣнія Ольгино, Мож. у. (Ф. Б.).—Саввинскій монастырь по берегу р. Разводни и по холмамъ, Звн. у. (П. и С.).—Воскресенскъ у стѣвъ Нового Іерусалима, Звн. у. (П.).—Горенки (Куль.).—Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

176. *Erysimum* L.

Стручки линеинные, 4-гранные или сплюснuto-4-гранные, рѣже почти цилиндрическіе; створки съ 3 жилками, изъ которыхъ срединная сильно выдается наподобіе кля, а боковыя—едва замѣтны; сѣмена въ каждомъ гнѣздѣ однорядныя; чашелистики прямостоящіе; наружныя—съ вышуканнами у основанія.

1. Цвѣты крупныя; лепестки 14—16 мм.; цвѣтоножка вдвое короче чашечки.

E. odoratum Ehrh.

Цвѣты мелкіе; лепестки до 9 мм.; цвѣтоножки равны чашечкѣ или длиннѣе ея. 2.

2. Цвѣтоножки въ 2—3 раза длиннѣе чашечки; стручки вдвое длиннѣе плодоножекъ и отклонены отъ цвѣтоноса.

E. cheiranthoides L.

Цвѣтоножки одинаковой длины съ чашечкой; стручки во много разъ длиннѣе плодоножекъ, б. ч. прижаты къ цвѣтоносу.

E. hieraciifolium L.

470. *E. cheiranthoides* L. Пет. Кр. I, стр. 67.—Бух. II, № 47.—Бух. I., № 55.—
F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 186.—Кауф. II, № 69.—
Цин., № 110.—Кауф. I, стр. 55.—Lind., p. 90.—
Ann. C. V, № 9.—Дв., № 650.—Макс., № 627.—
Hoff. H., № 5035.—Mart., p. 116.—Hoff., № 1315.—
St. II, p. 38.—St. I, № 453.

Erysimum Cheiranthoides L. Gold. C., p. 21.



Erysimum cheiranthoides.

Стебель 30—80 см., прямостоящий или приподнимающийся, бороздчатый,верху вѣтвистый; все растение покрыто 2—3-раздѣльными прижатыми волосками; листья ланцетные или продолговато-ланцетные, рѣдко-зубчатые, нижніе—сужены въ короткий черешокъ, верхніе—сидячіе; цвѣты ярко-желтые; лепестки до 5 мм.; стручекъ до 2,5 см., косо вверхъ торчащій, на почти горизонтальной плодоножкѣ, которая въ 2—3 раза короче стручка; стручки покрыты рѣдкими, звѣздчатыми волосками.

По паровымъ полямъ, дорогамъ, близъ жилья и на разрабатываемыхъ торфяныхъ болотахъ, очень часто. Цвѣтетъ иногда съ первыхъ чиселъ мая до осени.

α. nānum W. Zinger.

Стебель очень низкій, до 10 см., прямостоящій, не вѣтвистый; цвѣтовъ очень мало; стручки отклонены почти горизонтально и не образуютъ угла съ плодоножкой.

Подъ Лужками, Срп. у., у опушки сосноваго лѣса, въ цвѣту и въ плодахъ, 15 августа (II.).

β. umbrósum Choroschkov ¹⁾.

Отличается отъ типичнаго болѣе широкими листьями, до 2 см. ш., и нижними притупленными, а также плодоножками, частью равными, частью превышающими длину стручковъ.

Дарьино, Звн. у., у ручья въ травѣ (X.).

471. *E. hieraciifolium* L. Пет. Кр. I, стр. 67.—Кауф. II, № 70.—Gold. Sp., p. 132.

Erysimum Hieracifolium L. Макс., № 628.—Gold. C., p. 21.

Erysimum strictum Gaertn. Пет., стр. 186.—Гор., № 6.—Цин., № 111.

Erysimum hieraciifolium L. *β. Marschalianum* (Andrz.) Kaufm. Кауф. II, стр. 46.

Стебель 30—100 см., прѣмоторчащій, простой или вверху маловѣтвистый, бороздчатый; все растение сѣрое отъ 2—3-раздѣльныхъ, прижатыхъ волосковъ; листья продолговатые или продолговато-ланцетные, нижніе — сужены въ черешокъ, рѣдко-зубчатые или почти цѣльнокрайніе,

¹⁾ *Erysimum cheiranthoides* L. *β. umbrosum* var. nov.

Folia latiora, inferiora obtusata. Pedunculi siliquis longiores vel aequales.

A. Choroschkov.

верхніе—сидячіе или почти сидячіе, зубчатые, зубцы острые или цѣльно-крайніе; цвѣты желтые; лепестки до 9 мм.; цвѣтоножка равна чашелистикамъ или немного длиннѣе ихъ; стручки до 5 см., почти 4-гранные, вверхъ торчащіе и прижатые къ стеблю; столбикъ тоньше стручка; рыльце выемчатое; плодонжка во много разъ короче стручка.

По сухимъ и открытымъ мѣстамъ на песчаной и известковой почвѣ. Цвѣтетъ съ половины мая до іюля. Въ гербаріи Гольдбаха. Между Тверской и Бутырской заставой (Кар.).—Карапчеево, Калм. у. (К.).—Петровское-Разумовское (Шр.).—Мячково, Брн. у. (П. и С.).—Бачманово, Протопоново, Бѣлые Колодези, Калм. у.; Серпуховъ (П.).—Близъ ст. Быково, М.-Каз. ж. д. (С.). Обѣ слѣдующія разновидности растутъ вмѣстѣ.

α. *strictum* Fl. Wett. Пет. Кр. I, стр. 68.

Листья ланцетные или продолговатые, остро-зубчатые; стручки немного отклонены отъ цвѣтоноса. Вешняки, Мос. у. (X.).

β. *virgatum* Roth. Пет. Кр. I, стр. 68.

Листья линейно-ланцетные, цѣльнокрайніе; стручки прижаты къ цвѣтоносу. Успенское, Звн. у. (X.).



Erysimum hieraciifolium
α. *strictum*.



Erysimum hieraciifolium
β. *virgatum*.



Erysimum odoratum

472. *E. odoratum* Ehrh. Пет. Кр. I, стр. 68.—F. O., № 5, стр. 70.—Цин., № 113.

Стебель 20—100 см., прямостоящій, ребристый; все растеніе покрыто 3—4-раздѣльными волосками; листья ланцетные, продолговатые или продолговато-ланцетные, б. ч. остро-зубчатые; нижніе—иногда цѣльнокрайніе, сужены въ черешокъ, верхніе—сидячіе; цвѣты ярко-желтые, пахучіе; лепестки до 16 мм.; цвѣтоножки вдвое короче чашечки; стручки отстоящіе, на короткихъ плодоножкахъ, сѣрые, по ребрамъ зеленые; столбикъ длиннѣе ширины стручка, съ толстымъ двулопастнымъ рыльцемъ.

Найдено въ большомъ числѣ по глинистому склону къ р. Протвѣ, близъ д. Мордвиново, Мож. у., 13 іюля (Ф. О.).

177. *Brássica L.*

Стручекъ линейный или цилиндрическій, суженный въ б. или м. длинный, цилиндрическій воспикъ; створки выпуклыя, съ одной срединной жилкой или же съ тремя, изъ конхъ двѣ боковыя извилистыя, едва замѣтныя; сѣмена въ каждомъ гнѣздѣ одноридныя.

1. Цвѣты крупныя, до 20 мм.; всѣ тычиночныя нити прямыя; сѣмена гладкія. *B. oleracea L.*

Цвѣты не столь крупныя; короткія тычиночныя нити дугообразно отклонены; сѣмена ячешто-точечныя или очень мелко сѣтчато-морщинистыя. 2.

2. Распустившіеся цвѣты перерастаютъ цвѣточныя почки; чашечка къ концу цвѣтенія почти горизонтальная; сѣмя красно-бурое. *B. Rapa L.*

Распустившіеся цвѣты не перерастаютъ цвѣточные почки; чашечка къ концу цвѣтенія косо вверхъ торчащая; сѣмена черно-бурья. *B. Napus L.*

* *B. oleracea L.* Пет., стр. 149.—Кауф. II, стр. 47.—Цив., стр. 68.—Кауф. I, стр. 57.—Ноев. II., № 5152.—St. II, p. 38.—Pal., № 1407.

Все растеніе сѣро-зеленое или сизое, голое; стебель до 100 см.; верхніе листья ланцетные или яйцевидно-ланцетные, сидячіе, стеблеобъемлющіе; средніе и нижніе—лировидно-раздѣльные; цвѣты желтыя, рѣже бѣлыя; лепестки 12—20 мм.; стручки до 7 см. дл., вверхъ торчащіе, на отклоненныхъ плодоножкахъ.

Разводится въ огородахъ.



Brassica oleracea.



Brassica Rapa n. campestris.

473. *B. Rapa L.* Пет. Кр. I, стр. 69.—Пет., стр. 149.—Кауф. II, № 72.—Цив., стр. 68.—Кауф. I, стр. 57.—Mart., p. 117.—St. II, p. 38.—Pal., № 1406.

Стебель 60—100 см., прямостоящий, вѣтвистый; все растеніе сизое, въ нижней части покрыто отстоящими волосками, вверху голое; верхніе листья б. ч. цѣлюкрайніе, продолговато-овальные, стеблеобъемлющіе, съ глубокимъ сердцевиднымъ основаніемъ. нижніе — лоповидно-раздѣльные; цвѣты желтые, распустившіеся перерастаютъ цвѣточные почки; лепестки до 8 мм.; стручки вверхъ торчащіе, до 7 см., на горизонтально-отклоненныхъ плодonoжкахъ; сѣмена мелко ямочно-точечныя, свѣтло- или красно-бурыя.

α. campestris L.

Brassica Rapa L. α. *campestris* Kauffm. Бух. II, № 48.—Бух. I, № 40. — F. O., № 5, p. 70.—Кауф. II, стр. 48.—Кауф. I, стр. 57.

Brassica campestris L. Цин., № 121.—Дв., № 655.—Макс., № 630.—Gold. C., p. 21.—St. II, p. 38.—St. I, № 455.—Pal., № 1404.

Корень тонкій. На паровыхъ поляхъ, по межахъ, въ посѣвахъ и огородахъ, часто. Цвѣтетъ съ іюня до половины августа.

β. rapifera Metzg. Кауф. II, стр. 48.—Цин., стр. 68.—Кауф. I, стр. 57.

Корень толстый, мясистый. Разводится на огородахъ.



Brassica Rapa β. rapifera.



Brassica Napus.

* **B. Napus L.** Пет. Кр. I, стр. 69. — Пет., стр. 149. — Кауф. II, стр. 48. — Цин., № 122.—Кауф. I, стр. 57.—Hoff. H., № 5151.—Mart., p. 117.—St. II, p. 38.—St. I., № 456.—Pal., № 1405.

Стебель 60—20 см., прямостоящий, б. ч. вѣтвистый; все растеніе б. ч. съ сизоватымъ налетомъ; корневые листья лоповидно-раздѣльные, верхніе стеблевые — съ расширеннымъ, сердцевиднымъ, полустеблеобъемлющимъ основаніемъ, продолговатые; цвѣты желтые, распустившіеся не перерастаютъ цвѣточные почки; лепестки 8—10 мм.; стручки косо-вверхъ торчащіе, 3—7 см. дл.; сѣмена очень мелко сѣтчато-морщинистыя, черно-бурыя.

Разводится въ огородахъ, рѣдко дичаетъ. Находится въ герб. Максимовича.

178. *Sinápis* L.

Стручекъ линейный или продолговатый, неровно-бугорчатый, вытянутый въ длинный, сплюснутый, обоюдоострый или мечевидный носикъ; створки выпуклыя, съ 3 или 5 жилками; сѣмена въ гнѣздѣ однорядныя; чашелистики отстоящіе.

474. *S. arvensis* L. Her. Kr. I, стр. 69.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 280.—Кауф. II, № 74.—Цин., № 125.—Кауф. I, стр. 58.—Lind., p. 90.—Дв., № 657.—Макс., № 634.—Hoff. H., № 5160.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 117.—St. II, p. 38.—St. I, № 457.

Стебель 30—70 см., прямостоящій, покрытъ, какъ и листья, жесткими, отстоящими волосками; корневые листья ланцетовидные, крупно-зубчатые, иногда почти ланцетовидные, на черешкахъ; нижніе стеблевые—такіе же, какъ и корневые; верхніе—сидячіе, крупно- и неравно-зубчатые; цвѣты желтые; лепестки до 8 мм.; чашелистики отклоненные; стручекъ до 36 мм., прижатый къ цвѣтоносу, ребристый, переходитъ въ носикъ, длина котораго равна стручку или немного короче его; сѣмена черныя, гладкія.

По паровымъ полямъ, межамъ и огородамъ, часто. Цвѣтетъ съ іюли до середины августа.

- α. *leiocarpa* Neilr. Кауф. II, стр. 49.—Кауф. I, стр. 58.

Стручки голые.

- β. *dasycarpa* Neilr. Бух. II, № 49.—Бух. I, № 54.—Кауф. II, стр. 49.—Кауф. I, стр. 58.

Стручки покрыты жесткими, внизъ обращенными волосками.



Sinapis arvensis.



Sinapis alba.

- * *S. álba* L. Пет. Kr. I, стр. 69.—Пет., стр. 280.—Кауф. II, № 75.—Цин., № 126.—Кауф. I, стр. 58.—Дв., № 658.—Макс., № 633.—Mart., p. 117.—St. II, p. 38.—Pal., № 1412.

Стебель 30—60 см., прямостоящій, только въ нижней части жестко- и разсеяннo-волосистый, вверху б. ч. голый; листья глубоко перисто-раз-

дѣльные, съ неравными крупно-зубчатыми долями и съ болѣе крупной верхушечной долей, сливающейся съ верхними боковыми; цвѣты желтые; лепестки до 8 мм.; стручки до 15 мм., отклонены отъ цвѣтоноса съ сплюснутымъ, часто согнутымъ носикомъ, длиною со стручекъ или длиннѣе его; сѣмена желтоватая, ямочно-точечныя.

Разводится, рѣдко дичаетъ, по паровымъ полямъ и по межамъ, рѣдко. Въ гербаріи Максимовича за № 633.

179. *Alýssum* L.

Стручечки овально-яйцевидныя или круглыя, сплюснутыя параллельно перегородкѣ; створки выпуклыя; гнѣзда 1—4-сѣменные; тычиночныя нити короткихъ тычинокъ съ 2 шиловидными придатками, или всѣ тычиночныя нити съ крыловидными придатками, или же совсѣмъ безъ придатковъ; лепестки цѣльныя или слабо выемчатые.

1. Нити тычинокъ безъ крыловидныхъ придатковъ; чашелистики остаются при стручечкахъ. *A. calycinum* L.

Всѣ или только короткія тычиночныя нити съ крыловидными придатками; чашелистики опадаютъ. 2.

2. Стручечки голыя; цвѣты очень мелкіе; лепестки до 2 мм.; длинныя тычиночныя нити безъ зубцовъ, короткія — съ крыловидными зубцами. *A. minimum* Willd.

Стручечки съ звѣздчатыми волосками; лепестки до 6 мм.; всѣ тычиночныя нити съ крыловидными придатками.

A. montanum L.

475. *A. montanum* L. Пет. Кр. I, стр. 70. — Ф. Б., № 6. — Пет., стр. 135. — Кауф. II, № 76. — Цин., № 134. — Рупр., стр. 86. — Кауф. I, стр. 59. — Pal., № 1367.

Стебель 5—20 см., приподнимающійся или почти прямостоящій, у основанія деревянистый, вѣтвистый; все растеніе сѣрое отъ звѣздчатыхъ волосковъ; нижніе листья продолговато-обратно-яйцевидные, суженные въ черешокъ; стеблевые—ланцетные; всѣ цѣльнокрайніе; цвѣты ярко-желтые; лепестки до 6 мм.; нити всѣхъ тычинокъ крылатыя; чашелистиковъ при плодахъ нѣтъ; стручечки почти круглыя или округло-овальныя, съ звѣздчатыми волосками и со столбикомъ почти такой же длины какъ стручечекъ.

По пескамъ, по открытымъ мѣстамъ и по опушкамъ. Цвѣтетъ съ начала мая до половины іюня, рѣдко позднѣе. Лужки, Срп. у. (К.).—Подъ Серпуховымъ, Никифорово, устье Лопасни, Срп. у. (П.).—По известнякамъ отъ Бѣлыхъ Колодезей до с. Горы, Кзм. у. (Мпл.).—У моста М.-Кур. ж. д. черезъ р. Лопасню, Срп. у. (П.).



Alyssum montanum.

476. *A. mínimum* Willd. Пет. Кр. I, стр. 70. — Пет., стр. 135. — Кауф. II, № 77. — Мил., № 2. — Гор., № 2. Addenda, ошибочно названо *Psilonema calycinum* C. A. Mey.

Растение маленькое; стебель 4—12 см., простой или снизу вѣтвистый; листья продолговато-линейные, цѣлюкрайніе, покрыты звѣздчатыми волосками; цвѣты мелкіе, желтые, при отцвѣтаніи блѣднѣютъ; лепестки до 2 мм.; длинныя тычиночныя нити безъ зубцовъ, короткія — съ крыловидными зубцами у основанія; чашелистиковъ при плодахъ нѣтъ; стручечекъ круглый, голый, съ маленькой выемкой и съ столбикомъ въ 6 разъ короче стручечка.



Alyssum mínimum.

Цвѣтетъ въ началѣ мая. По извѣстиямъ въ Бѣлыхъ Колодезяхъ, Кзм. у. (П., Мил. и Г. М.). — Протопопово, Кзм. у. (Мил.). — Откосъ ж. д. у ст. Косино, М.-Каз. ж. д. и у ст. Сходня и Крюково, Ник. ж. д. (П. И.). — Между ст. Сходня и ст. Химки, Ник. ж. д. (Х.). — Откосъ ж. д. близъ ст. Быково, М. Каз. ж. д. (Куль.).

477. *A. calycinum* L. Кауф. II, стр. 50. — Кауф. I, стр. 59. — Дв., № 633. — Макс., № 597. — Mart., p. 113. — Hoff., № 132. — St. I, № 442. — Pal., 1366.

Psilonema calycinum C. A. Mey. Пет. Кр. I, стр. 70. — Пет., стр. 253. — Гор., № 8. — Цин., № 132.



Alyssum calycinum.

Стебли 7—20 см., прямостоящіе, вѣтвистые, какъ и все растение, покрыты звѣздчатыми волосками; нижніе листья продолговато-обратнояйцевидные, верхніе — продолговато-ланцетные, туповатые; цвѣты блѣдно-желтые; лепестки до 4 мм.; чашелистики остаются при стручечкахъ; стручечекъ округлый, покрытъ звѣздчатыми волосками, сверху немного приплюснутый, съ маленькой выемкой и съ очень короткимъ столбикомъ; нити всѣхъ тычинокъ безъ придатковъ.

Встрѣчается очень рѣдко. Находится въ гербаріи Максимовича. На откосѣ полотна Ник. ж. д., у ст. Крюково (П. И.). — Ховрино (Шатерниковъ). — Откосъ ж. д. между Малаховкой и Удѣльной, М.-Каз. ж. д. (Куль.).

180. *Bertéroa* DC.

Стручечки овальные или эллиптическіе, сплюснутые параллельно перегородкѣ; створки выпуклыя; гнѣзда 6—многочѣсенныя; тычиночныя нити

коротких тычинокъ съ одной стороны съ зубцомъ, нити длинныхъ тычинокъ расширены къ основанію крыловидно; лепестки двураздѣльные.

478. *B. incana* (L.) DC. Пет., стр. 146. — Цин., № 130. — Pinz., p. 9. — Lind., p. 88.

Farsetia incana R. Br. Бух. II, № 50. — Бух. I, № 48. — F. O., № 5, p. 70. — Кауф. II, № 78. — Кауф. I, стр. 59.

Alyssum incanum L. Дв., № 632. — Макс., № 596. — Hoff. H., № 4939. — Gold. C., p. 21. — Mart., p. 113. — Hoff., № 139. — St. II, p. 37. — St. I, № 441. — Pal., № 1365.

Стебель 20—60 см., прямостоящій или восходящій, простой или вѣтвистый, какъ и все растение. сѣрый отъ звѣздчатыхъ волосковъ; листья ланцетные, острые, цѣльнокрайніе, рѣже зубчатые, только нижніе сужены въ черешокъ; цвѣты бѣлые; лепестки до 6 мм.; стручечки до 7 мм., эллиптическіе; столбикъ тонкій, длиною почти въ половину стручечка.

По паровымъ полямъ, лугамъ, межамъ и холмамъ, очень часто. Цвѣтеть съ половины мая до осени.



Berteroa incana.



Lunaria rediviva.

181. *Lunaria* L.

Стручекъ крупный, совершенно плоскій, эллиптическій, на длинной плодоножкѣ; створки стручка безъ продольныхъ жилокъ, но съ сѣтчатыми жилками; сѣмена на сѣменосахъ, приросшихъ къ перегородкѣ стручка; тычиночныя нити безъ зубцовъ.

479. *L. rediviva* L. Пет. Кр. I, стр. 71. — Пет., стр. 217. — Кауф. II, № 79. — Гор., № 4. — Цин., № 128. — Кауф. I, стр. 60. — Lind., p. 88. — Дв., № 635. — Макс., № 595. — Hoff. H., № 4973. — Gold. C., p. 21. — Mart., p. 114. — Hoff., № 1959. — St. II, p. 37. — St. I, № 443. — Pal., № 1372.

Стебель 30—120 см., прямостоящій, бороздчатый, къ верхушкѣ развѣтвленный; все листья черешковые крупно пильчато-зубчатые; зубцы переходить въ остроконечіе; нижніе листья глубоко-сердцевидные, верх-

ніе—съ округлымъ, иногда почти клиновиднымъ основаніемъ и длинно-заостренныя: поверхность всѣхъ листьевъ съ короткими волосками: цвѣтоножки мягко-волосистыя: цвѣты лиловые: лепестки до 14 мм.; боковые чашелистики у основанія съ выпуклинами: стручки эллиптическіе, сужены равномерно къ обоимъ концамъ, повислые на длинныхъ плодоножкахъ: длина стручка до 5 см., ширина до 2 см.; сѣмена почковидныя, съ перепончатымъ ободкомъ.

По тѣнистымъ и сырымъ мѣстамъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ начала іюня. Воскресенскъ. у стѣнъ Нового Іерусалима (К.).—Близъ Серпухова (Ар.).—Серпуховъ, подъ Владычинимъ монастыремъ (Вар.).—Близъ д. Каменки по р. Горетовкѣ, въ 3 верстахъ отъ ст. Крюково (П. II.).

182. *Drába* L.

Стручечки продолговатыя или эллиптическіе, сплюснутые параллельно перегородкѣ: створки плоскія или слабо выпуклыя, съ 1 жилкой: тычиночныя нити безъ придатковъ; сѣмена двурядныя, въ больномъ числѣ.

1. Цвѣты бѣлые; лепестки двураздѣльные. *D. verna* L.

Цвѣты желтые, лепестки цѣльные или слабо-выемчатые. 2.

2. Стебель прямостоящій, съ сидячими листьями: цвѣты свѣтло-желтые. *D. nemorosa* L.

Стебель лежачій, почти ползучій, прямостоящіе только безлистные цвѣточныя стебли; цвѣты золотисто-желтые.

D. repens M.B.

480. *D. répens* M.B. Пет. Кр. I, стр. 72.

Стебель 10—20 см., стелящійся, почти ползучій, съ довольно длинными побѣгами и съ укороченными вѣточками въ видѣ пучковъ листьевъ;



Draba repens.

листья продолговатыя, заостренныя, цѣльнокрайніе, сужены въ очень короткій черешокъ и покрыты 2—4-раздѣльными волосками; цвѣточныя стебли безлистные, б. ч. голые; цвѣты золотисто-желтые; лепестки до 6 мм., въ 3 раза длиннѣе тоже желтыхъ чашелистиковъ; стручечки голыя, до 8 мм., продолговато-эллиптическіе, на болѣе длинныхъ, почти горизонтально-отклоненныхъ плодоножкахъ.

По холмамъ и открытымъ мѣстамъ, очень рѣдко. Цвѣтетъ съ начала мая. Между д. Новой и Старой Купавной, Бгр. у., въ шоссеиной канавѣ (П. II.).—На хол-

махъ между Лужками и Зибровымъ, Срп. у. (С.).—По откосу ж. д. между Быковымъ и Раменскимъ, Брн. у. (Куль.).

481. *D. nemorosa* L. Пет. Кр. I, стр. 71.—Пет., стр. 179.—Кауф. II, № 80.—
Цин., № 139.—Кауф., I, стр. 60.—Ann. C. II., № 104.

Draba lutea Gilib. Дв., № 625.—Макс., № 598.

Draba lutea DC. Hoff. II., № 4857.

Draba nemoralis Ehrh. Gold. C., p. 21.—Gold. Sp., p. 130.—Mart., p. 112.—
Lon., p. 113.

Draba muralis L. Дв., № 624.—Макс., № 599.—Gold. Sp., p. 130.—Mart.
p. 111.—St. II, p. 37.—St. I, № 435.—Pal., № 1345.

Draba muralis Mart. Макс., № 598—599.

Стебель 5—30 см., простой или ветвистый, съ розеткой корневых листьевъ; все растение покрыто звѣздчатыми волосками; корневые листья яйцевидные, суженные къ основанію въ короткій черешокъ, стеблевые—сидиціе; всѣ листья зубчатые; цвѣты свѣтло-желтые; лепестки до 2,5 мм.: стручечекъ продолговато-эллиптической, до 8 мм., на плодonoжкѣ почти горизонтально-отклоненной, въ 2—3 раза длиннѣе стручечка; стручечекъ опушенный.

По паровымъ полямъ, межамъ, пустырямъ и холмамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ конца апрѣля, весь май.

- γ. *leiocarpa* Lindl. Пет. Кр. I, стр. 72.—Бух. II, стр. 12.—F. O., № 5, p. 70.—
Кауф. II, стр. 52.—Кауф. I, стр. 60.

Стручечки голые. У насъ пока только эта разновидность.



Draba nemorosa.



Draba verna.

482. *D. verna* L. Пет., стр. 179.—Кауф. II, № 81.—Цин., 141.—Кауф. I, стр. 60.—
Lind., p. 88.—Ann. C. V, № 10.—Дв., № 623.—Макс., № 600.—
Gold. C., p. 21.—Mart., p. 111.—Lib. Tr., p. 76.—St. II, p. 37.—
St. I, № 434.—Pal., № 1344.

Одинъ или нѣсколько безлистныхъ стеблей въ 5—20 см. съ розеткой корневыхъ листьевъ; листья мелкіе, ланцетные или широко-ланцетные, цѣлюкрайніе или зубчатые, обыкновенно покрыты вильчатыми волосками; цвѣты бѣлые; лепестки до 2,5 мм., двураздѣльные, въ два раза длиннѣе чашечки; чашелистики яйцевидные, покрыты бѣлыми волосками; стручечки эллиптическіе, къ обоимъ концамъ слегка заостренные, до 7 мм. дл.

По холмамъ, лугамъ и открытымъ мѣстамъ. Цвѣтетъ съ половины апрѣля до половины мая. Симоновъ монастырь, Иваньково, Кусково (К.).—Близъ Борисова, Сри. у. (С.).—Перерва, Всесвятская роща (П.).

183. *Cochleária* L.

Стручечки шаровидные или эллиптическіе; створки сильно выпуклыя, съ сѣтчатыми жилками и съ срединной жилкой или безъ нея; сѣмена мелко-бугорчатая. двурядныя, по 2—6 въ каждомъ гнѣздѣ.

483. *C. officinális* L. Пет., стр. 169.—Кауф. II, № 83.—Цин. № 142.—Кауф. I, стр. 61.—St. II, p. 37.—Pal., № 1355.

Стебель 10—30 см., прямостоящій, голый, простой или вѣтвистый; всѣ листья голые, немного мясистые; корневые—розеткой, на длинныхъ черешкахъ, округлые, почти сердцевидные, цѣлюкрайніе; стеблевые—слегка угловато-зубчатые, охватываютъ стебель сердцевиднымъ основаніемъ, верхніе—зубчатые; цвѣты бѣлые; лепестки до 5 мм., вдвое длиннѣ чашечки; плодonoжки горизонтально отстоящія; стручечекъ эллиптической, заостренный, съ продольной жилкой на каждой створкѣ.

По сухимъ и открытымъ мѣстамъ, очень рѣдко. Въ іюлѣ съ почти зрѣлыми плодами. Близъ Павшина и Архангельскаго. Звн. у. (К.).—Вѣроятно запасено или одичало, въ сосѣднихъ губерніяхъ не встрѣчается.



Cochlearia officinalis.



Cochlearia Armoracia.

* *C. Armoracia* L. Бух. II, стр. 13.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 169.—Кауф. II, № 82.—Цин., № 143.—Кауф. I, стр. 61.—St. II, p. 37.—Pal., № 1357.

Корень проникаетъ въ землю очень глубоко, толщиною въ палецъ и толще; стебель 50—150 см., покрытъ частыми листьями; корневые листья очень большіе, суженные въ очень длинный черешокъ, продолговатые, гороховые, иногда съ сердцевиднымъ основаніемъ; средніе стеблевые—гребенчато-перистые, верхніе—ланцетные, сидячіе, къ основанію суженные, по

краймъ съ тупыми зубцами. самыя верхніе—линейныя, почти цѣльнокрайніе; цвѣты бѣлые; лепестки въ 3 раза длиннѣе чашечки; плодоножка отклонена отъ цвѣтоноса; стручечекъ удлинненно-шаровидный, безъ срединной жилки на створкахъ.

Разводится по огородамъ. Цвѣтетъ съ середины мая до половины іюля.

184. *Camelina Crantz.*

Стручечекъ грушевидный, вздутый, съ носикомъ, на которомъ сидитъ столбикъ, опадающій вмѣстѣ съ одною створкою; створки сильно вышуклыя, съ тонкими ребрышками близъ верхушки и съ одною жилкою; сѣмена двурядныя, въ большомъ числѣ.

1. Нижніе и средніе листья перисто-раздѣльные или выемчато-зубчатые. *C. dentata Pers.*

Всѣ листья цѣльнокрайніе или слегка п мелко-зубчатые. 2.

2. Стручечки до 10 мм. дл. на косо вверхъ торчащихъ плодоножкахъ; столбики въ 3—4 раза короче стручечка.

C. sativa Crantz.

Стручечки не длиннѣе 5 мм. на почти горизонтально отстоящихъ плодоножкахъ; столбики въ 2 раза короче стручечка.

C. microcarpa Andrzej.

484. *C. microcarpa Andrzej.* Пет. Кр. I, стр. 79.

Стебель 30—70 см., прямостоящій, простой или съ вверхъ торчащими вѣтвями; все растение густо шершаво-волосистое; листья продолговато-ланцетные, средніе и верхніе—сидячіе, съ стрѣловиднымъ основаніемъ, цѣльнокрайніе или слабо-зубчатые; цвѣты мелкіе, желтые; соцветіе удлинненное, съ цвѣтоножками косо вверхъ торчащими; стручечки мелкіе, не длиннѣе 5 мм., на почти горизонтально отстоящихъ плодоножкахъ; столбикъ въ два раза короче стручечка.

Вершина Боровскаго кургана противъ Заозерья, Брн. у. (П. и С.).—На откосѣ ж. д. близъ Крюкова, Ник. ж. д., и въ 3 верстахъ отъ ст. Обираловка, Ниж. ж. д. (П. П.).—Откосъ ж. д. между ст. Сходня и ст. Химки (Х.).



Camelina microcarpa.

485. *C. sativa Crantz.* Пет. Кр. I, стр. 72.—Бух. II, № 51.—Бух. I, № 49.—Ф. О., № 5, р. 70.—Пет., стр. 113.—Кауф. II, № 84.—Цин., № 145.—Кауф. I, стр. 62.—Lind., p. 90.—Ann. C. III, № 205.—Дв., № 634.—Макс., № 607.

Alyssum sativum Sw. Hoff. II, № 4948.—Mart., p. 113.

Myagrum sativum L. Hoff. II, № 4814.—Макс., № 607.—Gold. C., p. 21.—Gold. Sp., p. 130.—Hoff., № 2148.—St. II, p. 37.

Стебель 30—70 см., прямостоящий, простой или вѣтвистый, б. ч. покрытъ жесткими, отстоящими волосами, иногда голый; листья ланцетные или продолговато-ланцетные, цѣлюкрайніе или слегка зубчатые, шероховатые отъ волосковъ, иногда голые; нижніе—къ основанію суженные; средніе и верхніе—спидячіе, у основанія стрѣловидные; цвѣты блѣдно-желтые; лепестки до 4 мм., немного длиннѣе чашечки; стручечекъ до 10 мм., грушевидный, вздутый, съ килевиднымъ краемъ, на плодоножкѣ косо вверхъ торчащей; столбикъ въ 3—4 раза короче стручечка.

По посѣвамъ, преимущественно въ овсѣ, часто. Цвѣтеть съ начала іюня весь іюль.



Camelina sativa.



Camelina dentata.

486. *C. dentata* Pers. Пет. Кр. I, стр. 72.—Пет., стр. 153.—Кауф. II, № 85.—Гор., № 9.—Дня., № 147.

Myagrum dentatum Willd. Gold. C., p. 21.—Gold. Sp., p. 130.

Стебель 30—70 см., прямостоящий, простой или вѣтвистый, покрытъ мелкими, вильчатыми волосами; нижніе стеблевые листья б. ч. перисто-раздѣльные или лировидные, тупые, переходятъ въ короткій черешокъ; средніе — выемчато-зубчатые, почти перисто-надрѣзные; верхніе — почти цѣлюкрайніе и, какъ средніе, съ стрѣловиднымъ основаніемъ; все листья голые; цвѣты блѣдно-желтые; лепестки въ два раза длиннѣе чашечки; чашелистики съ бѣлымъ краемъ; стручечекъ крупный; столбикъ въ 4—6 разъ короче стручечка.

По посѣвамъ, очень рѣдко. Близъ с. Щербинки, Пдл. у. (Черняевъ).

185. *Thlaspi* L.

Стручечекъ овальный или яйцевидный, сильно сплюснутый со стороны реберъ перегородки, на верхушкѣ глубоко выемчатый; створки ладьевидныя, съ широкимъ, крыловиднымъ клемъ; гнѣзда 2—много-сѣменные.

487. *T. arvense* L. Бух. II, № 52.—Бух. I, № 50.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 290.—Кауф. II, № 86.—Цин., № 149.—Кауф. I, p. 62. Lind., p. 86.—Дв., № 628.—Макс., № 603.—Hoff. II, № 4897.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 112.—Lib. Tr., p. 52.—Hoff., № 3243.—St. II, p. 37.—St. I, № 437.—Pal., № 1351.

Стебель 30—60 см., прямостоящий, простой или вѣтвистый; все растеніе голое, желто-зеленое; корневыя листья обратно-яйцевидныя, суженныя въ черешокъ; стеблевые — продолговатыя, цѣльныя или зубчатые, сидячія, съ стрѣловиднымъ основаніемъ; цвѣты бѣлыя; лепестки до 3,5 мм., въ два раза длиннѣ чашечки; плодоносная кисть вытянутая; стручечекъ до 16 мм., округло-овальный, равенъ плодоножкѣ; столбикъ очень короткій въ узкой выемкѣ стручечка; сѣмена косо-морщинистыя.

Въ посѣвахъ и какъ сорное, очень часто. Цвѣтетъ съ начала мая до осени.



Thlaspi arvense.

186. *Lepidium* L.

Стручечки почти шаровидныя, эллиптическія или овальныя, сплюснутыя со стороны реберъ перегородки; створки ладьевидныя, киль ихъ часто крыловидный; гнѣзда односѣменныя.

1. Стеблевые листья перисто-раздѣльные, б. ч. съ линейными долями. 2.

Стеблевые листья продолговатыя, выемчато-зубчатые. 3.

2. Лепестковъ нѣтъ; тычинокъ 2.

L. ruderale L.

Лепестки есть; тычинокъ 6.

L. sativum L.

3. Стручечекъ съ выемкой. къ верхушкѣ широко крылатый; нижніе стеблевые листья тупые.

L. campestre R. Br.

Стручечекъ на верхушкѣ безъ выемки, острый, съ длиннымъ столбикомъ; всѣ листья острые.

L. Draba L.

L. Draba L. и *L. campestre* R. Br. въ настоящее время въ Моск. губ. не встрѣчаются, ихъ нѣтъ и въ сосѣднихъ губерніяхъ, были когда-то занесены, но теперь вымерли.

- * *L. sativum* L. Пет. Кр. I, стр. 73.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 215.—Кауф. II, № 87.—Цин., № 155.—Кауф. I, стр. 63.—Дв., № 626.—Макс., № 604.—Hoff. II, № 4888.—Mart., p. 112.—St. II, p. 37.—Pal., № 1347.

Стебель 30—60 см., простой или вѣтвистый, бороздчатый, какъ и все растеніе, съ сплывъ налетомъ; нижніе листья перисто- или двояко-перисто-раздѣльные, доли ихъ остро-зубчатые; средніе — глубоко перисто-раздѣльные, съ линейными или продолговатыми, цѣльнокрайними или

рѣдко-зубчатыми долями; верхніе листья б. ч. линейные, цѣлюнокрайніе; цвѣты бѣлые; лепестки до 2 мм., въ два раза длиннѣе чашечки; стручечки округло-овальные, до 6 мм., широко крылатые. на короткихъ плодоножкахъ. прижатыхъ къ цвѣтоносу; столбикъ равенъ выемкѣ.

Разводится и дичаетъ по огородамъ и пашнямъ. Цвѣтетъ съ половины іюня весь іюль.



Lepidium sativum.



Lepidium ruderaie.

488. *L. ruderaie* L. Мос., № 2.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 212.—Кауф. II, № 90.—Цип., № 157.—Кауф. I, стр. 63.—Lind., p. 90.—Дв., № 627.—Макс., № 606.—Hoff. II., № 4887.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 112.—Hoff., № 1891.—St. II, p. 37.—St. I, № 436.—Pal., № 1350.

Стебель 15—45 см., прямостоящій, сильно вѣтвистый, слегка опушенный; корневые листья въ неясно выраженной розеткѣ. двояко-перисто-раздѣльные; средніе стеблевые—перисто-раздѣльные, съ линейными долями; верхніе—линейные; цвѣты безъ лепестковъ, съ одной только чашечкой и двумя тычинками; стручечекъ до 3 мм., округло-овальный, съ едва замѣтнымъ столбикомъ; ножка стручечка отстоящая, въ два раза длиннѣе его.

Сорное, очень часто. Цвѣтетъ съ половины мая до осени.*

187. *Capsella* Medik.

Стручечекъ обратно-треугольный или эллиптическій, сильно сплюснутый со стороны реберъ перегородки, иногда на верхушкѣ выемчатый; створки ладьевидныя, съ килемъ, но безъ крыльевъ; гнѣзда многосѣмьенныя.

489. *C. bursa pastoris* (L.) Moench.

Capsella Bursa pastoris Moench. Бух. II, № 53.—Бух. I, № 51.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 155.—Кауф. II, № 91.—Цип., № 152.—Кауф. I, стр. 63.—Lind., p. 90.—Апп. С. III, № 206.—Дв., № 630.—Макс., № 630.

Thlaspi Bursa pastoris L. Дв., № 630.—Макс., № 602.—Hoff. II., № 4898.—
Gold. C., p. 21.—Mart., p. 112.—Hoff., № 3244.—
St. II., p. 37.—St. I, № 439.—Pal. № 354.

Стебель 15—45 см., простой или вѣтвистый, слегка опушенный; корневые листья б. ч. розеткой, продолговато-ланцетные, цѣльнокрайніе, выемчато-зубчатые или перисто-надрѣзные, суженные въ черешокъ; верхніе стеблевые—сидячіе, стрѣловидно-стеблеобъемлющіе, ланцетные, цѣльнокрайніе; цвѣты бѣлые; лепестки до 3 мм., въ два раза длиннѣе чашечки; стручечекъ съ очень короткимъ столбикомъ; плодонжка горизонтально отстоящая, немного длиннѣе стручечка.

Орное, по дорогамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ конца апрѣля до осени.

α. *integrifolia* Schlechtd. Бух. II, № 53 β.—Бух. I, № 51 β.—Кауф. II, стр. 56.—
Кауф. I, стр. 64.

Корневые и стеблевые листья цѣльнокрайніе.

β. *sinuata* Koch. Бух. II, № 53 γ.—Бух. I, № 51 γ.—F. O., № 5, p. 70.—Кауф. II, стр. 56.—Кауф. I, стр. 64.

Корневые листья выемчато-зубчатые.

γ. *coronopifolia* DC. F. O., № 5, p. 70.—Кауф. II, стр. 56.—Кауф. I, стр. 64.

Корневые, иногда нижніе стеблевые листья перисто-раздѣльные.



Capsella bursa pastoris.



Neslea paniculata.

188. *Neslea* Desv.

Стручечекъ въ видѣ орѣшка, не разverzающійся, почти шаровидный, сѣтчатоморщинистый, одногнѣздный, односѣмный, съ неоппадающимъ столбикомъ.

490. *N. paniculata* Desv. Пет., стр. 228.—Кауф. II, № 92.—Цик., № 165.—
Кауф. I, стр. 64.—Lind., p. 90.—Ann. C. I, № 5.—
Макс., № 608.

Rapistrum paniculatum Gaertn. Дв., № 621.

Alyssum paniculatum Willd. Hoff. II., № 4946.

Myagrum paniculatum L. Дв., № 621.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 111.—
Hoff., № 2145.—St. II, p. 37.—St. I, № 431.

Стебель 30—80 см., прямостоящий,верху вѣтвистый; все растеніе покрыто 3-раздѣльными волосками; корневые листья сужены въ черешокъ, продолговато-ланцетные, цѣлюкрайніе или съ рѣдкими зубцами; стеблевые—сидячіе, съ стрѣловиднымъ основаніемъ, продолговато-ланцетные; цвѣты желтые; лепестки до 4 мм., немного длиннѣе желтой чашечки; стручечекъ до 2 мм., сѣтчато-морщинистый, во много разъ короче длинной, отклоненной плодоножки; столбикъ почти въ два раза короче стручечка.

По посѣвамъ, часто. Цвѣтетъ съ начала іюня, весь іюль.

189. *Isatis L.*

Стручечки повислые, эллиптическіе или продолговатые, сильно сплюснутые со стороны реберъ перегородки; створки ладьевидныя, съ крылатымъ килемъ; гнѣзда односѣмьныя.

491. *I. tinctoria* L. Пет. Кр. I, стр. 74.—Pal., № 1422.



Isatis tinctoria.

Стебель 40—130 см., прямостоящий,верху вѣтвистый, въ нижней части шершаво-волосистый, какъ и нижніе листья, верхняя часть голая, спяая; прикорневые листья черешковые, продолговато-ланцетные, зубчатые; стеблевые—сидячіе, съ стрѣловиднымъ основаніемъ, цѣлюкрайніе, заостренные; соцветіе щитковидное; цвѣты желтые; лепестки до 4 мм.; стручечки до 11 мм., повислые на тонкихъ голыхъ плодоножкахъ.

По холмамъ и открытымъ мѣстамъ, на известнякахъ и пескѣ, рѣдко. Цвѣтетъ съ начала мая, плоды въ началѣ іюня.—Серпуховъ близъ Владычнаго монастыря и на берегу Оки у устья Нары (Вар.).—Дракино, Срп. у. (Мил.).—Бѣлые Колодези, Кзм. у. (П. и С.).

190. *Búnias L.*


Стручечекъ въ видѣ орѣшка, косо-овальный, неравнобокій, бородавчатый, двугнѣздный; гнѣзда односѣмьныя, расположены одно надъ другимъ, или гнѣздъ 4, расположенныхъ попарно, одна пара надъ другой; зародышъ свернуть улиткой.

492. *B. orientális* L. Бух. II, № 54. — Бух. I, № 52. — F. O., № 5, p. 70. — Пет., стр. 151.—Кауф. II, № 93.—Цин., № 166.—Кауф. I, стр. 65.—Ann. C. I, № 6.—Дв., № 622.—Макс., № 609.—Hoff. H., № 4821. — Gold. C., p. 21. — Mart., p. 111. — Hoff., № 581.—St. II, p. 37.—St. I, № 433.—Pal., № 1420.

Стебель 50—150 см., вѣтвистый, колюче-шершавый отъ отстоящихъ железистыхъ волосковъ; нижніе листья на длинныхъ черешкахъ, стручечковидно-раздѣльные, съ большою треугольно-верхушечною долею; сред-

ніе—глубоко-зубчатые, у основанія копьевидные, заостренные; верхніе продолговато-ланцетные, суженные къ основанію; цвѣты ярко-желтые; лепестки до 5 мм.; чашелистики горизонтально отклоненные; орбішекъ до 6 мм., неравнобокій, заостренный, бугорчатый, въ нѣсколько разъ короче косо отклоненной плодоножки.

По дугамъ, на паровыхъ поляхъ и по межамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины мая до середины іюля.



Bunias orientalis.



Chorispora tenella.

191. *Chorispora* DC.

Стручекъ цилиндрическій, 6. ч. нѣсколько дугообразно-согнутый, суженный въ длинный нослкъ, распадается на два ряда одноосѣменныхъ членковъ: рыльце коническое изъ 2 торчащихъ пластинокъ; чашелистики прижаты къ вѣничку, два изъ нихъ у основанія съ выуклинами.

493. *C. tenella* (Pall.) DC. Пет. Кр. I, стр. 73.—Ф. Б., № 7.—Пет., стр. 167.—Кауф. II, № 95.—Мвл., № 2.—Гор., № 11.

Стебель и листья съ короткими и железистыми волоскамъ; листья продолговато-ланцетные, черешковые; нижніе—выемчато-крупно-зубчатые; стеблевые—рѣдко-зубчатые; верхушечные—почти цѣльнокрайніе; цвѣты лиловые; лепестки узкіе, до 11 мм. дл., въ два раза длиннѣе чашелистиковъ; стручекъ до 35 мм., согнутый членистый, на короткой, горизонтально-отстоящей плодоножкѣ; нослкъ въ 2—4 раза короче стручка; все растеніе 5—45 см.

По холмамъ и дугамъ. Цвѣтетъ съ конца апрѣля до конца мая. Близъ Зиброва, Срп. у. (Экс. Бот. Лаб.).—Между Лопашней и Никифоровымъ, Срп. у. (П. и Сюз.).—Близъ Лужковъ, Срп. у. (С.).—Царицыно (Куль.).—Ваганьковское кладбище (К. А. Космоветкій).—Подъ самой Москвой, у полотна М.-Каз. ж. д. (З. В. Кикина).—Серпуховъ, близъ Владычнаго монастыря (Ф. Б.).—Близъ Ховрина (Шатерниковъ).—Серебряный боръ близъ Хорошова (герб. Петр. Ак., соб. Алферовъ).

192. *Ráphanus* Tourn.

Стручекъ длинный, вытянутъ въ б. или м. длинный носикъ; нижняя часть стручка пустая, верхняя четковидная, распадается на одногнѣзные членики, или же стручекъ веретенообразный, не распадоющійся, зрѣлый—подзрѣватый, раздѣленъ поперечными ложными перегородками; гнѣзда односѣменные.

494. *R. Raphanistrum* L. Бух. II, № 55.—Бух. I, № 53.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 256.—Кауф. II, № 94.—Кауф. I, стр. 66.—Lind., p. 92.—Дв., № 660.—Макс., № 635.—Hoff. II, № 5181.—Gold. C., p. 21.—Mart. p. 118.—St. II, p. 38.—St. I, № 459.—Pal., № 1416.

Raphanistrum innocuum Medic. Цин., № 169.

Стебель 30—50 см., вѣтвистый; все растеніе покрыто жесткими, торчащими волосками; листья на черешкахъ. лпровидные, глубоко-раздѣльные, съ продолговато-яйцевидными, неравно-зубчатыми долями; доли обыкновенно тупыя. конечная болѣе крупная, б. или м. ясно трехраздѣльная; цвѣты сѣрно-желтые; лепестки до 18 мм., въ два раза длиннѣе чашелистиковъ, прижатыхъ къ вѣнчику; стручекъ до 4 см., перетянутый между члениками; носикъ много длиннѣе верхняго членика.

На паровыхъ поляхъ и по посѣвамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины мая почти до осени.



Raphanus Raphanistrum.



Raphanus sativus.

- * *R. sativus* L. Пет., стр. 258.—Кауф. II, стр. 58.—Цин., стр. 80.—Кауф. I, стр. 65.—Hoff. II, № 5182.—Mart., p. 118.—St. II, p. 38.—Pal., № 1415.

Корень толстый, мясистый; стебель 30—50 см., вѣтвистый, какъ и листья, съ жесткими, рѣдкими волосками; листья лпровидные, глубоко-раздѣльные, съ продолговато-яйцевидными, неравно-зубчатыми долями; цвѣты бѣлые или лиловые съ темными жилками; стручекъ до 2,5 см.,

веретенообразный, не распадающийся, зрѣлый—подзрѣватый, съ ложными поперечными перегородками; поспѣкъ длинный.

Разводится на огородахъ.

Порядокъ Sarraceniales.

45 сем. Droseraceae DC.

Цвѣты правильные; чашечка 5-раздѣльная, остается при плодѣ; лепестковъ 5; завязь верхняя; тычинокъ 5; пыльники вскрываются наружу; столбикъ 3, 6. ч. двураздѣльныхъ; пестикъ одногнѣздный, съ многочисленными сѣмечками на 3—5-ствѣнныхъ сѣменосахъ; плодъ — коробочка, вскрывающаяся 3—5 створками, съ сѣменосами посрединѣ створокъ; сѣмена очень мелкія, съ прямымъ зародышемъ посрединѣ бѣлка, окружены свободной, не приросшей, тонкой кожурой. Болотныя растенія съ розеткой корневыхъ листьевъ, покрытыхъ съ верхней стороны розовыми стебельчатыми железками, приспособленными для ловли и перевариванія мелкихъ насекомыхъ; соцветіе — длинный, стебельчатый завитокъ.

193. *Drósera* L.

1. Листья круглые.

D. rotundifolia L.

Листья линейные или обратно-йцевидные, постепенно суженные въ черешокъ. 2.

2. Листья линейные.

D. anglica Huds.

Листья обратно-йцевидные, постепенно суженные въ черешокъ.

D. obovata Mert. et Koch.

495. *D. rotundifolia* L. Пет. Кр. I, стр. 75.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 180.—Кауф. II, № 96.—Цин., № 190.—Кауф. I, стр. 66.—Lind., p. 92.—Ann. C. V, № 13.—Дв., № 336.—Макс., № 313.—Hoff. II, № 2568.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 58.—St. II, p. 20.—St. I, № 215.

Листья почти круглые, помимо стебельчатыхъ железокъ, до 10 мм. дл. и до 12 мм. ш., сужены въ длинный волосистый черешокъ; стебельчатая железка по краямъ листа до 5 мм.; цвѣты бѣлые, на стрѣлкахъ до 25 см.; лепестки до 5 мм.; чашелистики тупые; коробочка длиннѣе чашечки, гладкая; сѣмена до 1,5 мм. дл., веретенообразныя, свѣтло-окрашенныя, съ почти гладкой оболочкой.

По моховымъ торфянымъ болотамъ, часто. Цвѣтетъ съ половины іюня, весь іюль, иногда до половины августа. Захарково, Зыково, Иваново, Косино (К.).—Мытищи, болото у Лосиннаго Острова (С.).—Берегъ Нерскаго озера, Мос. у.; Завидово, 1-е и 2-е моховое болото, Кал. у.; Глубокое озеро. Ряз. у.; у р. Малая Истра, болото близъ Клещева. Кал. у. (П. и С.).—Трепарево, Мож. у. (Ф. О.).—



Drosera rotundifolia.

За Александровской, Руз. у. (Сюз.).—Серп. у. (герб. кн. В. А. Вяземского).—С. Кудиново—Поганое озеро, Бгр. у. (X.).

496. *D. anglica* Huds. Пет. Кр. I, стр. 75.—Пет., стр. 180.—Цин., № 191.

Drosera anglica Huds. α . *vulgaris* Koch. Ф. Б., № 8.

Drosera longifolia L. Кауф. II, № 97.—Кауф. I, стр. 66.—Lind., p. 92.—Дв., № 337.—Макс., № 314.—Mart., p. 58.—Lon., p. 282.

Drosera longifolia L. α . *vulgaris* Koch. Кауф. II, стр. 60.—Кауф. I, стр. 66.

Листья линейные или длинно-клиновидно-линейные, на концѣ округлые, суженные въ длинный, голый черешокъ; стебельчатые железки до 4 мм. дл.; длина листа безъ черешка до 30 мм., ш. до 5 мм.; цвѣточная стрѣлка до 25 см., значительно превышаетъ листья; цвѣты бѣлые; лепестки до 6 мм.; коробочка длиннѣе чашечки; сѣмя до 1 мм. дл., веретенообразное, черное, съ отстающею отъ сѣмени оболочкой съ тонкими сѣтчатыми жилками.

По моховымъ торфянымъ болотамъ. Цвѣтеть съ половины іюня до конца іюля. Б. Мытищи (А.).—Косино—Св. озеро (П.).—Болото у Нерскаго озера, Мос. у.; Глубокое озеро близъ р. Малая Пистра, Руз. у. (П. и С.).—Тростенское озеро, Руз. у. (Ф. О.).—Архангельское (Мар.).—Въ казенномъ лѣсу близъ Ольгина, Мож. у. (Ф. Б.).



Drosera anglica.



Drosera obovata.

497. *D. obovata* Mert. et Koch.

Drosera anglica Huds. β . *obovata* Koch. Пет. Кр. I, стр. 75.

Drosera longifolia L. β . *obovata* Koch. Кауф. II, стр. 60.—Кауф. I, стр. 67.

Листья обратно-яйцевидные, суженные въ длинный, голый черешокъ, рѣже слегка покрытый волосами; длина листа до 20 мм., ш. до 8 мм.; длина стебельчатыхъ железокъ до 6 мм.; цвѣточная стрѣлка до 20 см.; коробочка не большая; сѣмена свѣтло-окрашенные, немного сѣтчатыя.

По моховымъ торфянымъ болотамъ. Цвѣтеть съ половины іюня, весь іюль. Тимохово, Бгр. у. (Ф.).—У Саввинскаго или Полецкаго озера, Вер. у. (П. и Ч.).—Косино; Тростенское озеро, Руз. у. (П.).—Глубокое озеро, Руз. у. (П. и С.).

Порядок Rosales.

46 сем. Crassuláceae DC.

Цвѣты правильные; чашечка 3—12-раздѣльная, чаще всего о 5 доляхъ; лепестковъ и пестиковъ столько же, сколько долей чашечки; вѣнчикъ раздѣльно-лепестный или лепестки спаяны только у основанія; тычинокъ столько же, сколько долей вѣнчика или вдвое болѣе; въ первомъ случаѣ чередуются съ долями вѣнчика, во второмъ—тѣ тычинки, которыя находятся супротивъ лепестковъ, прирасли къ послѣднимъ; вѣнчикъ вмѣстѣ съ тычинками прикрѣпленъ къ основанію чашечки; завязь верхняя; пестки свободные или основаніемъ сросшіеся; у основаніи каждаго пестика железистая чешуйка; плодъ изъ одногнѣздныхъ листовокъ съ многочисленными сѣменами въ каждой, прикрѣпленными въ два ряда вдоль внутренняго шва; сѣмя съ прямымъ зародышемъ. У насъ только травянистыя растенія съ мясистыми листьями, очередными, рѣже супротивными или мутовчатыми, или же листья собраны въ шаровидныя розетки; цвѣты въ простыхъ или однобокихъ полузонтикахъ и завиткахъ.

194. *Sédum* L.

Цвѣты правильные, чашечка 5-раздѣльная; вѣнчикъ изъ 5 свободныхъ лепестковъ; тычинокъ 10, прикрѣпленныхъ по очереди, то супротивъ лепестковъ, то между ними; завязь верхняя изъ 5 сросшихся только у основанія плодолистиковъ, окруженныхъ 5 цѣлюкрайними железистыми чешуйками; очень рѣдко чашелистиковъ и лепестковъ бываетъ по 6, а тычинокъ 12.

1. Цвѣты желтые. 2.

Цвѣты бѣлые, розовые или малиновые. *S. Telephium* L.

2. Соцвѣтіе о 3—6 вѣтвяхъ съ довольно рѣдко разставленными цвѣтами на короткихъ цвѣтоножкахъ. *S. acre* L.

Соцвѣтіе сжатое въ малочвѣтковыхъ полузонтикахъ; цвѣты почти сидячіе. *S. sexangulare* L.

498. *S. Teléphium* L. Пет. Кр. I, стр. 170.—Кауф. II, № 283.—Кауф. I, стр. 174.—Дв., № 454.—Макс., № 448.—Хофф. II, № 3469.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 80.—Хофф., № 2934.—St. II, p. 27.—St. I, № 303.—Pal., № 911.

Корни съ веретенообразными клубнями; стебель 20—70 см., прямо-стоящій или у основанія приподнимающійся, голый; листья мясистые, округлые, овальные, суженные къ основанію или сердцевидные съ ушками, сидячіе или нижніе на короткихъ черешкахъ, по краямъ зубчатые; цвѣты бѣлые, розовые или малиновые, собраны въ густой конечный, вѣтвистый полузонтикъ; лепестки острые, треугольные. Распадается на три подвида:

2. *máximum* Suter (sp.).

Sedum maximum Suter. Пет. Кр. I, стр. 170—173 и 174.—Пет. стр. 274.—Цин., № 550.

Sedum Telephium L. α . *maximum* Rehb. Кауф. II, стр. 175.—Кауф. I, стр. 174.

Sedum Telephium L. β . *purpureo-maculatum* Kauffm. Кауф. II, стр. 175.—Кауф. I, стр. 174.



Sedum Telephium α . *maximum*.

Цвѣты бѣлые, слегка желтоватые или съ розовыми крапинками; тычинки, супротивныя лепесткамъ, сидятъ б. ч. у самого ихъ основанія; листья супротивные или по три, съ сердцевиднымъ ушковатымъ основаніемъ, иногда нижніе—съ округлымъ.

По лѣсамъ и опушкамъ б. ч. на песчаной почвѣ. Цвѣтетъ съ начала августа. Между Покровскимъ и Пушкинымъ, Братцово (К.).—Воробьевы горы, близъ Серпухова (П.).

3. *vulgáre* Link (sp.).

Sedum vulgare Link. Пет. Кр. I, стр. 170—173 и 174.

Sedum Telephium L. γ . *dilute-purpureum* Kauffm. Кауф. II, стр. 175. — Кауф. I, стр. 175.

Sedum Telephium L. δ . *purpureum* Kauffm. Кауф. II, стр. 176. — Кауф. I, стр. 175.

Sedum purpurascens Koch.

Цвѣты розовые или малиновые; тычинки, супротивныя лепесткамъ,



Sedum Telephium β . *vulgare*.



Sedum Telephium γ . *purpureum*.

сидятъ выше основанія послѣднихъ; листья округлые у основанія, иногда верхніе—слегка сердцевидные.

По опушкамъ и по сухимъ открытымъ мѣстамъ, рѣже по пашнямъ. Цвѣтетъ съ половины іюля до конца августа. Между Покровскимъ и Тушинымъ (К.).—Трепарево, Мож. у. (А.).—Малые Мытищи (П.).—Рупосово; берегъ р. Учи близъ Листвянъ (С.).

γ. *purpureum* Link (sp.).

Sedum purpureum Link. Пет. Кр. I, стр. 170—173 и 174. — Бух. II, № 161. — Бух. I, № 155.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 275.—Цин., № 551.—Mart., p. 80.

Sedum Fabaria Koch. Пет., стр. 277.—Кауф. II, № 284.—Цин., № 552.—Кауф. I, стр. 175.

Цвѣты малиновые; тычинки. супротивныя лепесткамъ, сидятъ выше основанія послѣднихъ; листья сужены къ основанію и нижніе иногда стянуты въ черешокъ, всѣ очередные.

По кустарникамъ, по паровымъ полямъ и пашнямъ, часто. Цвѣтетъ съ половины іюля. Братцово, Мытищи (К.).—Павловскій посадъ, Бгр. у.; Тарасовка на Клязьмѣ (П.). — Михайловское, Пдл. у. (Б.).

499. *S. acre* L. Пет. Кр. I, стр. 174. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 274.—Кауф. II, № 285. — Цин., № 553.—Кауф. I, стр. 176. — Lind., p. 114.—Ann. C. IV, № 14. — Дв., № 455. — Макс., № 447. — Hoff. H., № 3437.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 80.—St. II, p. 27.—St. I, № 304.—Pal., № 916.

Маленькое мясистое растеніе до 15 см.; стебли лежачіе или приподнимающіеся, не цвѣтушіе—покрыты разставленными, островатыми листьями при основаніи ихъ съ выпуклой на спинкѣ; соцвѣтіе конечное, о 3—6 вѣтвяхъ, съ довольно рѣдко разставленными желтыми цвѣтами на короткихъ цвѣтоножкахъ; лепестки острые, въ 2—3 раза длиннѣе тупыхъ чашелистковъ.

По песчанымъ мѣстамъ и сухимъ разрабатываемымъ торфянымъ болотамъ, часто. Цвѣтетъ съ начала іюня до половины іюля. Серебряный боръ близъ Хорошова; Костино на Москвѣ р., Руз. у. (П.). — Торфяное болото у Звягина на Клязьмѣ (С.).—Борвиха, Звн. у.; платформа Суково Брянж. д. (X.).



Sedum acre.

500. *S. sexanguläre* L. Пет. Кр. I, стр. 174.—Макс., № 449.—Mart., p. 80.—St. II, p. 27.—St. I, № 305.

Sedum acre L. β. *sexangulare* L. Бух. II, № 160.—Бух. I, № 154.—Кауф. II, стр. 176.—Кауф. I, стр. 176.

Маленькое мясистое растеніе до 10 см.: стебли лежачіе или приподнимающіеся, не цвѣтушіе — покрыты черепичато 6-рядными, тупыми, у основанія округлыми листьями, сидящими такъ часто, что покрываютъ

наполовину или болѣе одни другихъ; цвѣты конечные, почти спячіе, въ сжатыхъ полузонтикахъ; развѣтвленіе послѣднихъ малоцвѣтковое (1—3); лепестки острые, въ 2—3 раза длиннѣе тупыхъ чашелистиковъ.

Тамъ же, гдѣ и предыдущее, но чаще и цвѣтеть въ то же время. На Ходынскомъ полѣ по дорогѣ къ Хорошову, Воробьевы горы, Свиблово; Бѣлые Колодези, К.л.м. у. (П.).—Язовскій оврагъ близъ Михайловскаго, Пдл. у. (В.).—В. Мытищи; Зиброво, Срп. у. (С.).



Sedum sexangulare.



Sempervivum soboliferum.

195. *Sempervivum* L.

Цвѣты правильные; чашечка 6—20-раздѣльная; лепестковъ 6—20, сросшихся основаниями между собой и съ тычинками, которыхъ вдвое болѣе лепестковъ; 6—20 плодниковъ окружены чередующимися съ ними расщепленными железистыми чешуйками.

501. *S. soboliferum* Sims. Пет. Кр. I, стр. 175.—Пет., стр. 275.—Кауф. II, № 286.—Цин., № 555.—Кауф. I, стр. 176.

Sempervivum tectorum L. Дв., № 529.—Макс., № 453.—Mart., p. 84.—Hoff., № 2944.—St. II, p. 28.—St. I, № 324.

Sempervivum globiferum Mart. Макс., № 454.—Mart., p. 84.—Pal., № 962.

Sempervivum Arachnoideum L. Макс., № 454.

Sempervivum hirtum L. Дв., № 530.—Макс. Приб., стр. 215.—Hoff. H., № 3643.—Gold. C., p. 20.

Листья въ шарообразныхъ розеткахъ, продолговато-клиновидные или почти обратно-яйцевидные, выше середины заостренные, съ обѣихъ сторонъ голые, только по краямъ съ бѣлыми рѣсничками, очень толстые, мясистые; цвѣточныи стебель до 40 см. опушенный, покрытъ продолговато-треугольными, сидячими, по краямъ рѣсничатыми листьями; соцветіе въ щитковидномъ полузонтикѣ съ вѣтвями до распусканія цвѣтовъ свернутыми завиткомъ; цвѣты блѣдно-желтые или зеленовато-желтые, шестерные; лепестки до 12—14 мм., по краямъ рѣсничато-зубчатые, вверхъ

торчащие, въ $2\frac{1}{2}$ раза длиннѣе овальныхъ, по краямъ рѣсничатыхъ чашелистиковъ.

По безплоднымъ сухимъ и песчанымъ мѣстамъ, часто. Цвѣтетъ съ первыхъ чиселъ іюля до половины августа. Архангельское, Звн. у.; близъ Волги. Кн. у.; Мякинино. Ваганьково кладбище, Щукино (К.). — Близъ Серпухова (М.). — Лужки, Сри. у. (П.).

47 сем. Saxifragaceae Vent.

Цвѣты правильные, обоюполые, рѣже однополые; чашечка 5—4-раздѣльная; вѣничекъ 5—4-лепестный; лепестки прикрѣплены у основаніи долей чашечки; 5—4 тычинокъ чередуются съ долями вѣничка, рѣже тычинокъ вдвое болѣе или много; завязь верхняя, полунижняя или нижняя, одногнѣздная, со стѣнными по швамъ сѣменосами, или двугнѣздная съ осевыми сѣменосами; пестикъ изъ 2—4 плодolistиковъ, со столбиками по числу плодolistиковъ или безъ столбиковъ съ одними рыльцами; плодъ — коробочка, развѣрзающаяся на верхушкѣ по внутренней сторонѣ плодolistиковъ или плодъ — ягода; сѣмя съ бѣлкомъ или безъ бѣлка.

Обзоръ сем. Saxifragaceae Vent.

Подсемейство Saxifragoidae A. Br.

Цвѣтокъ 5-ной; завязь верхняя; плодъ — коробочка.

I. Saxifragae Vent.

Плодolistиковъ 2, сросшихся; тычинокъ вдвое болѣе лепестковъ.

Saxifraga, *Chrysosplenium*.

II. Parnassiae A. Br.

Плодolistиковъ 3—4, сросшихся; тычинокъ 5, по числу лепестковъ.

Parnassia.

Подсемейство Philadelphoidae Aschers. et Graeb.

Тычинокъ много; завязь нижняя, 4—5-гнѣздная; плодъ — коробочка; листья супротивные.

Philadelphus.

Подсемейство Ribesiodae Engl.

Тычинокъ столько же, сколько лепестковъ, чередующихся съ послѣдними; завязь нижняя, одногнѣздная; плодъ — ягода.

Ribes.

Опредѣлитель родовъ.

1. Травянистыя растенія. 2.

Кустарники. 4.

2. Цвѣты мелкіе, изъ одной чашечки въ 4 листочка.

Chrysosplenium.

- Цвѣты б. или м. крупные, 5-ные, съ чашечкой и окрашеннымъ вѣнчикомъ. 3.
3. Цвѣты бѣлые; между лепестками и пестиками съ коронкой железистыхъ пластинокъ (стаминодѣвъ). *Parnassia*.
- Цвѣты желтые съ оранжевыми пятнышками у основанія; безъ коронки. *Saxifraga*.
4. Листья супротивные. *Philadelphus*.
- Листья очередные. *Ribes*.

196. *Saxifraga* L.

Цвѣты правильные; чашечка 5-раздѣльная; вѣнчикъ 5-лепестный; тычинокъ 10; завязь верхняя или полунижняя, двугнѣздная, съ 2 столбиками, остающимися на плодѣ въ видѣ 2 рожковъ; плодъ—двугнѣздная коробочка, многосѣменная, съ сѣменосомъ посрединѣ перегородки, вскрывается вверху двумя щелями.

502. *S. Hirculus* L. Пет. Кр. I, стр. 184.—Пет., стр. 270.—Кауф. II, № 302.—Мил., № 14.—Цин., № 559.—Кауф. I, стр. 186.—Lind., p. 114.—Анг. С. I, № 23.—Дв., № 427.—Макс., № 404.

Растеніе съ длинными, тонкими, ползучими побѣгами, покрытыми мелкими листьями; стебель 10—30 см., прямо-стоящій, въ нижней части голый, въ верхней—вмѣстѣ съ цвѣтоножками покрытъ густымъ, рыжимъ войлокомъ; листья линейно-ланцетные, туповатые, цѣлюкрайніе, стеблевые—сидячіе, корневые—сужены въ черешокъ; цвѣты верхушечные, по 1—4, желтые съ оранжевыми крапинками; лепестки 9—12 мм., у основанія съ 2 бородавочками, въ 3—4 раза длиннѣе яйцевидныхъ, при отцвѣтаніи отогнутыхъ чашелистиковъ, по краямъ рѣсничатыхъ.



Saxifraga hirculus.

По торфянымъ моховымъ болотамъ. Цвѣтеть съ іюля до половины августа. Близъ Сергіевского посада, Дмит. у. (Дв.).—Б. Мытищи (А.).—Косино (К.).—Кусково (Ш.).—Близъ ст. Рѣшетниково, Кля. у. (Нав.).—С. Клементьево, Руз. у. (Сюз.).—Быково, Брн. у. (С.).—Ст. Удѣльная по болоту р. Македонки, Брн. у. (Куль.).

197. *Chrysosplénium* L.

Околоцвѣтникъ простой, въ видѣ 4-листной окрашенной чашечки, сросшейся съ завязью (только средній цвѣтокъ 5-ной); 2 его супротивныя лопасти меньше двухъ другихъ; тычинокъ 8 (10), прикрѣпленныхъ къ надпестичному железистому диску; пыльники одногнѣздные; столбикъ 2;

коробочка одногнѣзная, двурогая, вскрывается до половины 2 створками; сѣмена черныя, лоснящіеся, сидятъ по краямъ створокъ.

503. *C. alternifolium* L. Бух. II, № 174.—Бух. I, № 166.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 167.—Кауф. II, № 303.—Цин., № 560.—Lind., p. 114.—Кауф. I, стр. 186.—Ann. C. II, № 125.—Дв., № 426.—Макс., № 403.—Hoff. II., № 3150.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 76.—St. II, p. 26.—St. I, № 285.

Растеніе съ нитевидными побѣгами; стебель до 15 см., ребристый; листья нѣсколько мясистые, округло-почковидные, не глубоко-лопастные, съ округлыми, на верхушкѣ слегка выемчатыми лопастями; корневые листья на длинныхъ черенкахъ, стеблевые — на короткихъ, очередные; цвѣты скучены въ частый полузонтикъ и окружены верхними желтовато-зелеными листьями въ видѣ прицвѣтниковъ.

По сырýmъ и тонкимъ мѣстамъ у ручьевъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины апрѣля до половины мая; плоды съ конца мая и въ первой половинѣ іюня.



Chrysosplenium alternifolium



Parnassia palustris

198. *Parnassia* L.

Цвѣтокъ правильный; чашечка 5-лиственная; вѣнчикъ 5-лепестный; тычинокъ 5, чередующихся съ лепестками; супротивъ каждого лепестка недоразвившаяся тычинка (стаминодій) въ видѣ пластинки, окаймленной длинно-стебельчатыми железками; всѣ пластинки образуютъ коронку между лепестками и пестикомъ; завязь верхняя, съ 4 сидчими рыльцами, одногнѣзная, съ 4 стѣнными сѣменосами; плодъ—коробочка, разверзающаяся только на верхушкѣ по швамъ.

504. *P. palustris* L. Бух. II, № 56.—Бух. I, № 56.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 235.—Кауф. II, № 98.—Цин., № 193.—Pinz., p. 10.—Кауф. I, стр. 67.—Lind., p. 92.—Ann. C. I, № 8.—Дв., № 331.—Макс., № 312.—Hoff. II., № 2510.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 57.—Lib. Tr., p. 44.—Hoff., № 2329.—St. II, p. 19.—St. I, № 211.—Pal., № 604.

Стебель ребристый, до 30 см., какъ и все растеніе, голый, ниже середины съ однимъ стеблеобъемлющимъ листомъ; корневые листья на длинныхъ черешкахъ, сердцевидно-ййцевидные, цѣлюнокрайніе; цвѣтокъ верхушечный, одиночный; лепестки бѣлые, до 10 мм., съ просвѣчивающими жилками; листочки коронки о 9—13 зеленовато-желтыхъ стебельчатыхъ железкахъ.

По сырымъ и болотистымъ лугамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ конца іюля, весь августъ.

* *Philadélphus* L.

Цвѣтокъ правильный; чашечка 4—5-листная; вѣнчикъ 4—5-лепестный; тычинокъ много, пучками; завязь нижняя, 4—5-гнѣздная, съ 4—5 столбиками, сросшимися только у основанія; плодъ — коробочка. Кустарникъ съ супротивными листьями.

1. Завязь и чашелистики пушистые; листья съ нижней стороны мягко-пушистые. *P. latifolius* Schrad.

Завязь и чашелистики голые; листья съ нижней стороны голые или только вдоль жилокъ коротко-пушистые. 2.

2. Столбикъ такой же длины, какъ тычинки, или длиннѣе ихъ; цвѣты безъ запаха. *P. inodorus* L.

Столбикъ короче тычинокъ; цвѣты пахучіе. *P. coronarius* L.

* *P. coronarius* L. Лек., стр. 238.—Pal., № 977.



Philadelphus coronarius.

Кустарникъ до 2,5 м. съ красно-бурой корой; листья яйцевидно-эллиптическіе или эллиптическіе, съ суженнымъ, рѣже съ округлымъ основаніемъ, заостренные, по краямъ рѣдко-зубчатые, съ нижней стороны по жилкамъ коротко-пушистые, въ углахъ нижнихъ жилокъ съ бородачками, верхняя сторона голая; цвѣты пахучіе, бѣлые или желтовато-бѣлые, въ конечныхъ 3—5—11-цвѣтковыхъ кистяхъ; цвѣтоножки 6. ч. короче чашечки; чашелистики острые, голые; столбикъ короче тычинокъ, глубоко, иногда до половины раздѣльный; завязь снаружи голая.

Разводится по садамъ.

* *P. inodórus* L.

Кустарникъ до 1,5 м. съ темно-бурой корой и дугообразно-изогнутыми вѣтвями; листья широко-или узко-яйцевидные, съ длинно-заостренной верхушкой, цѣлюнокрайніе или очень рѣдко-зубчатые; снизу по жилкамъ разбѣнно-волосистые, сверху голые; цвѣты конечные, по 1—3, бѣлые, безъ запаха; цвѣтоножки до 5—17 мм.; завязь и яйцевидно-заострен-

ные чашелистики голые; столбикъ глубоко-раздѣльный, такой же длины какъ тычинки или длиннѣе ихъ.

Разводится по садамъ.



Philadelphus inodorus.



Philadelphus latifolius.

* *P. latifolius* Schrad.

Кустарникъ до 2,5 м., съ вверхъ торчащими вѣтвями и съ сѣрой корой; листья широко-яйцевидные, заостренные, по краямъ рѣдко-зубчатые, съ нижней стороны мягко пушистые, съ верхней—свѣтло-зеленые и разсыянно-опушенные; цвѣты бѣлые, крупныя, съ слабымъ запахомъ, на цвѣтоножкахъ короче чашечки, рѣже равныхъ ей; завязь и чашелистики пушистые; столбикъ нѣсколько длиннѣе тычинокъ.

Разводится по садамъ.

199. *Ribes* L.

Цвѣты правильные; чашечка 4—5-надрѣзная или раздѣльная, иногда трубчатая; лепестковъ 4—5, прикрѣпленныхъ въ зѣвѣ чашечки и чередующихся съ ея долями; 4—5 тычинокъ чередуются съ лепестками; завязь нижняя или полунижняя, одногнѣздная, съ супротивно-стоящими сѣмечками; столбикъ б. ч. 2-, рѣже 3—4-раздѣльный; плодъ—ягода съ засохшей чашечкой на верхушкѣ; сѣмена горизонтальныя, съ студенистой наружной оболочкой; зародышъ маленькій, прямой, лежащій въ роговомъ бѣлкѣ близъ верхушки сѣмени.

1. Вѣтви съ шипами.

Вѣтви безъ шиповъ. 2.

2. Цвѣты крупныя, ярко-желтыя.

Цвѣты зеленовато-бѣлые или зеленовато-желтыя, мелкіе. 3.

3. Кисти цвѣтовъ прямо-торчащія; цвѣты б. ч. однополые; листья сверху лоснящіеся.

Кисти повислыя; цвѣты обоеполые; листья не лоснящіеся. 4.

R. Grossularia L.

R. aureum Pursh.

R. alpinum L.

4. Листья пахучие, съ нижней стороны съ желтыми точечными железками; прицвѣтники шиловидные. *R. nigrum* L.

Листья безъ запаха и безъ железокъ съ нижней стороны; прицвѣтники яйцевидные. *R. rubrum* L.

505. **R. Grossulária** L. Пет., стр. 259.—Гор., № 19.—Цик., № 556.—Дв., № 249.—Макс., № 235.—Mart., p. 43.—Нотт., № 2693.—St. I, № 157.—Pal., № 451.

Ribes spinosum Lam. Пет. Кр. I, стр. 185. — Бух. II, стр. 22. — Кауф. II, № 304.—Кауф. I, стр. 188.

Ribes spinosum Lam. α . glanduloso-setosum Koch. Кауф. II, стр. 188. — Кауф. I, стр. 188.



Ribes Grossularia.

Кустарникъ до 1 м. съ сѣрой корой и 1—3-раздѣльными шипами; листья на черешкахъ, округло-3—5-лопастные, у основанія б. ч. сердцевидные; лопасти по краямъ крупно-зубчатыя, зубцы туповатые; цвѣты по 1—3 въ пазухахъ листьевъ, повислые на короткихъ цветоножкахъ съ 2—3 прицвѣтниками; чашечка съ продолговатыми, округлыми, отогнутыми чашелистниками; лепестки очень мелкіе, зеленоватые, бѣловатые или красноватые; завязь пушистая; ягода округлая или продолговатая, усаженная железистыми щетинками.

Разводится, иногда дичаетъ. Цвѣтетъ съ половины апрѣля до половины мая. Найдено несомнѣнно дикимъ близъ Протопопова, Кзм. у.; сосновый лѣсъ близъ

Озеръ, Кзм. у.; близъ Серпухова (П.). — Мытищи — Лосинный Островъ (С.). — Михайловское въ лѣсу «Шинкино». Пдл. у. (Б.). — Близъ платформы 17 верста, М.-Брянск. ж. д. (Х.).

α . *uva-crispa* L.

Ribes spinosa L. β . *Uva crispa* auct. Кауф. II, стр. 188.—Кауф. I, стр. 188.

Ribes Uva crispa L. Дв., № 250.—Макс., № 236.—Mart., p. 44.—St. I, № 158.—Pal., № 452.

Ягоды покрыты пушкомъ или простыми щетинками.

* **R. alpinum** L. Пет. Кр. I, стр. 185.—Пет., стр. 260.—Pal., № 449.

Кустарникъ до 1,5 м. съ сѣро-бурой корой; листья глубоко-3—5-лопастные, у основанія слегка сердцевидные или округлые, сверху лоснящіеся, снизу свѣтлѣе, по краямъ неравно- и глубоко-зубчатые; цвѣты не вполне двудомные; мужскія цвѣточные кисти густыя, длинныя, о 20—30 цвѣткахъ, торчащія; женскія — о 2—6 цвѣткахъ; черешки листьевъ, цветоносы и цветоножки железисто-пушистые; прицвѣтники перепончатые, ланцетные; чашечка блюдчатая, голая, съ яйцевидными чашелистниками,

вчетверо длиннѣе лопатчатыхъ зеленовато-желтыхъ лепестковъ; ягоды красная.

Разводится по садамъ.



Ribes alpinum.



Ribes rubrum.

506. *R. rubrum* L. Пет. Кр. I, стр. 185. — Ф. Б., № 31. — Пет., стр. 259. — Кауф. II, № 306. — Мил., № 15. — Гор., № 20. — Цин., № 557. — Кауф. I, стр. 189. — Lind., p. 114. — Дв., № 277. — Макс., № 233. — Hoff. II., № 1844. — Mart., p. 43. — Hoff., № 2695. — St. II, p. 16. — St. I, № 155. — Pal., № 448.

Кустарникъ до 1,5 м. съ буро-сѣрой корой; листья 3—5-лопастные, не пахучіе, снизу безъ железокъ, по краямъ doubly-зубчатые, на длинныхъ черешкахъ, основаніе которыхъ съ довольно длинными железистыми волосками; кисть цвѣтовъ рѣдкая, вначалѣ слегка отклоненная, потомъ повислая; прицвѣтники яйцевидные; чашечка блюдчатая, съ лопатчатыми, отвороченными чашелистиками, много длиннѣе клиновидныхъ, желто-зеленыхъ лепестковъ; ягоды красныя или желтовато-бѣлыя.

Разводится, въ дикомъ состояніи рѣдко. Цвѣтетъ съ начала мая до начала іюня. Медвѣдково, Мос. у.; Буньково, Бгр. у. (К.).—Подъ Саввинскимъ монастыремъ, Зви. у. (М.).—Мытищи—Посинный Островъ (С.).—Спасъ-Сѣтунь, Мос. у. (Г. О.).—Вѣковой лѣсъ около Іосифова монастыря, Влк. у. (Ф. Б.).—Въ лѣсу близъ платформы 17 верста, Брянск. ж. д. (Х.).

507. *R. nigrum* L. Пет. Кр. I, стр. 185. — Бух. II, № 175. — Бух. I, № 167. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 259. — Кауф. II, стр. 305. — Цин., № 558. — Кауф. I, стр. 188. — Дв., № 248. — Макс., № 234. — Hoff. II., № 1845. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 43. — Hoff., № 2694. — St. II, p. 16. — St. I, № 156. — Pal., № 450.

Кустарникъ до 2 м. съ красновато-бурой корой; листья пахучіе, глубоко 3—5-лопастные, у основанія сердцевидные, по краямъ неравно-зубчатые, сверху голые, снизу свѣтлѣе, слегка опушенные и покрыты разбѣянными, желтыми точечными железками; цвѣты въ пазушныхъ по-

вислыхъ кистяхъ; цвѣтоножки пушистыя, съ мелкими шиловидными прицвѣтниками; чашечка колокольчатая, съ продолговатыми, отвернутыми чашелистиками, вдвое длиннѣе продолговатыхъ. внутри красноватыхъ лепестковъ; ягода черная.

Разводится и въ дикомъ состояніи по тѣнистымъ берегамъ рѣкъ и ручьевъ. Цвѣтетъ съ мая до половины іюня. Токарево (Ген.).—Люблино, Пваньково. Братцово (К.).—Михайловское, по берегамъ р. Пахры. Пдл. у. (Б.).—Островъ на Окѣ противъ Бачманова, Кзм. у.; лѣсъ за Хмѣтьевымъ, Кзн. у.; Никифорово, Сри. у. (П.).—Близъ Зиброва, Сри. у. (С.).—Дарьино. Зви. у.; въ лѣсу у платформы 17 верста, Брянск. ж. д. (Х.).



Ribes nigrum



Rubus aureum

* *R. auréum* Pursch. Пет. Кр. I, стр. 185.—Пет., стр. 260.

Кустарникъ до 2 м. съ сѣрой корой; листья 3-лопастные, на цвѣтущихъ вѣтвяхъ 5-лопастные, съ клиновиднымъ, рѣже округлымъ основаниемъ, сверху свѣтло-зеленые, лоснящіеся, снизу тусклые, лопасти цѣльнокрайнія или крупно-и рѣдко-зубчатая, по краямъ коротко-рѣсничатая; жилы цвѣтовъ рѣдкія, слегка отклоненныя; цвѣтоносы голые; прицвѣтники продолговатые, зеленые, почти такой же длины, какъ цвѣтоножки; чашечка съ длинною, цилиндрическою трубкою, ярко-желтая, съ продолговатыми, округлыми чашелистиками, въ 2—3 раза длиннѣе усѣченныхъ, зазубренныхъ, спереди оранжевыхъ лепестковъ; ягода сперва оранжевая, потомъ почти черная.

Разводится по садамъ.

48 сем. Rosáceae Juss.

Цвѣты правильные, обоеполые, рѣже однополые, съ верхней, полунижней или нижней завязью; чашечка 5-, рѣже 4- или 6-листная, иногда чашечка состоитъ изъ 5 внутреннихъ крупныхъ и 5 наружныхъ (подчашіе) мелкихъ листочковъ; тычинокъ много, рѣже 4 или менѣе; лепестковъ 5 (рѣже 4—6 или 0), прикрѣпленныхъ выѣтъ съ тычинками къ краю цвѣто-

ложка; пестиковъ 1—много, свободныхъ или сросшихся между собой вполне или только въ нижней своей части, на выпукломъ цвѣтоложѣ, или же на двѣ цвѣтоложе вогнутого или даже кувшинчатого; каждый пестикъ съ свободнымъ столбикомъ, рѣдко верхушечнымъ, б. ч. боковымъ; рыльце маленькое головчатое, рѣдко кистевидное; сѣменочекъ въ каждой завязи б. ч. по 2, рѣдко по одной; плодъ — костянка, сухая или мясистая, листовка или мѣшечекъ, ягода иногда сборная, или же плодъ крупный, мясистый; сѣмена съ прямымъ зародышемъ, безъ бѣлка или съ незначительнымъ бѣлкомъ.

Обзоръ сем. Rosaceae Juss.

Подсемейство 1. Spiraeoidéae Agardh.

Пестиковъ 3—5 съ верхушечнымъ или почти верхушечнымъ столбикомъ; плодъ — листовка или мѣшечекъ; чашелистики остаются.

Physocarpus, Spiraea, Sorbaria.

Подсемейство 2. Rosoidéae Focke.

Пестиковъ много, рѣдко въ ограниченномъ числѣ, на выпукломъ, цилиндрическомъ или булабовидномъ цвѣтоложѣ, или же цвѣтоложе кувшинчатое, и пестики сидятъ на двѣ; каждый пестикъ 1—2-сѣменный.

I. *Róseae DC.*

Цвѣтоложе кувшинчатое, на двѣ которого расположены пестики съ длинными столбиками, выступающими изъ-за краевого железистаго кольца цвѣтоложе; сѣменочка одна, вислая; плодъ образуется изъ разрастающагося цвѣтоложе, которое становится мясистымъ.

Rosa.

II. *Sanguisorbeae Spreng.*

Пестиковъ 1—3, заключенныхъ въ кольчатое, трубчатое или кубарчатое цвѣтоложе; сѣменочка одна, вислая; сѣмянки заключены въ отвердѣломъ цвѣтоложѣ.

Alchimilla, Agrimonia, Sanguisorba, Poterium.

III. *Ulmariéae Meiss.*

Пестиковъ 5—15; рыльце головчатое; сѣменочки парныя; плодъ изъ односѣменныхъ, не раскрывающихся, отваливающихся сѣмянокъ.

Filipendula.

IV. *Potentilléae Spreng.*

Пестиковъ много на выпукломъ цвѣтоложѣ; сѣменочекъ 2, висячихъ; плодъ изъ сочныхъ костянокъ, образующихъ сборную ягоду, или плодъ сухой изъ сѣмянокъ, рѣже плодоложе становится мясистымъ.

Rubus, Fragaria, Comarum, Potentilla, Geum.

Подсемейство 3. *Romoidéae* Focke.

Цвѣтоложе бокальчатое, сросшееся съ пестиками и образующее вмѣстѣ съ ними нижнюю 1—5-гнѣздную завязь; чашечка 5-листная остается при плодѣ; сѣмепочекъ 1—2, рѣдко ихъ много въ каждомъ гнѣздѣ; плодъ мясистый или мучнистый.

Cotoneaster, Crataegus, Amelanchier, Pirus, Sorbus.

Подсемейство 4. *Prunoidéae* Focke.

Пестикъ одинъ, съ 2 впячыми сѣмепочками; столбикъ вер-хушечный; плодъ — костянка, мясистая или сухая.

Prunus.

Опредѣлитель родовъ.

1. Деревья и кустарники. 2.

Травянистыя растенія и полукустарники. 13.

2. Чашечка двойная изъ 5 наружныхъ и 5 внутреннихъ листочковъ.

Potentilla.

Чашечка простая изъ 5 листочковъ. 3.

3. Цвѣтоложе кувшинчатое, на днѣ котораго расположены свободные пестики.

Rosa.

Цвѣтоложе иной формы, иногда бокальчатое, но тогда сросшееся съ пестиками. 4.

4. Столбикъ одинъ.

Prunus.

Болѣе одного столбика (иногда у *Crataegus crus-galli* 1—2 столбика). 5.

5. Цвѣтоложе вышуктое, въ послѣдствіи б. ч. разрастается; плодъ изъ сочныхъ костянокъ, образуетъ сборную ягоду.

Rubus.

Цвѣтоложе плоское, не разрастается, или цвѣтоложе бокальчатое, сросшееся съ пестиками; плодъ—листочка или мясистый. 6.

6. Пестиковъ 3—5, свободныхъ или сросшихся только основаніями. 7.

Пестики срались съ бокальчатымъ цвѣтоложемъ, образуя 1—5-гнѣздную завязь. 9.

7. Пестики супротивны долямъ чашечки; листья перистые.

Sorbaria.

Пестики чередуются съ долями чашечки; листья не перистые. 8.

8. Листья 3-лопастные; мѣшечки 2-створчатые, сросшіеся своими ножками въ общую плодоножку.

Physocarpus.

Листья цѣльнокрайніе, зубчатые или надрѣзные, но не 3-лопастные; мѣшечки не сросшіеся, вскрываются щелью.

Spiraea.

9. Листья перистые.

Sorbus.

Листья не перистые. 10.

10. Листья цѣльнокрайніе или мелко-зубчатые. 11.

Листья лопастные или крупно-зубчатые.

Crataegus.

11. Листья цѣльнокрайніе.

Cotoneaster.

Листья по краямъ мелко-пильчатые. 12.

12. Цвѣты въ кистяхъ на концахъ вѣтвей, съ узко-овальными клиновидно-суженными лепестками. *Amelanchier*.
Цвѣты въ малоцвѣтковыхъ щиткахъ, съ широкими округлыми лепестками. *Pirus*.
13. Лепестковъ вѣтъ. одна только чашечка, иногда двойная, одноцвѣтная, окрашенная или зеленая. 14.
Цвѣты съ чашечкой и вѣнчикомъ. 16.
14. Столбикъ съ головчатымъ рыльцемъ. 15.
Столбикъ съ кистистымъ малиновымъ рыльцемъ. *Poterium*.
15. Цвѣты темно-малиновые, въ головкахъ. *Sanguisorba*.
Цвѣты зелено-желтые, въ полусонтикахъ. *Alchimilla*.
16. Цвѣтоложе кубарчатое, твердѣющее, густо усаженное подъ чашечкой крючковатыми колючками. *Agrimonia*.
Цвѣтоложе иное, безъ крючковатыхъ колючекъ. 17.
17. Чашечка 5-раздѣльная, безъ наружныхъ чашелистиковъ. 18.
Чашечка двойная, изъ 5 (4) крупныхъ внутреннихъ и 5 (4) наружныхъ маленькихъ листочковъ. 19.
18. Цвѣты мелкіе, въ густыхъ полусонтикахъ; тычинки по отцвѣтаніи отваливаются; плодъ сухой. *Filipendula*.
Цвѣты б. или м. крупные, одиночные или въ не густыхъ кистяхъ; тычинки по отцвѣтаніи остаются увядшими; плодъ — сборная ягода изъ сочныхъ костянокъ. *Rubus*.
19. Столбики длинныя, верхушечныя, 2-членистыя; верхушечный членикъ согнуть крючкомъ. *Geum*.
Столбики короткіе, б. ч. боковыя, простыя, не членистыя. 20.
20. Лепестки темно-малиновые, заостренныя. *Comarum*.
Лепестки бѣлые или желтые, округлыя или слегка выемчатые. 21.
21. Цвѣты бѣлые; плодоложе голое, по отцвѣтаніи разрастается въ сочную ягоду; листья на длинныхъ черешкахъ, тройчатые. *Fragaria*.
Цвѣты желтые, рѣдко бѣлые; плодоложе волосистое, сухое, не разрастается; листья пальчатые, перистые, рѣдко тройчатые, но тогда цвѣты желтые. *Potentilla*.

* *Physocarpus Maxim.*

Пестики чередуются съ долями чашечки; мѣшечки кожистыя, вздутые, 2-створчатые, сросшіеся своими ножками внизу въ общую ножку; кожура сѣмянъ очень твердая, лоснящаяся; прилистники пленчатые, легко опадаютъ.

* *P. opulifolius Maxim.* Пет. Кр. I, стр. 138.—Пет., стр. 239.

Spiraea opulifolia L. Pal., № 1026.

Кустарникъ до 2 м. съ сѣрой корой; листья на черешкахъ, въ очертаніи округло-яйцевидныя или яйцевидныя, съ клиновиднымъ основаніемъ,

3—5-лопастные, по краямъ съ неравными зубцами, голые, снизу блѣднѣе; прилистники ланцетные, иногда по краямъ зубчатые; цвѣты въ конечныхъ щиткахъ, бѣлые; лепестки до 6 мм.; цвѣтоножки б. ч. голыя; чашечка снаружи голая, рѣже коротко-опушенная, внутри чашелистики покрыты войлокомъ; мѣшечки длиннѣе чашечки, голые, красноватые, лоснящіеся, на верхушкѣ съ остающимися столбками.



Physocarpus opulifolius.

Разводится по садамъ. Цвѣтетъ въ маѣ.

* *Spiraea* L.

Пестики чередуются съ долями чашечки, мѣшечки не вздутые, хрящеватые, свободные, не сросшіеся, вскрываются одною щелью вдоль внутренняго края мѣшечковъ; кожа сѣмянъ тонкая; прилистниковъ нѣтъ.

1. Цвѣты однополые, растеніе двудомное, иногда въ женскихъ цвѣтахъ находятся нѣсколько недоразвитыхъ тычинокъ; всѣ листья цѣльнокрайніе, нѣсколько мясистые.

S. laevigata L.

Цвѣты обоеполые; листья по краямъ или только у верхушки зубчатые, не мясистые. 2.

2. Цвѣты розовые.

S. salicifolia L.

Цвѣты бѣлые. 3.

3. Листья сѣро-зеленые; цвѣтоносныя вѣтви очень короткія, съ листьями цѣльнокрайними, которые много мельче обыкновенныхъ зубчатыхъ листьевъ на молодыхъ вѣтвяхъ; плодоносная чашечка съ торчащими долями. 4.

Листья зеленые, всѣ зубчатые или городковые; цвѣтоносныя вѣтви длинныя, покрыты почти такими же листьями, какъ и на молодыхъ вѣтвяхъ; доли чашечки отогнутыя. 5.

4. Листья на молодыхъ вѣтвяхъ съ середины зубчатые или къ верхушкѣ городковые; цвѣтоножки вдвое длиннѣе цвѣтка; столбики прямые.

S. crenifolia C. A. Mey.

Листья на молодыхъ вѣтвяхъ цѣльнокрайніе и къ верхушкѣ слегка городковые; цвѣтоножки въ 4 раза длиннѣе цвѣтка; столбики отогнуты наружу.

S. hypericifolia L.

5. Вѣтви угловато-ребристыя, согнуты дугой; столбики прямые.

S. ulmifolia Scop.

Вѣтви цилиндрическія, не угловатыя; столбики отогнутые, какъ бы боковые.

S. media Schmidt.

* *S. hypericifolia* L. Пет. Кр. I, стр. 138.—Пет., стр. 285.—Пал., № 1022.

Кустарникъ до 1 м., съ сѣрой корой; листья на короткихъ черенкахъ, клиновидно-продолговатые, тупо-обратно-яйцевидные или линейно-ланцетные, цѣльнокрайніе или у верхушки съ 3—5 острыми зубчиками, съ 1 или 3 жилками, сверху темно-зеленые, снизу сине-зеленые; цвѣты въ сидячихъ зонтикахъ, безъ прицвѣтныхъ листьевъ; лепестки бѣлые, до 2,5 мм., равны тычинкамъ, рѣже короче ихъ; цвѣтоножки въ 4 раза длиннѣе цвѣтка; мѣшечки изнутри выпуклые, съ отогнутыми въ сторону столбиками.

Разводится по садамъ. Цвѣтеть съ половины мая.



Spiraea hypericifolia.



Spiraea crenifolia.

* *S. crenifolia* C. A. Mey. Пет. Кр. I, стр. 138.—Петр., стр. 285.

Spiraea crenata Pall. Pal., № 1024.

Кустарникъ до 1 м. съ сѣрой корой и вѣтвями безъ реберъ; листья на короткихъ черенкахъ, клиновидно-продолговатые, спереди округлые и только на верхушкѣ зубчатые, по бокамъ цѣльнокрайніе, съ 3 продольными жилками, сверху темно-зеленые, снизу сине-зеленые, слегка опушенные; цвѣты на укороченныхъ боковыхъ вѣточкахъ, въ щиткахъ, окруженныхъ прицвѣтными листьями; лепестки бѣлые, до 2,5 мм., короче тычинокъ; цвѣтоножки въ 2 раза длиннѣе чашечки; доли послѣдней при плодахъ торчащія; мѣшечки у верхушки изнутри выпуклые и со столбиками вверхъ торчащими.

Разводится по садамъ. Цвѣтеть съ половины мая.

* *S. média* Schmidt. Пет. Кр. I, стр. 138.—Пет., стр. 285.—Кауф. II, стр. 167.—Цин., № 169.

Spiraea triloba Pal., № 1025.

Кустарникъ до 1,5 м., съ вѣтвями почти торчащими, безъ реберъ, съ сѣро-бурой корой; листья на короткихъ черенкахъ, эллиптическіе, острые, на цвѣтоносныхъ вѣтвяхъ цѣльнокрайніе, на не цвѣтущихъ—у верхушки глубоко 3-зубчатые или отъ верхушки до половины крупно-зуб-

чатые, очень рѣдко цѣльнокрайніе, обыкновенно покрыты разсѣянными волосками, сверху темно-зеленые, снизу сѣро- или синевато-зеленые; цвѣты бѣлые, на боковых вѣточкахъ, въ густыхъ щиткахъ; лепестки до 3 мм., короче тычинокъ; чашелистики острые, отогнутые; мѣшечки опушенные, изнутри выпуклые, съ отогнутыми, какъ бы боковыми столбиками.

Разводится по садамъ. Цвѣтетъ съ начала мая.



Spiraea media.



Spiraea ulmifolia.



Spiraea salicifolia.

* ***S. ulmifolia* Scop.**

Spiraea chamaedryfolia L. Пет. Кр. I, стр. 138.—Пет., стр. 285.—Пал., № 1023.

Кустарникъ до 1,5 м., съ сѣрой корой и съ угловато-ребристыми вѣтвями, согнутыми дугой; листья на короткихъ черешкахъ, яйцевидно-эллиптические, двояко-зубчатые, къ основанію клиновидные. иногда почти округлые, по краямъ рѣбчатые, снизу блѣднѣе; цвѣты на боковых вѣточкахъ въ щиткахъ, бѣлые; лепестки до 4 мм., короче тычинокъ; цвѣтовожки голыя; чашелистики отогнутые; мѣшечки выдаются изъ чашечки, снаружи выпуклые, голые и съ прямыми столбиками.

Разводится по садамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ мая до половины іюня.

* ***S. salicifolia* L.** Пет. Кр. I, стр. 138.—Пет., стр. 284.—Кауф. II, стр. 167.—Цин., стр. 169.—Кауф. I, стр. 149.—Дв., № 526.—Макс., № 463.—Март., р. 86.—Ст. II, р. 30.—Ст. I, № 329.—Пал., № 1020.

Кустарникъ до 2 м., съ ребристыми вѣтвями; листья на короткихъ черешкахъ, продолговато-ланцетные, иногда обратно-яйцевидно-ланцетные, по краямъ почти отъ основанія остро-зубчатые, сверху темно-зеленые, снизу свѣтлѣе, иногда сизые и съ выдающимися жилками; цвѣты блѣдно-розовые, въ конечной, густой, удлиненной метелкѣ; лепестки до 4 мм.; цвѣтовожки длиною съ цвѣтокъ; чашелистики треугольные, тупые, торчащіе или отогнутые; тычинки длиннѣе лепестковъ; мѣшечки съ расходящимися верхушками и отогнутыми столбиками.

Разводится по садамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюня.

* *S. laevigata* L. Pal., № 1019.

Кустарникъ до 1,5 м.; вѣтви цилиндрическія, съ красно-бурой корой; листья голые, продолговато-обратно-яйцевидные, къ основанію суженные, почти сидячіе, слегка стеблеобъемлющіе, на верхушкѣ округлые или съ очень короткимъ остриемъ, цѣльно-крайніе, спне-зеленые, тусклые, снизу свѣтлѣе; цвѣты однополые, зеленовато-бѣлые, въ конечныхъ крупныхъ метелкахъ; женскіе цвѣты содержатъ нѣсколько недоразвитыхъ тычинокъ; чашелистики тупо - треугольные, при плодахъ вверхъ торчащіе; столбики немного отклонены, впоследствии опадаютъ.

Разводится по садамъ. Цвѣтетъ съ половны мая; зрѣлые плоды въ августѣ.



Spiraea laevigata.

* *Sorbária* A. Br.

Пестики супротивны долямъ чашечки; мѣшечки съ внутренней стороны внизу на треть спаяны, вскрываются вдоль спинки до спайки; семена мелкія, со свободно окружающей ихъ наружной кожурой; прилистники ланцетные.

* *S. sorbifolia* A. Br. Пет. Кр. I, стр. 138.—Пет., стр. 283.—Кайф. II, стр. 168. *Spiraea sorbifolia* L. Цм., стр. 169.—Pal., № 1027.

Кустарникъ до 2 м., съ ползучими подземными побѣгами; молодые побѣги, черешки листьевъ, цвѣтоножки и плодники покрыты звѣздчатымъ пушкомъ; листья непарно-перистые, о 6—9 парахъ; листочки продолговато-ланцетные, по краямъ двояко-зубчатые; прилистники по краямъ зубчатые, съ звѣздчатымъ пушкомъ; цвѣты бѣлые, въ конечной, густой вѣтвистой, пирамидальной метелкѣ; тычинки длиннѣе лепестковъ; плодники продолговато-цилиндрическіе, торчащіе, съ неясной жилкой на спинкѣ, часто на верхушкѣ съ засохшимъ, согнутымъ столбикомъ.

Разводится по садамъ, очень часто. Цвѣтетъ въ маѣ.



Sorbaria sorbifolia.

200. *Rósa* L.

Цвѣты обоеполые; чашечка 5-лиственная, опадающая или остающаяся при плодѣ; лепестковъ 5; тычинокъ много, прикрепленныхъ вмѣстѣ съ лепестками къ железистому кольцу, стягивающему зѣвъ кувшинчатаго

цвѣтоложа; пестиковъ много, расположенныхъ по дну цвѣтоложа; каждый пестикъ съ боковымъ изгибнымъ столбикомъ и одной высячей съемочкой; плодъ — ложная сочная ягода, образовавшаяся изъ разросшагося цвѣтоложа, заключающаго волосистые орѣшки. Кустарники съ шипами и перистыми листьями.

1. Листья, особенно молодые, вишнево-красные.

R. rubrifolia Vill.

Листья зеленые. 2.

2. Вѣтви и шипы, особенно на молодыхъ отпрыскахъ, покрыты пушкомъ или войлокомъ.

R. rugosa Thunb.

Вѣтви и шипы голые. 3.

3. Крупные шипы загнуты серпомъ. 4.

Крупные шипы прямые, шиповидные или кустарники безъ шиповъ. 7.

4. Чашелистики перисто-надрѣзные. 5.

Чашелистики простые, узко-ланцетные. *R. cinnamomea* L.

5. Мелкіе шипы прямые, крупные — отогнутые. *R. gallica* L.

Только крупные серповидные шипы. 6.

6. Цвѣты махровые. *R. gallica* L. *a. centifolia* L.

Цвѣты простые.

R. canina L.

7. Цвѣты желтые.

R. lutea Mill.

Цвѣты бѣлые или розовые. 8.

8. Листочки очень мелкіе; всѣ вѣтви густо покрыты шипами.

R. pimpinellifolia L.

Листочки крупные; цвѣтушія вѣтви почти безъ шиповъ.

R. pendulina L.

* *R. gallica* L. Пет., стр. 260.—Pal., № 1039.

Не высокій кустарникъ до 50 см.; молодые отпрыски густо покрыты шетинистыми и болѣе крупными сплюснутыми, немного согнутыми шипами; на цвѣтущихъ вѣткахъ шипы сидятъ не столь густо; цвѣтоножки, а также и черешки листьевъ съ шипами и стебельчатыми железками; листья о 5, рѣже о 3 листочкахъ, округло-овальныхъ или эллиптическихъ, по краямъ железисто- и двояко-пильчато-зубчатыхъ, сверху ярко-зеленыхъ, снизу спнезеленыхъ; прилистники широкіе, плоскіе, по краямъ железистые; цвѣты конечные, по 1—3, крупные, карминно-красные, торчащіе; чашелистики перисто-надрѣзные, съ ланцетовидно-расширенной верхушкой, по краямъ пушистые или, какъ и на спинкѣ,



Rosa gallica.

железистые, короче лепестковъ; плодъ шаровидный, карминно-красный. съ чашелистиками рано опадающими.

Разводится по садамъ. Цвѣтетъ въ іюнѣ; плоды въ августѣ.

г. centifolia L. (sp.).

Rosa centifolia L. Пет., стр. 261.—Pal., № 1037.

Цвѣты поникшіе, розовые, махровые, со множествомъ смыкающихся лепестковъ; доли чашечки яйцевидныя, ланцетныя; плодъ яйцевидный; молодыя не цвѣтуція вѣтви съ твердыми серповидными шипами.



Rosa gallica г. *centifolia*.



Rosa rubrifolia.

*** R. rubrifolia Vill.** Пет. Кр. I, стр. 163.

Кустарникъ до 2 м.; молодыя вѣтви вишнево-красныя, съ сѣрымъ налетомъ, старыя — бурія; шипы сидятъ неравномѣрно, сплюснутые и серповидные; листья о 5—9 листочкахъ, старыя — сверху зеленые, снизу съ красновато-сѣрымъ налетомъ, молодыя — съ обѣихъ сторонъ вишнево-красныя, голыя; листочки эллиптическіе, остро-зубчатые, верхніе зубцы загнуты къ верхушкѣ; вдоль нижней стороны черешковъ съ серповидными, загнутыми шипами; прилистники широкіе, близъ цвѣтовъ эллиптическіе, вишнево-красныя; цвѣты конечные, многочисленные; лепестки темно-розовыя; чашелистики линейно-ланцетные, длиннѣе лепестковъ, при зрѣлыхъ плодахъ опадаютъ; плодъ шаровидный, вишнево-красный, лоснящійся или съ сѣрымъ налетомъ.

Разводится по садамъ. Цвѣтетъ въ іюнѣ; плоды въ августѣ.

*** R. canina L.** Пет. Кр. I, стр. 162.—Пет., стр. 261.—Кауф. II, стр. 165.—Цин., № 492.—Кауф. I, стр. 165.—Lind., p. 110.—Дв., № 532.—Макс., № 465.—Макс. Пут. II, стр. 10.—Хоф. II., № 3767.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 87.—St. II, p. 30.—St. I, № 332.—Pal., № 1040.

Rosa solstitialis Bess. Gold C., p. 20.

Кустарникъ до 2 м.; молодыя отпрыски б. ч. дугообразно согнуты и покрыты, какъ и старыя вѣтви, твердыми, загнутыми, у основанія рас-

широкими и плоскими шипами; листья съ обѣихъ сторонъ зеленые, о



Rosa canina

5—7 листочкахъ, послѣдніе овальные или яйцевидные, у основанія округлые, верхніе—на черешкахъ, нижніе—сидячіе, совершенно голые, очень рѣдко снизу вдоль жилки съ волосками, остро-зубчатые, зубцы съ согнутой верхушкой; прилистники расширены, съ отогнутой свободной верхушкой и часто по краямъ съ железками; черешки и цвѣтоножки голые или покрыты железистыми щетинками; цвѣты по 2—4, рѣже вѣтви обь 1 цвѣткъ; лепестки блѣдно-розовые или бѣлые; чашелистники над-рѣзные, съ 2 боковыми придатками внизу и расширенною верхушкой, отогнутой книзу, при созрѣваніи плода опадаютъ; плодъ эллиптическій или почти шаровидный, ярко-красный, лоснящійся.

Разводится по садамъ, иногда дичаетъ. Цвѣтетъ въ іюнѣ; плоды въ августѣ.

508. *R. cinnamomea* L. Пет. Кр. I, стр. 161.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 261.—Кауф. II, № 271.—Цип., № 491.—Кауф. I, стр. 164.—Lind., p. 110.—Дв., № 531.—Макс., № 464.—Hoff. H., № 3769.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 87.—St. II, p. 30.—Pal., № 1032.

Кустарникъ до 2 м. съ красно-бурыми, лоснящимися вѣтвями, подъ



Rosa cinnamomea.

прилистниками съ 2 согнутыми шипами; годовалые отпрыски усажены частыми, слегка согнутыми, щетинковидными шипами; листья о 5—7—9 листочкахъ, снизу голубоватые или сѣроватые, голые или коротко-опушенные; листочки овально-продолговатые, остро-пильчато-зубчатые; прилистники въ нижней части сросшіеся п б. или м. расширенные, а на стебляхъ не цвѣтущихъ свернутые въ трубку, приросшая часть ихъ въ 3—4 раза длиннѣе острыхъ расходящихся ушковъ; цвѣты одиночные или по 2—3, розовые; цвѣтоножки и завязь голые; доли чашечки цѣльныя, съ ланцетной верхушкой, не опадающія.

По лѣсамъ, кустарникамъ, опушкамъ и открытымъ мѣстамъ, часто. Цвѣтетъ съ начала іюня до іюля; плоды съ середины августа.

- α. vulgaris* C. A. Mey. Пет. Кр. I, стр. 162.—Бух. II, № 154.—Бух. I, № 143.—
Кауф. II, стр. 164.—Кауф. I, стр. 164.

Листочки снизу пушистые, зубцы по краямъ слабо загнуты къ верхушкѣ листочка. По плодамъ различаются слѣдующія формы:

- a) *subglobosa* C. A. Mey. Пет. Кр. I, стр. 162.—Кауф. II, стр. 164.—Кауф. I, стр. 164.

Плоды почти шаровидные. По пескамъ на берегу Клязьмы близъ Павловскаго посада, Бгр. у. (К.).—Близъ Серпухова (П.).

- b) *turbinella* C. A. Mey. Пет. Кр. I, стр. 162.—Кауф. II, стр. 164.—Кауф. I, стр. 164.

Плоды грушевидные. Берегъ Клязьмы близъ Павловскаго посада, Бгр. у., Невѣрово, Клм. у. (К.).

- c) *elliptica* C. A. Mey. Пет. Кр. I, стр. 162.—Кауф. II, стр. 164.—Кауф. I, стр. 164.

Плоды эллиптическіе.

- β. *glabrifolia* C. A. Mey. Пет. Кр. I, стр. 162.—Кауф. II, стр. 165.—Кауф. I, стр. 164.

Листочки снизу голые, безъ железокъ; зубцы сильно заострены и часто загнуты къ верхушкѣ листочковъ. По формѣ плодовъ различаются:

- a) *typica*.

Плоды эллиптическіе, къ обоимъ концамъ суженные. Берегъ Клязьмы—Павловскій посадъ, Бгр. у.; Карапчеево, Клм. у. (К.).—Боровскій курганъ, Брн. у.; Вѣлые Колодези, Клм. у. (П.).

- b) *subglobosa* Petunnikov. Пет. Кр. I, стр. 162.

Плоды почти шаровидные. Карапчеево, Клм. у. (П.).—Павловскій посадъ, Бгр. у. (X.).

* *R. rugosa* Thunb.

Кустарникъ до 1,5 м.; молодые отпрыски густо покрыты мелкими и крупными, прямыми шипами, цвѣтушія вѣтви—менѣе густо; вѣтви, черешки, цвѣтоножки, нижняя сторона листьевъ и шипы густо покрыты пушкомъ или войлокомъ; листья о 5—11 листочкахъ, плотные, сверху морщинистые, темно-зеленые, тусклые или лоснящіеся, снизу сѣро-зеленые; черешки съ шипиками; листочки широко-овальные, б. ч. тупые, просто- или двояко-зубчатые; зубчики округлые, тупые, рѣже острые; прилистники широкіе, пушистые, по краямъ мелко-зубчатые, зубчики съ железками; цвѣты по 1—3, очень крупныя, темно-розовые, рѣже бѣлые; чашелистики



Rosa rugosa.

длинные, ланцетные, на концѣ расширенныя; плоды шаровидные, крупныя, оранжево-красныя, съ остающимися чашелистиками.

Разводится по садамъ. Цвѣтетъ въ июнѣ; плоды въ началѣ августа.

α. flore pleno Hort.

Цвѣты крупныя, махровыя.

* *R. pendulina* L.



Кустарникъ до 1,5 м., съ красно-бурыми, лоснящимися вѣтвями, почти безъ шиповъ; годовалыя отпрыски покрыты щетиновидными, прямыми шипами; листья о 7, рѣдко о 9—11 листочкахъ, съ обѣихъ сторонъ голыя, рѣже съ нижней стороны вдоль жилки опушенныя; листочки эллиптическіе, б. ч. съ обѣихъ концовъ округлыя, doubly железисто-зубчатыя, на короткихъ черешкахъ, послѣдніе съ стебельчатыми железками; прилистники широкіе, съ отстоящими острыми ушками, по краямъ железисто-зубчатыя; цвѣты по 1 или по 2, темно-розовыя; цвѣтоножки голыя или съ железистыми щетинками; чашелистики очень длинныя, линейно-ланцетныя, длиннѣе лепестковъ; плоды на поднимающихся плодonoжкахъ, ярко-красныя, съ остающимися и сходящимися конусомъ чашелистиками.

Разводится по садамъ, иногда дичаетъ. Цвѣтетъ въ июнѣ, плоды въ началѣ августа.

3. *lagenária* Vill.

Плоды грушевидныя; цвѣтоножки голыя или опушенныя; черешки листьевъ съ длинными, стебельчатыми железками.

α. alpina L. (sp.).

Rosa alpina L. Пет. Кр. I, стр. 163.—Pal., № 1038.

Плоды шаровидныя; листочки съ нижней стороны почти голыя или вдоль жилки опушенныя; цвѣтоножки со стебельчатыми железками. Петровское-Разумовское, въ лѣсу, одичалое (Шр.).

* *R. pimpinellifolia* L. Пет. Кр. I, стр. 163.—Пет., стр. 260.—Pal., № 1034.

Сильно вѣтвистый кустарникъ до 1 м.; вѣтви густо покрыты прямыми, мелкими и болѣе крупными шипами, между которыми стебельчатыя железки; листья о 5—11 листочкахъ, сверху темно-зеленыя, снизу свѣтло-зеленыя; листочки очень мелкіе, округлыя или продолговатыя, б. ч. тупыя, остро- или мелко-зубчатыя; черешокъ частью съ шипиками; прилистники широкіе, по краямъ б. ч. зубчатыя; цвѣты одиночныя, блѣлыя или блѣдно-розовыя, простыя или махровыя; чашелистики широкія, короче лепестковъ и остаются при плодахъ, послѣдніе шаровидныя, черныя или черно-бурыя.

Разводится по садамъ. Цвѣтетъ въ июнѣ; плоды въ началѣ августа.

* *R. lútea* Mill. Пет. Кр. I, стр. 163.—Пет., стр. 260.

Высокій кустарникъ до 3 м.; вѣтви красно-бурыя, усажены прямыми, твердыми шипами; черешки и часто нижняя сторона листьевъ съ щетиновидными железками; листья о 5—9 листочкахъ, съ обѣихъ сторонъ голые, снизу нѣсколько свѣтлѣе; листочки овальные, острые, у основанія нѣсколько клиновидные, по краямъ остро- и двояко-пильчатые, зубцы загнуты къ верхушкѣ; прилистники по краямъ съ железками, свободная часть зубчатая; цвѣты (1—3) желтые, крупные; чашелистики равны или нѣсколько длиннѣ лепестковъ, перисто-раздѣльные, на концѣ немного расширенные, по краямъ съ крупными рѣсничками; плодъ шаровидный, красный, съ остающимися чашелистиками.

Разводится по садамъ. Цвѣтетъ въ июнѣ; плоды въ половинѣ августа.



Rosa pimpinellifolia.



Rosa lutea.

201. *Alchimilla* L.

Лепестковъ нѣтъ; чашечка изъ 4 внутреннихъ большихъ и 4 наружныхъ маленькихъ чашелистиковъ, остается при плодахъ; цвѣтоложе колокольчатое, у зѣва суженное, при плодахъ твердѣетъ; 4 тычинки на утолщенномъ, кольцеобразномъ краю цвѣтоложа; пестикъ одинъ съ боковымъ столбикомъ и головчатымъ рыльцемъ; сѣмечко одна; плодъ сѣмянкa, заключенная въ цвѣтоложe.

509. *A. vulgáris* L. Пет. Кр. I, стр. 163.—Бух. II, № 155.—Бух. I, № 144.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 132.—Кауф. II, № 272.—Цин., № 450.—Кауф. I, стр. 166.—Lind., p. 108.—Ann. C. IV, № 10.—Дв., № 179.—Макс., № 167.—Hoff. II., № 1179.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 31.—Hoff., № 81.—Ad., p. 85.—St. I, № 105.—Pal., № 273.

Корневище толстое, бурое, покрыто бурыми чешуйками; стебель 10—30 см. приподнимающийся или почти лежачій, голый или съ рѣдкими

волоскам; листья почковидные или округло-почковидные, съ 5—7—9



Alchimilla vulgaris.

округлыми или яйцевидными лопастями, остро-зубчатыми, по краямъ съ шелковистыми волосками, сверху голые, снизу по жилкамъ съ волосками, корневые—на длинныхъ черешкахъ, стеблевые—на короткихъ или почти сидячіе; прилистники крупные, сросшіеся вокругъ стебля воронкой, по краямъ зубчатые; цвѣты въ раскидномъ, вильчатомъ полузонтикѣ, зеленые; цвѣтоножки равны чашечной трубкѣ или немного длиннѣе ея.

По лугамъ, лѣсамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ начала мая до августа; плоды съ августа.

α. hybrida L. Hoff., № 81.—Ad., p. 85.

Alchemilla vulgaris L. *β. subsericea* Koch. Пет. Кр. I, стр. 163.—F. O., № 6, p. 86.—Кауф. II, стр. 166.—Цин., № 157.—Кауф. I, стр. 166.

Alchemilla pubescens Lam. Дв., № 180.—Mart., p. 31.

Alchemilla vulgaris L. *β. pubescens* Mart. Макс., № 167.

Alchemilla hybrida DC. Mart., p. 31.

Стебли и черешки листьевъ покрыты густыми, отстоящими волосками; верхняя и нижняя сторона листьевъ серебристая отъ прижатыхъ волосковъ.

202. *Agrimónia* L.

Цвѣты обоеполые; лепестковъ 5; чашечка 5-раздѣльная, по отцвѣтаніи съ сходящимися долямъ; цвѣтоложе кубарчатое, твердѣющее, усаженное до чашелистиковъ крючковатыми колючками, при плодахъ твердѣющими; верхушка цвѣтоложка стянута мясистымъ кольцомъ, къ которому прикреплены 6—20 тычинокъ; пестиковъ 2, заключенныхъ въ цвѣтоложе; въ каждомъ пестикѣ по одной висячей сѣменочкѣ; столбикъ одинъ, нитевидный, съ почти двулопастнымъ рыльцемъ; сѣмянкa б. ч. одна, заключена въ твердомъ и цѣлкомъ цвѣтоложѣ.

510. *A. Eupatória* L. Пет. Кр. I, стр. 161.—Бух. II, № 152.—Бух. I, № 149.—F. O., 6, p. 86.—Пет., стр. 131.—Кауф. II, № 269.—Цин., № 451.—Кауф. I, стр. 163.—Lind., p. 108.—Дв., № 557.—Макс., № 452.—Hoff. H., № 3684.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 85.—Hoff., № 57.—St. II, p. 28.—St. I, № 319.—Pal., 943.

Корневище толстое; стебель 30—80 см., прямостоящій, простой, бороздчатый, покрытъ длинными, отстоящими или внизъ обращенными волосками; листья перисто-перистые, попеременно то съ крупными, то съ мелкими парами листочковъ; крупные листочки эллиптическіе или про-

долговатые, по краямъ крупно-зубчатые; мелкіе — яйцевидные, зубчатые; прилистники косо-полусердцевидные, остро-надрѣзные, съ нижней стороны, какъ и листья, покрыты густымъ звѣздчатымъ пушкомъ; цвѣты въ верхушечномъ, у основанія прерванномъ колосѣ; лепестки 4 мм., яйцевидные, оранжевые; при плодахъ наружныя колючки цвѣтоложа отстоящія.

По холмамъ и кустарникамъ, любить глинистую почву, очень часто. Цвѣтеть съ половины іюня весь іюль.



Agrimonia Eupatoria.



Agrimonia pilosa.

511. **A. pilosa** Ledb. Пет. Кр. I, стр. 161.—Бух. II, № 153.—Бух. I, № 150.—Пет., стр. 131.—Кауф. II, № 270.—Цин., № 452.—Pinz., p. 12.—Кауф. I, стр. 163.—Ann. С. II, № 122.

Корневище толстое; стебель 50—100 см., примостоящій, бороздчатый, покрытъ длинными, отстоящими волосками; листья непарно-перистые, съ крупными и мелкими парами листочковъ, изъ конхъ первые продолговатоморбическіе, къ основанію клиновидные, зубчатые только въ верхней половинѣ или въ двухъ третяхъ, по 4—6 зубцовъ съ каждой стороны; нижняя сторона листьевъ безъ звѣздчатого пушка; мелкіе листочки овальные или яйцевидные, цѣльнокрайніе, рѣже съ однимъ зубцомъ; прилистники косые, полусердцевидные, остро-зубчатые; цвѣты въ верхушечномъ рѣдкомъ колосѣ; лепестки 3—4 мм., желтые; при плодахъ всѣ колючки цвѣтоложа сходятся конусомъ.

По лѣсамъ, опушкамъ и по кустарникамъ, не часто. Цвѣтеть съ іюля до половины августа; плоды съ середины августа. Успенское, Зви. у. (Х.).—Близъ Михайловскаго, Пдл. у. (Б.).—Воробьевы горы (П.).—Митищи. Лосинный Островъ; Боровскій курганъ, Брн. у. (С.).

203. *Sanguisorba* L.

Цвѣты обоеполые; лепестковъ нѣтъ; чашечка 4-раздѣльная, опадающая; тычинокъ 4, прикрѣпленныхъ къ утолщенному краю цвѣтоложа:

пестикъ одинъ, съ нитевиднымъ столбикомъ и головчатымъ, бородавчатымъ рыльцемъ; сѣмепочка одна, вислая; сѣмянкa заключена въ отвердѣломъ, 4-гранномъ цвѣтожѣ.

512. *S. officinális* L. Пет. Кр. I, стр. 164.—Бух. II, № 156.—Бух. I, № 145.—Пет., стр. 270.—Кауф. II, № 273.—Цин., № 449.—Рупр., стр. 62 и 88.—Кауф. I, стр. 167.—Lind., p. 108.—Дв., № 176.—Макс., № 162.—Mart., p. 30.—Hoff., № 2824.—Ad., p. 83.—St. II, p. 11.—St. I, № 104.—Pal., № 260.

Корневище толстое, горизонтальное, деревянистое; стебли 40—100 см., прямостоящіе, бороздчатые, голые, къ верхушкѣ часто вѣтвистые; листья непарно-перистые; листочки продолговатые, у основанія сердцевидные, зубчатые, снизу сизые, на черешкахъ, иногда съ маленькими прилистничками; прилистники у листьевъ косые, зубчатые, приросшіе къ основанію черешка; соцвѣтіе — продолговатая головка въ 1,5—3,5 см. на длинномъ цвѣтоносі; цвѣты темно-малиновые; прицвѣтники ланцетные, по краямъ рѣсничатые, равны цвѣтку или короче его.



Sanguisorba officinalis.

По лугамъ и кустарникамъ. Цвѣтетъ съ іюня весь іюль. Влнзъ Купавны, Бгр. у.; Кунцово, Семеновское (Мар.).—За Богородскимъ (Дв.).—Между Химками и Братцовымъ (герб. Горожанкина).—Гуслицы, Бгр. у. (А.).—На болотѣ «Пальница» близъ с. Михайловскаго и около Красной Пахры, Пдл. у. (Б.).—Заливной лугъ по дорогѣ къ Лужкамъ, Зиброво, Никифорово, Срп. у. (П.).—Дракино, Срп. у. (С.).—С. Рождествено на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогуъ).

204. *Potérĭum* L.

Цвѣты однополые и обоеполые: верхніе—женскіе, нижніе—мужскіе, средніе—обоеполые; лепестковъ нѣтъ; чашечка 4-раздѣльная, опадающая; тычпнокъ 20—30; пестиковъ 2—3, съ кистевидными малиновыми рыльцами; сѣмепочка одна, вислая; сѣмянкa въ морщинистомъ, отвердѣломъ цвѣтоложѣ.

513. *P. Sanguisorba* L. Пет. Кр. I, стр. 164.—Пет., стр. 251.—Кауф. II, стр. 167.—Гор., № 30.—Цин., № 448.—Кауф. I, стр. 167.—Дв., № 888.—Макс., № 886.—Mart., p. 170.—Hoff., № 2587.—St. II, p. 53.—Pal., № 2054.

Стебель 30—60 см., прямостоящій, бороздчатый, часто съ красными полосками и точкамъ, голый или слегка опушенный, въ верхней части вѣтвистый; листья непарно-перистые; листочки округлые или овальные, у основанія сердцевидные, крупно-пильчато-зубчатые, сидячіе или на черешкахъ; соцвѣтіе головчатое, въ 8—15 мм., на длинномъ цвѣтоносі;

чашечка зеленоватая, по отцветаніи краснѣетъ; плодовая чашечная трубка 4-гранная, сѣтчато-морщинистая.

Найдено подъ Владычнымъ монастыремъ близъ Серпухова (Экз. Бот. Лаб.).



Poterium Sanguisorba.



Filipendula Ulmaria.

205. *Filipéndula* L.

Чашелистиковъ и лепестковъ 5—6; тычинокъ 20—40, прикрѣпленныхъ вдоль жилокъ чашечки; пяти тычинокъ книзу утончаются; пестиковъ 5—10, о 2 сѣмечкахъ каждый; рыльце головчатое; плодъ состоитъ изъ сѣмянокъ.

514. *F. Ulmaria* Maxim. Пет. Кр. I, стр. 137. — Бух. II, № 150. — Бух. I, № 142. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 188. — Кауф. II, № 267. — Цин., № 443.

Spiraea Ulmaria L. Кауф. I, стр. 150. — Lind., p. 108. — Ann. C. I, № 19. — Дв., № 528. — Макс., № 462. — Hoff. H., № 3761. — Gold. C., p. 20. — Mart., p. 86. — Hoff., № 3163. — St. II, p. 30. — St. I, № 331. — Pal., № 1029.

Стебель до 1,5 м., прямостоящій, ребристый, голый; листья прерывчато-перистые, нижніе—на длинныхъ черешкахъ, верхніе—на короткихъ: листочки яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, заостренные, по краямъ неравно-двойко-зубчатые, конечный непарный листокъ 3—5-раздѣльный: между крупными листочками еще очень маленькіе; прилистники полу-сердцевидные, по краямъ неравно-зубчатые, немного сросшіеся съ черешкомъ; цвѣты въ верхушечномъ сложномъ полузонтикѣ съ неравными лучами, бѣлые. сильно пахучіе; лепестковъ 5, до 3,5 мм. дл.; чашечка 5-раздѣльная, доли ея яйцевидныя, тупыя, внизъ отогнутыя; плодниковъ 10. спирально-скрученныхъ, голыхъ.

По болотамъ, болотистымъ лугамъ и канавамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до осени.

α. denudata Beck.

Filipendula Ulmaria Maxim. α. *denudata* Koch. Пет. Кр. I, стр. 137.—F. O., № 6, р. 86.—Кауф. II, стр. 162.

Spiraea Ulmaria L. α. *denudata* Koch. Кауф. I, стр. 150.

Spiraea denudata Presl. Pinz., p. 12.

Листья съ обѣихъ сторонъ голые, съ нижней стороны только свѣтлѣе и вдоль жилокъ слегка опушенные. Пушкино (Куль).—Косино; Дарьино, Зяг. у. (X.).

β. tomentosa Maxim.

Filipendula Ulmaria Maxim. β. *discolor* Koch. Пет. Кр. I, стр. 137.—F. O., № 6, р. 86.—Кауф. II, стр. 162.

Spiraea Ulmaria L. β. *discolor* Koch. Кауф. I, стр. 150.

Листья съ нижней стороны бѣлые отъ тонкаго бѣлаго войлока. Кунцово, Воробьевы горы (П.).—Раменское, Брн. у. (К.).—Лосинный Островъ (А.).—Въ гербаріи Генпинага.—Дарьино, Звн. у. (X.).—Быково, Брн. у. (Куль.).

515. F. hexapetala Gilib. Пет. Кр. I, стр. 137.—Бух. II, № 151.—Ф. Б., № 29.—Пет., стр. 189.—Кауф. II, № 268.—Дви., № 442.

Spiraea Filipendula L. Мил., № 10.—Pinz., p. 12.—Рупр., стр. 86.—Кауф. I, стр. 150.—Lind., p. 108.—Ann., C. V, № 19.—Дв., № 527.—Макс., № 461.—Макс. Пут. II, стр. 10.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 86.—Нойф., № 3155.—St. II, p. 30.—St. I, № 330.—Pal., № 1028.

Корни съ веретенообразными клубнями; стебель прямостоящій, до 80 см., ребристый, голый, съ небольшимъ числомъ стеблевыхъ листьевъ; листья въ очертаніи ланцетные, прерывчато-перисто-раздѣльные; доли ихъ ланцетныя или продолговато-ланцетныя, перисто-зубчатыя или надрѣзныя, между крупными долями находятся еще маленькія, по краямъ зубчатыя; прилистники полусердцевидные, по краямъ надрѣзано-зубчатыя; цвѣты въ сложномъ полусонтикѣ съ неравными лучами; лепестковъ 6, до 6 мм. дл., сверху бѣлыхъ, снизу часто розовыхъ; чашечка 6-раздѣльная, съ яйцевидными, тупыми, отвороченными долями; плодниковъ до 12, прямо-торчащихъ, не скрученныхъ спирально, шершавыхъ.



Filipendula hexapetala.

По лугамъ, любить песокъ и известняки. Цвѣтетъ съ начала іюня, весь июль. Протопопово, Клм. у. (Макс.).—Ивановская гора на Нарѣ, Срп. у.; Подольскъ; за Калужской заставой (К.).—Амлево (А.).—Карапчеево, Бѣлые Колодези, Горы, Клм. у.; Лужки, Зброво, устье Лонасни, Срп. у. (Мил.).—Дубровицы, Пдл. у.; Дракино, Бѣлосесокская слобода, Срп. у. (X.).—Лонасня, Курниково, Срп. у. (П.).—Серебряный боръ близъ Хорошова; Клычево, Клм. у.; Софьино, Брн. у. (П.).—Покровское-Фили по берегу Москвы р. (Гей.).—С. Съверское, Клм. у. (Куль.).—Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

206. *Rúbus* L.

Пять лепестковъ и много тычинокъ прикрѣплены къ краю цвѣто-
ложка; чашечка 5-листная, безъ подчашія; пестиковъ много, на кониче-
скомъ цвѣтоложѣ; сѣмепочекъ по 2 висѣющихъ; столбики нитевидные, бо-
ковые; плодъ состоитъ изъ сочныхъ костянокъ, образующихъ ложную,
сочную ягоду, которая легко отдѣляется отъ позреватаго плодоложа.

1. Стебли травянистые, съ ползучимъ деревянистымъ корневи-
щемъ. 2.

Полукустарники съ деревянистыми стеблями. 4.

2. Цвѣты малиновые. *R. arcticus* L.

Цвѣты бѣлые. 3.

3. Цвѣтокъ одинъ верхушечный; листья сердцевидно-почковидные,
5-лопастные; растеніе двудомное. *R. chamaemorus* L.

Цвѣты (3—6) щиткомъ; листья тройчатые; растеніе обоимолое.

R. saxatilis L.

4. Стебли безъ шиповъ; цвѣты очень крупныя, ярко-малиновыя.

R. odoratus L.

Стебли съ шипами; цвѣты не крупныя, бѣлыя, рѣже блѣдно-розо-
выя. 5.

5. Цвѣтоножки безъ стебельчатыхъ железокъ. 6.

Цвѣтоножки съ стебельчатыми железами. *R. caesius* L.

6. Листья съ нижней стороны голыя или по жилкамъ очень слабо-
опушенные; отпрыски безъ сизаго налета.

R. suberectus Anders.

Листья съ нижней стороны бѣло-войлочные или покрыты густымъ
сѣрымъ пушкомъ; отпрыски съ сизымъ налетомъ. 7.

7. Листья съ нижней стороны покрыты тонкимъ бѣлымъ войлокомъ;
отпрыски прямостоящіе. *R. idaeus* L.

Листья съ нижней стороны покрыты сѣрымъ пушкомъ; отпрыски
длинные, ползучіе. *R. caesio* \times *idaeus* G. F. W. Mey.

516. *R. chamaémorus* L.

Rubus Chamaemorus L. Пет. Кр. I, стр. 142.—Пет., стр. 261.—Кауф. II, № 249.—
Цин., № 487.—Рупр., стр. 89.—Кауф. I, стр. 154.—
Lind., p. 110.—Ann., C. IV, № 12.—Дв., № 538.—
Макс., № 487.

Корень ползучій, почти деревянистый; стебель 8—20 см., прямосто-
ящій, не вѣтвистый, бороздчатый, въ верхней части пушистый; нижняя
часть стебля съ 2—3 яйцевидными, стеблеобъемлющими чешуйками; ли-
стья (2—3) на длинныхъ черешкахъ, почковидно-сердцевидные, 5-лопаст-
ные, по краямъ неравно-зубчатые; прицвѣтники маленькіе, яйцевидно-
округлые, цѣлюнокрайніе или зубчатые; цвѣтокъ одинъ верхушечный,
однополый (растеніе двудомное); лепестки бѣлые, до 10 мм., иногда съ ро-
зовымъ оттѣнкомъ; чашелистики тупые или коротко-заостренные, иногда

даже ланцетные; плодъ красноватый, зрѣлый—желтоватый, изъ небольшого числа костянокъ.

По большимъ торфянымъ болотамъ. Цвѣтетъ съ начала іюня; плоды съ начала іюля. Въ Кн. у. (Дв.. А.).—За Сенежскимъ озеромъ на самой южной границѣ Кн. у. (Нав.).—Захарово; за Сенежскимъ озеромъ близъ дер. Загорье и Осиповой, Кн. у. (П.).



Rubus chamaemorus.



Rubus arcticus.

517. *R. arcticus* L.

Корневище тонкое, вѣтвистое, почти деревянистое; стебли до 30 см., слегка бороздчатые, безъ шиповъ, покрыты, какъ и все растеніе, короткими и рѣдкими волосками; листья на черешкахъ, тройчатые, рѣже пяти-терные; листочки яйцевидно-ромбическіе, по краямъ неравно- и двояко-зубчатые, конечный листокъ на черешкѣ болѣе длинномъ, чѣмъ у боковыхъ; прилистники у нижнихъ листьевъ овальные, у верхнихъ — продолговатые; цвѣты одиночные, пазушные; лепестки до 10 мм., малиновые, длиннѣе чашечки; чашелистики ланцетные, заостренные; плоды черновато-пурпуровые, очень ароматичные.

По большимъ торфянымъ болотамъ. За Б. Мытищами между Лосинымъ Островомъ и Удѣльнымъ лѣсомъ, наблюдалось нѣсколько лѣтъ (С.). Цвѣтетъ съ половины мая до конца іюня; плодовъ почти не приносятъ: найдена была только одна ягода въ концѣ іюня. — Между Кузнецовымъ и Раменемъ, Дмит. у., въ цвѣту 4 іюня (П. Кречетовичъ).

* *R. odorátus* L. Пет. Кр. I, стр. 143. — Пет., стр. 261. — Кауф. II, стр. 152. — Цвѣт., стр. 167. — Pal., № 1046.

Стебли безъ шиповъ, до 2 м. въ первый годъ простые, во второй годъ вѣтвистые, молодые покрыты, какъ черешки, цвѣтоножки и чашечки, пурпуровыми, железистыми волосками; листья на длинныхъ черешкахъ, яйцевидно-3—5-лопастные, съ сердцевиднымъ основаніемъ, по краямъ двояко-пильчатые; лопасти заостренные, средняя крупнѣе остальныхъ;

прилистники маленькіе, ланцетные, почти свободные; цвѣты крупныя, до 40 мм., ярко-малиновыя: лепестки округлыя, длиннѣе чашечки; тычинки съ красными нитями и желтыми пыльниками; плодъ красный.

Разводится по садамъ. Цвѣтеть съ половины іюля весь августъ.



Rubus edoratus.



Rubus saxatilis.

518. *R. saxatilis* L. Бух. II, № 139.—Бух. I, № 134.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 261.—Кауф. II, № 248.—Цин., № 484.—Кауф. I, стр. 154.—Lind., p. 110.—Дв., № 537.—Макс., № 486.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 88.—Hoff., № 2723.—St. II, p. 30.—St. I, № 336.—Pal., № 1047.

Корневище горизонтальное; плодущіе стебли прямостоящіе, до 30 см. безплодные—лежачіе, до 1,5 м., осенью на концѣ укореняющіеся; черенки и стебли покрыты отстоящими волосками и очень рѣдкими, тонкими шипиками; листья тройчатые; листочки яйцевидно-ромбическіе, острые и неравно-остро-зубчатые; прилистники у нижнихъ листьевъ эллиптическіе, у верхнихъ—ланцетные; кисть цвѣтовъ верхушечная, щитковидная, о 3—6 цвѣткахъ, на короткихъ цвѣтоножкахъ; лепестки бѣлыя, до 7 мм., равны чашечкѣ или нѣсколько ее превышаютъ; чашелистики треугольно-ланцетные, заостренные, у плодовъ внизъ отогнутые; плодъ красный, изъ немногихъ (1—6) крупныхъ костянокъ.

По лѣсамъ, очень часто. Цвѣтеть съ половины мая до половины іюня; плоды съ половины іюля.

519. *R. idaeus* L. Бух. II, № 137.—Бух. I, № 132.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 262.—Кауф. II, № 245.—Цин., № 481.—Кауф. I, стр. 153.—Lind., p. 110.—Дв., № 533.—Макс., № 483.—Hoff. II., № 3798.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 87.—Hoff., № 2720.—St. II, p. 30.—St. I, № 333.—Pal., № 1042.

Стебли двулѣтніе, прямостоящіе, до 2 м., цилиндрическіе, не вѣтвистые. въ первый годъ густо усажены тонкими прямыми шипами, на второй годъ вѣтвистые, только въ нижней части съ шипами, въ верхней почти

безъ шиповъ; листья перистые, о 3—5, рѣдко 7 листочкахъ, на черешкѣ, съ нижней стороны усаженномъ рѣдкими шипиками; листочки яйцевидные, заостренные, неравно-остро-зубчатые, съ верхней стороны почти голые, съ нижней — покрыты тонкимъ, бѣлымъ войлокомъ; прилистники линейные, въ нижней части приросшіе къ черешку; цвѣточные кисти малоцвѣтковые, на концѣ стебли и въ пазухахъ верхнихъ листьевъ; лепестки бѣлые, короче чашечки; чашелистики треугольно-ланцетные, заостренные; плодъ малиновый, бархатистый, легко отдѣляется отъ конпческаго плодоложа.

По лѣсамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвѣтеть съ начала іюня; плоды съ начала іюля.



Rubus idaeus.



Rubus caesio x idaeus.

***R. caesio x idaeus* G. F. W. Mey.** Пет. Кр. I, стр. 142.

Отпрыски цилиндрическіе, лежачіе, съ низымъ налетомъ и съ мелкими, б. ч. книзу загнутыми шипами; листья тройчатые, снизу съ частымъ сѣроватымъ пушкомъ, молодые — сѣро-войлочные; конечный листокъ б. ч. 3-лопастной или 3-раздѣльный, боковые — часто 2-лопастные; прилистники линейные; цвѣты въ малоцвѣтковыхъ щиткахъ; цвѣтоножки безъ стебельчатыхъ железокъ; лепестки узкіе, продолговатые; тычиночныя нити прямые, равны столбикамъ, рѣже длиннѣе ихъ. Наша форма совершенно не плодущая.

Въ Университетскомъ Бот. саду, пересажено изъ-подъ Косина; опредѣлялъ Форске.

520. ***R. suberectus* Anders.** Пет. Кр. I, стр. 141.

Rubus fruticosus L. Бух. I, стр. 13. — Пет., стр. 262. — Кауф. II, № 246. — Цун., № 483. — Кауф. I, стр. 153. — Дв., № 536. — Макс., № 484. — Mart., p. 88. — Hoff., № 2719. — St. II, p. 30. — St. I, № 335. — Pal., № 1045.

Rubus fruticosus L. β . *Nessensis* (W. Hall.) Kauffm. Кауф. II, стр. 151. — Кауф. I, стр. 153.

Rubus fruticosus L. β . *corylifolius* Smith. Макс., № 484.

Rubus corylifolius Smith. Дв., № 535.—Макс. Пут. II, стр. 11.—Mart., p. 87.

Rubus nemorosus Hayne. Макс. Пут. II, стр. 11.—Gold. C., p. 20.

Отпрыски прямостоящие и только у верхушки согнуты дугой, безъ сизаго налета; шипы на стебляхъ коническіе, короткіе, б. ч. темно-красныя, въ верхней части стебля и на цвѣтоносныхъ вѣтвяхъ очень рѣдкіе; прицвѣтники и прилистники линейные; листья 3—5-ные, на сильно развитыхъ экземплярахъ 7-ные, верхушечные—чашто простые; листочки съ обѣихъ сторонъ зеленые, яйцевидные, заостренные, двояко-пильчатые, боковые—почти сидячіе, конечный листокъ на черешкѣ; цвѣтоножки короткія, пушистыя, безъ стебельчатыхъ железокъ; цвѣты б. ч. собраны въ не густой щитокъ; лепестки 10—13 мм.; при расцвѣтаніи тычинки превышаютъ столбики; чашелистики при плодахъ отворочены, по краямъ бѣловато-войлочные; зрѣлые плоды малиново-черныя.



Rubus suberectus.

По холмистымъ мѣстамъ, по кустарникамъ и опушкамъ. Цвѣтетъ съ половины іюня и почти весь іюль; плоды съ половины іюля. Воробьевы горы, Царицыно, Свиблдово (Мар.).—Тюфелева роща (К.).—Близъ Протопопова, Кзм. у. (Макс.).—Лосинный Островъ, Косенно: Быково, Раменское, Брн. у. (П.).—По окраинѣ березовой рощи и торфяного болота близъ с. Кудинова—Поганое озеро, Бгр. у. (X.).

521. *R. caésius* L. Пет. Кр. I, стр. 142.—Бух. II, № 138.—Бух. I, № 133.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 262.—Кауф. II, № 247.—Цин., № 482.—Кауф. I, стр. 154.—Lind., p. 110.—Дв., № 534.—Макс., № 485.—Hoff. II., № 3793.—Gold. C., p. 20.—Gold. Sp., p. 126.—Mart., p. 87.—St. II, p. 30.—St. I, № 334.—Pal., № 1044.

Отпрыски длинныя, лежачіе, по осени укореняющіеся цилиндрическіе, голые или слегка опушенные, покрыты сизымъ налетомъ и мелкими, прямыми или слегка книзу загнутыми шипами; листья тройчатые, рѣдко 5-ные; листочки съ нижней стороны пушистыя, по краямъ неравно- или надрѣзочно-зубчатые, иногда лопастные, яйцевидные; конечный листокъ часто ромбическій и на короткомъ черешкѣ, боковые—сидячіе; прилистники ланцетные; соцвѣтіе—не густой щитокъ; цвѣтоножки длинныя, пушистыя, съ стебельчатыми желез-



Rubus caesius.

ками; лепестки до 11 мм., широко-эллиптические; чашечка покрыта сѣрымъ войлокомъ и иногда короткими шипиками; тычинки едва превышаютъ столбики; зрѣлые плоды черные съ низымъ налетомъ.

Въ кустахъ, по холмамъ и по берегамъ рѣкъ. Цвѣтеть съ половины іюня до середины августа; плоды съ половины іюля. Воробьевы горы, Сокольники, Спасское, Ивановское, Братцово; Карапчеево, Клм. у. (К.).—Серебряный боръ близъ Хорошова; д. Роднева—лѣвый берегъ р. Мѣчи, Пдл. у. (Х.).—По берегу р. Пахры, Пдл. у. (Б.).—Близъ Серпухова; Невѣрово, по берегу р. Коломенки между Ильинскимъ и Павловымъ, Клм. у.; Усово на Москвѣ р., Звн. у.; близъ Краснаго Стана, Руз. у. (П.).—Быково, Брн. у. (Куль.).—Дракино, Срп. у.; Раменское, Брн. у. (С.).—Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

207. *Fragária L.*

Цвѣты обоеполые или разнополые, и тогда растеніе двудомное; пять лепестковъ и много тычинокъ прикрѣплены къ краю полусферовиднаго цвѣтоложа; чашечка изъ 5 внутреннихъ крупныхъ и 5 наружныхъ мелкихъ чашелистиковъ; пестиковъ много, съ короткими боковыми, увядающими столбиками; плодоложе голое, по отцвѣтаніи разрастается въ сочную, вѣжную ягоду, отдѣляющуюся отъ чашечки; сѣмечки въ углубленіяхъ цвѣтоложа.

1. Волоски на цвѣтоножкахъ горизонтально-отстоящіе.

F. moschata Duchesne.

Волоски на цвѣтоножкахъ прижатые или слегка отстоящіе. 2.

2. Листья съ обѣихъ сторонъ съ шелковистыми волосками; средній на короткомъ черешкѣ; чашелистики прижаты къ плоду.

F. viridis Duchesne.

Листья только снизу съ шелковистыми волосками, всѣ листочки сидячіе; чашелистики отогнуты отъ плода. *F. vesca* L.

522. *F. vesca* L. Бух. II, № 142.—Бух. I, № 148.—Ф. О., № 6, p. 86.—Пет., стр. 189.—Кауф. II, № 250.—Цин., № 478.—Кауф. I, стр. 155.—Lind., p. 110.—Дв., № 539.—Макс., № 477.—Ной. Н., № 3806.—Gold. C., p. 20.—St. II, p. 30.—St. I, № 337.—Pal., № 1048.

Fragaria vesca L. silvestris. Mart., p. 88.

Корневище бурое, толстое, съ длинными, нитевидными, укореняющимся побѣгами; листья тройчатые, корневые на длинныхъ черешкахъ, покрыты отстоящими волосками; листочки сидячіе, овально-ромбическіе, крупно-зубчатые, сверху съ рѣдкими волосками, снизу—съ шелковистыми густыми волосками; прилистники ланцетные; цвѣточные стебли 10—20 см., обыкновенно безлистные или съ однимъ мало развитымъ листомъ у перваго развѣтвленія, превышаютъ корневые листья; цвѣтоножки съ прижатыми волосками; цвѣты бѣлые; лепестки до 6 мм.; чашелистики острые, при плодахъ отогнутые; тычинки короче пестиковъ; плоды обыкновенно коническіе, до основанія покрыты сѣянками.

По лѣсамъ и кустарникамъ, рѣже по лугамъ, очень часто. Цвѣтеть съ половины мая до іюля; плоды съ начала іюня.

a. crenáta Schur.

Лепестки по наружному краю б. или м. крупно-городковые. Близъ д. Родневой, Пдл. у., и по дорогѣ отъ ст. Пески М.-Каз. ж. д. къ д. Черкизово, Кзм. у. (X.).—Мытищи (С.).



Fragaria vesca.



Fragaria moschata.

523. *F. moscháta* Duchesne.

Fragaria elatior Ehrh. Бух. II, № 141.—Бух. I, № 147.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 189.—Кауф. II, № 251.—Цин., № 479.—Кауф. I, стр. 155.—Lind., p. 110.—Ann. C. IV, № 11.—Дв., № 541.—Макс., № 479.—Mart., p. 83.—Hoff., № 1382.

Корневище толстое, бурое, съ побѣгами; листья до 20 см., тройчатые, на длинныхъ черешкахъ; листочки на короткихъ черешкахъ, яйцевидно-ромбическіе, крупно-зубчатые, съ нижней стороны шелковистые; черешки листьевъ и цвѣтоносы покрыты довольно густыми, отстоящими или внизъ отогнутыми волосами; прилистники ланцетные, бурые; цвѣточные стебли 15—30 см., многоцвѣтковые, превышаютъ листья; цвѣты то обоеполые, то однополые; въ обоеполыхъ цвѣтахъ тычинки равны пестикамъ, въ однополыхъ — тычинки вдвое длиннѣ пестиковъ; лепестки 6—12 мм.¹⁾; чашелистики у плодовъ растопыренные или отогнутые; плодъ яйцевидный, очень ароматичный.

По лѣсамъ и кустарникамъ. Цвѣтеть съ половины мая до іюля; плоды съ іюля. Иваньково, Никольское, Соколянки, Братово. Подольскъ (К.).—Шипшино близъ Михайловскаго, Пдл. у. (Б.).—Мытищи — Удѣльный лѣсъ (С.).—Воробьевы горы; берегъ р. Коломенки противъ Павлѣева. Кзм. у.; близъ Серпухова (П.).—Рождествено на Нарв. Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

¹⁾ А. А. Хорошковъ нашелъ близъ Подольска съ лепестками до 14 мм.

524. *F. viridis* Duchesne.

Fragaria collina Ehrh. Бух. II, № 140.—Бух. I, № 146.—Ф. О., № 6, p. 86.—Пет., стр. 189.—Кауф. II, № 252.—Цин., № 165.—Кауф. I, стр. 155.—Lind., p. 110.—Дв., № 540—Макс., № 478.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 88.

Корневище толстое, бурое, съ длинными, укореняющимися побѣгами; черешки листьевъ и нижняя часть стеблей покрыты густыми, отстоящими волосками; цвѣтоножки покрыты прижатыми волосками; листочки яйцевидные, крупно-зубчатые, сверху темно-зеленые, покрыты не густыми,

*Fragaria viridis*

шелковистыми волосками, снизу густо-шелковисто-волосистые, средній листокъ къ основанію клиновидный и на короткомъ черешкѣ, боковые—спячіе; цвѣточные стебли 5—16 см., равны листьямъ или нѣсколько превышаютъ ихъ; лепестки 7—10 мм.; чашечка по отцвѣтаніи своими 5 внутренними долями прижимается къ плоду, наружныя—отгибаются; плодъ шаровидно-яйцевидный, розовый и въ нижней своей части безъ сѣмянокъ.

По открытымъ мѣстамъ, лугамъ и холмамъ. Цвѣтетъ съ половины мая до середины іюня; плоды съ конца іюня. Царицыно, по дорогѣ изъ Ивань-

кова въ Братцово, Никольское, Раменки; Ильинское и Воскресенскъ. Звн. у. (К.).—Близъ платформы Суково, Брянск. ж. д. (Х.).—Серебряный боръ близъ Хорошова, Симоновъ монастырь (П.).—Близъ Михайловскаго, Пдл. у. (Б.).—Близъ с. Озеры, Бѣлые Колодези, Кдм. у. (П. и С.).—Рожествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

208. *Comarum* L.

Лепестковъ 5, заостренныхъ, остающихся при плодѣ; чашечка изъ 5 внутреннихъ большихъ и 5 наружныхъ маленькихъ чашелистиковъ; пестиковъ много, съ короткими, почти верхушечными столбиками; плодоложе выпуклое, волосистое, подъ конецъ разрастается и становится губчато-мясистымъ.

525. *C. palustre* L. Пет. Кр. I, стр. 143.—Бух. II, № 143.—Бух. I, № 135.—Ф. О., № 6, p. 86.—Пет., стр. 169.—Кауф. II, № 253.—Цин., № 477.—Кауф. I, стр. 156.—Lind., p. 108.—Дв., № 555.—Макс., № 466.—Hoff. II., № 3876.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 91.—St. II, p. 30.—St. I, № 348.—Pal., № 1072.

Potentilla Comarum Nestl. Макс., № 446.—Hoff. II., № 3876.

Корневище ползучее, почти деревянистое; стебель до 1 м., у основанія лежачій, укореняющійся, потомъ приподнимающійся и прямостоя-

ний. голый, вверху волосистый; листья очередные, на черешкахъ, непарно-перистые, о 3—7 листочкахъ; послѣдніе на очень короткихъ черешкахъ, продолговато-ланцетные, острые, у основанія клиновидные, по краямъ крупно-зубчатые, сверху темно-зеленые, снизу сине-зеленые, войлочные; прилистники большіе, приросшіе къ черешку листа; цвѣты по 2—5 на концѣ стебля; плоская чашечка съ внутренней стороны красно-бурая, голая, снаружи зеленая, пушистая, доли ея заостренныя; лепестки 3—5 мм., въ 3 раза короче чашечки, ланцетовидные, заостренные, темно-малиновые, какъ тычинки и пестики; плодъ мясистый, покрытъ пушкомъ; сѣмена голыя.

По болотамъ, очень часто. Цвѣтеть съ начала іюня до половины іюля; плоды съ середины іюля.



Comarum palustre

209. *Potentilla* L.

Лепестковъ 5 или 4, обратно-яйцевидныхъ, опадающихъ; чашечка изъ 5—4 внутреннихъ большихъ и 5—4 наружныхъ маленькихъ чашелистиковъ; тычинокъ и пестиковъ много, послѣдніе съ боковыми, опадающими столбиками; плодоложе выпуклое, волосистое, сухое, не отдѣляется отъ чашечки, не разрастается или разрастается мало; плодъ сухой, состоитъ изъ сѣмянокъ.

1. Завязи и сѣмянки густо окутаны длинными волосками. 2. Завязи и сѣмянки голыя, не окутаны волосками. 3.
2. Кустарникъ; цвѣты желтые. *P. fruticosa* L.
Травянистое растеніе; цвѣты бѣлые. *P. alba* L.
3. Листья перистые. 4. Листья пальчатые. 6.
4. Растеніе съ длинными, укореняющимися побѣгами; цвѣты крупныя; лепестки длиннѣе чашечки. *P. anserina* L.
Растеніе безъ длинныхъ, укореняющихся побѣговъ; цвѣты мелкіе; лепестки равны чашечкѣ или короче ея. 5.
5. Растеніе покрыто довольно длинными щетинистыми, отстоящими волосками, листья о 5 листочкахъ. *P. norvegica* L. *a. varians* Moench.
Растеніе хотя и пушистое, но безъ щетинистыхъ волосковъ; листья о 7—10 листочкахъ. *P. supina* L.
6. Цвѣты одиночныя, пазушныя. 7. Цвѣты въ верхушечномъ полузонтикѣ или щиткѣ. 8.
7. Листья на длинныхъ черешкахъ, б. ч. 5-ные, съ короткими, простыми прилистниками; растеніе съ ползучимъ, укореняющимся стеблемъ съ побѣгами. *P. reptans* L.

Листья сидячіе или на едва замѣтныхъ черешкахъ, б. ч. 3-тые.. съ крупными зубчатыми прилистниками; растеніе съ прямо-стоящимъ стеблемъ, иногда съ лежачимъ, но не укореняющимся и безъ побѣговъ. *P. silvestris* Neck.

8. Вѣнчикъ короче чашечки; листья только стеблевые, тройчатые. *P. norvegica* L.

Вѣнчикъ равенъ чашечкѣ или длиннѣе ея; корневые листья, если они есть, всегда 5—7-ные; нижніе стеблевые тоже 5—7-ные. 9..

9. Стебель и черешки листьевъ покрыты длинными, прямыми, отстоящими волосками. 10.

Стебель и черешки листьевъ покрыты войлокомъ и курчавыми волосками, рѣже голые. 14.

10. Нижняя сторона листьевъ покрыта полупучковатыми (звѣздчатыми) волосками. *P. okensis* Petunikov.

Листья безъ полупучковатыхъ волосковъ, съ одними простыми. 11.

11. Цвѣточный стебель прямой, во время цвѣтенія безъ пучка корневыхъ листьевъ. *P. recta* L.

Цвѣточные стебли прямостоячіе, съ основаніемъ б. ч. восходящимъ, приподнимающіеся или лежачіе, всегда съ пучкомъ корневыхъ листьевъ. 12.

12. Все растеніе не высокое; стебли о немногихъ листьяхъ, изъ которыхъ только 1—2 нижнихъ 7—5-ные, остальные 3-тые или простые; плодоножки отогнутыя; плодовая головка шаровидная, охваченная шаровидно-смыкающимся долями чашечки.

P. rubens Zimm.

Растеніе б. или м. высокое; стебель о многихъ листьяхъ, внизу 5-ныхъ, вверху 3-тыхъ; цвѣты крупные; плодоножки прямо-торчащія; плодовая головка коническая, облечена въ плодовую чашечку такой же формы. 13.

13. Верхушечные листья почти супротивные; листочки у нижнихъ листьевъ обратно-яйцевидные, съ сильно расширенной верхушкой; все растеніе свѣтло-зеленое. *P. Nestleriana* Tratt.

Верхушечные листья очередные; листочки у нижнихъ листьевъ продолговатые или слегка яйцевидные.

P. thuringiaca Bernh.

14. Цвѣточный стебель прямой, во время цвѣтенія безъ пучка корневыхъ листьевъ у основанія. 15.

Цвѣточный стебель у основанія восходящій, приподнимающійся или лежачій, съ пучкомъ корневыхъ листьевъ. 19.

15. Листья съ нижней стороны блѣдно-зеленые, голые или покрыты волосками, но не войлокомъ. *P. intermedia* L.

Листья съ нижней стороны или съ обѣихъ сторонъ б. или м. густо покрыты бѣлымъ или сѣрымъ войлокомъ. 16.

16. Поверхность листа б. или м. густо покрыта полупучковатыми (звѣздчатыми) волосками, видными только въ луну.

P. argentea \times *thyrsiflora*.

Поверхность листа безъ полупучковатыхъ волосковъ. 17.

17. Листья съ нижней стороны покрыты густымъ, бѣлымъ войлокомъ.

P. argentea L.

Листья съ нижней стороны б. или м. густо покрыты тонкимъ сѣрымъ войлокомъ и вдоль жилокъ съ прижатыми, длинными, прямыми волосками. 18.

18. Листочки, особенно на нижнихъ листьяхъ, обратно-йцевидные, съ клиновиднымъ основаніемъ и сильно расширенной верхушкой, съ немногими широкими зубцами по краямъ.

P. intermedia L. γ . *canescens* Rupr.

Листочки на нижнихъ листьяхъ ланцетные или йцевидно-ланцетные, со многими узкими зубцами. *P. canescens* Bess.

19. Верхняя сторона листьевъ покрыта пучковатыми (звѣздчатыми) волосками съ 8—12 боковыми щетинками.

P. arenaria Boreckh.

Верхняя сторона листьевъ покрыта полупучковатыми волосками съ 2—5 боковыми щетинками. 20.

20. Листочки продолговатые, по краямъ гребенчато-зубчатые, съ 6—8 зубцами съ каждой стороны.

P. argenteiformis Kauffm.

Листочки обратно-йцевидные, съ расширенной верхушкой и съ 3—6 зубцами съ каждой стороны. 21.

21. Стебли прямостоящіе или приподнимающіеся только у основанія; розетки и пучки корневыхъ листьевъ б. ч. только до начала цвѣтенія; зубцы на листьяхъ б. ч. туповатые.

P. argentea \times *thyrsiflora*.

Стебли лежащіе, или почти лежащіе, приподнимающіеся только цвѣтущей верхушкой; розетки и пучки корневыхъ листьевъ остаются до осени; зубцы на листьяхъ острые. 22.

22. Верхняя сторона листьевъ темно-зеленая или сѣро-зеленая отъ пучковатыхъ волосковъ; корневые листья много крупнѣе нижнихъ стеблевыхъ.

P. arenaria \times *thyrsiflora*.

Верхняя сторона листьевъ свѣтло-зеленая; корневые листья почти такой же величины, какъ нижніе стеблевые.

P. thyrsiflora Hülsen.

* *P. fruticósa* L. Пет. Кр. I, стр. 158.—Пет., стр. 249.—Кауф. II, стр. 161.—Цин., № 453.—Pal., № 1049.

Кустарники до 1 м., съ красновато-бурой корой; листья 5 или 7 листочкахъ, перистые; листочки ланцетные, конечный—трехраздѣльный, съ низбѣгающими боковыми долями, боковые—простые или иногда двураздѣльные; нижняя сторона листьевъ, молодые вѣтви и чашечка покрыты

бѣлыми, шелковистыми волосками; прилистники ланцетные, заостренные перепончатые, стеблеобъемлющие; цвѣты одиночные или въ малоцвѣтковыхъ полузонтикахъ, б. ч. конечные, желтые; лепестки округло-обратно-яйцевидные, до 14 мм., длиннѣе чашечки; наружные чашелистики продолговатые, равны яйцевиднымъ, заостреннымъ внутреннимъ или вдвое длиннѣе ихъ; сѣмянки у основанія волосистыя.

Разводится по садамъ.



Potentilla fruticosa.



Potentilla alba.

526. *P. álba* L. Пет. Кр. I, стр. 158. — Бух. II, стр. 19. — Пет., стр. 251. — Кауф. II, № 254. — Мил., № 11. — Гор., № 29. — Пал., № 1061.

Корневище толстое, черно-бурое, вѣтвистое; все растеніе 8—20 см., покрыто, кромѣ верхней стороны взрослыхъ листьевъ, прижатыми, довольно длинными серебристыми волосками; всѣ лпсты корневыя на длинныхъ черешкахъ, о 5 листочкахъ, продолговато-ланцетныхъ или эллиптическихъ, только спереди съ нѣсколькими направленными впередъ зубцами и по краямъ съ длинными, прижатыми волосками; прилистники яйцевидные, заостренные; цвѣточныя стебли тонкіе, короче листьевъ, оканчиваются 3—5 бѣлыми цвѣтами; лепестки обратно-яйцевидные, 7—8 мм.; чашелистики яйцевидно-ланцетные, заостренные, наружныя ланцетовидно-линейныя; цвѣтоножки покрыты волосками; сѣмянки у основанія съ волосками.

Цвѣтетъ съ начала мая и въ іюнь. Между Прилуками и устьемъ Лопасни по срубленному лѣсу, Срп. у.; по опушкѣ сосноваго лѣса близъ с. Озеры, Кѣл. у. (Экс. Бот. Лаб.). — Подъ Москвой близъ Новаго Коптева, теперь тамъ исчезла; въ лѣсу за р. Десной близъ Дубровицъ, Пдл. у., и между Подольскомъ и Даниловымъ (Г.). — С. Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

527. *P. canéscens* Bess.

Стебель 20—40 см., прямостоящій или основаніемъ приподнимающійся, покрытъ отстоящими, курчавыми волосками или войлокомъ;

листья 5-ные, рѣже 7-ные, съ ланцетными или яйцевидно-ланцетными прилистниками, цѣлюкрайными или только съ однимъ зубцомъ; листочки у всѣхъ листьевъ продолговато-ланцетные, надрѣзано-пильчатые, по краямъ рѣсничатые, съ верхней стороны покрыты тонкими, прижатыми волосками, съ нижней—б. или м. густо сѣрымъ войлокомъ и разбѣянными, отстоящими волосками, вдоль жлокъ прижатыми; зубцы на листочкахъ линейные или яйцевидно-линейные; цвѣтоножки густо сѣро-войлочные; цвѣты въ полусонтикахъ; наружные чашелистики продолговато-линейные, равны яйцевиднымъ, заостреннымъ внутреннимъ, всѣ густо покрыты сѣрымъ войлокомъ; лепестки золотисто-желтые, часто равны чашечкѣ; сѣмянки съ слабымъ килемъ.



Potentilla canescens

Найдено А. Н. Петунниковымъ только одинъ разъ въ одномъ экземплярѣ во Владычномъ монастырѣ близъ Серпухова, въ цвѣту 2 июля; опредѣлить Th. Wolf.

528. *P. argentea* L. Пет. Кр. I, стр. 150.—Бух. II, № 146.—Бух. I, № 138.—F. O., № 6, p. 86.—Иет., стр. 251.—Кауф. II, № 263.—Цин., № 475.—Pinz., p. № 12.—Кауф. I, стр. 160.—Lind. p. 108.—Ann. C. II, № 121.—Дв., № 545.—Макс., № 470.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 89.—Hoff., № 2571.—St. II, p. 30.—St. I, № 340.—Pal., № 1057.

Корневище деревянистое, обыкновенно съ нѣсколькими приподнимающимися, рѣже прямостоящими стеблями въ 20—50 см., покрытыми бѣлымъ войлокомъ и съ одной стороны б. ч. красноватыми; листья 5-ные, на длинныхъ черешкахъ; верхніе—почти сидячіе и б. ч. 3-тые; корневой розетки или пучковъ листьевъ во время цвѣтенія нѣтъ; листочки обратно-яйцевидные, продолговатые, къ основанію клиновидные, по краямъ крупно-зубчатые или иногда глубоко надрѣзано-зубчатые, съ верхней стороны голые, темно-зеленые, рѣже покрыты сѣрымъ войлокомъ, съ нижней—покрыты густымъ, бѣлымъ войлокомъ; у верхнихъ листьевъ листочки продолговато-линейные; прилистники яйцевидные или ланцетные, цѣлюкрайные или съ одного края слегка зубчатые, съ нижней стороны бѣло-войлочные; цвѣтоножки по отцвѣтаніи прямо-торчащія; цвѣты блѣдно-желтые; лепестки до 4 мм., равны чашечкѣ или немного длиннѣе ея, слабо выемчатые; сѣмянки слегка морщинистыя, безъ кия.



Potentilla argentea.

По бесплоднымъ мѣстамъ, дорогамъ и паровымъ полямъ, очень часто. Цвѣтетъ съ іюня до осени; плоды съ половины іюня.

α. typica Beck. Бух. II, № 146 *α.*—Бух. I, № 138 *α.*

Листья съ верхней стороны голые, темно-зеленые; листочки по краямъ крупно-зубчатые. Очень часто.

β. decumbens Jord.

Листочки очень широкіе, быстро клиновидно-суженные, въ верхней половинѣ съ 2 крупными, туповатыми зубцами съ каждой стороны.



Potentilla argentea β. decumbens.



Potentilla argentea γ. tenuiloba.

сверху темно-зеленые, почти голые, снизу бѣло-войлочные. Воробьевы горы; Лужки, Срп. у. (II.).

γ. tenuiloba Jord.

Potentilla argentea L. var. *perincisa* Borbas. Пет. Кр. I, стр. 151.

Листья съ верхней стороны голые, темно-зеленые или покрыты короткими, прижатыми волосками; листочки глубоко-надрѣзные; зубцы линейно-ланцетные, часто почти линейные; средній листокъ иногда до основанія 3-лопастной и лопасти глубоко-надрѣзная, отчего листъ кажется семернымъ (*P. septemsecta* Zimm.). Рупосово, Мос. у. (С.).—Между Косинымъ и Вешнякамъ; Дарьяно, Звн. у. (Х.).—Быково, Бр. у. (Куль.).

δ. incanescens Opiz. Пет. Кр. I, стр. 151.—Бух. II, № 146 *β.*—Бух. I, № 138 *β.*—*Г. О.*, № 6, р. 86.—Кауф. II, стр. 160.—Кауф. I, стр. 160.

Листья съ верхней стороны сѣро-войлочные; листочки какъ у *α. typica* Beck. Мытщи (С.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).

ε. dissécta Wallr. Пет. Кр. I, стр. 161.

Листья съ верхней стороны сѣро-войлочные; листочки какъ у *γ. tenuiloba* Jord. Рупосово, Мос. у. (С.).—Быково, Брн. у. (Куль.).

P. argentea × *thyrsiflora*.

Potentilla collina Wibel. Пет., стр. 251.—Мил., № 12.

Корневище деревянистое, бурое; стебли 20—40 см., прямостоящіе или у основанія приподнимающіеся, часто съ одной стороны красноватые, покрыты бѣлымъ, б. или м. густымъ войлокомъ; розетки или пучки корневыхъ листьевъ бываютъ только до начала цвѣтенія, потомъ б. ч. пропадаютъ; листья 5-ные; листочки по своей формѣ очень разнообразны: то приближаются къ *P. argentea* L., то къ *P. thyrsiflora* Hülsen, а также

цвѣтъ верхней стороны ихъ; опушение какъ у *P. thyrsiflora* Hülsen, т.-е. съ полупучковатыми волосками; зубцы б. ч. бываютъ туповатые, съ дугообразно-выпуклыми краями; цвѣты въ конечномъ, довольно рѣдкомъ полузонтикѣ; цвѣтоножки по отцвѣтаніи б. ч. загibaются книзу; лепестки 4—5 мм.; наружные чашелистики овальные, заостренные, немного короче треугольныхъ внутреннихъ.

По песчанымъ холмамъ и известнякамъ. Цвѣтетъ съ половины мая, весь июнь и половину июля; плоды съ августа. Серпуховъ, Лужки, Зиброво, Пикифорово, Прилуки, Срп. у.; Вѣлье Колодези, Кзм. у. (П. и С.).



Potentilla argentea × *thyrsiflora*.



Potentilla thyrsiflora.

529. *P. thyrsiflora* Hülsen. Пет. Кр. I, стр. 155.

Корневище деревянистое, съ нѣсколькими почти лежащими, приподнимающимися стеблями въ 20—40 см., часто вѣтвистыми съ самаго основанія, иногда съ одной стороны красноватыми, покрытыми, какъ и цвѣтоножками, бѣлымъ войлокомъ; цвѣты въ очень раскидномъ полузонтикѣ, нижнія боковыя вѣтви очень длинныя; розетки или пучки корневыхъ листьевъ остаются до осени; листья 5-ные, иногда попадаютъ 6—7-ные, на длинныхъ черешкахъ, верхніе почти сидячіе, часто 3-тые; листочки корневыхъ и нижнихъ стеблевыхъ листьевъ широко-обратно-яйцевидные, съ клиновиднымъ основаниемъ и сильно расширенной верхушкой, по краямъ съ 3—6 зубцами съ каждой стороны; длина зубцовъ немного превышаетъ ширину его основанія; верхняя сторона листьевъ свѣтло-зеленая, почти голая или покрыта б. или м. частыми, полупучковатыми (звѣздчатыми) волосками, съ нижней стороны свѣтло сѣро-войлочные, покрыты менѣе густымъ войлокомъ, чѣмъ у *P. argentea* L.; прилистники ланцетные; цвѣты на длинныхъ, тонкихъ цвѣтоножкахъ, по отцвѣтаніи торчащихъ или отогнутыхъ книзу; лепестки свѣтло-желтые, 4—5 мм., длиннѣе чашечки; наружные чашелистики ланцетные, немного короче внутреннихъ треугольныхъ; сѣмянки голыя, слегка морщинистыя.

По открытымъ песчанымъ холмамъ. Цвѣтеть съ половины мая, весь июнь. Близъ Серпухова, близъ ст. Ока, Лужки, Зиброво, Никифорово, Прилуки, Срп. у. (П. и С.).

***P. arenaria* × *thrysiflora*.**

Корневище деревянистое, бурое; стебли 20—30 см., лежаціе, иногда приподнимающіеся, б. ч. сѣро-войлочные; розетки и пучки корневыхъ листьевъ остаются и къ осени разрастаются; корневые листья много круп-



Potentilla arenaria × *thrysiflora*.

нѣ нижнихъ стеблевыхъ; листья на длинныхъ черешкахъ, 5-ные, верхніе—почти сидячіе, 3-тые; листочки обратно-яйцевидные, книзу клиновидные, у верхушки сильно расширенныя и только въ верхней половинѣ зубчатые, по 3—6 зубцовъ съ каждой стороны; нижняя сторона листьевъ сѣро- или бѣловато-войлочная, верхняя — темно- или сѣро-зеленая, съ полупучковатыми волосками; цвѣты въ конечномъ, раскидистомъ полузонтикѣ;

лепестки 5—6 мм.; наружные чашелистики ланцетные, почти равны внутреннимъ треугольнымъ.

По песчанымъ холмамъ. Цвѣтеть съ половины мая почти до осени. Серпуховъ, Лужки, Зиброво, Никифорово, Прилуки, Срп. у. (П. и С.).

530. *P. argenteiformis* Kauffm.

Potentilla argenteaeformis Kauffm. Пет. Кр. I, стр. 153.—Кауф. II, № 262.—Мил., № 12.—Гор. № 13.—Цип. № 474.—Рупр., стр. 86.—Кауф. I, стр. 159.

Potentilla collina Wibel. Гор., № 13.



Potentilla argenteiformis.

Корневище деревянистое съ буровато-черными чешуйками; стебель 20—40 см., лежацій или приподнимающійся, у основанія почти деревянистый, покрытъ, какъ и цвѣтоножки, тонкимъ, сѣроватымъ войлокомъ; листья 5-ные, рѣже 6—7-ные, нижніе—на длинныхъ черешкахъ, верхніе—почти сидячіе, тройчатые; листочки продолговато-овальные, къ основанію клиновидные, сверху темно-зеленые, съ рѣдкими волосками простыми и полупучковатыми (звѣздчатыми), снизу сѣровато-войлочные, по краямъ зубчатые съ 6—8 туповатыми или заостренными зубцами съ каждой стороны; длина зубца

короче ширины его основанія, рѣже равна ей; прилистники овально-ланцетные, длинно-заостренные, съ нижней стороны сѣро-войлочные; цвѣты въ раскидномъ полузонтикѣ; цвѣтоножки постѣ цвѣтенія отогнуты; наружные чашелистики ланцетные, внутренніе — треугольно-овальные; лепестки почти круглые, съ едва замѣтной выемкой, длиннѣ чашечки; цвѣтоложе съ мягкими волосами; сѣмянки голыя, съ поперечными морщинками, безъ замѣтнаго кия.

По песчанымъ холмамъ и по колеямъ лѣсныхъ дорогъ. Цвѣтеть съ половины мая, весь июнь; зрѣлые плоды съ начала іюля. Подъ Серпуховымъ (К.).—Серпуховской городской лѣсъ и подъ Владычнымъ монастыремъ (П.).

531. *P. supina* L. Пет. Кр. I, стр. 156.—Пет., стр. 250.—Кауф. II, № 255.—Гор., № 27.—Цин., № 454.—Кауф. I, стр. 162.—Дв., № 543.—Макс., № 468.—Mart., p. 89.—St. I, № 339.—Pal., № 1055.

Стебель 10—60 см., однолѣтній, б. ч. лежащій или приподнимающійся, сильно вѣтвистый, опушенный, въ верхней части съ разбѣянными железистыми волосами; листья очердные, верхушечные — почти супротивные, непарно-перистые, о 3—5 парахъ, почти сидячіе, нижніе—на черешкахъ; листочки обратно-яйцевидные или продолговатые, съ клиновиднымъ основаніемъ, по краямъ зубчатые или крупно-надрѣзано-зубчатые, сидячіе, верхняя пара низбѣгаетъ по черешку; прилистники яйцевидные, заостренные, цѣльнокрайніе, нижніе—иногда зубчатые, немного приросшіе къ черешку; цвѣты на короткихъ цвѣтоножкахъ въ развилкахъ стебля, супротивные листу, по отцвѣтаніи цвѣтоножка удлинняется и отгибается книзу; лепестки желтые, до 3 м., равны чашечкѣ или короче ея; сѣмянки морщинистыя.



Potentilla supina.

По берегамъ рѣкъ на известковой и песчаной почвѣ, рѣдко. Цвѣтеть съ половины іюня до конца іюля; плоды съ начала іюля. По берегу Москвы р. близъ Угreshи (Т.).—Берегъ Москвы р. близъ Софійнскаго шляза, Брн. у. (П.).—По берегу Москвы р. между Боровскимъ курганомъ и Мячковымъ, Брн. у. (П. и С.).—Близъ Потылихи, кирпичный заводъ (Гей.).

532. *P. norvegica* L. Пет. Кр. I, стр. 148.—Бух. II, № 147.—Бух. I, № 139.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 250.—Кауф. II, № 256.—Цин., № 455.—Кауф. I, стр. 162.—Lind., p. 108.—Макс., № 473.—Hoff. H., № 3841.—Gold. C. p. 20.—Gold. Sp., p. 126.—Mart., p. 90.—St. I, № 344.—Pal., № 1063.

Potentilla Norvegica L. Дв., № 549.

Корень многолѣтній; корневые листья пучкомъ, только по веснѣ или по осени, во время цвѣтенія ихъ не бываетъ; стебли 10—50 см., припод-

нимающіеся или прямостоящіе, вильчато-развѣтвленные, покрыты, какъ и все растеніе, довольно длиннымъ, щетинистымъ, торчащими волосками; листья 3-тые, нижніе—на длинныхъ черешкахъ, верхніе—сидячіе; листочки продолговато-обратно-яйцевидные, по краямъ крупно-зубчатые; прилистники яйцевидные, заостренные, цѣлюкрайніе или иногда зубчатые; цвѣты въ верхушечныхъ развѣтвленіяхъ, одиночные, нижніе—на длинныхъ цветоножкахъ, верхніе—на очень короткихъ; лепестки желтые, 4 мм., слегка обратно-сердцевидные, короче чашечки и не соприкасаются краями; внутренніе чашелистики яйцевидные, заостренные, наружные—ланцетные; сѣмянки слегка морщинистыя, голыя.

По паровымъ полямъ и разрабатываемымъ торфянымъ болотамъ, часто. Цвѣтетъ съ мая до іюля.



Potentilla norvegica.



Potentilla norvegica α. varians.

α. varians Moench (sp.).

Potentilla norvegica L. β. *ruthenica* Willd. Пет. Кр. I, стр. 148. — Кауф. II, стр. 156. — Цип., стр. 158. — Кауф. I, стр. 162.

Potentilla Ruthenica Willd. Дв., № 550. — Макс., № 474. — Gold. Sp., p. 126. — Mart., p. 90.

Листья почти перистые, о 5 листочкахъ или перисто-пальчатые, т.-е. конечный листокъ глубоко 3-раздѣльный, съ боковыми низбѣгающими долями.

На сухихъ разрабатываемыхъ торфяныхъ болотахъ.

533. *P. intermédia* L. Кр. I, стр. 149. — Бух. II, № 149. — Бух. I, № 141. — Пет., стр. 250. — Кауф. II, № 264. — Цип., № 464. — Кауф. I, стр. 161. — Дв. № 546. — Макс., № 475. — Mart., p. 89. — St. II, p. 30. — Pal., № 1058.

Potentilla obscura Mart. Макс., № 475.

Potentilla canescens DC. Макс., № 469.

Potentilla obscura Willd. Gold. C., p. 20. — Gold. Sp., p. 126.

Potentilla hirta L. St. I, № 341.

Корневище многолѣтнее, б. ч. съ пучкомъ корневыхъ листьевъ; стебель 30—50 см., приподнимающійся или прямостоящій, покрытъ курчавыми, прижатыми волосками; корневые листья на длинныхъ черешкахъ, 5-ные, рѣже 3-тые; листочки обратно-ййцевидные, къ основанію клиновидные, крупно-зубчатые, б. ч. покрываютъ одинъ другого краями; стеблевые листья на болѣе короткихъ черешкахъ; верхніе—почти сидячіе, листочки ихъ почти ланцетные; прилистники яйцевидные, заостренные; цвѣты собраны въ конечное, б. ч. густое, вильчато-развѣтвленное соцвѣтіе; цвѣтоножки и чашечки покрыты густыми, курчавыми волосками; лепестки желтые, 5 мм., превышаютъ чашечку, рѣже равны ей; сѣмянки слегка морщинистыя.

Цвѣтетъ съ первыхъ чиселъ іюня до августа; плоды съ половины іюня.



Potentilla intermedia α. *typica*.



Potentilla intermedia β. *composita*.

- α. *typica* Rupr. Пет. Кр. I, стр. 149.—Бух. II, № 149а.—Бух. I, № 141 а.—Кауф. II, стр. 160.—Кауф. I, стр. 161.

Листья тонкіе, мягкіе, съ верхней стороны почти голые, темно-зеленые, съ нижней — покрыты рѣдкимъ пушкомъ, замѣтнымъ только въ луну; стебель приподнимающійся. — По высохшимъ и разрабатываемымъ торфянымъ болотамъ.

- β. *composita* Rupr. Пет. Кр. I, стр. 150.

Осенняя форма съ очень развитымъ соцвѣтіемъ и пучкомъ 5-ныхъ, корневыхъ листьевъ, между которыми попадаются и 3-тые; стеблевые — тоже тройчатые или тройчато-разсѣченные; опушеніе листьевъ какъ у α. *typica* Rupr. Растетъ тамъ же, гдѣ предыдущая разновидность.

- γ. *canescens* Rupr. Пет. Кр. I, стр. 150.—Бух. II, № 149β.—Бух. I, № 141β.—Ф. О., № 6, р. 86.—Кауф. II, стр. 161.—Кауф. I, стр. 161.

Стебель б. ч. прямостоящій, слегка красноватый; листья плотные; листочки снизу съ частымъ войлокомъ, придающимъ исподу тускло-

сѣрый или иногда почти бѣлый цвѣтъ, и вдоль жилокъ съ прижатыми волосками, верхняя сторона опушенная настолько густо, что листь тускло-зеленый, иногда почти сѣрый.

По паровымъ полямъ, мекамъ и дорогамъ, очень часто.



Potentilla intermedia γ. *canescens*.



Potentilla recta.

534. *P. recta* L. Пет. Кр. I, стр. 147. — Пет., стр. 250. — Кауф. II, № 265. — Цин., № 460. — Рупр., стр. 88. — Кауф. I, стр. 161. — Lind., p. 108. — Pal., № 1056.

Potentilla obscura Willd. Др., № 544. — Mart., p. 89.

Potentilla intermedia L. (? *obscura* Mart.). Макс., № 475, одинъ экземпляръ между *P. intermedia* L.

Стебель 20—70 см., прямостоящій, рѣже у основанія нѣсколько приподнимающійся, покрытъ довольно жесткими, длинными, бѣлыми щетинками, выходящими изъ маленькихъ луковокъ, между которыми находятся, особенно въ верхней части стебля, железистые волоски; листь только стеблевые, 5—7-ные, на черешкахъ; листочки продолговаты, по краямъ зубчатые, по 9—15 зубцовъ съ каждой стороны, съ обѣихъ сторонъ пушистые; прилистники ланцетные, иногда по краямъ зубчатые; цвѣты въ конечномъ, сжатомъ полузонтикѣ на вверхъ торчащихъ цвѣтоножкахъ лепестки блѣдно-желтые, 6—10 мм., длиннѣ чашечки; внутренніе чашелистики ланцетные, наружные—нѣсколько уже, но немного длиннѣ внутреннихъ; сѣмянки складчато-морщинистыя, съ узкимъ крылатымъ килемъ.

Находится въ гербаріи Максимовича, за № 475, и въ гербаріи Геннинга изъ Сокольниковъ подъ именемъ *P. ораса*. Въ послѣднее время М. И. Голенкинъ нашелъ въ с. Дракинѣ на Окѣ, Срп. у., на известнякахъ; цвѣтетъ въ іюлѣ и августѣ.

535. *P. thuringiaca* Bernh. Пет. Кр. I, стр. 145. — Кауф. II, № 260. — Кауф. I, стр. 159. — Ann. C. V, № 20.

Potentilla heptaphylla Mill. Пет., стр. 250.

Potentilla Goldbachii Rupr. Цин., № 465.

Potentilla elongata Goldb. Gold. C., p. 20.

Стебли 20—50 см., часто красноватые, восходящие дугой вокруг пучка корневыхъ листьевъ, покрыты, какъ и черешки листьевъ, цвѣтоножки и чашечки, длинными оттопыренными волосками; корневые и нижніе стеблевые листья на длинныхъ черешкахъ, 7-ные или 5-ные, верхніе—почти сидячіе, 3-тые, рѣже 5-ные; листочки продолговатые, по краямъ крупно-зубчатые, о 9—12 зубцахъ, снизу блѣднѣе, съ обѣихъ сторонъ съ прижатыми волосками; цвѣты въ развѣсистыхъ, рѣдкихъ полузонтикахъ на тонкихъ цвѣтоножкахъ; лепестки широко-сердцевидные, оранжево-желтые, 6—8 мм. дл. превышаютъ чашечку; наружные чашелистики ланцетные, внутренніе — треугольные; сѣмянки слегка морщинистыя.



Potentilla thuringiaca var. *elongata*.

По лѣсамъ, кустарникамъ, опушкамъ и лугамъ, часто. Цвѣтетъ съ половины мая весь июнь.

У насъ растетъ только:

α. elongata (Ser.) Th. Wolf (Ser. in DC. Prodr. 1825 pro var. *intermediae* — *P. elongata* Goldb. 1820).

Potentilla thuringiaca Bernh. β. *Goldbachii* Rupr. (sp.). Пет. Кр. I, стр. 146.— Бух. II, № 148.— Бух. I, № 140.— Ф. О., № 6, р. 86.— Кауф. II, стр. 158.— Кауф. I, стр. 160.

Листочки обратно-яйцевидные или продолговато-обратно-яйцевидные. Можно различить двѣ формы:

а) *major* Rupr. Пет. Кр. I, стр. 146.

Стебли вѣтвистые, до 50 см., б. ч. во много разъ превышаютъ корневые листья, рѣже корневые листья доходятъ до трехъ четвертей стебля, это б. ч. у растеній, выросшихъ въ тѣни. Иваново, Никольское, Давыдково, Вессвятское; Варавино, Дмит. у.; по дорогѣ изъ Каширы въ Коломну (К.). — Серебряный боръ близъ Хорошова, В. Мытниц (П.). — Рупосово, Мос. у. (С.). — Близъ Звенигорода (П. и С.). — Дорога изъ Вешняковъ въ Косино; Вязки, Брн. у.; Роднево, Пдл. у. (Х.).

б) *humilior* Rupr. Пет. Кр. I, стр. 146.

Стебли не высокіе, 10—20 см., въ 2—3 раза превышаютъ корневые листья, мало вѣтвистые, съ вверхъ торчащими плодоножками. Серебряный боръ близъ Хорошова; близъ Вѣлаго Колодца у Серпухова (П.). — Вѣлые Колодези, Кзм. у. (П. и С.).

536. *P. Nestleriána* Tratt.

Корновнице толстое, деревянистое, бурое; стебли 30—50 см., у основанія восходящіе, потомъ прямостоящіе, на верхушкѣ мало вѣтвистые, покрыты волосками двоякаго рода: длинными, мягкими, прямыми и болѣе

короткими, курчавыми; корневые листья на длинных черешкахъ, 7—5-ные, стеблевые—на болѣе короткихъ, верхніе—почти супротивные, сидячіе, 3-тые; листочки продолговато-обратно-яйцевидные, по краямъ почти съ самаго основанія глубоко-пильчато-зубчатые, зубцы острые; прилистники яйцевидно-заостренные, у корневыхъ листьевъ ланцетные; цвѣты желтые; лепестки до 7 мм.; наружные чашелистики ланцетные, равны треугольнымъ внутреннимъ; сѣмянки слегка морщинистыя; все растеніе свѣтло-зеленое.

Найдено А. Н. Петунниковымъ близъ Зиброва, Срп. у., въ цвѣту 14 мая и П. В. Сюзевымъ близъ Лужковъ, Срп. у., съ первыми цвѣтами 30 апрѣля.



Potentilla Nestleriana.

537. *P. rubens* Zimm.

Potentilla opaca L. Пет. Кр. I, стр. 157.—Пет., стр. 251.—Кауф. II, № 261.—Гор., № 28.—St. II, p. 30.

Potentilla patula W. K. Цик., № 470.

Стебли слабые, 10—30 см., б. ч. лежачіе, только верхушкой приподнимающіеся, красноватые, покрыты, какъ и черешки листьевъ, отстоящими или отогнутыми книзу длинными, мягкими волосками; корневые листья 7—9-ные, на длинныхъ черешкахъ; листочки ланцетовидно-обратно-



Potentilla rubens.

яйцевидные, съ длиннымъ клиновиднымъ основаніемъ и съ 4—6 зубцами съ каждой стороны; нижняя сторона листьевъ и по краямъ съ длинными, мягкими волосками; пятерныхъ листьевъ на стеблѣ только 1—2 нижнихъ, вверхъ по стеблю они быстро упрощаются и становятся мельче—3-тыми и даже простыми клиновидными о немногихъ зубцахъ спереди; цвѣточные полузонтики многоцвѣтковые, раскидистые;

цвѣты на длинныхъ, тонкихъ цвѣтоножкахъ; наружные чашелистики узко-ланцетные или линейно-ланцетные, наполовину уже широко-ланцетныхъ внутреннихъ; лепестки въ 2 раза длиннѣе чашечки; плодоножки отклоненныя или поникающія; плодовая головка остается полушаровидной, прикрытой шаровидно-смыкающимися чашелистиками; сѣмянки съ закругленной спинкой, безъ кля и по бокамъ слегка морщинистыя.

Найдено только разъ А. Г. Арефьевымъ близъ Серпухова въ цвѣту 20 мая 1880 г.

538. *P. okénsis* Petunnikov. Пет. Кр. I, стр. 155.

Корневище толстое, черно-бурое, очень вѣтвистое; стебли лишь немногим превышаютъ корневыя листья, во время цвѣтенія не выше 15 см.; листья 5-ные, на длинныхъ черенкахъ, которые раза въ три длиннѣ пластинки и покрыты горизонтально отстоящими волосками, какъ и цвѣтоносныя стебли; листочки обратно-яйцевидные, къ основанію нѣсколько клиновидные, съ довольно большими острыми зубцами, отъ 5 до 7 съ каждой стороны, нѣсколько искривленными и обращенными впередъ, при чемъ верхушечный зубецъ короче верхнихъ боковыхъ; обѣ стороны листочковъ покрыты частыми, жесткими волосками, которые на нижней сторонѣ полупучковатые, съ немногими короткими боковыми щетинками, окружающими длинную среднюю; такіе же волоски покрываютъ снаружи и доли чашечки; прилистники корневыхъ листьевъ линейные, густо- и длинно-волосистые, прилистники стеблевыхъ листьевъ широко- и косо-ланцетовидные; цвѣтоносныхъ стеблей очень много, несущихъ по 2—3 мелкихъ простыхъ листа, рѣдко по одному тройчатому съ меньшимъ числомъ зубцовъ; каждый цвѣтоносъ дѣлится вверху вильчато или тройчато, такъ что въ соцветіи всего 4—6 цвѣтковъ на длинныхъ и тонкихъ цвѣтоножкахъ, б. или м. наклоненныхъ, а при плодоношеніи поникшихъ; цвѣты сравнительно крупныя, до 14 мм. въ поперечникъ; лепестки свѣтло-оранжево-желтые, слегка сердцевидно-выемчатые, превышаютъ чашечку на 1—2 мм.; наружныя чашелистики ланцетные, вдвое уже широко-ланцетныхъ внутреннихъ.

*Potentilla okensis.*

По опушкамъ и на полянахъ. Цвѣтетъ съ пачала мая до начала іюня. За Лужками, близъ Зиброва и за Никифоровымъ, Сри. у. (П.).

539. *P. arenária* Borkh.

Potentilla incana Fl. Wett. Пет. Кр. I, стр. 151.

Potentilla cinerea Chaix. Пет., стр. 251.—Кауф. II, № 259.—Гор., № 16.—

Ции., № 473.—Рупр., стр. 86.—Кауф. I, стр. 153.

Potentilla verna L. Дв., № 547.—Макс., № 471.—Mart., p. 89.—Hoff., № 2533.—

St. II, p. 30.—St. I, № 342.—Pal., № 1060.

Корневище толстое, сильно развѣтвленное, деревянистое; стебли 5—20 см., лежащіе, б. ч. прижатые къ землѣ и иногда укореняющіеся, верхушки стеблей приподнимающіяся; все растеніе покрыто мягкими, довольно длинными волосками; листья 5-ные, на длинныхъ черешкахъ, верхніе—иногда тройчатые; листочки обратно-яйцевидные, къ основанію клиновидно-суженные, по краямъ тупо и довольно крупно-гороdkовые, съ верхней и съ нижней стороны покрыты пучковатыми (звѣздчатыми)

волосами, отчего кажутся сѣро-зелеными, особенно съ нижней стороны;



Potentilla arenaria.

z. cuneifolia Th. Wolf.

Листочки спереди широкіе, къ основанію длинно-клиновидные, въ нижнихъ двухъ третяхъ цѣльнокрайніе. Лужки, Срп. у. (П.).— Между Лужками и Зибровымъ, Срп. у. (П. и С.).

540. *P. silvestris* Neck.

Potentilla erecta (L.) Zimm. Пет. Кр. I, стр. 144.

Potentilla Tormentilla Scop. Бух. II, № 144. — Бух. I, № 136. — F. O., № 6, р. 86. — Пет., стр. 249. — Кауф. II, № 257. — Цин., № 468. — Кауф. I, стр. 158. — Lind, p. 108. — Ann. C. V, № 21. — Макс., № 476.

Tormentilla erecta L. Дв., № 551. — Макс., № 476. — Hoff. II, № 3858. — Gold. C., p. 20. — Mart., p. 90. — Lib. Tr., p. 56. — Hoff., № 3273. — St. II, p. 30. — St. I, № 345. — Pal., № 1064.

Корневище толстое цилиндрическое, съ нѣсколькими стеблями въ



Potentilla silvestris.

10—40 см. и съ пучкомъ корневыхъ листьевъ; стебли прямостоящіе, приподнимающіеся или почти лежащіе, съ рѣдкими, прижатыми волосами, въ верхней половинѣ сильно-вѣтвистые; корневые листья на длинныхъ черешкахъ, 3-тые, рѣже 5-ные, стеблевые—всегда 3-тые, почти сидячіе; листочки обратно-яйцевидные, продолговатые или ланцетные, всегда съ клиновиднымъ основаніемъ и въ верхней половинѣ крупно-зубчатые, голые или опушенные; прилистники крупные, съ 3—7 крупными зубцами или надрѣзами; цвѣты одиночные, на длинныхъ цвѣтоножкахъ, пазушные или конечные, б. ч. съ 4, рѣже

съ 5 желтыми лепестками, которые длиннѣ чашечки, рѣже равны ей; сѣмянки слегка морщинистыя.

По лугамъ, кустарникамъ и лѣсамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины мая до осени; плоды съ июля.

α. *typica* Beck.

Стебли лежачіе или только верхушкой приподнимающіеся, простые или только въ верхней части вѣтвистые; листья не крупнѣ 2 см.; цвѣты не крупнѣ 1 см. въ поперечникѣ.

β. *strictissima* Beck.

Стебли прямоторчащіе, б. ч. красноватые, вѣтвистые только въ верхней части; вѣтви торчащія вверхъ; листочки крупные, иногда крупнѣ 3 см., продолговато-обратно-яйцевидные или продолговато-ланцетные, съ крупными зубцами; прилистники глубоко зубчато-надрѣзные. Раменское, Брн. у. (П.).—Мытищи (С.).

γ. *latifolia* Aschers. et Graeb.

Очень крупная форма съ широко-яйцевидными листочками и почти кожистыми листьями на короткихъ черешкахъ; прилистники очень крупные, глубоко-надрѣзные; стебель лежачій, сильно и очень растопыренно-вѣтвистый. Красниковоеское болото за Б. Мытищами, въ травѣ (С.).

541. *P. réptans* L. Пет. Кр. I, стр. 144. — Мос., № 7. — Ф. Б., № 28. — Пет., стр. 249. — Кауф. II, № 258. — Цин., № 466. — Кауф. I, стр. 158. — Lind., p. 108. — Ann. C. III, № 221. — Дв., № 548. — Макс., № 472. — Mart., p. 90. — St. II, p. 30. — St. I, № 343.

Стебель 10—70 см., простой, лежачій, прижатый къ землѣ, укореняющійся; все растеніе покрыто прижатыми волосками; листья на длинныхъ черешкахъ, 5-ные (рѣже 7-ные или 3-тые); листочки обратно-яйцевидные, къ основанію суженные, по краямъ крупно-зубчатые; прилистники яйцевидные, заостренные; цвѣты желтые, въ пазухахъ листьевъ, б. ч. одиночные, на длинныхъ цветоножкахъ, превышающихъ черешки листьевъ; лепестки 8—12 мм., обратно-сердцевидные, длиннѣ чашечки; сѣмянки слегка буторчатые, не морщинистыя.

По берегамъ рѣкъ на пескѣ и известнякахъ. Цвѣтетъ съ половины іюня, весь іюль. Звенигородъ (К.). — Архангельское, Звн. у. (А.).—Берегъ Оки (Ст.).—Коломна по берегу р. Коломенки (П.).—Бачманово, Кзм. у. (П. и С.).—По Лютеркѣ; Новосилки и Бавыкино по р. Лопаснѣ, Срп. у. (И.).—По берегу р. Нахры въ Сѣкиринѣ и въ с. Михайловскомъ, Пдл. у. (Б.).—Троицкая и д. Булатова, Пдл. у.; Трутѣево и Ладыгино, Руз. у.



Potentilla reptans.

(X.).—Между Мухомымъ и Григоровымъ по берегу Москвы р., Руз. у.
(Г.).—Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

542. *P. anserina* L. Бух. II, № 145.—Бух. I, № 137.—F. O., № 6, p. 86.

Potentilla Anserina L. Пет. Кр. I, стр. 145.—Пет., стр. 249.—Кауф. II, № 266.—
Цпп., № 459.—Кауф. I, стр. 162.—Lind., p. 108.—
Дв., № 542.—Макс., № 467.—Hoff. II, № 3812.—Gold.
C., p. 20.—Mart. p. 89.—Hoff., № 2572.—St. II, p. 30.—
St. I, № 338.—Pal., № 1050.



Potentilla anserina.

Корневище бурое, почти деревянистое, съ пучкомъ листьевъ, изъ пазухъ которыхъ выходятъ длинные, нитевидные, укореняющіеся побѣги; листья непарноперистые, въ очертаніи овальные или продолговатые; листочки по краямъ надрѣзочно-пильчатые, сверху зеленые, снизу серебристые отъ прижатыхъ волосковъ; чередуясь съ большими листочками, сидятъ очень мелкіе, цѣлюкрайніе или съ 2—3 зубцами; прилистники сросшіеся, пленчатые, на побѣгахъ глубоко-раздѣльные; цвѣты одиночные, пазушные, на длинныхъ цвѣтоножкахъ; лепестки золотисто-желтые, 7—11 мм., обратно-яйцевидные, вдвое длиннѣе чашечки; наружные чашелистики надрѣзные, рѣже цѣльные, внутренние — продолговато-яйцевидные, заостренные.

По лугамъ, близъ жилья и по песчанымъ берегамъ рѣкъ, очень часто.
Цвѣтетъ съ половины мая до осени.

a. sericea Hayne. Пет. Кр. I, стр. 145.—F. O., № 6, p. 86.—Кауф. II, стр. 161.—
Цпп., стр. 159.—Кауф. I, стр. 162.—Mart., p. 89.

Листья съ обѣихъ сторонъ бѣлые, серебристые отъ прижатыхъ волосковъ.

210. *Géum* L.

Лепестковъ 5; чашечка прирасла къ коротко-цилиндрическому или полушаровидному цвѣтоложу, состоитъ изъ 5 внутреннихъ крупныхъ и 5 наружныхъ мелкихъ чашелистиковъ (подчашія); пестиковъ много; столбики длинные, верхушечные, 2-членстые; верхній членникъ ихъ загнутъ крючкомъ и отпадаетъ, нижній остается на плодѣ; плодоложе сухое цилиндрическое; плодъ сухой, состоитъ изъ сѣмянокъ.

1. Цвѣты поникшіе; плодоложе на длинной ножкѣ, равной чашечкѣ; верхній членникъ столбика до самой верхушки волосистый и почти равенъ нижнему. *G. rivale* L.

Цвѣты торчащіе или отклоненные; плодоложе на ножкѣ, не превышающей половины чашечки; верхній членникъ столбика на верхушкѣ голый и въ 3—4 раза короче нижняго. 2.

2. Чашечка по отцвѣтаніи отогнута. 3.

Чашечка по отцвѣтаніи не отогнута.

G. intermedium Ehrh.

3. Стебель и цвѣтоножки покрыты густыми, желтоватыми, отстоящими, щетинистыми волосками.

G. aleppicum Jacq.

Стебель и цвѣтоножки покрыты короткими, рѣдкими и болѣе длинными, мягкими, бѣлыми волосками.

G. urbanum L.

543. *G. rivale* L. Пет. Кр. I, стр. 139.—Бух. II, № 135.—Бух. I, № 130.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 195.—Кауф. II, № 149.—Цин., № 447.—Кауф. I, стр. 152.—Lind., p. 108.—Дв., № 554.—Макс., № 482.—Hoff. H., № 3869.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 91.—Hoff., № 1476.—St. II, p. 30.—St. I, № 347.—Pal., № 1068.

Стебель 20—60 см., прямостоящій бороздчатый, покрытъ отстоящими волосками; верхняя часть стебля, цвѣтоножки и чашечки съ железистыми волосками; корневые листья на длинныхъ черешкахъ, прерывчато-перисто-лировидные; конечная доля крупная, 3—5-надрѣзная, крупно- и неравно-зубчатая, съ клиновиднымъ и иногда сердцевиднымъ основаніемъ; боковые доли похожи на конечную, но мельче; между крупными долями еще очень маленькіе листочки; стеблевые листья на короткихъ черешкахъ, о 3 ланцетовидныхъ доляхъ съ клиновиднымъ основаніемъ; прилистники не большіе, яйцевидно-продолговатые, глубоко надрѣзано-зубчатые; цвѣты на концѣ стебля, отъ 2 до 5, поникшіе; лепестки 10—15 мм., выемчатые, желто-буроватые, съ темными жилками; чашечка колокольчатая, буро-красная или пурпуровая; плодоложе на длинной ножкѣ, равной чашечкѣ; верхній членникъ плодоваго столбика до самой верхушки волосистый, почти такой же длины, какъ и нижній ¹⁾.



Geum rivale.

По берегамъ ручьевъ, рѣкъ и по сырымъ лугамъ, очень часто. Цвѣтеть съ половины мая до іюня; плоды въ концѣ іюня.

544. *G. urbanum* L. Бух. II, № 133.—Бух. I, № 128.—F. O., № 6, p. 68.—Пет., стр. 195.—Кауф. II, № 241.—Цин., № 444.—Кауф. I, стр. 151.—Lind., p. 108.—Дв., № 552.—Макс., № 480.—Hoff. H., № 3871.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 90.—Hoff., № 1478.—St. II, p. 30.—St. I, № 346.—Pal., № 1066.

¹⁾ Иногда встрѣчается уродливая форма, описанная какъ самостоятельный видъ подъ именемъ *G. hybridum* Wulf., съ чашечкой превращенной въ листья. Особенно оригинальная форма хранится въ гербаріи Анненкова: чашечка превратилась въ крупныя зубчатые листья, изъ коней 5 во много разъ крупнѣе другихъ пяти; ноготки лепестковъ тоже очень удлиннились, а въ срединѣ цвѣтка проросъ другой на длинной ножкѣ. Уродливая форма находится въ гербаріи Гофмана, была еще найдена Чистяковымъ, А. П. Федченко, Кауфманомъ въ Ивановѣ и мною на берегу р. Работни близъ д. Рупосово, Мос. у.

Стебель 30—80 см., прямостоящий, полый, часто вѣтвистый, покрытъ очень короткимъ пушкомъ и рѣдкими отстоящими волосками; корневые листья на длинныхъ черешкахъ, ланцетно-периостые, съ 3—7 долями; доли продолговато-ромбическія, часто лопатныя и глубоко неравнозубчатыя, между крупными долями очень маленькія; стеблевые листья на короткихъ черешкахъ; нижніе — походятъ на корневые, верхніе — 3-раздѣльные, сидячіе; прилистники крупные, стеблеобъемлющіе, яйцевидно-округлые, крупно-и неравно-зубчатые; цвѣты конечные, одиночные, по отцвѣтаніи на очень длинныхъ цвѣтоножкахъ; лепестки желтые, до 5 мм.; чашечка растопыренная, очень рано отгибается внизъ; плодоножка очень короткая; верхній членикъ столбика только внизу волосистый, четверо короче нижняго, голаго.



Geum urbanum

По тѣнистымъ мѣстамъ, около жилья, очень часто. Цвѣтетъ съ начала іюня, весь іюль; плоды съ августа.

< *G. intermédium* Ehrh. = *Geum rivale* < *urbanum*. Пет. Кр. I, стр. 139.—Бух. II, 134.—Бух. I, № 129.—F. O., № 6, p. 86.—Пет. стр. 195.—Кауф. II, № 243.—Цви., № 446.—Pinz., p. 12.—Кауф. I, стр. 152.—Дв., № 553.—Макс., № 481.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 90.—St. II, p. 30.



Geum intermedium.

Стебель 30—70 см., прямостоящий, слегка бороздчатый, покрытъ довольно рѣдкими, въ верхней части железистыми волосками; листья, какъ корневые, такъ и стеблевые, похожи на листья *G. rivale* L.; прилистники довольно крупные, яйцевидные, глубоко зубчато-надрѣзные; цвѣты конечные, на длинныхъ цвѣтоножкахъ, торчащіе или слегка отклоненные; лепестки до 9 мм. желтые съ розовымъ оттѣнкомъ и съ мало замѣтными жилками; чашечка съ приподнятыми долями; плодоножка не длиннѣе половины чашечки; верхній членикъ столбика на верхушкѣ голый и втрое короче нижняго.

По сырымъ и тѣнистымъ мѣстамъ, иногда по берегамъ озеръ и рѣкъ, рѣдко. Цвѣтетъ въ іюнѣ Кунцово, Иваньково (К.).—Жуковка на рѣкѣ Ступни (М.).—Воробьевы горы (П.).—Серебряный боръ близъ Хорошова (П. и С.).—Останкино (Гей.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Боровскій курганъ, Брн. у. (С.).—Романцово и Порѣчье, Мож. у. (В.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.).

545. *G. aléppicum* Jacq.

Geum strictum Ait. Пет. Кр. I, стр. 138. — Бух. II, № 136. — Ф. О., № 6, р. 86. — Пет., стр. 195. — Кауф. II, № 242. — Цип., № 445. — Кауф. I, стр. 151.

Стебель 40—70 см., прямостоящий, иногда вѣтвистый, покрытъ, какъ и цвѣтоножки, густыми, отстоящими, желтоватыми щетинистыми волосками; корневые листья на длинныхъ черешкахъ, ланцетно-прерывчато-перистые, о 3—9 листочкахъ; листочки лопастные, глубоко неравно-зубчатые, конечный—крупнѣе остальныхъ, между крупными листочками еще маленькіе; стеблевые листья на короткихъ черешкахъ; прилистники очень крупные, часто 3-лопастные и неравно-зубчатые; цвѣты на короткихъ цвѣтоножкахъ, по отцвѣтаніи удлиняющихся и торчащихъ; лепестки желтые, до 6 мм.; чашечка съ отогнутыми долями; верхній членикъ столбика въ 3 раза короче голаго нижняго и покрытъ почти доверху густыми, щетинистыми волосками.

Около жилия и по открытымъ холмистымъ мѣстамъ. Цвѣтетъ съ іюня весь іюль; плоды съ половины іюля. Иваново, Воскресенскъ, Звн. у. (К.).—Шелениха (Сюз.).—Вогородское подъ Москвой, Пушкино, Мытищи (С.).—Дарьино, Звн. у. (Х.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Между Владычнымъ монастыремъ и д. Березинки, Срп. у.; Воробьевы горы (П.).—Гладышево (Гей.).—Выково, Брн. у.; Никольское близъ Салтыковки (Куль.).



Geum aleppicum.

* *Cotoneáster* Medic.

Плодъ—мучнистая ягода съ 2—5 косточками, верхушки которыхъ не заключены въ мякоть плода, а только прикрыты остающимися и сходящимися долями чашечки; косточки односеменные; остальное какъ у *Crataegus*.

1. Цвѣтоножки и чашечки снаружи войлочные.

C. tomentosa Lindl.

Цвѣтоножки и чашечки снаружи голыя, только чашелистики по краямъ иногда опушенные. 2.

2. Плоды красные.

C. integerrima Medic.

Плоды черные. 3.

3. Лепестки круглые; только верхушка чашелистиковъ пушистая.

C. melanocarpa Lodd.

Лепестки округлые, съ клиновиднымъ основаніемъ; всѣ края чашелистиковъ пушистые.

C. acutifolia Turcz.

* *C. melanocarpa* Lodd.

Cotoneaster nigra Wahlenb.—*Mespilus Cotoneaster nigra* Ehrh.

Кустарникъ до 2 м.; листья цѣльнокрайніе, яйцевидные или овальные, тупые или слегка заостренные, сверху голые, въ молодости съ разсѣянными волосками, снизу бѣло-войлочные, позднѣе зеленовато-войлочные, на короткихъ черешкахъ; цвѣты въ прямостоящей, 2—10-цвѣтковой кисти; лепестки розовые, круглые; цвѣтоножки и чашечки голыя; верхушка чашелистиковъ съ пушкомъ; плоды черные.

Разводится по садамъ. Цвѣтетъ съ половины мая; плоды въ августѣ.



Cotoneaster melanocarpa.



Cotoneaster acutifolia.

* *C. acutifolia* Turcz.

Cotoneaster lucida Schlecht.

Кустарникъ въ 1—1,5 м., листья эллиптическіе, б. ч. заостренные, цѣльнокрайніе, въ молодости съ верхней стороны разсѣяннo-волосистые, потомъ голые, лоснящіеся, съ нижней стороны ржаво-войлочные, потомъ разсѣяннo-волосистые или почти голые; цвѣты въ 2—5-цвѣтковой кисти; лепестки розовые, округлые, съ клиновиднымъ основаніемъ; чашечка снаружи голая; чашелистики по краямъ съ пушкомъ; плодъ черный или буро-черный, часто съ сизымъ налетомъ.

Разводится по садамъ. Цвѣтетъ съ половины мая; плоды въ августѣ.

* *C. tomentosa* Lindl. Пер., Кр. I, стр. 166.

Cotoneaster vulgaris Lindl. Kayф. II, № 275.—Kayф. I, стр. 169.

Кустарникъ иногда до 2 м., съ бурой корой; молодая вѣтвь покрыта войлокомъ; листья широко-овальные, б. ч. спереди округлые, въ молодости съ верхней стороны пушистые, потомъ голые, снизу бѣло-войлочные, цѣльнокрайніе; цвѣточная кисть 2—10-цвѣтковая; лепестки бѣлые или блѣдно-розовые, равны чашелистикамъ; чашечка и цвѣтоножки

покрыты бѣлымъ войлокомъ; плодъ красный, тусклый, иногда покрытъ пушкомъ.

Разводится по садамъ. Цвѣтетъ съ половины мая; плоды въ августѣ. Опыляемый по берегу Москвы р. близъ Нескучнаго сада и Голыцинской больницы.



Cotoneaster tomentosa.



Cotoneaster integerrima

* *C. integerrima* Medic.

Cotoneaster vulgaris Lindl. Her. Кр. I, стр. 166.—Пет., стр. 172.—Цин., № 498.

Mespilus Cotoneaster L. Pal., № 1005.

Cotoneaster Cotoneaster Karst.

Кустарникъ до 1.5 м., съ буровато-сѣрой корой, на молодыхъ вѣтвяхъ съ красно-бурой корой и съ бѣлыми чечевичками; листья округло-яйцевидные, съ нижней стороны въ молодости бѣло-войлочные, потомъ съ зеленоватымъ пушкомъ, сверху голые, цѣлюкрайніе, слегка заостренные, на короткихъ пушистыхъ черешкахъ; цвѣты въ повислыхъ. 2—5-цвѣтковыхъ кистяхъ; лепестки розовые, до 3 мм.; чашелистики яйцевидные, только по краямъ пушистые; плодъ шаровидный, до 7 мм., ярко-красный, мучнистый.

Разводится по садамъ. Цвѣтетъ съ половины мая; плоды въ августѣ.

* *Crataégus* L.

Чашелистиковъ 5, мелкихъ; завязь изъ 1—5 сросшихся между собой плодолистиковъ. 2—5-гнѣздная, съ 2 сѣмечками въ каждомъ гнѣздѣ; столбиковъ и косточекъ 1—5; косточки 2-сѣменные или вслѣдствіе недоразвитія односѣменные; плодъ—мучнистая ложная ягода съ кружкомъ на верхушкѣ.

1. Взрослые листья съ нижней стороны покрыты густыми волосами или войлокомъ. 2.

Взрослые листья съ нижней стороны совершенно голые или покрыты только вдоль жилокъ рѣдкими волосами. 3.

2. Листья глубоко-лопастные или надрѣзные; плоды черные.

C. nigra W. K.

Листья не глубоко-лопастые, лопасти маленькія; плоды ярко-красные.

C. coccinea L.

3. Листья почти кожистые, сверху темно-зеленые, лоснящіеся, почти безъ лопастей, только глубоко неравно-зубчатые.

C. crus galli L.

Листья мягкіе, не кожистые, не лоснящіеся, 3—7-лопастные.

4. Вѣтви темно-красныя; колючки длинныя до 5 см.

C. sanguinea Pall.

Вѣтви съ буро-сѣрой или пепельно-сѣрой корой; колючки маленькія.

C. Oxyacantha L.

* *C. coccinea* L. Пет. Кр. I, стр. 166.—Пет., стр. 172.—Pal., № 997.

Кустарникъ въ 6—7 м., съ бурой корой и не частыми колючками въ 2,5—4 см.; листья въ очертаніи округло-яйцевидные, съ почти сердцевиднымъ основаніемъ и не глубокими, не крупными лопастями, по краямъ просто- или двояко-зубчатые, сверху б. ч. голые, снизу довольно густо волосистые; цвѣты крупныя, зеленовато-бѣлыя, въ щиткахъ; цвѣтоножки войлочные; столбиковъ 5; чашелистики войлочные, по краямъ железистые; плодъ шаровидный или грушевидный, до 18 мм., ярко-красный.

Разводится. Цвѣтетъ съ половины мая; плоды въ концѣ августа.



Crataegus coccinea.



Crataegus crus galli.

* *C. crus galli* L.

Crataegus Crus galli L. Пет. Кр. I, стр. 166.—Пет., стр. 172.—Pal., № 999.

Кустарникъ въ 4—6 м., съ длинными, отогнутыми колючками до 6 см.; листья обратно-яйцевидные, съ удлинено-клиновиднымъ основаніемъ, въ нижней части цѣльнокрайніе, въ верхней—двояко-зубчатые или надрѣзано-двояко-зубчатые, съ обѣихъ сторонъ голые кожистые, сверху

темно-зеленые, лоснящиеся; прилистники линейные; цветы белые, въ щиткахъ; столбиковъ 1—2; чашелистики линейно-ланцетные, по краямъ часто железисто-зубчатые; плодъ продолговато-шаровидный, до 10 мм., ярко-красный.

Разводится по садамъ, нѣсколько страдаетъ отъ морозовъ. Цвететъ съ половины мая; плоды съ половины августа.

* *C. sanguinea* Pall. Пет. Кр. I, стр. 165.—Пет., стр. 172.—Кауф. II, стр. 169.—Гор., № 31.—St. II, p. 29.

Crataegus Oxyacantha L. Кауф. II, № 274.—Кауф. I, стр. 168.

Кустарникъ до 7 м., съ темно-красной, лоснящейся корой на побѣгахъ и съ длинными колючками до 5 см.; листья тонкіе, въ очертаніи широко-яйцевидные, съ клиновиднымъ основаніемъ и не глубоко-5—7-лопастные; лопасти широкія, треугольныя, по краямъ двояко-зубчатыя; прилистники ланцетные, серповидно-согнутые; цветы белые, въ щиткахъ; чашелистики яйцевидно-треугольные, отвороченные; столбиковъ 3; цветоножки голыя; плодъ шаровидный или удлинненно-шаровидный, ярко-красный, зрѣлый—мягкій.

Разводится по садамъ, иногда дичаетъ. Цвететъ съ половины мая; плоды въ концѣ августа. Въ одичаломъ видѣ найденъ: Братцово, близъ Борисовской мельницы (К.).—Близъ городской Канатчиковой дачи за Даниловскимъ кладбищемъ (П.).—Воробьевы горы (С.).

α. xanthocarpa Regel.

Плоды желтые.



Crataegus sanguinea.



Crataegus Oxyacantha.

* *C. Oxyacantha* L. Пет. Кр. I, стр. 164. — Пет., стр. 172.—Цан., № 496.—Borg., p. 699. — Дв., № 558. — Макс., № 459. — Hoff., № 1041.—St. II, p. 29.—St. I, № 327.—Pal., № 1000.

Mespilus Oxyacantha Crantz. Gold. C., p. 20.—Mart. p. 86.

Кустарникъ до 5 м., съ буро-сѣрой или пенельно-сѣрой корой и съ маленькими колючками; листья къ основанію клиновидные, 3—5-лопастные.

надрѣзы доходятъ иногда почти до средней жилки. съ лопастями округлыми, обыкновенно остро-зубчатыми; нижняя сторона темновато-зеленая; боковыя жилки. по крайней мѣрѣ самыя нижнія. изогнуты внутрь; прилистники крупныя, на не цвѣтущихъ вѣтвяхъ широко-почковидныя. зубчатые; цвѣты бѣлые. въ щиткахъ; лепестки до 7 мм.; чашелистики яйцевидно-треугольныя, заостренныя; столбиковъ 2—3; плодъ до 10 мм., овальный, рѣже шаровидный, красный, съ желтоватою мякотью.

Разводится по садамъ. Цвѣтетъ съ начала мая; плоды въ концѣ августа.

*** *C. nígra* W. K.**

Кустарникъ до 4 м., съ бурой корой; молодыя вѣтви и почки покрыты бѣлымъ или сѣрымъ войлокомъ, къ осени пропадающимъ; колючки не частыя, короткія до 1 см.; листья яйцевидныя, съ клиновиднымъ или слегка округлымъ основаніемъ. 7—9-лопастныя или надрѣзные, сверху темно-зеленыя, рѣдко-волосистыя, снизу сѣро-зеленыя отъ довольно густого войлока, по краямъ просто или двояко-зубчатыя; цвѣты въ щиткахъ, на цвѣтоножкахъ. покрытыхъ бѣлымъ войлокомъ; чашелистики короткіе, цѣльнокрайніе или слегка зазубренныя, покрыты бѣлымъ войлокомъ; столбиковъ 5; завязь голая; плодъ шаровидный, черныя.

Разводится по садамъ. Цвѣтетъ съ половины мая; плоды съ половины августа.



Crataegus nigra.



Amelanchier vulgaris.

*** *Amelanchier* Medic.**

Плодъ—ложная ягода съ остающимся прямыми чашелистиками; гнѣздъ 3—5, съ 2 сѣмечками въ каждомъ гнѣздѣ и съ пленчатыми перегородками (внутриплодникъ), и еще съ не полными ложными перегородками.

* **A. vulgaris Moench.** Пет. Кр. I, стр. 167.—Пет., стр. 135.

Amelanchier ovalis Medic.—*A. rotundifolia* K. Koch.—*A. Amelanchier* Karst.

Кустарникъ до 3 м.; листья округлые, эллиптическіе, тупые, пильчатые, съ нижней стороны голые или въ молодости съ рѣдкими волосками; цвѣты бѣлые, въ прямостоящихъ или мало отогнутыхъ кистяхъ; чашечка голая; плоды синне-черные, съ остающимися, б. ч. прямо-торчащими чашелистиками.

Разводится по садамъ, рѣдко дичаетъ. Цвѣтеть въ маѣ. Въ одичаломъ состояніи: близъ ст. Сходня, у полотно Ник. ж. д. въ смѣшанномъ основномъ и березовомъ лѣсу (X.).

* **A. ovalis Borkh.** Пет. Кр. I, стр. 167.

Amelanchier canadensis Medic γ. *rotundifolia* Torr.—*A. spicata* Decsne.

Кустарникъ до 5 м.; листья округло-овальные или эллиптическіе, на верхушкѣ коротко-заостренные, по краямъ зубчатые, въ молодости съ нижней стороны или съ обѣихъ сторонъ покрыты серебристыми волосками, потомъ голые; цвѣты бѣлые, въ повислыхъ кистяхъ; лепестки обратно-яйцевидные; чашечка войлочная; плоды черные съ сплнмъ налетомъ и съ отогнутыми, остающимися долями чашечки.

Разводится по садамъ. Цвѣтеть въ маѣ; плоды съ середины іюля.



Amelanchier ovalis.



Pirus communis.

211. *Pirus* L.

Плодь крупный мясистый (яблоко), б. ч. 5-гнѣздный, съ жесткими, пергаментными перегородками (внутренлодникъ) и б. ч. съ 2 сѣмечками въ каждомъ гнѣздѣ. рѣже вслѣдствіе недоразвитія—съ одной; цвѣты крупные, въ рѣдкихъ, малоцвѣтковыхъ полузонтикахъ.

546. **P. communis L.** Пет. Кр. I, стр. 167.—Пет., стр. 241.—Кауф. II, № 276.—Цив., № 499.

Pyrus communis L. Рупр., стр. 86.—Кауф. I, стр. 169.—St. II, p. 29.—Pal., № 1006.

Болѣе или менѣе высокое дерево, до 20 м.; молодыя вѣтви съ желтовато-бурой корой, часто оканчиваются колючкой; листья округлые или округло-лицевидные, коротко-заостренные, по краямъ мелко-пильчатые, въ молодости пушистые, потомъ голые; черешокъ б. ч. равенъ листу; цвѣты по 6—12, крупные, бѣлые; лепестки 10—15 мм.; столбикъ свободный; плодъ постепенно суживается къ плодоножкѣ (грушевидный) или округлый, безъ углубленія близъ плодоножки.

Встрѣчается дико очень рѣдко, у насъ не большимъ деревцомъ или кустомъ. На берегу Оки близъ Лужковъ, Срп. у. (К.). — Бѣлые Колодези, Кзм. у. (П.).

547. *P. Málus* L. Пет. Кр. I, стр. 167. — Бух. II, № 157. — Бух. I, № 151. — Ф. О., № 6, р. 86. — Пет., стр. 242. — Кауф. II, № 277. — Цин., № 500.

Pyrus Malus L. Гор., № 17. — Кауф. I, стр. 169. — St. II, р. 29. — Pal., 1007.

Pirus Malus L. α . *glabra* Koch. — *Malus acerba* Merat. — *Malus silvestris* Mill.

Маленькое дерево до 10 м., на молодыхъ вѣтвяхъ съ красно-бурой, лоснящейся корой; листья на черешкахъ б. ч. равныхъ половинѣ листа, лицевидные, съ округлымъ основаніемъ и б. или м. заостренной верхушкой, по краямъ просто или двояко-зубчатые, съ обѣихъ сторонъ голые или



Pirus Malus

съ нижней стороны вдоль жилокъ волосистые, въ молодости съ обѣихъ сторонъ пушистые; цвѣты крупные, по 5—6; лепестки 12—17 мм., съ нижней стороны блѣдно-розовые, съ верхней — бѣлые; чашечки и цвѣтоножки б. ч. пушистыя; столбики у основанія сросшіеся; плодъ шаровидный, съ углубленіемъ у плодоножки и у остающейся чашечки.

По лѣсамъ, изрѣдка. Цвѣтеть съ половины мая. Воробьевы горы, близъ Строгина; Буньково—за Павловскимъ посадомъ, Бгр. у. (К.). — Противъ Краснаго Стана, Руз. у. (Ч.). — Бѣлые Колодези, Кзм. у. (Экс. Бот. Лаб.). — Романцово, Мож. у. (В.). — Ольгино, Мож. у. (Ф. В.). — Михай-

ловское, Пдл. у. (Б.). — Невѣрово, Кзм. у.; Хмѣтьево, Кпл. у. (П.). — Казарины луга по р. Сестрѣ, Кпл. у.; Шилково по рѣкѣ Медвѣдкѣ, Кзм. у.; близъ Лужковъ, Срп. у. (П. и С.). — Харлово, Брн. у. (Сюз.). — Рождественно на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

212. *Sórbus* L.

Плодъ — ложная ягода, 2—4-гнѣздная, съ очень тонкими перегородками (внутриплодникъ); цвѣты мелкіе, въ густомъ метельчатомъ щиткѣ.

548. *S. Aucupária* L. Бух. II, № 158.—Бух. I, № 152.—F. O., № 6, p. 86.—
Кауф. II, № 278.—Цпл., № 501.—Кауф. I, стр. 170.—
Поф. II, № 3696.—Lib. Tr., p. 8.

Sorbus aucuparia L. Пет., стр. 283.—Дв., № 560.—Макс., № 458.—Gold. C.,
p. 20.—Mart., p. 86.—St. II, p. 29.—St. I, № 328.—
Pal., № 1002.

Sorbus Aucuparia Gärtn. Lind., p. 110.

Дерево до 10 м., съ строй гладкой корой; листья непарноперистые, о 9—19 листочкахъ; листочки на очень короткихъ черешкахъ, продолговатые, заостренные, по краямъ просто или doubly зубчатые, въ молодости съ нижней стороны покрыты серебристыми волосками, потомъ голые; цвѣты въ конечныхъ, очень густыхъ вѣтвистыхъ щиткахъ, съ сильнымъ миндальнымъ запахомъ; цвѣтоножки и чашечки пушистыя; лепестки бѣлые, до 3,5 мм.; плодъ шаровидный, красный, походить на ягоду, до 10 мм.

По лѣсамъ, очень часто. Цвѣтеть съ половины мая; плоды съ конца августа.



Sorbus Aucuparia.

213. *Prúnus* L.

Лепестковъ 5, прикрѣпленныхъ вмѣстѣ съ 15—20 тычинками къ краю цвѣтоложа, увядающаго и опадающаго вмѣстѣ съ долями чашечки; пестикъ съ длиннымъ столбикомъ и головчатымъ рыльцемъ; сѣмечекъ 2, помѣщенныхъ рядомъ; плодъ—костянка, мясистая или сухая, съ голой или войлочной поверхностью и односѣменной косточкой; зародышъ прямой съ вверхъ обращеннымъ корешкомъ. Деревья и кустарники.

1. Цвѣты розовые; плодъ — сухая костянка съ войлочной поверхностью. *P. nana* Stokes.

Цвѣты бѣлые; плодъ — мясистая костянка съ голой поверхностью. 2.

2. Цвѣты въ кистяхъ; черешокъ листа близъ основанія съ железками. 3.

Цвѣты по 1 или въ пучкахъ; черешокъ листа безъ железокъ. 4.

3. Цвѣты въ повислыхъ кистяхъ; черешокъ съ 2 железками; плодъ черный; костянка морщинистая. *P. Padus* L.

Цвѣты въ кистяхъ при распусканіи вверхъ торчащихъ или немного отклоненныхъ; черешокъ съ 2—4 железками; плодъ красный; косточка гладкая. *P. virginiana* L.

4. Цвѣты по 2—5; не развернувшіеся листья вдоль сложены, взрослые—кожистые, голые, лоснящіеся. 5.

- Цвѣты поодинокѣ или попарно; не развернувшіеся листья свернуты трубкой, взрослые—плотные, темно-зеленые, тусклые. 6. Листья на концахъ молодыхъ вѣтвей эллиптическіе или ланцетные, заостренные, остальные — тупые или округлые; плоды мелкіе.

P. fruticosa Pall.

Все листья одинаковые, заостренные; плоды крупные.

P. Cerasus L.

6. Цвѣты обыкновенно попарно; плоды яйцевидно-продолговатые, крупные, висячіе; дерево.

P. domestica L.

Цвѣты поодинокѣ; плодъ округлый, маленькій, на короткой, торчащей плодоножкѣ; кустарникъ.

P. spinosa L.

549. *P. spinosa* L. Пет. Кр. I, стр. 135.—Пет., стр. 252.—Кауф. II, стр. 146.—Мял., № 6.—Ция., № 437.—Кауф. I, стр. 148.—Дв., № 521.—Макс., № 466.—Mart., p. 85.—St. I, № 326.—Pal., № 995.

Кустарникъ до 2,5 м.; кора темно-бурая; молодые боковыя вѣтки часто переходятъ въ колючки; листья эллиптическіе или продолговато-эллиптическіе, въ молодости съ обѣихъ сторонъ покрыты пушкомъ, потомъ сверху голые, снизу вся поверхность или только вдоль жиллокъ опушенная; цвѣты одиночные, если же бываютъ по 2—3, то каждый цвѣтокъ выходитъ изъ отдѣльной почки; вѣничикъ бѣлый; лепестки до 8 мм.; цветоножка голая, равна голой чашечкѣ или въ 2 раза длиннѣе ея; плодъ



Prunus spinosa v. *dasyphylla*.



Prunus domestica.

шарообразный, черно-синій съ сизымъ налетомъ, на короткой торчащей или немного отогнутой плодоножкѣ.

По холмамъ и склонамъ, любитъ известнякъ. Цвѣтетъ съ конца апрѣля до половины мая; зрѣлые плоды въ августѣ.

У насъ встрѣчается только:

- а. *dasyphylla* Schur. Труды Бот. Сад. Им. Юрьевск. Ун. Т. II, стр. 15. А. Н. Петуникова. *Prunus spinosa* L. и *Prunus insititia* L.

Цвѣтоножка 7—13 мм. дл. вмѣстѣ съ чашечкой и часто плодоножкой опушенная. Бѣлые Колодези, Кзм. у. (Экс. Бот. Лаб.).

* *P. doméstica* L. Пет., стр. 252. — Кауф. II, стр. 145. — Цин., стр. 152. — Кауф. I, стр. 147. — Hoff. II., № 3674. — St. II, p. 29. — Pal., № 994.

Дерево до 12 м.; вѣтви б. ч. безъ колючекъ, съ стройной корой, молодые вѣтки бурья, голыя; листья эллиптическіе или обратно-ййцевидные, немного заостренные, по краямъ зубчатые, сверху голые, снизу б. ч. пушистые; цвѣты обыкновенно попарно на опушенныхъ цвѣтоножкахъ; лепестки 9—11 мм., бѣлые или зеленовато-бѣлые; плоды яйцевидно-продолговатые, висцїе, крупныя, темно-синїе, красныя или золотисто-желтыя, б. ч. съ низымъ налетомъ.

Разводится. Цвѣтеть съ конца апрѣля до половины мая.

* *P. nana* Stokes.

Amygdalus nana L. Пет. Кр. I, стр. 137. — Пет., стр. 136. — Pal., № 986.

Не высокій кустарникъ до 1 м. съ торчащими вѣтвями; листья ланцетные или продолговато-ланцетные, суженные въ короткій черешокъ, по краямъ зубчатые; прилистники линейные, съ рѣдкими зубчиками; цвѣты въ пазухахъ листьевъ, по 1 или по 2, сидячіе, у основанїя съ 8 маленькими чешуйками; чашечка трубчатая, зубцы вдвое короче трубки, на верхушкѣ округлыя и рѣсничато-зубчатые; лепестки розовыя, продолговатые, на концѣ округлыя, до 10 мм.; плодъ округлый, немного заостренный, покрытъ войлокомъ.

Разводится по садамъ. Цвѣтеть въ началѣ мая.



Prunus nana.



Prunus fruticosa.

550. *P. fruticósa* Pall.

Prunus Chamaecerasus Jacq. Пет. Кр. I, стр. 134. — Пет., стр. 252. — Кауф. II, № 239. — Цин., № 440. — Рупр., стр. 88. — Кауф. I, стр. 147.

Кустарникъ до 1 м. или нѣсколько выше; вѣтви съ сѣрой корой; листья лоснящіеся, голые, немного кожистые, железисто-зубчатые, на молодыхъ вѣтвяхъ конечные листья б. ч. ланцетные или продолговатые, заостренные, остальные — обратно-яйцевидные, тупые или закругленные; черешки безъ железокъ; цвѣты на длинныхъ цвѣтоножкахъ, въ 2—3-цвѣтковомъ пучкѣ; лепестки 6—7 мм., бѣлые; костянка красная, мало сочная.

По опушкамъ и по кустарникамъ. Цвѣтетъ съ половины мая и въ началѣ юня; плоды въ августѣ. Раменки, Мос. у.; Невѣрово, Кзм. у.; между Серпуховымъ и Лужками (К.). — Горенки (Вор.). — Влизъ ст. Чуденка, Вгр. у. (П. И.). — Влизъ Никифорова, Срп. у. (Мил.). — Подъ Коломною (Макс.). — Бѣлые Колодези, Кзм. у. (П.). — Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

Р. *Cerasus* L. Пет., стр. 252. — Кауф. II, стр. 145. — Цин., № 439. — Кауф. I, стр. 147. — Hoff. H., № 3672. — St. II, p. 29. — Pal., № 992.

Дерево до 9 м.; вѣтви съ бурой корой; листья эллиптическіе или ланцетные, заостренные, съ неравными округлыми зубцами и съ обѣихъ сторонъ лоснящіеся; черешокъ листа безъ железокъ; цвѣты по 3—5 въ пучкахъ; лепестки до 10 мм., бѣлые; плодъ — костянка темно-лиловая или темно-красная, мясистая, сплюснuto-шаровидная.

Разводится. Цвѣтетъ въ маѣ.



Prunus Cerasus.



Prunus Padus.

551. *P. Pádus* L. Нер. Кр. I, стр. 134—137. — Бух. II, № 132. — Бух. I, № 127. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 252. — Кауф. II, № 240. — Цин., № 441. — Кауф. I, стр. 148. — Lind., p. 106. — Ann. C. II, № 120. — Дв., № 520. — Макс., № 455. — Hoff. H., № 3680. — Gold. C., p. 20. — Mart., p. 85. — Hoff., № 2607. — St. II, p. 29. — St. I, № 325. — Pal., № 987.

Кустъ или дерево до 10 м.; молодая вѣтвь темно-бурья; листья эллиптическіе, заостренные, по краямъ остро-пильчатые, съ обѣихъ сторонъ голые, снизу блѣднѣе; черешки близъ основанія листа съ 2 же-

лезкамъ; прилистники длинные, почти линейные, бываютъ только при распусканіи листьевъ и очень рано опадаютъ; цвѣточная кисть длинная, довольно рѣдкая, повислая; цвѣты на цвѣтоножкахъ въ нѣсколько разъ превышающихъ чашечку; вѣнчикъ бѣлый; лепестки б. ч. съ слабо зубчатымъ краемъ; плодъ черный, лоснящійся, шарообразный; косточки морщинистыя.

По лѣсамъ, опушкамъ и открытымъ мѣстамъ, очень часто. Цвѣтетъ въ маѣ; зрѣлые плоды съ конца іюля до половины августа.

P. virginiana L. Пет., Кр. I, стр. 137.—Пет., стр. 252.

Кустарникъ или дерево до 10 м.; листья овальные или обратно-яйцевидные, заостренные, съ мелкими, острыми, впередъ направленными и какъ бы прижатыми зубцами, съ нижней стороны въ углахъ жилковъ б. ч. съ бородками; черешки съ 2 или 4 железками; цвѣты въ длинныхъ, довольно густыхъ кистяхъ, во время распусканія вверхъ торчащихъ или немного отклоненныхъ; вѣнчикъ бѣлый, съ округлыми, цѣлюкрайними лепестками; цвѣтоножка у нижнихъ цвѣтовъ не болѣе какъ въ $1\frac{3}{4}$ раза длиннѣе чашечки; плодъ красный, подъ конецъ черно-красный; косточка гладкая.



Prunus virginiana.

Разводится по садамъ. Цвѣтетъ съ конца мая до половины іюня; зрѣлые плоды въ августѣ.

49 сем. Leguminosae Endl.

Чашечка трубчатая или колокольчатая, 5-зубчатая или 5-надрѣзная, или же двугубая; верхняя губа 2-зубчатая, нижняя—3-зубчатая; вѣнчикъ неправильный, симметричный, мотыльковый, прикрѣпленный къ диску на днѣ чашечки, 5-лепестный, съ свободными или сросшимися лепестками и иногда также съ трубкой тычинокъ; оба нижніе лепестка срослись въ лодочку, верхній наибольшій — парусъ или флагъ и 2 боковые—крылья; тычинокъ 10, двубратственныхъ, т.-е. 9 срослись въ трубку и одна свободная, или однобратственныхъ, т.-е. всѣ 10 тычинокъ срослись въ трубку; завязь верхняя, одногнѣзная, съ боковымъ стѣннымъ сѣменосомъ; столбикъ и рыльце простые; плодъ — одногнѣздый бобъ, рѣже съ 2 неполными гнѣздами, вскрывающійся 2 створками или только вдоль верхнего шва, или же бобъ членистый, распадающійся на односѣменные членики, или же плодъ не вскрывающійся—односѣменный орѣшекъ; сѣмя безъ бѣлка, съ рубчикомъ въ мѣстѣ прикрѣпленія къ сѣменосу; зародышъ согнутъ съ подсѣмодольнымъ колѣвомъ такъ, что оно и зародышевый корешокъ лежать по краю толстыхъ мясистыхъ сѣмодолей.

Обзоръ сем. Leguminosae Endl.

Отдѣлъ Phyllólobae DC.

Сѣмедолы при прорастаніи листовидныя выносятся изъ земли и зеленѣютъ на свѣту.

Группа Lótidae Aschers. et Graeb.

Бобы во всю свою длину одногнѣзные или двугнѣзные, рѣдко съ губчатыми поперечными перегородками, б. или м. ясно вскрывающіеся, многосѣменные, рѣдко односѣменные.

I. *Genisteae* DC.

Чашечка б. или м. ясно двугубая; крылья вѣнчика у верхняго края поперекъ складчато-морщинистыя; всѣ тычинки сраслись въ трубку; бобы одногнѣзные.

Genista, Cytisus.

II. *Anthyllideae* Koch.

Чашечка 5-раздѣльная или двугубая; крылья не морщинистыя у верхняго края; тычинки сраслись въ одну трубку, нити вверху расширены; бобъ одногнѣзный.

Ononis, Anthyllis.

III. *Trifolieae* DC.

Листья тройчатые; одна тычинка свободная, остальные 9 сраслись въ трубку; бобъ одногнѣзный.

Medicago, Melilotus, Trifolium, Lotus.

IV. *Galégeae* Bronn.

Листья непарноперистые, рѣдко парноперистые; одна тычинка свободная; бобъ одногнѣзный.

Caragana.

V. *Astragaleae* Adans.

Листья б. ч. непарноперистые; одна тычинка свободная; бобъ отчасти двугнѣзный вслѣдствіе развитія ложной перегородки, образовавшейся изъ внутрь загнутаго края спинного шва.

Astragalus.

Группа Hedysáridae Aschers. et Graeb.

Одна тычинка свободная; бобъ съ косыми перегородками или распадается на членики; иногда плодъ одногнѣзный, односѣменный, и тогда не вскрывается.

VI. *Coronilleae* DC.

Цвѣты въ пазушныхъ головчатыхъ зонтикахъ; бобы цилиндрическіе или сплюснутые.

Coronilla.

VII. *Hedysáreae* DC.

Цвѣты въ пазушныхъ кистяхъ; бобы сплюснутые.

Onobrychis.

Отдѣлъ *Sarcólobae* DC.

Сѣмедоли остаются толстыми и послѣ прорастанія.

Группа *Viciidae* Aschers. et. Graeg.

Сѣмедоли послѣ прорастанія остаются подъ землей; листья б. ч. парноперистые, обыкновенно оканчиваются развѣтвленнѣмъ усикомъ; одна тычинка свободная.

VIII. *Viciae* Bronn.

Ervum, Vicia, Lens, Pisum, Lathyrus, Orobus.

Группа *Phaseólidae* Aschers. et Graeb.

Сѣмедоли послѣ прорастанія зеленѣя, но толстыя, выносятся изъ-подъ земли, рѣдко остаются заключенными въ сѣменной кожурѣ; листья непарноперистые, часто тройчато-перистые; всѣ тычинки сросшіяся или одна свободная.

IX. *Phaseóleae* Benth.

Phaseolus.

Опредѣлитель родовъ.

1. Кустарники съ желтыми цвѣтами. 2.
Травянистыя растенія. 4.
2. Листья парноперистые или только съ двумя парами, сильно сближенными, оканчиваются колючкой; прилистники часто колючіе; одна тычинка свободная. *Caragana.*
Листья тройчатые или простые; прилистники травянистые; всѣ тычинки срослись въ трубку. 3.
3. Листья простые. *Genista.*
Листья тройчатые. *Cytisus.*
4. Листья тройчатые, иногда у основанія черешка съ крупными прилистниками. 5.
Листья перистые, обѣ одной парѣ или нѣсколькихъ парахъ листочковъ; корневыя листья иногда простые. 10.
5. Чашечка двугубая; стебель вьющійся. *Phaseolus.*
Чашечка 5-раздѣльная; стебель не вьющійся. 6.
6. Лодочка заострена въ клювъ. 7.
Лодочка тупая. 8.
7. Цвѣты желтые. *Lotus.*
Цвѣты розовые съ бѣлымъ. *Ononis.*
8. Завязь изогнута у основанія и прилегае къ нарусу. *Medicago.*
Завязь прямая. 9.
9. Тычиночная трубка срослась съ лепестками и послѣдніе между собой; вѣнчикъ засыхаетъ и остается при плодѣ. *Trifolium.*
Тычиночная трубка не срослась съ вѣнчикомъ; вѣнчикъ по отцвѣтаніи опадаетъ. *Melilotus.*

10. Листья, иногда только стеблевые, непарноперистые, оканчиваются листочкомъ. 11.

Листья парноперистые, оканчиваются усикомъ или травянистымъ остриемъ. 14.

11. Цвѣты въ головкахъ съ оберткой изъ пальчато-раздѣльных прицвѣтничковъ; тычинки срались въ одну трубку.

Anthyllis.

Цвѣты въ нѣмъ соцвѣтѣи или въ головкахъ, но тогда безъ обертки; одна тычинка свободная. 12.

12. Лодочка вытянута въ клювъ; цвѣты зонтикомъ. *Coronilla.*

Лодочка тупая или скошенная; цвѣты кистью или головкой. 13.

13. Лодочка скошенная; плодъ 1-сѣменный твердый орѣшекъ, сѣтчатоморщинистый.

Onobrychis.

Лодочка закругленная; бобъ многосѣменный, 2-гнездный или не вполне 2-гнездный.

Astragalus.

14. Листья оканчиваются травянистымъ шипикомъ. *Orobus.*

Листья оканчиваются усикомъ. 15.

15. Трубка тычиночныхъ нитей скошена, такъ какъ нижнія тычинки срались больше верхнихъ. 16.

Трубка тычиночныхъ нитей съ прямымъ ровнымъ краемъ, такъ какъ всѣ тычинки срались равномерно. 18.

16. Столбикъ плоскій, на внутренней сторонѣ волосистый; чашечка 5-раздѣльная, съ равными зубчиками.

Lens.

Столбикъ нитевидный, прямой, вверху кругомъ опушенный или подъ верхушкой на наружной сторонѣ бородатый. 17.

17. Кисть рѣдкая о 2—8 цвѣткахъ; цвѣты мелкіе, 3—6 мм., голубоватые; столбикъ кругомъ волосистый, но не бородатый.

Ervum.

Кисть густая, многоцвѣтковая; цвѣты б. или м. крупныя, 7—18 мм., и тогда столбикъ кругомъ волосистый, или цвѣты пазушныя, на короткихъ цвѣтоножкахъ, и тогда столбикъ снаружи бородатый.

Vicia.

18. Прилистники равны цвѣтоносу, несущему 1—2 цвѣтка; столбикъ 3-гранный, сверху килеватый, снизу желобчатый. *Pisum.*

Прилистники короче цвѣтоноса, несущаго много цвѣтовъ; столбикъ къ верхушкѣ плоскій.

Lathyrus.

214. Genista L.

Верхняя губа чашечки двураздѣльная, нижняя 3-раздѣльная; лодочка тупая; столбикъ шпоровидный, съ загнутой внутрь верхушкой и съ рыльцемъ, скошеннымъ внутрь цвѣтка; всѣ тычинки срались въ трубку; бобъ линейно-продолговатый, сжатъ съ боковъ, много длиннѣе чашечки.

552. *G. tinctoria* L. Пет. Кр. I, стр. 117.—Пет., стр. 192.—Кауф. II, № 196.—Цин., № 333.—Рупр., стр. 86.—Кауф. I, стр. 122.—Borg., p. 699.—Дв., № 677.—Макс., № 657.—Mart., p. 123.—Hoff., № 1434.—St. II, p. 42.—St. I, № 475.—Pal., № 1527.

Кустарникъ отъ 50 до 150 см. съ зелеными бороздчатыми, торчащими вѣтвями, въ верхней части опушенными; листья ланцетные или эллиптическіе, къ обоимъ концамъ заостренные, цѣльнокрайніе, по краямъ и иногда вдоль жилокъ покрыты пушкомъ; листья на цвѣтоносныхъ вѣтвяхъ много мельче, чѣмъ на листовыхъ; прилистники очень мелкіе, шиловидные; цвѣты въ длинныхъ кистяхъ, ярко-желтые; флагъ до 14 мм.; чашечка цилиндрическая, двугубая; зубцы ея ланцетные, острые, иногда по краямъ съ пушкомъ; бобъ линейный, до 2 см., совершенно голый и немного согнутый, съ ясно выраженнымъ положеніемъ сѣмянъ.



Genista tinctoria.

По холмамъ и кустарникамъ, любить песчаную почву. Цвѣтеть съ половины іюня весь іюль. Серпуховъ, Лужки, Срп. у. (К.).—Зиброво, у устья Лопасни, Срп. у. (Мил.).—Бѣлые Колодези, Горы, Кал. у. (П.).—Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Солдугубъ).

215. *Cytisus* L.

Чашечка трубчатая: верхняя губа усѣченно-двугубая; столбикъ шиловидный, загнутый, съ рыльцемъ, скошеннымъ кнаружи цвѣтка; всѣ тычинки срались въ трубку; бобъ сжатъ съ боковъ.

553. *C. ratisbonensis* Schaeffer. Пет. Кр. I, стр. 117.—Кауф. II, № 197.—Кауф. I, стр. 122.

Cytisus biflorus L'Hérit. Пет., стр. 175.—Цин., № 335.—Рупр., стр. 87.

Cytisus supinus L. Дв., № 699.—Макс., № 679.—Макс. Пух. I, p. 217.—Hoff. II, № 5784.—Gold. Sp., p. 211.—Mart., p. 127.—Pal., № 1607.

Кустарникъ въ 50—150 см. съ довольно толстымъ стволемъ и короткими, согнутыми дугою вѣткамъ; все растеніе б. ч. покрыто жесткими, почти щетинистыми, нѣсколько отстоящими волосками; листья тройчатые, на длинныхъ черешкахъ; листочки продолговато-округлые, цѣльнокрайніе, на очень короткихъ черешкахъ; цвѣты желтые, пазушные, по 2—3, иногда по 4, до 24 мм., на короткихъ цвѣтоножкахъ съ кругловатыми прицвѣтниками, распускаются вмѣстѣ съ листьями; лодочка тупая; чашечка трубчатая, до трети двугубая, трубка ея длиннѣе губъ; зрѣлый бобъ черный до 3 см., покрытъ шелковистыми волосками.

На песчаной почвѣ по опушкамъ и холмамъ. Цвѣтеть съ половины

мая до половины июня. Токарево (Ген.).—Быково, Раменское, Брн. у.; Лужки, Срп. у. (К.).—За Новымъ Рождественскимъ, Брн. у. (Макс.).—За Зибровымъ, Соколова пустынь, Никифорово, Срп. у. (П. и С.)—У полустанка Сходня, Нпк. ж. д.; Верея, Брн. у. (Х.).



Cytisus ratisbonensis.



Cytisus nigricans.

γ *C. nigricans* L. Пет. Кр. I, стр. 119.—Пет., стр. 175.—Hoff. Н., № 5779.

Кустарникъ до 1 м., вѣтви прямыя, торчащія; листья тройчатые, на длинныхъ черешкахъ, сине-зеленые, сверху голые, снизу, какъ и черешки, прижато-волосистые; листочки почти сидячіе, обратно-лицевидные или продолговатые, тупые, быстро переходятъ въ короткое остріе; цвѣты желтые, въ длинныхъ, верхушечныхъ, торчащихъ кистяхъ; лодочка заостренная; цвѣтоножка съ длиннымъ линейнымъ прицвѣтникомъ; чашечка колокольчатая, глубоко-двугубая; бобъ до 2 см., покрытъ прижатыми, серебристыми волосами. Разводится по садамъ.

216. *Ononis* L.

Чашечка 5-надрѣзная, при плодахъ открытая; нижніе 3 зубца нѣсколько длиннѣе 2 верхнихъ; лодочка заострена въ шиловидный клювъ; всѣ тычиночныя нити кверху расширены и срались въ одинъ пучокъ; бобъ вздутый, овальный, малосѣмянный.

554. *O. hircina* Jacq. Пет. Кр. I, стр. 119.—Ф. Б., № 22.—Пет., стр. 230.—Кауф. II, № 198.—Цин., № 330.—Рупр. стр. 62.—Кауф. I, стр. 123.—Lind., p. 102.—Borg., p. 699.

Ononis arvensis Smith. Дв., № 679.—Макс., № 658.

Ononis spinosa L. Дв., № 679.

Стебель до 1,5 м., тонко-бороздчатый, сильно вѣтвистый, мохнатый отъ длинныхъ, простыхъ и короткихъ железистыхъ волосковъ; листья на черешкахъ о 3 листочкахъ: два боковые—сидячіе, средній—на черешкѣ,

вѣтви—продолговатые, остро-пильчато-зубчатые, на нижней сторонѣ густо покрыты короткими железистыми волосками, отчего клейкіе и съ очень тяжелымъ запахомъ, верхняя сторона листа покрыта железками менѣе густо; прилистники овальные, крупные, стеблеобъемлющіе, по краямъ зубчатые, равны черешку листа и прираели къ нему; цвѣты попарно въ пазухахъ листьевъ, до 17 мм. дл., розовые или розовые съ бѣлымъ, къ верхушкѣ стебля и вѣтвей скучены колосовидной кистью; чашечка съ острыми, линейно-ланцетными зубцами, мохнатая; бобъ железисто-волосистый, короче чашечки, съ 2—4 бугорчатыми сѣменами.

По лугамъ и по безплоднымъ мѣстамъ; растетъ только по береговой полосѣ р. Оки, какъ въ Серпуховскомъ, такъ и въ Коломенскомъ уѣздахъ. Цвѣтетъ съ половины іюня, весь іюль. Найдено занесеннымъ у ж.-д. моста р. Лопасни (И.).

α. *spinescens* Ledb. Пет. Кр. I, стр. 120.

Вѣтви на концѣ съ колючками.



Ononis hircina.



Anthyllis vulneraria.

217. *Anthyllis* L.

Чашечка 5-зубчатая, цилиндрическая, по отцвѣтаніи закрывается и вздувается; лодочка тупая или коротко заостренная; 4 нижнихъ лепестка у основанія срались съ тычиночной трубкой; вѣнчикъ засыхаетъ и остается при плодѣ; тычинки къ верхушкѣ расширены, срались въ одинъ пучокъ; бобъ вздутый, 1—2-сѣменный, заключенъ въ чашечку.

555. *A. vulneraria* L. Пет. Кр. I, стр. 120.—Ф. Б., № 23.—Пет., стр. 138.—Кауф. II, № 199.—Мил., № 8.—Гор., № 11.—Цил., № 337.—Pinz., p. 11.—Кауф. I, стр. 123.—Lind., p. 102.—Borg., p. 699.—Дв., № 678.—Макс., № 659.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 123.—Hoff., № 248.—Pal., № 1541.

Корень деревянистый; стеблей нѣсколько въ 20—50 см., цилиндрическихъ, прямостоящихъ или приподнимающихся, мохнатыхъ отъ прижа-

тыхъ или отстоящихъ волосковъ; корневые листья эллиптическіе, на длинныхъ черешкахъ, стеблевые—перистые, съ конечнымъ болѣ крупнымъ листочкомъ и боковыми линейно-ланцетными; верхняя сторона листьевъ голая или слегка волосистая, нижняя—густо-волосистая; цвѣты конечные, въ 2—3 скученныхъ головкахъ, рѣдко головка одна; при головкѣ 2 двудлиныхъ прицвѣтника, разсѣченныхъ на 3—7 линейныхъ или ланцетныхъ долей; цвѣты блѣдно-желтые или оранжевые, до 18 мм.; чашечка вздутая, сухая, войлочнo-мохнатая; зубцы чашечки очень короткіе и неравной длины; бобъ маленькій, съ сѣтчатыми жилками.

По заливнымъ лугамъ, холмамъ и открытымъ мѣстамъ. Цвѣтетъ съ начала іюня до середины іюля. Лужки, Срп. у. (К.).—Токарево, Петровское (Мар.).—Серебряный боръ близъ Хорошова (Траутшольдъ).—Останкино (Кар.).—Горенки (Шатерниковъ).—Противъ Бавыкина. Срп. у.; Карапчеево, Кзм. у. (П.).—Б. Мытищи у шоссе; Мячково по заливному луку Москвы р., Брн. у. (С.).—Зиброво, Никифорово, Лопасня, Срп. у. (Мпл.).—Быково, Брн. у. (Куль.). Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

218. Medicágo L.

Чашечка 5-зубчатая или 5-надрѣзная; лодочка тупая; лепестки не прирасли къ трубкѣ тычинокъ; одна тычинка свободная, остальные срастись въ трубку; завязь изогнута у основанія и прилегае къ парусу; бобъ серповидный или почковидный.

1. Цвѣты лиловые.

M. sativa L.

Цвѣты желтые. 2.

2. Цвѣты мелкіе, не крупнѣе 2 мм.; бобъ почковидный, съ продольными дугообразными жилками.

M. lupulina L.

Цвѣты выше 2 мм.; бобъ согнутъ серпомъ или свернутъ почти въ кольцо, съ сѣтчатыми жилками.

M. falcata L.

556. *M. lupulina* L. Пет. Кр. I, стр. 121.—Бух. II, № 111.—Бух. I, № 105.—Ф. О., № 6, р. 86.—Пет., стр. 221.—Кауф. II, № 201.—Цин., № 342.—Кауф. I, стр. 124.—Lind., р. 102.—Ann. C. III, № 216.—Дв., № 722.—Макс., № 699.—Hoff. Н., № 6130.—Gold. C., р. 21.—Mart., р. 132.—Hoff., № 2048.—St. II, р. 45.—St. I, № 508.

Стебель 20—80 см., отъ основанія сильно вѣтвистый, съ тупыми ребрами, б. ч. лежачій, рѣже приподнимающійся или прямостоящій; листья раздѣлены длинными междоузліями, тройчатые, черешки очень разнообразной длины; листочки обратно-яйцевидные, на верхушкѣ съ маленькой выемкой и въ выемкѣ съ остріемъ, по краямъ близъ верхушки мелкозубчатые, боковые—на короткихъ черешкахъ, средній—на болѣ длинномъ; прилистники косо-яйцевидные, заостренные, почти цѣлюнокрайніе; все растение б. ч. покрыто бѣлыми, мягкими, довольно рѣдкими волосками; цвѣты блѣдно-желтые, до 2 мм., въ пазушной, продолговатой, почти головчатой кисти на длинномъ цвѣтоносѣ; цвѣтоножки короче чашечекъ;

бобъ мелкій до 2.5 мм., почти почковидный, слегка вздутый, съ продольными, дугообразными жилками.

По лугамъ, паровымъ полямъ и по опушкамъ, очень часто. Цвѣтеть съ половины іюня до осени; плоды съ конца іюля.

α. Willdenowii Boenn.

Бобы и цвѣтоножки б. или м. густо покрыты железистыми волосками. Борвиха, Зви. у.; Петрунино, Роднево, Пдл. у. (Х.). — По заливному лугу Москвы р., Мож. у. (В.). — Быково, Брн. у. (Куль.). Красный Станъ, Руз. у. (Сюз.). — Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).



Medicago lupulina.



Medicago falcata.

557. *M. falcata* L. Пет. Кр. I, стр. 121. — Бух. II, № 110. — Бух. I, № 104. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 221. — Кауф. II, № 200. — Цин., № 338. — Кауф. I, стр. 124. — Lind., p. 102. — Дз., № 721. — Макс., № 698. — Hoff. H., № 6121. — Gold. C., p. 21. — Mart., p. 132. — St. II, p. 45. — St. I, № 507. — Pal., № 1717.

Medicago falcata L. *β. media* DC. Pinz., p. 11.

Стебель 20—80 см., вѣтвистый, бороздчатый, голый или опушенный, лежачій или приподнимающийся; листья о 3 листочкахъ; средній на болѣе длинномъ черешкѣ; листочки нижнихъ листьевъ продолговатые, верхнихъ — линейно-клиновидные, всѣ у верхушки усѣченные и съ короткимъ остриемъ, верхняя треть края мелко-зубчатая; прилистники овально-ланцетные, шловидно-заостренные, нижние — зубчатые; соцветіе — пазушная, головчатая кисть на цвѣтоносѣ равномъ листу или превышающемъ его; цвѣтоножки б. ч. равны чашечкѣ; цвѣты золотисто-желтые, до 8 мм. дл.; бобъ согнутъ серпомъ или свернутъ почти въ кольцо, съ сѣтчатыми жилками.

По холмамъ, лугамъ и дорогамъ, часто. Цвѣтеть съ начала іюня до осени.

* *M. sativa* L. Пет. Кр. I, стр. 121. — Бух. II, стр. 17. — F. O., № 6, p. 86. — Pal., № 1716.

Стебель 30—80 см., вѣтвистый, прямостоящій, бороздчатый, покрытъ, какъ и все растение, тонкими прижатыми волосками; листья на довольно



Medicago sativa.

короткихъ черешкахъ о 3 листочкахъ, средній листочекъ на болѣе длинномъ черешкѣ; листочки б. ч. эллиптические, къ основанію немного суженные, верхніе — почти линейно-клиновидные, края въ верхней части мелкозубчатые, верхушка слегка выемчатая, съ короткимъ остриемъ; прилистники изъ широкаго основанія косо-ланцетные, длинно-заостренные и иногда съ наружнаго края мелкозубчатые; соцветіе — продолговатая кисть на цвѣтоносѣ равномъ листу или превышающемъ его; цвѣты лиловые, до 10 мм.; бобъ пушистый, согнутый, съ 1—3—5 оборотами и съ сѣтчатыми жилками.

Разводится, иногда дичаетъ. Цвѣтетъ съ начала іюня до осени. Петровское-Разумовское на дамбѣ (П.). — Мытищи — владѣніе

Челноковыхъ (С.). — Около Алексѣевского за Крестовской заставой (въ герб. Бот. сада). — Откосъ ж. д. подъ Серпуховымъ (Вар.). — Михайловское, паркъ, Пдл. у. (Б.). — Въ Мож. у. (Ф. О.). — Быково, Брн. у. (Куль.). — Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

219. *Melilotus* Juss.

Чашечка 5-зубчатая; лодочка тупая; лепестки не прирасли къ трубкѣ тычинокъ; одна тычинка свободная, остальные срастись въ трубку; завязь прямая; бобъ прямой, короткий, шаровидный или продолговатый, не раскрывающійся, 1—4-сѣменный, часто сѣчатый.

558. *M. officinalis* Desr. Пет. Кр. I, стр. 121. — Бух. II, № 113. — Бух. I, № 107. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 223. — Кауф. II, № 203. — Цин., № 348. — Кауф. I, стр. 125. — Lind., p. 102. — Дв., № 705. — Макс., № 683. — Hoff. H., № 5996. — Gold. C., p. 21. — Gold. Sp., p. 133. — Mart., p. 123.

Trifolium officinalis Sw. St. II, p. 45.

Trifolium Melilotus officinalis L. St. I, № 496. — Pal., № 1686.

Стебель 30—130 см., прямостоящій, вѣтвистый, въ нижней части цилиндрической, въ верхней — бороздчатый и слегка волосистый; листья тройчатые; листочки по краямъ зубчатые, средній на болѣе длинномъ черешкѣ; у нижнихъ листьевъ листочки овальные, у верхнихъ — продолговато-овальные; прилистники шиловидные, съ ясно замѣтной жилкой; цвѣточныя кисти узкія, длинныя, въ пазухахъ листьевъ;

вѣнчикъ до 5 мм., желтый; крылышки почти равны парусу и длиннѣе лодочки; бобы съ поперечными морщинками, слабо сѣтчатые, зрѣлые—желто-бурые.

По пустырямъ, около жилья и по паровымъ полямъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до осени.



Melilotus officinalis.



Melilotus albus.

559. *M. albus* Desr. Пет. Кр. I, стр. 121.—Бух. II, № 112.—Бух. I, № 106.—
F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 223.—Кауф. II, № 202.—
Цин., № 347.—Кауф. I, стр. 124.—Lind., p. 102.

Melilotus vulgaris Willd. Макс., № 684.—Hoff. Н., № 6003.—Gold. C., p. 21.—
Gold. Sp., p. 133.—Mart., p. 128.

Стебель прямостоящій, до 2 м., вѣтвистый, въ нижней части цилиндрическій, въ верхней—бороздчатый, покрытъ рѣдкими, прижатыми волосками; листья тройчатые, на черешкахъ короче листа; листочки нижнихъ листьевъ обратно-яйцевидные, верхнихъ—узко-эллиптическіе или даже линейные, по краямъ зубчатые, на верхушкѣ притупленные, съ остріемъ; средній листокъ на черешкѣ болѣе длинномъ; прилистники не большіе, почти нитевидные, съ болѣе широкимъ основаніемъ и ясно замѣтной жилкой; цвѣточная кисть длинная, напушная; цвѣты бѣлые, повислые; вѣнчикъ до 6 мм.; крылышки короче паруса и немного длиннѣе лодочки; бобы сѣтчато-морщинистые, зрѣлые—черно-бурые.

По пустырямъ, по берегамъ рѣкъ и на песчаной и известковой почвѣ. Цвѣтетъ съ половины іюня до осени. Татарово, Тушино, Спасское; Мичково, Бри. у. (К.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Лужьяки за Воробьевыми горами (П.).—Мытници (С.).—У Марына, близъ Перервы; между платформой Юдинской и 34 веретой Бри. ж. д.; Успенское, Зви. у. (Х.).

220. *Trifolium* L.

Чашечка 5-зубчатая или 5-надрѣзная; лодочка тупая; всѣ лепестки срослись между собой и прираели къ трубкѣ тычинокъ или только флагъ

свободный; вѣнчикъ засыхаетъ, остается при плодѣ и скрываетъ его; одна тычиночная нить свободная, остальные срослись въ трубку; всѣ нити или черезъ одну къ верхушкѣ расширены; завязь прямая; бобъ маленькій, овальный, 1—4-сѣмянный, не разверзающійся или разверзающійся неправильно, заключенъ въ чашечкѣ.

1. Цвѣты въ головкахъ сидѣтис; зѣвъ чашечки внутри съ волосатымъ кольцомъ. 2.

Цвѣты въ головкахъ на ножкахъ; зѣвъ чашечки внутри голый. 5.

2. Вѣнчикъ короче чашечки. *T. arvense* L.

Вѣнчикъ вдвое длиннѣе чашечки. 3.

3. Трубка чашечки снаружи голая, съ нитевидными, длинно-рѣсничатыми зубцами. *T. medium* L.

Трубка чашечки снаружи волосистая или мохнатая. 4.

4. Листочки эллиптическіе или продолговатые; чашечка о 10 жилкахъ. *T. pratense* L.

Листочки продолговато-ланцетные; чашечка о 20 жилкахъ.

T. alpestre L.

5. Цвѣты бѣлые или розовые. 6.

Цвѣты желтые, по отцвѣтаніи бурые. 8.

6. Листья снизу съ короткими волосками; чашечка съ зубцами почти равными. *T. montanum* L.

Листья снизу голые; 2 верхнихъ зубца чашечки длиннѣе остальныхъ. 7.

7. Стебель ползучій, укореняющійся. *T. repens* L.

Стебель не ползучій и не укореняющійся, но иногда лежачій, съ розеткой корневыхъ листьевъ. *T. hybridum* L.

8. Цвѣты темно-желтые, потомъ темно-бурые или черно-бурые.

T. spadicum L.

Цвѣты свѣтло-желтые, потомъ свѣтло-буроватые. 9.

9. Всѣ черешки листочковъ равные. *T. agrarium* L.

Черешокъ среднего листочка въ 3—4 раза длиннѣе, чѣмъ у боковыхъ. *T. campestre* Schreb.

560. *T. pratense* L. Пет. Кр. I, стр. 122.—Бух. II, № 116.—Бух. I, № 110.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 293.—Кауф. II, № 204.—Цви., № 353.—Кауф. I, стр. 127.—Lind., p. 104.—Ann. C. II, № 116.—Дв., № 708.—Макс., № 688.—Hoff. H., № 6046.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 129.—St. II, p. 45.—St. I, № 498.—Pal., № 1693.

Главный стебель укороченный, съ корневыми листьями, изъ пазухъ которыхъ выходятъ приподнимающіеся цвѣточвые стебли въ 20—60 см.; корневые листья на очень длинныхъ черешкахъ; листочки ихъ широко-йцеевидные или слегка обратно-сердцевидные, по краямъ очень мелко выемчато-зубчатые; стеблевые листья на короткихъ черешкахъ, эллиптическіе или продолговатые, почти цѣльпокрайніе; прилистники съ ясными

жилками, почти пленчатые, до двухъ третей приросшіе къ черешку. свободная часть быстро остиисто-заостренная; все растеніе прижато-пушистое; цвѣточная головка колючая, шаровидная, у основанія съ 2 сближенными листочками и расширенными прилистниками; въячникъ до 15 мм., пурпуровый, рѣже розовый; чашечка о 10 жилкахъ; зубцы щетиновидные, нижній вдвое длиннѣ остальныхъ.

По лугамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвѣтеть съ конца мая до осени.

α. sativum Schreb. et Hoppe. Пет. Кр. I, стр. 122.

Trifolium sativum Boenn. Mart., p. 129.

Растеніе очень крупное; стебли часто голые; головки сидятъ парно и не окружены оберткой. Разводится, иногда дичаетъ.



Trifolium pratense



Trifolium alpestre

561. **T. alpestre L.** Пет. Кр. I, стр. 123.—Пет., стр. 293.—Кауф. II, № 206.—Цин., № 351.—Pinz., p. 11.—Рупр., стр. 86.—Кауф. I, стр. 127.—Mart., p. 130.—Hoff., № 3291.—St. II, p. 45.—St. I, № 499.—Pal., № 1694.

Trifolium Alpestre L. Дв., № 710.—Макс., № 690.

Стебель 20—60 см., простой, прямостоящій, тонко-бороздчатый, съ прижатыми волосками; листья на черешкахъ, равныхъ листу или короче его; листочки по краямъ очень мелко-зубчатые, продолговато-ланцетные, съ сильно выдающимися боковыми жилками; прилистники приросшіе тремя четвертями своей длины къ черешку листа, свободная часть прилистника шиловидная, по краямъ длинно-рѣсничатая; головки часто парныя, верхушечныя, яйцевидно-шаровидныя, у основанія обыкновенно окутаны листьями; въячникъ пурпуровый, до 15 мм.; чашечка съ 20 жилками, мохнатая, съ щетиновидными, мохнатыми зубцами, изъ которыхъ нижній длиннѣ остальныхъ.

По опушкамъ и по кустарникамъ. Цвѣтеть съ половины іюня. Серпуховъ, Лужки, Срп. у. (К.).— Въ лѣсу подъ Иваньковымъ, Срп. у.

(П. и С.).—Бѣлопесочная слобода и Старая Кашира, Срп. у. (Х.).—Дракино, Срп. у.; Горы, Клм. у. (Мпл.).—Городищи на р. Коломенкѣ, Клм. у. (Макс.).—Бѣлые Колодези, Клм. у. (П.).—Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

562. *T. médium* L. Пет. Кр. I, стр. 122.—Бух. II, № 117.—Бух. I, № 111.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 293.—Кауф. II, № 205.—Цин., № 352.—Pinz., p. 11.—Кауф. I, стр. 127.—Lind., p. 104.—Ann. C. I, № 14.—Дв., № 709.—Макс., № 689.—Gold. C., p. 21.

Trifolium flexuosum Jacq. Дв., № 709.—Макс., № 689.—Макс. Пут. I, p. 92.—Mart., p. 129.

Trifolium carneum. Mart., p. 129 (съ цвѣтами тѣлеснаго цвѣта).

Стебель 20—80 см., приподнимающийся, вѣтвистый, въ междоузліяхъ часто согнутъ колѣномъ, тонко-бороздчатый, съ рѣдкими, прижатыми волосками; листья на длинныхъ черешкахъ;



Trifolium medium.

листочки по краямъ рѣсничатые, сверху голые, снизу блѣднѣе и особенно на срединной жилкѣ прижато-волосистые; нижніе — яйцевидные, верхніе — яйцевидно-ланцетные; прилистники узко-ланцетные; головка шаровидная или яйцевидная, на ножкѣ; вѣнчикъ пурпуровый, до 20 мм.; трубка чашечки съ 10 жилками, снаружи голая, съ нитевидными длинно-рѣсничатыми зубцами, изъ которыхъ нижній длиннѣе остальныхъ.

По лѣсамъ и кустарникамъ. Цвѣтетъ съ половины іюня до осени. Воробьевы горы, Кунцово, Черемушки, Лизаветино (К.).—Мытищи (С.).—Косино, Останкино, ст. Ново-Удѣльная, М.-Каз. ж. д. (Х.).—Михайловское, Масловскій лѣсъ, Пдл. у. (Б.).—Семеновское на Нарѣ, Срп. у. (Макс.).—Серпуховъ. Бѣлые Колодези. Клм. у. (П.).—Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

563. *T. arvense* L. Бух. II, № 118.—Бух. I, № 112.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 292.—Кауф. II, № 207.—Цин., № 350.—Кауф. I, стр. 128.—Lind., p. 104.—Ann. C. I, № 15.—Дв., № 711.—Hoff., H., № 6012.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 130.—Hoff., № 3294.—St. II, p. 45.—St. I, № 501.—Pal., № 1697.

Стебель 10—50 см., прямостоящій, почти отъ основанія вѣтвистый, покрытъ какъ и все растеніе, мягкими, бѣлыми волосками; листья на короткихъ черешкахъ; листочки линейно-продолговатые, спереди мелкозубчатые, часто съ выемкой; прилистники нижнихъ листьевъ ланцетно-шиловидные, верхнихъ — яйцевидные, равны черешку листа; головки на длинныхъ цвѣтоносахъ, сперва продолговато-шаровидныя, потомъ почти цилиндрическія; вѣнчикъ до 3—4 мм., короче чашечки, блѣдно-розовый;

чашечка мохнато-волосистая, съ 10 жилками и длинными щетино-шиловидными зубцами.

По паровымъ полямъ, мекамъ и по разрабатываемымъ торфянымъ болотамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до осени; плоды съ половины августа.



Trifolium arvense.



Trifolium montanum.

564. *T. montanum* L. Бух. II, № 120.—Бух. I, № 114.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 293.—Кауф. II, № 208.—Цин., № 356.—Pinz., p. 11.—Кауф. I, стр. 128.—Lind., p. 104.—Ann. C. II, № 117.—Дв., № 712.—Макс., № 691.—Hoff. H., № 6037.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 130.—St. II, p. 45.—St. I, № 502.—Pal., № 1702.

Стебли до 60 см., выходить изъ пазухъ корневыхъ листьевъ, бороздчатые, покрыты прижатыми волосками; корневые листья на очень длинныхъ черешкахъ, верхніе стеблевые—почти сидячіе; листочки узко-эллиптическіе, мелко- и остро-зубчатые, по краю со множествомъ утолщенныхъ жилокъ, снизу б. ч. съ прижатыми волосками; прилистники яйцевидно-ланцетные, шиловидно-заостренные; головки на длинныхъ цвѣтоносахъ; вѣдчикъ до 9 мм., бѣлый; цвѣтоножка въ 3 раза короче трубки чашечки, послѣдняя о 10 жилкахъ, съ рѣдкими волосками; зубцы ея ланцетно-шиловидные, почти все равной длины.

По лугамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины мая до осени; плоды съ половины іюля.

565. *T. répens* L. Пет. Кр. I, стр. 122.—Бух. II, № 119.—Бух. I, № 113.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 294.—Кауф. II, № 209.—Цин., № 357.—Pinz., p. 11.—Кауф. I, стр. 129.—Lind., p. 104.—Ann. C. I, № 16.—Дв., № 707.—Макс., № 687.—Hoff. H., № 6050.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 129.—Hoff., № 3322.—St. II, p. 45.—St. I, № 497.—Pal., № 1691.

Стебель 10—50 см., ползучий, вѣтвистый, бороздчатый голый или съ очень рѣдкими волосками; листья на длинныхъ черешкахъ; листочки обратно-яйцевидные или обратно-сердцевидные, по краямъ мелко- и остро-зубчатые, голые, съ нижней стороны лоснящиеся (очень рѣдко встрѣчается съ пятерными листьями, это—*T. pentaphyllum* Mart.); прилистники пленчатые, яйцевидные, быстро-заостренные въ остъ; головки шаровидныя, на длинныхъ, бороздчатыхъ цвѣтоносахъ, превышающихъ листья; цвѣтоножки среднихъ цвѣтовъ длиною равны трубкѣ чашечки; вѣнчикъ до 11 мм., бѣлый, часто тѣлеснаго цвѣта, позднѣ бурый; чашечка голая, зубцы ея ланцетные и два зубца длиннѣ остальныхъ.

Около жилья, по паровымъ полямъ, по дорогамъ и лугамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ конца мая до осени; плоды съ половины августа.



Trifolium repens.



Trifolium hybridum.

566. *T. hybridum* L. Бух. II, № 121. — Бух. I, № 116. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 294. — Кауф. II, № 210. — Цин., № 358. — Pinz., p. 11. — Кауф. I, стр. 129. — Lind., p. 104. — Ann. C. II, № 118. — Дв., № 706. — Макс., № 686. — Hoff. H., № 6031. — Gold. C., p. 21. — Gold. Sp., p. 134. — Mart., p. 129. — St. II, p. 45. — Pal., № 1690.

Trifolium elegans Savi. Бух. I, № 115.

Корневище толстое, несетъ нѣсколько прямостоящихъ или приподнимающихся, бороздчатыхъ, голыхъ стеблей въ 15—50 см., съ полыми междоузліями и у основанія съ розеткой корневыхъ листьевъ на длинныхъ черешкахъ; листочки голые, эллиптическіе или продолговато-яйцевидные, по краямъ мелко- и остро-зубчатые, съ каждой стороны съ 20 боковыми жилками; прилистники яйцевидно-ланцетные, постепенно заостренные; головки шаровидныя, на цвѣтоносахъ б. ч. превышающихъ листья; вѣнчикъ до 10 мм., бѣлый, потомъ розовый; чашечка голая съ шиловидными зубцами.

По сырымъ лугамъ, огородамъ и пустырымъ, часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до осени; плоды съ половины августа.

α. elegans Savi.

Trifolium elegans Savi. Пет. Кр. I, стр. 122. — F. O., № 6, p. 86. — Кауф. II, № 211. — Pinz., p. 11. — Кауф. I, стр. 129.

Стебли лежащіе, къ верхушкѣ опушенные, съ плотными междоузліями; листочки съ 40 боковыми жилками; вѣнчикъ до 8 мм. дл. По дорогѣ изъ Иванькова въ Братцово (К.). — Въ Мож. у. (Ф. О.). — Находится въ гербаріи Макеймовича подъ именемъ *T. hybridum* L.



Trifolium hybridum x elegans



Trifolium spadiceum.

567. *T. spadiceum* L. Бух. II, № 114. — Бух. I, № 108. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 294. — Кауф. II, № 212. — Цин., № 359. — Кауф. I, стр. 130. — Lind., p. 104. — Ann. C. II, № 119. — Дв., № 713. — Макс., № 692. — Hoff. II, № 6055. — Gold. C., p. 21. — Mart., p. 130. — Hoff., № 3326. — St. II, p. 45. — St. I, № 504. — Pal., № 1704.

Стебель 15—40 см., прямостоящій или слегка приподнимающійся, покрытъ прижатыми волосками; листья на черешкахъ, б. ч. голые; листочки обратно-яйцевидные или эллиптическіе, по краямъ мелко-зубчатые, верхушка у нижнихъ листочковъ выемчатая; прилистники продолговато-ланцетные, острые; головки яйцевидныя, потомъ продолговато-цилиндрическія, на длинныхъ цвѣтоносахъ, вдвое превышающихъ листья; вѣнчикъ до 5 мм., сперва оранжевый, потомъ темно-бурый; флагъ согнутъ шлемомъ съ самаго основанія; крылышки вытянуты впередъ; столбикъ вчетверо короче боба; чашечка съ ланцетовидными зубцами, края которыхъ усажены рѣдкими волосками; 2 зубца чашечки короткихъ и 3 вдвое длиннѣе.

По сырымъ лугамъ и на торфяной почвѣ, часто. Цвѣтетъ съ начала іюня весь июль. Давыдково, Фили, Косино, Царицыно (К.). — Мытищи (С.). — Воробьевы горы (П.). — Михайловское, Пдл. у. (В.). — Вблизи платформы Катуаръ, Савеловск. ж. д. (Х.). — Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

568. *T. agrarium* L. Бух. II, № 115. — Бух. I, № 109. — Ф. О., № 6, p. 86. — Пет., стр. 294. — Кауф. II, № 213. — Цин., № 360. — Кауф. I, стр. 130. — Lind., p. 104. — Ann. C. I, № 18. — Дв., № 714. — Макс., № 693. — Hoff. H., № 6004. — Gold. C., p. 21. — Mart. p. 131. — St. II, p. 45. — St. I, № 503. — Pal., № 1703.



Trifolium agrarium.

Стебель 20—40 см., прямостоящий, иногда приподнимающийся, покрыть прижатыми волосками, б. ч. сильно вѣтвистый; листья на голых черешках; листочки продолговато-йцевидные, въ верхней части мелко- и остро-зубчатые, иногда съ выемкой, б. ч. голые, рѣже покрыты разсѣянными волосками; прилистники сросшіеся съ черешкомъ, прямо вверхъ торчащіе, съ продольными, параллельными жилками; головки пазушные и конечные, шаровидныя или овальныя, на цвѣтоносахъ, равныхъ листьямъ или превышающихъ ихъ; вѣнчикъ до 6 мм., сперва желтый, потомъ свѣтло-бурый; флагъ у основанія сжатъ съ боковъ, спереди расширенъ ложкой; крылья расходятся въ стороны; чашечка голая, съ 2 короткими и 3 длинными зубцами; столбикъ на треть короче боба.

По холмамъ, открытымъ мѣстамъ, кустарникамъ и паровымъ полямъ, очень часто. Цвѣтеть съ конца іюня до осени.

569. *T. campêtre* Schreb. Пет. Кр. I, стр. 124. — Дв., № 715. — Макс., № 694. — Mart., p. 131.

Trifolium procumbens L. *z. majus* Koch. Кауф. I, стр. 130.

Trifolium procumbens L. Пет., стр. 294. — Кауф. II, № 214. — Гор., № 23. — Цин., № 361. — Дв., № 716. — Макс., № 695. — Mart., p. 131. — St. I, № 505.



Trifolium campestre.

Стебель 20 — 40 см., прямостоящий или приподнимающийся, б. ч. сильно- и растопыренно-вѣтвистый, покрыть мелкими прижатыми волосками; листья б. ч. голые; листочки обратно-йцевидные, мелко- и остро-зубчатые, спереди б. ч. съ выемкой и въ выемкѣ съ остріемъ; черешокъ среднего листочка въ 3—4 раза длиннѣе, чѣмъ у боковыхъ; прилистники яйцевидные, острые рѣсничатые, часто съ завернутыми краями; головки пазушныя, рѣже почти шаровидныя, на цвѣтоносахъ, не превышающихъ листья; вѣнчикъ до 6 мм., желтый, потомъ свѣтло-бурый; флагъ съ ясными жилками, у основанія сжатъ съ боковъ, спереди расширенъ ложкообразно;

чашечка голая, съ рѣзко выступающими жилками; столбикъ во много разъ короче боба.

По паровымъ полямъ, пашнямъ и на известнякахъ, очень рѣдко. Цвѣтетъ въ июлѣ и августѣ. Хотьичи, Вгр. у., и Каралчесво, Клм. у. (Кл.).

221. *Lótus L.*

Чашечка 5-зубчатая или 5-надрѣзная; лодочка заострена въ клювъ и вверхъ согнута; вѣничикъ опадаетъ; одна тычинка свободная; столбикъ постепенно утонченный; бобъ линейный, двустворчатый, прямой, многосѣмный; створки скручиваются спирально.

570. *L. corniculátus L.* Бух. II, № 122.—Бух. I, № 117.—Ф. О., № 6, p. 86.—Пет., стр. 217.—Кауф. II, № 215.—Цин., № 364.—Кауф. I, стр. 131.—Lind., p. 104.—Ann. C. III, № 217.—Дв., № 719.—Макс., № 697.—Hoff. H., № 6076.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 131.—Hoff., № 1947.—St. II, p. 45.—St. I, № 506.

Стебли 10—40 см., лежаціе или приподнимающіеся, вѣтвистые, съ тупыми ребрами, голые или покрытые волосками; листья тройчатые, на короткихъ черешкахъ; листочки обратно-яйцевидные, цѣльнокрайніе, тупые или слегка заостренные, б. ч. голые; прилистники почти сидячіе, широко-яйцевидные, б. ч. косые; цвѣты въ 2—7-цвѣтковыхъ зонтикахъ, на длинныхъ пазушныхъ цвѣтоносахъ; вѣничикъ до 15 мм., ярко-желтый; парусъ оранжевый; крылья усѣченные, нѣсколько уже лодочки, согнутой подъ прямымъ угломъ и быстро заостренной въ носикъ; зубцы чашечки изъ треугольнаго основанія, шиловидные; бобъ цилиндрическій, до 25 мм., съ 2 нѣсколько возвышенными швами.



Lotus corniculatus

По лугамъ и пустырямъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до осени.

α. ciliátus Koch.

Листья и чашечка по краямъ рѣсничатые, покрыты довольно длинными волосками. Мытищи (С.).—Вешняки, Мос. у. (Х.).—Быково, Брн. у. (Куль.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.).—Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

* *Caragána Royen.*

Чашечка коротко-трубчатая, у основанія часто съ выпуклиной, съ 5 короткими зубцами; лодочка тупая; столбикъ нитевидный, съ рыльцемъ

какъ бы обрубленнымъ; одна тычиночная нить свободная; цвѣтоножки сочлененныя; бобъ сначала сплюснутый, потомъ почти цилиндрическій, многосѣмный, съ кожистыми створками.

1. Листья о 4—8 парахъ.

C. arborescens Lam.

Листья о 2 парахъ сближенныхъ листочковъ 2.

2. Листочки клиновидно-обратно-яйцевидные; цвѣтоножки сочленены выше середины.

C. frutex (L.) K. Koch.

Листочки линейно-клиновидные; цвѣтоножки сочленены въ самой срединѣ или ниже середины.

C. pugnata DC.

* *C. arborescens* Lam. Пет., стр. 155.—Кауф. II, стр. 129.—Цин., № 136.—Кауф. I, стр. 132.

Robinia Caragana L. Дв., № 700.—Hoff. H., № 5788.—Mart., p. 127.—St. II, p. 44.—St. I, № 492.—Pal., № 1614.

Кустарникъ до 5 м., съ вверхъ торчащими вѣтками; листья парноперистые, о 4—8 парахъ; листочки продолговато-эллиптическіе, цѣльнокрайніе, на верхушкѣ съ остриемъ; вмѣсто непарнаго листочка, маленькое мягкое остроконечіе; прилистники колючіе; цвѣты пучками на довольно длинныхъ цвѣтоножкахъ съ сочлененіемъ выше середины; вѣнчикъ желтый, до 20 мм.; чашечка съ очень короткими зубцами въ 5—6 разъ короче трубки; стручокъ голый, доснающійся, 4—6 см.

Разводителъ, иногда дичаетъ. Цвѣтетъ съ половины мая и въ началѣ іюня.



Caragana arborescens.



Caragana frutex.

* *C. frutex* (L.) K. Koch.

Caragana frutescens DC. Пер., стр. 155.

Robinia frutescens L. Pal., № 1617.

Сильно вѣтвистый кустарникъ до 1,5 м.; листья на короткихъ черешкахъ о 4 сближенныхъ листочкахъ, клиновидно-обратно-яйцевидныхъ, цѣльнокрайнихъ, на верхушкѣ слегка выемчатыхъ и въ выемкѣ съ остриемъ; вмѣсто непарнаго листочка, маленькое остроконечіе; прилистники

плоскатыя, безъ колючки, рѣже съ колючкой; цвѣты одиночныя; цвѣтоножка длинная, съ сочлененіемъ выше середины; вѣнчикъ до 20 мм., желтый; чашечка колокольчатая, у основанія съ выпуклиной; зубцы ея треугольныя, въ 4 раза короче трубки, по краямъ пушистыя; стручокъ до 3 см.

Разводится по садамъ. Цвѣтеть съ конца мая.

* *C. pygmaea* DC. Пет., стр. 155.

Robinia pygmaea L. Pal., № 1618.

Не высокій кустарникъ до 60 см., съ длинными, изогнутыми вѣтвями, колючими отъ оставшихся черешковъ прошлогоднихъ листьевъ; листья почти сидячіе, о 2 очень сближенныхъ парахъ, оканчиваются колючкой; листочки линейно-клиновидные, на верхушкѣ округлые, съ остріемъ; прилистники колючіе; цвѣты одиночныя, пазушныя до 20 мм., желтые; чашечка безъ мѣшковидной выпуклинны, но только съ маленькимъ возвышеніемъ, зубцы ея опушенные; цвѣтоножка сочленена въ самой срединѣ или ниже середины; стручокъ въ молодости покрытъ прижатыми, серебристыми волосками, потомъ почти голый.

Разводится, привитая на *C. arborescens* образуетъ не большое дерево съ повислыми вѣтвями.



Caragana pygmaea.

222. *Astrágalus* L.

Чашечка колокольчатая или трубчатая, 5-зубчатая или 5-надрѣзная; лодочка тупая; столбикъ голый нитевидный; одна тычиночная нить свободная; бобъ часто на плодоножкѣ, вслѣдствіе вдавленнаго внутрь нижняго шва двугибдный или не вполне двугибдный, многосѣмный, вскрывается двумя створками.

1. Цвѣты желтые или зелено-желтые. 2.

Цвѣты фіолетовые. 3.

2. Листья и плоды голые; бобы линейные, тупо-трехгранные.

A. glycyphyllus L.

Листья и плоды волосистые; бобы шаровидные, вздутые.

A. Cicer L.

3. Листья о 7—9 листочкахъ; цвѣточная кисть рѣдкая; цвѣтоножки длиннѣе прицвѣтниковъ.

A. arenarius L.

Листья о 15—27 листочкахъ; цвѣточная кисть частая, почти головчатая; прицвѣтники длиннѣе цвѣтоножекъ.

A. danicus Retz.

571. *A. Cicer* L. Пет. Кр. I, стр. 126.—Пет., стр. 143.—Кауф. II, № 218.—Дан., № 378.—Рупр., стр. 62.—Кауф. I, стр. 134.—Pal., № 1664.

Стебель 20—100 см., лежачий, б. ч. спльно вѣтвистый, бороздчатый покрытъ, какъ и все растеніе, короткими, прижатыми волосками; листья непарноперистые, о 6—13 парахъ; листочки продолговато-эллиптическіе или ланцетные, съ обѣихъ сторонъ притупленные, съ очень маленькимъ остриемъ на верхушкѣ; прилистники ланцетные, не сросшіеся; цвѣточные головки густыя, продолговатыя, пазушныя, на цвѣтоносахъ, не превышающихъ листья; вѣнчикъ блѣдно-желтый, до 16 мм.; прицвѣтники рѣсничатые, б. ч. равны чашечной трубкѣ; чашечка и бобъ покрыты черными волосками; бобы вздутые, яйцевидно-шаровидные, съ кривымъ, загнутымъ носикомъ.



Astragalus Cicer.

По холмамъ и сухимъ мѣстамъ, на пескѣ и известнякахъ. Цвѣтетъ съ половины іюня до конца іюля; плоды съ половины іюля. Серпуховъ, Лужки, Срп. у.; Карачеево, Ккм. у. (К.).—Дракино, Срп. у. (С.).—Бѣлые Колодези, Ккм. у. (П.).—Горы, Протопопово, Клычево, Акатьево, Ккм. у.; Зиброво, устье Лопасни, Срп. у. (Мпл.).—Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

572. *A. glycyphylus* L. Бух. II, стр. 18.—Пет., стр. 143.—Кауф. II, № 219.—Цин., № 379.—Рупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 134.—Lind., p. 104.—Дв., № 702.—Макс., № 680.—Макс. Пум. I, p. 92.—Pal., № 1665.

Astragalus glycyphylus L. Пет. Кр. I, стр. 127.—Ф. В., № 24.—Гор., № 10.—Ann. C. III, № 218.—Mart., p. 128.—Hoff., № 407.—St. II, p. 44.—St. I, № 494.

Стебель до 1.5 м., лежачий, вѣтвистый, бороздчатый, голый или слабо опушенный; листья парноперистые, о 4—7 парахъ; листочки на короткихъ черешкахъ, эллиптическіе, на концѣ округлые, снизу блѣднѣе; прилистники овальные, заостренные, не сросшіеся; цвѣточная кисть овальная, на цвѣтоносѣ короче листа; вѣнчикъ желто-зеленый, до 16 мм.; цвѣтоножки короче чашечки и узколанцетныхъ прицвѣтниковъ; чашечка почти колокольчатая, голая, часто по краямъ рѣсничатая; бобъ линейный, тупо-трехгранный, согнутый, голый.



Astragalus glycyphylus

По лугамъ, кустарникамъ и холмамъ, не часто. Цвѣтетъ съ половины іюня, весь іюль. Три горы (герб. Ген.).—Куцково, Царицыно (Мар.).—По берегу р. Сѣтунъ близъ дачи Про-

хорова (А.).—Горенки (Шатерниковъ).—Архангельское, Зви. у.; Подольскъ по р. Протвѣ (К.).—На Пахрѣ близъ д. Городки, Пдл. у. (Я. В. Байковъ).—Дубровицы, Пдл. у. (Г.).—Константиновка, Пдл. у. (Х.).—Борисово, Срп. у. (М.).—Бавыкино, Срп. у. (Ш.).—Между Костинимъ и Краснымъ Станомъ, Руз. у.; въ Вереѣ (П. и Ч.).—Между Васильевымъ и Санинымъ и близъ д. Григорово, Руз. у. (Экс. Бот. Лаб.).—Дубровка, Руз. у. (Г. О.).—Звенигородъ, Саввинскій монастырь; Бѣлые Колодези, Кзм. у.; близъ Котина, Руз. у. (П.).—Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

573. A. dānicus Retz.

Astragalus hypoglottis L. Пет. Кр. I, стр. 126.—Кауф. II, № 216.—Цин., № 371.—Кауф. I, стр. 133.—Mart., № 682.

Astragalus hypoglottis L. Пет., стр. 143.—Гор., № 24.

Astragalus Glaux. St. II, p. 45.

Стебель 8—30 см., лежачій или приподнимающійся, вѣтвистый, покрытъ, какъ и все растеніе, довольно частыми, прижатыми волосками; листья непарноперистые, о 7—13 парахъ; листочки продолговато-овальные или продолговато-линейные, на верхушкѣ съ выемкой; прилистники травянистые, сросшіеся и супротивные черешку листа; цвѣточные головки шаровидныя или яйцевидныя, на длинныхъ цвѣтоносахъ; вѣнчикъ фіолетовый, до 16 мм.; прицвѣтники длиннѣе цвѣтоножекъ и вдвое короче чашечной трубки; чашечка цилиндрическая, вдвое короче вѣнчика, покрыта, какъ бобъ и часть цвѣтоноса, черными волосками; бобъ округло-овальный, прямой, почти сидячій, до 8 мм.



Astragalus danicus.

На заливныхъ лугахъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ начала мая. Клинь (Макс.).—Карачарово на Волгѣ, Кзм. у.; Бѣлопесочная слобода на Окѣ, Срп. у.; Дракино, Срп. у. (Ш.).—Серпуховъ, заливной лугъ у ж.-д. моста (Тор. и М.).—Лужки. Зиброво, Никифорово, Срп. у. (Экс. Бот. Лаб.).—Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

574. A. arenārius L. Пет. Кр. I, стр. 126.—Пет., стр. 143.—Кауф. II, № 217.—Цин., № 374.—Pinz., p. 11.—Рупр., стр. 87.—Кауф. I, стр. 133.—Lind., p. 104.—Ann. C. I, № 18.—Дв., № 703.—Макс., № 681.—Hoff. Н., № 5888.—Pal., № 1672.

Стебель 10—40 см., лежачій или приподнимающійся, покрытъ, какъ и все растеніе, прижатыми, двураздѣльными, серебристыми волосками; листья непарноперистые, о 3—8 парахъ; листочки на короткихъ черешкахъ, продолговато-линейные, къ верхушкѣ немножко расширенныя и б. ч. тупые; прилистники пленчатые, сросшіеся, супротивны черешку листа; цвѣты въ рѣдкѣй, 4—8-цвѣтковой кисти, на цвѣтоносѣ б. ч. превышающ-

щемъ листь; вѣнчикъ красновато-лиловый или блѣдно-лиловый, до 17 мм.; двѣтожка длиннѣе прицвѣтниковъ; чашечка трубчатая, зубцы ея вчетверо и болѣе короче трубки; бобы продолговатые, на ножкахъ длиною съ чашечную трубку.

На песчаной почвѣ, по дорогамъ, холмамъ и сосновымъ лѣсамъ. Цвѣтетъ съ половины іюня до половины августа. Звенигородъ (Дв.).—Между Троицкимъ и Щукинымъ (А.).—Архангельское, Звн. у.; Лужки, Срп. у. (К.).—Симоновъ монастырь, Серебряный боръ близъ Хорошова; Соколова пустынь, Срп. у. (П.).—Введенское, Звн. у. (гр. М. Гудовичъ).

a. glabréscent Rchb.

Astragalus arenarius L. forma *glabra* Petunnikov. Пет. Кр. I, стр. 126.

Растеніе почти голое; листочки голые заостренные; бобъ почти голый. Симоновъ монастырь, Тюфелева роща, Серебряный боръ близъ Хорошова (П.).



Astragalus arenarius.



Coronilla varia.

223. *Coronilla* L.

Чашечка колокольчатая, вслѣдствіе неполнаго срастанія двухъ верхнихъ зубцовъ почти двугубая; лодочка заострена клювомъ и согнута вверхъ; тычинки сверху нѣсколько расширены, одна изъ нихъ свободная; бобъ линейный, цилиндрическій, почти 4-гранный, членистый, распадается на односеменные членики.

575. *C. varia* L. Пет. Кр. I, стр. 127.—Ф. Б., № 25.—Пет., стр. 171.—Кауф. II, № 220.—Цин., № 429.—Pinz., p. 11.—Рузр., стр. 86.—Кауф. I, стр. 135.—Дв., № 701.—Макс., № 678.—Макс. Пут. II, p. 10.—Mart., p. 127.—Hoff., № 1016.—St. II, p. 44.

Стебель 30—100 см., голый, приподнимающійся, вѣтвистый, бороздчатый; листья непарноперистые, голые, о 5—11 парахъ, съ очень короткимъ черешкомъ; листочки широки- или узко-эллиптическіе, на короткихъ черешкахъ, б. ч. округлые и съ маленькимъ остріемъ; прилистники очень

маленькіе ланцетные, свободные; зонтикъ 10—20-цвѣтковый, на длинныхъ цвѣтоносѣхъ, б. ч. превышающихъ листья; вѣнчикъ до 14 мм.; наружъ розовый. крылья и лодочка почти бѣлые, клонъ темно-красный; цвѣтоножка втрое длиннѣе чашечки, у основанія съ очень маленькимъ прицвѣтникомъ; стручокъ членистый, распадающійся, съ остроконечіемъ.

По холмамъ, кустарникамъ и опушкамъ. Цвѣтетъ съ начала іюня до половины іюля; плоды съ начала августа. Лужки, Зиброво, устье Лопасни, Дракино, Сри. у.; Горы, Бѣлые Колодези, Протопопово, Карачеево, Кзм. у. (Мил.).—Клычево, Бачманово, Кзм. у. (П.).—Семеновское на Нарѣ, Сри. у. (Макс.).—Лопасня у ж.-д. моста, Сри. у. (П.).—Рождествено на Нарѣ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).

a. hirsuta Maxim. Пет. Кр. I, стр. 128.—Макс. Пут. II, р. 10.

Поверхность листьевъ пушистая. Протопопово, Кзм. у. (Макс.).

224. *Onobrychis* Tourn.

Чашечка 5-раздѣльная, зубцы ея длиннѣе трубки; лодочка скошенная; одна тычиночная нить свободная только отчасти; плодъ—не раскрывающійся, односемянный твердый орѣшекъ, сѣтчато-морщинистый, сплюснутый, обратно-овальный, верхній край его толстый, прямой, нижній—тонкій, согнутый, крылато-килеватый, гребенчатый или зазубренный.

576. *O. viciaefolia* Scop.

Onobrychis sativa Lam. Пет. Кр. I, стр. 128.—Ф. Б., № 26.—Пет., стр. 230.—Кауф. II, № 221.—Мил., № 9.—Гор., № 13.—Цян., № 344.—Рупр., стр. 86.—Кауф. I, стр. 135.

Hedysarum Onobrychis L. Макс. Приб., стр. 215, sub № 682.—Pal., № 1646.

Стебель до 1 м. внизу восходящій, потомъ прямостоящій, голый. бороздчатый, мало вѣтвистый; листья на черешкахъ, непарноперистые, о 6—13 парахъ; листочки на короткихъ черешкахъ, овальные или линейные, на концѣ часто съ остріемъ, снизу съ выступающими жилками и слегка шелковисто-опушенные, рѣже голые; цвѣточная кисть многоцвѣтковая, длинная, на длинномъ цвѣтоносѣ, во много разъ превышающемъ листь; цвѣты до 12 мм., на очень короткихъ цвѣтоножкахъ, розовые съ темными жилками; крылышки длиннѣе трубки чашечки, но короче ея зубцовъ; чашечка пушистая, зубцы ея вдвое длиннѣе трубки; плодъ—орѣшекъ, округлый, пушистый, на краю и по морщинкамъ съ шиповатыми зубцами.

По открытымъ мѣстамъ и по берегамъ рѣкъ, иногда разводится и дичаетъ. Цвѣтетъ съ половины мая до конца іюля. Близъ Коломны (Макс.).—Лопасня у ж.-д. моста, Сри. у. (П.).—Серпуховъ у Владычнаго монастыря (Экс. Бот. Лаб.).—Дуб-



Onobrychis viciaefolia

ровицы. Пдл. у. (Г.).—Софьино на Москвѣ р. у шлюза. Бря. у.; Андреевское на Москвѣ р. Пдл. у. (П.).—Красный Станъ на Москвѣ р. Руз. у. (Сюз.).—Ст. Поваровка, Ник. ж. д. (С.).

225. *Ervum* L.

Чашечка 5-раздѣльная; одна тычинка свободная; столбикъ нитевидный. подъ рыльцемъ съ волосками на всей окружности; трубка тычинокъ скошенная; бобъ одногнѣздный. 1—4-сѣменный; цвѣты очень мелкіе.

577. *E. hirsutum* L. Бух. II, № 129. — Бух. I, № 126. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 185. — Кауф. II, № 230. — Цвн., № 400. — Кауф. I, стр. 140. — Lind. p. 104. — Ann. C. III, № 219. — Дв., № 697. — Макс., № 676. — Gold. C., p. 21. — Gold. Sp., p. 133. — Mart., p. 126. — St. II, p. 43. — St. I, № 491.



Ervum hirsutum.

Стебель 20—60 см., слабый. лазящій. бороздчатый. покрытый короткими рѣдкими волосками; листья о 7—10 парахъ, оканчиваются вѣтвистымъ усикомъ; листочки продолговато-линейные или линейные, на концѣ усѣченные или выемчатые, съ очень маленькимъ остриемъ; прилистники полустрѣловидные, б. ч. цѣльнокрайніе; кисть о 2—8 цвѣтахъ; цвѣтонось такой же длины, какъ листъ; вѣнчикъ 3—4 мм., бѣлый или голубовато-бѣлый; чашечка пушистая, зубцы ея равны чашечной трубкѣ; бобъ пушистый, черноватый, продолговато-ромбическій, о 2 буроватыхъ сѣменахъ съ черными точками.

На паровыхъ поляхъ, въ посѣвахъ и на огородахъ, очень часто. Цвѣтетъ

съ половины іюня до половины августа.

a. fissum G. Fröl.

Нѣкоторые стрѣловидные придатки прилистниковъ расщеплены на 2—4 щетинковидныя дольки. Петрушино. Пдл. у.; 17 верста Брянск. ж. д. (X.).

578. *E. tetraspermum* L. Бух. II, № 128. — Бух. I, № 125. — Пет., стр. 186. — Кауф. II, № 231. — Цвн., № 401. — Кауф. I, стр. 141. — Дв., № 696. — Макс., № 677. — Gold. C., p. 21. — Mart., p. 126. — St. II, p. 43. — St. I, № 490. — Pal., № 1599. —

Стебель 20—60 см., слабый. лазящій. простой или вѣтвистый, бороздчатый, почти голый; листья о 3—4 парахъ, оканчиваются простымъ или вѣтвистымъ усикомъ; листочки линейные или линейно-ланцетные, тупые, съ очень короткимъ остриемъ; прилистники ланцетные, цѣльнокрайніе или съ зубцомъ б. или м. длиннымъ, отогнутымъ; кисть 1—2-цвѣтковая, равна

листу; вѣнчикъ 5—6 мм. бѣловатый; флагъ лиловый. крылья голубоватые; чашечка голая, зубцы ея треугольно-ланцетные, короче трубочки; бобъ голый, въ 1,5—2 см., свѣтло-бурый, продолговато-линейный, о 4 сѣменахъ; сѣмена почти шаровидныя, зелено-бурыя съ темными пятнышками.

По заливнымъ лугамъ, на пескѣ и по полямъ. Цвѣтеть съ половины іюня, весь июль. Петрово, Братцово (К.).—Опушка Серебрянаго бора близъ Хорошова; Заозерье и Боровскій курганъ, Ври. у. (Н. и С.). Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).



226. Vicia L.

Чашечка 5-зубчатая. нѣсколько косая, б. ч. два верхнихъ зуба нѣсколько короче трехъ нижнихъ; одна тычиночная нить свободная; трубка тычинокъ скошенная; столбикъ кругомъ волосистый или снаружн боро-датыи; бобъ сплюснутый, двустворчатый, одногнѣздный. 2—много-сѣменный.

1. Цвѣты по 2—5 въ очень короткихъ кистяхъ или по 1—2 въ па-зухахъ листьевъ. 2.

Цвѣты въ густыхъ кистяхъ на длинныхъ цвѣтоносахъ. 5.

2. Цвѣты бѣлые, крылья съ темнымъ пятномъ. *V. Faba* L.
Цвѣты лиловые или малиновые. 3.

3. Кисти 2—5-цвѣтковые; цвѣты грязно-лиловые; зубцы чашечки неравные. *V. sepium* L.

Цвѣты по 1—2 въ пазухахъ листьевъ, пестрые или малиновые; зубцы чашечки почти равные. 4.

4. Цвѣтокъ пестрый: флагъ голубой. крылья малиновыя, лодочка бѣлая. *V. sativa* L.

Цвѣтокъ малиновый. *V. angustifolia* Roth.

5. Листочки продолговато-линейные или ланцетные. 6.

Листочки округло- или продолговато-яйцевидные. 7.

6. Отгибъ паруса длиною съ ноготокъ; рубчикъ сѣмени огибаеъ треть его окружности. *V. Cracca* L.

Отгибъ паруса вдвое длиннѣе ноготка; рубчикъ сѣмени огибаеъ четверть его окружности. *V. tenuifolia* Roth.

7. Цвѣты желтые. *V. pisiformis* L.

Цвѣты свѣтло-лиловые или красно-лиловые. 8.

8. Вѣнчикъ бѣлый или свѣтло-лиловый, съ жилками; кисть въ 2 раза превышаетъ листь. *V. silvatica* L.

Вѣнчикъ красно-лиловый; кисть не превышаетъ листьевъ.

V. cassubica L.

579. *V. pisiiformis* L. Пет. Кр. I, стр. 131.—Пет., стр. 305.—Кауф. II, № 229.—Гор., № 25.

(Стебель лежачий, лазящий. до 2 м., бороздчатый; все растение голое. сизое; листья парноперистые, о 3—5 парях, оканчиваются вѣтвистымъ усикомъ; листочки округло-яйцевидные, на верхушкѣ б. ч. выемчатые и съ очень короткимъ остриемъ; нижняя пара листочковъ прижата къ стеблю, крупнѣ остальныхъ и покрываетъ полустрѣловидные и зубчатые прилистники; кисть густая, немного короче листьевъ; вѣнчикъ 12—15 мм., свѣтло-желтый; чашечка косо-колокольчатая, съ треугольно-ланцетными, заостренными зубцами; прицвѣтники линейные, почти нитевидные, длиною съ цветоножку; бобъ до 35 мм., продолговатый, зрѣлый — бурый; рубчикъ сѣмени огibaетъ половину его окружности.



Vicia pisiiformis.

По известковымъ склонамъ. Цвѣтетъ съ начала іюня; зрѣлые плоды съ начала августа. Пока только въ Бѣлыхъ Колодезяхъ, Кзм. у. гдѣ этотъ видъ растетъ въ огромномъ количествѣ (Экс. Бот. Лаб.).

580. *V. silvatica* L. Бух. II, № 123.—Бух. I, № 118.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 305.—Кауф. II, № 228.—Цви., № 413.—Кауф. I, стр. 139.—Lind., p. 106.—Ann. C. V, № 18.—Дв., № 689.—Макс., № 669.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 125.—St. II, p. 43.—St. I, № 485.

(Стебель слабый, лазящий, 0,5—2 м., бороздчатый; все растение голое; листья перистые, о 12—20 листочкахъ, сидящихъ б. ч. не парно, а какъ бы чередуясь; листочки овальные, на концѣ округлые, съ мягкимъ остриемъ; прилистники полустрѣловидные, надрѣзочно-зубчатые; зубцы узкіе щетинковидные; кисть многоцвѣтковая, густая, въ 2—3 раза длиннѣ листьевъ; вѣнчикъ 13—18 мм., блѣдно-лиловый съ темными жилками; зубцы чашечки щетинковидные, на концѣ черные, верхніе—въ два раза короче нижнихъ; бобъ до 3 см., на ножкѣ, немного превышающей чашечку; рубчикъ сѣмени огibaетъ три четверти окружности.



Vicia silvatica.

По лѣсамъ, кустарникамъ и лѣсистымъ холмамъ. Цвѣтетъ съ начала іюня весь іюль; плоды съ половины августа. Кунцово, Раменки, Черемушки, Давыдково, Спасское; Не-

вѣрово, Кал. у. (К.).—Мытищи, Лосинный Островъ (С.).—Михайловское, Илл. у. (Б.).—Хмѣтьево, Кал. у.; Воробьевы горы (П.).—Рождествено на Нарѣ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).


581. *V. cassubica* L. Пет. Кр. I, стр. 129.—Пет., стр. 305.—Кауф. II, № 227.—Мил., № 5.—Цин., № 408.—Pinz., p. 12.—Кауф. I, стр. 139.—Дв., № 690.—Gold., Sp., p. 141.—Mart., p. 125.—St., I, № 486.—Pal, 1587.

Корневище толстое, ползучее; стебель до 1 м., прямостоящій, у основанія иногда нѣсколько приподнимающійся, 4-гранный, бороздчатый, покрытъ какъ и черешки листьевъ короткими волосками; листья парноперистые, о 9—12 парахъ, оканчиваются простымъ или мало-развѣтвленнымъ усикомъ, нижніе—безъ усика, только съ остріемъ; листочки слегка опушенные, продолговатые или овально-продолговатые, на концѣ б. ч. округлые, съ остріемъ; прилистники подустрѣловидные, цѣлюкрайніе; кисть не превышаетъ листья, не густая, о 9—15 цвѣтахъ; вѣнчикъ 11—14 мм., красно-лиловый; 2 верхнихъ зубца чашечки много короче остальныхъ; бобы бурые, голые, почти ромбическіе; рубчикъ сѣмени занимаетъ треть его окружности.

Въ лѣсахъ на песчаной почвѣ, рѣдко. Цвѣтетъ съ начала іюля. Пока только въ Быковѣ, Бри. у., въ лѣсу по направленію къ Михневу въ большомъ числѣ экземпляровъ, особенно по просѣкамъ.



Vicia cassubica.



Vicia cracca.

582. *V. Cracca* L. Бух. II, № 124.—Бух. I, № 119.—F. O., № 6., p. 86.—Пет., стр. 305.—Кауф. II, № 225.—Цин., № 409.—Кауф. I, стр. 138.—Lind., p. 106.—Ann. C. IV, № 8.—Дв., № 691.—Макс., № 671.—Hoff. H., № 5723.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 125.—Hoff., № 3461.—St. II, p. 43.—St. I, № 487.—Pal, № 1588.

Vicia cracca L. *α. typica.* Бух. II, № 124 *α.*—Бух. I, № 119 *α.*

Стебель 40—100 см., слабый, вѣтвистый, лежачій или лазящій, бороздчатый, б. или м. опушенный, какъ и все растеніе; листья парноперистые, о 9—10 парахъ, оканчиваются вѣтвистымъ усикомъ; листочки продолговато-ланцетные, иногда почти линейные, съ остріемъ; прилистники полустрѣловидные, цѣлюкрайніе; кисти длинныя, однобокія, многоцвѣтковыя. б. ч. превышаютъ листья; вѣнчикъ до 10 мм., голубовато-лиловый, отгиб паруса равенъ ноготку; верхніе 2 зубца чашечки значительно короче остальныхъ; бобъ до 3 см., на ножкѣ короче чашечной трубки; рубчикъ сѣмени огибаеъ треть его окружности.

По кустарникамъ, посѣвамъ, паровымъ полямъ и около жилья, очень часто. Цвѣтетъ съ начала іюня до осени; плоды съ половины августа.

а. *leptophylla* Fr. Пет. Кр. I, стр. 129. — Бух. II, № 124 β. — Бух. I, № 119 β. — Кауф. II, стр. 136. — Кауф. I, стр. 139.

Vicia tenuifolia Roth. Макс., № 672 и въ герб. за № 174².

Листочки линейно-ланцетные или почти линейные, сѣрые отъ шелковистыхъ волосковъ. Близъ с. Богородскаго, Мос. у. (Ф.). — Михайловское, Пдл. у. (В.). — Бачманово, Кзм. у. (П.).

β. *pseudocassubica* Klett. et Richt. (Fl. von Leipzig, 1830).

Vicia Cracca L. γ. *platyphylla* Rupr. Пет. Кр. I, стр. 129. — Кауф. II, стр. 136. — Кауф. I, стр. 139.

Vicia cassubica L. Макс., № 670 и въ герб. за № 174³.

Листочки овально-эллиптическіе, тупые, голые, рѣже покрыты не густыми волосками; цвѣточные кисти рѣдкоцвѣтныя, б. ч. значительно превышаютъ листья. По лѣсамъ. Воробьевы горы; Карапчеево, Кзм. у. (П.). — Лѣсъ близъ Дракина, Срп. у. (С.).

583. *V. tenuifolia* Roth. Пет. Кр. I, стр. 129. — Пет., стр. 305. — Кауф. II, стр. 138. — Цил., № 411. — Кауф. I, стр. 140. — Дв., № 692. — Mart., p. 126.



Vicia tenuifolia.

Стебель 40—150 см., приподнимающійся, крѣпкій, мало вѣтвистый, крупно-бороздчатый, б. или м. покрытъ, какъ и все растеніе, короткими, прижатыми волосками; листья парноперистые, о 10—14 парахъ, оканчиваются простымъ или вѣтвистымъ усикомъ; листочки ланцетные или почти линейные, съ довольно длиннымъ остріемъ, обыкновенно обращены въ одну сторону; прилистники полустрѣловидные, цѣлюкрайніе; кисть густая, многоцвѣтковая, однобокая, б. ч. значительно превышаетъ листья; вѣнчикъ до 16 мм., красно-лиловый; отгиб паруса вдвое длиннѣе ноготка; верхніе зубцы чашечки короче остальныхъ; бобъ на ножкѣ такой же длины, какъ трубка чашечки; рубчикъ сѣмени огибаеъ четверть его окружности.

По дугамъ, известковымъ откосамъ и кустарникамъ. рѣдко. Цвѣтеть съ половины іюня. Бѣлые Колодези. Клм. у. (П.).—Б. Мытищи на дугу у Перловской фермы (С.).

584. *V. sépium* L. Бух. II, № 125.—Бух. I, № 120.—Ф. О., № 6, p. 86.—Пет., стр. 304.—Кауф. II, № 222.—Цип., № 405.—Pinz., p. 12.—Кауф. I, стр. 137.—Lind., p. 106.—Дв., № 695.—Макс., № 675.—Hoff. H., № 5751.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 126.—Hoff., № 3479.—St. II, p. 43.—St. I, № 489.—Pal., № 1596.

Стебель до 1 м., простой, ребристый и бороздчатый, голый или съ очень рѣдкими волосками; листья парноперистые, о 3—6 парахъ, оканчиваются развѣтвленнымъ усикомъ; листочки овальные, обратно-яйцевидные или продолговато-линейные, тупые или слегка выемчатые и на верхушкѣ съ очень маленькимъ остриемъ, голые или коротко-пушистые особенно по краямъ; прилистники полустрѣловидные, съ зубцами; кисть короткая, пазушная, 2—5-цвѣтковая; вѣтчикъ до 13 мм., грязно-лиловый; зубцы чашечки 3-угольные, тонко-заостренные, неравные, короче трубки, верхніе — сходятся верхушками и короче нижнихъ; бобъ до 30 мм., продолговатый, зрѣлый—голый, черный.



Vicia sepium.

По кустарникамъ, у изгородей и близъ жилья, очень часто. Цвѣтеть съ половины мая до осени; плоды съ половины іюля.

2. *vulgáris* Koch.

Листочки у листьевъ очень крупные, яйцевидные, у нижнихъ—почти округлые. Царицыно; Новый Іерусалимъ. Звн. у. (X.).

3. *angustifolia* Koch.

Листочки у листьевъ продолговато-яйцевидные или яйцевидно-ланцетные. Чаше чѣмъ 2.

585. *V. satíva* L. Бух. II, № 127.—Бух. I, № 122.—Ф. О., № 6, p. 86.—Пет., стр. 304.—Кауф. II, № 223.—Цип., № 402.—Кауф. I, стр. 138.—Дв., № 693.—Макс., № 673.—Hoff. H., № 5750.—Mart., p. 126.—Hoff., № 3478.—St. II, p. 43.—St. I, № 488.—Pal., № 1592.

Стебель слабый, лежачій или лазящій, до 80 см., съ ребрами и бороздками, покрытъ какъ и все растеніе, короткими волосками; листья парноперистые, о 3—8 парахъ, оканчиваются усикомъ; листочки обратно-яйцевидные или продолговато-линейные, выемчатые или усѣченные, съ остриемъ на верхушкѣ; прилистники полустрѣловидные, зубчатые, опушенные; цвѣты б. ч. по 2, рѣже по 1 въ пазухахъ листьевъ; вѣтчикъ до 20—25 мм., флагъ голубой, крылья малиновые, лодочка бѣловатая; зубцы чашечки довольно равные, длиною почти съ чашечную трубку, ланцето-

шиловидные, прямые; бобы до 45 мм., продолговато-линейные, пушистые, ушке почти голые, косо вверх торчащие. зрѣлые—буроватые.

Въ посѣвахъ. часто. Цвѣтетъ съ половины іюня почти до осени.



Vicia sativa.



Vicia angustifolia.

586. *V. angustifolia* All.

Vicia angustifolia Roth. Пет., стр. 304. — Кауф. II, № 224. — Цин., № 403. — Pinz., p. 12. — Кауф. I, стр. 138. — Lind., p. 106. — Ann. C. V, № 17. — Дв., № 694. — Макс., № 674. — Hoff. H., № 5715. — Gold. C., p. 21. — Mart., p. 126. — St. II, p. 43.

Стебель 20—60 см., слабый, лежащій или лазящій, бороздчатый, пушистый, какъ и все растеніе; листья парноперистые, о 4—6 парахъ, оканчиваются вѣтвистымъ усикомъ; листочки нижнихъ листьевъ обратно-йцевидные, верхнихъ—линейно-продолговатые или линейные, всѣ 6. ч. усѣченные и съ остріемъ; прилистники полустрѣловидные, зубчатые; цвѣты пазушные, парные, рѣже по одному; вѣнчикъ до 16 мм., малиновый; зубцы чашечки равные, ланцето-шиловидные, прямые; бобы до 4 см., продолговато-линейные, гладкіе, голые или коротко-опушенные, отклонены отъ стебля, зрѣлые—черные.

Въ посѣвахъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до половины августа.

α. segétalis Koch. Бух. II, № 126. — Бух. I, № 121. — F. O., № 6, p. 86. — Кауф. II, стр. 136. — Кауф. I, стр. 138.

Vicia segetalis Thuill.

Листочки у нижнихъ листьевъ обратно-йцевидные или продолговато-йцевидные, у верхнихъ—продолговато-линейные; цвѣты 6. ч. одиночные; бобъ 6. ч. разрываетъ чашечку.

β. Bobártii Forst. Кауф. II, стр. 136. — Кауф. I, стр. 138.

Листочки у верхнихъ листьевъ линейные; бобъ не разрываетъ чашечку.

V. Fába L. Пет., стр. 304.—Кауф. II, стр. 135.—Цин., № 142.—Кауф. I, стр. 137.—
Hof. II., № 5727.—St. II, p. 43.—Pal., № 1597.

Стебель до 1 м., ребристый, прямостоящий; все растение голое, спозеленное; листья о 2—3 парахъ, оканчиваются остриемъ, рѣже непарнымъ листочкомъ; листочки эллиптическіе, тупые, съ маленькимъ остриемъ, мясистые; прилистники полу-стрѣловидные, цѣльнокрайніе, рѣже зубчатые; цвѣты въ пазухахъ листьевъ на короткихъ цветоножкахъ; вѣнчикъ до 27 мм., бѣлый; крылья съ темнымъ пятномъ; зубцы чашечки неравные: нижніе — равны трубкѣ, 2 верхнихъ много короче ея и сходятся верхушками; бобъ торчащій, почти цилиндрическій, пушистый, съ толстыми и кожистыми стѣнками; сѣмена сплюснутыя, съ рубчикомъ на концѣ.

Разводится по огородамъ.



Vicia Faba.



Lens esculenta.

* *Lens* Tourn.

Чашечка 5-раздѣльная; одна тычинка свободная; столбикъ плоскій, только на внутренней сторонѣ волосистый; трубка тычинокъ скошенная; бобъ сплюснутый ромбическій, 1—2-сѣменный; цвѣты очень мелкіе.

* **L. esculenta Moench.** Пет., стр. 211.

Ervum Lens L. Кауф. II, стр. 139. — Цин., стр. 141. — Кауф. I, стр. 141.—
Дв., № 698.—Pal., № 1598.

Cicer Lens Willd. Mart., p. 127.

Стебель 15—40 см., почти прямостоящій или слегка лазящій, бороздчатый, б. ч. пушистый; листья о 5—7 парахъ, кончаются б. ч. простымъ усикомъ; листочки продолговатые или ланцетные, слегка выемчатые и съ очень короткимъ остриемъ; прицвѣтники ланцетные, цѣльнокрайніе; кисть 1—3-цвѣтковая, б. ч. короче листа; вѣнчикъ 5—6 мм., голубоватобѣлый съ синими жилками; зубцы чашечки шиловидные, равны вѣничку;

бобъ ромбическій, 11—12 мм., соломенно-желтый, 1—3-сѣменный; сѣмена сплюснутыя.

Разводится, иногда какъ сорное по огородамъ. Цвѣтеть съ начала юня весь июль.

* *Pisum* L.

Чашечка 5-надрѣзная; одна тычинка свободная; тычиночная трубка прямо сръзанная; нити нѣсколько кверху расширены; столбикъ 3-гранный, съ боковъ сплюснутый, сверху килеватый, снизу желобчатый, на внутренней сторонѣ бородатый; бобъ сплюснутый, одногнѣздный, многосѣменный.

* *P. sativum* L. Пет., стр. 242.—Кауф. II, стр. 140.—Цин., № 141.—Кауф. I, стр. 141.—Нoff. H., № 5673.—St. II, p. 43.—Pal., № 1566.



Pisum sativum.

Стебель до 1,5 м., лазящій, съ ребрами и бороздками; все растеніе голое, сизое; листья 2—3-парные, съ вѣтвистымъ усикомъ на концѣ; листочки овальные, съ очень короткимъ остриемъ; прилистники очень крупные, крупнѣе листочковъ, полусердцевидные, въ нижней части неравно-зубчатые; кисти — 1—2-цвѣтковые, въ пазухахъ листьевъ, равны или мало превышаютъ прилистники; вѣнчикъ 20 мм. бѣлый; зубцы чашечки треугольно-ланцетные, длиною съ трубку; бобъ 6—10 см.; сѣмена желтыя, шаровидныя.

Разводится по огородамъ.

227. *Láthyrus* L.

Чашечка 5-раздѣльная, у основанія съ выпуклой; одна тычинка свободная; столбикъ сплюснутый, плоскій, по внутренней сторонѣ волосистый, наружная сторона голая, иногда у основанія желобчатая; бобы сплюснутые, одногнѣздные, многосѣменные; листья съ усикомъ.

1. Листья обѣ 1 парѣ листочковъ. 2.

Листья о 2—5 парахъ листочковъ. 4.

2. Цвѣты желтые.

L. pratensis L.

Цвѣты темно-розовые или снаружи зеленоватые, внутри розовые. 3.

3. Стебель широко-крылатый.

L. silvester L.

Стебель ребристый, но безъ крыльевъ.

L. tuberosus L.

4. Листья о 2—3 парахъ; прилистники значительно мельче листочковъ.

L. paluster L.

Листья о 3—5 парахъ; прилистники не мельче листочковъ.

L. pisiformis L.

587. *L. tuberósus* L. Пет. Кр. I, стр. 133.—Пет., стр. 210.—Кауф. II, № 233.—Гор., № 26.—Цин., № 415.—Кауф. I, стр. 144.—Дв., № 683.—Макс., № 663.—Mart., p. 124.—Pal., № 1582.

Корень тонкій. вѣтвистый, съ круглыми или продолговатыми клубнями; стебель 30—90 см., тонкій, приподнимающийся или лазящій, вѣтвистый, 4-гранный; все растеніе голое; листья обѣ 1 парѣ; усикъ б. ч. трехраздѣльный; листочки продолговато-эллиптические, на концѣ съ остріемъ; прилистники полустрѣловидные, узко-ланцетные; кисть 3—7-цвѣтковая, на длинномъ цвѣтоносѣ, въ нѣсколько разъ превышающемъ листъ; вѣнчикъ до 14 мм., темно-розовый; чашечка колокольчатая, съ треугольными, острыми, по краямъ коротко-рѣсничатыми зубцами; бобъ до 35 мм., почти цилиндрической, голый.

Упоминается у Марціуса и Максимовича. Найдено на лѣсептомъ берегу Лопасни близъ Отрады, Срп. у., въ 2 верстахъ отъ жилья (кн. Долгоруковъ). Между Лужками и Зибровымъ, Срп. у. (Гербарій Сельско-Хоз. Инстит., собр. Шеваковъ).



Lathyrus tuberósus.



Lathyrus silvester.

588. *L. silvéster* L.

Lathyrus silvestris L. Пет. Кр. I, стр. 131.—Мос., № 6.—Бух. II, стр. 18.—Пет., стр. 210.—Кауф. II, № 235.—Цин., № 417.—Кауф. I, стр. 143.—Lind., p. 106.—Ann. C. IV, № 9.—Дв., № 685.—Макс., № 665.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 124.—St. II, p. 43.—St. I, № 480.—Pal., № 1584.

Стебель лежащій, до 2 м., силенутый, 4-гранный, широко-крылатый. вѣтвистый; все растеніе голое, сизое; листья обѣ 1 парѣ; усикъ сильно вѣтвистый; черешки листьевъ тоже крылатые, крылья ихъ вполнину уже стеблевыхъ; листочки продолговато-ланцетные или узко-ланцетные, на концѣ быстро переходятъ въ маленькое остріе; прилистники линейно-ланцетные, острые; кисть 4—8-цвѣтковая, на цвѣтоносѣ б. ч. превышающемъ листъ; вѣнчикъ до 17 мм.; парусъ и лодочка снаружи зеленоватые,

внутри парусъ розовый, крылья малиновые; нижніе 3 зубца чашечки изъ треугольнаго основанія узко-ланцетные, немного короче трубочки. 2 верхнихъ — много короче нижнихъ; бобъ голый, до 8 см.; сѣмя почти гладкое, съ рубчикомъ въ половину его окружности.

По лѣсамъ, кустарникамъ и холмамъ. Цвѣтетъ съ половины іюня, весь іюль; плоды съ половины августа.

α. ensifolius Buek.

Lathyrus silvestris L. *α. typicus* Kauffm. Пет. Кр. I, стр. 132.—F. O., № 6, p. 86.—Кауф. II, стр. 142.—Кауф. I, стр. 143.

Листья узко-ланцетные, съ 3 жилками; крылья листовыхъ черешковъ очень узкіе, уже половины стеблевыхъ крыльевъ.

Въ гербаріи Гольдбаха и Максимовича. — Раменки и Хованиха, Мос. у. (Н.). — Мож. у. (Ф. О.). — Противъ Краснаго Стана, Ряз. у.; Чекмово, Дмит. у. (П.). — Пушкино (Куль.). — Косино; Верей. Брн. у. (X.).

β. latifolius Rupr. Пет. Кр. I, стр. 132.—Кауф. II, стр. 142.—Кауф. I, стр. 143.

Lathyrus latifolius L. Дв., № 686.—Макс., № 666.—Макс. Пут. II, p. 92.—Hoff. II, № 5700.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 124.—Hoff., № 1847.—St. II, p. 43.—St. I, № 481.—Pal., № 1585.

Листья широко-ланцетные, б. ч. съ 5 жилками; крылья листовыхъ черешковъ шириною въ половину стеблевыхъ крыльевъ.

Петровское, Петрово, Никольское, Раменки, Богородское (К.). — Свиблово (Мар.). — Останкино (А.). — Тушино (X.). — Соколово на Сходѣ, Воробьевы горы (П.). — Мытищи; Быково, Брн. у. (С.). — Малаховка (Куль.). — Михайловское, Пдл. у. (Б.). — Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

589. *L. pratensis* L. Бух. II, № 130. — Бух. I, № 123. — F. O., № 6, p. 86.—

Пет., стр. 210.—Кауф. II, № 232.—Цин., № 416.—Pinz., p. 12.—Кауф. I, стр. 142.—Lind., p. 106.—Дв., № 684.—Макс., № 664. — Hoff. II, № 5706. — Gold. C., p. 21.—Mart., p. 124.—Hoff., № 1853.—St. II, p. 43.—St. I, № 479.—Pal., № 1583.



Lathyrus pratensis.

Стебель лазящій, до 1 м., немного сплюснутый, съ 4 ребрами, вѣтвистый; все растеніе слабо опушенное или голое; листья на черешкѣ, равномъ прилистнику, обь 1 парѣ листочковъ, продолговато-ланцетныхъ, острыхъ, съ 3—5 жилками; усикъ простой или 3-раздѣльный; прилистники яйцевидно-ланцетные, заостренные, у основанія съ 2 неравными ланцетными ушками; кисть 4—12-цвѣтковая, на длинномъ цвѣтоносі, превышающемъ листья; вѣнчикъ до 15 мм., желтый; всѣ зубцы чашечки ланцетно-шиловидные, почти равные ея трубкѣ; бобъ линейный, сплюснутый, зрѣлый—черный, 25—35

мм.; сѣмена сплюснутыя, гладкія, лоснящіеся съ продолговатымъ рубчикомъ.

По дугамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвѣтеть съ половины іюня до половины августа; плоды съ начала августа.



Lathyrus paluster.



Lathyrus pisiformis.

590. *L. palúster* L.

Lathyrus palustris L. Пет. Кр. I, стр. 132.—Пет., стр. 210.—Кауф. II, № 236.—Цин., № 422.—Кауф. I, стр. 144.—Дв., № 687.—Макс., № 667.—Mart., p. 125.—Hoff., № 1851.—St. II, p. 43.—St. I, № 482.

Стебель тонкій, приподнимающийся или лазящій, до 1 м., голый, крылатый, не вѣтвистый; листья 2—3-парные; усикъ вѣтвистый; черешокъ листа узко-крылатый; листочки продолговатыя, продолговато-ланцетные или ланцетные, на концѣ быстро переходятъ въ очень короткое остріе, сверху зеленые, снизу сизые; прилистники полустрѣловидные, съ обоихъ концовъ заостренные; кисть 2—5-цвѣтковая, на цвѣтоножѣ, б. ч. превышающемъ листья; вѣнчикъ до 20 мм., блѣдно-снѣгій; нижній зубецъ чашечки ланцетный, верхніе — треугольные, вдвое короче нижняго; бобы до 45 мм., бурые, продолговато-линейные; сѣмя бурое, гладкое, съ рубчикомъ въ четверть его окружности.

По болотамъ, покрытымъ кустарникомъ. Цвѣтеть съ половины іюня. Въ канавѣ близъ Раменскаго, Брн. у. (К.). — Между Боровскимъ курганомъ и Заозерьемъ, Брн. у., въ болотѣ; Тимофеево, Петраково, Дмит. у. (П. и С.).—Воробьевы горы (Мар.).—Ст. Удѣльная, М.-Каз. ж. д., у р. Македоновки и Хрипань, Брн. у. (Куль.).

591. *L. pisifórmis* L. Пет. Кр. I, стр. 131.—Пет., стр. 210.—Кауф. II, № 234.—Цин., № 420.—Кауф. I, стр. 142.—St. I, № 483,—Pal., № 1586.

Стебель лежачій или лазящій, до 1,5 м., сплюснутый, узко-крылатый, почти голый или слабо опушенный; листья о 3—5 паряхъ; усикъ

вѣтвистый; листочки продолговато-овальные или овальные, тупые, иногда съ маленькой выемкой на концѣ и съ очень маленькимъ остроконечіемъ; прилистники равны листочкамъ или крупнѣ ихъ. почти яйцевидные, съ острой верхушкой и полустрѣловиднымъ ушкомъ. у основанія рѣдко- и неравно-зубчатые; кисть густая, на цвѣтоножѣ, равномъ листу или немного длиннѣ его; вѣнчикъ до 15 мм., снаружи зеленоватый, внутри лилово-розовый, съ жилками; 3 нижнихъ зубца чашечки ланцетные, равны ея трубкѣ; верхніе 2 зубца вдвое короче нижнихъ и загнуты вверхъ; бобъ до 5 см., линейный, бурый; сѣмя гладкое, бурое, съ рубчикомъ въ шестую часть его окружности.

По холмамъ, открытымъ мѣстамъ и кустарникамъ. Цвѣтетъ съ середины мая; зрѣлые плоды въ августѣ. Денпсеево, Звн. у. (Гольдбаха герб.).—Серпуховъ (К.).—Лузкп, Срп. у. (П. и С.).—Зиброво, Никифорово, Срп. у. (П.).

228. *Orobus* L.

Листья оканчиваются мягкимъ травянистымъ остриемъ, остальное какъ у *Lathyrus*.

592. *O. vѣrnus* L. Пет. Кр. I, стр. 133. — Бух. II, № 131. — Бух. I, № 124. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 233. — Кауф. II, № 237. — Цин., № 423. — Кауф. I, стр. 144. — Lind., p. 106. — Ann. C. III, № 220. — Дв., № 680. — Макс., № 660. — Hoff. H., № 5687. — Gold. C., p. 21. — Mart., p. 124. — Hoff., № 2281. — St. II, p. 43. — St. I, № 476. — Pal., № 1571.

Стебель прямостоящій, до 70 см., остро-ребристый, бороздчатый, голый; листья о 2—4 парахъ; листочки продолговато-линейные, длинно-



Orobus vernus.



Orobus niger.

заостренные, съ 3—5 продольными жилками, по краямъ коротко-рѣсничатые, съ нижней стороны лоснящіеся; прилистники полустрѣловидные,

заостренные; кисть 3—7-цветковая, на цветоносе, не превышающем листья; вѣнчикъ 15—18 мм., малиновый, потомъ снѣй, подъ конецъ сине-зеленый; зубцы чашечки треугольные, туповатые, по краямъ коротко-рѣсничатые; бобъ до 5 см., голый; сѣмя желтое съ пурпуровыми точками.

По лѣсамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ начала мая; плоды съ половины іюня.

593. *O. niger* L. Пет. Кр. I, стр. 133. — Пет., стр. 233. — Кауф. II, № 238. — Гор., № 14. — Цин., № 424. — Рупр., стр. 88. — Кауф. I, стр. 144. — Borg., p. 699. — Дв., № 682. — Макс., № 662. — St. I, № 478. — Pal., № 572.

Стебель до 1 м., прямостоящій, ребристый, вѣтвистый; все растение голое, при сушкѣ чернѣетъ; листья о 4—6 паракъ; листочки овальные, рѣже продолговатые, съ остріемъ, сверху тусклые, снизу сине-зеленые; прилистники узко-ланцетные; кисть о 4—12 цвѣтахъ, на цветоносе, б. ч. превышающемъ листья; вѣнчикъ до 14 мм., малиновый, потомъ голубой; зубцы чашечки треугольные, острые, верхніе короче нижнихъ; бобъ до 5,5 м., голый, зрѣлый—черный; сѣмя шаровидное, бурое.

По гористымъ мѣстамъ, поросшимъ кустарникомъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ половины мая, почти весь іюнь. Между Костинымъ и Краснымъ Станомъ, Руз. у. (Ш. и Ч.). — Бѣлые Колодези, Кзм. у. (Экс. Бот. Лаб.). — Подъ Бородинымъ, Мож. у., въ казенномъ лѣсу (Ф. Б.).



Phaseolus multiflorus



Phaseolus vulgaris

* *Phaséolus* L.

Чашечка двугубая: верхняя губа двузубчатая, нижняя 3-зубчатая; столбикъ подъ верхушкой бородатый, вмѣстѣ съ тычинками и лодочкой скрученъ улиткообразно; бобъ линейный, двустворчатый, съ губчатыми неполными поперечными перегородками.

* *P. multiflorus* Willd. Пет., стр. 238.—Цвл., стр. 149.—Нoff. Н., № 5651.—St. II, p. 42.

Стебель выюйщийся, до 5 м.; листья перисто-тройчатые, у основанія черешка съ прилистниками; листочки на короткихъ черешкахъ, яйцевидные, заостренные, слегка покрыты волосками и съ маленькими прилистничками у каждого листочка; кисть многоцвѣтковая, б. ч. превышаетъ листья; вѣнчикъ ярко-красный или бѣлый; бобъ серповидный, шероховатый; сѣмена бѣлыя или темно-красныя съ темными пятнами.

Разводится.

* *P. vulgaris* L. Пет., стр. 238.—Кауф. II, стр. 143.—Цвл., стр. 149.—Кауф. I, стр. 145.—Нoff. Н., № 5656.—St. II, p. 42.—Pal., № 1547.

Стебель выюйщийся, до 2 м., слегка пушистый; листья тройчато-перистые, съ 2 прилистниками; листочки треугольно-яйцевидные, иногда съ слегка сердцевиднымъ основаніемъ, у каждого листочка два маленькіе прилистничка; кисть малоцвѣтковая, б. ч. короче листа; вѣнчикъ до 20 мм., бѣлый; бобъ повиселый, гладкій, почти прямой; сѣмена бѣлыя.

Разводится.

Порядокъ Geraniáles.

50 сем. Geraniáceae DC.

Цвѣты правильные, рѣже нѣсколько неправильные; чашечка 5-листная, остается при плодѣ; вѣнчикъ 5-лепестный; тычинокъ 10, къ основанію расширенныхъ и основаніемъ сросшихся между собой; иногда только 5 тычинокъ съ пыльниками и железками у основанія, другія 5 безъ пыльниковъ и безъ железокъ; пестикъ 5-гнѣздный, съ длинными столбками, приросшими къ столбцу, т.-е. къ продолженію цвѣтоложка, который вмѣстѣ со столбками ко времени созрѣванія плода сильно удлиняется; рылецъ 5, свободныхъ; гнѣзда завязи съ 2 сѣмечками; плодъ сухой изъ 5 сѣмянокъ, отдѣляющихся отъ столбца вмѣстѣ со столбками снизу вверхъ; послѣдніе закручиваются дугой или спиралью; сѣмя безъ бѣлка; зародышъ обыкновенно зеленый, согнутый, со складчатыми сѣмедолями. Травянистыя растения съ супротивными листьями, иногда верхними очередными, съ прилистниками. Цвѣты въ назушныхъ, 2-многоцвѣтковыхъ полузонтикахъ, рѣже цвѣты одиночные.

229. Geranium L.

Всѣ 10 тычинокъ съ пыльниками; супротивныя лепесткамъ тычинки съ медовыми железками, короче остальныхъ; столбики зрѣлыхъ сѣмянокъ съ внутренней стороны голые, закручиваются дугой или кольцомъ; створки плода у основанія округлыя, съ внутренней стороны вскрываются щелью; листья обыкновенно дланевидно- или пальчато-раздѣльные; цвѣтоносы 1—2 цвѣтковые.

1. Листья пальчатые: 3-тые и 5-ные; листочки ихъ на черешкахъ, съ перисто-раздѣльными долями. *G. Robertianum* L.
Листья пальчато-5—7—9-раздѣльные или надрѣзные. 2.
2. Листья въ очертаніи угловатые, глубоко-5—7-раздѣльные, съ клиновидно-ромбическими долями, остро-надрѣзными. 3.
Листья въ очертаніи округло-почковидные. 7.
3. Лепестки на верхушкѣ выемчатые. 4.
Лепестки на верхушкѣ округлые. 5.
4. Цвѣтоносы обѣ 1 цвѣткѣ. *G. sibiricum* L.
Цвѣтоносы о 2 цвѣткахъ. *G. bohemicum* L.
5. Стебель вверху и цвѣтоножки жестко-волосистые, но не железистые. *G. palustre* L.
Стебель вверху и цвѣтоножки съ железистыми волосками. 6.
6. Низъ стебля съ рѣдкими, отогнутыми волосками; цвѣтоножки всегда торчащія; тычиночныя нити ланцетныя. *G. silvaticum* L.
Стебель и листовые черешки съ короткими пушкомъ; цвѣтоножки по отцвѣтаніи отогнуты; плодоножки торчащія; тычиночныя нити линейныя, къ основанію треугольно-расширенныя. *G. pratense* L.
7. Листья глубоко-5—7-раздѣльные, доли ихъ линейныя, съ жесткими, отстоящими волосками, какъ и стебель; цвѣтоносы обѣ 1 цвѣткѣ. *G. sanguineum* L.
Листья не глубоко-3—7—9-надрѣзные, съ мягкими волосками; цвѣтоносы о 2 цвѣтахъ. 8.
8. Лепестки на верхушкѣ цѣльные, безъ выемки; сѣмена сѣтчатые или ямочно-морщинистыя. *G. rotundifolium* L.
Лепестки на верхушкѣ съ выемкой; сѣмена гладкія. 9.
9. Створки плода поперекъ морщинистыя. *G. molle* L.
Створки плода гладкія. 10.
10. Корень толстый, многолѣтній; лепестки въ 2 раза длиннѣе чашечки, глубоко-выемчатые. *G. pyrenaicum* L.
Корень тонкій, однолѣтній; лепестки равны чашечкѣ или немного длиннѣе ея, спереди слегка выемчатые. *G. pusillum* L.

594. *G. pratense* L. Бух. II, № 101.—Бух. I, № 95.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 194.—Кауф. II, № 180.—Цин., № 308.—Pinz., p. 11.—Кауф. I, стр. 111.—Дв., № 666.—Макс., № 646.—Нол. Н., № 5376.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 119.—Нол. № 1459.—St. II., p. 40.—St. I, № 463.—Pal., № 1455.

Корневище толстое, съ толстыми корнями; стебли въ 30—80 см., вильчато-вѣтвистые, коротко-пушистые, въ верхней части железисто-пушистые; листья въ очертаніи угловато-округлые, 7—9-надрѣзные; доли клиновидныя, почти перисто-надрѣзныя и зубчатые; нижніе листья на длинныхъ черешкахъ, верхніе—почти сидячіе; цвѣтоносы въ пазухахъ

листья въ, двуцвѣтковые; цвѣтоножки по отцвѣтаніи отогнутыя; плодоножки торчащія; у каждаго цвѣтка 2 красноватыхъ, яйцевидно-ланцетныхъ, заостренныхъ прицвѣтника; лепестки до 20 мм., сине-лиловые съ явственными жилками; тычиночныя нити у основанія быстро расширены; чашечка железисто-пушистая.

По лугамъ и близъ жилья, очень часто. Цвѣтетъ съ начала іюня до августа.



Geranium pratense.



Geranium silvaticum.

595. *G. silvaticum* L. Бух. II, № 100.—Бух. I, № 94.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 194.—Кауф. II, № 179.—Цин. № 307.—Pinz., p. 11.—Кауф. I, стр. 111.—Дв., № 664.—Макс., № 645.—Нoff. H., № 5388.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 119.—Hoff., № 1467.—St. II, p. 40.—St. I, № 461.—Pal., № 1453.

Корневище косое, толстое; стебли въ 20—60 см., вильчато-вѣтвистые, въ нижней части съ рѣдкими, отогнутыми волосками, въ верхней—опушение болѣе густое и железистое; корневые листья на длинныхъ черешкахъ, въ очертаніи угловато-округлые, 5—7-раздѣльные или надрѣзные и зубчатые; средніе листья на менѣе длинныхъ черешкахъ, 6. ч. 5-надрѣзные; верхніе—почти сидячіе и часто 3-надрѣзные; прилистники шиловидные, сухіе; цвѣтоносы въ пазухахъ листьевъ, двуцвѣтковые; цвѣтоножки вверхъ торчащія; прицвѣтники маленькіе, сухіе; лепестки до 15 мм., вдвое длиннѣе чашечки, лиловые, рѣже бѣлые, съ жилками; тычиночныя нити ланцетныя; чашечка покрыта железистыми волосками.

По лѣсамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины мая весь іюнь.

α. parviflorum Knaf, in Čelak. Prodr. p. 530.

Geranium silvaticum L. var. *flor. minor. pallid.* Пет. Кр. I, стр. 109.—Герб. Гольдбаха.

Съ мелкими цвѣтами; лепестки равны чашечкѣ или немного длиннѣе ея. Денисьево (герб. Гольдбаха).—Воробьевы горы, Серебряный боръ

близъ Хорошова, Троицкое-Кайнарджки; Бѣлые Колодези, Кям. у. (П.). — Иваньково, Пушкино (Ч.). — Между Дарьиннымъ и д. Бузаевой, Зви. у. (Х.). — Салтыковка, Ниж. ж. д. (Куль.).

596. *G. palustre* L. Пет. Кр. I, стр. 109. — Бух. II, № 102. — Бух. I, № 96. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 194. — Кауф. II, № 181. — Цин., № 309. — Кауф. I, стр. 112. — Дв., № 665. — Макс., № 647. — Hoff. II, № 5373. — Gold. C., p. 21. — Mart., p. 119. — Lib. Tr., p. 182. — Hoff., № 1457. — St. II, p. 40. — St. I, № 462. — Pal., № 1454.

Корневище толстое, почти горизонтальное; стебли въ 50—150 см., вильчато-вѣтвистые, приростовые или приподнимающіеся, слабые, покрыты внизъ отогнутыми волосками, на листовыхъ черешкахъ и у верхушекъ стебли — частыми, но не железистыми; листья черешковые, съ обѣихъ сторонъ покрыты короткими волосками, 7-надрѣзные, съ клиновидно-ромбическими и надрѣзными зубчатыми долями; стеблевые листья супротивные; цветоносы въ пазухахъ листьевъ, очень длинныя, двудѣтковые; цвѣты на длинныхъ цветоножкахъ, съ 2 ланцетными, сухими прицвѣт-



Geranium palustre.



Geranium palustre β. trifidum.

никами у каждого; лепестки до 15 мм., фиолетово-красныя, съ жилками, въ 2 раза длиннѣ чашечки; тычиночныя нити постепенно книзу расширены; чашечка голая, покрыта только по жилкамъ простыми, прижатymi волосками.

По ручьямъ, болотамъ и сырымъ тѣнистымъ мѣстамъ, рѣже по сырýmъ лугамъ, вообще очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до осени.

α. nemorosum Brügg.

Лепестки до 7 мм., равны чашечкѣ или немного длиннѣе ея; все растеніе гораздо меньше и слабѣе. Мытницы — Лосинный Островъ (С.).

3. *trifidum* Litw. Пет. Кр. I, стр. 109.

Лепестки на верхушкѣ не глубоко-3-надрѣзные ¹⁾. Пушкино (Л.).

597. *G. sanguineum* L. Пет. Кр. I, стр. 109.—Пет., стр. 194.—Кауф. II, № 182.—Цин., № 305.—Pinz., p. 11.—Рупр., стр. 86.—Кауф. I, стр. 112.—Borg., p. 690.—Дв., № 663.—Макс., № 638.—Mart., p. 119.—Hoff., № 1464.—St. II, p. 40.—St. I, № 467.—Pal., № 1462.

Geranium sanguineum L. *β. majus*. Макс., № 638 *β.*

Корневище бурое, съ мясистыми чешуйками; стебли 20—60 см., слабые, прямостоящіе или распростертыя, вильчато-вѣтвистые, покрытыя отстоящими щетинками безъ железистыхъ волосковъ; листья супротивные, въ очертаніи округло-сердцевидные, глубоко-5—7-надрѣзные; доли узко-клиновидныя, б. ч. 3-надрѣзныя, надрѣзы узколанцетные, иногда



Geranium sanguineum.



Geranium sanguineum α. latipartitum.

съ однимъ или двумя зубцами; черешки и листья съ отстоящими волосками; цветоносы въ пазухахъ листьевъ и развѣтлений, длинныя, 1-цвѣтковые; лепестки до 16 мм., кроваво-красныя, съ жилками, выемчатые, длиннѣе чашечки; чашелистики эллиптическіе, покрыты длинными, отстоящими волосками; тычиночныя нити ланцетныя, красныя; створки плода на спинкѣ съ длинными волосками.

По опушкамъ и по кустарникамъ на песчаной и известковой почвѣ. Цвѣтетъ съ половины іюня, иногда второе цвѣтеніе съ половины августа. Каранчесово, Кзм. у.; Серпуховъ, Мужи, Срп. у. (К.).—Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Вѣлые Колодези, Кзм. у. (П.).

¹⁾ Petalis apice trilobulatis. У А. Н. Петуникова въ Кр. Обз. сказано, что листья иногда 3-надрѣзные; названіе относится къ лепесткамъ, а не къ листьямъ.

α. latipartitum Petunnikov ¹⁾. Пет. Кр. I, стр. 110.

Листья разделены на 5—7 широко-клиновидныхъ долей; доли просты или 2—3-надрѣзные, туповаты. У Лушковъ, Срп. у., въ половинѣ августа 1887 г. и Бѣлые Колодези, Клм. у., въ сентябрѣ (П.).

598. *G. sibiricum* L. Пет. Кр. I, стр. 110.—Пет., стр. 194.—Кауф. II, № 183.—Гор., № 9.—Цин., № 304.—Рупр., стр. 87.—Кауф. I, стр. 113.—Дв., № 662.—Макс., № 637.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 119.—Нон., № 1465.—St. II, p. 40.—St. I, № 468.—Pal., № 1461.

Стебель длинный, 20—80 см., вѣтвистый, простертый, покрытый, какъ и цветоножки, прижатыми, отогнутыми книзу волосками; листья супротивные, на длинныхъ черенкахъ, въ очертаніи округло-сердцевидные, пальчато-5-надрѣзные; доли продолговато-ромбическія, глубоко-неравно-зубчаты; цветоножки въ пазухахъ листьевъ, одноцвѣтковые, по отцвѣтаніи внизъ отогнуты; лепестки до 7 мм., равны чашечкѣ, слегка выемчатые, у основанія и по краямъ рѣбчатые, розовые съ красными жилками; чашечка покрыта длинными волосками; створки плода волосисты.



Geranium sibiricum.



Geranium pyrenaicum.

Сорное, по безплоднымъ мѣстамъ, рѣдко. Гербарій Гольдбаха.—Кунцово, опушка лѣса по берегу Москвы р. (П.).—Нескучный садъ (Кл.).—Кудаево на р. Нарѣ, Срп. у. (кн. Вяземскій).—Ботаническій садъ (П.).—Серпуховъ (М.).—Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Красково, Мос. у., у шоссе близъ церкви (Куль.).

599. *G. pyrenaeicum* L. Пет. Кр. I, стр. 110.—Pal., № 1450.

Корнивище толстое, многолѣтнее; стебель 20—60 см., прямостоящій или приподнимающійся, какъ и все растеніе, мягко-пушистый отъ отсто-

¹⁾ *Geranium sanguineum* L. *α. latipartitum* Petunnikov.

Folliis 5—7 partitis, laciniis late cuneiformibus, integris vel 2—3 incis, obtusatis.
A. Petunnikov.

щихъ волосковъ; листья въ очертаніи округло-почковидные, 7—9. иногда 11-раздѣльные; доли ихъ спереди надрѣзныя и тупо-зубчатыя; нижніе листья на очень длинныхъ черешкахъ, верхніе—на короткихъ, иногда почти сидячіе; цвѣтоносы въ пазухахъ листьевъ 2-цвѣтковые; цвѣтоножки по отцвѣтаніи внизъ отогнуты; лепестки до 8 мм., въ 2 раза длиннѣе чашечки, глубоко-выемчатые, красновато-лиловые; чашечки и цвѣтоножки желѣзисто-пушистыя; сѣмена гладкія; створки плода гладкія.

Сорное. Цвѣтетъ съ половины мая. Петровское-Разумовское (Шр.).

600. *G. bohémicum* L. Пет. Кр. I, стр. 112.—Пет., стр. 194.—Кауф. II, № 185.

Стебель 20—40 см., прямостоящій, вѣтвистый, покрытъ какъ и цвѣтоножки, длинными, отстоящими простыми и болѣе короткими желѣзистыми волосками; листья на длинныхъ черешкахъ, супротивные, въ очертаніи 5-угольные, 3—5-надрѣзные, съ широко-ромбическими, глубоко-и неравно-зубчатыми долями; цвѣтоносы въ пазухахъ листьевъ 2-цвѣтковые; цвѣтоножки по отцвѣтаніи вверхъ торчащія; лепестки до 12 мм., голубые съ лиловыми жилками, у основанія и по наружному краю рѣсничатые; чашелистики покрыты длинными волосками и съ довольно длинной остью.

Последніе цвѣты и зрѣлые плоды въ началѣ іюля. Близъ торфиного болота на песчаной почвѣ, по опушкѣ Прокудино-Алексѣевского бора, близъ Орхова-Зуева, въ Московской и Владимірской губерніяхъ (Нав.).



Geranium bohemicum.



Geranium pusillum.

601. *G. pusillum* L. Пет. Кр. I, стр. 110. — Ф. Б., № 19. — Пет., стр. 194. — Кауф. II, № 184. — Гер., № 10. — Цин., № 313. — Кауф. I, стр. 113. — Ann. C. III., № 214. — Дв., № 669. — Макс., № 639. — Gold. C., p. 21. — Mart., p. 120. — Hoff., № 1460. — St. II, p. 40. — Pal., № 1460.

Корень тонкій, однолѣтній; стебель 10—40 см., сильно-вѣтвистый, простертый или приподнимающійся; листья въ очертаніи почти округлые.

5—7-раздѣльные; доли ихъ клиновидныя, б. ч. спереди 3-надрѣзныя, туповатые; цвѣтоносы 2-цвѣтковые; цвѣтоножки по отцвѣтаніи внизъ отогнутыя; лепестки до 4 мм., равны чашечкѣ или немного длиннѣе ея, свѣтло-лиловые, спереди слегка выемчатые; чашелистики покрыты волосками; створки плода гладкія, прижато-пушистыя; сѣмена гладкія.

Сорное, по пустырямъ, пашнямъ и близъ жилья, рѣдко. Цвѣтетъ съ половины мая до осени. Въ гербаріяхъ Генинга и Гольдбаха. Давыдково (А.).—Соколыники (М.).—Три горы (Почовъ).—Ботаническій садъ (П.).—Александровскій садъ у забора (З.).—Тесово, Мож. у. (Мос.).—По дорогѣ изъ Малаховки въ Быково, Брн. у., у плотины (Куль.).—Серпуховъ по берегу р. Серпейки (Сюз.).—Бавыкино, Срп. у. (П.).—Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

602. *G. rotundifolium* L. Пет. Кр. I, стр. 111.—Пет., стр. 194.—Кауф. II, № 186.—Цин., № 314.—Кауф. I, стр. 113.—Lind., p. 100.—Дв., № 667.—Макс., № 640.—Mart., p. 509.—St. I, № 466.

Корень однолѣтній, тонкій; стебель 10—10 см., прямостоящій, сильно-вѣтвистый; все растеніе покрыто отстоящими, мягкими волосками,



Geranium rotundifolium.



Geranium molle.

простыми и железистыми; листья округло-почковидные, до половины 5—7-раздѣльные; доли ихъ на верхушкѣ б. ч. 3-зубчатые, зубцы туповатые; цвѣтоносы 2-цвѣтковые; цвѣтоножки по отцвѣтаніи внизъ отогнутыя; лепестки до 6 мм., длиннѣе чашечки, розовые съ 3 темными жилками, на верхушкѣ цѣльные, округлые; створки плода гладкія, покрыты мягкими, отстоящими волосками; сѣмена сѣтчато-и ямчато-морищинистыя.

Находится въ гербаріи Гольдбаха.

603. *G. molle* L. Пет. Кр. I, стр. 111.—Пет., стр. 194.—Кауф. II, стр. 111.—Цин., № 312.—Кауф. I, стр. 114.—Дв., № 668.—Макс., № 643.—Mart., p. 120.—St. I, № 464.—Pal., № 1458.


Корень однолѣтний, тонкій; стебель 10—30 см., распростертый, иногда приподнимающійся; все растеніе покрыто отстоящими простыми и железистыми волосками; листья округло-почковидные, до половины 5—7—9-раздѣльные; доли ихъ то съ параллельными краями, то клиновидныя, спереди крупно-надрѣзныя, зубцы туповатые; нижніе листья на длинныхъ черешкахъ, верхніе—почти сидячіе; лепестки до 6 мм., на верхушкѣ выемчатые, розовые, длиннѣе чашечки; чашелистики съ очень короткой остью; цвѣтоножки по отцвѣтаніи внизъ отогнутыя; створки плода голыя, поперекъ морщинистыя; сѣмена гладкія.

Находится въ гербаріи Максимовича.

604. *G. Robertianum* L. Пер. Кр. I, стр. 112.—Бух. II, № 103.—Ф. Б., № 20.—Бух. I, № 97.—Пер., стр. 193.—Кауф. II, № 187.—Цин., № 317.—Кауф. I, стр. 114.—Lind., p. 100.—Дв., № 670.—Макс., № 644.—Hoff., II, № 5382.—Gold. C., p. 21.—Gold. Sp., p. 132.—Mart., p. 120.—Lib. Tr., p. 104.—St. II, p. 40.—St. I, № 465.—Pal., № 1457.

Geranium Robertianum L. nostrum. Gold Sp., p. 132.

Корень тонкій, однолѣтний, стебель 20—60 см., прямостоящій, вильчато-развѣтвленный, покрытъ, какъ и все растеніе, длинными простыми и железистыми волосками; листья на длинныхъ черешкахъ, 3-тые или 5-ные; листочки ихъ на черешкахъ, съ перисто-раздѣльными долями, зубцы съ маленькимъ остриемъ на верхушкѣ; цвѣтоносы въ пазухахъ верхнихъ листьевъ, 2-цвѣтковые; лепестки узкіе, до 12 мм., безъ выемки, розовые съ бѣлыми жилками, въ полтора раза длиннѣе чашечки; чашелистики треугольно-ланцетные, торчащіе, съ 3 жилками, покрыты длинными волосками; сѣмянки сѣтчато-морщинистыя; все растеніе съ сильнымъ непріятнымъ запахомъ.



Geranium Robertianum.

У ручьевъ и по сырýmъ, тонкимъ и тѣнистымъ мѣстамъ, не часто. Цвѣтетъ съ начала іюля до осени. Воробьевы горы (Гольдбахъ, А. и П.).—Кунцово, близъ Проклятаго мѣста (К.).—Степаньково, Мос. у. (Фишеръ).—Каменки, Мос. у. (П. И.).—

Соколово, Мос. у. (П.).—Петровское, Кал. у. (Ч.).—Казенный лѣсъ близъ Впрева, Кал. у. (П. и С.).—Имѣніе гр. Шереметева—Плесковский паркъ въ Шебалахъ, Пдл. у. (Б.).—Звенигородъ, близъ имѣнія гр. Шереметева (Куль.).—Казенный лѣсъ близъ Соколова, Мож. у. (Мос.).—Еловый лѣсъ близъ д. Трули (Трулени), въ сѣв. части Мож. у. (Мос. и Ф. Б.).

α. mosquense Ledb. Пер. Кр. I, стр. 113.—Кауф. II, стр. 111.—Кауф. I, стр. 114.

Отличается болѣе прямымъ стеблемъ съ почти щитковидно-ме-

тельчатымъ соцветіемъ, но такое соцветіе часто замѣчается и у типичной формы по отцвѣтаніи. Въ гербаріяхъ Максимовича и Генninga.

230. *Eródium* L'Hérit.

Только 5 тычинокъ, чередующихся съ лепестками, несутъ пыльники и железки у основанія; тычинки же, супротивныя лепесткамъ, безъ пыльниковъ и расширенныя; столбики зрѣлыхъ сѣминокъ съ внутренней стороны покрыты длинными волосками, отдѣляются отъ срединнаго столбца и основаніе ихъ скручивается спирально; створки плода не вскрываются; цвѣтки въ многоцвѣтковыхъ полузонтикахъ.

605. *E. cicutarium* (L.) L'Hérit. Бух. II, № 104. — Бух. I, № 98. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 185. — Кауф. II, № 188. — Цин., № 318. — Кауф. I, стр. 114. — Lind., p. 100. — Др., № 661. — Макс., № 636. — Hoff. II, № 5248. — Gold. C., p. 21. — Mart., p. 118. — Hoff., № 1297. — St. II, p. 39.

Geranium cicutarium L. Дв., № 661. — Макс., № 636. — Mart., p. 118. — St. I, № 460. — Pal., № 1445.

Стебель 40 — 90 см., распростертый или приподнимающийся; все растеніе шершавое отъ рѣдкихъ волосковъ; листья на черешкахъ, перистые, съ перисто-раздѣльными и зубчатыми долями; у основанія листа два бѣловатыхъ или красноватыхъ, яйцевидно-треугольныхъ прилистника; цветоносы въ пазухахъ листьевъ, многоцвѣтковые; лепестки 4—6 мм., неравные: 2 верхнихъ — болѣе крупныя, всѣ малиновыя, рѣдко бѣлыя, иногда съ пятномъ; чашелистики съ очень короткой остью; тычиночныя нити съ пыльниками быстро расширены у основанія.

По паровымъ полямъ и огородамъ — сорное, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до осени.



Eródium cicutarium

51 сем. Oxalidáceae DC.

Цвѣты правильные; чашечка 5-лиственная или 5-раздѣльная, остается при плодѣ; вѣтчикъ 5-лепестный, въ почкосложеніи скрученный; тычинокъ 10, сросшихся своимъ основаніемъ: изъ нихъ 5 длинныхъ и 5 короткихъ; завязь верхняя, 5-гнѣздная, съ 5 свободными столбиками и головчатыми рыльцами; въ каждомъ гнѣздѣ много сѣмечекъ, сидящихъ въ одинъ рядъ; плодъ — коробочка, вскрывающаяся по синеватымъ швамъ трещинами, изъ которыхъ выбрасываются сѣмена; сѣмя съ бѣлкомъ; зародышъ прямой.

231. *Óxalis* L.

606. *O. Acetosélla* L. Пет. Кр. I, стр. 113.—Бух. II, № 106.—Бух. I, № 100.—
 F. O., № 6. p. 86.—Пет., стр. 234.—Кauf. II, № 191.—
 Цик., № 320.—Kauf. I, стр. 116.—Lind., p. 100.—Ann.
 C. III, № 215.—Дв., № 456.—Макс., № 446.—Hoff. H.,
 № 3472.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 80.—Hoff., № 2286.—
 St. II, p. 27.—St. I, № 306.



Oxalis Acetosella

Корневище тонкое, ползучее, съ толстыми мясистыми чешуйками; все растение 5—10 см.; листья на длинных черешкахъ, тройчатые; листочки вдоль складчатые, обратно-сердцевидные, съ очень короткими черешками; въ молодости все растение покрыто прижатыми волосками, позднѣ листья почти голые, только края слегка волосистые; цвѣты пазушные, одиночные, на цвѣтоножкахъ, превышающихъ листья, съ маленькими прицвѣтниками посрединѣ; лепестки до 15 мм., обратно-яйцевидные и б. ч. съ косою верхушкой, бѣлые съ розовыми жилками и желтымъ пятномъ у основанiя.

По влажнымъ тѣнистымъ мѣстамъ и въ большихъ лѣсахъ, очень часто. Цвѣтетъ съ начала мая до iюня.

52 сем. *Lináceae* DC.

Цвѣты правильные; чашечка и вѣнчикъ у нашихъ видовъ 5-раздѣльные, послѣднiй въ почкосложенiи скрученный; тычинокъ 10, спаянныхъ у основанiя кольцомъ, изъ нихъ 5 съ пыльниками, чередующихся съ лепестками, супротивныя же лепесткамъ безъ пыльниковъ, въ видѣ зубцовъ; завязь верхняя, 5-гнѣздная, съ 3—5 свободными столбиками; каждое гнѣздо завязи дѣлится ложною перегородкою, въ каждой половинѣ гнѣзда по одной висячей сѣменочкѣ; плодъ—почти шаровидная коробочка, вскрывающаяся по перегородкамъ; сѣмя съ прямымъ зародышемъ и очень маленькимъ бѣлкомъ.

232. *Linum* L.

1. Листья супротивные.
Листья очередные. 2.
2. Цвѣты желтые.
Цвѣты голубые.

L. catharticum L.

L. flaxum L.

L. usitatissimum L.

607. *L. flavum* L. Пет. Кр. I, стр. 100.—Пет., стр. 215.—Кауф. II, № 160.—Цин., № 277.—Кауф. I, стр. 98.—Borg., p. 699.—Дв., № 333—334.—Макс., № 316.—Gold. C., p. 19.—Gold. Sp., p. 125.—Mart., p. 58.
Linum monopetalum Willd. Mart., p. 58.—St. II, p. 20.—St. I, № 214.

Стебель 15—60 см., прямостоящий или приподнимающийся, близъ верхушки ребристый, голый; листья у основанія съ 2 железками и съ 3 жилками, нижніе—продолговато-яйцевидные, тупые, верхніе—ланцетные, острые; соцветіе щитковидное, вѣтвистое; цветоножки очень короткія; пѣлты крупныя, ярко-желтыя съ оранжевыми жилками; лепестки до 25 мм.; чашелистики ланцетные, заостренные, по краямъ железисто-рѣсничатыя, немного превышаютъ коробочку и въ 3 раза короче лепестковъ.

Очень рѣдко. Находится въ гербаріяхъ Гофмана и Максимовича. Свиблово; Кунавна, Бгр. у. (Мар.).



Linum flavum.

Linum usitatissimum.

Linum catharticum.

- * *L. usitatissimum* L. Бух. II, стр. 16.—Пет. II, стр. 216.—Кауф. II, № 161.—Цин., стр. 110.—Кауф. I, стр. 99.—Дв., № 332.—Макс., № 315.—Hoff. H., № 2566.—Mart., p. 58.—St. II, p. 20.—St. I, № 212.—Pal., № 614.

Стебель 30—80 см., прямостоящий, голый, вверху развѣтвленный; листья ланцетные или линейно-ланцетные, цѣльнокрайніе, съ 3 жилками, верхніе—сидячіе, нижніе—съ едва замѣтнымъ черешкомъ; цвѣты голубые; лепестки много длиннѣе чашечки; чашелистики не длиннѣе коробочки, яйцевидные, заостренные, съ рѣсничками, но безъ железокъ; пыльники и пестики голубые.

Разводится. Цвѣтетъ со средины іюня; плоды съ конца іюля.

608. *L. catharticum* L. Бух. II, № 91.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 214.—Кауф. II, № 162.—Цин., № 279.—Pinz., p. 10.—Кауф. I, стр. 99.—Lind., p. 98.—Ann.C. III, № 212.—Дв., № 335.—Макс., № 317.—Hoff. H., № 2550.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 58.—St. II, p. 20.—St. I, № 213.

Стебель 10—30 см., очень тонкій, прямостоящій, иногда у основанія приподнимающійся, вверху вильчато-развѣтвленный; листья супротивные, по краю рѣсничато-шероховатые, спзо-зеленые, нижніе—обратно-яйцевидные, тупые, верхніе—продолговато-ланцетные, слегка заостренные; цвѣты полусонтикомъ на длинныхъ цвѣтоножкахъ; лепестки до 5 мм., бѣлые съ желтымъ пятномъ у основанія, въ два раза длиннѣе чашечки; чашелистики эллиптическіе, заостренные, по краямъ железисто-рѣсничатые, равны коробочкѣ.

По лугамъ и кустарникамъ, часто. Цвѣтетъ съ середины мая до осени. Иваново. Братово; Архангельское, Зви. у.; Звенигородъ; Мячково, Брн. у.; Голпково, Кзм. у. (К.). — Мытищи (С.). — Михайловское, Пдл. у. (Б.). — Ланково, Красный Станъ, Руз. у.; Карапчеево, Кзм. у.; Кусково, Раменки (П.). Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

53 сем. Polygaláceae Juss.

Цвѣты неправильные, симметричные; чашечка изъ 5 свободныхъ чашелистиковъ, остается при плодѣ; 2 боковые чашелистика много крупнѣе 3 остальныхъ, крыловидные и окрашенные въ цвѣтъ лепестковъ; вѣнчикъ 3- или 5-лепестный; нижній лепестокъ крупнѣе прочихъ, желобчатый, на концѣ 3-лопастной и бахромчатый, сросшійся съ 2 боковыми; задніе 2 лепестка свободные и длиннѣе боковыхъ; тычинокъ 8, сросшихся въ одинъ пучокъ, наверху раздѣляющійся на 2 супротивныхъ пучка по 4 тычинки въ каждомъ; пыльники одногнѣздные, вскрываются дырочками; завязь верхняя, 2-гнѣздная, съ простымъ столбикомъ и 2-лопастнымъ рыльцемъ; въ каждомъ гнѣздѣ одна висячая сѣменочка; плодъ—двугнѣздная коробочка, сплюснутая со стороны швовъ, вскрывающаяся 2 створками; сѣмена съ небольшимъ придаткомъ, пушистые, съ бѣлкомъ; зародышъ прямой.

233. Polygala L.

1. Съ корневою густою розеткою листьевъ.

P. amarella Crantz.

Безъ розетки корневыхъ листьевъ. 2.

2. Прицвѣтники длиннѣе цвѣточныхъ почекъ, образуютъ хохолокъ на концѣ кисти.

P. comosa Schkuhr.

Прицвѣтники короче цвѣточныхъ почекъ и хохолка не образуютъ.

P. vulgaris L.

609. *P. vulgaris* L. Пет. Кр. I, стр. 59.—Бух. II, № 31.—Бух. I, № 31.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 244.—Кауф. II, № 46.—Цил., № 197.—Кауф. I, стр. 42.—Дв., № 675.—Макс., № 656.—Hoff. H., № 5573.—Gold. C., p. 21.—St. II, p. 42.—St. I, № 474.—Pal., № 1514.

Polygala vulgaris L. γ. *elata* (должно быть *elongata*) Макс., № 656 β.

Polygala vulgaris L. β. *elongata*. Mart., p. 123.

Корень буроватый, почти деревянистый; стебли 10—20 см., приподнимающіеся; нижніе листья яйцевидные или округло-яйцевидные, съ ко-

роткими черешками, остальные — ланцетные, заостренные, сидячие; кисть рѣдкая, не большая; прицвѣтники плечатые, очень маленькіе, не превышаютъ цвѣточныхъ почекъ; два крыловидныхъ чашелистика съ срединною жилкою зеленою, къ верхушкѣ утолщающіеся и боковыми сѣтчато-развѣтвленными; остальные чашелистики ланцетные, зеленые съ широкимъ бѣлымъ краемъ; цвѣты лѣвовато-синіе, до 7 мм. дл.; завязь съ замѣтной плодоножкой.

По сырымъ лугамъ. Цвѣтеть съ конца мая до середины іюля. Кусково, Владычино, Ивановское (К.).—Давыдково, Кунцово; Анофріево, Руз. у.; Аннинское, Влк. у. (Кл.).—Салтыковка. Ниж. ж. д. (Куль.).—Б. Мытищи, лугъ у р. Яузы (С.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Кочергино, Вокресенское на р. Клязьмѣ, Дмит. у. (П.).—Поляна въ лѣсу между Сенежскимъ озеромъ и Покровскимъ, Клн. у.; Клычево, Кдм. у. (П. и С.).—По дорогѣ изъ д. Салослово въ Денисьево, Звн. у.; Нестерово, Руз. у.; Озерекское, Мос. у. (Х.).



Polygala vulgaris.



Polygala comosa.

610. **P. comosa Schkuhr.** Пет. Кр. I, стр. 59.—Бух. II, № 32.—Бух I, № 32.—Г. О., № 5, р. 70.—Петр., стр. 244.—Кауф. II, № 47.—Цвн., № 198.—Pinz, p. 10.—Кауф. I, стр. 42.—Ann. C. II, № 107.

Polygala vulgaris L. Mart., p. 123.

Изъ тонкаго бѣловато-желтаго корня выходятъ обыкновенно нѣсколько стеблей, у основанія немного приподнимающихся, въ 10—30 см.; нижніе стеблевые листья эллиптическіе, суженные въ короткій черешокъ, остальные—ланцетовидные или линейно-ланцетные, сидячие; длинная, частая кисть заканчивается хохолкомъ изъ прицвѣтниковъ, превышающихъ цвѣточные почки и цвѣтоножки распустившихся цвѣтовъ; по мѣрѣ отцвѣтанія прицвѣтники опадаютъ; крыловидные чашелистики съ срединною зеленою жилкою и боковыми наверху дугообразно соединенными и мало

развѣтвленными; цвѣты сине-лиловые или грязно-малиновые, рѣдко бѣлые, до 5 мм.; завязь безъ замѣтной плодоножки.

По лугамъ и холмамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ конца мая до осени.

611. *P. amarélla* Crantz. Пет. Кр. I, стр. 61.

Polygala amara L. а. О., № 5, p. 70.—Пет., стр. 244.—Кауф. II, № 48.—Цин., № 200.—Кауф. I, стр. 42.—Дв., № 676.—Макс., № 655.—Hoff. II., № 5561.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 123.—Hoff. № 3544.—St. II, 42.

Polygala amara L. а. *genuina* Koch. Бух. II., № 33.—Бух. I, № 33.—Кауф. II, стр. 31.—Кауф. I, стр. 42.

Polygala uliginosa Rehb. Ann. C. I, № 9.

(стеблей нѣсколько, голыхъ, облиственныхъ, въ 5—15 см.; корневые листья собраны густой розеткой, обратно-яйцевидные, суженные въ черешокъ, верхушка ихъ тупая, почти округлая; стеблевые листья ланцетные, сидячіе, туповатые или заостренные; кисть сперва густая, по отцвѣтаніи вытянутая, рѣдкая; прицѣтники равны цвѣтоножкѣ; цвѣты сніе, маленькіе, не длиннѣе 4 мм.; крыловидные чашелистики съ срединною жилкою и боковыми мало вѣтвистыми и не соединяющимися у верхушки; плодъ округло-сердцевидный, шире крыловидныхъ чашелистиковъ.



Polygala amarella.

По сырымъ лугамъ и на торфяной почвѣ, не рѣдко. Цвѣтетъ съ начала мая до конца іюля. Кусково, Б. Мытищи, Владычино, Тушино; Рѣшетниково, Клн. у. (К.).—Пушкино; ст. Мухино, Руз. у. (С.).—Богородское, Мос. у.; Григорово на Москвѣ р., Руз. у. (П.).—Между Успенскимъ и Борками, Звн. у. (Х.).

54 сем. Euphorbiaceae Klotzsch et Garcke.

Растенія однодомныя или двудомныя; цвѣты однополые, съ околоцвѣтникомъ или безъ околоцвѣтника; часто 10—12 мужскихъ цвѣтовъ, состоящихъ изъ одной тычинки каждый, и одинъ женскій, состоящій изъ одного пестика, заключены въ бокальчатую обертку и образуютъ цвѣточный пучокъ; если растеніе двудомное, то цвѣты б. ч. съ 3-листнымъ околоцвѣтникомъ; завязь верхняя, 3-гнѣздная, въ каждомъ гнѣздѣ по 1 или по 2 вспячихъ сѣмечки; столбики 3-раздѣльные, съ двураздѣльными рыльцами или два нитевидныхъ столбика; плодъ—коробочка, вскрывающаяся по перегородкамъ, со створками, эластично отскакивающими отъ срединной колонки; сѣмя съ большимъ бѣлкомъ.

234. *Mercurialis* L.

Растеніе двудомное; цвѣты однополые, въ колосѣ или кисти; околоцвѣтникъ 3-раздѣльный; мужской цвѣтокъ о 9—12 тычинкахъ, женскій—

съ 2-гнѣздною завязью и 2 нитевидными столбиками; со стороны пивовъ завязи прикрѣплены по одной тычинкѣ безъ пыльниковъ; коробочка 2-гнѣздная, съ онадающими створками; въ каждомъ гнѣздѣ по одному сѣмени; растение безъ млечнаго сока.

612. *M. perennis* L. Бух. II, № 97.—Бух. I, № 91.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 224.—Кауф. II, № 173.—Цин., № 1311.—Кауф. I, стр. 106.—Lind., p. 158.—Ann. C. II, № 152.—Дв., № 921.—Макс., № 919.—Hoff. H., № 7757.—Gold. C., p. 23.—Mart., p. 177.—Hoff., № 2091.—St. II, p. 55.—St. I, № 679.

Корневище ползучее, вѣтвистое, членистое, съ побѣгами; стебли 15—40 см., прямо-стоящіе, 4-гранные, только въ верхней части съ листьями, голые или опушенные; листья черешковые, супротивные, эллиптическо-ланцетные, заостренные, шильчато-городковые; прилистники маленькіе, отогнутые книзу, ланцетные, острые, цѣльнокрайніе; мужскіе цвѣты въ рѣдкихъ, длинныхъ пазушныхъ колосьяхъ, превышающихъ листья; женскіе—объ 1—3 цвѣткахъ на длинномъ цвѣтоносі, но значительно короче листьевъ; коробочка морщинистая, шершаво-пушистая.

По тыпистымъ мѣстамъ на перегнойной почвѣ, очень часто. Цвѣтетъ со середины апрѣля до середины мая.



Mercurialis perennis.

235. *Euphórbia* L.

То, что представляетъ цвѣтокъ, есть цвѣточный пучокъ, состоящій изъ мужскихъ цвѣтовъ и одного женскаго, окруженныхъ общей колокольчато-бокальчатой оберткой въ видѣ чашечки, съ 4—5 железками по краямъ и 4—5 зубцами въ промежуткахъ между железокъ; каждый мужской цвѣтокъ состоитъ изъ одной сочлененной тычинки, у основанія съ рѣсничатымъ прицвѣтничкомъ; всѣхъ цвѣтовъ въ пучкѣ 10—12; пыльники съ б. или м. раздѣненными гнѣздами; женскій цвѣтокъ состоитъ изъ одной 3-гнѣздной, 3-лопастной завязи на ножкѣ, впослѣдствіи поникающей; столбикъ 3-раздѣльный; каждое рыльце 2-лопастное; плодъ—3-гнѣздная коробочка, разверзающаяся вдоль спинки, съ онадающими створками; въ каждомъ гнѣздѣ по одному сѣмени; растенія съ млечнымъ сокомъ.

1. Листья линейно-ланцетные или продолговато-ланцетные; сѣмена гладкія. 2.

Листья обратно-яйцевидные; сѣмена яченстыя или ямчатыя. 5.

2. Медовыя железки полулунныя, съ 2 рожекками; прицвѣтники яйцевидно-ромбическіе. 3.

Медовыя железки поперекъ овальныя; прицвѣтники овальные. 4.

3. Листья линейно-ланцетные или ланцетные, заостренные; листья пазушных вѣточекъ такіе же, какъ и стеблевые, но уже ихъ; коробочка точечно-бугорчатая, какъ бы съ налетомъ.

E. Esula L.

Стеблевые листья линейные, тупые; листья пазушных вѣточекъ почти нитевидные, заостренные; коробочка ясно-бугорчатая.

E. cyparissias L.

4. Коробочка гладкая; листья у верхушки по краямъ мелко-зубчатые; молодое растеніе пушистое.

E. villosa W. K.

Коробочка бородавчатая; листья цѣлюкрайніе; молодое растеніе голое.

E. palustris L.

5. Листья къ верхушкѣ мелко-зубчатые; сѣмена ячисто-сѣтчатые.

E. helioscopia L.

Листья цѣлюкрайніе; сѣмена грубо-ямчато-точечные.

E. Peplus L.

613. *E. palustris* L. Пет. Кр. I, стр. 104.—Пет., стр. 187.—Кауф. II, № 169.—Цин., № 1294.—Кауф. I, стр. 104.—Дв., № 525.—Макс., № 828.—Mart., p. 84.—Hoff., № 1336.—St. II, p. 28.—St. I, № 323.



Euphorbia palustris.

Корневище толстое, горизонтальное, вѣтвистое; стеблей нѣсколько въ 80—150 см., прямо-стоящихъ, толстыхъ, полыхъ, съ боковыми не цвѣтущими вѣточками; все растеніе голое; листья широко-ланцетные или эллиптическо-ланцетные, сидячіе, тупые, цѣлюкрайніе, очень рѣдко съ едва замѣтными зубчиками; листья на вѣточкахъ много уже стеблевыхъ; зонтикъ сжатый, многолучевой; вторичные зонтики 3-лучевые; цвѣтоносы 2-раздѣльные; прицвѣтники обратно-овальные, къ основанію суженные; медовыя железы округлыя; коробочка съ бородавками; сѣмена гладкія.

По сырým мѣстамъ, очень рѣдко. Въ Кунцовѣ, одинъ экземпляръ въ гербаріи Борхмана.

614. *E. villosa* W. K. Пет. Кр. I, стр. 104.

Euphorbia procera M. B. Пет., стр. 186.—Кауф. II, № 170.—Цин., № 1293.—Рупр., стр. 62.—Кауф. I, стр. 104.

Euphorbia procera M. B. *a. leiocarpa* Ledeb. Кауф. II, стр. 102.—Кауф. I, стр. 105.

Корневище толстое; стеблей нѣсколько въ 50—100 см., прямо-стоящихъ, полыхъ, простыхъ или вѣтвистыхъ; все растеніе въ молодости мягко-пушистое, позднѣе голое, спзое; листья сидячіе, продолговато-ланцетные, мелко-зубчатые, къ основанію цѣлюкрайніе; зонтикъ многолучевой; вторичные зонтики 2—3-лучевые; цвѣтоносы 2-раздѣльные; прицвѣтники

яйцевидно-овальные, цѣлюнокрайнїе или мелко-зубчатые; медовыя железки овальныя; коробочка голая, иногда съ очень рѣдкими бугорками; сѣмена гладкія.

Встрѣчается исключительно по береговой полосѣ Оки отъ Серпухова до Коломны и растетъ на всякаго рода почвахъ, любитъ сырыя мѣста. Цвѣтетъ съ середины мая до середины іюня; плоды съ конца іюля.



Euphorbia villosa.

Euphorbia Esula α. typica.

Euphorbia Esula β. virgata.

615. **E. Esula L.** Пет. Кр. I, стр. 105. — Пин., № 1307. — Lind., p. 158. — Дв., № 524. — Макс., № 829. — Hoff. H., № 3590. — Gold. C., p. 20. — Mart., p. 84. — St. II, p. 28. — St. I, № 322.

Euphorbia virgata W. K. Бух. II, № 96. — Бух. I, № 90. — F. O., № 5, p. 70.

Euphorbia palustris L. Hoff., H., № 3608.

Корень почти отвѣсный, рѣже ползучій, деревянистый; стебель 30—80 см., прямостоящій, б. ч. вѣтвистый, съ не цвѣтущими вѣточками; листья линейно-ланцетные или ланцетные, суженные къ основанію, цѣлюнокрайнїе или на концѣ мелко-зубчатые, все голые, часто сизые; зонтикъ о многихъ лучахъ; лучи повторно 2-раздѣльные; листочки покрывала продолговато-линейные или яйцевидные; прицвѣтники яйцевидно-ромбическіе, съ острымъ кончикомъ; медовыя железки съ длинными рожками; коробочка на спинкѣ мелко-точечная; сѣмена гладкія.

По междкамъ и по паровымъ полямъ, на открытыхъ мѣстахъ и по берегамъ рѣкъ, часто. Цвѣтетъ съ начала іюня до августа.

α. typica Petunnikov. Пет. Кр. I, стр. 107.

Euphorbia virgata W. K. β. *latifolia* Kauffm. Кауф. II, стр. 103. — Рупр., стр. 87. — Кауф. I, стр. 105.

Euphorbia Esula L. b. *latifolia*. Mart., p. 84.

Листья продолговато-ланцетные, туповатые, наибольшая ширина выше середины листа, постепенно сужены къ основанію, близъ верхушки мелко-зубчатые, рѣже цѣлюнокрайнїе; корневище ползучее. — Находится въ гербаріяхъ Генниппа, Максимовича и

Краузе.—Берегъ Москвы р. близъ Хорошова, Тушино, Спасское; Мячково, Брн. у. (К.).—Софьинскій шлюзъ на Москвѣ р., Брн. у. (П.).—Около Дѣвличьего монастыря, на берегу Москвы рѣки, въ гербаріи А. Н. Петунникова, собр. Негунскій.—Юдинская платформа М.-Бр. ж. д. по откосу (Х.).—Пехорка, Брн. у. (Куль.).

3. *virgata* W. K. (sp.). Пет. Кр. I, стр. 107.

Euphorbia virgata W. K. Кауф. II, № 171.—Цин., № 1306.—Кауф. I, стр. 105.

Листья линейно-ланцетные, рѣже продолговато-линейные, б. ч. постепенно-заостренные, цѣлюкрайніе; корневище б. ч. отвѣсное ¹⁾. Мытищи, Пушкино (С.).—По межѣ близъ ст. Клязьма, М.-Яр. ж. д.; между Вешняками и Косинымъ—окраина поля (Х.).—Симоновъ монастырь, Воробьевы горы, Люблино; Сенежское озеро, Кля. у.; Коломна, Серпуховъ (П.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).

616. *E. cyparissias* L.

Euphorbia Esula L. γ. *Cyparissias* L. Пет. Кр. I, стр. 107.



Euphorbia cyparissias.

Корневище ползучее, буроватое, сильно вѣтвистое; стебель 15—40 см., прямостоящій, голый; листья линейные, тупые, съ одною срединною жилкою; въ верхней части стебля изъ пазухъ листьевъ выходятъ короткія вѣточки съ почти нитевидными, заостренными листьями; все растение сизоватое; зонтикъ многолучевой; лучи его повторно-2-раздѣльные; прицвѣтники треугольно-почковидные; медовыя железы съ короткими рождками; коробочка округло-яйцевидная, мелко-бугорчатая; сѣмена гладкія.

По склонамъ холмовъ и по берегамъ рѣкъ, рѣдко. Въ зрѣлыхъ плодахъ въ началѣ іюля. Въ гербаріи Максимовича изъ-подъ Коломны.—Карапчеево, Кля. у. (К.).—Красный

Станъ, Руз. у. (Сюз.).—Кузьминки (бр. Б. и Л. Сабанѣвы).

617. *E. helioscopia* L. Пет. Кр. I, стр. 103.—Пет., стр. 187.—Кауф. II, № 168.—Цин., № 1292.—Кауф. I, стр. 104.—Дв., № 523.—Нoff. Н., № 3597.—Mart., p. 84.—Нoff., № 1330.—St. II, p. 28.—St. I, № 321.

Euphorbia Helioscopia L. Макс., № 827.—Gold. С., p. 20.

Корень однолѣтній; стебель 15—40 см., прямостоящій, простой или у основанія развѣтвленный, голый или съ рѣдкими волосками; листья

¹⁾ Эти двѣ разновидности трудно считать за виды, какъ это дѣлаютъ многіе флористы. Нѣтъ ни одного стойкаго признака, который не сглаживался бы постепенно; зазубренность листьевъ очень часто отсутствуетъ у *E. Esula* и иногда слабо замѣтна у *E. virgata*; что же касается формы листьевъ, то она порою такъ измѣнчива на одной и той же особи, что положительно затрудняешься, къ какой разновидности отнести определяемое растение; но все же встрѣчаются особи, въ которыхъ ясно выражены все признаки одной изъ формъ.

обратно-яйцевидные, къ основанію суженные, къ верхушкѣ закругленные и мелко-зубчатые, иногда слегка выемчатые; зонтикъ 5-лучевой, у основанія съ 5 крупными, овальными листьями; вторичные зонтики 3-лучевые съ 3 оберточными листьями; вѣточки вторичнаго зонтика вильчато-2-раздѣльны, съ 2 обратно-овальными, мелко-зубчатыми прицвѣтниками; медовыя железы поперечно-эллиптическія; коробочка гладкая; сѣмена ячеисто-сѣтчатые.

Сорное, по огородамъ, не часто. Цвѣтетъ съ начала августа. За Бутырской заставой, близъ Давилова кладбища (К.).—Воробьевы горы (Куль.).



Euphorbia helioscopia.



Euphorbia Peplus.

618. *E. Réplus* L. Пер. Кр. I, стр. 103.—Пер., стр. 187.—Кауф. II, № 172.—Цви., № 1297.—Кауф. I, стр. 106.—Др., № 522.—Макс., № 826.—Ной. Н., № 3611.—Mart., p. 83.—Ной., № 1337.—St. II, p. 28.—St. I, № 320.

Корень однолѣтній; стебель 10—25 см., голый, спльно вѣтвистый; листья обратно-яйцевидные, суженные въ черешокъ, на концѣ округлые, всѣ цѣльнокрайніе, голые; нижніе почти круглые; зонтикъ растопыренный, 3-лучевой; цвѣтоносы 2-раздѣльные; прицвѣтники яйцевидные, почти съ сердцевиднымъ основаніемъ; медовыя железы съ 2 длинными рожеками; коробочка голая, на спинкѣ съ 2 почти крылатыми ребрышками; сѣмена 6-гранныя, на внутренней поверхности съ 2 бороздками, на вѣтшней—грубо-ямчато-точечныя.

Сорное, по огородамъ и на воздѣланной почвѣ. рѣдко. Находится въ гербаріи Гофмана за № 3611.—Московскій Ботаническій садъ, обильно по грядамъ (II.).

55 сем. *Callitrichaceae* Link.

Растенія однодомныя; цвѣты однополые, безъ околоцвѣтника, иногда со слѣдами его въ видѣ 2 маленькихъ чешуекъ; каждый цвѣтокъ съ 2

серповидными, пленчатыми прицветниками; мужской цветок состоитъ изъ одной тычинки съ овальнымъ, потомъ почковиднымъ, одногнѣзднымъ пыльникомъ, вскрывающимся поперечною щелью; женскій цветокъ изъ одного пестика; завязь сначала двугнѣздная, потомъ становится 4-гнѣздной въ слѣдствіе появленія ложной перегородки; въ каждомъ гнѣздѣ по одной виспячей сѣмечкѣ; столбика два, шптевидныхъ; плодъ сложный, распадающійся на 4 плодника. Подводныя растенія съ супротивными листьями безъ прилистниковъ, иногда по высыханіи лужицъ, гдѣ они растутъ, становятся наземными.

236. Callitriche L.

619. *C. verna* L. Дв., № 2.—Hoff. Н., № 358.—Gold. С., р. 17.—Mart., р. 3.—St. II, р. 3.—St. I, № 1.

Callitriche vernalis Kütz. Пет. Кр. III, стр. 45.

Callitriche palustris L. Бух. II, № 389.—Бух. I, № 361.—Пет., стр. 152.—Кауф. II, № 701.—Цин., № 518.—Кауф. I, стр. 460.—Lind., р. 112.

Callitriche pallens Goldb. Дв., № 2.—Макс., № 822.—Gold., Sp., р. 17.

Callitriche aquatica Willd. Ad. р. 2.

Маленькое водяное или наземное растеніе разнообразнаго вида; стебель тонкій, вѣтвистый, укореняющійся, распростертый, приподнимающійся или прямостоящій; листья супротивные, линейные, ланцетные, обратно-яйцевидные или обратно-овальные, часто близъ верхушки собраны



Callitriche verna α. *latifolia*.

Callitriche verna β. *fontana*.

розеткой, ярко-зеленые, не прозрачныя; мужскіе цвѣты б. ч. въ верхнихъ мутовкахъ стебля; плоды длиннѣе ширины, слегка сердцевидные, дольки ихъ со спинки выпуклыя, по угламъ узко- и остро-ребристыя; рыльца прямостоящія или расходящіяся.

По канавамъ, рѣкамъ, по стоячимъ и медленно текущимъ водамъ, рѣже наземныя. Цвѣтетъ съ іюля до осени.

α. latifolia Kütz.

Callitriche vernalis Kütz. *b. latifolia* Kütz. Пет. Кр. III, стр. 46.

Callitriche palustris L. *α. stagnalis* Kauffm., non Scop. Кауф. II, стр. 475.—Кауф. I, стр. 460.

Стебли длинные; все листья ложковидные или обратно-яйцевидные, с 3—5 жилками, верхушка их округлая или слегка выемчатая. В гербарии Анненкова.—Каргашино на Клязьмѣ въ озеркѣ (П.).

β. fontana Kütz.


Callitriche vernalis Kütz. *δ. fontana* Kütz. Пет. Кр. III, стр. 46.

Callitriche palustris L. *γ. fontana* Rupr. Бух. II, № 389γ.—Бух. I, № 361γ.—F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, стр. 475.—Кауф. I, стр. 461.

Стебли длинные, подводные верхние листья собраны розеткой; верхние листья обратно-яйцевидные или ложковидные, с 3 жилками, подводные—широко-линейные, усеченные, б. ч. обѣ 1 жилкѣ.



Callitriche verna v. stellata.



Callitriche verna δ. dubia.



Callitriche verna α. angustifolia.

Царцыно, Б. Мытници, Киреево, Богородское (К.).—Михайловское, Масловскій лѣсъ въ канавѣ, Пдл. у. (Б.).—Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Солмогубъ).

γ. stellata Hoppe.

Callitriche vernalis Kütz. *γ. stellata* Hoppe. Пет. Кр. III, стр. 46.

Callitriche palustris L. *δ. stellata* Rupr. Мос., № 35.—Кауф. II, стр. 475.—Кауф. I, стр. 461.

Стебель длинный, подводный, съ розеткой плавающихъ листьевъ; только верхние листья ложковидные, с 3 жилками, съ округлой верхушкой, остальные—линейные, слегка выемчатые или 2-зубчатые, с 1 жилкой. Останкино; противъ Пестрикова, Кзм. у. въ озеркахъ (П.).—Заливъ Клязьмы близъ Черкизова (С.).—Вилки въ ручьѣ, Брн. у. (Х.).

δ. dubia Hoffm.

Callitriche vernalis Kütz. *ε. dubia* Hoffm. Пет. Кр. III, стр. 46.

Callitriche palustris L. *ε. dubia* Rupr. Кауф. II, стр. 475.—Кауф. I, стр. 461.

Callitriche palustris L. c. *intermedia* Hoppe. Дв., № 2.

Callitriche stagnalis Scop. β. *intermedia* Hoppe. Hoff. № 34.

Callitriche intermedia Hoppe. Mart., p. 3.—St. II, p. 3.—St. I, № 2.


Листья такіе же, какъ у γ. *stellata*, но всё на концѣ съ 2 зубчик-камн. Петровское - Разумовское (Гольдбахъ).—Въ р. Торгоши, Дят. у. (П.).—Мытищи, р. Яуза близъ Тайнинской платформы, Мос. у. (С.).

ε. *angustifolia* Hoppe.

Всѣ листья линейные, на концѣ съ 2 зубчиками. Противъ Пестрикова, Калм. у., въ озеркѣ (П.).



Callitriche verna ε. *caespitosa*.



Callitriche verna γ. *minima*.

ζ. *caespitosa* Schultz.

Callitriche vernalis Kütz. β. *caespitosa* Schultz. Her. Kr. III, стр. 46.

Callitriche palustris L. β. *caespitosa* Rupr. Бух. II, № 389β.—Бух. I, № 361β.—
Кауф. II, стр. 475.—Кауф. I, 461.—
Дв., № 2.

Callitriche caespitosa Schultz. Mart., p. 3.

Стебли наземные, короткіе, ползучіе; всѣ листья обратно-овальные, съ округлой верхушкой и съ 3 жилками. Серебряный боръ близъ Хорошова, Лужники въ озеркахъ. Воробьевы горы (П.).—Мытищи (С.).—Михайловское, около р. Пахры, Пдл. у. (Б.).

η. *minima* Hoppe.

Callitriche vernalis Kütz. α. *minima* Hoppe. Her. Kr. III, стр. 46.

Callitriche palustris L. γ. *minima* Rupr. Кауф. II, стр. 476.—Кауф. I, стр. 461.

Callitriche minima Hoppe. Макс., № 822.—Hoff. II, № 36.—Mart., p. 3.

Очень маленькое наземное растеніе; всѣ листья линейные, съ 1 жилкой, съ округлой или выемчатой верхушкой, верхніе—часто собраны розеткой. Богородское. Дефтортово (П.).—Измайловскій звѣринецъ (Гольдбахъ).—Успенскій погостъ, Влк. у. (Ч.).—Близъ Мартыновки по берегу р. Черная Грязь, Калм. у. (П. и С.).

620. *C. autumnális* L. Пет. Кр. III, стр. 46.—Пет., стр. 153.—Цин., № 519.—Lind., p. 112.—Ann. C. III, № 223.—Дв., № 3.—Gold. Sp., p. 112.—Mart., p. 3.—St. II, p. 3.—St. I, № 3.

Callitriche virens Goldb. F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, № 702.—Кауф. I, стр. 462.—Дв., № 3.—Макс., № 823.—Gold. C., p. 17.—Gold. Sp., p. 112.

Callitriche aquatica Willd. *autumnalis* L. Hoff. II, № 33.

Подводное растеніе до 20 см. съ приподнимающимися и укореняющимися стеблями, развѣтвленными отъ основанія; листья прозрачные, ярко-зеленые, линейные, съ 1 жилкой; уширенные къ основанію, нѣсколько суженные къ верхушкѣ, кончикъ выемчатый, съ 2 зубчиками; плоды крылатые на спинкѣ, съ столбиками скоро опадающими.

По стоячимъ и медленно текущимъ водамъ. Цвѣтетъ въ августѣ. Симоновъ монастырь (Гольб.).—Купавна, Павловскій посадъ, Бгр. у. (К.).—Заливъ Клязьмы близъ Тарасовки (С.).—Противъ Пестрикова—въ озерахъ, Кзм. у.; въ озерахъ близъ Каргашина на Клязьмѣ (П.).



Callitriche autumnalis.

Порядокъ Sapindales.

56 сем. Celastraceae R. Br.

Цвѣты правильные; чашечка 4—5-раздѣльная; лепестковъ 4—5, прикрѣпленныхъ вмѣстѣ съ тычинками къ краю мясистой диска; тычинки чередуются съ лепестками; завязь 3—5-гнѣздная, съ однимъ столбикомъ; въ каждомъ гнѣздѣ по 2 сѣменочки; плодъ—3—5-створчатая коробочка, вскрывающаяся по створкамъ; сѣмена съ мясистой кожурой; зародышъ зеленый, лежитъ въ большомъ мясистомъ бѣлѣ. Кустарники съ супротивными листьями и съ маленькими опадающими прилистниками.

237. *Evonymus* L.

* *E. europaeus* L. Пет. Кр. I, стр. 115.—Пет., стр. 187.—Кауф. II, стр. 116.—Цин., № 325.—Кауф. I, стр. 118.—Дв., № 245.—Макс., № 231.—Hoff. II, № 1818.—Mart., p. 43.—Hoff., № 1353.—St. II, p. 15.—St. I, № 154.—Pal., № 444.

Кустарникъ съ гладкими, 4-гранными вѣтвями; листья коротко-черешковые, продолговатые или широко-ланцетные, заостренные, мелкозубчатые, толые; полужонтикъ малоцвѣтковый, на довольно длинномъ цвѣтоносѣ, выходящемъ изъ пазухъ листьевъ и превышающемъ черешокъ листа; лепестки до 5 мм., тупые, зеленоватые; коробочка розовая; сѣмена бѣлые, цѣликомъ облечены въ кожуру оранжеваго цвѣта.

Разводится по садамъ; въ одичаломъ видѣ было найдено Макенмо-вичемъ на Мячковскомъ курганѣ (Боровскій курганъ) въ 1824 году и находится въ гербаріяхъ Гольдбаха и Борхмана; съ тѣхъ поръ въ одичаломъ видѣ болѣе не найдено. Цвѣтетъ съ половины мая.



Evonymus europaeus.



Evonymus verrucosus.

621. *E. verrucosus* Scop. Бух. II, № 108.—Бух. I, № 102.—F. O., № 6, p. 86.—Кауф. II, № 193.—Цин., № 326.—Pinz., p. 11.—Кауф. I, стр. 118.—Lind., p. 102.—Ann. C. II, № 114.—Дв., № 246.—Макс., № 232.—Hoff. H., № 1820.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 43.—Hoff., № 1355.—St. II, p. 15.

Evonymus verrucosus L. Пет. Кр. I, стр. 115.—Пет., стр. 187.

Вѣтви кустарника цилиндрическія съ частыми темными бородавками; листья на короткихъ черешкахъ, эллиптическіе, заостренные, по краямъ мелко-зубчатые, голые; цвѣты въ полузонтикахъ по 2—3, рѣже 1, на очень длинномъ цвѣтоножѣ, выходящемъ изъ пазухи листа; лепестки до 3—5 мм., округлые, свѣтло-коричневые; коробочка тѣлеснаго цвѣта; сѣмена черныя, лоснящіяся, до половины облечены въ кожуру ярко-краснаго цвѣта.

По лѣсамъ и кустарникамъ, очень часто; цвѣтетъ съ половины мая весь іюнь; зрѣлые плоды съ половины августа.

57 сем. Aceráceae DC.

Цвѣты правильные, однополые или обоеполые; чашечка б. ч. 5-раздѣльная (рѣже 6—12-раздѣльная); лепестковъ по числу долей чашечки; тычинокъ б. ч. 8 (рѣже 5—12), прикрѣпленныхъ къ широкому подпестичному диску; въ мужскихъ цвѣтахъ тычиночныя нити равны лепесткамъ или длиннѣе ихъ, въ обоеполыхъ—короче лепестковъ; завязь верхняя, 2-гнѣздная, 2-лопастная, съ однимъ столбикомъ и 2-раздѣль-

нымъ рыльцемъ; въ каждомъ гвѣздѣ 2 сѣмечки; плодъ изъ 2 сплюснутыхъ орѣшковъ съ крыльями (крылатки); зародышъ согнутый съ тонкими складчатыми сѣмелями; сѣмя безъ бѣлка. Деревья съ супротивными листьями безъ прилистниковъ.

238. *Ácer* L.

1. Листья перистые, съ 1 или 2 парами листочковъ на черешкахъ.

A. Negundo L.

Листья не перистые. 2.

2. Листья сердцевидно-овальные.

A. tatarica L.

Листья лопастные. 3.

3. Листья б. ч. 3-лопастные, по краямъ двояко-зубчатые; зубцы короткіе.

A. Ginnala Maxim.

Листья выемчато-5-лопастные, лопасти 3—5-зубчатые; зубцы длинно-заостренные.

A. platanoides L.

* *A. tatáricum* L. Пет. Кр. I, стр. 114.—Пет., стр. 129.—Кауф. II, № 114.—Цин., № 300.—Кауф. I, стр. 117.—Дв., № 392.—Макс., № 371.—Mart., p. 69.—St. II, p. 56.—St. I, № 263.—Pal., № 2174.

Кустарникъ, рѣже дерево; листья на довольно длинныхъ черешкахъ, яйцевидные, съ нѣскольکو сердцевиднымъ основаніемъ, спереди заострен-



Acer tataricum.



Acer platanoides.

ные, рѣже слегка 3-лопастные, неравно-зубчатые, снизу по жилкамъ опушенные; цвѣточная кисть яйцевидная, прямостоящая, распускается послѣ листьевъ; лепестки бѣлые, до 3 мм.; тычинки мужскихъ цвѣтовъ вдвое длиннѣе лепестковъ; завязь пушистая; крылья плодовъ округлы, почти параллельныя, ярко-красныя. Разводится.

622. *A. platanoïdes* L. Пет. Кр. I, стр. 113.—Бух. II, № 107.—Бух. I., № 101.—
 F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 129.—Кауф. II, № 192.—
 Цин., № 303.—Кауф. I, стр. 117.—Ann. C. IV, № 6.—
 Дв., № 393.—Макс., № 372.—Hoff. H., № 7916.—
 Gold. C., p. 19.—Mart., p. 69.—Hoff., № 7.—St. II,
 p. 56.—St. I, № 264.—Pal., № 2177.

Высокое, раскидистое дерево съ сѣрою корою; годовалыя вѣтви коричневыя, слегка лоснящіяся; листья длинно-черешковые, на нижней сторонѣ въ углахъ жилкохъ съ бородками сѣрыхъ волосковъ, въ очертаніи округлые, у основанія сердцевидные, 5-лопастные; лопасти 3—5-зубчаты, зубы длинно-заостренные, выемки между лопастями и зубцами округлы; цвѣтки въ щиткахъ, желтовато-зеленые, распускаются вмѣстѣ съ листьями; лепестки до 7 мм.; крылья плода тѣныя, расходятся подъ тупымъ угломъ.

По лѣсамъ, разсѣяннѣ; сѣвернѣе Москвы страдаетъ отъ мороза. Цвѣтеть съ начала мая. Воробьевы горы, Кунцово (К.). Мытищи—Лосинный Островъ (С.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).

* *A. Ginnála* Maxim.

Кусть или не высокае деревцо съ сѣрой корою; листья 6—10 см. дл. и 3—6 см. ш., 3-лопастные, рѣже продолговато-яйцевидные, по краямъ



Acer Ginnala.



Acer Negundo.

неравно-двойко-зубчатые, средняя лопасть много крупнѣе боковыхъ, иногда въ свою очередь слабо 3-лопастная; верхняя сторона листа желто-зеленая, или темно-зеленая, нижняя—свѣтлѣе, обѣ лоснящіяся; черешокъ листа красноватый; осенью листья ярко-пурпуровые; цвѣты такіе же, какъ у *A. tatarica*, но тычинки нѣсколько длиннѣе; плодъ голый. крылья его параллельныя, спереди нѣсколько расширенныя, красно-зеленыя или синевато-красныя. Разводится.

* *A. Negúndo* L.

Дерево, у насъ б. ч. кусть, съ голыми вѣтками и черешками; листья свѣтло-зеленые, на длинныхъ черешкахъ, непарноперистые, съ 1 или 2 па-

рами листочковъ и однимъ конечнымъ ботве крупнымъ, иногда неясно 3-лопастнымъ; листочки яйцевидные, заостренные, коротко-черешковые, крупно-и неравно-зубчатые, б. ч. голые, рѣже снизу слабо опушенные и въ углахъ жилкокъ съ бородками; мужскіе цвѣты съ 4—6 тычинками на длинныхъ цвѣтоножкахъ, въ довольно длинной, густой, повислой кисти; женскіе—въ рѣдкой повислой кисти, съ нушистою завязью; крылья плодовъ на верхушкѣ округлыя, расходятся подѣ острымъ угломъ. Раз- водится.

* Сем. Hippocastanaceae DC.

Цвѣты обоеполые, неправильные; чашелистиковъ 5; лепестковъ 5, изъ коихъ одинъ не большой или иногда его совсѣмъ нѣтъ; тычинокъ 7 (5—9), прикрѣпленныхъ къ подпестичному диску; пестикъ одинъ, 3-гнѣзд- ный, съ однимъ нитевиднымъ столбикомъ и 2 сѣмечками въ каждомъ гнѣздѣ, изъ которыхъ одна направлена вверхъ, другая—внизъ; плодъ— 3-створчатая коробочка, вскрывающаяся по створкамъ, б. ч. съ однимъ сѣменемъ; сѣмя съ большимъ рубцомъ, безъ бѣлка; зародышъ согнутый; корень помѣщается въ складкѣ сѣменной кожуры. Деревья съ супротив- ными пальчатыми листьями безъ прилистниковъ.

* Aësculus L.

1. Лепестковъ 5; листочки безъ черешковъ.

A. Hippocastanum L.

Лепестковъ 4; листочки съ ясными черешками. 2.

2. Цвѣты блѣдно-желтые или зелено-желтые. *A. lutea* Wang.

Цвѣты пурпуровые.

A. Pavia L.



Aesculus hippocastanum.



Aesculus Pavia.

* *A. Hippocastanum* L. Пет. Кр. I, стр. 114.—Пет., стр. 131.—Pal., № 755.

Дерево; листья на длинныхъ черешкахъ, дланевидные изъ 5—7 кли- повидно-обратно-яйцевидныхъ листочковъ, къверху заостренныхъ, края ихъ

неравно-зубчатые, верхняя сторона голая, нижняя по жилкамъ или въ углахъ жилокъ съ желтоватыми волоскамъ; цвѣточная кисть конечная, вверхъ торчащая, пирамидальная; лепестки до 13 мм., волнистые, бѣлые или розовые съ желтыми и красными пятнами, верхніе 2 крупнѣе и отогнуты; тычинки отогнуты внизъ дугой; коробочка покрыта шипами; сѣмя круглое или слегка почковидное, бурое, лоснящееся. Разводится.

* *A. Pavia* L. Пет. Кр. I, стр. 115.—Pal., № 756.

Pavia rubra Lam. Пет., стр. 235.

Не большое дерево; листья на длинныхъ черешкахъ, дланевидные, о 5 листочкахъ; послѣдніе овально-ланцетные, заостренные, двояко-зубчатые, сверху темно-зеленые, часто лоснящіеся, снизу сѣро-зеленые или желто-зеленые, въ углахъ жилокъ волосистые; цвѣточная кисть конечная, рѣдкая, пирамидальная; лепестковъ 4, пурпуровыхъ, по краямъ железисто-рѣсничатыхъ; тычинки красноватыя съ оранжевыми пыльниками, короче лепестковъ; коробочка обратно-яйцевидная, гладкая, безъ шиповъ. Разводится.

* *A. lutea* Wang.

Aesculus flava DC. Пет. Кр. I, стр. 115.

Pavia flava DC. Пет., стр. 235.

Не большое дерево; листья дланевидные; листочковъ 5, яйцевидно-ланцетныхъ, заостренныхъ, двояко-зубчатыхъ, сверху лоснящихся; цвѣточная кисть конечная, рѣдкая пирамидальная; лепестки блѣдно-желтые или зелено-желтые, пушистые, съ рѣсничками и съ довольно длиннымъ ноготкомъ, выступающимъ изъ чашечки; тычинки короче лепестковъ; коробочка продолговато-округлая, съ шероховатою или съ нѣсколько бугорчатою поверхностью. Разводится.



Aesculus lutea.

58 сем. Balsaminaceae Rich.

Цвѣты неправильные, симметричныя; чашечка 5-лиственная или вследствие недоразвитія 2 чашелистиковъ 3-лиственная; одинъ изъ чашелистиковъ очень крупный, вытянутъ въ длинную шпору и окрашенъ въ цвѣтъ лепестковъ, два другіе—маленькіе; лепестковъ 5: передній—желобчатый, сердцевидный, оба боковые большіе спаяны у основанія съ обоими маленькими, такъ что лепестковъ кажется всего три; тычинокъ 5, сросшихся между собой верхними концами нитей; пыльники ихъ плотно слипаются между собой, нити же по отцвѣтаніи отрываются подъ своимъ основа-

нѣмъ, и всѣ тычинки остаются на верхушкѣ молодого плода; завязь верхняя, 5-гнѣздная, съ сидячимъ рыльцемъ; плодъ — длинная струковидная коробочка, разверзающаяся 5 створками: створки упруго скручиваются спиралью снизу вверхъ и съ силой выбрасываютъ сѣмена, а срединная колонка остается; зародышъ прямой; сѣмя безъ бѣлка.

239. *Impatiens Rivin.*

623. *I. noli tângere* L. Пет. Кр. I, стр. 113. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 204. — Кауф. II, № 189. — Цин., № 319. — Кауф. I, стр. 115. — Ann. C. IV, № 7. — Дв., № 261. — Hoff. II, № 1884. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 45. — Lib. Tr., p. 168.

Impatiens Nolitangere L. Макс., № 245. — Hoff., № 1728. — St. I, № 600. — Pal., № 1976.

Impatiens noli me tangere L. Бух. II, № 105. — Бух. I, № 99.

Стебель 40—100 см., примостоящій, съ утолщенными узлами, сильно вѣтвистый, совершенно голый, какъ и все растеніе; листья продолговато-



Impatiens noli tangere.



Impatiens parviflora.

яйцевидные, крупно-зубчатые, тусклые, на короткихъ черешкахъ; цветоносы въ пазухахъ листьевъ, о 3—5 цвѣткахъ, короче листа и согнутые подъ нимъ; цвѣты крупные, лимонно-желтые съ красными пятнами въ зѣвѣ, повислые; шпора на концѣ загнута; зрѣлыя коробочки отъ прикосновенія растрескиваются и далеко разбрасываютъ сѣмена.

По тонкимъ тѣнистымъ мѣстамъ и по лѣснымъ ручьямъ, очень часто. Цвѣтетъ съ начала іюля, весь августъ.

624. *I. parviflora* DC. Пет. Кр. I, стр. 113. — Ф. Б., № 21. — Пет. стр. 204. — Кауф. II, № 190. — Гор., № 20.

Стебель 10—60 см., примостоящій, простой или вѣтвистый; листья скучены на концѣ стебля или вѣтвей, коротко-черешковые, яйцевидно-продолговатые, острые, голые, немного досилившиеся, зубчатые; зубцы на концѣ

железистые; цветоносы въ листовыхъ пазухахъ, равны листьямъ или длиннѣе ихъ, о 4—10 цвѣтахъ, торчащіе; цвѣты маленькіе, блѣдно-желтые съ красными пятнышками въ зѣвѣ; шпора маленькая, прямая; стручковидная коробочка торчащая или нѣсколько отклоненная.

Занесенное, близъ жилья по паркамъ и садамъ. Цвѣтетъ съ іюня до осени. Подъ Ново-Дѣвичьимъ монастыремъ, Ботанической садъ (П.).—Пятницкое кладбище (С.).—Фили (Ассѣ).—Куяново (П.).

Порядокъ Rhamnáles.

59 сем. Rhamnáceae R. Br.

Цвѣты правильные, обоеполые или однополые, и тогда растеніе двудомное; чашечка 4—5-надрѣзная, въ почкосложеніи створчатая, трубка ея слаяна съ завязью, такъ что послѣдняя полунижняя или нижняя; лепестковъ и тычинокъ по числу долей чашечки; тычинки супротивны лепесткамъ, которые много мельче чашелистиковъ; завязь 2—4-гнѣздная, окружена железистымъ дискомъ, съ простымъ столбикомъ и 2—4-раздѣльнымъ рыльцемъ; въ каждомъ гнѣздѣ одна прямая сѣмечка; плодъ у нашихъ видовъ—мясистая костянка съ косточками; зародышъ большой, зеленый или желтоватый; сѣмя съ бѣлкомъ. Кустарники съ простыми листьями и съ прилистниками.

240. *Rhámnus* L.

Цвѣты б. ч. однополые; чашечка 4-надрѣзная, опадающая; лепестковъ 4, безъ ноготка; тычинокъ 4; рыльце 4-раздѣльное; костянка съ 1—5 косточками; сѣмя къ наружной сторонѣ плода съ глубокой бороздкой.

625. *R. cathártica* L. Пет., стр. 258.—Кауф. II, № 194.—Цин., № 327.—Рупр., стр. 90.—Кауф. I, стр. 119.—Дв., № 243.—Макс., № 230.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 42.—Pal., № 433.



Rhamnus cathartica.

Кустарникъ съ супротивными вѣтвями, на концахъ часто переходящими въ колючки; листья супротивные, на длинныхъ черешкахъ, эллиптическіе или яйцевидно-эллиптическіе, съ обоихъ концовъ заостренные или внизу закругленные, по краямъ мелко-зубчатые, голые, съ 3—4 дугообразными боковыми жилками; доли чашечки широко-ланцетныя, острые, у мужскихъ цвѣтовъ отогнутыя, по отцвѣтаніи опадаютъ кольцомъ; лепестки зеленноватые; костянка черная.

По холмамъ и опушкамъ на известковой и песчаной почвѣ. Цвѣтетъ съ половины мая до половины іюня. Лузки, Сри. у.; Сер-

пуховъ, Подольскъ; Невѣрово, Карапчеево, Кал. у.; Мячково, Боровскій курганъ, Брн. у. (К.).—Коломна; за Никифоровымъ, (Сри. у. (П.).—Близъ Звенигорода (Макс.).—Въ одичаломъ состояніи: Царицино (Мар.).—Горенки (Куль.).

241. *Frángula Tourn.*

Цвѣты обоеполые, 5-ные; лепестки съ поготкомъ; рыльце не раздѣльное головчатое; стѣмя плоское, чечевицеобразно-3-гранное.

626. *F. Álnus Mill.*

Rhamnus Frangula L. Бух. II, № 109.—Бух. I, № 103.—F. O, № 6, p. 86.—Пет., стр. 258.—Кауф. II, № 195.—Цин., № 323.—Pinz., p. 11.—Кауф. I, стр. 119.—Ann. C. II, № 115.—Дв., № 244.—Макс., № 229.—Hoff. II, № 1796.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 42.—St. I, № 153.—Pal., № 436.

Frangula vulgaris Rehb.

Кустарникъ съ очередными вѣтвями безъ колючекъ; листья очередные, на черешкахъ, овальные или обратно-яйцевидные, тупые или слегка заостренные, пѣлынокрайніе съ 6—9 параллельными боковыми жилками, снизу вдоль жилокъ часто волосистые; доли чашечки продолговаты, нѣсколько острые, прямые; лепестки съ поготкомъ, внутри бѣлые, снаружи зеленые; незрѣлыя костянки красныя, зрѣлыя—черныя.

По лѣсамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до половины іюля.



Frangula Alnus.



Parthenocissus quinquefolius.

* Сем. Vitáceae Juss.

Цвѣты правильные, обоеполые; чашечка очень маленькая, 5-зубчатая; лепестковъ 5, въ почкосложеніи створчатыхъ, много крупнѣе чашечки; тычинокъ 5 супротивныхъ лепесткамъ; между тычинками и пестикомъ подпестичный 5-лопастной дискъ, лопасти котораго чередуются

съ тычинками; завязь верхняя, 2-гнѣздная, съ почти сидячимъ головчатымъ рыльцемъ; въ каждомъ гнѣздѣ 2 прямостоячія сѣмечки; плодъ—ягода; зародышъ не большой, въ твердомъ какъ рогъ, иногда складчатомъ бѣлкѣ.

* *Parthenocissus* Planchon.

* *P. quinquefolius* (L.) Planchon.

Ampelopsis quinquefolia R. et Sch. Пер. Кр. I, стр. 115.—Пер., стр. 135.

Hedera quinquefolia L.—*Vitis quinquefolia* Moench.—*Ampelopsis hederacea* DC.—*Quinaria hederacea* Rafinesque.

Кустарникъ съ лазящимъ деревянистымъ стеблемъ и съ длинными усиками; листья голые, дланевидные, на длинныхъ черешкахъ, съ 5, рѣже 3 листочками; послѣдніе продолговатые или яйцевидно-ланцетные, заостренные, на очень короткихъ черешкахъ, по краямъ острозубчатые съ почти колючими зубчиками; цвѣты зеленые, въ вильчатыхъ полузонтикахъ; плодъ—круглая, черная ягода съ синеватымъ налетомъ, вызрѣваетъ очень рѣдко. Разводится.

Порядокъ *Malvales*.

60 сем. *Tiliaceae* Juss.

Цвѣты правильные; чашечка 5-листная; вѣнчикъ 5-лепестный; тычпочекъ много, свободныхъ или сросшихся у основаніи въ 5 пучковъ, прикрѣпленныхъ супротивъ лепестковъ; пыльники съ гнѣздами, обращенными внутрь цвѣтка; завязь верхняя, 5-гнѣздная; гнѣзда супротивны чашелистикамъ, съ 2 вислыми сѣмечками въ каждомъ гнѣздѣ; столбикъ простой, съ 5-зубчатымъ рыльцемъ; плодъ—орѣшекъ, вслѣдствіе недоразвитія одногнѣздный, 1—2-сѣмennyй; сѣмя съ бѣлкомъ и среднимъ зародышемъ.

242. *Tilia* L.

1. Нижняя сторона листа, молодая вѣтвь и черешки листьевъ пушистые. *T. platyphyllos* Scop.

Черешки и нижняя сторона листьевъ голые. 2.

2. Нижняя сторона листьевъ синеватая; бородачки въ углахъ жилочекъ буроватые. *T. cordata* Mill.

Нижняя сторона листьевъ свѣтлѣе, но не синеватая; бородачки въ углахъ жилочекъ сѣроватые. *T. vulgaris* Hayne.

627. *T. cordata* Mill.

Tilia parvifolia Ehrh. Пер. Кр. I, стр. 103.—Бух. II, № 95.—Бух. I, № 89.—Пер., стр. 291.—Кауф. II, стр. 167.—Цин., № 293.—Кауф. I, стр. 102.—Lind., p. 98.—Hoff. II., № 3907.—Mart., p. 92.

Tilia microphylla Vent. Дв., № 474.—Макс., № 488.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 92.

Tilia europaea L. Hoff. II., № 3907.—Hoff., № 3265.—St. II, p. 31.—St. I, № 354.—Pal., № 1091.

Tilia ulmifolia Scop.—*Tilia silvestris* Desf.—*Tilia cordifolia* Bess.

Листья округло-сердцевидные, часто неравнобокие, заостренные, двояко-зубчатые, голые, сверху темно-зеленые, снизу синева-зеленые и в углах жилы с буроватыми бородавками; старые листья жесткие, сухие; щитки о многих цветках, редко о 2—3; крыло на черешке и отворочено от цветоноса; орешки мелкие, слегка ребристые, с тонкою скорлупой.

По лесам, иногда в южной части губернии рощами, очень часто. Цветет с половины июня до половины июля.

* *T. vulgaris* Hayne. Кр. I, стр. 103.
Tilia intermedia DC. Макс., № 488. *Tilia europaea* Sm.—*Tilia hollandica* Hort =
T. cordata > *platyphyllos*.



Tilia cordata.

Листья плотные, голые, снизу бледные, но никогда не бывают сине-зелеными, в углах жилы с сѣроватыми бородавками; щиток 5—7-цветковый, повислый; крыло на черешке; орешки кожистые, хрупкие.

Разводится очень часто. Цветет с половины июня.



Tilia vulgaris.



Tilia platyphyllos.

* *T. platyphyllos* Scop.

Tilia platyphylla Scop. Пет. Кр. I, стр. 103.—Пет., стр. 291.—Цик., стр. 114.—
 Дв., № 475.—Макс., № 489.—Mart., p. 93.
Tilia grandifolia Ehrh. Кауф. II, стр. 100.—Кауф. I, стр. 197.

Листья крупные, округло-сердцевидные, заостренные, двояко-зубчатые, с нижней стороны лишь несколько бледные и покрыты мягким пушком, с сѣроватыми бородавками в углах жилы; взрослые листья

тонкіе, мягкіе; молодыя вѣтви и черешки листьевъ тоже пушпистые; щитки о немногихъ (2—3) цвѣтахъ, повислые; крыло сидячее, обращенное внизъ, но не отвороченное; орѣшки съ толстою и твердою скорлупой и съ выдающимися 5 ребрышками.

Разводится. Цвѣтетъ съ начала іюня.

61 сем. *Malvaceae* R. Br.

Цвѣты правильные, обоеполые; чашечка двойная, остающаяся, въ почкосложеніи створчатая, верхняя — 5-раздѣльная, нижняя (подчашіе) — изъ 3 свободныхъ или саяанныхъ листочковъ; лепестковъ 5, въ почкосложеніи скрученныхъ, сросшихся между собой у основанія и нѣсколько приросшихъ къ трубкѣ тычинокъ; тычинокъ много, сросшихся почти до верхушки въ трубку; пыльники почковидные, двугнѣздные, вскрываются полукруговой трещиной; завязь изъ многихъ плодолистиковъ, сросшихся между собой и приросшихъ вмѣстѣ со столбиками къ цвѣточному столбцу; верхушки столбиковъ свободныя и число ихъ равно числу плодолистиковъ; гнѣзда завязи съ одной или многими сѣмепочками; плодъ сухой, распадается на многочисленныя сѣмянки; зародышъ согнутый со складчатыми сѣмедолями; сѣмя съ не большимъ бѣлкомъ.

243. *Málva* L.

Нижняя чашечка (подчашіе) изъ 3 свободныхъ чашелистиковъ; плодъ изъ сплюснутыхъ сѣмянокъ, расположенныхъ кольцомъ.

1. Цвѣты очень крупныя, одиночныя, въ пазухахъ листьевъ; только корневые листья сердцевидно-округлые, стеблевые — глубоко-пальчато-раздѣльные. *M. Alcea* L.

Цвѣты не крупныя, пучками въ пазухахъ листьевъ; всѣ листья округло-сердцевидныя. 2.

2. Вѣтчикъ въ 3—4 раза длиннѣе чашечки, темно-красный съ темными жилками; листочки подчашія широко-яйцевидныя.

M. mauritiana L.

Вѣтчикъ равенъ чашечкѣ или въ 2—3 раза длиннѣе ея, блѣдно-розовый или бѣлый; листочки подчашія линейно-ланцетныя. 3.

3. Лепестки б. ч. въ 3 раза длиннѣе чашечки; чашелистики съ плоскимъ краемъ и впередъ направленными волосками; сѣмянки съ округлымъ краемъ.

M. neglecta Wallr.

Лепестки равны чашечкѣ или немного длиннѣе ея; чашелистики съ волнистымъ краемъ и съ щетинистыми, оттопыренными волосками; сѣмянки съ острымъ краемъ. *M. rotundifolia* L.

628. *M. Alcea* L. Пет. Кр. I, стр. 108.—Бух. II, стр. 16.—Ф. Б., № 18.—Пет., стр. 220.—Кауф. II, № 174.—Цин., № 286.—Рупр., стр. 87.—Кауф. I, стр. 108.—Pal., № 1481.

Стебель 40—80 см., прямостоящий, простой или съ короткими боковыми вѣточками, шершавый отъ звѣздчатыхъ волосковъ, особенно въ верхней части; всѣ листья на черешкахъ; корневые и нижніе стеблевые — округло-сердцевидные, 5-лопастные, по краямъ зубчатые; средніе — 5-раздѣльные, доли ихъ клиновидно-суженныя, надрѣзные или зубчатые; верхніе листья б. ч. 3-раздѣльные, края ихъ почти перисто-надрѣзные или зубчатые; прилистники линейные, острые, по краямъ съ простыми волосками; цвѣты крупныя, одиночныя, въ пазухахъ верхнихъ листьевъ; лепестки розовыя, выемчатые, до 30 мм. дл.; три листочка подчашія продолговато-яйцевидныя, острые; чашелистики до 1 см. дл., съ 3 жилками, сросшіеся, широко-яйцевидныя, острые; сѣмянки по бокамъ морщинистыя, на спинкѣ съ короткими волосками.



Malva Alcea.

По опушкамъ и старымъ паркамъ, занесено, рѣдко. Цвѣтеть съ начала іюля. Аннинское, Бгр. у. (Гум.). — Куское (П.). — Около Красной Пахры. Пдл. у. (Б.). — Осташево въ паркѣ, Мож. у. (Ф. Б. и Мос.).

629. *M. mauritiána* L. Иет. Кр. I, стр. 108. — Иет., стр. 220. — Кауф. II, № 175. — Цин., № 287. — Кауф. I, стр. 108. — Дв., № 673. — Mart., p. 121. — St. II, p. 41. — St. I, № 471. — Pal., № 1479.

Malva silvestris L. Мак., № 650. — Pal., № 1478.

Стебель 50—150 см., прямостоящий, съ рѣдкими волосками; листья покрыты волосками, округло- 5—7-лопастные, по краямъ зубчатые, на длинныхъ, голыхъ черешкахъ, только на верхней сторонѣ усаженныхъ рядомъ густыхъ волосковъ; цвѣтовъ по нѣскольку въ пазухахъ листьевъ на голыхъ цвѣтоножкахъ; лепестки до 25 мм., пурпурово-красныя, съ жилками, широко-обратно-сердцевидныя, съ не глубокой выемкой; три листочка подчашія яйцевидныя, заостренныя; чашелистики треугольно-яйцевидныя, сросшіеся основаніемъ, волосистыя; сѣмянки голыя, на спинкѣ сѣтчато-морщинистыя.

Сорное, по огородамъ и близъ жилья, рѣдко. Цвѣтеть съ іюня до половины августа. Находится въ гербаріи Максимовича. На пашнѣ въ Ивановкѣ (К.). — Серпуховѣ (Г.). —



Malva mauritiana.

На огородах за Владычнымъ монастыремъ близъ Серпухова (Вар.).—Пехорка, Брн. у. (Куль.).

630. *M. neglecta* Wallr. Пет. Кр. I, стр. 107. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 220.—Кауф. II, № 176.

Malva rotundifolia L. Кауф. I, стр. 108.—Lind., p. 98.

Malva rotundifolia auct. pl. Дв., № 671.—Макс., № 648.—Hoff. Н., № 5485.—Gold. С., p. 21.—Mart., p. 121.—Hoff., № 2022.—St. II, p. 41.—St. I, № 470.

Стебель длинный, 10—80 см., лежачий или приподнимающийся, слегка бороздчатый, покрытый редкими, книзу обращенными волосками; листья на длинных черешках, округло-сердцевидные, неясно 5—7-лопастные, края неравно-зубчатые; цветы пучками в пазухах листьев, на довольно длинных цветоножках; лепестки выемчатые, блѣдно-розовые, до 14 мм., въ 2—3 раза длиннѣе чашечки; листочки подчашья линейно-ланцетные; чашелистики сросшіеся, треугольные, съ плоскими краями и впередъ направленными волосками; сѣмянки гладкія, не морщинистыя, съ округленнымъ краемъ.

Сорное, около жилья и по огородамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ начала іюля до осени.



Malva neglecta.



Malva rotundifolia.

631. *M. rotundifolia* L. Ann., C. IV, № 4.

Malva borealis Wallm. Пет. Кр. I, стр. 107.—Бух. II, № 98.—Бух. I, № 93.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 221.—Кауф. II, № 177.—Цин., № 290.—Кауф. I, стр. 108.—Lind., p. 98.

Malva Henningii Goldb. Макс., № 649.—Hoff. Н., № 5471.—Gold. С., p. 21.—Gold. Sp., p. 133.

Malva humifusa Henning. Hoff. Н., № 5471.

Malva rotundifolia L. b. pusilla. Mart., p. 121.

Стебель 10—80 см., лежачий или приподнимающийся, покрытый волосками или почти голый; листья на длинных черешках, округло-серд-

цевидные, неясно- 5—7-лопастные, по краямъ неравно-зубчатые; цвѣты пучками въ пазухахъ листьевъ; лепестки бѣлые или розоватые, до 7 мм., немного превышаютъ чашечку или равны ей, на верхушкѣ слегка выемчатые; листочки подчашія линейно-ланцетные; чашелистики сросшіеся, треугольные, съ волнистыми краями и щетинистыми, оттопыренными волосками; сѣмянки сѣтчато-морщинистыя, съ острымъ краемъ.

По огородамъ, садамъ и близъ жилья, какъ сорное, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до осени.

α. *hirsuta* Kauffm. herb.

Malva borealis Wallm. *hirsuta* Kaufm. Пет. Кр. I, стр. 108.

Malva Henningii Goldb. *pilosior et hispidior* Goldb. Гербарій Гольдбаха.

Съ двоякаго рода волоскамъ: длинными жесткими и короткими вѣтвистыми. Карапчеево, Калм. у. (К.).

β. *glábrior* Kauffm. herb.

Malva borealis Wallm. *glabrior* Kauffm. Пет. Кр. I, стр. 108.

Молодые части растенія шершавыя, взрослые — голыя или съ рѣдкими волоскамъ.

244. *Lavatéra* L.

Подчашіе 3-надрѣзное, а не 3-раздѣльное; остальное какъ у *Malva*.

632. *L. thuringiáca* L. Бух. II, № 99.—Бух. I, № 92.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 210.—Кауф. II, № 178.—Цин., № 283.—Рупр., стр. 87 и 90.—Кауф. I, стр. 109.—Lind., p. 98.—Макс., № 651.—Hoff. II., № 5503.—Gold. C., p. 21.—Gold. Sp., p. 133.—Mart., p. 121.—Hoff., № 1873.—St. II, p. 41.—Pal., № 1487.

Lavatera vulgaris Mart. Дв., № 675.—Mart., p. 121.

Lavatera olbia Steph. Gold. Sp., p. 133.—St. I, № 469.

Стебель 60—150 см., вѣтвистый; все растеніе сѣро-войлочное отъ звѣздчатыхъ волосковъ; листья черешковые, по краямъ округло-городковые; нижніе—угловато-5-лопастные; верхніе — глубоко-3-лопастные, съ срединною болѣе длинною лопастью; цвѣточная кисть верхушечная; цвѣты одиночные въ пазухѣ листа; цвѣтоножки длинныя, вверхъ торчащія; лепестки до 40 мм., розовые съ жилками, глубоко-2-лопастные, въ 3 раза длиннѣе чашечки; листочки подчашія округлые, съ короткимъ остроконеціемъ и съ сѣтчатыми жилкамъ; чашелистики треугольные, сѣро-войлочные; сѣмянки гладкія, съ округлымъ краемъ.

По холмамъ, кустарникамъ и близъ жилья. Цвѣтетъ съ половины іюля весь августъ. Воробьевы горы, между Петровымъ и Тушинскимъ; Архангельское. Звн. у.; Боровскій курганъ, Брн. у.;



Lavatera thuringiaca.

Серпуховъ; Карапчеево, Калм. у. (К.).—Токарево (Геп.).—Аннинское, Бгр. у. (Гум.).—Жилино, близъ Пехорки, Брн. у. (Куль.).—Около Малоярославскаго шоссе, недалеко отъ моста черезъ р. Мѣчу (Б.).—Впоанія, Дмит. у. (С.).—Бѣлые Колодези. Калм. у.; Симоновъ монастырь (П.).—Успенское, Звн. у.; Невѣрово, Калм. у. (Х.).

Порядокъ Parietáles.

62 сем. Guttiferae Endl.

У насъ только подсемейство:

Hypericoïdéae Vent.

Цвѣты правильные; чашечка 5-раздѣльная, остающаяся; вѣнчикъ 5-лепестный, въ почкосложеніи скрученный; тычинокъ много, сросшихся въ три пучка; завязь верхняя, 3-гнѣздная, съ 3 нитевидными столбиками; гнѣзда со стѣнными сѣменосами; плодъ—3-гнѣздная, многосѣменная коробочка, вскрывающаяся по перегородкамъ; сѣмена безъ бѣлка съ прямымъ зародышемъ. У насъ только травы съ супротивными простыми листьями безъ прилистниковъ.

245. *Hypericum* L.

1. Все растеніе пушистое.

H. hirsutum L.

Все растеніе голое. 2.

2. Чашелистики по краю съ железистыми рѣсничками.

H. montanum L.

Чашелистики безъ рѣсничекъ. 3.

3. Стебель 4-гранный, полый; чашелистики эллиптическіе, тупые.

H. quadrangulum L.

Стебель цилиндрическій или съ 2 острыми ребрышками, плотный; чашелистики ланцетные, острые.

H. perforatum L.

633. *H. perforatum* L. Бух. II, № 92.—Бух. I, № 86.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 203.—Кауф. II, № 163.—Цви., № 294.—Pinz., p. 10.—Кауф. I, стр. 100.—Lind., p. 98.—Ann. C. III, № 213.—Дв., № 482.—Макс., № 702.—Hoff. H., № 6190.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 133.—Hoff., № 1697.—St. II, p. 46.—St. I, № 510.—Pal., № 1730.

Стебли въ 30—100 см., примостоящіе, у основанія приподнимающіеся, вѣтвистые, цилиндрическіе или съ 2 продольными линиями, плотные; листья сидячіе, овальные или продолговато-овальные, тупые, съ частыми, просвѣчивающими точечными железками; цвѣты золотисто-желтые; лепестки до 14 мм., по краю и по поверхности съ черными точками; чашелистики ланцетные, длинно-заостренные, короче коробочки; сѣмена съ мелкими точечками.

По лугамъ, холмамъ и по полянамъ. Цвѣтеть съ половинны іюня до середины августа. Лизаветино, Никольское, Иваньково, Давыдково, Раменки (К.). — Перово; Быково—Михневскій лѣсъ, Брн. у. (С.). — Кусково, Лужники подъ Воробьевыми горами, Серебряный боръ близъ Хорошова; Хотѣичи по берегу р. Нерской, Бгр. у. (П.). — Михайловское, Пдл. у. (Б.). — Успенское, Звн. у. (Х.). — Клементьево, Руз. у. (Сюз.).



Hypericum perforatum.



Hypericum quadrangulum.

634. *H. quadrangulum* L. Пет. Кр. I, стр. 101. — Бух. II, № 93. — Бух. I, № 87. — F. O., № 5, p. 70. — Пет., стр. 203. — Кауф. II, № 164. — Цин., № 296. — Pinz., p. 10. — Кауф. I, стр. 101. — Lind., p. 93. — Ann. C. II, № 113.

Hypericum quadrangulare Sm. Дв., № 480. — Макс., № 700. — Hoff. II, № 6194. — Gold. C., p. 21. — Mart., p. 132. — Hoff., № 1699. — St. II, p. 46. — St. I, № 509.

Hypericum dubium Leers. Дв., № 481. — Макс., № 701. — Gold. C., p. 21. — Mart., p. 132.

Корневище почти деревянистое, бурое, вѣтвистое, съ побѣгами; стебли 30—60 см., прямостоящіе, вѣтвистые, полые, съ ясными 4 гранями; листья сидячіе, эллиптическіе или яйцевидно-эллиптическіе, тупые, съ 5 ясными жилками, снизу свѣтлѣе, сизоватые, вдоль края съ рядомъ чернымъ точекъ и съ рѣдкими просвѣчивающими железками; цвѣты золотисто-желтые; лепестки до 12 мм., съ черными точками; чашелистики широко-эллиптическіе, тупые, съ немногими черными точками; коробочка немного длиннѣе чашечки; сѣмена съ мелкими точечками.

По лугамъ, лѣсамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвѣтеть съ половинны іюня до осени.

635. *H. hirsutum* L. Пет. Кр. I, стр. 101. — Бух. II, № 94. — Бух. I, № 88. — Пет., стр. 203. — Кауф. II, № 166. — Гор., № 8. — Цин., № 297. — Рупр., стр. 87. — Кауф. I, стр. 101. — Дв., № 484. — Макс., № 704. — Hoff. II, № 6182. — Gold. C., p. 21. — Gold. Sp., p. 134. — Mart., p. 133. — Hoff., № 1692. — St. II, p. 46.

Стеблей б. ч. нѣсколько въ 50—100 см., прямостоящихъ цилиндрическихъ; все растение пушистое; листья яйцевидные или продолговато-яйцевидные, тупые, съ 5 ясными жилками, нижняя сторона свѣтлѣе, съ просвѣчивающими точечными железками; соцвѣтіе узко-пирамидальное; цвѣты блѣдно-желтые; лепестки до 10 мм.; чашелистики ланцетные, острые, по краямъ железисто-рѣсничатые; сѣмена бархатистыя.



Hypericum hirsutum.

По лѣсистымъ холмамъ. Цвѣтетъ съ половины іюля до половины августа. Воробьевы горы, Борисовская мельница близъ Братцова, Соколово, Раменки; Подольскъ; Деписево, Зви. у. (К.).—Около р. Язовки п. р. Пахры, Пдл. у. (В.).—Константиновка по высокому берегу р. Рожан, Пдл. у. (Х.).—Около Дубровки, Руз. у. (Г. О.).—За Семеновымъ, Мож. у. (Г.).—Подъ Архангельскимъ, Зви. у. (герб. Гофмана).—Близъ Серпухова (Ар.).—Кушелевка, Срп. у. (Кузнецовъ).—Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Бѣлые Колодези, Кзм. у. (П.).

H. montanum L. Находится въ гербаріи Максимовича за № 121; съ тѣхъ поръ не найдено; не встрѣчается и въ смежныхъ губерніяхъ.

63 сем. Elatináceae Camb.

Чашечка 2—4-раздѣльная; вѣничекъ 3—4-лепестный, въ почкосложеніи не скрученный; лепестки чередуются съ чашелистиками; тычинокъ по числу лепестковъ или вдвое болѣе, прикрѣпленныхъ къ цвѣтоложу; завязь верхняя, 3—4-гнѣздная, съ 3—4 сидячими рыльцами; плодъ—коробочка, вскрывающаяся по спайкамъ створокъ; гнѣзда многосѣменные; сѣмена безъ бѣлка, прямые или согнутые, иногда подковою; зародышъ прямой или согнутый. Маленькія водяныя растенія съ супротивными или мутовчатыми листьями съ прилистниками.

246. Elatine L.

1. Листья мутовчатые.

E. Alsinastrum L.

Листья супротивные. 2.

2. Листья, по крайней мѣрѣ нижніе, съ черешками не короче эллиптической пластинки; сѣмена подковообразныя.

E. Hydropiper L.

Листья коротко-черешковые, почти сидячіе; сѣмена слегка согнутыя. 3.

3. Чашечки 2-дольные; лепестковъ и тычинокъ три.

E. triandra Schkuhr.

Чашечки о 4 чашелистикахъ; лепестковъ 4; тычинокъ 4—6.

*E. callitrichoides Rupr.*636. *E. triandra Schkuhr.* Пет. Кр. I, стр. 98. — Пет., стр. 181. — Кауф. II, № 157. — Мил., № 6. — Цин., № 272. — Кауф. I, стр. 97.

Стебли въ 2—10 см., сильно вѣтвистые, лежащiе, въ междоузлiяхъ укореняющiеся; листья 2-рядные, коротко-черешковые, ланцетные, тупо-заостренныя; прилистники овально-ланцетные, зубчатые; цвѣты въ пазухахъ листьевъ, сидящiе, о 3 лепесткахъ; чашечка о 2 чашелистикахъ; тычинокъ 3; сѣмена едва согнутыя.

Въ илѣ по берегамъ прудовъ, рѣдко. Цвѣтеть съ начала iюля до осени.

а. *terrestris* Seubert. Пет. Кр. I, стр. 98. — Ф. Б., № 15. Стебель ползучий; вѣтви приподнимающiяся; листья овально-ланцетные, цѣлюкрайне, нѣсколько мясистые, тусклые; лепестки розовые. Невѣрово, Кзм. у. (К.). — Въ маленькомъ болотцѣ близъ Шутикова, Мож. у. (Ф. Б.).

б. *intermedia* Seubert. Пет. Кр. I, стр. 98.

Стебель только у основанiя ползучий, приподнимающiйся; листья ланцетные или линейно-ланцетные, прозрачные, разставленно-зубчатые; лепестки бѣлые. Илистый берегъ р. Клязьмы близъ Тарасовской платформы (И.).

637. *E. callitrichoides Rupr.* Пет. Кр. I, стр. 99. — Пет., стр. 181. — Кауф. II, № 153. — Мил., № 7. — Цин., № 273. — Кауф. I, стр. 97.

Стебель 2—10 см., сперва ползучий, укореняющiйся, потомъ приподнимающiйся, бѣлый; листья коротко-черешковые, продолговато-линейные, цѣлюкрайне, на концѣ приутолщенные или слегка выемчатые, слабо-прозрачные, лоснящiеся, сверху ярко-зеленые, снизу слегка серебристые; прилистники лiцевидные, острые перепончатые; цвѣты о 4 лепесткахъ и 4 чашелистикахъ; тычинокъ 4—6; сѣмена немного согнутыя, поперекъ морщинистыя.

На днѣ прудовъ, по берегамъ озеръ и рѣкъ, часто. Близъ Павловскаго посада, Вгр. у. (К.). — Машино въ рѣкѣ Торгошѣ, Дмт. у. (И.). —

*Elatine triandra.**Elatine callitrichoides.*

Въ озеркахъ по берегамъ р. Клязмы между Черкпзовымъ и Каргашинымъ (П. и С.).

638. *E. Hydriopiper* L. Бух. II, № 90.—Пет., стр. 181.

Elatine Schkuhriana Hayne. Пет. Кр. I, стр. 99.—Кауф. II, № 159.—Цин., № 274.—Кауф. I, стр. 97.



Elatine Hydriopiper.

Стебель въ 2—10 см., вѣтвистый, ползучий, укореняющійся, съ поднимающимися вѣточками; листья продолговато-эллиптическіе, суженные въ длинный черешокъ, равный отгибу листа или длиннѣе его; прилистники едва замѣтные; лепестковъ и чашелистиковъ по 4; тычннокъ 8; сѣмена подковообразныя.

Цвѣтетъ съ середины іюня; плоды въ концѣ іюля.

α. *terrestris* Seubert.

Elatine Schkuhriana Hayne 1. forma *terrestris* Seubert. Пет. Кр. II, стр. 100.

Очень мелкая форма со стеблемъ сильно вѣтвистымъ, ползучимъ и съ листьями нѣсколько мясистыми,

у которыхъ пластинка почти равна черешку, а поверхность усеяна мелкими бугорками; на концѣ вѣтвей листья скучены въ розетку; цвѣты частые и лепестки ихъ розовые.

Наземная форма по берегамъ рѣкъ, ручьевъ и озеръ. Невѣрово, Кзм. у. (К.).—Берегъ р. Клязмы у Павловскаго посада, Бгр. у.; у д. Мартынова на высохшемъ плѣ р. Черная Грязь, Кзм. у. (П. и С.).

β. *intermedia* Seubert.

Elatine Schkuhriana Hayne 2. forma *intermedia* Seubert. Пет. Кр. I, стр. 100.

Болѣе крупная форма съ вѣтвистымъ ползучимъ стеблемъ; листья прозрачныя, съ одною срединною жилкою; черешокъ много длиннѣе пластинки; цвѣты частые, лепестки ихъ бѣлые.

Подъ водой на очень мелкихъ мѣстахъ. Клязма у Павловскаго посада (К.).—Клязма у Каргашина, озеро Долгое близъ д. Рыбаки, Мос. у. (П. и С.).

γ. *submersa* Seubert. Ф. Б., № 16.

Elatine Schkuhriana Hayne 3. forma *submersa* Seubert. Пет. Кр. I, стр. 100.

Стебель мало вѣтвистый, прямой, вытянутый, укореняющійся только у основанія; листья о 3—5 жилкахъ; цвѣтовъ мало; лепестки бѣлые.

Подъ водой. Клязма у Павловскаго посада, Бгр. у. (П. и С.).—Машино, въ р. Ширенкѣ, Дмит. у. (П.).—Глубокое озеро на глубинѣ полуаршина, Руз. у. (Г. О. и Ф. Б.).

639. *E. Alsinastrum* L. Пет. Кр. I, стр. 98.—Ф. О., № 5, р. 70.—Пет., стр. 181.—Кауф. II, № 156.—Цин., № 271.—Рупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 97.

Стебель 5—40 см., разветвленный, голый, членистый, въ узлахъ перетянутый; листья мутовчатые, нижніе—6. ч. по 5, линейные, верхніе—6. ч. по 3, овальные, цѣлюкрайніе, съ 3 ясными и 6 слабо замѣтными жилками; цвѣты сидятъ въ пазухахъ листьевъ; лепестковъ 4, бѣлыхъ, округлыхъ, равныхъ 4-листной чашечкѣ; сѣмена линейныя, немного согнутыя.

Въ прудахъ, очень рѣдко. Съ цвѣтами и плодами въ началѣ августа. Прудъ близъ Воронцова за Калужской заставой (Ф.).—Близъ д. Аксентьевой въ Куровскомъ лѣсу, Мож. у. (Ф. О.).



Elatine Alsinastrum.



Helianthemum vulgare.

64 сем. Cistáceae Dunal.

Цвѣты правильные, обоеполые; чашечка 5-листная, въ почкосложеніи скрученная; 2 вѣшніе чашелистика очень маленькіе, такъ что чашечка кажется 3-листной; вѣнчикъ 5-лепестный, въ почкосложеніи скрученный, но по направленію противоположному чашечкѣ; тычинокъ много; завязь верхняя, изъ 3—5 плодolistиковъ, одногнѣздная, со стѣнными сѣменосами; столбикъ одинъ съ головчатымъ или слегка 3-лопастнымъ рыльцемъ; сѣмепочки прямые; плодъ—коробочка, вскрывающаяся по стѣннымъ швамъ створками, число конхъ равно числу плодolistиковъ; сѣмя съ бѣлкомъ; зародышъ согнутый.

247. *Helianthemum* Mill.

640. *H. vulgare* Gaertn. Пет. Кр. I, стр. 75.—Пет., стр. 198.—Мил., № 3.
Helianthemum Chamaecistus Mill.—*H. Helianthemum* (L.) Karst.

Полукустарникъ съ распростертыми или приподнимающимися вѣтвями до 30 см.; листья съ прилистниками, супротивные, на короткихъ череш-

кахъ, овальные или линейно-продолговатые, тупые, цѣльнокрайніе, съ завернутыми внутрь краями, часто рѣсничатые; верхняя сторона ихъ съ короткими волосками, нижняя—часто войлочная; цвѣты въ кистевидномъ полузонтикѣ, съ прицвѣтниками; 3 чашелистика съ остроконечіемъ, перепончатые, съ 4 выдающимся жилками, въ 3—4 раза короче желтыхъ лепестковъ, у основанія съ темно-желтыми пятнами; пыльники по концамъ съ выемками; столбики въ 2—3 раза длиннѣ завязи; цвѣтоножки при плодахъ отогнуты внизъ.

Близъ Берлюковой пустыни, Бгр. у. (Е. Е. Армандъ).

65 сем. *Violáceae* DC.

Цвѣты неправильные, симметричные, обоеполые; чашечка остающаяся при плодѣ, 5-листная, у каждого листочка съ придаткомъ, обращеннымъ назадъ; вѣнчикъ 5-лепестный, съ нижнимъ лепесткомъ, снабженнымъ б. или м. длинной шпорой; тычнокъ 5, плотно прилегающихъ къ пестику, съ очень короткими нитями; 2 переднія тычинки вытянуты въ шпоровидные медовки, заключенные въ шпору нижняго лепестка; связникъ у пыльниковъ пленчатый, вытянутый въ б. или м. длинный придатокъ; завязь одногнѣзная, съ 3 стѣнными сѣменосами, многосѣменная; столбикъ простой, часто булабовидный; плодъ—3-створчатая коробочка, вскрывающаяся по спиннымъ швамъ; зародышъ прямой; сѣмя съ мясистымъ бѣлкомъ.

248. *Viola* L.

1. Всѣ листья корневые, на длинныхъ черешкахъ; цвѣты въ пазухахъ корневыхъ листьевъ на длинныхъ цвѣтоножкахъ; чашелистики на верхушкѣ округленные или туповатые. 2.

Цвѣты въ пазухахъ стеблевыхъ, иногда и корневыхъ листьевъ; чашелистики острые или заостренные. 7.

2. Листья голые или едва замѣтно опушенные; рыльце приплюснутое, косое; коробочка повислая, 3-гранная, голая. 3.

Листья ясно-пушистые; рыльце согнуто крючкомъ; коробочка шаровидная, пушистая. 5.

3. Листья съ довольно частыми городками, на крылатыхъ черешкахъ; зубцы съ бурой железкой; прилистники до половины приросшіе къ листовымъ черешкамъ. *V. uliginosa* Schrad.

Листья съ рѣдкими городками, но безъ железокъ на зубцахъ; черешки не крылатые; прилистники свободные. 4.

4. Листья почковидные, съ обѣихъ сторонъ голые, б. ч. лоснящіеся; шпора не превышаетъ 1 мм.; цвѣтоножка б. ч. превышаетъ листья. *V. palustris* L.

Листья сердцевидно-почковидные, нѣсколько заостренные, б. или м. тусклые, б. ч. покрыты рѣдкими волосками, иногда только на нижней сторонѣ; шпора постоянно не короче 2 мм.; цвѣтоножка б. ч. не превышаетъ листьевъ. *V. epipsila* Ledeb.

5. Прилистники узко-ланцетные, длинно и тонко заостренные, съ длинными и частыми бахромками, длина копъхъ превышаетъ ширину прилистниковъ, по краямъ усаженныхъ, какъ и бахромки, волосами. *V. collina Bess.*

Прилистники яйцевидно-ланцетные, острые, по краямъ съ толстыми и короткими бахромками, длина копъхъ менѣ половины ширины прилистниковъ; края бахромокъ безъ волосковъ. 6.

6. Корневище ползучее съ длинными стелющимися побѣгами; нижній лепестокъ выемчатый. остальные—округлые; цвѣты пахучіе. *V. odorata L.*

Корневище не ползучее, безъ побѣговъ; б. ч. всѣ лепестки слегка выемчатые; цвѣты безъ запаха. *V. hirta L.*

7. Прилистники лировидно-перисто-раздѣльные, съ болѣе крупною конечною долею. *V. tricolor L.*

Прилистники не перисто-раздѣльные. 8.

8. Листовые черешки и стебли покрыты только съ одной стороны волосками; цвѣты пахучіе. *V. mirabilis L.*

Листовые черешки и стебли голые или опушенные со всѣхъ сторонъ; цвѣты безъ запаха. 9.

9. Прилистники крупные, похожи на листья, у верхнихъ листьевъ равны половинѣ пластинки листа или даже длиннѣ половины пластинки. 10.

Прилистники мелкіе, не походятъ на листья, всѣ короче половины пластинки листа. 11.

10. Стебель и листья покрыты короткими волосками; средніе прилистники длиною съ черешокъ листа. *V. elatior Fr.*

Стебель и листья голые; средніе прилистники короче листового черешка. *V. pumila Chaix.*

11. Коробочка, стебли и листья коротко-пушистые.

V. arenaria DC.

Все растеніе голое, если же и бываетъ слегка опушенное, то коробочка всегда голая. 12.

12. Коробочка тупая, на верхушкѣ съ короткимъ остріемъ, шпора желтоватая; корневой розетки осевыхъ листьевъ нѣтъ.

V. canina L.

Коробочка острая; шпора бѣлая; корневая розетка осевыхъ листьевъ есть. *Riviniana Rehb.*

641. **V. palustris L.** Пет. Кр. I, стр. 76.—Бух. II, № 13.—Пет., стр. 306.—Кауф. II, № 99.—Цин., № 172.—Кауф. I, стр. 69.—Lind., p. 92.—Дв., № 252.—Макс., № 238.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 44.—St. I, № 595.—Pal., № 1972.

Корневище ползучее, съ побѣгами; листья въ числѣ 2, рѣдко 3, почковидные, съ обѣихъ сторонъ голые, б. ч. лоснящіеся, гороdkовые; нижняя сторона листа свѣтлѣе верхней; вѣнчикъ блѣдно-лиловый,

отъ 9 до 11 мм.; шпора не превышаетъ 1 мм.; цвѣтоножки часто превышаютъ листья; два прицвѣтника б. ч. сидятъ на нижней половинѣ цвѣтоножки; коробочка голая.

По болотамъ и болотистымъ лугамъ, не часто. Цвѣтетъ съ конца апрѣля до половины юня. Близъ Никольскаго по берегу р. Химки, Зыково; Раменское, Брн. у. (К.).—Сокольники, Косино, Серебряный боръ близъ Хорошова; Ковригино, Бгр. у.; Карачарово на Волгѣ, Кн. у. (П.).—Пушкино, болото по берегу р. Серебрянки (С.).—По списку Я. В. Байкова встрѣчается по ручью близъ д. Каменки, Пдл. у.—Вилки, Брн. у. (Х.).—Кусково (Куль.).



Viola palustris.



Viola epipsila.

642. *V. epipsila* Ledb. Пет. Кр. I, стр. 76.—Бух. II, № 59.—Бух. I, № 59.—
 F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 306.—Кауф. II, № 100.—
 Цип., № 173.—Кауф. I, стр. 70.—Ann. C. II, № 105.

Viola palustris L. Hoff. H., № 1870.

Корневникъ горизонтальный, съ длинными междоузліями; листья въ числѣ 2—3, рѣдко 1, сердцевидно-почковидные, городковые, б. ч. покрыты рѣдкими волосками, чаще всего волоски бываютъ только на нижней сторонѣ листьевъ; нижній листъ иногда тупой, верхній—всегда слегка заостренный; вѣнчикъ лиловый или голубовато-лиловый, отъ 12 до 17 мм., рѣдко до 19 мм.; шпора чаще всего равна 2 мм.; чашелистики яйцевидные, туповатые; цвѣтоножка б. ч. не превышаетъ листьевъ и обыкновенно въ верхней своей половинѣ съ двумя прицвѣтниками; коробочка голая.

По болотамъ, болотистымъ лугамъ и по опушкамъ сырыхъ лѣсовъ. Цвѣтетъ съ конца апрѣля до середины юня. Иваново, Воробьевы горы, Перерва, Кусково, Богородское; Раменское, Брн. у. (К.).—Лосинный Островъ; Буньково, Бгр. у.; Карачарово на Волгѣ, Кн. у. (П.).—Мытищи; Хотѣвичи, Брн. у., съ бѣлыми цвѣтами (С.).—Близъ деревни Малинокъ, Пдл. у. (Б.).—Новоудѣльная, М.-Каз. ж. д., Брн. у. (Х.).—По окраинѣ болота Бисерова монастырскаго озера, Бгр. у. (П. и Х.).

V. epipsila × **palustris.**× *Viola Ruprechtiana* Borb.

Листья почковидно-сердцевидные, первый б. ч. съ округлой верхушкой, второй съ нѣсколько-заостренной, слабо-лосянищеся, на нижней сторонѣ по жилкамъ покрыты короткими волосками, позднѣе часто совершенно голые; иногда попадаются особи съ однимъ листомъ голымъ, другимъ слегка опушеннымъ; прицвѣтники—то ниже середины цвѣтоножки, то выше середины; шпора средняя между обоими видами, но почти всегда въ два раза длиннѣе придатковъ чашелистиковъ; попадаются особи и съ очень короткой шпорой, но тогда листья съ нижней стороны опушенные.

Косино, между Косинымъ и Вешняками (X.).—Болото по берегу Бисерова монастырскаго озера, Бгр. у. (П. и X.).

643. V. uliginósa Bess.

Viola uliginosa Schrad. Пет. Кр. I, стр. 82.—Пет., стр. 306.—Кауф. II, № 101.—Мил., № 4.—Гор., № 1 Addenda.

Листья съ крылатыми черешками, сердцевидно-яйцевидные, городковые, на каждомъ зубцѣ съ бурой железкой; прилистники яйцевидно-ланцетные, железисто-зубчатые, до половины приросшіе къ листовымъ черешкамъ; чашелистики нѣсколько туповатые, яйцевидные; лепестки продолговато-обратно-яйцевидные, темно-лиловые, средніе—у основанія съ маленькимъ углубленіемъ, нижніе—съ 5, верхніе—съ 3 темными жилками, средній нижній лепестокъ до 17 мм.; цвѣтоножка б. ч. превышаетъ листья; коробочка голая.

Цвѣтеть съ начала мая. Въ болотѣ по кочкамъ близъ Бѣлопесоцкой слободы противъ Каширы, Срп. у. (П., Г. М. и Мил.).

*Viola uliginosa.*

- 644. V. hirta L.** Пет. Кр. I, стр. 78.—Бух. II, № 60.—Бух. I, № 60.—F. O., № 5, p. 70.—Пет., стр. 307.—Кауф. II, № 102.—Цин., № 176.—Рупр., стр. 87.—Кауф. I, стр. 70.—Ann. C. III, № 207.—Дв., № 251.—Макс., № 237.—Hoff. II., № 1859.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 44.—Hoff., № 3490.—St. II, p. 6.—St. I, № 594.—Pal., № 1970.

Viola campestris M. B. Дв., № 254.—Hoff. II., № 1851.

Довольно толстое корневище безъ побѣговъ; все растеніе сѣро-зеленое отъ отклоненныхъ, короткихъ волосковъ; листья удлинено-яйцевидные, у основанія сердцевидные, городковые; прилистники не покрыты волосками, яйцевидно-ланцетные, острые, по краямъ съ толстыми и короткими бахромками, длина конхъ менѣе половины ширины прилистниковъ, иногда верхушка ихъ слабо рѣсничатая; попадаются особи съ прилистниками почти безъ бахромокъ и листьями слабо опушенными; цвѣтоножка голая или покрыта волосками, посрединѣ съ двумя прицвѣтниками; цвѣты

блѣдно-лиловые, рѣдко бѣлые; всѣ лепестки немного вмячатые; коробочка пушистая.

По холмамъ, лѣсамъ и опушкамъ. Цвѣтеть съ конца апрѣля до половины мая.

α. vulgaris Rchb.

Viola hirta L. var. *dumetorum* Haussk.

Цвѣтоножки равны или почти равны весеннимъ листьямъ, которые во время цвѣтенія до 6 см. дл., по отцвѣтаніи черешокъ листа



Viola hirta α. *vulgaris*.



Viola hirta β. *fraterna*.

въ 2—4 раза длиннѣе пластинки, очень рѣдко въ полтора раза. Воробьевы горы, Лизветино, Кунцово, Раменки (К.).—Мытищи—Лосинный Островъ (С.).—Царицыно; Бѣлые Колодези, Км. у. (Х.).—Серебряный боръ близъ Хорошова, съ бѣлыми цвѣтами (П. и Сюз.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Пикифорово, Лужки, Срп. у.; Невѣрово, Км. у. (П.).—Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ.).

β. fraterna Rchb.

Viola parvula Opiz.—*Viola hirta* L. var. *pratensis* Haussk.

Растетъ густыми дернинками; цвѣтоножки до 7 см., въ два раза и болѣе длиннѣе весеннихъ листьевъ, которые во время цвѣтенія мелки, 1—2 см. дл., на черешкахъ такой же длины. Новый Иерусалимъ по склону у березовой рощи, Зен. у. (Х.).—Въ Серебряномъ бору близъ Хорошова, найдено съ бѣлыми цвѣтами = *f. lactiflora* Rchb. (П. и С.).

645. **V. collina Bess.** Пет. Кр. I, стр. 77.—Пет., стр. 307.—Кауф. II, № 103.—Цин., № 178.—Кауф. I, стр. 70.

Корневище толстое, безъ побѣговъ; все растеніе свѣтло-зеленое, коротко-пушистое; листья обратно-сердцевидные, мелко-и часто-городковые; прилистники узко-ланцетные, длинно-заостренные, съ длинными и ча-

стыми бахромками, длина коихъ въ ширину прилистника, усаженного по краямъ и по краямъ бахромокъ короткими рѣсничками; цвѣты душистые, блѣдно-лиловые съ бѣловатой шпорою; коробочка пушистая.

По лѣсистымъ холмамъ и по опушкамъ. Цвѣтетъ съ половины апрѣля до половины мая. Воробьевы горы (Рач.).—Куницово—Проклятое мѣсто (К.).—Царицыно (Х.).—Серпуховъ (Сюз.).—Въ лѣсу у ручья близъ Борисова, Срп. у. (С.).—Близъ Лужковъ, Срп. у.; липовая роща близъ Игнатьева, Кал. у. (П.).

V. collina \times *hirta*. Бух. II, № 60 а.

По сообщенію Ф. В. Бухгольца въ окрестностяхъ Михайловскаго, Пдл. у. встрѣчается *Viola*, которая по формѣ и опушенію прилистниковъ подходитъ къ *V. hirta*, по формѣ же листьевъ, запаху и цвѣту лепестковъ—къ *V. collina*.



Viola collina.



Viola odorata.

646. *V. odorata* L. Пет. Кр. I, стр. 78.—Ф. Б., № 9.—Пет., стр. 307.—Кауф. II, № 104.—Мил., № 3.—Цин., № 179.—Рупр., стр. 87.—Кауф. I, стр. 71.—Дв., № 253.—Макс., № 239.—Макс. Пут. II, стр. 11.—Mart., p. 44.

Корневище толстое, съ длинными побѣгами; листья округло-яйцевидные съ сердцевиднымъ основаніемъ и закругленной верхушкой, городковые, коротко-пушистые; прилистники яйцевидно-ланцетные, съ бахромками короче половины ширины прилистниковъ, рѣсничекъ по краямъ нѣтъ; цвѣты душистые, темно-лиловые; нижній лепестокъ на верхушкѣ слегка выемчатый, 4 остальные съ округлой верхушкой; коробочка коротко-пушистая.

Одичалое, въ тѣнистыхъ мѣстахъ, б. ч. по старымъ запущеннымъ паркамъ. Цвѣтетъ съ половины апрѣля, весь май. Воробьевы горы (герб. Гольдбаха).—Въ Дворцовомъ саду (Дв.).—Петровское-Разумовское (Кл.).—Садъ Занѣгина въ Красномъ Селѣ; садъ въ Ивакинѣ близъ Химокъ (М.).

647. *V. canina* L. Пет. Кр. I, стр. 79.—Бух. II, № 62.—Бух. I, № 62.—F. O., № 5, p. 70. — Пет., стр. 308. — Кауф. II, № 107. — Цин., № 186.—Кауф. I, стр. 72.—Дв., № 255.—Макс., № 241.—Нoff. H., № 1853.—Gold. C., p. 18.—Mar., p. 44.—Hoff., № 3489.—St. II, p. 16.—St. I, № 596.

Стебель одинъ или нѣсколько въ 5—30 см., б.ч. приподнимающихся; листья глубоко-сердцевидные, по краямъ зубчатые, продолговато-ланцетные или яйцевидные, иногда съ вытянутой верхушкой, но не заостренные,



Viola canina α. *sabulosa*.



Viola canina β. *ericetorum*.

нижніе — туповатые; прилистники продолговато-ланцетные, бахромчатые; цвѣты сине-лиловые, на длинныхъ цветоножкахъ; лепестки у основанія бѣлые; шпора желтоватая, въ 2 раза длиннѣе придатковъ чашелистиковъ; коробочка голая, тупая, съ короткимъ остриемъ на верхушкѣ.

Цвѣтетъ съ мая до половины іюня.

α. *sabulosa* Rchb. Пет. Кр. I, стр. 79.—Кауф. II, стр. 66.—Кауф. I, стр. 72.

Мелкая форма со стеблемъ почти лежащимъ, съ листьями сердцевидными; цвѣты маленькіе; растетъ на пескахъ. Симоновъ монастырь, Серпуховъ (К.). — Воробьевы горы (П.). — Близъ Старой Кашеры, Срп. у. (С.).



Viola canina γ. *lucorum*.

β. *ericetorum* Rchb. Пет. Кр. I, стр. 80.

Стебель средней высоты, почти прямостоящій; листья овально-сердцевидные. По кустарникамъ и лугамъ, не часто. Лужки, Срп. у.;

Акатьево, Клм. у.; лѣсъ близъ Вирева, Клм. у.; Воробьевы горы, Сокольники (П.).—Михайловское, Костяковский лѣсъ, Пдл. у. (Б.).—Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ.).

γ. lucorum Rehb. Пет. Кр. I, стр. 80.—Pinz., p. 10.

Viola canina L. *β. typicum* Trautv. Бух. II, № 62 *β.* — Бух. I, № 62 *β.* — Кауф. II, стр. 67.—Кауф. I, стр. 72.

Viola canina L. *major*. Ann. C. V, № 11.

Viola canina L. *γ. montana* L. Бух. I, № 62 *γ.*

Viola lancifolia M. B. Hoff. II., № 1861.

Стебли тонкіе, высокіе; листья сердцевидно-овальные, крупные; прилистники по краямъ съ рѣдкими, почти линейными зубчиками, крупные, по короче черешковъ листьевъ. По лѣсамъ и кустарникамъ. очень часто. Перерва, Ивановко, Останкино (К.).—Сокольники, Раменки, Кунцово. Мытищи, Люблино, Серебряный боръ близъ Хорошова; Раменское, Брн. у.; Михайловское, Мож. у.; между Никифоровымъ и Лопасней, Срп. у.; Бѣлые Колодези, Кзм. у. (П.). — Въ лѣсу между Серпуховымъ и ст. Ока (С.). — Дарьино, Успенское, Звн. у. (Х.).

δ. montana Rehb. Пет. Кр. I, стр. 80.

Viola canina L. *γ. montana* L. Кауф. II, стр. 67.—Кауф. I, стр. 72.—Hoff. II., № 1865.—St. II, p. 16.

Viola stricta Hornm. Ann. C. V, № 10.

Viola montana L. *β. persicifolia* Willd. Макс., № 242.—Mart., p. 45.—Hoff., № 3492.

Viola elatior Fr. Дв., № 256.

Стебель прямостоящій; листья крупные, съ длинными и широкими прилистниками, равными у верхнихъ листьевъ черешкамъ или даже нѣсколько длиннѣе ихъ. Воровьевы горы (гербаріи Гофмана и Гольдбаха)—Перерва, Ивановко, Останкино (К.).

648. *V. elatior* Fr. Пет. Кр. I, стр. 81.—Пет., стр. 308.—Кауф. II, № 108.—Гор., № 12.—Цин., № 182.—Pinz., p. 10.—Кауф. I, стр. 73.

Стебель прямостоящій, очень высокій, до 50 см.; все растеніе покрыто короткимъ пушкомъ; листья широко-ланцетные, снизу округлые или слабо-сердцевидные, до 9 см. дл. и до 2,5 см. ш.; черешки до 2,5 см., узко-крылатые; прилистники очень крупные, до 5 см. дл. и до 1 см. ш., зубчатые, значительно превышаютъ черешокъ листа, у нижнихъ листьевъ равны ему; цвѣты блѣдно-лиловые или почти бѣлые, на длинныхъ цвѣтоножкахъ; чашелистики острые; шпора равна придаткамъ чашелистиковъ или немного длиннѣе ихъ.

По оврагамъ и кустарникамъ, на пескѣ и известнякахъ. Цвѣтетъ съ начала мая; зрѣлые плоды съ начала августа. Бѣлые Колодези, Карапчеево, Кзм. у. (П.). — Клычево, Кзм. у. (Мил.).—Близъ Лужковъ, Срп. у. (П. и Сюз.).—Между Никифоровымъ и Прилуками, Срп. у. (Экс. Бот. Лаб.).



Viola elatior.

649. *V. pumila* Chaix. Пет. Кр. I, стр. 82.

Viola stagnina Kit. Пет., стр. 308.—Кауф. II, № 108.—Цви., № 184.—Рупр., стр. 87.—Кауф. I, стр. 73.

Viola pratensis M. et K.

Стебель до 30 см., совершенно голый, какъ и все растение; листья продолговатые, у основанія слегка сердцевидные или округлые, къ верхушкѣ вытянутые и зубчатые; черешокъ близъ листа немного крылатый; прилистники бахромчатые, вдвое короче черешка, верхніе—столь же длинные или немного длиннѣе его; цвѣты почти бѣлые или молочно-бѣлые, на длинныхъ цветоножкахъ; шпора такой же длины, какъ придатки чашелистниковъ.

По сырымъ лугамъ и кустарникамъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ конца мая до половины іюня. Найдено между Иваньковымъ и Тушинымъ близъ Захарова (К.).—Впослѣдствіи тамъ же (Н.).



Viola pumila.



Viola mirabilis.

650. *V. mirabilis* L. Бух. II, № 58. — Бух. I, № 58. — F. O., № 5, p. 70. — Пет., стр. 108.—Кауф. II, № 110.—Цви., № 181.—Pinz., p. 10. — Кауф. I, стр. 74. — Ann. C. II, № 106. — Дв. № 257. — Макс., № 243. — Hoff. II, № 1864. — Gold. C., p. 18.—Mart., p. 45.—St. II, p. 16.—St. I, № 597.—Pal., № 1973.

Viola Mirabilis L. Hoff., № 3491.

Изъ толстаго, почти деревянистаго съ бурыми чешуйками корневища выходятъ одинъ или нѣсколько стеблей, которые сперва очень коротки, такъ что растеніе кажется почти безстебельнымъ, потомъ, по отцвѣтаніи, стебли вырастаютъ до 35 см. и выше; черешки листьевъ и стебли съ одной стороны опушенные; листья на длинныхъ черешкахъ, округло-сердцевидные, городковые, по жилкамъ часто съ волосками; верхушка ихъ немного заостренная; прилистники продолговато-ланцетные, цѣлюкрайніе или едва зубчатые, верхніе—съ рѣсничками; цвѣты душистые, блѣдно-

лиловые, на длинных цветоножках; чашелистики крупные, ланцетные, шпора длиннее придатков; коробочка голая.

По лесамъ, часто. Цвѣтеть съ половины апрѣля до половины мая; плоды въ половинѣ июля. Купцово, Воробьевы горы, Мизаветино, Останкино, Маренно (К.).—Воронцово за Калужской заставой, Кузьминки, Гаврилково на Сходнѣ; Бѣлые Колодези, Клм. у. (П.).—Мытищи—Лосинный Островъ; Зиброво, Срп. у.; Боровскій курганъ, Брн. у. (С.).—Михайловское, Пдл. (В.).—Дарьино, Звн. у.; Невѣрово, Клм. у. (Х.).

651. *V. Riviniána* Rehb.

Viola silvestris Lam. Пет. Кр. I, стр. 79.—Бух. II, № 61.—Бух. I, № 61.—Пет., стр. 308.—Кауф. II, № 106.—Цин., № 187.—Кауф. I, стр. 72.

Корневище несетъ центральную розетку осевыхъ листьевъ и нѣсколько приподнимающихся или иногда почти лежащихъ стеблей въ 10—30 см.; все растеніе б. ч. голое и лоснящееся; листья, особенно верхніе, яйцевидно-сердцевидные, зубчатые, нижніе — округло-сердцевидные, тупые, иногда почти почковидные, длина ихъ часто равна ширинѣ или даже короче ея; прилистники линейно-ланцетные, по краямъ бахромчатые; цвѣты свѣтло-лиловые, на длинныхъ цветоножкахъ; лепестки у основанія бѣлые, въ 2—2½ раза длиннѣе ширины; шпора бѣлая, въ 2—4 раза длиннѣе



Viola Riviniana.



Viola arenaria.

нижнихъ придатковъ чашелистиковъ, которые бываютъ въ 2—3 мм. дл.; коробочка острая, голая.

По лесамъ. Цвѣтеть съ начала мая; плоды въ іюлѣ. Купцово, Пушкино (К.).—Петровское-Разумовское (Куль.).—Корчагино, Клн. у. (П.).—Михайловское, Пдл. у. (В.).—Звенигородъ — Саввинъ-Сторожевскій монастырь; подъ Бородинымъ, Мож. у. (М.).—Порѣчье, Мож. у. (В.)

652. *V. arenária* DC. Пет. Кр. I, стр. 79.—Бух. II, № 63.—Бух. I, № 63.—Г. О., № 5, р. 70.—Пет., стр. 308.—Кауф. II, № 105.—Цин., № 188.—Кауф. I, стр. 71.—Апп. С. I, № 7.—Дв., № 260.

Viola glauca M. B. Макс., № 240.—Нoff. II., № 1857.—Gold. С., р. 18.

Стеблей нѣсколько въ 3—10 см., приподнимающихся или почти лежащихъ; все растеніе сизо-зеленое, тусклое, покрыто очень короткимъ пушкомъ; листья маленькіе, сердцевидные, тупые, очень мелко-городковые, зубцы тупые; прилистники узкіе, бахромчато-зубчатые; цвѣты синевато-лиловые; чашелистики острые; шпора въ 3—4 раза длиннѣе придатковъ чашелистиковъ; коробочка коротко-пушистая.

По песчанымъ холмамъ и опушкамъ. Цвѣтетъ съ конца апрѣля до половины мая; плоды съ іюля. Симоновъ монастырь, Сокольники, Богородское, Воробьевы горы. Всесвятское; Архангельское, Звн. у. (К.). — Вешняки, М.-Каз. ж. д.; Верен—Михайловскій лѣсъ, Брн. у. (Х.).—Михайловское у каменоломни, Пдл. у. (Б.). — Карачарово на Волгѣ, Кн. у.; близъ Серпухова съ бѣлыми цвѣтами (П.).—Зиброво, Срп. у. (С.).

653. *V. tricolor* L. Бух., II, № 57.—Бух. I, № 57.—Пет., стр. 307.—Кауф. II, № 111.—Цил., № 189.—Кауф. I, стр. 74.—Lind., p. 92.—Дв., № 258.—Макс., № 244.—Hoff. H., № 1878.—Gold. C., p. 18.—Gold. Sp., p. 122.—Hoff., № 3496.—St. II, p. 16.—St. I, № 598.—Pal., № 1974.

Стебли до 40 см., тонкіе, восходящіе или лежащіе, покрыты, какъ и все растеніе, короткимъ пушкомъ; листья коротко-черешковые, городковые, нижніе — сердцевидно-яйцевидные, верхніе — продолговато-эллиптические или ланцетные; прилистники крупныя, превышаютъ черешокъ,



Viola tricolor a. vulgaris.



Viola tricolor β. arvensis.

лировидно-перисто-раздѣльные, съ болѣе крупной верхушечной долей; цвѣты 2—3-цвѣтные; шпора вдвое длиннѣе придатковъ чашелистиковъ; нижніе боковые лепестки у основанія бородатые; столбикъ утолщенъ булавовидно; рыльце почти шаровидное, полое, съ боковымъ отверстіемъ и у основанія съ двумя пучками волосковъ.

Цвѣтетъ съ начала мая до осени.

a. vulgaris Koch. Бух. II, № 57a.—Бух. I, № 57a.—F. O., № 5, p. 70.—Кауф. II, стр. 68.—Pinz., p. 9.—Кауф. I, стр. 74.—Ann. C. III, № 208.

Viola bicolor Hoffm. Mart., p. 45.

Вѣнчикъ фіолетово-синій съ желтымъ и бѣлымъ. По лугамъ и холмамъ и по разрабатываемымъ торфянымъ болотамъ, очень часто.

3. *arvensis* Murr. Бух. II, № 573.—Бух. I, № 573.—Ф. О., № 5, p. 70.—Кауф. II, стр. 69.—Pinz., p. 9.—Кауф. I, стр. 74.—Макс., № 244.

Viola arvensis Murr. Дв., № 259.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 45.—St. I, № 509. Вѣнчикъ бѣлый съ желтымъ. По паровымъ полямъ и въ посевахъ, очень часто.

Порядокъ Myrtillôrae.

66 сем. Thymelaeáceae Rehb.

Цвѣты обоеполые, правильные; вѣничка нѣтъ, одна только окрашенная, опадающая чашечка гвоздевидной или ворончатой формы съ 4-пальцеватымъ отгибомъ; цвѣтоложе сильно вогнутое, железистое; тычинокъ 8, расположенныхъ въ два ряда такъ, что тычинки верхняго ряда супротивны долямъ чашечки, а тычинки нижняго ряда чередуются съ долями чашечки; завязь одногнѣздная, съ короткимъ столбикомъ и головчатымъ рыльцемъ; семеночка одна, висячая; плодъ — односеменная сочная костянка; семя безъ бѣлка или съ очень маленькимъ бѣлкомъ; зародышъ прямой съ листовидными семядолями.

249. *Daphne* L.

654. *D. Mezereum* L. Бух. II, № 363.—Бух. I, № 344.—Ф. О., № 7, p. 102.—Пет., стр. 176.—Кауф. II, № 666.—Цин., № 1287.—Кауф. I, стр. 433.—Lind., p. 158.—Ann. C. V., № 48.—Дв., № 397.—Макс., № 375.—Hoff. II, № 2997.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 70.—Hoff., № 1141.—St. II, p. 24.—St. I, № 262.—Pal., № 784.



Daphne Mezereum.

Кустарникъ въ 1—1,5 м., съ морщинистою, желтовато-сѣрой корой; листья продолговато-ланцетные, постепенно суженные въ черешокъ, туповатые, съ нижней стороны сѣро-зеленые; цвѣты розовые, душистые, сидятъ пучками по 3—5 и окружены сухими, бурыми чешуйками, распускаются ранней весной до листьевъ; лопасти вѣничка тупые или быстро коротко-застраженные; трубка пушистая; костянка овальная, ярко-красная.

По большимъ лѣсамъ, часто. Цвѣтетъ съ начала апрѣля, нерѣдко когда лежитъ еще снѣгъ, рѣже въ началѣ мая; плоды въ концѣ юля.

* Сем. Elaeagnáceae R. Br.

Цвѣты правильные, обоеполые или однополые, и тогда растеніе двудомное; вѣничка нѣтъ—одни 4—2-раздѣльный околоцѣтникъ; тычинокъ

4—2, прикрѣпленныхъ къ зѣву и чередующихся съ долями околоцвѣтника; завязь съ одной примостоящей сѣмепочкой. плотно заключена въ нижней части трубки околоцвѣтника, и потому кажется нижней или полунижней; столбикъ простой, къ верхушкѣ утолщающійся, съ косымъ, одностороннимъ рыльцемъ; плодъ — орѣхъ, принимающій видъ ягоды или костянки вследствие развитія цвѣтоложа или вокругъ орѣха, или только вокругъ его нижней части; сѣмя съ бѣлкомъ и прямымъ зародышемъ. Кустарники, покрытые почти на всѣхъ частяхъ характерными звѣздчатыми чешуйкамъ, сообщающими имъ серебристо-блестящій или ржаво-бурый цвѣтъ.

* Hippóphaës L.

Растеніе двудомное; цвѣты однополые; околоцвѣтникъ мужскихъ цвѣтовъ глубоко-2-раздѣльный, съ 4—2 тычинками; околоцвѣтникъ женскихъ цвѣтовъ трубчатый, 2-лопастной; рыльце съ продольной бороздкой; плодъ — мясистая костянка; косточка на одной сторонѣ съ не глубокой бороздкой.

* *H. rhamnoides* L.

Hippophae rhamnoides L. Пет. Кр. III, стр. 48. — Пет., стр. 201. — Цин., стр. 385. — Gold. Sp., p. 140. — Hoff., № 1647. — St. II, p. 55. — St. I, № 674. — Pal., № 2113.

Кустарникъ до 3,5 м., сильно вѣтвистый съ колочками; кора черно-бурая или буро-зеленая, на молодыхъ вѣтвяхъ желто-бурая, покрыта чешуйками того же цвѣта; листья на короткихъ черешкахъ, линейно-ланцетные, съ нѣсколько завернутыми краями, сверху темно-зеленые, вначалѣ густо, потомъ разсѣянно покрыты серебристыми, звѣздчатыми чешуйками, снизу серебристые или желтовато-бѣлые, тоже съ чешуйками, особенно густо на срединной жилкѣ; мужскіе цвѣты въ короткихъ колосьяхъ, женскіе — одиночные въ пазухахъ листьевъ, буроватые; плодъ шарообразный или овальный, оранжевый или красноватый, очень сочный и ароматичный.

Разводится по садамъ.



Hippophae rhamnoides.

* *Elaeágnus* L.

Цвѣты обоеполые; околоцвѣтникъ 4-лопастной; тычинокъ 4; плодъ сухой; косточки съ 8 бороздкамъ.

* *E. argenteus* Pursh. Пет., стр. 181.

Elaeagnus argentea Pursh. Пет. Кр. III, стр. 48.

Кустарникъ до 3 м., съ подземными, ползучими побѣгами; кора темно-сѣрая; молодые вѣтви ржаво-бурныя отъ густо покрывающихъ ихъ

чешуекъ; листья на короткихъ черешкахъ, кожистые, по краямъ нѣсколько волнистые, широко- или узко-овальные или же яйцевидные, у основанія округлые, къ верхушкѣ постепенно или быстро заостренные, рѣже равномерно суженные къ обоимъ концамъ; какъ верхняя, такъ и нижняя сторона серебристая, на нижней, кромѣ того, особенно вдоль жиллокъ, ржаво-бурые чешуйки; цвѣты по 2 — 5 въ пазухахъ листьевъ, 10—12 мм. дл., сильно пахучіе, на короткихъ цвѣтоножкахъ; наружная сторона околоцвѣтника серебристая, внутренняя — желтая; плодъ продолговато-округлый, серебристый.

Разводится по садамъ.



Elaeagnus argenteus.

67 сем. *Lythráceae* Juss.

Каждый цвѣтокъ съ 2 прицвѣтниками; чашечка колокольчатая или трубчатая, съ 6 крупными и 6 мелкими зубцами; лепестковъ 6, прикрѣпленныхъ къ краю чашечки, скоро опадающихъ; тычинокъ 6 или 12, прикрѣпленныхъ къ трубкѣ чашечки ниже лепестковъ; завязь 2-гнѣздная, верхняя; столбикъ длинный съ головчатымъ рыльцемъ или столбикъ короткий съ блюдчатымъ рыльцемъ; коробочка 2-гнѣздная, многосѣменная съ осевыми сѣменосами, разverzается створчато, крышечкою или неправильно; сѣмя съ бѣлкомъ и прямымъ зародышемъ.

250. *Lythrum* L.

Цвѣты правильные, обоеполые; чашечка трубчатая, съ 6 крупными зубцами и между ними съ 6 болѣе мелкими; лепестковъ 6, прикрѣпленныхъ къ краю или трубкѣ чашечки и чередующихся съ ея крупными зубцами; тычинокъ 6. ч. 12, рѣже 6; столбикъ длинный, тонкій, съ почти головчатымъ рыльцемъ; коробочка многосѣменная.

655. *L. Salicária* L. Бух. II, № 162.—Бух. I, № 156.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 219.—Кауф. II, № 287.—Цин., № 530.—Кауф. I, стр. 177.—Lind., p. 112.—Ann. C. V, № 24.—Дв., № 519.—Макс., № 451.—Hoff. II, № 3552.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 83.—Hoff., № 1992.—St. II, p. 28.—St. I, № 318.—Pal., № 940.

Lythrum quadrifolia. Mart., p. 83.

Стебель 50—100 см., прямостоящій, гранистый, покрытъ волосками, простой или вѣтвистый; листья въ нижней части стебля по 2 или по 3 мутовкамъ, въ верхней—спиральные, ланцетные или продолговатые, у основанія сердцевидные, слегка стеблеобъемлющіе. б. ч. голые, рѣже съ короткими волосками; соцвѣтіе конечное, въ колосѣ, въ нижней части

прерывчатомъ; цвѣты мутовками на короткихъ цвѣтоножкахъ; лепестки до 10 мм., малиновые; чашечная трубка съ 12 полосками и 6 короткими треугольными и 6 длинными ланцетными зубцами, покрыта маленькими курчавыми волосками; тычинокъ 12, изъ нихъ 6 длинныхъ и 6 короткихъ.

Около рѣкъ, по канавамъ и сырымъ лугамъ, покрытымъ кустарникомъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюля до середины августа.



Lythrum Salicaria.



Peplis Portula.

251. *Péplis* L.

Цвѣты правильные; чашечка колокольчатая, съ 6 крупными и 6 мелкими зубцами, послѣдніе отогнуты кнаружи; лепестковъ 6, очень мелкихъ, скоро опадающихъ или ихъ совсѣмъ нѣтъ; тычинокъ 6, прикрѣпленныхъ къ чашечкѣ супротивъ ея крупныхъ зубцовъ; столбикъ короткій съ блюдчатымъ рыльцемъ; коробочка многосѣменная.

656. *P. Pórtula* L. Бух. II, № 163. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 236. — Кауф. II, стр. 288. — Цин., № 522. — Кауф. I, стр. 178. — Lind., p. 112. — Ann. C. I, № 21. — Дв., № 367. — Макс., № 349. — Hoff. H., № 2839. — Gold C., p. 19. — Mart., p. 64. — St. II, p. 22. — St. I, № 239.

Маленькое растеніе съ распростертыми или приподнимающимся стеблями до 15 см.; листья супротивные, обратно-яйцевидные или лопатчатые, цѣлюкрайніе, суженные въ короткій черешокъ; цвѣты почти сидячіе въ пазухахъ листьевъ, съ 2 маленькими прицвѣтниками; лепестки маленькіе, обратно-яйцевидные, не длиннѣе зубцовъ чашечки, бѣлые или блѣдно-розовые; чашечка коротко-колокольчатая, съ заостренными зубцами не длиннѣе ея трубки; шаровидная коробочка выдается изъ чашечки; все растеніе нѣсколько мясистое.

По сырымъ мѣстамъ и около дорогъ, часто. Цвѣтетъ съ начала іюля до осени.

68 сем. *Onothéraceae* Endl.

Цвѣты правильные или не вполне правильные, обоеполые; чашечка б. или м. трубчатая или раздѣльная, въ почкосложеніи створчатая, съ 4 или 2 чашелистниками; вѣничикъ раздѣльнолепестный, о 4 или 2 лепесткахъ, въ почкосложеніи скрученныхъ вправо, прикрѣпленныхъ, какъ п тычинки, къ чашечкѣ; тычинокъ 8 или 2; завязь нижняя, 4- или 2-гнѣздная; столбикъ простой, нитевидный, съ головчатымъ или 4-лопастнымъ рыльцемъ; плодъ сухой—коробочка или орѣхъ, въ первомъ случаѣ 4-гнѣздный со многими сѣменами въ каждомъ гнѣздѣ и съ осевыми сѣменосами, разверзается 4 створками; во второмъ случаѣ 1—2-гнѣздный съ однимъ сѣменемъ въ каждомъ гнѣздѣ; сѣмя безъ бѣлка, простое или съ хохолкомъ изъ длинныхъ волосковъ; зародышъ прямой.

1. Цвѣты желтые.

Onothera.

Цвѣты иной окраски. 2.

2. Чашечка и вѣничикъ 4-раздѣльные.

Epilobium.

Чашечка и вѣничикъ 2-раздѣльные.

Circaea.

252. *Epilóbium* L.

Чашечка 4-раздѣльная, съ очень короткой трубкой, отваливается послѣ цвѣтенія; лепестковъ 4; тычинокъ 8, изъ коихъ 4 длиннѣе остальныхъ; рыльце булабовидное или 4-раздѣльное; плодъ—коробочка, б. ч. 4-гранная, походить на стручокъ, разверзается 4 створками; сѣмянъ много, съ хохолкомъ.

1. Вѣничикъ колесовидный, крупный, слегка неправильный; все листья очередные.

E. angustifolium L.

Вѣничикъ ворончатый, не крупный, правильный; нижніе листья супротивные или мутовчатые, только верхушечные—очередные. 2.

2. Рыльце булабовидное. 3.

Рыльце 4-раздѣльное. 4.

3. Стебель съ 2—4 выступающими продольными ребрышками; листья черешковые, по краямъ съ частыми зубчиками.

E. roseum Schreb.

Стебель цилиндрическій, безъ продольныхъ полосокъ; листья спячіе, цѣлюкрайніе, рѣдко съ неясными, немногими зубчиками.

E. palustre L.

4. Стебель, особенно въ нижней части, мохнатый отъ отстоящихъ, шиловидныхъ волосковъ. 5.

Стебель пушистый, особенно вверху, отъ короткихъ, прижатыхъ, серповидныхъ волосковъ, поверхность которыхъ усеяна частыми бугорками.

E. montanum L.

5. Цвѣты крупные, до 20 мм., темно-малиновые; поверхность волосковъ гладкая.

E. hirsutum L.


Цвѣты не крупные, до 10 мм., розовые; поверхность волосковъ покрыта мелкими бугорками.

E. parviflorum Schreb.

657. *E. angustifolium* L. Пет. Кр. I, стр. 176.—Бух. II, № 164.—Бух. I, № 157.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 182.—Кауф., II, № 289.—Цип., № 502.—Кауф. I, стр. 180.—Lind., p. 110.—Ann. C. III, № 123.—Дв., № 385.—Макс., № 364.—Hoff. H., № 2928.—Hoff., № 1280.—St. II, p. 23.—St. I, № 251.—Pal., № 765.

Epilobium spicatum Pers. Макс. № 364.

Epilobium spicatum Lam. Hoff. H., № 2928.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 68.—Hoff., № 1280.



Epilobium angustifolium.

По опушкамъ, полянамъ, просѣкамъ и сухимъ торфянымъ болотамъ, очень часто; цвѣтеть съ середины июня до середины августа; плоды съ половины августа.

Кромѣ типичной формы встрѣчаются слѣдующія:

а. *macrophyllum* Haussk. Пет. Кр. I, стр. 177.

Epilobium angustifolium L. *latifolium*. Въ гербаріи Гофмана.

Листья эллиптическіе, заостренные, у основанія закругленные, снизу съ очень сильно выдающимися боковыми сѣтчатыми жилками. Въ гербаріи Гофмана.

б. *albiflorum* Haussk. Пет. Кр. I, стр. 177.

Съ бѣлыми цвѣтами. Михневскій лѣсъ близъ Быкова, Брн. у. (II.).

658. *E. hirsutum* L. Пет. Кр. I, стр. 177.—Бух. II, № 165.—Бух. I, № 158.—Пет., стр. 182.—Кауф. II, № 290.—Цип., № 503.—Кауф. I, стр. 180.—Lind., p. 110.—Дв., № 386.—Макс., № 365.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 68.—Hoff., № 1281.—St. II, p. 23.—Pal., № 766.

Epilobium hirsutum L. а. *grandiflorum*. St. I, № 252.—Mart., p. 68.

Epilobium grandiflorum Roth. Макс., № 365.

Корневище съ тонкими подземными побѣгами; стебель 50—150 см., цилиндрическій, сильно вѣтвистый, покрытъ, какъ и все растеніе, длинными, отстоящими, мягкими шпильовидными волосками, перемѣшанными

въ большомъ количествѣ съ короткими булавовидными; листья продолговатые или продолговато-ланцетные, стеблеобъемлющие, нѣсколько неизбѣгающіе, по краямъ съ мелкими, железистыми, загнутыми впередъ зубчиками; цвѣты крупные, одиночные въ пазухахъ листьевъ, на цвѣтоножкѣ въ нѣсколько разъ короче завязи; лепестки 15—18 мм., темно-малиновые, выемчатые; чашелистики острые; коробочка до 10 см., во много разъ длиннѣ плодоножки.

По тонкимъ мѣстамъ и по берегамъ рѣкъ и ручьевъ. Цвѣтетъ съ половины іюня до середины августа. Братцово, Лизаветино, Тушино; Воскресенскъ, Звн. у. (К.). — Останкино, Воробьевы горы; Островцы на Москвѣ р., Брн. у. (П.). — Сокольники у р. Яузы; близъ платформы Соколово на Щелковской вѣтви М.-Яр. ж. д. (С.). — Близъ д. Исаково по р. Язовкѣ, Пдл. у. (Б.). — Трутѣво, Руз. у.; Ивановское, Звн. у. (Х.). — Ильинское, Мож. у. (Куль.). — Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).



Epilobium hirsutum.

659. *E. parviflorum* Schreb. Пет. Кр. I, стр. 180. — Пет., стр. 182. — Кауф. II, № 291. — Гор., № 32. — Цин., № 504. — Кауф. I, стр. 182. — Макс., № 336. — Hoff. II., № 2935.

Epilobium pubescens Roth. Дв., № 387. — Макс., № 366. — Hoff. II., № 2935. — Gold. C, p. 19. — Mart., p. 68.

Epilobium hirsutum L. β . *parviflorum*. St. I, № 252.

Стебель до 1 м., прямостоящій, только у самаго основанія иногда приподнимающійся, простой или вѣтвистый, покрытъ, какъ и все растеніе, рѣдкими, булавовидными и мягкими отстоящими, шиловидными волосками, поверхность которыхъ усѣяна весьма мелкими и сравнительно рѣдкими бугорками; у основанія стебля осенью образуются короткіе побѣги съ розетками листьевъ; листья продолговатые, ланцетные или овально-продолговатые, б. ч. съ обѣихъ сторонъ пушистые, по краямъ съ мелкими зубчиками; нижніе листья на короткихъ черешкахъ и часто супротивные, верхніе — сидячіе, очередные, съ округлымъ основаніемъ; цвѣты свѣтло-розовые; лепестки до 8 мм., выемчатые, немного превышаютъ пушистую чашечку; рыльце 4-лопастное; коробочка до 8 см., на очень короткой плодоножкѣ.



Epilobium parviflorum.

У ручьевъ и по сырымъ мѣстамъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ половины іюня, весь июль. Царицыно (герб. Гофмана). — Останкино (С.).

α. umbrósum Haussk. Пет. Кр. I, стр. 181.

Стебель сильно вѣтвистый почти съ самаго основанія; листья широкіе, съ верхней стороны почти голые или съ рѣдкими волосками, всё на короткихъ черешкахъ. Останкино (П.).

660. *E. montánum* L. Пет. Кр. I, стр. 178.—Бух. II, № 168.—Бух. I, № 161.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 182.—Кауф. II, № 292.—Цин., № 505.—Pinz. p. 12.—Кауф. I, стр. 180.—Lind., p. 110.—Дв., № 388.—Макс., № 367.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 68.—Hoff., № 1282.—St. II, p. 23.—St. I, № 253.—Pal., № 767.

Epilobium roseum Schreb. Hoff. II, № 2937.

Корневище съ тонкими побѣгами, несущими розетки листьевъ; стебель простой или мало вѣтвистый, до 1 м., прямостоящій или только у самаго основанія приподнимающійся, опушенный тонкими, серповидными волосками, такими же, какъ у *E. palustre* L; листья яйцевидно-ланцетные, у основанія округлые или слегка сердцевидные, на концѣ заостренные, неравно-зубчатые, на короткихъ черешкахъ, супротивные, верхушечные—очередные; цвѣты блѣдно-розовые; лепестки обратно-сердцевидные, 7—10 мм.; рыльце 4-раздѣльное; чашелистики острые; коробочка до 7,5 см.



Epilobium montanum.



Epilobium montanum α. minor.

По сырѣмъ и тѣнистымъ мѣстамъ. Цвѣты съ половины іюня до осени; плоды съ начала августа. Петрово, близъ Братцова; близъ скита за Троицей, Варавино, Дмт. у. (К.).—За Давыдовымъ (А.).—По берегу р. Учи у ст. Мамонтовка, М.-Яр. ж. д.; Боровскій курганъ, Брн. у. (С.).—Лосинный Островъ, Воробьевы горы, Химки, Кусково; Звенигородъ; Парѣво, Бгр. у.; Карчагино, Клин. у. (П.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Дарьино, Звн. у. (Х.).—Быково, Брн. у. (Куль.).—Красный Станъ, Руз. у. (Сюз.).—Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогузь).

α. mínor Haussk. Пет. Кр. I, стр. 178.

Epilobium strictum Zinger.

Все растеніе маленькое, не выше 40 см., простое или мало вѣтвистое, съ очень мелкими листьями отъ 1 до 2 см. дл. и отъ

4 до 10 мм. ш., по краямъ часто-зубчатыми, на очень короткихъ черешкахъ. По крутому глинистому берегу Москвы р. близъ Лапкина, Руз. у. (П.).

661. *E. roseum* Schreb. Бух. II, № 167. — Бух. I, № 160. — Ф. О., № 6, p. 86. — Пет., стр. 182. — Кауф. II, № 294. — Цин., № 508. — Кауф. I, стр. 181. — Дв., № 389. — Макс., № 368. — Gold. C., p. 19. — Mart., p. 68. — St. II, p. 23. — St. I, № 255.

Epilobium roseum Schreb (*E. tetragonum* L. herb.). Пет. Кр. I, стр. 180.

Epilobium montanum L. Hoff. H., № 2933.

Epilobium tetragonum L. Дв., № 390. — Макс., № 369. — Hoff. H., № 2939. — Gold. C., p. 19. — Mart., p. 68. — Hoff., № 1284. — St. II, p. 23. — St. I, № 254.

Корневище съ побѣгами; стебель прямостоящій, до 80 см., б. ч. сильно вѣтвистый, съ 2—4 возвышенными продольными ребрышками, пушистый, въ верхней части даже бѣлесоватый отъ широкихъ и короткихъ серповидныхъ волосковъ, поверхность которыхъ густо усеяна бугорками; листья яйцевидно-ланцетные, съ коротко-клиновиднымъ основаніемъ, по краямъ остро-зубчатые, всѣ на черешкахъ, нижніе— супротивные, верхушечные—очередные; цвѣты блѣдно-розовые; лепестки 5—7 мм., съ темными жилками, выемчатые, немного превышаютъ чашечку; рыльце булавовидное; чашелистики острые; коробочка 5—6 см., съ закругленными углами.



Epilobium roseum.

По тѣнистымъ мѣстамъ у рѣкъ, ручьевъ и канавъ. Цвѣтетъ съ іюля, весь августъ; плоды съ середины августа. Иваньково, Лизаветино; Раменское, Звн. у. (К.).—Останкино, Воробьевы горы; Березинки на р. Талицѣ, Дмит. у. (П.).—Михайловское, берегъ р. Протвы, Пдл. у. (Б.).—Трутьево, Руз. у. (Х.).—Невѣрово, Калм. у. (Сюз.).

662. *E. palustre* L. Пет. Кр. I, стр. 177. — Бух. II, № 166. — Бух. I, № 159. — Ф. О., № 6, p. 86. — Пет., стр. 182. — Кауф. II, № 293. — Цин., № 506. — Кауф. I, стр. 181. — Lind., p. 110. — Ann. C. IV, № 13. — Дв., № 391. — Макс., № 370. — Hoff. H., № 2934. — Gold. C., p. 19. — Mart., p. 69. — St. II, p. 23. — St. I, № 256. — Pal., № 768.

Корневище съ длинными и тонкими подземными побѣгами; стебель до 50 см., прямостоящій, простой или развѣтвленный, цилиндрическій, безъ продольныхъ полосокъ, покрытъ булавовидными и короткими, очень тонкими серповидными волосками, поверхность которыхъ усеяна мелкими и частыми бугорками; листья ланцетные или линейно-ланцетные, съ клиновиднымъ основаніемъ, цѣлюкрайніе, иногда у крупныхъ экземпляровъ съ очень рѣдкими, маленькими зубцами; цвѣты свѣтло-розовые, иногда почти бѣлые; лепестки 5—8 мм., выемчатые, б. ч. вдвое длиннѣе ча-

печки; рыльце булабовидное; коробочка до 7 см.; сѣмена продолговатая, суженныя къ концамъ и съ прозрачнымъ придаткомъ на верхушкѣ.



Epilobium palustre.



Epilobium palustre α. monticolum.

По болотамъ и по берегамъ рѣкъ, очень часто. Цвѣтетъ съ начала іюня до осени.

Кромѣ типичной формы встрѣчаются слѣдующія:

α. monticolum Haussk.

Стебель простой, до 25 см., съ однимъ, рѣдко съ 2—4 верхушечными цвѣтками, прямостоящій, въ нижней части почти голый, у верхушки покрытъ мелкими, курчавыми волосками; листья слегка мясистые, б. ч. голые или по жилкамъ прижато-волосистые, линейные, ланцетные, до 2 см. дл. и до 2 мм. ш., верхушка ихъ тупая, закругленная; цвѣты въ поперечникѣ до 7 мм., блѣдно-лиловые или почти бѣлые; коробочка до 4 см., прижато-волосистая, на довольно длинной плодоножкѣ.

Болото Тростенскаго озера подъ Карасевымъ, Руз. у. (П. и С.).

β. adenophorum Haussk.

Стебель до 70 см., съ прижатыми къ стеблю листьями, не вѣтвистый, прямоторчащій, пушистый, иногда въ верхней части вмѣстѣ съ коробочками железисто-волосистый; листья узко-ланцетные, цѣлюкрайніе, грязно-зеленые, 3—4 см. дл. и 2—5 мм. ш., съ внутрь завороченными краями, туповатые; коробочка толстая, до 7 см., на ножкѣ въ 1—1,5 см. дл.

Окраина болота озера Нерскаго, Мос. у. (П. и С.).—Кусково (П.).

253. *Onothéra* L.

Чашечка 4-раздѣльная, съ длинной трубкой; лепестковъ 4; тычинокъ 8, изъ коихъ 4 длинныхъ и 4 короткихъ; коробочка продолговатая, книзу утолщенная, 4-гранная, вскрывается 4 створками; сѣмена безъ хохолка.

663. *O. biennis* L.

Oenothera biennis L. Пет. Кр. I, стр. 182.—Бух. II, № 169.—Бух. I, № 162.—Пет., стр. 229.—Кауф. II, № 295.—Цин., № 509.—Рупр., стр. 89.—Кауф. I, стр. 182.—Lind., p. 112.—Ann. C. V, № 22.—Дв., № 384.—Hoff. II, № 2908.—Mart., p. 67.—Hoff., № 2217.—St. II, p. 23.—St. I, № 250.—Pal., № 759.

Стебель до 1 м., простой или маловѣтвистый, пушистый, какъ и все растеніе; корневые листья розеткой, эллиптические, тупые съ остроконечіемъ, суженные въ черешокъ; стеблевые—широко-ланцетные, острые, по краямъ рѣдко- и мелко-зубчатые; нижніе—сужены въ черешокъ, верхніе—почти сидячіе и много мельче нижнихъ; цвѣты желтые, въ пазухахъ маленькихъ верхнихъ листьевъ, собраны длинною кистью; лепестки до 20 мм., слегка выемчатые; чашелистики по отцвѣтаніи отвороченные, ланцетные, съ длиннымъ остроконечіемъ; коробочка 2—4 см. дл.

*Oenothera biennis.*

По песчанымъ мѣстамъ и по берегамъ рѣкъ. Цвѣтетъ съ половинны іюня до осени. Троицкое-Бутурлино (А.).—Воробьевы горы; Архангельское, Звн. у. (К.).—Перерва, берегъ Москвы р., Серебряный боръ близъ Хорошова; Бачманово, Кдм. у.; по р. Истрѣ близъ Сенькова, Звн. у. (П.).—Берегъ р. Оки, Срп. у. (Рупр.).—Дракино, Срп. у. (С.).—Успенское, Звн. у. (Х.).—Порѣчье, берегъ Москвы р., Звн. у. (Куль.).

254. *Circaea* L.

Чашечка глубоко-2-раздѣльная; вѣнчикъ 2-лепестный съ обратно-сердцевидными лепестками; тычинокъ 2, чередующихся съ лепестками; столбикъ тонкій съ головчатымъ или 2-лопастнымъ рыльцемъ; плодъ орѣшковидный, 1—2-гнѣздный съ однимъ сѣменемъ въ каждомъ гнѣздѣ.

664. *C. lutetiána* L. Пет. Кр. I, стр. 182.—Бух. II, № 171.—Бух. I, № 164.—Пет., стр. 168.—Кауф. II, № 296.—Цин., № 510.—Рупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 182.—Lind., p. 112.—Ann. C. III, № 222.—Дв., № 38.—Макс., № 41.—Hoff. II, № 64.—Gold. C., p. 17.—Ad., p. 4.—St. II, p. 4.—St. I, № 6.—Pal., № 26.

Circaea pubescens. Mart., p. 4.

Корневище съ длинными, тонкими, подземными побѣгами; стебель 30—60 см., прямостоящій, 6. ч. простой, пушистый; листья супротивные, обратно-яйцевидные, съ округлымъ или почти сердцевиднымъ основаніемъ и заостренной верхушкой, по краямъ выемчато-мелко-зубчатые, на длинныхъ желобчатыхъ, безкрылыхъ черешкахъ; цвѣты въ рѣдкой конечной

листьи на длинномъ цвѣтоносѣ; лепестки выемчатые, до 3 мм., равны чашечкѣ, блѣдно-розовые; чашелистики острые, пурпуровые, внизъ отвороченные; плодъ обратно-яйцевидный, 2-гнездный, съ частыми, крючковатыми щетинками.

По берегамъ рѣкъ и тѣнистымъ мѣстамъ, не часто. Цвѣтеть съ половины юня, весь июль. Воробьевы горы (Гольдб.). — Кусково (Мар.). — Кунцово (К.). — Тѣнистый берегъ Клязьмы близъ Черкизова (С.). — Бѣлые Колодези, Клм. у. (П.).



Circaea lutetiana.



Circaea alpina.

665. *C. alpina* L. Пет. Кр. I, стр. 183. — Бух. II, № 170. — Бух. I, № 163. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 168. — Кауф. II, № 297. — Гор., № 18. — Цин., № 512. — Кауф. I, стр. 183. — Lind., p. 112. — Ann. C. I, № 20. — Дв., № 39. — Макс., № 42. — Hoff. H., № 62. — Gold. C., p. 17. — Mart., p. 4. — Ad., p. 5. — St. II, p. 4. — St. I, № 7.

Корневище съ ползучими побѣгами; стебель 5—30 см., слабый, лежащій или приподнимающійся, б. ч. вѣтвистый, голый; все растение нѣсколько мясистое; листья супротивные, обратно-яйцевидные съ сердцевиднымъ основаніемъ и съ коротко-заостренной верхушкой, по краямъ зубчатые, сверху лоснящіеся, на крылатыхъ, плоскихъ, не желобчатыхъ черешкахъ; цвѣты бѣлые въ рѣдкихъ конечныхъ или пазушныхъ кистяхъ на длинныхъ цвѣтоносахъ; прицвѣтники маленькіе шиловидные; лепестки 1—2 мм., у основанія клиновидные, короче чашечки; плодъ продолговатобулавовидный, 1-гнездный, съ крючковатыми щетинками.

Въ большихъ тѣнистыхъ и сырыхъ лѣсахъ. Цвѣтеть съ половины юня, весь июль; плоды съ половины августа. Воробьевы горы, Кунцово (Мар.). — Горенки (Гольдб.). — Лосинный Островъ, Соколово; Подольскъ; Рушиново, Мож. у. (К.). — Лѣсъ за Троицкой лаврой, Дмт. у.; Борисовскій еловый лѣсъ, Мож. у. (П.).

69 сем. Halorrhagidáceae R. Br.

Растения водяные; цветы обоеполые или однополые; чашечка 4-раздѣльная или въ видѣ кольцеобразной оканты; лепестковъ 4 или ихъ совѣтъ нѣтъ; тычинокъ 8 или 1; завязь нижняя, 4-гнѣздная или одногнѣздная, съ одной вспячей сѣменочкой; столбиковъ или почти сидячихъ рылецъ столько, сколько гнѣздъ въ завязи; плодъ — односѣмянный орѣшекъ или распадоющийся на 4 сухія костянки; сѣмя съ бѣлкомъ и прямымъ зародышемъ.

255. *Myriophyllum* L.

Растения однодомныя; верхніе цветы мужскіе, нижніе — женскіе; чашечка 4-раздѣльная; вѣнчикъ изъ 4 свободныхъ лепестковъ, легко и скоро опадающій; у женскихъ цветовъ онъ очень мелкій или его совѣтъ нѣтъ; тычинокъ 8; завязь нижняя, 4-гнѣздная, съ 4 ворсинчатыми рыльцами; въ каждомъ гнѣздѣ одна вспячая сѣменочка; плодъ сухой, распадается на 4 сухія костянки; сѣмена почти безъ бѣлка.

666. *M. verticillatum* L. Пет., стр. 226. — Кауф. II, № 299. — Цин., № 514. — Кауф. I, стр. 184. — Lind., p. 112. — Ann. C. V, № 23. — Дв., № 886. — Макс., № 888. — Hoff. II., № 7554. — Gold. C., p. 23. — Mart., p. 170. — St. II, p. 53.

Растение, погруженное въ воду; корневище ползучее, укореняющееся; стебель 15—70 см., голый, трубчатый, ломкій, простой или маловѣтвистый; листья мутовками по 5—6, очень рѣдко по 4, гребенчато-перистые, съ линейными, щетинковидными долями; цветы мутовками въ длинномъ, б. ч. торчащемъ изъ воды колосѣ, несущемъ въ нижней своей части женскіе цветы, въ срединѣ — обоеполые, на верхушкѣ — мужскіе; прицвѣтники походятъ на листья, только во много разъ мельче ихъ, иногда только немного длиннѣе цветовъ; вѣнчикъ бѣлый или зеленовато-бѣлый, рано опадающій.

По стоячимъ и медленно текущимъ водамъ. Цвѣтетъ съ половины іюня до половины августа.

а. *pinnatifidum* Wallr.

Прицвѣтники во много разъ длиннѣе цветовъ, нижніе походятъ на верхніе листья и почти не отличаются отъ нихъ; цвѣточный колосъ кажется покрытымъ листьями и цветы сидятъ въ пазухахъ. Клязьма близъ Черкизова (С.).

б. *intermedium* Koch. Кауф. II, стр. 185. — Кауф. I, стр. 184.

Прицвѣтники въ 2—3 раза длиннѣе цветовъ, равны междоузліямъ или нѣсколько длиннѣе ихъ. Лизаветино, Братцово (К.). — Три горы (Гольдб.). — Давыдково, Воробьевы горы (П.). — Клязьма близъ Чер-



Myriophyllum verticillatum.

кпзова (С.).—Въ р. Македоновѣ близъ ст. Удѣльная М.-Каз. ж. д., Брн. у. (Куль.).

γ. *pectinatum* Wallr.

Myriophyllum verticillatum L. β. *pectinatum* Koch. Кауф. II, стр. 185. — Кауф. I, стр. 184.

Myriophyllum pectinatum DC.

Прицвѣтники равны цвѣтамъ или нижніе немного длиннѣе цвѣтовъ и въ нѣсколько разъ короче междоузлій, гребенчато-перистые, съ очень сближенными, почти соприкасающимися дольками. Въ р. Химкѣ близъ Иззаветинской мельницы (К.).—Въ р. Истрѣ подъ Воскресенскомъ, Звн. у. (П.). — Клязьма близъ Черкизова (С.).

667. *M. spicatum* L. Бух. II, № 172.—Бух. I, № 165.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 226.—Кауф. II, № 300.—Цин., № 515.—Pinz., p. 12.—Кауф. I, стр. 185.—Дв., № 885.—Макс., № 889.—Hoff. II, № 7553.—Gold. C., p. 23.—Mart., p. 170.—St. II, p. 53.—St. I, № 656.



Myriophyllum spicatum.

Корневница ползучее; стебель 40—150 см., погруженный въ воду, какъ и все растеніе, трубчатый, б. ч. вѣтвистый; листья мутовками, б. ч. по 4, гребенчато-перисто-раздѣльные, съ нитевидными долями; цвѣты мутовками въ довольно длинномъ, прерывчатомъ, торчащемъ изъ воды колосѣ; нижніе прицвѣтники у 2—3 мутовокъ походятъ на очень мелкіе листья, остальные нераздѣльные, очень маленькіе, короче цвѣтовъ, такъ что цвѣточныя мутовки кажутся почти безъ прицвѣтниковъ; вѣнчикъ блѣдно-розовый.

По медленно текущимъ водамъ и у береговъ рѣкъ. Цвѣтетъ съ половины іюня, весь іюль. Спаское, Хорошово; въ р. Протвѣ близъ Трепарева, Мож. у. (К.).—Давыдково (А.).—Соколово въ р. Сходнѣ, въ р. Учѣ близъ Липстванъ; въ р. Истрѣ подъ Воскресенскомъ, Звн. у.; въ р. Коломенкѣ противъ Павлѣва, заводъ р. Оки близъ Бачманова, Кзм. у. (П.).—Клязьма близъ Черкизова (С.).—Троицкое-Лыково (Гей.).—Борвиха, Звн. у. (Х.).—Въ р. Македоновѣ близъ ст. Удѣльная М.-Каз. ж. д., Брн. у. (Куль.).

256. *Hippuris* L.

Цвѣты обоеполые; вѣнчика нѣтъ, одна только чашечка въ видѣ кольцеобразной окранны; тычинка одна; завязь нижняя, одногнѣздная, съ одной сѣмечкой; столбикъ одинъ, нитевидный, съ рыльцемъ по всей длинѣ столбика; плодъ—костянка съ тонкимъ околоплодникомъ; сѣмя съ блѣкомъ и прямымъ зародышемъ.

668. *H. vulgaris* L. Пет. Кр. I, стр. 184.—Бух. II, № 173.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 201.—Кауф. II, № 301.—Цин., № 517.—Кауф. I, стр. 185.—Lindl., p. 112.—Дал., № 1.—Макс., № 1.—Hoff. II., № 25.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 3.—Ad., p. 1.—St. II, p. 3.

Корневище ползучее; стебель 20—80 см., простой, членистый, голый, своей нижней частью погруженный въ воду, подъ водой изъ сочленений пускаетъ корни; листья мутовчатые, по 6—15, цѣльно-крайніе, линейные, заостренные, подводные—отклонены внизъ и прижаты къ стеблю, надводные—отстоять отъ стебля горизонтально; цвѣты въ пазухахъ листьевъ очень маленькіе, безъ вѣнчика; тычинка одна съ краснымъ пыльникомъ; плодъ — косянка съ усѣченной верхушкой и остающимся столбикомъ.

По стоячимъ водамъ и у береговъ рѣкъ. Цвѣтеть съ половины іюня, весь іюль. Три горы (Мар.).—Воробьевы горы (Гольдб.).—Братцово, Щукино; Ильинское, Звн. у. (К.).—Кузьминки, Соколово на Сходнѣ; Анпино, Звн. у. (П.).—Мытищи (С.).



Hippuris vulgaris.

- α. minor* Mart. Пет. Кр. I, стр. 184.—Кауф. II, стр. 186.—Цин., стр. 177.—Кауф. I, стр. 185.

Hippuris vulgaris L. var. *gracillior* Goldb. Gold. C., p. 17.

Hippuris minor. Mart., p. 3.

Только верхніе листья линейные, по 6—8 въ мутовкѣ, нижніе—линейно-ланцетные, по 4—6 въ мутовкѣ; растение маленькое, тонкое. Три горы (Ген.).—Далматово, Клин. у. (Ген. и герб. Гольдб.).—Ильинское, Звн. у. (К.).—Б. Мытищи (С.).

Порядокъ Umbelliflorae.

70 сем. Umbelliferae Juss.

Цвѣты правильные или слегка неправильные, обоополые, рѣже однополые, собраны въ зонтички, лучи которыхъ обыкновенно окружены такъ называемой частной обверткой изъ прицвѣтныхъ листочковъ; въ свою очередь зонтички расположены почти всегда тоже зонтикомъ и составляютъ сложный зонтикъ. внизу съ общей обверткой; рѣже ни частныхъ обвертокъ, ни общей нѣтъ или однѣ только частныя; рѣже цвѣты собраны головкамъ; чашечка съ 5-зубчатымъ или неяснымъ отгибомъ; 5 лепестковъ вѣнчика, обыкновенно на концѣ съ внутрь загнутымъ кончикомъ, прикрѣплены къ чашечкѣ и чередуются съ ея зубцами; тычинокъ 5, въ почкосложеніи внутрь свернутыхъ, подобно лепесткамъ; завязь нижняя, 2-гнѣздная; столбикъ 2, внизу расширенныхъ въ надпестичный дискъ; плодъ — вислоплодникъ изъ 2 сѣмянокъ, подъ конецъ

отдѣляющихся по спайкѣ и въсячихъ на б. ч. вильчатомъ столбцѣ; на спинкѣ и по бокамъ каждой сѣмянки вислоплодника выступаютъ продольныя ребрышки обыкновенно въ числѣ 5: три на спинкѣ и 2 по бокамъ близъ спайки; кромѣ главныхъ ребрышекъ, бываютъ еще между ними вторичныя ребрышки; подъ ребрышками проходятъ вдоль сѣмянки жилки, а между ребрышками—канальцы, наполненные эфирными маслами; такіе же канальцы проходятъ б. ч. и по плоской сторонѣ сѣмянокъ; сѣмянка съ хрящеватымъ бѣлкомъ, окружающимъ не большой, прямой зародышъ.

Обзоръ сем. Umbelliferae Juss.

Подсемейство 1. Orthospermae Koch.

Бѣлокъ на внутренней сторонѣ плоскій, выпуклый или слабо вогнутый.

I. Saniculae Koch.

Плоды на поперечномъ разрѣзѣ почти круглые, покрыты шипами или чешуйками; лепестки прямо-торчащіе, съ середины загнуты внутрь.

Sanicula, Eryngium.

II. Ammeae Koch.

Плоды явственно сплюснуты съ боковъ и б. ч. вдоль перетянутые.

Cicuta, Apium, Petroselinum, Aegopodium, Carum, Pimpinella, Sium.

III. Seséleae Koch.

Плоды въ поперечномъ разрѣзѣ круглые или сжатые со спинки; ребра сѣмянокъ нитевидныя или крылатыя, боковыя крылья обѣихъ сѣмянокъ плотно прилегаютъ одно къ другому.

Oenanthe, Aethusa, Seseli, Libanotis, Cenolophium, Cnidium, Conioselinum.

IV. Angeliceae Koch.

Плоды сильно сжатые со спинки; 3 спинныхъ ребрышка сѣмянки нитевидныя или крылатыя, 2 же боковыхъ почти всегда широко-крылатыя; крылья обѣихъ сѣмянокъ отходятъ одно отъ другого; столбецъ 2-раздѣльный; бѣлокъ на внутренней сторонѣ плоскій.

Levisticum, Selinum, Ostericum, Angelica, Archangelica.

V. Peucedaneae Koch.

Плоды сжаты со спинки; спинныя ребрышки сѣмянокъ почти всегда нитевидныя, края сѣмянокъ крылатыя, рѣдко край ихъ утолщенъ; боковыя ребрышки сливаются съ крыльями или прилегаютъ къ нимъ; крылья обѣихъ сѣмянокъ прилегаютъ одно къ другому; столбецъ 2-раздѣльный; бѣлокъ на внутренней сторонѣ плоскій.

Peucedanum, Anethum, Pastinaca, Heracleum.

VI. *Thapsieae* Koch.

Плоды въ разрёзѣ круглыя или сжатые со спинки; главные спинныя ребрышки нитевидныя, боковыя—сливаются или прилегаютъ къ крыльямъ; вторичныя ребрышки ши-роко- и перепончато-крылатыя; бѣлокъ на внутренней сто-ронѣ плоскій.

Laserpicium.

VII. *Daiſeeae* Koch.

Плоды въ поперечномъ разрёзѣ сжаты со спинки или по-чти круглыя; главные ребрышки нитевидныя, усажены щетинками; вторичныя ребрышки состоятъ изъ шиповъ свободныхъ или у основанія соединенныхъ въ крыловид-ное ребрышко; бѣлокъ съ внутренней стороны плоскій.

Daucus.

Подсемейство 2. *Sampylospérmae* Koch.

Бѣлокъ на внутренней сторонѣ сѣмянки съ глубокой, про-дольной бороздкой или съ завернутыми внутрь краями.

VIII. *Caucalídeae* Koch.

Плоды нѣсколько сжаты съ боковъ; главные ребрышки нитевидныя, усажены шипиками; вторичныя ребрышки сильнѣе выдаются, усажены въ нѣсколько рядовъ шипи-ками или все пространство между главными ребрышками усажено шипиками; бѣлокъ съ завернутыми внутрь краями.

Torilis.

IX. *Scandiceae* Koch.

Плоды сжаты съ боковъ, б. ч. съ носикомъ; ребрышки нитевидныя, иногда замѣтныя только близъ верхушки плода, вторичныхъ ребрышекъ нѣтъ.

Anthriscus, Chaerophyllum.

X. *Smyrneae* Spreng.

Плоды въ разрёзѣ круглыя или слегка съ боковъ сжатые, безъ носика; главные ребрышки замѣтны, рѣже ихъ почти нѣтъ.

Conium.

Подсемейство 3. *Coelospérmae* Koch.

Бѣлокъ на внутренней сторонѣ сѣмянокъ глубоко вогнутый.

XI. *Coriándreae* Koch.

Плоды почти шаровидныя или съ глубокой перетяжкой вдоль плода; ребрышки мало выдаются, главные — почти плоскія, извилистыя, вторичныя—выдаются сильнѣе глав-ныхъ.

Coriandrum.

Определитель родовъ.

1. Цвѣты въ головкахъ. 2.
Цвѣты въ зонтикахъ. 3.
2. Листья и обертка колочіе; все растеніе въ верхней части голубоватое; цвѣты синеватые. *Eringium.*
Листья и обертка безъ колочекъ; цвѣты бѣлые. *Sanicula.*
3. Цвѣты ярко-желтые. 4.
Цвѣты бѣлые, розоватые, зеленые или желто-зеленые. 6.
4. Общей и частныхъ обертокъ нѣтъ. 5.
Общая и частныя обертки многолистныя. *Levisticum.*
5. Листья съ нитевидными долькамп. *Anethum.*
Листья съ широкими долями. *Pastinaca.*
6. Ни общей, ни частныхъ обертокъ нѣтъ. 7.
Обертки есть, многолистныя, иногда есть только частныя, рѣже обертки 1—3-листныя. 10.
7. Листья съ узкими, почти нитевидными долькамп. *Carum.*
Листья, особенно корневыя, съ широкими долями. 8.
8. Зонтики на короткихъ цвѣтоносахъ, нѣкоторые почти спячіе; каналцы одиночныя. *Apium.*
Зонтики на длинныхъ цвѣтоносахъ; каналцы по 2—3 между ребрышками, или же каналцевъ нѣтъ. 9.
9. Корневыя и нижніе стеблевыя листья тройчато-двусложныя; каналцевъ между ребрышками нѣтъ. *Aegopodium.*
Корневыя листья перистыя; между ребрышками замѣтны по 2—3 каналца. *Pimpinella.*
10. Цвѣты зеленые, зеленоватые или желто-зеленые. 11.
Цвѣты бѣлые или блѣдно-розовые. 13.
11. Плоды плоскіе, сплюснутые со спинки. 12.
Плоды слегка сплюснутые съ боковъ, и потому со спинки выпуклые. *Petroselinum.*
12. Стебель сильно ребристый, какъ и листья, шершавый. *Heraclium.*
Стебель безъ реберъ, дудчатый, голый, какъ и листья. *Archangelica.*
13. Плоды или завязь покрыты шипиками или волосками. 14.
Плоды и завязь совершенно голые. 18.
14. Плоды и завязь покрыты шипиками. 15.
Плоды или иногда только завязь покрыты волосками. 16.
15. Листочки обертки перисто-раздѣльные, у частныхъ обертокъ тройчато-раздѣльные, такой же длины, какъ лучи зонтика. *Daucus.*
Листочки обертки простые, цѣльные, много короче лучей зонтика. *Torilis.*

16. Общая и частная обертка есть. 17.

Только одна частная обертка, общей же нетъ. *Seseli.*

17. Стебель голый или только на узлахъ и подъ зонтикомъ пушистый; сѣмянки съ 5 ребрышками и 2—3 канальцами между ними, на внутренней плоской сторонѣ замѣтны отъ 2 до 6 попарно расположенныхъ канальцевъ. *Libanotis.*

Стебель, особенно въ нижней части, покрытъ обращенными внизъ щетинистыми волосками; сѣмянки съ 5 едва замѣтными главными ребрышками и 4 вторичными широко-крыловидными; подъ вторичными ребрышками одиночные канальцы.

Laserpicium.

18. Листья (въ воды) просто-перистые, съ продолговато-ланцетными или продолговатыми, крупными листочками.

Sium.

Листья 2—3-перистые, если же корневые листья и бываютъ просто-перистые, то листочки ихъ лопастные. 19.

19. Общая обертка многолистная. 20.

Общей обертки нетъ или она 1—3-листная. 21.

20. Частная обертка однобокая; плоды слегка сплюснутые съ боковъ; сѣмянки съ 5 извилистыми ребрышками; зубцы чашечки не замѣтны. *Conium.*

Частная обертка всесторонняя; плоды сплюснуты со спинки; сѣмянки съ 5 нитевидными, не извилистыми ребрышками; чашечка изъ 5 зубчиковъ. *Peucedanum.*

21. Частная обертка однобокая, изъ 3 линейныхъ, длинныхъ и отогнутыхъ вверхъ листочковъ, длиннѣе лучей зонтичковыхъ.

Aethusa.

Частная обертка всесторонняя, если же однобокая, то не линейная, и не длиннѣе лучей зонтичковыхъ. 22.

22. Боковые ребрышки на сѣмянкѣ крылатые, много шире спинныхъ, которыя бываютъ то крылатыми, то нитевидными. 23.

Сѣмянки съ ребрышками или безъ ребрышекъ, но краевые ребрышки одинаковой ширины со спинными. 26.

23. Листочки у листьевъ крупные, широкіе зубчатые. 24.

Листочки у листьевъ глубоко-перисто-надрѣзные или-раздѣльные, иногда 2-перисто-надрѣзные. 25.

24. Чашечка изъ 5 зубчиковъ; лучи зонтика и цветоножки б. ч. голые; всѣ ребрышки сѣмянки полые. *Ostericum.*

Чашечные зубцы не замѣтные; лучи зонтика и цветоножки пушистые; ребрышки сѣмянки плотныя. *Angelica.*

25. Стебель ребристый съ острыми ребрами; влагалище стеблевыхъ листьевъ узкое; боковые ребрышки обѣихъ сѣмянокъ расходятся; канальцы одиночные, иногда только у боковыхъ ребрышекъ парные. *Selinum.*

Стебель цилиндрическій или съ едва замѣтными ребрами; влага-

- лище стеблевыхъ листьевъ широкое, нѣсколько вздутое; боковыя ребрышки обѣихъ сѣмянокъ соприкасаются; каналцы по 2—3 между ребрышками. *Conioselinum*.
26. Сѣмянки гладкія безъ ребрышекъ или послѣднія едва замѣтны только у верхушки. *Anthriscus*.
- Сѣмянки съ ребрышками, иногда нитевидными, но явственно замѣтными по всей длинѣ сѣмянки. 27.
27. Сѣмянки съ 5 извилистыми главными ребрышками и 4 вторичными, прямыми, килеватыми. *Coriandrum*.
- Сѣмянки только съ 5 прямыми главными ребрышками. 28.
28. Чашечка изъ 5 зубчиковъ. 29.
- Чашечные зубчики не замѣтны. 31.
29. Частныя обертки изъ ланцетныхъ листочковъ съ бѣлымъ пленчатымъ краемъ. *Seseli*.
- Частныя обертки изъ линейныхъ листочковъ безъ пленчатого края. 30.
30. Листочки у листьевъ мелкіе, перисто-надрѣзные; столбики вверхъ торчащіе; столбецъ неясно выраженъ, приспособленъ къ сѣмянкамъ. *Oenanthe*.
- Листочки у листьевъ ланцетные, зубчатые; столбики отогнуты; столбецъ 2-раздѣльный. *Cicuta*.
31. Стебель покрытъ, особенно въ нижней части, отогнутыми внизъ, щетинистыми волосками. *Chaerophyllum*.
- Стебель по всей длинѣ голый. 32.
32. Частныя обертки равны лучамъ зонтичковъ или длиннѣе ихъ; стебель внизу цилиндрическій. *Onidium*.
- Частныя обертки короче лучей зонтичковъ; стебель по всей длинѣ ребристый. *Cenolophium*.

257. *Sanicula* L.

Плодь почти шаровидный, не распадается на сѣмянки; послѣднія густо покрыты крючковатыми щетинками и со многими каналцами; чашечка изъ 5 зубчиковъ; лепестки выемчатые, цвѣты въ головкахъ: краевые мужскіе на короткихъ ножкахъ, остальные—спячіе, обоеполые.

669. *S. europaëa* L. Пет. Кр. I, стр. 186.—Бух. II, № 176.—Ф. Б., № 32.—Бух. I, № 168.—Ф. О., № 6, р. 86.—Пет., стр. 270.—Кауф. II, № 307.—Цин., № 561.—Пупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 195.—Lind., р. 114.—Ann. C. V, № 25.—Дв., № 287.—Макс., № 273.—Hoff. H., № 2245.—Gold. C., р. 19.—Mart., р. 50.—Hoff., № 2825.—St. II, р. 17.—St. I, № 176.—Pal., № 529.

Бурое корневище съ однимъ или нѣсколькими голыми бороздчатыми, простыми или мало вѣтвистыми стеблями въ 20—50 см.; корневыя листья на длинныхъ черешкахъ, округло-сердцевидные, почти до самаго

основанія 3—5-лопастные, сверху темно-зеленые, снизу свѣтлѣе и лоснящіеся; лопасти съ клиновиднымъ основаніемъ, 3-лопастныя, по краямъ неравно-зубчатыя. зубцы съ мягкимъ шипикомъ; стеблевыхъ листьевъ нѣтъ или одинъ маленькій; зонтикъ 3—5-лучевой, вторичные зонтики 3-лучевые; общая обвертка состоитъ изъ ланцетныхъ, по краямъ зубчатыхъ или перисто-раздѣльныхъ листочковъ, листочки частныхъ обвертокъ цѣльнокрайніе; цвѣты блѣдно-розовые въ головчатыхъ зонтичкахъ; зубцы чашечки ланцетные; плодъ до 3 мм., красноватый, покрытъ крючковатыми шипиками.



Sanicula europaea.

По большимъ лѣсамъ. Цвѣтетъ съ половины іюня. Петровское-Разумовское (К.).—Лосинный Островъ (Ф.).—Сокольники (Ген.).—Воробьевы горы; Воскресенскъ, Звн. у. (герб. Гольдб.).—Кусково (Мар.).—Кунцово (Дв.).—Останкино (А.).—Измайловскій звѣринецъ (С.).—Никольское близъ Салтыковки (Куль.).—Михайловское — Сѣкиринскій лѣсъ, Пдл. у. (Б.).—Ромашково (П.).—Петровское, Клн. у. (Ч.).—Романцово, Мож. у. (В. и М.).—Между Утицами и Семеновскимъ въ Государевомъ лѣсу, между Колычевымъ и Занинымъ, Мож. у. (Ф. Б.).—Карасино—лѣсъ близъ Тростенскаго озера, Ряз. у. (Ф. О.).

258. *Eryngium* L.

Плодъ не распадается на сѣмянки, почти цилиндрическій или овальный, въ поперечномъ разрѣзѣ почти круглый, покрытъ чешуйками и бугорками, безъ реберъ и съ едва замѣтными канальцами; чашечка изъ 5 зубцовъ; лепестки вверхъ торчащіе, выемчатые; всѣ цвѣты обоеполые.


670. *E. plánum* L. Пет. Кр. I, стр. 187.—Пет., стр. 185.—Кауф. II, № 308.—Цин., № 563.—Рупр., стр. 62, 88 и 90.—Кауф. I, стр. 196.—Lind., p. 116.—Ann. C. V, № 26.—Дв., № 286.—Макс., № 272.—Нoff. Н., № 2241.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 50.—Hoff., № 1312.—St. II, p. 17.—St. I, № 175.—Pal., № 526.

Стебель голый, бороздчатый, до 60 см.; все растеніе въ верхней части покрыто голубымъ налетомъ; корневые листья на длинныхъ черешкахъ, овальные съ сердцевиднымъ основаніемъ, по краямъ неравно-зубчатые, зубцы оканчиваются шипикомъ; нижніе стеблевые листья сидячіе, стеблеобъемлющіе, остро- и крупно-зубчатые, верхніе — 3—5-раздѣльные, колюче-зубчатые; цвѣты въ яйцевидныхъ головкахъ съ обертками о 6—7 листкахъ; листочки обертки узко-ланцетные, съ колючкой, не превышаютъ головку; чашечка съ ланцетными зубчиками, заостренными въ колючку; лепестки голубые.

По холмамъ, лугамъ и по берегамъ рѣкъ, на песчаной и известковой почвѣ. Цвѣтетъ съ половины іюня до половины августа. Кунцово, Хорошово, Щукино, Спасское; Подольскъ; Невѣрово, Клм. у.; близъ Серпухова (К.).—Воробьевы горы (герб. Гольдб.).—Троицкое-Голенищевое (Гей.).—Лужники на Москвѣ р.; Алексѣевское на р. Сѣверкѣ, Пдл. у. (П.).—Близъ с. Ознобищина въ 8 верстахъ отъ Подольска (Б.).—Новлинская, Пдл. у. (Х.).—Боровскій курганъ, Брн. у.; Дракино, Срп. у. (С.).—Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Быково, Брн. у. (Куль.).—Бѣлые Колодези, Клм. у. (Мил.).



Eryngium planum.



Cicuta virosa.

259. Cicuta L.

Плодь слегка сжатъ съ боковъ, сплюснуто-шаровидный, распадается на 2 сѣмянки съ 5 плоскими, нитевидными ребрышками, между которыми явственно замѣтно по одному широкому каналцу; бѣлокъ въ поперечномъ разрѣзѣ округлый; столбецъ раздвоенный; чашечка 5-зубчатая; лепестки обратно-сердцевидные.

671. *C. virósa* L. Пет. Кр. I, стр. 188.—Бух. II, № 178.—Бух. I, № 169.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 167.—Кауф. II, № 309.—Цян., № 564.—Кауф. I, стр. 197.—Lind., p. 116.—Дв., № 309.—Макс., № 301.—Hoff. H., № 2407.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 53.—St. II, p. 18.—St. I, № 200.

Корневище толстое, внутри полое, съ поперечными перегородками; стебель 60—150 см., голый, тонко-бороздчатый, обыкновенно въ нижней части красноватый; листья перисто-2—3-сложные; листочки ланцетные, заостренные, по краямъ съ острыми зубцами; нижніе листья на длинныхъ черешкахъ, верхніе — на короткихъ; у зонтиковъ общей обертки нѣтъ или она 1—2-лиственная; частныя обертки изъ 8—12 очень узкихъ листочковъ; лепестки бѣлые; плодь бурый, 1,5—1,75 дл. Растеніе ядовитое.

По болотамъ, канавамъ, по берегамъ рѣкъ и ручьевъ, очень часто.

Цвѣтеть съ половины юня до половины августа; плоды съ половины августа.

α. angustifolia Kit.

Cicuta virosa L. *β. tenuifolia* Koch. Пет. Кр. I, стр. 188. — Ф. О., № 6, р. 86. — Кауф. II, стр. 197. — Гор., № 35. — Кауф. I, стр. 197.

Cicuta tenuifolia Froel.

Стебель очень тонкій; листочки у листьевъ линейные, цѣльнокрайніе или очень рѣдко-зубчатые; лучей у зонтика мало—отъ 5 до 8. Тростенское озеро, Ряз. у. (Ф.).

* *Apium* L.

Плодь сжатъ съ боковъ, вдоль перетянутый, округлый; сѣмянка съ 5 нитевидными ребрышками, между которыми ясно замѣтно по одному канальцу; поперечный разрѣзъ сѣмянки пятиугольный; бѣлокъ на внутренней сторонѣ плоскій; столбецъ нераздѣльный; зубцы чашечки не замѣтные; пестичный дискъ плоскій; лепестки округлые.

* *A. graveolens* L. Пет., стр. 138. — Кауф. II, стр. 198. — Кауф. I, стр. 197. — Дв., № 324. — Mart., р. 56. — St. II, р. 19. — St. I, № 204. — Pal., № 579.

Корень толстый, почти шаровидный, со многими мелкими боковыми корешками; стебель 30—100 см., очень вѣтвистый, бороздчатый, голый, какъ и все растеніе; нижніе листья на длинныхъ черешкахъ, сверху лоснящіеся, перисто-двусложные; листочки округлые съ клиновиднымъ основаніемъ, спереди надрѣзные или зубчатые; верхніе стеблевые листья тройчатые, на короткихъ черешкахъ; зонтики 6—12-лучевые, на короткихъ цвѣтоносахъ, нѣкоторые почти сидячіе. Общихъ и частныхъ обвертокъ нѣтъ; цвѣты бѣловатые; плоды 1,5 мм. дл.

Разводится по огородамъ.



Apium graveolens.

* *Petroselinum* Hoffm.

Плодь слегка сжатъ съ боковъ, яйцевидный; сѣмянка съ 5 нитевидными ребрышками, между которыми ясно замѣтно по одному канальцу; столбецъ раздвоенный; пестичный дискъ коническій; зубцы чашечки не замѣтны; лепестки округлые.

* *P. sativum* Hoffm. Пет., стр. 237. — Кауф. II, стр. 198. — Цин., стр. 190. — Кауф. I, стр. 197. — Дв., № 323. — St. II, р. 19. — Pal., № 578.

Корень вертикальный, толстый, въ разрѣзѣ бѣлый; стебель въ 50—100 см., съ тонкими, продольными линіями, голый, какъ и все растеніе, б. ч. вѣтвистый; нижніе листья на длинныхъ черешкахъ, въ очертаніи тре-

угольные, 2—3-перисто-сложные, сверху лоснящиеся; листочки обратно-яйцевидные съ клиновиднымъ основаніемъ, 3-надрѣзные или глубоко-зубчатые; зубцы туповатые съ маленькимъ бѣлымъ остриемъ; верхніе листья тройчатые, съ узко-ланцетными, цѣльными или 3-надрѣзными листочками; зонтики 10—20-лучевые; цвѣты желто-зеленые; общая обвертка 1—2-лиственная, частныя — 6—8-листные, листочки ихъ линейные, вполнѣ короче цвѣтоножекъ; плоды мелкіе, сѣро-бурые, 8 мм. дл.

Разводится по огородамъ.



Petroselinum sativum.



Aegopodium Podagraria.

260. *Aegopódium* L.

Плодь продолговатый, сплюснутый съ боковъ; сѣмянкa съ 5 нитевидными ребрышками безъ канальцевъ между ними; бѣлокъ съ внутренней стороны плоскій, съ наружной—округлый; столбець только на концѣ раздвоенный; зубцы чашечки не замѣтные; пестичный дискъ конусовидный; лепестки обратно-сердцевидные.

672. *E. Podagraria* L. Бух. II, № 179.—Бух. I, № 170.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 131.—Кауф. II, № 310.—Цин., № 569.—Кауф. I, стр. 198.—Lind., p. 116.—Дв., № 325.—Макс., № 300.—Hoff. N., № 2475.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 56.—Hoff., № 48.—St. II, p. 19.—St. I, № 205.—Pal., № 580.

Корневище ползучее; стебель 50—100 см., бороздчатый, вверху иногда вѣтвистый, голый; корневые и нижніе стеблевые листья тройчато-дву-сложные, на длинныхъ черешкахъ; листочки яйцевидные, заостренные, у основанія б. ч. неравнобокіе, по краямъ двояко-остро-зубчатые; верхніе листья тройчатые или тройчато-сложные, почти сидячіе, съ широкимъ влагалищемъ; ни общей, ни частныхъ обвертокъ нѣтъ; цвѣты бѣлые; плодь темно-бурый, 3 мм. дл.

По сырымъ лѣсамъ и по садамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюня, весь іюль; плоды съ половины августа.

261. *Cárum L.*

Плодь продолговатый, явственно силюснутый съ боковъ, вдоль перетянутый; сѣмянка съ 5 нитевидными ребрышками, между которыми по одному каналцу; бѣлокъ съ наружной стороны округлый, съ внутренней—почти плоскій; столбецъ раздвоенный; чашечные зубцы не замѣтны; лепестки обратно-яйцевидные.

673. *C. Cárví L.* Бух. II, № 180.—Бух. I, № 178.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 163.—Кауф. II, № 311.—Цин., № 570.—Кауф. I, стр. 198.—Lind., p. 116.—Ann. C. IV, № 15.—Макс., № 299.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 55.—Hoff., № 710.—St. II, p. 19.—St. I, № 201.—Pal., № 573.

Carum carvi L. Дв., № 319.

Bunium Carvi M. B. Макс., № 299.

Bunium Carvi Rehb. Pinz., p. 12.

Корень веретенообразный; стебель 30—80 см., вѣтвистый, бороздчатый; листья перисто-3-сложные, съ узко-ланцетными, у верхнихъ листочковъ съ линейными долями, оканчивающимися очень короткимъ, мягкимъ остриемъ; нижние листья на длинныхъ черешкахъ, верхние—на короткихъ, у основанія съ влагалищемъ; зонтики безъ общей и частныхъ обвертокъ; лучи ихъ неравной длины; лепестки бѣлые, очень рѣдко розовые; плодь бурый, 3—4 мм. дл., съ остающимися столбиками.

По лугамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины мая до половины юля; плоды съ начала юля.



Carum Carvi.

262. *Pimpinella L.*

Плодь яйцевидный, явственно силюснутый съ боковъ, вдоль перетянутый; сѣмянка съ 5 нитевидными ребрышками, между которыми замѣтны 2—3 каналца; бѣлокъ снаружи выпуклый, съ внутренней стороны плоскій; столбецъ раздвоенный; чашечные зубцы не замѣтны; лепестки обратно-яйцевидные.

674. *P. Saxifraga L.* Пет. Кр. I, стр. 183.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 240.—Кауф. II, стр. 312.—Цин., № 573.—Pinz., p. 12.—Кауф. I, стр. 199.—Ann. C. II, № 126.—Макс., № 297.—Gold. C., p. 19.—Gold. Sp., p. 124.—Mart., p. 56.—Hoff., № 2481.—St. II, p. 19.—St. I, № 206.—Pal., № 574.

Pimpinella saxifraga L. Дв., № 320.

Стебель 20—100 см., прямостоящій, только вверху нѣсколько вѣтвистый, съ продольными линиями, едва замѣтными бороздками или ребрышками, б. или м. покрытъ пушкомъ или голый; корневые листья непарно-перистые на длинныхъ черешкахъ; листочки съ обѣихъ сторонъ пуши-

стые, рѣже почти голые, очень разнообразны по очертанію и надрѣзамъ; конечный непарный листокъ часто 3-лопастной; стеблевые листья мало развиты, съ ланцетными долями и широкими влагалищами; общей и



Pimpinella Saxifraga α. integrifolia.



Pimpinella Saxifraga β. nigra.

частныхъ обвертокъ нѣтъ; столбики во время цвѣтенія и по отцвѣтаніи то короче завязи, то длиннѣе ея; плодъ округло-яйцевидный, 1,5—2 мм. дл.

По лугамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до осени; плоды съ половины августа.



Pimpinella Saxifraga γ. dissectifolia.



Pimpinella Saxifraga δ. magna.

α. integrifolia Wallr.

Pimpinella Saxifraga L. *α. poterifolia* Koch. Пет. Кр. I, стр. 189. — Бух. II, № 181. — Бух. I, № 175. — Кауф. II, стр. 200. — Кауф. I, стр. 199.

Стебель не высокій, то голый, то покрытъ пушкомъ; листочки у корневыхъ листьевъ округло-яйцевидные или почти округлые, по

краймъ крупно-и неравно-зубчатые; корень въ разрѣзѣ не сплѣтъ. Встрѣчается очень часто.

β. *nigra* Willd. Пет. Кр. I, стр. 189.—Gold. Sp., p. 124.

Pimpinella Saxifraga L. β. *nigra* Kauffm. F. O., p. 6, p. 86.—Кауф. II, стр. 200.—
Кауф. I, стр. 199.

Pimpinella nigra Willd. Дв., № 321.—Макс., № 298.—Gold. C., p. 19.—Mart.,
p. 56.—St. I, № 207.

Стебель высокій, б. ч. пушистый; листочки корневыхъ листьевъ крупные, обратно-яйцевидные, крупно-зубчатые или надрѣзочно-зубчатые, съ обѣихъ сторонъ покрыты сѣроватымъ пушкомъ; стеблевые листья б. ч. развитые, съ перисто-надрѣзными листочками, доли которыхъ ланцетныя и отогнуты кнаружи; корень въ разрѣзѣ сплѣтъ. Близъ Серпухова (П.).—Мытищи (С.).

γ. *dissectifolia* Wallr.

Pimpinella dissecta herb. Goldb. Pinz., p. 12.—Gold. C., p. 19.—Gold. Sp., p. 124.

Стебель б. ч. тонко-бороздчатый, слегка опушенный, какъ и листья; листочки на корневыхъ листьяхъ широко-яйцевидные, перисто-разсѣченные, съ крупно-зубчатыми или надрѣзными дольками; стеблевые листья какъ у β. *nigra*. Клементьево, Руз. у. (Сюз.).

δ. *magna* L.¹⁾

Pimpinella Saxifraga L. γ. *major* Kauffm. Пет. Кр. I, стр. 189.—F. O., № 6, p. 86.—
Кауф. II, стр. 200.—Кауф. I, стр. 200.

Pimpinella magna L. Дв., № 322.—Gold. Sp., p. 124.—Pal., № 575.

Стебель всегда голый, ребристый, б. ч. съ нижней половины вѣтвистый; корневые листья съ верхней стороны темно-зеленые, лоснящіеся, снизу свѣтлѣе; стеблевые листья у каждого развѣтвленія, съ широкимъ влагалищемъ и съ мало развитой пластинкой, только самый нижній иногда похожъ на корневые; столбикъ даже во время цвѣтенія длиннѣе завязи; плодъ 2—3 мм. дл., яйцевидно-округлый, съ 5 маленькими, острыми ребрышками. Форма, во всемъ подходящая къ *magna*, но съ цилиндрическимъ, не ребристымъ стеблемъ есть: *var. tereticaulis* Cel. (Oest. Bot. Z. 1873, p. 340). Лѣсъ близъ ст. Удѣльная, М.-Каз. ж. д. (С.).—*var. tereticaulis* Cel.—Иваньково; Раменское, Брн. у. (К.); тамъ же (С.).

¹⁾ Эта послѣдняя разновидность различается прежними авторами по двумъ признакамъ, а именно: 1) у *P. Saxifraga* L. стебель всегда цилиндрическій, только съ продольными полосками, у *P. magna* L. стебель грубо ребристый; 2) у первого вида столбики короткіе, не превышаютъ длиною завязь; у второго—столбики даже во время цвѣтенія длиннѣе завязи. Что первый признакъ не стойкій, видно уже изъ того, что есть разновидность у *P. magna* L. съ цилиндрическимъ стеблемъ (*var. tereticaulis* Cel.), а мнѣ попался *P. nigra* Willd. съ грубо ребристымъ стеблемъ. Въ отношеніи второго признака Д. П. Литвиновъ оспариваетъ и его въ Schedae ad Herbarium Florae Rossicae V, p. 100, указывая, что въ громадномъ, имъ просмотрѣнномъ матеріалѣ встрѣчались и у *P. Saxifraga* L. очень длинныя столбики. Иходя изъ вышеизложеннаго, нѣтъ основанія считать *P. magna* L. за видъ, а скорѣе за разновидность *P. Saxifraga* L.

263. *Sium* L.

Плоды продолговато-яйцевидные, слегка сплюснутые съ боковъ, вдоль перетянутые; сѣмянка съ 5 нитевидными, приплюснутыми ребрышками, въ поперечномъ разрѣзѣ пятиугольная, въ ложбинкахъ между ребрышками замѣтно по 3 канальца; бѣлокъ съ наружной стороны выпуклый, часто съ углами, съ внутренней стороны плоскій; столбецъ раздвоенный, свободный или сросшійся съ сѣмянками; столбики отогнуты; чашечка съ 5 зубчиками; лепестки обратно-яйцевидные. выемчатые.

675. *S. latifolium* L. Пет. Кр. I, стр. 189.—Пет., стр. 281.—Кауф. II, № 313.—Цин., № 576.—Кауф. I, стр. 200.—Дв., № 306.—Макс., № 296.—Mart., p. 53.—St. II, p. 18.—St. I, № 188.

Корневище толстое, съ мутовками довольно толстыхъ корней; стебель 80—150 см., прямостоящій, ребристо-бороздчатый, голый, какъ и все



Sium latifolium.

растение, вверху часто вѣтвистый; листья непарноперистые; листочки подводныхъ листьевъ перисто-2-сложные, съ линейными или нитевидными долями; листочки надводныхъ листьевъ продолговато-ланцетные или продолговатые, съ округлымъ, неравнобокимъ основаніемъ и постепенно заостренной верхушкой, по краямъ зубчатые; общая обертка многolistная, отогнутая, листочки ея ланцетные или линейно-ланцетные, цѣлюкрайніе, рѣже зубчатые или надрѣзные; частныя обертки такіе же, какъ и общая; зубцы чашечки ясно замѣтные, неодинаковые, при плодахъ опадающіе; плодъ 2,5—3,5 мм.

По стоячимъ водамъ, канавамъ и по берегамъ рѣкъ. Цвѣтетъ съ половины іюня.

Петровское на Москвѣ р.; Серпуховъ (П.).—Марьино близъ Перервы (Х.).—Берегъ Клязьмы близъ Тарасовки, между Черкизовымъ и Каргашинымъ на Клязьмѣ; Выково, Брн. у. (С.).

α. angustifolium Rupr. Пет. Кр. I, стр. 189.

Sium latifolium L. *β. longifolium* Presl. Кауф. II, стр. 201.—Кауф. I, стр. 200.

Листочки надводныхъ листьевъ линейно-ланцетные, острые. Серпуховъ (К.).—На берегу Кривого озера за Владычнымъ монастыремъ близъ Серпухова (П.).

264. *Oenanthe* L.

Плодъ продолговатый или почти кубарчатый, въ поперечномъ разрѣзѣ круглый; сѣмянка съ 5 тупыми ребрышками, краевыя ребрышки нѣсколько шире спинныхъ, между ребрышками по одному канальцу; бѣлокъ на внутренней сторонѣ выпуклый; столбецъ, приросшій къ сѣмян-

камъ, неясно выраженъ; столбики вверхъ торчащіе; чашечка изъ 5 длинныхъ зубчиковъ; лепестки обратно-овальные, выемчатые.

676. *O. aquática* (L.) Lam. Дв., № 308.—Макс., № 295.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 53.—St. II, p. 18.—St. I, № 199.—Pal. № 560.

Oenanthe Phellandrium Lam. Бух. II, № 182.—Бух. I, № 171.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 229.—Кауф. II, № 314.—Цин., № 582.—Кауф., I, стр. 201.—Lind. p. 116.

Phellandrium aquaticum L. Pal., № 560.

Корневище толстое, губчатое; корни нитевидные, мутовчатые; стебель 50—150 см., въ нижнихъ сочлененіяхъ укореняющийся, полый, сильно вѣтвистый съ растопыренными вѣтками, голый, какъ и все растеніе; листья перисто-2—3-сложные, у подводныхъ—листочки съ многораздѣльными, линейными или нитевидными долями; у надводныхъ листьевъ листочки съ мелкими, перисто-надрѣзными, ланцетными или яйцевидно-ланцетными долями, оканчивающимися очень маленькимъ мягкимъ остриемъ; зонтики о 7—10 короткихъ лучахъ, сидятъ супротивно листу; общей обертки нѣтъ или она о 2—3 нитевидныхъ листочкахъ; частныя обертки есть; цвѣты бѣлые; плоды 2,5—3,5 мм. дл., немного длиннѣ плодоножки и съ остающимися столбиками.



Oenanthe aquatica.

По берегамъ рѣкъ, озеръ, прудовъ и по болотамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до середины августа; плоды съ половины іюля.

265. *Aethúsa* L.

Плодь округло-яйцевидный; сѣмянка на внутренней сторонѣ плоская, на вѣшной выуклая, съ 5 толстыми, высокими ребрышками, на спинкѣ килеватыми; краевыя ребрышки нѣсколько шире спинныхъ; между ребрышками по одному канальцу; бѣлокъ съ внутренней стороны плоскій; чашечные зубцы не замѣтные; столбецъ раздвоенный; лепестки глубоко-выемчатые, у краевыхъ цвѣтовъ неравные.

677. *A. Cynárium* L. Пет., стр. 131.—Кауф. II, № 315.—Цин., № 583.—Кауф. I, стр. 201.—Дв., № 310.—Макс., № 294.—Hoff. H., № 2410.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 54.—Hoff., № 52.—St. II, p. 18.—St. I, № 194.

Стебель 30—100 см., полый, прямостоящій, вѣтвистый, тонко-бороздчатый, съ легкимъ сизымъ налетомъ, голый, какъ и все растеніе; листья лоснящиеся, темно-зеленые, снизу блѣднѣе, перисто-2—3-сложные; листочки треугольные или яйцевидные, глубоко-раздѣльные или остро-надрѣзано-зубчатые; нижніе листья на черешкахъ, верхніе—сидячіе, съ расширен-

ными влагалищами; зонтики супротивны листьямъ, на длинныхъ цветоносахъ, съ неравными лучами, безъ общей обертки; частныя обертки одностороння, изъ 3 отогнутыхъ линейныхъ листочковъ, длиннѣе зонтичковъ; цвѣты бѣлые; плоды 2—3 мм. дл.

Сорное, по садамъ и огородамъ, часто. Цвѣтетъ съ половины іюля до осени; плоды съ конца августа.



Aethusa Cynapium.



Seseli annuum.

266. *Séseli* L.

Плодъ овальный или продолговатый, въ поперечномъ разрѣзѣ почти круглый, въ молодости опушенный; сѣмянка съ 5 толстыми ребрышками, изъ коихъ краевыя иногда шире спинныхъ; между ребрышками замѣтны 1 или 2—3 канальца; бѣлокъ съ внутренней стороны плоскій; чашечка изъ 5 короткихъ, толстыхъ зубчиковъ; столбецъ раздвоенный; лепестки выемчатые или почти цѣльные.

678. *S. ánnuum* L.

Seseli coloratum Ehrh. Пет. Кр. I, стр. 190. — Пет., стр. 277. — Кауф. II, № 316. — Гор., № 21. — Цив., № 587. — Рупр., стр. 86. — Кауф. I, стр. 202.

Selinum pratense Spreng. Мако. гербарій за № 237.

Стебель 20—80 см., простой или вверху съ короткими, вверхъ торчащими вѣтвями, тонко бороздчатый, б. ч. голый или подъ узлами слабо опушенный, часто красноватый и, какъ все растеніе, съ легкимъ спылымъ налетомъ; листья въ очертаніи продолговато-яйцевидные, тройчато-перистые, съ линейными листочками и долями, оканчивающимися очень маленькимъ бѣлымъ остриемъ; нижніе листья на длинныхъ, сверху желобчатыхъ черешкахъ, верхніе—сидячіе, съ влагалищами; зонтики о 20—30 лучахъ; общей обертки нѣтъ или она 1—2-лиственная; частныя обертки многостебельныя; листочки ихъ ланцетные, съ бѣлымъ пленчатымъ краемъ и длиннѣе зонтичковъ; цвѣты бѣлые или до распусканія красноватые;

плоды до 2 мм. дл., овальные, голые, молодые—опушенные, такъ же какъ и верхняя поверхность лучей у зонтиковъ.

По открытымъ холмистымъ мѣстамъ и заливнымъ дугамъ. Цвѣтеть съ конца юли. Близъ Лужковъ, Срп. у.; Карапчеево, Клм. у. (К.).—Между д. Калиново и Дракинымъ, Срп. у. (С.).—Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Между Никифоровымъ и устьемъ Лопасни, Срп. у.; Невѣрово, Протопопово, Клм. у. (П.).—Бѣлые Колодези, Горы, Клм. у. (Мил.).—Между Елинымъ и Коневымъ Бродомъ, Клм. у. (Х.).

267. *Libanótis* Crantz.

Плодь овальный, не сплюснутый, покрытъ короткими щетинками; сѣмянка съ 5 толстыми ребрышками и 2—3 канальцами между ними, на внутренней плоской сторонѣ сѣмянки замѣтны отъ 2 до 6 попарно расположенныхъ канальцевъ; чашечка изъ 5 шиловидныхъ, опадающихъ зубчиковъ; столбець раздвоенный.

679. *L. montána* Crantz. Пет. Кр. I, стр. 190.—Бух. II, № 183.—Бух. I, № 180.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 213.—Кауф. II, № 317.—Цин., № 588.—Кауф. I, стр. 202.

Libanotis montana All. Ann. C. II., № 127.

Athamanta Libanotis L. Дв., № 295.—Макс., № 293.—Hoff. H., № 2328.—Mart., p. 51.—St. № 185.

Стебель 80—150 см., прямостоящій, глубоко-бороздчатый, голый, только подъ узлами и подъ зонтикомъ покрытъ пушкомъ, въ верхней



Libanotis montana α. typica.



Libanotis montana β. intermedia.

части вѣтвистый; листья съ нижней стороны сине-зеленые, съ выдающимися жилками, перисто-2-сложные, въ очертаніи продолговатые; листочки яйцевидные или продолговатые, у основанія слегка клиновидные, глубоко-перисто-надрѣзные или глубоко-зубчатые съ острыми зубцами; общая

и частныя обертки многолистные, листочки ихъ линейные; зонтики сжатые, многолучевые; цвѣты бѣлые; плоды 3—4 мм. дл.

По заливаемъ лугамъ, открытымъ мѣстамъ и по оврагамъ. Цвѣтеть съ половины іюня до конца іюля; плоды съ конца іюля.

- а. *typica* Kauffm. Пет. Кр. I, стр. 191.—Кауф. II, стр. 204.—Кауф. I, стр. 203.
Libanotis montana L. *β. gracilis* Kauffm. F. O., № 6, p. 86.—Кауф. II, стр. 204.—
 Кауф. I, стр. 203.

Листья 2—3-перистые съ перисто-надрѣзными листочками, изъ коихъ нижняя пара покрываетъ средній черешокъ листа; не распустившіеся цвѣты снаружи б. ч. розовые, потомъ бѣлые. Симоновъ монастырь, Щукино, Тушино; Архангельское, Звн. у. (К.).—Мытищи (С.).—Верея, Брн. у. (X.).

- β. *intermedia* Rupr. Пет. Кр. I, стр. 191.—F. O., № 6, p. 86.—Кауф. II, стр. 204.—
 Цип., № 529.—Кауф. I, стр. 203.

Libanotis sibirica C. A. M. Пет., стр. 213.

Athamanta sibirica L. Дв., № 296.—Hoff. H., № 2333.—Gold. C., p. 19.—Gold. Sp.,
 p. 123.—Mart., p. 52.—Hoff., № 430.—St. II, p. 18.—St. I,
 № 186.—Pal., № 543.

Athamanta Libanotis L. *β. sibirica* L. Mart., p. 52.—Макс., № 293.

Libanotis sibirica Koch. или C. A. M. non *Athamanta sibirica* L.

Корневые листья просто-перистые съ широкими, крупно-перисто-разсѣченными листочками, доли коихъ крупно-зубчатыя; нераспустившіеся цвѣты снаружи бѣлые. Спасское, Шелениха, Братцово; Мячково, Брн. у.; Карапчеево, Кзм. у. (К.).—Воробьевы горы; Павловскій посадъ, Брн. у. (П.).—Быково—опушка Михневскаго лѣса, Брн. у. (С.).—Боровскій курганъ, Брн. у. (Куль.).—Успенское, Звн. у. (X.).—Рождествено на Нарѣ, Срн. у. (гр. Е. Соллогубъ).

268. *Cnidium* Cuss.

Плоды овальные или продолговатые, не сплюснутые; сѣмянка въ разрѣзѣ полукруглая, съ 5 крылатыми ребрышками и одиночными канальцами между ними; чашечные зубцы не замѣтны; столбецъ раздвоенный; лепестки выемчатые.

680. *C. venosum* (Hoffm.) Koch. Пет. Кр. I, стр. 191.—Пет., стр. 169.—
 Кауф. II, № 318.—Цип., № 592.—Кауф. I,
 стр. 204.—Макс., № 292.

Selinum silvestre L. Дв., № 291.—Gold. Sp., p. 123.—Mart., p. 51.—St. II,
 p. 18.—St. I, № 189.

Selinum pratense Spreng. Макс., № 292.—Gold. C., p. 19.

Стебель 30—60 см., примостоящій, простой или вверху мало развѣтвленный съ торчащими вверхъ вѣтвями, голый, внизу цилиндрическій, вверху бороздчатый; верхнія листовыя влагалища длинныя; листья 2—3-перистые, съ узкими линейными или ланцетно-линейными, коротко-заостренными долями и просвѣчивающими жилками; зонтики 15—30-лучевые, во время плодоношенія сжатые; общей обертки нѣтъ или изъ немногихъ листочковъ; частныя обертки многолистные, равной длины

съ цветоножками; цвѣты бѣлые; плодъ до 3 мм. дл., овальный съ остающимися, отогнутыми столбиками.

По дѣсамъ на песчаной и известковой почвѣ. Цвѣтеть съ половины юли до конца августа. Серебряный боръ близъ Хорошова; Городекъ близъ Павловскаго посада, Бгр. у.; Раменское, Бри. у.; между Парфентьевымъ и Пестриковымъ, Кзм. у. (К.).—Перово, Кузьминки (герб. Голдб.). Въ гербаріи Максимовича.—Невѣрово, Кзм. у. (П.).



Cnidium venosum.



Cenolophium Fischeri.

269. *Cenolophium* Koch.

Плоды овально-продолговатые, въ поперечномъ разрѣзѣ почти круглые; сѣмянка съ 5 равными, острыми, почти крылатыми ребрышками, внутри вѣдуто-полыми, съ одиночными канальцами между ними; на внутренней сторонѣ сѣмянки 2 канальца; чашечные зубцы не замѣтные; столбецъ раздвоенный; лепестки почти круглые, выемчатые.

681. *C. Fischéri* Koch. Пет. Кр. I, стр. 192.—Ф. Б., № 33.—Пет., стр. 164.—Кауф. II, № 319.—Цин., № 591.—Рупр. стр. 62 и 88.—Кауф. I, стр. 204.

Cnidium Silaus Spreng. Дв., № 297.

Silaus pratensis Bess. Макс., № 291.

Peucedanum Silaus L. Дв., № 297.—Макс., № 291.—Hoff. H., № 2341.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 52.—Hoff., № 2415.—St. II, p. 18.—St. I, № 183.

Стебель 80—150 см., прямостоящій, голый, ребристый; листья перисто-3-сложные, на черешкахъ, переходящихъ въ узкое влагалище; общіе, какъ и частные черешки листьевъ угловато изогнуты и растопырены; листочки глубоко-перисто-раздѣльные, доли ихъ почти линейныя, цѣлюпокрайнія, остроконечныя; общей обертки нѣтъ или она 1—2-листная; частныя обертки многостебельныя, изъ линейно-шиловидныхъ листочковъ; цвѣты бѣлые; плодъ до 5 мм. дл., голый съ остающимися столбиками.

По берегамъ рѣкъ, по заливнымъ лугамъ и пашнямъ. Цвѣтетъ съ начала юля. Угрешскій монастырь, Перерва, Симоновъ монастырь; близъ Серпухова; Невѣрово, Кзм. у. (К.).—Кунцово (Ассы).—По берегу Москвы р. близъ села Успенскаго, Звн. у. (Ф. Б.).—Близъ Романцова, Мож. у. (В.).—Бѣлопесочная слобода, Срп. у. (Х.).—Островъ на Окѣ противъ Бачманова, Кзм. у. (П.).

270. *Conioselinum* Fisch.

Плоды овальные, со спинки нѣсколько сплюснутые; сѣмянка съ 5 перепончатыми, крылатыми ребрышками, изъ коихъ боковая вдвое шире спинныхъ; между ребрышками замѣтны 2—3 канальца; чашечные зубцы не замѣтны; столбецъ раздвоенный; лепестки обратно-яйцевидные.

682. *C. tatáricum* Fisch. Пет. Кр. I, стр. 192.—Макс., № 289.—Макс. Пут. II, стр. 78.

Conioselinum Fischeri Wimm. et Grah. Мос., № 9.—Ф. О., № 6, р. 86.—Пет., стр. 170.—Кауф. II, № 320.—Цин., № 596.—Кауф. I, стр. 205.

Conioselinum ingricum Fisch. Макс., № 289.

Стебель 60—150 см., цилиндрическій, голый, въ узлахъ нѣсколько изогнутый, продольно-полосатый или едва замѣтно ребристый, голый; листья 2—3-перисто-сложные, съ нижней стороны блѣднѣе и лоснящіеся; верхніе—съ раздутыми влагалищами; листочки продолговатые, перисто-раздѣльные, доли ихъ перисто-надрѣзные, зубчатая или цѣльная; общая обертка обѣ 1—2 листочкахъ, легко опадающая; частныя обертки изъ щетинковидныхъ листочковъ, многостыныя, б. ч. однокія, повислыя; цвѣты бѣлые; лучи зонтика бороздчатые; плоды 5—6 мм. дл., голые.



Conioselinum tataricum.

По лѣснымъ холмамъ, сырымъ мѣстамъ и по болотистымъ кустарникамъ. Цвѣтетъ съ половины юля и въ августѣ. Братцово, между Иваньковымъ и Петровымъ (К.).—Раменки (М.).—Мож. у. (В.).—Трепарево,

Мож. у. (Ф. О.).—Успенское, Дарьино, Новый Иерусалимъ, Звн. у.; Саяново, Пдл. у. (Х.).—По берегу р. Десны близъ Лаптевской мельницы, Пдл. у. (Мос.).—Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

* *Levisticum* Koch.

Плодъ овальный, сплюснутый со спинки; сѣмянка съ 5 крылатыми ребрышками; боковыя ребрышки расходящіяся, вдвое шире спинныхъ; между ребрышками по одному канальцу; чашечные зубцы не замѣтны; столбецъ раздвоенный; лепестки почти округлые, цѣльные.

* *L. officinale* Koch. Пет., стр. 213.—Кауф. II, стр. 207.—Ципп., стр. 198.—
Кауф. I, стр. 206.

Levisticum ligusticum. Дв., № 302.

Ligusticum Levisticum L. Макс., № 290.—Mart., p. 53.—Pal., № 550.

Стебель 100—200 см., голый съ сизымъ налетомъ, съ тонкими продольными линиями, трубчатый, вверху вѣтвистый; листья голые, съ обѣихъ сторонъ лоснящиеся, перистые или перисто-двусложные, нижніе—на длинныхъ черешкахъ, верхніе—сидячіе; листочки обратно-овальные съ клиновиднымъ основаніемъ, крупно-зубчатые или разсѣченно-зубчатые, часто 2—3-раздѣльные; общая и частныя обертки многολистныя съ ланцетовидными листочками; цвѣты ярко-желтые; плоды 4—6 мм. дл.

Разводится по садамъ и огородамъ. Цвѣтетъ съ начала юня, весь июль.



Levisticum officinale.



Selinum Carvifolia.

271. *Selinum* L.

Плоды округлые, сжатые со спинки; сѣмянка съ 5 перепончатокрылатыми ребрышками, изъ конхъ боковыя сильно расходящіяся, вдвое шире остальныхъ; каналцы одиночные, иногда только у боковыхъ ребрышекъ парные; чашечные зубцы не замѣтны; столбецъ раздвоенный; лепестки выемчатые.

683. *S. Carvifolia* L. Пет. Кр. I, стр. 193.—Бух. II, № 184.—Бух. I, № 181.—
Пет., стр. 275.—Кауф. II, № 321.—Ципп., № 597.—Кауф. I,
стр. 206.—Lind., p. 118.—Макс., № 288.—Макс. Пут. II,
стр. 91.—Hoff. II., № 2309.—St. II, p. 18.—Pal., № 541.

Selinum carvifolium L. Дв., № 293.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 51.—Hoff.,
№ 2936.

Selinum Carvifolium L. St. I, № 190.

Стебель 40—100 см., прямостоящій, простой или вверху мало вѣтвистый, глубоко-бороздчатый, остро-ребристый; листья 2—3-перистые, въ очертаніи яйцевидно-продолговатые, нижніе—на длинныхъ черешкахъ, верхніе—почти сидячіе; листочки перисто-раздѣльные, доли ихъ то яйце-

видно-ланцетныя, то продолговато-линейныя, съ маленькимъ острымъ кончикомъ; зонтикъ сжатый, 15—20-лучевой; лучи бороздчатые, сверху опушенные; общей обертки нѣтъ или она малоллистная, скоро опадающая; частныя обертки многолистныя изъ линейныхъ листочковъ; цвѣты бѣлые, рѣдко блѣдно-розовые; плоды до 3—4 мм. дл.

По лѣсамъ, болотистымъ лугамъ и кустарникамъ, часто. Цвѣтеть съ половины іюля до половины августа; плоды въ концѣ августа. Между Пваньковымъ и Братцовымъ; Подольскъ; Павловскій посадъ, Бгр. у. (К.).—Лосинный Островъ (А.).—Перово (герб. Гольдб.).—Пушкино, Мытищи (С.).—Горенки, Семеновское за Калужской заставой; Лузки, Срп. у. (П.).—Семеновское, Срп. у. (Макс.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Дарьино, Звн. у. (Х.).—Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

z. silvaticum Spreng. Пет. Кр. I, стр. 193.—Mart., p. 51.

Стебель болѣе высокій, съ перепончатыми ребрами и съ общей оберткой, состоящей изъ нѣсколькихъ листочковъ. Воробьевы горы; Архангельское, Звн. у. (Мар.).

272. *Ostéricum Hoffm.*

Плоды яйцевидные, нѣсколько сжатые со спинки; сѣмянка съ 5 ребрышками, изъ коихъ только два боковыхъ широко-крылатыя, всѣ ребрышки полныя; каналы одиночные; оболочка плода прирасла къ сѣмени только вдоль канальцевъ; чашечка изъ 5 яйцевидныхъ зубчиковъ; столбецъ раздвоенный; лепестки округло-обратно-сердцевидные, съ длиннымъ ноготкомъ.

684. *O. palústre* Bess. Пет. Кр. I, стр. 194.—Пет., стр. 234.—Кауф. II, № 323 — Гор., № 36.—Цин., № 598.

Стебель 50—120 см., прямостоящій, трубчатый, ребристо-бороздчатый, малоллистный; корневые листья 2—3—много-перистые, сверху голые,



Ostéricum palustre.

снизу б. ч. по жилкамъ опушенные, на длинныхъ, 3-гранныхъ, крылатыхъ черешкахъ; листочки яйцевидные или продолговатые, заостренные, съ косымъ или нерѣдко съ сердцевиднымъ основаніемъ, по краямъ неравно-зубчатые, всѣ на короткихъ черешкахъ; стеблевые листья съ широкими, вздутыми влагалищами, очень маленькіе, часто тройчатые; зонтики 15—30-лучевые; лучи крылато-граннстые, голые, рѣже опушенные; общей обертки нѣтъ или она 1—2-листная; частныя обертки многолистныя; цвѣты бѣлые; плоды 4—5 мм. дл., сѣро-бурые, съ металлическимъ блескомъ.

Находится въ гербаріи Максимовича за № 240.

273. *Angélica* L.

Плоды овальные, сплюснутые со спинки; сѣмянка съ 5 ребрышками, изъ коихъ 3 спинныхъ нитевидныя и 2 боковыхъ широко-перепончато-крылатыя; ребрышки плотныя; вся оболочка плода прираста къ сѣмени; каналцы одиночныя: спайка сѣмянокъ очень узкая; чашечные зубцы не замѣтные; столбецъ раздвоенный; лепестки ланцетовидно-заостренныя, цѣльныя.

685. *A. silvéstris* L. Пет. Кр. I, стр. 193.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 137.—Кауф. II, № 322.—Цин., № 599.—Кауф. I, стр. 207.—Lind., p. 118.—Дв., № 305.—Макс., № 287.—Hoff. H., № 2382.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 55.—Hoff., № 223.—St. II, p. 18.—St. I, № 192.—Pal., № 552.

Imperatoria sylvestris Desf. Макс., № 287.—Mart., p. 55.

Стебель 80—250 см., трубчатый, въ нижней части цилиндрическій, въ верхней—тонко-ребристый, б. ч. съ низымъ налетомъ; листья перисто-2—3-сложные, нижніе—на длинныхъ черешкахъ, верхніе—сидячіе, съ сильно вздутыми влагалищами; листочки большіе, овальные, заостренныя, по краямъ просто- или двояко-зубчатые, зубчики съ остроконечіемъ; въ развѣтвленіяхъ листа маленькіе прилистнички; зонтики крупныя, о 15—30 лучахъ; стебель подъ зонтиками и лучи покрыты пушкомъ; общей обертки нѣтъ или она о 2—3 листочкахъ; частныя обертки многостыныя; цвѣты бѣлые, иногда съ розовымъ оттѣнкомъ; зубцы у чашечки не замѣтныя; плоды 4—5 мм. дл., буро-желтые.

По лѣсамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ начала іюля до осени; плоды съ половины августа.

α. *decúrgens* Rupr. Пет. Кр. I, стр. 193.—Бух. II, № 185.—Бух. I, № 176.—Кауф. II, стр. 208.—Цин., стр. 199.—Кауф. I, стр. 207.

Angelica montana Schleich.

Конечные листочки съ клиновиднымъ основаніемъ и низбѣгающіе вдоль черешка. *Forma typica* Rupr., у которой конечные листочки съ округлымъ основаніемъ и не низбѣгающіе, вѣроятно, просматривается.



Angelica silvestris.

274. *Archangélica* Hoffm.

Плоды овальные, сплюснутые со спинки; сѣмянка съ 5 ребрышками, изъ коихъ 3 спинныхъ—нитевидныя и 2 боковыхъ—толстыя, крыловидныя; въ наружной оболочкѣ сѣмянки каналцевъ нѣтъ, но послѣдніе заложены въ большомъ числѣ во внутренней оболочкѣ, которая

плотно охватывають сѣми и совершенно обособлена отъ наружной; чашечка изъ 5 мелкихъ зубчиковъ; столбецъ раздвоенный; лепестки эллиптические цѣльные, заостренные.

686. *A. officinalis* Hoffm. Пет. Кр. I, стр. 194.—Ф. Б., № 34.—Пет., стр. 139.—Кауф. II, № 324.—Цин., № 600.—Кауф. I, стр. 208.—Макс., № 286.

Angelica Archangelica L. Дв., № 304.—Макс., № 286.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 53.—St. II, p. 18.—St. I, № 191.—Pal. № 551.

Стебель 1—2,5 м., трубчатый, тонко-бороздчатый, голый съ сизымъ налетомъ; корневые листья на длинныхъ черешкахъ, 2—3-перистые, голые; листочки яйцевидные, б. ч. заостренные съ клиновиднымъ или иногда даже съ сердцевиднымъ основаніемъ, по краямъ остро-зубчатые; конечный листокъ 3-лопастной, боковые—иногда 2-лопастные; стеблевые листья б. ч. 2-перистые, съ сильно вздутыми, стеблеобъемлющими влагалищами; зонтикъ очень большой, почти шаровидный, съ пушистыми лучами; общей обертки нѣтъ или она 1-листная; частныя обертки многостыныя; цвѣты зеленоватые; плоды зеленоватые, 5—8 мм. дл.



Angelica officinalis.

По берегамъ рѣкъ, по кустарникамъ и по лугамъ. Цвѣтеть съ конца іюня до осени. Серпуховъ; Невѣрово, Клм. у. (К.).—Перерва; Бачманово, Клм. у.; Софьино, Брн. у.; Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (П.).—Дракино, Срп. у. (С.).

275. *Peucedanum* L.

Плоды обратно-яйцевидные, сплюснутые со спинки; сѣмянка чечевицеобразная, съ широкой плоской каймой; ребрышекъ 5, нитевидныхъ; 3 спинныхъ ребрышка ясно замѣтны, 2 же боковыхъ менѣе ясны и часто сливаются съ каймой; послѣдняя у 2 сѣмянокъ плотно прилегаетъ одна къ другой; между ребрышками 1—3 канальца; чашечка изъ 5 зубчиковъ или они не замѣтны; столбецъ раздвоенный; лепестки выемчатые или почти цѣльные; цвѣты обоеполые или иногда встрѣчаются и не плодущіе въ тѣхъ же зонтикахъ.

1. Листочки цѣльные, пильчатые, кожистые, снизу сизо-зеленые.

P. Cervaria Cuss.

Листочки перисто-раздѣльные или надрѣзные съ продолговатыми или линейными долями, снизу не сизо-зеленые. 2.

2. Главный листово́й черешокъ отогнуть; боковые отходить подъ

прямымъ угломъ къ главному; листочки лоснящіеся, доли ихъ продолговатыя.

P. Oreoselinum Moench.

Листовые черешки не оттопырены и расположены подъ острымъ угломъ къ главному; листья не лоснящіеся, доли ихъ ланцетоланнейныя или линейныя.

P. palustre (L.) Moench.

687. *P. Cervária (L.) Cuss.* Пет. Кр. I, стр. 195. — Пет., стр. 237. — Рупр., стр. 88.

Peucedanum Cervaria Lap. Кауф. II, № 325. — Цин., № 608. — Кауф. I, стр. 209. — Макс., № 284.

Athamanta Cervaria L. Макс., № 284.

Стебель 50—100 см., прямостоящій цилиндрическій, въ нижней части слабо-, въ верхней—сильно-бороздчатый, маловѣтвистый, голый, какъ и все растеніе; корневые листья на длинныхъ черешкахъ, кожистые, съ нижней стороны блѣднѣе, сизо-зеленые, 2—3-перистые, боковые черешки подъ острымъ угломъ къ главному; листочки яйцевидные или яйцевидно-продолговатыя, по краямъ остро-пильчатые; верхніе стеблевые листья мало развиты, безъ черешковъ, съ одними длинными влагалищами; зонтики 12—30-лучевые; лучи съ верхней стороны шероховатые; общая и частныя обертки многолестныя, отогнуты книзу, съ бѣлыми краями; цвѣты бѣлые, до распусканія блѣдно-розовые; плодъ продолговато-эллиптическій, 4—6 мм., желто-бурый, на верхушкѣ не выемчатый.



Peucedanum Cervaria.

Найдено только разъ близъ Верен и находится въ гербаріи Максимовича за № 241.

688. *P. Oreoselinum (L.) Moench.* Пет. Кр. I, стр. 195. — Пет., стр. 237. — Кауф. II, № 326. — Цин., № 609. — Кауф. I, стр. 209. — Макс., № 285.

Selinum Oreoselinum Scop. Дв., № 294.

Athamanta Oreoselinum L. Дв., № 294. — Макс., № 285. — Gold. C., p. 19. — Mart., p. 52. — Hoff., № 429. — St. II, p. 18. — St. I, № 187.

Стебель 50—100 см., прямостоящій цилиндрическій, тонко-продольно-полосатый, только въ верхней части слегка бороздчатый, маловѣтвистый; корневые листья на длинныхъ черешкахъ, въ очертаніи треугольныя, сверху нѣсколько лоснящіеся, снизу блѣднѣе и съ сѣтчатыми жилками, тройчато-перистые; главный листової черешокъ отогнутъ, боковые оттопырены подъ прямымъ угломъ или даже отогнуты книзу; листочки съ клиновиднымъ основаніемъ, переходятъ въ короткій черешокъ, глубоко-перисто-надрѣзные, доли ихъ широкія или узкія, тупыя или заостренныя въ бѣ-

лый кончикъ; зонтички 20—30-лучевые; лучи съ верхней стороны пушистые; общая и частныя обертки многолистныя, отогнутыя книзу, съ бѣлымъ краемъ; цвѣты бѣлые; плоды почти круглыя, красно-бурыя, 4—7 мм., на верхушкѣ и у основанія съ маленькими выемками.

По открытымъ мѣстамъ, рѣдко. Останкино, Алексѣевское близъ Троицкаго шоссе (герб. Гольдб.).—Въ гербаріи Максимовича за № 242.



Peucedanum Oreoselinum.



Peucedanum palustre.

689. *P. palústre* (L.) Moench. Пет. Кр. I, стр. 194.—Бух. II, № 186.—Бух. I, № 179.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 237.—Кауф. II, № 327.—Цин., № 607.—Кауф. I, стр. 210.—Макс., № 283.

Selinum palustre L. Дв., № 292.—Макс., № 283.—Hoff. H., № 2316.—Gold. C., p. 19.—Gold. Sp., p. 123.—Mart., p. 51.—Hoff., № 2939.—St. II, p. 18.

Thysselinum palustre Hoffm. Hoff. H., № 2316.

Стебель 1—1,5 м., прямостоящій, вѣтвистый, голый, б. или м. ребристый; корневые листья крупныя, на длинныхъ черешкахъ, глубоко 2—3-перисто-раздѣльные, голые, въ очертаніи треугольныя; листочки глубоко-перисто-раздѣльные, доли ихъ линейно-ланцетныя или линейныя, заостренныя или туповатыя, съ краснымъ или бѣлымъ заостреннымъ кончикомъ; стеблевые листья менѣ развиты, на болѣе короткихъ черешкахъ, верхніе почти сидячіе; зонтики 12—30-лучевые съ опушенными лучами; общая и частныя обертки многолистныя; листочки ихъ ланцетные, очень длинно-заостренные, съ бѣлой каймой и по краямъ рѣсничатые; цвѣты до распусканія розовые, потомъ бѣлые; плоды овальныя, 4—5 мм. дл.

По болотамъ и болотистымъ кустарникамъ, часто. Цвѣтетъ со середины іюля до середины августа; плоды съ половины августа. Лосинный Островъ, Б. Мытищи, Захарково, Зыково; Павловскій посадъ, Бгр. у. (К.).—Три горы, Семеновское (Мар.).—Кузьминки, Красниково болото за Б. Мытищами (П.).—Близъ Образцова на Клязьмѣ, Бгр. у. (С.).—

Болото Пальница близъ Михайловскаго, Пдл. у. (Б.). — Вязки, Брн. у. (Х.). — Ст. Удѣльная по берегу р. Македоновки, Брн. у.; Вобошино озеро близъ Леонова (Куль.).

* *Anéthum* L.

Плоды овальные, сплюснутые со спинки; сѣмянка чечевицеобразная съ широкой пленчатой каймой; ребрышекъ 5, нитевидныхъ, на спинкѣ килеватыхъ, 3 спинныхъ ребрышка ясно замѣтны, 2 же боковыхъ часто сливаются съ каймой или прилегаютъ къ ней; канальцы одиночные, заполняютъ промежутокъ между ребрышками; зубцы чашечки не замѣтны; пестичный дискъ плоскій; столбецъ раздвоенный; лепестки почти круглые, на концѣ какъ бы обрубленные.

* *A. graveolens* L. Пет., стр. 137. — Кауф. II, стр. 212. — Цин., № 612. — Кауф. I, стр. 210. — Дв., № 318. — Mart., p. 55. — St. II, p. 19. — St. I, № 203. — Pal., № 571.

Стебель 40—100 см., примостоящій, цилиндрическій, продольно-полосатый, б. ч. вѣтвистый; все растеніе голое съ синеваатымъ налетомъ; листья 2—3-перисто-раздѣльные, нижніе — на черешкахъ, верхніе — сидятъ съ влагалищами; доли линейныя или почти щетинковидныя, заостренныя; зонтики крупныя, 10—40-лучевыя; лучи продольно-полосатыя, голыя; общей и частныхъ обертокъ нѣтъ; цвѣты ярко-желтыя; плоды 3—5 мм. дл., эллиптическіе, бурые, нѣсколько лоснящіеся, широкій край ихъ желтоватый.

Разводится по огородамъ.



Anethum graveolens.



Pastinaca sativa.

276. *Pastinaca* L.

Плоды овальные, сплюснутые со спинки; сѣмянка чечевицеобразная съ широкой пленчатой каймой; спинныя ребрышки очень тонкія, боковыя — отодвинуты къ краю и сливаются съ каймой; канальцы одиноч-

ные, къ обоимъ концамъ суживаются; чашечка изъ очень маленькихъ зубчиковъ или зубчики не замѣтны; столбецъ раздвоенный; лепестки округлые, слегка выемчатые.

690. *P. sativa* L. Пет. Кр. I, стр. 195.—Бух. II, № 187.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 235.—Кауф. II, № 329.—Цин., № 613.—Кауф. I, стр. 211.—Lind., p. 118.—Дв., № 317.—Макс., № 281.—Hoff. II., № 2449.—Gold. C., p. 19.—Hoff., № 2335.—St. II, p. 19.—St. I, № 202.—Pal., № 570.

(стебель 40—120 см., прямостоящій. б. ч. бороздчатый, голый или покрытъ короткими волосками, въ верхней половинѣ вѣтвистый; листья непарноперистые, нижніе—на длинныхъ черешкахъ, верхніе—на короткихъ съ влагалищами; листочки продолговато-яйцевидные, у основанія клиновидные или косые, по краямъ неравно- и крупно-зубчатые или надрѣзные, съ 1—2 лопастями у основанія; общей и частныхъ обвертокъ нѣтъ; зонтики 8—18-лучевые, б. ч. съ неравными лучами; цвѣты ярко-желтые; плоды желто-бурые, округло-овальные, 5—6 мм. дл., такой же длины, какъ плодоножка.

По паровымъ полямъ, открытымъ мѣстамъ и около дорогъ, часто. Цвѣтеть съ начала іюля до половины августа; плоды съ половины августа.

а. *typica* Rupr. Пет. Кр. I, стр. 196.

Pastinaca sativa L. а. *glabra* Kauffm. Кауф. II, стр. 212.—Кауф. I, стр. 211.

Pastinaca pratensis Fl. Dan. Mart., p. 55.

Листья съ верхней стороны голые, лоснящіеся, съ нижней—голые или покрыты короткимъ и рѣдкимъ пушкомъ. За Покровскимъ близъ Тулуповской мельницы (К.).—Никольское близъ Салтыковки (Куль.).—Быково, Брн. у. (С.).—Дарьино, Звн. у. (Х.).

б. *silvestris* Rupr. Пет. Кр. I, стр. 196.

Pastinaca sativa L. б. *pubescens* Kauffm. Кауф. II, стр. 213.—Кауф. I, стр. 211.

Pastinaca opaca Bernh.

Листья тусклые, съ обѣихъ сторонъ покрыты пушкомъ, снизу довольно густымъ. Химки, Братцово, Давыдково; Троица, Дмит. у.; Мячково, Брн. у. (К.).—Раменки, Воробьевы горы; Городище на Клязьмѣ, Вгр. у. (П.).—Мытищи (С.).

277. *Heracléum* L.

Плоды обратно-яйцевидные, сплюснутые со спинки; сѣмянка чечевицеобразная; спинные ребрышки очень тонкія, боковыя—прилегаютъ къ широкой каймѣ сѣмянки; каналцы одиночные, къ концу булавовидно расширенные, не доходя до конца сѣмянки; чашечка изъ 5 зубчиковъ; столбецъ раздвоенный; лепестки выемчатые, иногда почти двураздѣльные; паружные цвѣты зонтика часто съ неравными лепестками.

691. *H. sibiricum* L. Пет. Кр. I, стр. 196.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 198.—Кауф. II, № 330.—Цин., № 615.—Pinz., p. 12.—Кауф. I, стр. 211.

Стебель 50—150 см., прямостоящий, бороздчатый. б. ч. покрытъ длинными, жесткими, обращенными книзу волосками; листья шершавые отъ волосковъ, непарноперистые, обѣ 1—2—3 паряхъ, нижніе—на длинныхъ черешкахъ, верхніе—почти сидячіе съ широкими, б. ч. вздутыми влагалищами; листочки съ широко-лопастными или перисто-раздѣльными долями; зонтики крупные, о 15—30 лучахъ; лучи бороздчатые; цвѣты зеленые или желто-зеленые; завязь голая или почти голая; плодъ 6—11 мм. дл., эллиптическій, голый, на верхушкѣ съ выемкой.

По лугамъ, кустарникамъ, по берегамъ рѣкъ и близъ дорогъ, часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до августа; плоды съ конца іюля.



Heracleum sibiricum x. *typicum*.



Heracleum sibiricum β. *longifolium*.

- x. *typicum* Kauffm. Пет. Кр. I, стр. 196. — Бух. II, № 188. — Бух. I, № 172. —
Кауф. II, стр. 213.—Кауф. I, стр. 212.

Heracleum sibiricum L. Дв., № 300.—Макс., № 279.—Gold. Sp., p. 124.—Mart.,
p. 52.—Hoff., № 1579.—St. II, p. 18.—St. I, № 180.—
Pal., № 549.

Heracleum Sphondylium L. Дв., № 293.—Макс., № 278.—Gold. Sp., p. 124.—
Hoff., № 1588.—St. II, p. 18.—St. I, № 177.—Pal.
№ 548.

Heracleum Panaces L. Дв., № 301.—Gold. Sp., p. 124.—Mart., p. 52.—St. I,
№ 179.

Листочки въ очертаніи яйцевидные съ сердцевиднымъ основаніемъ, лопастные, по краямъ двояко- и крупно-зубчатые; конечный листокъ глубоко-трехраздѣльный, доли его лопастныя.

- β. *longifolium* Koch. Пет. Кр. I, стр. 196.—Кауф. II, стр. 211.—Кауф. I, стр. 212.

Heracleum angustifolium L. Дв., № 299.—Макс., № 280.—Hoff. H., № 2366.—
Mart., p. 52.—St. I, № 178.

Heracleum longifolium. Mart., p. 52.

Heracleum flavescens Bess. Hoff. H., № 2368.—Gold. Sp., p. 124.—Ad., p. 163.

Heracleum Sphondylium L. b. *flavescens*. Mart., p. 52.

Heracleum sibiricum L. *angustifolium* Ledb. non L.

Листочки глубоко-перисто-раздѣльные; доли ихъ линейно-ланцетныя или линейныя, иногда съ сильно вытянутыми концами, по краямъ неравно-зубчатыя.

278. *Laserpícium* L.

Плоды овальные, сжатые со спинки; сѣмянка съ 5 главными, едва замѣтными ребрышками, изъ коихъ 3 находятся на спинкѣ сѣмянки, а 2 остальные — на плоской сторонѣ; кромѣ главныхъ, есть еще 4 вторичныя, очень широкія, крыловидныя ребрышка; два изъ нихъ помѣщаются на спинкѣ сѣмянки между главными ребрышками и два по краямъ сѣмянки въ видѣ каймы; подѣ вторичными ребрышками — одиночные каналцы; чашечка изъ 5 зубчиковъ; столбецъ раздвоенный; лепестки выемчатые.

692. *L. pruthénicum* L.

Laserpitium prutenicum L. Пет. Кр. I, стр. 197. — Мос., № 10. — Ф. О., № 6, р. 86. — Пет., стр. 209. — Кауф. II, № 331. — Цин., № 619. — Рупр., стр. 88. — Кауф. I, стр. 212. — Апп. С. I, № 24. — Дв., № 303. — Макс. Пут. II, стр. 78.

Laserpitium Prutenicum. Макс., № 274.

Стебель 40—120 см., прямостоящій, простой или въ верхней части маловѣтвистый, бороздчатый, покрытъ, особенно въ нижней части, б. или м. густо, щетинистыми. внизъ обращенными волосками; листья двойко-перистые, нижніе — иногда тройко-перистые на длинныхъ черешкахъ, покрытыхъ щетинистыми волосками; доли листочковъ по краямъ рѣсничатыя, ланцетныя или линейно-ланцетныя, цѣлюкрайнія или у нижнихъ листочковъ глубоко-перисто-надрѣзныя; зонтики о 10—20 лучахъ; лучи нѣсколько неравной длины и, какъ цвѣтоножки, покрыты только съ верхней стороны густыми волосками; общая и частныя обертки многосистныя; листочки ихъ ланцетные, отогнутые книзу, по краямъ съ широкой бѣлой каймой; завязь покрыта волосками; плоды 4—5 мм. дл., по ребрамъ волосистые.



Laserpitium pruthenicum.

По лѣсамъ и кустарникамъ, часто. Цвѣтеть съ конца іюня до конца августа; плоды съ половины августа. Б. Мытищи. Братцово, Иваньково, Раменки; Аппинское, Бгр. у. (К.). — Пушкино (С.). — Гладышево и Семеновское за Калужской заставой; Островцы на Москвѣ р. Брн. у. (П.). — Кунцово; Семеново, Звн. у. (Х.). — Близъ дер. Поливаново, Пдл. у. (Мос.). — Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

279. *Daucus* L.

Плоды овальные или продолговатые, слегка сплюснутые со спинки; сѣмянка съ главными ребрышками щетинистыми, изъ конхъ 3 на спинкѣ сѣмянки и 2 на плоской сторонѣ; 4 вторичныхъ ребрышка замѣтнѣ главныхъ, состоятъ изъ одного ряда длинныхъ шиповъ, слившихся основаніями; одиночные каналцы подъ вторичными ребрышками; чашечка изъ 5 зубцовъ; столбецъ простой, не раздвоенный; лепестки глубоко-выемчатые; краевые цвѣты часто съ неравными лепестками.

693. *D. Carota* L. Пет. Кр. I, стр. 198.—Мос., № 11.—Ф. Б., № 35.—Пет., стр. 176.—Кауф. II, № 332.—Мил., № 16.—Гор., № 37.—Цил., № 620.—Кауф. I, стр. 213.—Дв., № 289.—Макс., № 275.—Mart., p. 50.—Hoff., № 1153.—St. II, p. 18.—St. I, № 181.—Pal., № 536.

Стебель 20—50 см., прямостоящій, бороздчатый, покрытъ, какъ черешки и нижняя сторона листьевъ, жесткими волосками; листья въ очертаніи продолговатые, 2—3-перистосложные, съ перисто-раздѣльными листочками и ланцетными, коротко-заостренными долями; зонтики во время цвѣтенія плоскіе, многолучевые; общая обертка многолистная съ тройчатыми или перисто-раздѣльными листочками; у частныхъ обертковъ листочки простые, линейные или тройчатые; цвѣты бѣлые; плоды эллиптическіе, 3—4 мм. дл., съ тонкими шипами въ ширину плода.

По кустарникамъ и открытымъ мѣстамъ, б. ч. на известковой почвѣ. Цвѣтетъ съ половины іюля. Берегъ р. Пахры близъ Подольска (Вар.).—Дубровицы и близъ Даниловской фабрики по берегу р. Пахры, Пдл. у.; между Васильевскимъ и Сонинымъ по берегу р. Москвы, Руз. у. (Г.).—Михайловское, Пдл. у. (Мос.).—Луковня, берегъ р. Пахры, Пдл. у.; Семеновко, Зви. у. (Х.).—Михалково-Головино (Гейл.).—Между ст. Лонаси и ж.-д. мостомъ, Срп. у. (П.).—Невѣрово. Б. Алексѣвка на р. Сѣверкѣ, Кал. у. (П.).



Daucus Carota.

280. *Torilis* Adans.

Плоды продолговатые, нѣсколько сжатые съ боковъ и вдоль перетянутые, усажены согнутыми шипиками; сѣмянка съ мало замѣтными главными щетинистыми ребрышками, между которыми находится еще менѣ замѣтныя вторичныя ребрышки, сплошь усаженные въ нѣсколько рядовъ искривленными шипиками; каналцы одиночные подъ вторичными ребрышками; чашечка изъ 5 зубчиковъ; лепестки выемчатые; краевые цвѣты съ неравными лепестками.

694. *T. Anthriscus* (L.) Gmel. Пет. Кр. I, стр. 198. — Ф. Б., № 36. — Пет., стр. 291. — Кауф. II, № 333. — Цин., № 621. — Кауф. I, стр. 214. — Дв., № 288. — Макс., № 276.

Caucalis Anthriscus Scop. Дв., № 288. — Mart., p. 50. — Hoff., № 722. — St. II, p. 17.
Tordylium Anthriscus L. Mart., p. 50. — St. I, № 182.

Стебель 40—100 см., почти от основанія вѣтвистый, тонкій, продольно-полосатый, шершавый отъ короткихъ, прижатыхъ и кнпзу обращенныхъ волосковъ; листья въ очертаніи треугольные, покрыты короткими, прижатыми щетинистыми волосками, двойко-перистые, съ ланцетными, перисто-раздѣльными или надрѣзанно-зубчатыми листочками; конечный листокъ б. ч. сильно вытянутъ; зонтики о 5—12 сильно вытянутыхъ лучахъ; цвѣты бѣлые или блѣдно-розовые; общая обвертка малолестная; листочки ея линейные или ланцетные, въ нѣсколько разъ короче лучей; листочки частныхъ обвертокъ б. ч. равны цвѣтоножкамъ и вдвое короче плодоножекъ; плоды 2—3 мм. дл., густо покрыты шипами; послѣдніе покрыты короткими щетинками и оканчиваются тонкимъ просвѣчивающимъ остриемъ.



Torilis Anthriscus.

По кустарникамъ и тѣнистымъ обрывамъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ половины іюня. Борисовская мельница близъ Братцова (К.). — На каменистой почвѣ близъ Оки (Ст.). — Горницкая мельница на р. Лопасѣ, Сри. у. (II.). — Рождествено на Парѣ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ). — Невѣрово, Бѣлые Колодези, Кзм. у. (II.).

281. *Anthriscus* Hoffm.

Плоды почти цилиндрическіе, вдоль перетянутые, вытянутые въ б. или м. длинный носикъ; сѣмянка гладкая, безъ ребрышекъ, послѣднія слабо замѣтны только у верхушки сѣмянки; каналцы одиночные, слабо замѣтные; бѣлокъ на внутренней сторонѣ съ глубокой бороздкой; чашечные зубцы не замѣтные; столбецъ коротко-2-надрѣзной; лепестки усѣченные или выемчатые, у краевыхъ цвѣтовъ часто неравные.

695. *A. silvestris* Hoffm. Пет. Кр. I, стр. 198. — Бух. II, № 189. — Бух. I, № 177. — Ф. О., № 6, p. 86. — Пет., стр. 138. — Кауф. II, № 334. — Цин., № 622. — Кауф. I, стр. 215. — Lind., p. 118. — Ann. C. II, № 128. — Дв., № 313. — Макс., № 306.

Chaerophyllum silvestre L. Дв., № 313. — Макс., № 306. — Gold. C., p. 19. — Mart., p. 54. — Hoff., № 821. — St. II, p. 18. — St. I, № 197. — Pal., № 566.

Стебель 80—150 см., въ верхней части вѣтвистый, трубчатый, бороздчатый, голый или въ нижней части покрытъ внизъ обращенными волосками, подъ узлами иногда тоже б. или м. густо-волосистый; листья съ верхней стороны лоснящіеся, голые, съ нижней — часто по жилкамъ покрыты волосками, въ очертаніи треугольные, 2—3-перисто-раздѣльные; листочки продолговато-ланцетные, глубоко-перисто-надрѣзные или глубоко-зубчатые; верхніе листья съ широкими по краямъ пленчатыми и рѣсничатыми влагалищами; зонтики о 8—16 лучахъ; цвѣты бѣлые; общей обертки нѣтъ или она 1—3-листная; частныя обертки 5—8-листные; листочки ихъ ланцетные, по краямъ рѣсничатые; плоды 5—7 мм. дл., буро-зеленые, лоснящіеся, вытнуты въ короткій носокъ, не превышающій одну пятую длины плода.

По кустарникамъ, около заборовъ, по садамъ и по сырýmъ мѣстамъ. очень часто. Цвѣтетъ съ конца мая до середины іюля; плоды съ половины іюля.

α. nitida Kauffm. Пет. Кр. I, стр. 199.—Кауф. II, стр. 217.—Кауф. I, стр. 215.

Все растеніе голое; листочки лоснящіеся. Около Борисовской мельницы близъ Братцова (К.).



Anthriscus silvestris.



Anthriscus Cerefolium.

A. Cerefolium Hoffm. Пет. Кр. I, стр. 199.—Пет., стр. 138.—Кауф. II, стр. 217.—Цин., стр. 206.—Кауф. I, стр. 215.—Макс., № 305.

Chaerophyllum cerefolium Crantz. Дв., № 312.

Scandix Cerefolium L. Макс., № 305.—Mart., p. 54.—St. II, p. 18.—St. I, № 196.—Pal., № 536.

Chaerophyllum sativum Lam. Mart., p. 54.

Стебель 30—70 см., тонко-бороздчатый, вѣтвистый, голый, только надъ узлами покрытъ пушкомъ; листья свѣтло-зеленые, сверху голые, снизу вдоль жилокъ съ короткими волосками, въ очертаніи треугольные, 2—3-перистые; листочки широко-ййцевидные съ клиновиднымъ основа-

ниемъ, глубоко-перисто-надрѣзные или глубоко-зубчатые, по краямъ часто рѣсничатые; зонтики, супротивные листьямъ, сидячіе или на короткихъ двѣтоноскахъ, 3—5-лучевые съ пушистыми лучами; общей обертки нѣтъ; частныя—1—3-листные, однобокія, отогнутыя книзу; листочки ихъ по краямъ рѣсничатые, не длиннѣе лучей зонтичковыхъ; цвѣты бѣлые; плоды на толстыхъ плодоножкахъ, 6—12 мм. дл., лоснящіеся, черно-бурые, вытянуты въ носикъ почти вполонину плода.

Иногда разводится по огородамъ.

282. *Chaerophyllum* L.

Плоды ланцетно-продолговатые, сжатые съ боковъ, не удлинены въ носикъ; сѣмянка съ 5 тупыми, равными ребрышками и одиночными между ними канальцами во всю длину сѣмянки; бѣлокъ на внутренней сторонѣ съ глубокой, продольной бороздкой; зубцы чашечки не замѣтны; столбецъ коротко-2-надрѣзной; лепестки обратно-сердцевидные, глубоко выемчатые.

1. Листочки у листьевъ очень крупные, до 12 см., по краямъ зубчатые.
C. aromaticum L.

Листочки у листьевъ не крупные (2—2,5 см.), глубоко-перисто-надрѣзные. 2.

2. Листочки у частныхъ обвертокъ по краямъ рѣсничатые.

C. temulum L.

Листочки у частныхъ обвертокъ по краямъ безъ рѣсничекъ, съ широкимъ бѣлымъ пленчатымъ краемъ. 3.

3. Частныя обертки правильныя, 8—10-листные; столбики у плодовъ длинные, торчащіе, слегка расходящіеся, на высокомъ коническомъ дискѣ.
C. Prescotii DC.

Частныя обертки однобокія, 3-, рѣже 5-листные; столбики у плодовъ короткіе, отогнутые, иногда почти горизонтально, на почти плоскомъ дискѣ.
C. bulbosum L.

C. temulum L. Пет. Кр. I, стр. 199.—Кауф. II, № 335.—Цян., № 627.—Кауф. I, стр. 216.—Дв., № 315.—Макс., № 304.—Mart., p. 54.—St. II, p. 18.

Стебель 30—100 см., слегка бороздчатый, съ утолщенными узлами, развѣтвленный, въ нижней части покрытъ внизъ обращенными щетинками, въ верхней части короткими, прижатыми волосками; листья 2—3-перисто-раздѣльные; листочки продолговато-яйцевидные, перисто-раздѣльные или глубоко-зубчатые съ туповатыми зубчиками; зонтики 6—12-лучевые, конечные или супротивные листьямъ; цвѣты бѣлые, часто съ неравными лепестками; общей обертки б. ч. нѣтъ; частныя обертки внизъ отогнуты, изъ 6—8 ланцетныхъ, по краямъ рѣсничатыхъ листочковъ;

плоды 4—6 мм. дл., съ коническимъ дискомъ и короткими, слегка расходящимся столбиками.

Въ Московской губерніи не найдено; имѣются лишь ошибочныя указанія у прежнихъ авторовъ; но, судя по наличности этого вида въ соседнихъ губерніяхъ (Смоленской и Тульской), есть основаніе встрѣтить это растеніе и въ Московской.



Chaerophyllum temulum.



Chaerophyllum bulbosum.

696. *C. bulbosum* L. Пет. Кр. I, стр. 199.

Chaerophyllum bulbosum L. var. *neglectum* Zinger. F. O., № 6, p. 86.—Кайф. II, № 219.—Гор., № 38.

Chaerophyllum neglectum Zinger. Цив., № 626.

Стебель 80—180 см., вѣтвистый, въ нижней части покрытъ разсѣпными, выпъ отогнутыми щетинками, въ верхней части почти голый, бороздчатый, трубчатый; нижніе листья въ очертаніи треугольные, 3-перистые, на длинныхъ черешкахъ, покрытыхъ длинными, бѣлыми, отстоящими щетинистыми волосками; листочки въ очертаніи яйцевидно-заостренные, глубоко-перисто-раздѣльные, съ острыми ланцетными долями; верхніе листья почти сидячіе, съ длинными влагалищами и съ узкими, почти линейными листочками; зонтики 15—20-лучевые; цвѣты бѣлые; общей обертки нѣтъ; частныя обертки б. ч. однобокія, 3-, рѣже 5-листные; листочки ихъ ланцетные, длинно-заостренные, съ широкимъ, бѣлымъ пленчатымъ краемъ безъ рѣсничекъ; плоды 4—6 мм. дл. съ широкимъ, почти плоскимъ дискомъ и съ расходящимися, почти книзу отогнутыми столбиками не свыше 0,5 мм. дл.

По лѣсамъ и кустарникамъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ половины іюня до конца іюля; плоды съ конца іюля. Близъ Коломны въ гербаріи Максимовича за № 253¹.—По дорогѣ изъ Иванькова въ Братцово (К.).—Трепарево, Мож. у. (Ф. О.).—Дарьино, Зви. у. (X.).—Рождествено на Нарѣ. Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).

697. *C. Prescottii* DC. Пет. Кр. I, стр. 199.

Chaerophyllum bulbosum L. Бух. II, № 190. — Бух. I, № 173. — Ф. О., № 6, р. 86. — Пет., стр. 165. — Кауф. II, № 336. — Цин., № 625. — Рупр., стр. 62 и 88. — Кауф. I, стр. 216. — Ann. C. V, № 27. — Дв., № 314. — Макс., № 303. — Gold. C., p. 19. — Mart., p. 54. — Hoff., № 819. — St. II, p. 18. — St. I, № 193.

Myrrhis bulbosa Spreng. Дв., № 314.

Стебель 80—180 см., бороздчатый, в нижней части густо покрыть вниз отогнутыми белыми щетинками, в верхней — голый или покрыть менее обильно; нижние листья в очертании треугольные, 3-перистые, на длинных черешках, голых или покрытых мягкими не щетинистыми волосками; листочки такие же, как у *C. bulbosum* L.; зонтик 12—20-лучевые; цветы белые; общей обертки нет; частная обертка правильная, 8—10-лиственная; листочки их широко-ланцетные, заостренные с широкой, белой каймой без ресничек; плоды 5—9 мм. дл., с коническим диском и с торчащими, слегка расходящимися столбиками, достигающими вместе с диском до 1,5 мм. дл.

По лугам, кустарникам и по берегам рек, часто. Цветет с половины июня до конца июля; плоды с конца июля. Тулуповская мельница близ Покровского. Сокольники близ Яузы, Петрово; между устьем Нары и Окой. Срп. у. (К.). — Между Вешняками и Коспным (Х.). — Угreshи (Куль.). — Пушкино. берег р. Учи; Дракино, Срп. у. (С.). — Болото Пальница близ Михайловского. Илл. у. (В.). — Остров на Окк против Бачманова. Игнатьево, Кзм. у.; Лаково, Руз. у.; Софринский шлях на Москв. р., Брн. у. (П.).



Chaerophyllum Prescottii.



Chaerophyllum aromaticum.

698. *C. aromaticum* L. Пет. Кр. I, стр. 201. — Бух. II, № 191. — Бух. I, № 174. —

Ф. О., № 6, р. 86. — Пет., стр. 165. — Кауф. II, № 337. — Цин., № 628. — Кауф. I, стр. 217. — Lind., p. 120. — Дв., № 316. — Макс., № 302. — Hoff. II, № 2424. — Gold. C., p. 19. — Mart., p. 55.

Стебель 50—100 см., тонко-бороздчатый, въ верхней части вѣтвистый и почти голый, въ нижней—густо покрытъ выпъ отогнутыми щетинистыми волосками; листья на длинныхъ черешкахъ, покрытыхъ щетинистыми волосками, тройко-тройчато-сложные; листочки крупные, продолговато-яйцевидные, заостренные, по краямъ зубчатые, сверху голые или съ рѣдкими, прижатыми волосками, снизу коротко-, но густо-волосистые; зонтики 12—18-лучевые; цвѣты бѣлые; общей обертки б. ч. нѣтъ; частныя обертки многостыныя; листочки ихъ ланцетные, б. ч. съ рѣсничатымъ краемъ; плоды 10—11 мм. дл., въ нижней части нѣсколько суженные; столбики растопыренные, длиннѣе копническаго диска.

По оврагамъ и холмистымъ мѣстамъ, покрытымъ лѣсомъ. Цвѣтеть съ половины юня; плоды въ половинѣ августа. Братцово, Петрово, Воробьевы горы (К.).—Архангельское, Зви. у. (Мар.).—Михайловское по берегу р. Пахры, Пид. у. (В.).—Дарьино, Зви. у. (Х.).—Григорово на Москвѣ р., Вер. у.; Нестерово на Москвѣ р., Руз. у. (П.).—Тростенское озеро, лѣсъ по р. Тростиѣ, Руз. у. (С.).—Красный Станъ, Руз. у. (Сюз.).—Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

283. *Conium L.*

Плоды яйцевидно-шаровидные, слегка сплюснутые съ боковъ; съмянка съ 5 пзвилыстыми хрящеватыми ребрышками; каналцевъ нѣтъ; бѣлокъ съ внутренней стороны съ глубокой продольной бороздкой; зубцы чашечки не замѣтные; столбецъ 2-раздѣльный; лепестки обратно-сердцевидные, слегка выемчатые.

699. *C. maculatum L.* Пет. Кр. I, стр. 201.—Мос., № 12.—F O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 170.—Кауф. II, № 338.—Цан., № 629.—Кауф. I, стр. 217.—Lind., p. 120.—Дв., № 290.—Макс., № 308.—Hoff. II, № 2306.—Gold.C., p. 19.—Mart., p. 50.—Hoff., № 972.—St. II, p. 18.—St. I, № 184.—Pal., № 539.

Стебель 80—200 см., тонко-бороздчатый, съ сильнымъ налетомъ (если послѣдній стерся, то лоснящийся) и съ красно-бурыми пятнами, полый, въ верхней части сильно вѣтвистый; все растение съ мышинымъ запахомъ; нижние листья на длинныхъ, полыхъ черешкахъ, тройко-перистые; листочки продолговато-яйцевидные, глубоко-перисто-надрѣзные; доли ихъ цѣльнокрайнія или зубчатая, зубчики тупые или заостренные въ бѣлый кончикъ; верхние листья менѣе сложные, почти сидячіе съ узкими влагалищами; зонтики не большіе, 12—20-лучевые; цвѣты бѣлые; общая обертка мно-



Conium maculatum.

голистная, вниз отогнутая. Листочки ее ланцетные, съ узкой каймой; частыя обвертки однокія изъ 3—6 ланцетныхъ, окаймленныхъ листочковъ, сросшихся своимъ основаніемъ; плоды въ 3—3,5 мм. дл.

Сорное, около жилья или на тучной почвѣ садовъ п огородовъ. Часто. Цвѣтетъ съ конца іюня до августа.

* *Coriándrum* L.

Плоды шаровидные, въ поперечномъ разрѣзѣ круглые; сѣмянка съ 5 извилистыми главными ребрышками, почти плоскими, п 4 вторичными прямыми, килеватыми; канальцевъ на наружной сторонѣ сѣмянки нѣтъ, а только 2 канальца на внутренней—плоской; бѣлокъ на внутренней сторонѣ вогнутый; чашечка изъ 5 зубчиковъ, часто неравныхъ; лепестки выемчатые или 2-лопастные, у краевыхъ цвѣтовъ неравные.

* *C. satívum* L. Пет. Кр. I, стр. 201.—Пет., стр. 170.—Кауф. II, стр. 220.—Цин., стр. 207.—Кауф. I, стр. 208.—Дв., № 311.—Макс., № 277.—Макс. Пут. II, стр. 78.—Mart., p. 54.—St. II, p. 18.—St. I, № 195.—Pal., № 561.



Coriandrum sativum.

Стебель 30—60 см., цилиндрическій голый, какъ п все растение, вверху вѣтвистый; нижніе листья перистые, на длинныхъ черешкахъ; листочки ихъ широкіе, продолговато-округлые, надрѣзочно-зубчатые; верхніе листья двояко-перистые, почти сидячіе; листочки ихъ перисто-раздѣльные, доли линейныя; зонтики 3—5-лучевые; цвѣты бѣлые или блѣдно-розовые; общей обвертки нѣтъ или она однолистная; частыя обвертки однокія, 3-листные; листочки ихъ линейные, короче лучей зонтичковъ; плоды округлые, до 3 мм. дл.

Прежде разводилось по огородамъ, иногда дичало. Цвѣтетъ въ іюлѣ п въ августѣ.

71 сем. *Cornáceae* DC.

Цвѣты обоеполые, правильные; чашечка изъ 4 зубчиковъ; лепестковъ 4, въ почкостоложеніи створчатыхъ; 4 тычинки чередуются съ лепестками; завязь нижняя, 2-гнѣздная, съ одною вспячею сѣмепочкой въ каждомъ гнѣздѣ; столбикъ простой, съ головчатымъ рыльцемъ; плодъ—костинка. нѣсколько сочная; косточка твердая, 1—2-гнѣздная; сѣмя съ бѣлкомъ; зародышъ срединный, прямой.

284. *Córnus L.*

1. Столбикъ подъ рыльцемъ булавовидно утолщенъ; листья на цвѣтущихъ вѣтвяхъ съ 4 парами боковыхъ жилокъ, снизу блѣднѣе.

C. sanguinea L.

Столбикъ не утолщенъ подъ рыльцемъ; листья на цвѣтущихъ вѣтвяхъ съ 5—6 парами боковыхъ жилокъ, снизу сине-зеленые. 2.

2. Зубцы чашечки узко-треугольные, ясно-замѣтные; лепестки продолговато-яйцевидные, нѣсколько короче удвоенной ширины ихъ; плодъ бѣлый, шарообразный. *C. alba Wangenh.*

Зубцы чашечки широко-треугольные, мало-замѣтные; лепестки ланцетные, нѣсколько длиннѣе удвоенной ширины ихъ; плодъ синеватый, продолговатый. *C. tatarica Mill.*

700. *C. sanguinea L.* Пет. Кр. I, стр. 202.—Бух. II, стр. 23.—Пет., стр. 171.—Кауф. II, № 339.—Цин., № 630.—Рупр., стр. 86.—Кауф. I, стр. 218.—St. II, p. 11.—Pal., № 263.

Cornus alba L. Макс., № 163.—Макс. Пут. II, стр. 92.

Кустарникъ въ 1—4 м.; старая кора сѣро-бурая, на молодыхъ вѣтвяхъ красно-бурая, зимой почти кроваво-красная; листья на цвѣтущихъ вѣтвяхъ коротко-черешковые, яйцевидно-округлые, яйцевидные или яйцевидно-продолговатые, у основанія округлые, рѣже суженные, къ верхушкѣ б. или м. коротко-заостренные, голые или съ рѣдкими волосками, снизу свѣтлѣе и покрыты болѣе густыми волосками; боковыхъ жилокъ б. ч. 4 пары; соцвѣтiе щитковидное; чашечка съ 4 короткими зубчиками, покрыта волосками; дискъ плоскiй, желтый; лепестки бѣлые, до 6 мм. дл.; столбикъ подъ рыльцемъ расширенъ булавовидно; зрѣлый плодъ лилово-черный; косточка вполнѣ шаровидная.



Cornus sanguinea.

Цвѣтетъ съ половины iюня. Противъ Рай-Семеновскаго, Срп. у. (Макс.).—Лѣсная опушка близъ Серпухова (Бор.).—Близъ Борисова, Срп. у. (М.).—По обрыву къ р. Пахрѣ близъ Подольска (К.).—Между Зиборовымъ и Никифоровымъ, Срп. у. (П. и С.).—Рождествено на Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Солмогубъ).

* *C. alba Wangenh., non L.* (1787).

Cornus alba L. Пет. Кр. I, стр. 203.—St. II, p. 11.—Pal., № 264.

Cornus stolonifera Michx. (1803).

Кустарникъ съ многочисленными корневыми отраслями и съ нижними вѣтвями лежащими, часто укореняющимися; кора кроваво-красная, особенно зимой; листья на цвѣтущихъ вѣтвяхъ эллиптическiе или широко-

ко-эллиптическіе, къ основанію суженные, къ верхушкѣ б. или м. длинно-заостренные, съ 5—6 парами боковыхъ жилокъ, въ молодости съ обѣихъ сторонъ покрыты пушкомъ, потомъ сверху почти голые, снизу синне-зеленые и съ короткими прижатыми волосками; соцвѣтіе щитковидное; лепестки продолговатые, яйцевидные, длина конхъ нѣсколько менѣе удвоенной ширины ихъ; дискъ вынуклый. желтоватый, потомъ карминно-красный; чашечные зубчики узко-треугольные; столбикъ безъ утолщенія подъ рыльцемъ; плодъ шаровидный, бѣлый; косточка сверху нѣсколько сжатая.

Разводится, иногда дичаетъ. Петровское-Разумовское (Г.). — Спасъ-Сѣтунь (Н.). — Ст. Сходя по р. Схидиѣ внизъ по теченію отъ жел.-дор. моста (Х.).

Кромѣ типичной формы разводятся слѣдующія:

а. *fol. aurea-marginata* Hort.

Листья съ желтой росписью.

б. *fol. argenteo-marginata* Hort.

Листья съ бѣлой росписью.

γ. *fol. tricoloribus* Hort.

Листья съ бѣлой и блѣдно-розовой росписью.



Cornus alba.



Cornus tatarica.

* *C. tatárica* Mill. Пер. Кр. I, стр. 203.

Cornus sibirica Lodd. Пер., стр. 171.—Дпн., № 631.—Дв., № 177.—Ад., р. 84.—
Pal., № 264.

Cornus alba L. отчасти.

Кустарникъ безъ корневыхъ отраслей; вѣтви б. ч. вверхъ торчащія, не лежащія и не укореняющіяся; кора б. ч. кроваво-красная; листья на цвѣтущихъ вѣтвяхъ широко-яйцевидные или широко-овальные съ 5—6 парами боковыхъ жилокъ, у основанія округлые, рѣже нѣсколько суженные, верхушка ихъ быстро или постепенно заостренная; въ молодости

листья, особенно съ нижней стороны, съ серебристыми волосками, потомъ сверху почти голые, темно-зеленые, снизу сине-зеленые съ прижатыми волосками; лепестки ланцетные, длина ихъ нѣсколько превышаетъ удвоенную ширину; зубчики чашечки широко-треугольные, мало замѣтные; дискъ желтый, потомъ карминно-красный, выпуклый; столбикъ не утолщенъ подъ рыльцемъ; плодъ продолговатый, голубоватый; косточка косо-продолговатая, съ боковъ и съ верхушки сильно сплюснутая.

Разводится по садамъ.

К О Н Е Ц Ъ В Т О Р О Й Ч А С Т И .

Алфавитный указатель семействъ и родовъ II части.

	<i>Смр.</i>		<i>Смр.</i>
Acer L.	347	Berberis L.	164
Aceraceae DC.	346	Berteroa DC.	198
Aconitum L.	140	Beta L.	82
Actaea L.	142	Betula L.	46
Aegopodium L.	400	Betulaceae Rich.	45
Aesculus L.	349	Brassica L.	194
Aethusa L.	405	Bunias L.	208
Agrimonia L.	238		
Agrostemma L.	108	Callitrichaceae Link.	341
Albersia Kunth.	95	Callitriche L.	342
Alehimilla L.	237	Caltha L.	136
Alnus Gaertn.	50	Camelina Crantz.	203
Alsine Wahlenb.	117	Cannabis L.	55
Alyssum L.	197	Capsella Medic.	206
Amarantaceae Juss.	94	Caragana Royen.	301
Amarantus L.	94	Cardamine L.	183
Amelanchier Medic.	276	Carum L.	401
Anemone L.	149	Caryophyllaceae Rehb.	96
Anethum L.	417	Celastraceae R. Br.	345
Angelica L.	413	Cenolophium Koch.	409
Anthriscus Hoffm.	422	Cerastium L.	125
Anthyllis L.	289	Ceratophyllaceae S. F. Gray	133
Apium L.	399	Ceratophyllum L.	134
Aquilegia L.	137	Chaerophyllum L.	424
Arabis L.	181	Chelidonium L.	166
Archangelica Hoffm.	413	Chenopodiaceae Vent.	80
Arenaria L.	118	Chenopodium L.	82
Aristolochia L.	59	Chorispora DC.	209
Aristolochiaceae Juss.	59	Chrysosplenium L.	218
Asarum L.	60	Cicuta L.	398
Astragalus L.	303	Circaea L.	387
Atriplex L.	89	Cistaceae Dunal.	365
		Clematis L.	143
Balsaminaceae Rich.	350	Cnidium Cuss.	408
Barbarea R. Br.	179	Cochlearia L.	202
Berberidaceae Vent.	164	Comarum L.	250

	<i>Cmp.</i>		<i>Cmp.</i>
Conioselinum Fisch.	410	Halorrhagidaceae R. Br.	389
Conium L.	427	Helianthemum Mill.	365
Coriandrum L.	428	Hepatica Gilib.	147
Corispermum L.	92	Heracleum L.	418
Cornaceae DC.	428	Herniaria L.	130
Cornus L.	429	Hesperis L.	185
Coronilla L.	306	Hippocastanaceae DC.	349
Corydalis Medic.	167	Hippophaës L.	378
Corylus L.	45	Hippuris L.	390
Cotoneaster Medic.	271	Humulus L.	55
Crassulaceae DC.	213	Hypericoideae Vent.	360
Crataegus L.	273	Hypericum L.	360
Cruciferae Juss.	169		
Cucubalus L.	99	Impatiens Rivin.	351
Cytisus L.	287	Isatis L.	208
Daphne L.	377	Juglandaceae DC.	44
Daucus L.	421	Juglans L.	44
Delphinium L.	138		
Dianthus L.	119	Laserpicium L.	420
Draba L.	200	Lathyrus L.	316
Drosera L.	211	Lavatera L.	359
Droseraceae DC.	211	Leguminosae Endl.	283
		Lens Tourn.	315
Elaeagnaceae R. Br.	377	Lepidium L.	215
Elaeagnus L.	378	Levisticum Koch.	410
Elatinaceae Camb.	362	Libanotis Crantz.	407
Elatine L.	362	Linaceae DC.	332
Epilobium L.	381	Linum L.	332
Erodium L'Hérit.	331	Lotus L.	301
Ervum L.	308	Lunaria L.	199
Eryngium L.	397	Lychnis L.	107
Erysimum L.	191	Lythraceae Juss.	379
Euphorbia L.	337	Lythrum L.	379
Euphorbiaceae Klotzsch et Gareke.	336		
Evonymus L.	345	Malachium Fr.	127
		Malva L.	356
Fagaceae Döll	52	Malvaceae R. Br.	356
Fagopyrum Gaertn.	80	Medicago L.	290
Filipendula L.	241	Melandryum Rochl.	104
Fragaria L.	248	Melilotus Juss.	292
Frangula Tourn.	353	Mercurialis L.	336
Fumaria L.	169	Moehringia L.	117
Fumariaceae DC.	167	Montia L.	96
		Moraceae Endl.	55
Genista L.	286	Myosurus L.	151
Geraniaceae DC.	322	Myriophyllum L.	389
Geranium L.	322		
Geum L.	268	Nasturtium R. Br.	173
Guttiferae Endl.	360	Neslea Desv.	207
Gypsophila L.	108	Nuphar Sm.	131
		Nymphaea L.	133

	<i>Cmp.</i>		<i>Cmp.</i>
Nymphaeaceae DC.	131	Salicaceae Rich.	7
Oenanthe L.	404	Salix L.	7
Onobrychis Tourn.	307	Salsola L.	94
Ononis L.	288	Sanguisorba L.	239
Onothra L.	386	Sanicula L.	396
Onothraceae Endl.	381	Santalaceae R. Br.	58
Orobis L.	320	Saponaria L.	114
Ostericum Hoffm.	412	Saxifraga L.	218
Oxalidaceae DC.	331	Saxifragaceae Vent.	217
Oxalis L.	332	Scleranthus L.	130
		Sedum L.	213
Papaver L.	165	Sempervivum L.	216
Papaveraceae DC.	165	Selinum L.	411
Parnassia L.	219	Seseli L.	406
Parthenocissus Planchon.	354	Silene L.	100
Pastinaca L.	417	Sinapis L.	196
Peplis L.	380	Sisymbrium L.	186
Petroselinum Hoffm.	399	Sium L.	404
Peucedanum L.	414	Sorbaria A. Br.	231
Phaseolus L.	321	Sorbus L.	278
Philadelphus L.	220	Spergula L.	128
Physocarpus Maxim.	227	Spergularia Pers	129
Pimpinella L.	401	Spinacia L.	88
Pirus L.	277	Spiraea L.	228
Pisum L.	316	Stellaria L.	120
Polygala L.	334		
Polygalaceae Juss.	334	Thalictrum L.	143
Polygonaceae Juss.	61	Thesium L.	58
Polygonum L.	71	Thlaspi L.	204
Populus L.	37	Thymelaeaceae Richb.	377
Portulacaceae Juss.	96	Tilia L.	354
Potentilla L.	251	Tiliaceae Juss.	354
Poterium L.	240	Torilis Adans.	421
Prunus L.	279	Trifolium L.	293
Pulsatilla Tourn.	148	Trollius L.	137
		Turritis L.	180
Quercus L.	52		
		Ulmaceae Mirbel.	53
Ranunculaceae Juss.	134	Ulmus L.	53
Ranunculus L.	151	Umbelliferae Juss.	391
Raphanus Tourn.	210	Urtica L.	56
Rhamnaceae R. Br.	352	Urticaceae Juss.	56
Rhamnus L.	352		
Ribes L.	221	Vaccaria Medic.	115
Rosa L.	231	Vicia L.	309
Rosaceae Juss.	224	Viola L.	366
Rubus L.	243	Violaceae DC.	366
Rumex L.	61	Viscaria Roehl.	104
		Vitaceae Juss	353
Sagina L.	115		

Алфавитный указатель латинских названий растений I и II части съ соответствующими русскими.

Abies. — Пихта.
 „ *balsamea.* — Пихта бальзамическая.
 „ *sibirica.* — „ сибирская.
Acer. — Кленъ.
 „ *Ginnala.* — Гиннала.
 „ *Negundo.* — Негундо.
 „ *platanoides.* — Кленъ чинаролистный.
 „ *tataricum.* — „ татарский.
Aconitum. — Борецъ.
 „ *Anthora.* — Волкобойникъ.
 „ *excelsum.* — Борецъ высокій.
 „ *lasiosomum.* — „ желтый.
Actaea spicata. — Воронецъ колосистый.
Aegopodium Podagraria. — Сныть обыкновенная.
Aesculus. — Желудникъ.
Aesculus Hippocastanum. — Камтанъ конскій.
 „ *lutea.* — Желудникъ желтый.
 „ *Pavia.* — „ Павія.
Aethusa Cynapium. — Кокорышъ, собачья петрушка.
Agrimonia. — Релейникъ.
 „ *Eupatoria.* — Релейникъ посконный.
 „ *pilosa.* — „ волосистый.
Agrostemma Githago. — Куколь.
Agrostis. — Полевика.
 „ *alba.* — Полевика бѣлая.
 „ *canina.* — „ собачья.
 „ *vulgaris.* — „ обыкновенная.
Albersia Bitum. — Щирца.
Alchimilla vulgaris. — Машетка обыкновенная.
Alisma. — Частуха.
 „ *arcuata.* — Частуха дугообразная.
 „ *Michaletii.* — „ подорожникъ.
Allium. — Лукъ.
 „ *angulosum.* — Лукъ ребристый.
 „ *Cepa.* — „ рѣпчатый.
 „ *oleraceum.* — Чеснокъ огородный.
 „ *Porrum.* — Лукъ Порей.
 „ *rotundum.* — „ круглый.
 „ *sativum.* — „ посѣвный.

Allium Schoenoprasum. — Лукъ Цибуль.
Alnus. — Ольха.
 „ *glutinosa.* — Ольха липкая.
 „ *incana.* — „ сѣрая.
Alopecurus. — Батрачникъ.
 „ *agrestis.* — Батрачникъ полевой.
 „ *fulvus.* — „ оранжевый.
 „ *geniculatus.* — „ козличатый.
 „ *pratensis.* — „ луговой.
 „ *ventricosus.* — „ вздутый.
Alsine tenuifolia. — Мокричникъ узколистный.
Alyssum. — Бурачекъ.
 „ *calycinum.* — Бурачекъ чашечный.
 „ *minimum.* — „ мелкій.
 „ *montanum.* — „ горный.
Amarantus retroflexus. — Подсвекольникъ.
Amelanchier. — Ирга.
 „ *ovalis.* — Ирга овальная.
 „ *vulgaris.* — „ обыкновенная.
Anemone. — Вѣтренница.
 „ *nemorosa.* — Вѣтренница тѣнистая.
 „ *ranunculoides.* — „ лютиковая.
 „ *silvestris.* — „ лѣсная.
Anethum graveolens. — Укропъ.
Angelica silvestris. — Дудникъ лѣсной.
Anthoxanthum odoratum. — Зубровка пахучій колосокъ.
Anthriscus. — Купырь.
 „ *Cerifolium.* — Кервель.
 „ *silvestris.* — Купырь лѣсной.
Anthyllis Vulneraria. — Извеникъ.
Apera spica venti. — Метлица полевая.
Apium graveolens. — Сельдерей.
Aquilegia vulgaris. — Водосборъ обыкновенный.
Arabis. — Рѣзуха.
Arabis Gerardii. — Рѣзуха Герарда.
 „ *hirsuta.* — „ волосистая.
 „ *pendula.* — „ повислая.

Archangelica officinalis. — Дятль лечебный.
Arenaria. — Песчанка.
 " *graminifolia.* — Песчанка злаколист-
 ная.
 " *serpyllifolia.* — " тимьянолист-
 ная.
Aristolochia. — Кирказонъ.
Aristolochia Clematitis. — Кирказонъ ломонос-
 ный.
 " *macrophylla.* — " крупнолист-
 ный.
Arrhenatherum elatius. — Райграссъ француз-
 ский.
Arundo Phragmites. — Тростникъ обыкновен-
 ный.
Asarum europaeum. — Копитень европейскій.
Asparagus officinalis. — Спаржа лечебная.
Aspidium. — Щитникъ.
 " *Braunii.* — Щитникъ Брауна.
 " *cristatum.* — Многокучникъ гребен-
 чатый.
 " *Dryopteris.* — Многоножка трой-
 чатая.
 " *filix mas.* — Многокучникъ большой.
 " *montanum.* — " горный.
 " *Phegopteris.* — Многоножка воло-
 систая.
 " *spinulosum.* — Многокучникъ шпо-
 ватый.
 " *Thelypteris.* — " цѣльнолист-
 ный.
Astragalus. — Астрagalъ.
Astragalus arenarius. — Астрagalъ песчаный.
 " *Cicer.* — " хлопунецъ.
 " *danicus.* — " датскій.
 " *glycyphyllus.* — " солодковолист-
 ный.
Athyrium filix femina. — Кочедыжникъ.
Atriplex. — Лебеда.
 " *hastatum.* — Лебеда копьелистная.
 " *hortense.* — " садовая.
 " *laciniatum.* — " разрывная.
 " *nitens.* — " лоснящаяся.
 " *patulum.* — " раскидистая.
Atropis distans. — Манникъ растопыренный.
Avena. — Овесъ.
 " *pratensis.* — Овесъ луговой.
 " *pubescens.* — " зячій.
 " *sativa.* — " посѣвный.
Barbarea. — Сурѣшница.
 " *stricta.* — Сурѣшница торчащая.
 " *vulgaris.* — " обыкновенная.
Beckmannia eruciformis. — Бекманія зубров-
 никъ.
Berberis vulgaris. — Барбарисъ обыкновенный.
Berteroa incana. — Икотникъ сѣдой.
Beta vulgaris. — Свекла обыкновенная.
Betula. — Береза.
 " *humilis.* — Береза приземистая.
 " *nana.* — " карликовая.
 " *pubescens.* — " пушистая.
 " *verrucosa.* — " бородавчатая.
Blysmus compressus. — Близна сиюснутая.
Botrychium. — Гроздовникъ.
 " *Lunaria.* — " ключъ-травя.
 " *Matricaria.* — " рутовый.

Botrychium virginianum. — Гроздовникъ вир-
 гинскій.
Brachypodium. — Коротконожка.
 " *pinnatum.* — Коротконожка пе-
 ристая.
 " *silvaticum.* — " лѣсная.
Brassica Napus. — Брюква.
 " *oleracea.* — Капуста.
 " *Rapa.* — Рѣпа.
Briza media. — Трясучка средняя.
Bromus. — Костеръ.
 " *arvensis.* — Костеръ полевой.
 " *erectus.* — " прямой.
 " *inermis.* — " безостный.
 " *mollis.* — " мягкій.
 " *patulus.* — " развѣсистый.
 " *ramosus.* — " вѣвистый.
 " *secalinus.* — " ржаной.
 " *tectorum.* — " кровельный.
Bunias orientalis. — Свербига восточная.
Butomus umbellatus. — Сусака зонтичный.
Calamagrostis. — Вѣйникъ.
 " *arundinacea.* — Вѣйникъ лѣсной.
 " *Epigeios.* — " наземный.
 " *lanceolata.* — " ланцетный.
 " *neglecta.* — " прямой.
 " *purpurea.* — " пурпуровый.
Calla palustris. — Бѣлокрыльникъ болотный.
Callitriche. — Болотникъ.
 " *autumnalis.* — Болотникъ осенний.
 " *vernalis.* — " весенній.
Caltha palustris. — Калужница болотная.
Camelina. — Камелина.
 " *dentata.* — Камелина зубчатая.
 " *microcarpa.* — " мелкоплодная.
 " *sativa.* — Рыжее.
Cannabis sativa. — Конопля.
Capsella bursa pastoris. — Сумочникъ па-
 стухий.
Caragana. — Акація.
 " *arborescens.* — Акація древовидная.
 " *frutex.* — " кустарная.
 " *pygmaea.* — " карликовая.
Cardamine. — Сердечникъ.
 " *amara.* — Сердечникъ горькій.
 " *impatiens.* — " недотрога.
 " *pratensis.* — " луговой.
Carex. — Осока.
 " *acutiformis.* — Осока заостренная.
 " *aristata.* — " остистая.
 " *caespitosa.* — " дернистая.
 " *canescens.* — " бѣловатая.
 " *caryophylla.* — " гвоздичная.
 " *chordorrhiza.* — " тонкокорневая.
 " *contigua.* — " сближенная.
 " *digitata.* — " пальчатая.
 " *dioica.* — " двудомная.
 " *distans.* — " разставленная.
 " *disticha.* — " двурядная.
 " *echinata.* — " иглистая.
 " *elongata.* — " вытянутая.
 " *erictorum.* — " лустырная.
 " *flava.* — " желтая.
 " *globularis.* — " шарообразная.
 " *Goodenoughii.* — " обыкновенная.
 " *gracilis.* — " рѣзущая.

Carex hirta. — Осока опушенная.
lasiocarpa. — " нитевидная.
Leersii. — " Леерсова.
leporina. — " заячья.
limosa. — " илстая.
loliaca. — " плевельная.
montana. — " горная.
obtusata. — " притупленная.
Oederi. — " Эдерава.
pallescens. — " блѣдная.
panicea. — " просынная.
paniculata. — " метельчатая.
paradoxa. — " странная.
pauciflora. — " малоцвѣтковая.
pediformis. — " стоповидная.
pilosa. — " волосистая.
praecox. — " ранняя.
Pseudocyperus. — " сытевидная.
remota. — " раздвинутая.
riparia. — " береговая.
rostrata. — " клювовидная.
silvatica. — " лѣсная.
stellulata. — " звѣздчатая.
stricta. — " торчащая.
tenella. — " нѣжная.
teretiuscula. — " круглостебельная.
vaginata. — " влагалищная.
vesicaria. — " пузырчатая.
vittilis. — " спутанная.
vulpina. — " лисья.

Carum Carvi. — Тминъ.
Catabrosa aquatica. — Катаброза водяная.
Cenolophium Fischeri. — Пусторебришникъ Фишеровъ.
Cephalanthera longifolia. — Пыльцеголовникъ длиннолиственный.
Cerastium. — Исколка.
argense. — Исколка полевая.
caespitosum. — " дернистая.
semidecandrum. — " пятичлѣнчатая.
glomeratum. — " скученная.
Ceratophyllum. — Роголистникъ.
demersum. — Роголистникъ подводный.
platyacanthum. — Роголистникъ рѣдкій.
Chaerophyllum. — Бутень.
aromaticum. — Бутень душистый.
bulbosum. — " клубненосный.
Prescotii. — " Прескоттовъ.
temulum. — " опьяняющій.
Chelidonium majus. — Чистотѣлъ большой.
Chenopodium. — Марь.
album. — Марь бѣлая.
bonus Henricus. — Марь цѣлительная.
foliosum. — Марь многолистная.
glaucum. — " сизая.
hybridum. — " свиная лебеда.
polyspermum. — Марь мелкая лебеда.
rubrum. — Марь красная.
urbicum. — " городская.

Chorispora tenella. — Раздѣльноостенникъ нѣжный.
Chrysosplenium alternifolium. — Селезеночникъ очереднолистный.
Cicuta virosa. Вехъ ядовитый.
Circaea alpina. — Колдуница альпійская.
lutetiana. — Колдунова трава.
Clematis recta. — Ломоносъ прямой.
Cnidium venosum. — Жгутъ-корень.
Cochlearia. — Ложечникъ.
Armoracia. — Хрѣвъ.
officinalis. — Ложечникъ лѣчебный.
Coeloglossum viride. — Пололепестникъ зеленый.
Comarum palustre. — Сабельникъ болотный.
Conioselinum tataricum. — Гирчовникъ татарскій.
Conium maculatum. — Болгоголовъ крапчатый.
Convallaria majalis. — Ландышъ майскій.
Coralliorrhiza innata. — Ладья коралловидный.
Coriandrum sativum. — Кипищъ.
Corispermum. — Клопошменникъ.
intermedium. — Клопошмянникъ средній.
Marschallii. — Клопошмянникъ Маршалловъ.
Cornus. — Деренъ.
alba. — Деренъ бѣлый.
sanguinea. — " кровавокрасный.
tatarica. — " татарскій.
Coronilla varia. — Вязель пестрый.
Corydalis. — Хохлатка.
cava. — Хохлатка полая.
Marschalliana. — " Маршалова.
solida. — " плотная.
Corylus Avellana. — Орѣшникъ обыкновенный.
Cotoneaster. — Кизильникъ.
acutifolia. — Кизильникъ остролиственный.
integerrima. — " цѣлнокрайный.
melanocarpa. — " черноплодный.
tomentosa. — " войлочный.
Crataegus. — Боярышникъ.
coccinea. — Боярышникъ яркокрасный.
crus-galli. — " пѣтушья шпора.
nigra. — " черный.
Oxyacantha. — " колючій.
sanguinea. — " кровавокрасный.
Cucubalus baccifer. — Волдырьникъ ягодный.
Cynosurus cristatus. — Гребникъ обыкновенный.
Cyperus fuscus. — Сытъ бурый.
Cypripedium Calceolus. — Башмачокъ.
guttatum. — " куропатка.
Cystopteris fragilis. — Пузырьникъ ломкій.
Cytisus. — Ракитникъ.
nigricans. — Ракитникъ чернѣющій.
ratisbonensis. — " двудвѣтковый.
Dactylis glomerata. — Ежа обыкновенная.
Daphne Mezereum. — Волчье лыко.
Daucus Carota. — Морковь.
Delphinium. — Живокость.
Consolida. — Живокость полевая.

Delphinium elatum. — Живокость высокая.
Deschampsia. — Луговик.
 " *caespitosa.* — Луговик щучка.
 " *flexuosa.* — " извилистый.
Dianthus. — Гвоздика.
 " *arenarius.* — Гвоздика песчаная.
 " *barbatus.* — " бородастая.
 " *Borbasis.* — " Борбаша.
 " *collinus.* — " холмовая.
 " *deltoides.* — " травяная.
 " *superbus.* — " пышная.
Draba. — Крупка.
Draba nemorosa. — Крупка лѣсная.
 " *repens.* — " ползучая.
 " *verna.* — " весенняя.
Drosera. — Росянка.
 " *anglica.* — Росянка англійская.
 " *obovata.* — " яйцевидная.
 " *rotundifolia.* — " круглолистная.
Elacagnus argentea. — Лохъ серебряный.
Elatine. — Повойничекъ.
 " *Alsinastrum.* — Повойничекъ мокрич-
 ный.
 " *callitrichoides.* — " болотниковый.
 " *Hydropiper.* — " водяной пер-
 рецъ.
 " *triandra.* — " трехтычково-
 вый.
Elodea canadensis. — Водяная зараза.
Epilobium. — Кипрей.
 " *angustifolium.* — Иванъ-чай.
 " *hirsutum.* — Кипрей мохнатый.
 " *montanum.* — " горный.
 " *palustre.* — " болотный.
 " *parviflorum.* — " мелкоцвет-
 ный.
 " *roseum.* — " розовый.
Eripactis. — Дремликъ.
 " *latifolia.* — Дремликъ широколистный.
 " *palustris.* — " болотный.
Eriopogon aphyllus. — Надбородникъ.
Equisetum. — Хвощъ.
 " *arvense.* — Хвощъ полевой.
 " *helecharis.* — " изоватый.
 " *hiemale.* — " зимующий.
 " *palustre.* — " болотный.
 " *pratense.* — " луговой.
 " *silvaticum.* — " лѣсной.
 " *variegatum.* — " пестрый.
Eriophorum. — Пушица.
 " *angustifolium.* — Пушица узколист-
 ная.
 " *gracile.* — " тонкая.
 " *latifolium.* — " широколист-
 ная.
 " *vaginatum.* — " влагалищная.
Erodium cicutarium. — Апстинъ веховый.
Ervum. — Пашенница.
 " *hirsutum.* — Пашенница волосистая.
 " *tetraspermum.* — " четырехсѣмен-
 ная.
Eryngium planum. — Синеголовникъ плоско-
 листный.
Erysimum. — Желтушникъ.
 " *cheiranthoides.* — Желтушникъ лев-
 койный.

Erysimum hieraciifolium. — Желтушникъ ястре-
 бинколистный.
 " *odoratum.* — Желтушникъ душистый.
Euphorbia. — Молочай.
 " *cyparissias.* — Молочай кипарисовый.
 " *Esula.* — " обыкновенный.
 " *helioscopia.* — " солнцеглядь.
 " *palustris.* — " болотный.
 " *Peplus.* — " отбѣняющий.
 " *villosa.* — " опушенный.
Evolvulus. — Бересклетъ.
 " *europaeus.* — Бересклетъ европей-
 ский.
 " *verrucosus.* — " бородавча-
 тый.
Fagopyrum esculentum. — Гречиха съѣдобная.
Festuca. — Овсяница.
 " *gigantea.* — Овсяница высокая.
 " *ovina.* — " овечья.
 " *pratensis.* — " луговая.
 " *rubra.* — " красная.
 " *silvatica.* — " лѣсная.
Filipendula hexapetala. — Земляника орѣхи.
 " *Uimaria.* — Таволга вязовая.
Fragaria moschata. — Земляника высокая.
 " *vesca.* — " обыкновенная.
 " *viridis.* — Клубника дикая.
Frangula Alnus. — Крушина ломкая.
Fritillaria ruthenica. — Рябчикъ русскій.
Fumaria officinalis. — Дымница лѣчебная.
Gagea. — Гусятникъ.
 " *erubescens.* — Гусятникъ красноватый.
 " *lutea.* — " желтый.
 " *minima.* — " мелкій.
Genista tinctoria. — Дрокъ красильный.
Geranium. — Геракъ.
 " *bohemicum.* — Геракъ богемская.
 " *molle.* — " мягкая.
 " *palustre.* — " болотная.
 " *pratense.* — " луговая.
 " *pusillum.* — " низкая.
 " *pyrenaicum.* — " пиринейская.
 " *Robertianum.* — " Робертова.
 " *rotundifolium.* — " круглолистная.
 " *sanguineum.* — " кровянокрас-
 ная.
 " *sibiricum.* — " сибирская.
 " *silvaticum.* — " лѣсная.
Geum. — Гравиятъ.
 " *aleppicum.* — Гравиятъ торчащій.
 " *intermedium.* — " средний.
 " *rivale.* — " ручейный.
 " *urbanum.* — " городской.
Gladiolus imbricatus. — Шпажникъ черепа-
 чатый.
Glyceria. — Манникъ.
 " *aquatica.* — Манникъ водяной.
 " *fluitans.* — " обыкновенный.
Goodyera repens. — Гудьера ползучая.
Gymnadenia. — Кокушникъ.
 " *conopsea.* — Кокушникъ комаровый.
 " *scutellata.* — " клобучковый.
Gypsophila. — Качмаъ.
 " *muralis.* — Качмаъ стѣнный.
 " *paniculata.* — " метельчатый.

Heleocharis.—Водолубь.
 " *acicularis.*—Водолубь иглочатый.
 " *ovata.* — " овальный.
 " *palustris.* — " болотный.

Helianthemum vulgare.—Солидцвѣтъ обыкновенный.
Hepatica triloba.—Перелѣска трехлопастная.
Hieracium sibiricum.—Борщеникъ сибирскій.
Herminium Monorchis.—Бровникъ одноклубневый.

Herniaria glabra.—Грыжникъ голый.
Hesperis matronalis.—Вечеринка.
Hierochloa odorata.—Лядникъ пахучій.
Hippophaes rhamnoides.—Облѣиха крупная.

Hippuris vulgaris.—Волявая сосенка.
Holcus lanatus.—Бухарникъ шерстистый.
Hordeum.—Ячмень.
 " *distichum.*—Ячмень двурядный.
 " *hexastichon.*— " шестирядный.
 " *vulgare.* — " обыкновенный.

Humulus Lupulus.—Хмель.
Hydrocharis morsus galeae.—Водокрасъ лягушечный.

Hypericum.—Звѣробой.
 " *hirsutum.*—Звѣробой волосистый.
 " *perforatum.*—Звѣробой исколотый.
 " *quadrangulum.*— " четырехгранный.

Impatiens.—Недотрога.
 " *noli-tangere.*—Недотрога-прыгунъ.
 " *parviflora.* — " мелкоцвѣтная.

Iris.—Касатикъ.
 " *Pseudacorus.*—Касатикъ желтый.
 " *sibirica.* — " сибирскій.
Isatis tinctoria.—Синиль красильный.

Juglans cinerea.—Орѣшница сѣрая.
Juncus.—Ситникъ.

" *acutiflorus.*—Ситникъ остроцвѣтный.
 " *alpinus.* — " азыйскій.
 " *bufonius.* — " жабиный.
 " *compressus.*— " сплюснутый.
 " *conglomeratus.*— " скученный.
 " *effusus.* — " развѣсистый.
 " *filiformis.* — " нитевидный.
 " *glaucus.* — " сизый.
 " *lampocarpus.* — " членистый.
 " *squarrosus.* — " оттопыренный.

Juniperus.—Можевеловикъ.
 " *communis.*—Можевеловикъ обыкновенный.
 " *Sabina.*— " казацкій.

Koeleria.—Келерія.
 " *cristata.*—Келерія гребенчатая.
 " *glauca.* — " сизая.

Larix.—Лиственница.
 " *europaea.*—Лиственница европейская.
 " *sibirica.* — " сибирская.

Laserpicium pruthenicum.—Гладышъ прусскій.
Lathyrus.—Чина.

" *palustris.*—Чина болотная.
 " *pisiformis.*— " гороховидная.
 " *pratensis.*— " луговая.

Lathyrus silvestris.—Чина лѣсная.

" *tuberosus.*— " клубнеспосая.

Lavatera thuringiaca.—Халѣма тюрингенская.

Lemna.—Ряска.

" *minor.*—Ряска мелкая.

" *trisulca.*— " трехлопастная.

Lenz esculenta.—Чечевича съѣдобная.

Lepidium ruderalis.—Клоповникъ.

" *sativum.*—Крессъ-салатъ.

Levisticum officinale.—Зоря лѣчебная.

Libanotis montana.—Порѣзникъ горный.

Lilium Martagon.—Царскія кудри.

Linum.—Ленъ.

" *catharticum.*—Ленъ слабительный.

" *flavum.*— " желтый.

" *usitatissimum.*— " обыкновенный.

Liparis Loeselii.—Лосникъ Лозелевскій.

Listera.—Тайникъ.

" *cordata.*—Тайникъ сердцевидный.

" *ovata.*— " овальный.

Lolium.—Плевель.

" *perenne.*— Райграссъ англійскій.

" *remotum.*—Плевель разставленный.

" *temulentum.*— " опьяняющій.

Lotus corniculatus.—Ляденецъ рога́тый.

Lunaria rediviva.—Лунникъ многолѣтний.

Luzula.—Ожика.

" *campestris.*—Ожика полевая.

" *nemorosa.*— " лѣсная.

" *pilosa.*— " волосистая.

Lychnis flos cuculi.—Горичавѣтъ кукушкинъ цвѣтъ.

Lycopodium.—Плау́нъ.

" *annotinum.*—Плау́нъ болотная можжу́ха.

" *clavatum.*— " бузавовидный.

" *complanatum.*— " сплюснутый.

" *Selago.*—Плау́нъ Баранецъ.

Lythrum Salicaria.—Дербени́къ плаку́нъ.

Majanthemum bifolium.—Майникъ двули́стный.

Malachium aquaticum.—Мягковолосникъ водяной.

Malaxis paludosa.—Стагачка болотистая.

Malva.—Просви́рякъ.

" *Alcea.*—Просви́рякъ алтѣйскій.

" *borealis.*— " сѣверный.

" *mauritanica.*— " мавританскій.

" *neglecta.*— " невѣданный.

Medicago.—Меду́нка.

" *falcata.*—Меду́нка серповидная.

" *lupulina.*— " хмелевая.

" *sativa.*— " посѣвная.

Melandryum.—Щелку́нецъ.

" *noctiflorum.*—Щелку́нецъ ночной цвѣтны́й.

" *pratense.*— " луговой.

" *silvestre.*— " лѣсной.

" *viscosum.*— " клейкій.

Melica.—Пердовникъ.

" *altissima.*—Пердовникъ рослый.

" *nutans.*— " повислый.

Melilotus.—Донникъ.

" *alba.*— " бѣлый.

Melilotus officinalis.—Донник лечебный.
Mercurialis perennis.—Пролётка многолетняя.
Microstylis monophyllos.—Стагачка однолистная.

Mileium offusum.—Боръ развѣсистый.
Moehringia.—Мерингия.
 " *lateriflora*.—Мерингия бокоцветная.
 " *trinervia*.— " трехнервная.
Molinia coerulea.—Молния свияя.
Montia rivularis.—Монция ручейная.
Myosurus minimus.—Мышехвостикъ маленький.
Myriophyllum.—Уруть.
Myriophyllum spicatum.—Уруть колосистый.
 " *verticillatum*.— " мутовчатый.

Najas minor.—Рѣзакъ маленький.
Nardus stricta.—Бѣлоусъ торчащій.
Nasturtium.—Жеруха.
 " *amphibium*.—Жеруха земноводная.
 " *anceps*.— " сомнительная.
 " *armoracioides*.— " хрѣновидная.
 " *austriacum*.— " австрийская.
 " *palustre*.— " болотная.
 " *silvestre*.— " лѣсная.
Neottia nidu savis.—Гвѣздовка безлистная.
Neslea paniculata.—Неслея метельчатая.
Nuphar.—Кубышка.
 " *luteum*.—Кубышка желтая.
 " *pumilum*.— " карликовая.
Nymphaea candida.—Кувшинка бѣлая.

Oenanthe aquatica.—Омежникъ, конскій укропъ.
Onobrychis viciaefolia.—Эспартегъ поствѣнный.
Onoclea struthopteris.—Разнолистникъ черный.
Ononis hircina.—Стальникъ вонючій.
Oenothera biennis.—Ослинникъ двудѣтнѣй.
Ophioglossum vulgatum.—Ужовникъ обыкновенный.

Orchis.—Ятрышникъ.
 " *coriophora*.—Ятрышникъ вонючій.
 " *incarnata*.— " темно-красный.
 " *maculata*.— " кукушкины слезки.
 " *militaris*.— " шлемовидный.
 " *Russowii*.— " Руссовъ.
 " *tridentata*.— " трехзубчатый.

Orobis.—Сочевичникъ.
 " *niger*.—Сочевичникъ черный.
 " *vernus*.— " весенний.
Oryza clandestina.—Дикій рисъ.
Ostericum palustre.—Маточникъ болотный.
Oxalis Acetosella.—Кислица заячья.

Panicum.—Просо.
 " *millaceum*.—Просо настоящее.
 " *lineare*.— " линейное.
 " *Crus-galli*.— " колосистое.
Paraver.—Макъ.
 " *Rhoeas*.—Макъ самосѣйка.
 " *somniferum*.— " снотворный.
Paris quadrifolia.—Вороній глазъ.
Parnassia palustris.—Бѣлосоръ болотный.
Parthenocissus quadrifolia.—Виноградъ дикій.
Pastinaca sativa.—Пастернакъ поствѣнный.
Peplis Portula.—Бутерлакъ обыкновенный.
Petroselinum sativum.—Петрушка.
Peucedanum.—Горчичникъ.

Peucedanum Cervaria.—Горчичникъ олений.
 " *Oreoselinum*.—Горчичникъ горная петрушка.
 " *palustre*.— " болотный.

Phalaris.—Канарейникъ.
Phalaris arundinacea.—Канарейникъ тростниковый.
 " *canariensis*.— " канарейное сѣмя.

Phaseolus.—Фасоль.
 " *multiflorus*.—Фасоль многоцветковая.
 " *vulgaris*.— " обыкновенная.

Philadelphus.—Чубучникъ.
 " *coronarius*.—Жасминъ дикій.
 " *inodorus*.—Чубучникъ непахучій.
 " *latifolius*.— " широколистный.

Phleum.—Аржанецъ.
 " *Boehmeri*.—Аржанецъ Бемеровъ.
 " *pratense*.— " Тамовеева трава.
Physocarpus opulifolia.—Пузырчатникъ кадинолистный.

Picea excelsa.—Ель обыкновенная.
Pimpinella Saxifraga.—Бедренецъ камеломка.
Pinus.—Сосна.

" *Cembra*.—Кедръ сибирскій.
 " *silvestris*.—Сосна обыкновенная.
 " *Strobus*.— " Веймутова.
Pirus communis.—Груша.

" *Malus*.—Яблоня.
Pisum sativum.—Горохъ.
Platanthera.—Любка.
 " *chlorantha*.—Любка зеленоцвѣтная.
 " *solstitialis*.— " ночная фиалка.

Roa.—Мятликъ.
 " *annua*.—Мятликъ одноцвѣтный.
 " *bulbosa*.— " луковичный.
 " *compressa*.— " сплюснутый.
 " *Chaixii*.— " судетскій.
 " *memoralis*.— " лѣсной.
 " *palustris*.— " болотный.
 " *pratensis*.— " луговой.
 " *trivialis*.— " обыкновенный.

Polygala.—Истодъ.
 " *amarella*.—Истодъ горьковатый.
 " *comosa*.— " хохлатый.
 " *vulgaris*.— " обыкновенный.

Polygonatum.—Купена.
 " *multiflorum*.—Купена многоцвѣтковая.
 " *officinalis*.— " лечебная.

Polygonum.—Гречиха.
 " *amphibium*.—Гречиха земноводная.
 " *aviculare*.— " спорышъ.
 " *Bistorta*.— " Полово гумно.
 " *Convolvulus*.— " повилочная.
 " *dumetorum*.— " прикустарная.

Polygonum Hydropiper.—Гречиха собачій перецъ.
 " *minus*.— " мелкая.
 " *mite*.— " прѣсная.
 " *nodosum*.— " узловатая.
 " *Persicaria*.— " Почечуйная трава.
 " *tomentosum*.— " войлочная.
Populus.—Тополь.

Populus, alba. — Тополь серебристый.
angulatus. — " ребристый.
balsamifera. — " бальзамический.
berolinensis. — " берлинский.
canadensis. — " канадский.
candicans. — " бѣлосоватый.
laurifolia. — " лавролиственный.
moskoviensis. — " московский.
nigra. — " Осокорь.
tremula. — Осина.

Potamogeton. — Рдестъ.
alpinus. — Рдестъ альпійскій.
compressus. — " сплюснутый.
crispus. — " курчавый.
gramineus. — " злачный.
lucens. — " блестящій.
mucronatus. — " остроконечный.
natans. — " плавающий.
obtusifolius. — " туполистный.
pectinatus. — " гребенчатый.
perfoliatus. — " сквознолистный.
praelongus. — " длинный.
pusillus. — " маленький.

Potentilla. — Лапчатка.
alba. — " бѣлая.
anserina. — " гусиная лапка.
arenaria. — " песчаная.
argentea. — " серебристая.
argenteaeformis. — Лапчатка стелющаяся.
canescens. — " сѣдая.
fruticosa. — " Курдюшій чай.
intermedia. — " средняя.
Nestleriana. — " Нестлерова.
norvegica. — " норвежская.
okensis. — " окская.
recta. — " прямая.
reptans. — " ползучая.
rubens. — " красноватая.
silvestris. — " лѣсовая.
supina. — " лежащая.
thuringiaca. — " тюрингенская.
thyrsiflora. — " развѣсистая.
Poterium Sanguisorba. — Черноголовка кровохлебовая.

Prunus Cerasus. — Вишня.
domesticus. — Слива обыкновенная.
fruticosa. — Дикая вишня.
nana. — Бобовникъ.
Padus. — Черемуха.
spinosa. — Тернъ.
virginiana. — Черемуха виргинская.
Pteridium aquilinum. — Орлякъ обыкновенный.
Pulsatilla patens. — Прострѣлъ, сонъ-трава.

Quercus robur. — Дубъ обыкновенный.

Ranunculus. — Лютикъ.
acer. — Лютикъ ѣдкій.
auricomus. — " золотистый.
bulbosus. — " луковичный.
cassubicus. — " кассубскій.

Ranunculus circinatus. — Лютикъ жесткодо-
 лный.
confervoides. — " янтарчатый.
Ficaria. — " чистякъ.
Flammula. — " прищипецъ.
illyricus. — " иллирійскій.
Lingua. — " язычковый.
nemorosus. — " лѣсной.
polyanthemos. — " многоцвѣ-
 тковый.

polyphyllus. — " многолист-
 ный.
pseudoflaccidus. — Лютикъ мягко-
 листный.
repens. — " Лютикъ ползучій.
sceleratus. — " ядовитый.

Raphanus Raphanistrum. — Рѣдка дикая.
sativus. — " огородная.

Rhamnus cathartica. — Крушина слабительная.

Rhynchospora alba. — Очеретникъ бѣлый.

Ribes. — Смородина.
alpinum. — Смородина альпійская.
aureum. — " золотистая.
Grossularia. — Крыжовникъ.
nigrum. — Смородина черная.
rubrum. — " красная.

Rosa. — Шиповникъ.
canina. — Шиповникъ дикій.
cinnamomea. — " обыкновенный.
gallica. — " французскій.
lutea. — " желтый.
pendulina. — " альпійскій.
pimpinellifolia. — " бреденный.
rubrifolia. — " краснелистный.

Rosa rugosa. — Шиповникъ морщинистый.

Rubus arcticus. — Княженика.
caesius. — Ежевика.
chamaemorus. — Морошка.
idaeus. — Малина.
odoratus. — Малина душистая.
saxatilis. — Костяника.
suberectus. — Куманика.

Rumex. — Щавель.
Acetosa. — Щавель кислый.
Acetosella. — " кислотоватый.
aquaticus. — " водяной.
confertus. — " копскій.
crispus. — " курчавый.
domesticus. — " домашний.
Hydrolapathum. — " Лошадиный.
limosus. — " илистый.
maritimus. — " морской.
maximus. — " огромный.
ucranicus. — " украинскій.

Sagina. — Мшанка
nodosa. — Мшанка узловатая.
procumbens. — " лежачая.
Sagittaria sagittifolia. — Стрѣлолистъ обыкно-
 венный.

Salix. — Ива.
acutifolia. — Вербя.
alba. — Ветла.
aurita. — Ива ушастая.
caprea. — Ива бредина.
cinerea. — " пенельная.
dasyclados. — " опушенная.

Salix fragilis. — Ива ломкая.
" Gmelinii. — " Лоза.
" lapponum. — " лопландская.
" livida. — " блѣдная.
" myrtilloides. — " черичная.
" nigricans. — " черноталъ.
" pentandra. — " черноталъ.
" phylicifolia. — " двудѣтная.
" purpurea. — " желтолозникъ.
" repens. — " ползучая.
" triandra. — " бѣлоталъ.
Salsola Kali. — Солянка калийная.
Sanguisorba officinalis. — Кровохлебка лѣчеб-
 ная.
Sanicula europaea. — Подѣсвинокъ европейскій.
Saponaria officinalis. — Мыльница лѣчебная.
Saxifraga Hirculus. — Камнеломка Царскія очи.
Scheuchzeria palustris. — Шейхерія болотная.
Scilla cernua. — Подсѣжникъ. Пролѣска.
Scirpus. — Камышъ.
" lacustris. — Камышъ озерный.
" maritimus. — " морской.
" pauciflorus. — " малоцвѣтковый.
" radicans. — " укореняющійся.
" silvaticus. — " лѣсной.
Scleranthus annuus. — Дивала однолѣтняя.
Scolochloa festuacea. — Трезубка овсянчатая.
Secale cereale. — Рожь обыкновенная.
Sedum. — Очитокъ.
" acre. — Очитокъ ѣдкій.
" sexangulare. — " шестигранный.
" Telephium. — " заячья капуста.
Selinum Carvifolia. — Гирча тмиолистная.
Sempervivum soboliferum. — Молодикъ.
Seseli coloratum. — Жабница покрашенная.
Setaria. — Щетинникъ.
" glauca. — Щетинникъ спизый.
" viridis. — " зеленый.
Silene. — Смолевка.
" dichotoma. — Смолевка двураздѣльная.
" nutans. — " поникшая.
" Otites. — " ушковая.
" procumbens. — " лежащая.
" tatarica. — " татарская.
" venosa. — " хлопущая.
Sinapis. — Горчица.
" alba. — Горчица бѣлая.
" arvensis. — " полевая.
Sisymbrium. — Гулявникъ.
" Alliaria. — Гулявникъ чесноч-
 ный.
" junceum. — " тростников-
 ый.
" Loeselii. — " Лозелевъ.
" officinalis. — " лѣчебный.
" sinapistrum. — " горчичный.
" Sophia. — " стручатый.
" strictissimum. — " торчащій.
" Thalianum. — " Таливъ.
" wolgensc. — " волжскій.
Sium latifolium. — Поручейникъ широколистный.
Sorbaria sorbifolia. — Рябинникъ.
Sorbus Aucuparia. — Рябина.
Sparganium. — Ежеголовка.
" affine. — Ежеголовка сходная.
" minimum. — " маленькая.
" neglectum. — " вѣтвистая.

Sparganium simplex. — Ежеголовка простая.
Spergula arvensis. — Торича полевая.
Spergularia rubra. — Торичникъ красный.
Spinacia oleracea. — Шпинатъ огородный.
Spiraea. — Таволга.
" crenifolia. — Таволга городковая.
" hypericifolia. — " звѣробоелист-
 ная.
" laevitaga. — " гладкая.
" media. — " средняя.
" salicifolia. — " иволистная.
" ulmifolia. — " вязолистная.
Spirodela polyrrhiza. — Ряска многокорешковая.
Stellaria. — Звѣздчатка.
" crassifolia. — Звѣздчатка толстолест-
 ная.
" graminea. — " злачная.
" Holostea. — " жестколи-
 стная.
" media. — " мокрица.
" mosquensis. — " московская.
" nemorum. — " лѣсная.
" palustris. — " болотная.
" uliginosa. — " болотистая.
Stippa pennata. — Ковылъ перыстый.
Stratiotes Aloides. — Тѣлорѣзъ сабуровидный.
Thalictrum. — Василеяникъ.
" angustifolium. — Василеяникъ узко-
 листный.
" aquilegifolium. — " водосборо-
 листный.
" flavum. — " желтый.
" minus. — " малый.
" simplex. — " простой.
Thesium ebracteatum. — Лѣвянка безпривѣт-
 никова.
Thlaspi arvense. — Ярутка полевая.
Thuja occidentalis. — Негинючка западная.
Tilia. — Липа.
" cordata. — Липа сердцевидная.
" platyphyllos. — " широколистная.
" vulgaris. — " обыкновенная.
Torilis Anthriscus. — Пузырникъ.
Trifolium. — Клеверъ.
" agrarium. — Клеверъ пашенный.
" alpestre. — " альпійскій.
" arvense. — " полевой.
" campestre. — " лежачій.
" hybridum. — " пенастоый.
" medium. — " средній.
" montanum. — " горный.
" pratense. — " луговой.
" repens. — " ползучій.
" spadicum. — " каштановый.
Triglochin. — Триостренникъ.
" maritima. — Триостренникъ морской.
" palustris. — " болотный.
Trisetum flavescens. — Овесъ желтоватый.
Triticum. — Пшеница.
" caninum. — Пшеница дикая.
" cristatum. — " гребенчатая.
" intermedium. — " средняя.
" repens. — " Пырей.
" vulgaris. — " обыкновенная.
Trollius europaeus. — Купальница европейская.

Tulipa Biebersteiniana. — Тюльпанъ Биберштейна.
Turritis glabra. — Вяжечка голая.
 Турба. — Рогозъ.
 „ *angustifolia*. — Рогозъ узколистный.
 „ *latifolia*. — „ широколистный.

Ulmus. — Вязъ.
 „ *pedunculata*. — Вязъ черешчатый.
 „ *scabra*. — „ шершавый.
Urtica — Крапива.
 „ *cannabina*. — Крапива коноплевидная.
 „ *dioica*. — „ двудомная.
 „ *urens*. — „ жгучая.

Vaccaria pyramidata. — Тысячеголовъ пирамидальный.

Veratrum. — Чемерица.
 „ *album*. — Чемерица бѣлая.
 „ *nigrum*. — „ черная.

Vicia. — Горошекъ.
 „ *angustifolia*. — Горошекъ узколистный.
 „ *cassubica*. — „ кассубскій.
 „ *Cracca*. — „ мышиный.

Vicia Faba. — Бобы русскіе.
 „ *pisiformis*. — Горошекъ гороховидный.
 „ *sativa*. — Вика.
 „ *sepium*. — Горошекъ заборный.
 „ *silvatica*. — „ лѣсовй.
 „ *tenuifolia*. — „ тонколистный.

Viola. — Фиалка.
 „ *arenaria*. — Фиалка песчаная.
 „ *canina*. — „ дикая.
 „ *collina*. — „ холмовая.
 „ *elator*. — Фиалка высокая.
 „ *epipsila*. — „ разнолистная.
 „ *hirta*. — „ опушенная.
 „ *mirabilis*. — „ разноцвѣтная.
 „ *odorata*. — „ душистая.
 „ *palustris*. — „ болотная.
 „ *pumila*. — „ низкая.
 „ *Riviniana*. — „ Ривиніева.
 „ *tricolor*. — „ Анютины глазки.
 „ *uliginosa*. — „ болотистая.

Viscaria vulgaris. — Дрема обыкновенная.

Zannichellia palustris. — Заннixelia болотная.
Zea Mays. — Кукуруза.

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
ФЛОРА
МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

СОСТАВИЛЪ
Д. П. Сырейщиковъ.

Подъ редакціей А. Н. Петунникова.

ЧАСТЬ III.

МОСКВА:

—
1910.

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ФЛОРА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ.

СОСТАВИЛЪ
Д. П. Сырейшиковъ.

Подъ редакцией А. Н. Петунникова.

ЧАСТЬ III.



МОСКВА.

—
1910.

Получая въ большомъ количествѣ запросы о скорѣйшемъ выпускѣ третьей и послѣдней части „Иллюстрированной флоры Московской губерніи“, я былъ вынужденъ выпустить эту часть, не исполнивъ обѣщанія приложить въ концѣ книги повикки, относящіяся къ первой, а равно и къ второй части.

Надѣюсь, что мнѣ простятъ этотъ пробѣлъ, потому что обработка и частью переработка накопившагося вновь матеріала задержала бы выпускъ этой послѣдней части, по крайней мѣрѣ, на годъ, а можетъ быть и болѣе, — и я рѣшилъ издать поздне въ видѣ прибавленія какъ этотъ новый матеріалъ, такъ и всѣ поправки, относящіяся ко всѣмъ тремъ частямъ флоры.

Окончивъ свой трудъ, я отъ всего сердца приношу искреннюю и глубокую благодарность А. Н. Петунникову за его редактированіе „Московской флоры“, за полезныя указанія во время моей работы и за обработку такого труднаго рода, какъ *Niegalium*. За эту обработку могъ взяться только А. Н. Петунниковъ, такъ много интересовавшійся и работавшій надъ уясненіемъ и опредѣленіемъ нашихъ формъ и сносившійся по этому поводу со всѣми европейскими знатоками этого рода.

Сердечно благодарю также А. А. Хорошкова, которому я обязанъ обработкой сем. *Rubiaceae* и уясненіемъ нѣкоторыхъ формъ, описанныхъ въ этой послѣдней части.

Прошу также проф. М. П. Голеникина принять мою глубокую признательность за разрѣшеніе заняться въ Моск. Бот. Саду культурами для выясненія нѣкоторыхъ формъ *Galium*, необходимыми и для другихъ растений при дальнѣйшей обработки Московской флоры.

Приношу также благодарность Ботаническому Музею Имп. Ак. Наукъ и Имп. Ботаническому Саду въ С.-Петербургѣ, гербаріями и библіотеками которыхъ я широко пользовался и гдѣ встрѣчалъ всегда такое радушіе содѣйствіе моимъ работамъ.

Въ довершеніе всего долженъ замѣтить, что, къ сожалѣнію, въ первую и вторую часть вкралось не мало ошибокъ, конечно, найдутся онѣ и въ третьей, но я надѣюсь еще разъ пересмотрѣть всю работу, внести поправки въ прибавленіе, и буду очень признателенъ за всякое сообщеніе моихъ промаховъ и ошибокъ.

Москва.

5 Декабря 1909 г.

Д. Сырейщиковъ.



Подотдѣль Angiospérmae.

Классъ Dicotylédones.

Подклассъ Sympétalae.

1. Растенія буроватыя, желтовато-бѣлыя или розовыя, съ одними чешуевидными листьями. 2.
Растенія съ зелеными листьями. 5.
2. Растенія вьющіяся съ нитевиднымъ розовымъ или бѣлымъ стеблемъ. (Cuscuta) *Convolvulaceae*.
Растенія съ прямостоячимъ не высокимъ стеблемъ, оканчивающимся соцветіемъ. 3.
3. Вѣнчикъ 5 (4)-раздѣльный; соцветіе вначалѣ поникшее; растенія бѣлыя или слегка желтоватыя. *Monotropaceae*.
Вѣнчикъ съ явственно замѣтной трубкой, 4-лопастный или 2-губый; соцветіе торчащее; растенія буроватыя, синеватыя или розовыя. 4.
4. Соцветіе вѣстостороннее; верхняя губа слегка 2-лопастная; цвѣты буроватые или голубоватые. *Orobanchaceae*.
Соцветіе одностороннее; верхняя губа безъ лопастей; цвѣты лиловато-розовые или розоватыя. (Lathraea) *Scrophulariaceae*.
5. Цвѣты безъ покрововъ, голые, пучками, частью обоеполые, частью мужскіе, частью женскіе; дерево. (Fraxinus) *Oleaceae*.
Цвѣты съ покрывами, обоеполые или однополые. 6.
6. Цвѣты однополые—одиночныя или въ корзинкахъ. 7.
Цвѣты обоеполые. 8.
7. Растенія со стеблемъ лежащимъ или лазящимъ, съ усиками. *Cucurbitaceae*.
Растенія безъ усиковъ, со стеблемъ б. ч. прямостоящимъ. *Compositae*.
8. Цвѣты мелкіе на очень короткихъ ножкахъ или сидячіе, собраны въ головку, у основанія которой нѣсколько листочковъ, составляющихъ общую обертку; часто цвѣторасположеніе походить на одинъ сложный цвѣтокъ съ чашечкой и вѣнчикомъ. 9.

Цвѣты одиночные или скученные, рѣдко головкою, но безъ общей обертки. 12.

9. Листья мутовчатые по 4—6 въ мутовкѣ; плодъ сухой изъ 2 долекъ. (Sherardia) *Rubiaceae*.

Листья очередные или супротивные, но не мутовчатые; плодъ коробочка или сѣмянка. 10.

10. Цвѣты съ развитой зеленой чашечкой; вѣнчикъ глубоко 5-раздѣльный. (Jasione) *Campanulaceae*.

Цвѣты съ зачаточной чашечкой въ видѣ волосянаго хохолка, щетинокъ, зубцовъ или вовсе безъ чашечки; вѣнчикъ 5—1-ой, трубчато-ворончатый или язычковый. 11.

11. Каждый цвѣтокъ съ 4 свободными тычинками; столбикъ простой съ однимъ рыльцемъ; чашечка двойная: наружная въ видѣ зубцовъ или коронки и внутренняя изъ ряда щетинокъ; вѣнчикъ 4—5-надрѣзной. *Dipsacaceae*.

Каждый цвѣтокъ съ 5 тычинками и пыльниками, почти всегда спаянными; столбикъ съ 2 нитевидными рыльцами; вѣнчикъ или правильный трубчатый, трубчато-ворончатый, или же неправильный язычковый, рѣже нитевидный. *Compositae*.

12. Вѣнчикъ раздѣльнолепестный. 13.

Вѣнчикъ спайнолепестный, иногда только у основанія. 14.

13. Кустарникъ съ узкими очередными сильно пахучими листьями. (Ledum) *Ericaceae*.

Травы или полукустарники съ листьями не пахучими.

Pirolaceae.

14. Завязь вполне верхняя заключена въ чашечку. 15.

Завязь нижняя—подъ чашечкой, рѣдко полунижняя. 29.

15. Травянистыя растенія съ вьющимся стеблемъ и ворончатыми цвѣтами. *Convolvulaceae*.

Растенія травянистыя или деревянистыя съ прямымъ, иногда изгибистымъ, но не вьющимся стеблемъ и съ цвѣтами не ворончатыми. 16.

16. Тычинокъ 8—10, болѣе числа долей вѣнчика, колокольчатого или кубарчатого. *Ericaceae*.

Тычинокъ по числу долей вѣнчика или менѣе—отъ 2 до семи. 17.

17. Завязь 4-дольная или 4-лопастная, съ 1 столбикомъ въ срединѣ; плодъ распадается на 4 односѣменныхъ орѣшка. 18.

Завязь цѣльная или по крайней мѣрѣ не 4-дольная; плодъ коробочка или ягода. 19.

18. Листья супротивные, крестообразно-расположенные на 4-гранномъ стеблѣ; вѣнчикъ б. ч. неправильный; тычинокъ 4 или 2. *Labiatae*.

Листья очередные, рѣдко попарно сближенные, б. ч. покрыты щетинками или волосками; цвѣты обыкновенно правильные, б. ч. въ завиткахъ; тычинокъ 5. *Borraginaceae*.

19. Цвѣты вполнѣ правильные. 20.

Цвѣты неправильные, т. е. либо всѣ доли чашечки или вѣнчика неправильныя, либо только нѣкоторыя части вѣнчика не вполнѣ одинаковыя. 27.

20. Тычиночекъ 2.

Oleaceae.

Тычиночекъ 4—5 или болѣе, по числу долей вѣнчика. 21.

21. Цвѣты съ пленчатымъ вѣнчикомъ сгучены на верхушкѣ стрѣлки въ плотный колосъ. *Plantaginaceae.*

Цвѣты съ вѣнчикомъ не пленчатымъ и не собраны колосомъ на концѣ стрѣлки. 22.

22. Рыльце простое, головчатое или штевидное. 23.

Рыльце 2-лопастное или 3-раздѣльное. 26.

23. Тычинки супротивныя долямъ вѣнчика; завязь простая.

Primulaceae.

Тычинки чередуются съ долями вѣнчика; завязь 2-гнѣздная. 24.

24. Листья очередные.

Solanaceae.

Листья супротивные. 25.

25. Зѣвъ вѣнчика закрытъ 5-лопастнымъ кольцомъ, состоящимъ изъ сросшихся между собой придатковъ пыльниковъ; цвѣты бѣлые.

Asclepiadaceae.

Зѣвъ вѣнчика открытъ, безъ придатковъ; цвѣты фіолетовые.

Apocynaceae.

26. Три рыльца на длинномъ столбикѣ; листья непарноперистые.

Polemoniaceae.

Рыльце 2-лопастное, сидячее или на столбикѣ; листья простые или иногда тройчатые. *Gentianaceae.*

27. Чашечка глубоко 2-раздѣльная, почти 2-листная; вѣнчикъ двугубый; водяныя растенія съ листьями вильчато-или перисто-многообразными на тонкія доли съ пузырьками.

Utriculariaceae.

Чашечка 4—5-дольная; растенія б. ч. наземныя или болотныя; листья безъ пузырьковъ. 28.

28. Рыльце 2-лопастное; тычиночекъ 2—4, рѣдко 5, но тогда всѣ онѣ или только 3 болѣе длинныя съ мохнатыми нитями.

Scrophulariaceae.

Рыльце головчатое; тычиночекъ 5, съ изогнутыми пушистыми, но не мохнатыми нитями. (Hyoscyamus) *Solanaceae.*

29. Листья мутовчатые или супротивные. 30.

Листья очередные. 33.

30. Тычиночекъ б. ч. 3; плодъ—орѣшекъ съ перистымъ хохолкомъ.

Valerianaceae.

Тычиночекъ 5—4, иногда раздвоенныхъ до основанія; плодъ безъ хохолка. 31.

31. Листья мутовчатые.

Rubiaceae.

Листья супротивные. 32.

32. Маленькія травянистыя растенія; завязь полунижняя; тычиноктъ 5 (4), раздвоенныхъ до-низу, такъ что ихъ кажется 10 (8).

Adoxaceae.

Кустарники или полукустарники; завязь нижняя; вѣничекъ 6. ч. 5-долый; тычиноктъ по числу долей вѣничка, или же вѣничекъ почти двугубый, а тычиноктъ 5.

Caprifoliaceae.

33. Полукустарники съ 6. или м. кожистыми листьями; тычиноктъ вдвое болѣе числа долей вѣничка; пыльники двурогіе.

(*Vaccinium*) *Ericaceae.*

Травы; цвѣты 5-ные съ 5 тычинками. 34.

34. Растеніе съ колючими листьями; цвѣты въ шаровидныхъ головкахъ; каждый цвѣтокъ съ оберткой изъ колючихъ чешуекъ; чашечка изъ щетиноктъ.

(*Echinops*) *Compositae.*

Растенія безъ колючихъ листьевъ; чашечка изъ 5 зеленыхъ долей; вѣничекъ колокольчатый, не окруженъ колючими чешуйками.

Campanulaceae.

Sympétalae.

Порядокъ Ericales.

72 сем. Piroláceae Dumort.

Цвѣты пятирные; вѣничекъ раздѣльнолепестный, опадающій; чашечка раздѣльнолистная, звѣздчато-растопыренная, остается при плодѣ; тычинокъ 10, прикрѣпленныхъ подъ пестикомъ или къ подпестичному железистому кольцу; гнѣзда пыльниковъ параллельныя; каждое гнѣздо раздѣлено перегородкой, вскрывается дырочкой; пыльники загибаются верхушкой книзу; пыльца б. ч. въ тетрадахъ, рѣже простая; завязь верхняя, 5-гнѣздная; сѣменосы очень толстыя, мясистыя; створки 5-створчатой коробочки прирасли обоими концами къ сѣменосу и несутъ отдѣлившіися отъ него перегородки; сѣмена чрезвычайно мелкія, съ свободно облекающей ихъ мѣшковишной кожурой; зародышъ простой состоитъ только изъ нѣсколькихъ клѣтокъ въ мясистомъ бѣлкѣ. Травы и полукустарники съ перезимовывающими б. ч. кожистыми листьями.

1. Цвѣтокъ одиночный, верхушечный.

Moneses.

Цвѣты кистями или зонтиками. 2.

2. Цвѣты въ зонтикѣ розовые; столбикъ короткій. *Chimophila.*

Цвѣты иной окраски, рѣже розоватыя, въ кистяхъ; столбикъ длинный. 3.

3. Цвѣты въ однобокой кисти; у основанія завязи 10-раздѣльное кольцо.

Ramischia.

Цвѣты во всесторонней кисти; железистаго кольца у основанія завязи нѣтъ или оно почти незамѣтное.

Pirola.

285. Pirola L.

Столбикъ длинный; завязь у основанія безъ кольца или съ едва замѣтнымъ кольцомъ; пыльники безъ рожковъ или съ едва замѣтными рожками; пыльцевыя зерна въ тетрадахъ; края створокъ съ войлочной оторочкой.

1. Вѣничекъ раскрыто-колокольчатый; тычинки отогнуты кверху; столбикъ изогнутый и отогнуть книзу. 2.

Вѣничекъ шаровидно-колокольчатый или почти шаровидный; тычинки сходятся; столбикъ прямой или почти прямой. 3.

2. Чашелистики ланцетные или яйцевидно-ланцетные съ отогнутой верхушкой, вдвое короче бѣлыхъ лепестковъ; прицвѣтники равны цвѣтоножкамъ или длиннѣе ихъ. *P. rotundifolia* L.

Чашелистики широко-яйцевидные, прижаты къ зеленоватымъ лепесткамъ и въ 3—4 раза короче ихъ; прицвѣтники короче цвѣтоножекъ.

P. chlorantha Sw.

3. Столбикъ нѣсколько длиннѣе вѣничка, на верхушкѣ утолщенъ въ кольцо болѣе широкое, чѣмъ 5-лопастное рыльце.

P. media Sw.

Столбикъ короче вѣничка, съ широкимъ 5-лопастнымъ, почти звѣздчатымъ рыльцемъ, но безъ расширеннаго кольца.

P. minor L.

701. *P. rotundifolia* L. F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 241.—Цин., № 913.

Pyrola rotundifolia L. Бух. II, № 268. — Бух. I, № 258. — Кауф. II, № 481. — Pinz., p. 15. — Кауф. I, стр. 314. — Lind., p. 136. — Ann., C. II, № 138. — Дв., № 417. — Макс., № 392. — Hoff. II., № 3136. — Gold. C., p. 19. — Mart., p. 75. — Lib. Tr., p. 195. — St. II, p. 26. — St. I, № 281. — Pal., № 854.

Корневище ползучее; листья пучкомъ, кожистые, округлые или слегка овальные, цѣльнокрайніе, рѣже съ не частыми округлыми городками, быстро стянуты въ длинный черешокъ; цвѣточій стебель 15—30 см., тупо-ребристый, съ однимъ или нѣсколькими продолговатыми влагалищными чешуйками; цвѣты душистые въ длинной всесторонней кисти; цвѣтоножки нѣсколько отогнуты книзу, каждая съ линейно-ланцетнымъ заостреннымъ прицвѣтникомъ, равнымъ цвѣтоножкѣ или нѣсколько длиннѣе ея; вѣничикъ раскрыто-колокольчатый, бѣлый, иногда съ розоватымъ оттѣнкомъ; лепестки округлые, около 6 мм.; чашелистики ланцетные или яйцевидно-ланцетные, заостренные; тычинки отогнуты вверхъ, нѣсколько длиннѣе лепестковъ; столбикъ дугообразно отогнутъ книзу; коробочка шаровидная, нѣсколько сплюснутая.



Pyrola rotundifolia.

По сырымъ и моховымъ лѣсамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ іюня, иногда до конца іюля; плоды съ середины августа.

702. *P. chlorantha* Sw. Сыр. Отч. I, стр. 14.—Ф. Б., № 52.—Пет., стр. 241.—

Цин., № 932.

Pyrola chlorantha Swartz. Пет. Кр. II, стр. 66.—Кауф. II, № 482.—Кауф. I, стр. 314.—

Дв., № 418.—Макс., № 393.—Hoff. II., № 3134.

Pyrola virens Schweigg. et Koerthe. Дв., № 418.—Макс., № 393.—Mart., p. 75.

Корневище ползучее; листья пучкомъ, кожистые, округлые, иногда слегка обратно-яйцевидные, цѣльнокрайніе или слабо-городковые; черешки б. ч. въ 2—3 раза длиннѣе пластинки, слегка красноватые, какъ и

стебель, въ 10—25 см., въ нижней части остро-ребристый, съ 1—2 линейными чешуйками; цвѣты зеленоватые, въ 2—8-цвѣтковой всесторонней кисти; вѣничикъ раскрыто-колокольчатый; лепестки овальные; цвѣтоножки отогнуты книзу, у основанія каждой линейно-ланцетный зеленый прицвѣтникъ, короче цвѣтоножки; чашелистики почти треугольные или широко-яйцевидные, прижаты къ вѣничку и въ 3—4 раза короче его; тычинки нѣсколько къверху отогнуты, равны лепесткамъ или короче ихъ; пыльники съ очень короткими, едва замѣтными рожками; столбикъ отогнуть дугообразно книзу, съ 5-лопастнымъ рыльцемъ.

По большимъ хвойнымъ лѣсамъ, не часто. Цвѣтетъ съ половины юня до половины юля; плоды съ конца августа. Деннсьево, Зви. у. (Гольб. герб.).—Усово, Зви. у. (П. и Ч.).—Близъ Сухаревки, Вер. у. (Г. О.).—Шевелкино, Бгр. у. (П. П.).—Берлюкова пустынь, Бгр. у. (П.).—Соколово, Бгр. у. (Сюз.).—Въ лѣсу между Быковымъ и Михневимъ, Бри. у. (П. и С.).—Мытищи, удѣльный лѣсъ; между Пушкинымъ и Степаньковымъ, Дмт. у.; основной лѣсъ близъ Барвихи, Зви. у. (С.).

703. *P. média* Sw. Ф. Б., № 53.—Пет., стр., 241.—Цин., № 933.

Pyrola media Swartz. Нер. Кр. II, стр. 66.—Кауф. II, № 483.—Pinz., p. 15.—Кауф. I, стр. 315.

Корневище длинное, ползучее; листья кожистые, пучкомъ, округлые, быстро переходить въ черешокъ; верхушка листа иногда слабо заострена, края слабо городковые, рѣже почти цѣльные; цвѣточный стебель слегка красноватый, 15—30 см., ребристый, съ широкими туповатыми чешуйчатыми листьями; кисть всесторонняя, о 5—15 цвѣткахъ, бѣлыхъ или слегка розоватыхъ, шаровидно-колокольчатыхъ; цвѣтоножки отогнутыя съ широкимъ пленчатымъ прицвѣтникомъ каждая, почти равнымъ цвѣтоножкѣ; чашелистики почти треугольные, прижаты къ вѣничку, только самый кончикъ слегка отстоящій; тычинки не отогнуты къверху, короче лепестковъ; столбикъ длиннѣе вѣничка слабо изогнутъ и на верхушкѣ утолщенъ въ кольцо болѣе широкое, чѣмъ 5-лопастное рыльце.

По большимъ моховымъ и хвойнымъ лѣсамъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ конца юня, весь юль. Лизаветино; Ку-



Pirola chlorantha.



Pirola media.

навна. Бгр. у. (К.).—Пушкино (Асст.).—Кусково (П.).—Лѣсъ между Быковымъ и Михневымъ. Бри. у. (П. и С.).—Шевелкино. Бгр. у. (П. П.).

704. *P. minor* L. F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 241.—Цви., № 934.

Pyrola minor L. Бух. II, № 269. — Бух. I, № 259. — Кауф. II, № 484. — Кауф. I, стр. 315. — Lind., p. 136. — Ann., C. III, № 237. — Дв., № 419. — Макс., № 394. — Hoff. H., № 3135. — Gold. C., p. 19. — Mart., p. 75. — St. II, p. 26. — St. I, № 282. — Pal., № 855.

Корневище ползучее, косо приподнимающееся; листья пучкомъ, менѣе кожистые, чѣмъ у остальныхъ видовъ, широко-овальные или яйцевидно-округлые, иногда съ слегка заостренной верхушкой, по краямъ слабо городковые; цвѣтостебель 10—20 см., слегка красноватый, съ 3 слабыми неравными гранями и 1—2 чешуйчатыми листочками; цвѣточная кисть густая, о 8—16 цвѣткахъ, съ шаровидными почти сомкнутыми лепестками; послѣдніе бѣлые съ розоватымъ краемъ или блѣдно-розовые, очень рѣдко чисто бѣлые; цвѣтоножки равны цвѣтку или короче его, каждая съ линейно-ланцетнымъ прицвѣтникомъ; чашелистики треугольные, заостренные, прижаты къ вѣничку и въ 3 раза короче его; тычинки прямые, короче лепестковъ; пыльники съ 2 едва замѣтными рожками; столбикъ прямой, короче вѣничка, съ 5-лопастнымъ, почти звѣздчатымъ рыльцемъ, но безъ расширеннаго кольца.



Pirola minor.

По лѣсамъ, часто. Цвѣтетъ съ половиною іюня до половины іюля. Косно. Воробьевы горы, Серебряный боръ близъ Хорошова (П.).—Чижово (Куль.).—Лѣсъ близъ ст. Мамоновка, М.-Яр. ж. д.:—лѣсъ противъ Мѣшкова, Зви. у. (С.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.).—Денисьево, Зви. у.; Крюкова, Влм. у. (Х.).—Лѣсъ между Быковымъ и Михневымъ. Бри. у. (П. и С.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Близъ Серпухова (Ар.).—Рождествено на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

286. *Móneses* Salisb.

Рыльце съ 5 торчащими зубчиками на б. или м. длинномъ столбикѣ; у основанія завязи 10 железокъ, чередующихся съ тычинками, нити которыхъ у основанія 3-гранныя; пыльники съ 2 короткими рожками; пылевые зерна въ тетрадахъ; края створокъ безъ войлочной оторочки.

705. *M. grandiflora* Salisb. Сыр. Отч. II, стр. 19.—Пет., стр. 224.—Цви., № 936.

Pirola uniflora L. Сыр. Отч. I, стр. 14.—Ф. Б., № 54.—F. O., № 6, p. 86.

Pyrola uniflora L. Бух. II, № 271. — Кауф. II, № 486. — Мил., № 23. — Кауф. I, стр. 316. — Дв., № 422. — Макс., № 391.—Hoff. H., № 3140. — Mart., p. 75.—Lib. Tr., p. 219.—St. II, p. 26.

Корневище ползучее; листья пучкомъ или въ нижней части стебля, округлые, иногда слегка заостренные, по краямъ городковые, кожистые,

переходя въ черешокъ, равный пластинкѣ или короче ея; цвѣточная стрѣлка 5—10 см., съ маленькимъ овальнымъ прицвѣтникомъ выше середины, по краямъ рѣсничатымъ; цвѣтокъ одинъ, верхушечный, душистый, поникающій, 13—25 мм. въ поперечникѣ, раскрытый, иногда съ отогнутыми лепестками; тычинки сидятъ б. ч. попарно супротивъ лепестковъ; чашелистики бѣловатыя, яйцевидныя, по краямъ рѣсничатые.

По большимъ хвойнымъ и сырымъ моховымъ лѣсамъ, не часто. Цвѣтетъ съ начала іюня до середины іюля. Лосинный островъ (Ф.).—Пзмайлово, Аннинская роща (Ген.).—Радумли (П.).—Лѣсъ между ст. Пушкино и Братовицкой; лѣсъ противъ Мѣшкова, Зви. у. (С.).—Лукино, Зви. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Воскресенскъ, Зви. у. (Дв.).—Спаское, Дмит. у. (Ш.).—Кочергино на Клизьмѣ, Дмит. у. (П. и Х.).—Казенный лѣсъ близъ Бирева, Клин. у. (П. и С.).—Близъ Боготѣлова, Клин. у.; Иосифовъ монастырь, Влк. у. (Ч.).—Аннинское, Бгр. у. (Гум.).—Шевелкино, Чуденки, Бгр. у. (П. П.).—Русино, Мож. у. (П. и Ч.).—Занино, Мож. у. (Ф. Б.).—Дубровицы, Пдл. у. (Г.).



Moneses grandiflora.



Chimophila corymbosa.

287. *Chimóphila* Pursh.

Рыльце почти сидячее, щитковидное, 5-угольное; основаніе завязи окружено чашевиднымъ железистымъ кольцомъ съ ровнымъ краемъ; рыльцевыя зерна въ тетрадахъ; края створокъ безъ войлочной оторочки.

706. *C. corymbósa* Pursh.

Chimaphila umbellata Nutt. Пер., стр. 167.—Цин., № 937.—Линд., p. 136.

Pirola umbellata L. Ф. Б., № 55.—Ф. О., № 6, p. 86.

Pyrola umbellata L. Кауф. II, № 487.—Кауф. I, стр. 316.—Дв., № 421.—Макс., № 396.—Хоф. II., № 3139.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 75.—St. II, p. 26.—St. I, № 284.

Подукустарникъ съ ползучимъ корневищемъ; стебли прямостоящіе, 10—25 см., простые или вильчато-вѣтвистые; листья мѣтовками, продол-

говато-ланцетные, сверху шире, съ округлой или слегка заостренной верхушкой, по краямъ остро-зубчатые, къ клиновидному основанію цѣльнокрайніе, кожистые, сверху темно-зеленые, лоснящіеся, съ вдавленными жилками, снизу свѣтлѣе; цвѣты розовые въ зонтикѣ на длинномъ цвѣтоножѣ; цвѣтоножки длиннѣе цвѣтка, слабо опушенные; чашелистики округло-яйцевидные, тупые, рѣсничато-зазубренные; вѣнчикъ плоско-колокольчатый; тычиночныя нити по краямъ расширеннаго основанія рѣсничатыя.

По хвойнымъ лѣсамъ, не часто. Цвѣтеть съ половины іюля до половины августа. Всевѣтское, Цамайлово; Архангельское, Зви. у.; Раменское, Бри. у. (К.).—Горенки, Куеково (Мар.).—Мытищи въ удѣльномъ лѣсу; между Быковымъ и Михневымъ, Бри. у.; сосновый лѣсъ между Барихой и Усовымъ, Зви. у. (С.).—Успенское, Зви. у. (Александрова Л.).—Измчиновскій постъ (Ассы).—Куровка, Ольгино, Мож. у. (Ф. О.).—Апаренки, Заншино, Мож. у.; Сухарево, Вер. у. (Ф. Б.).—Вялки, Бри. у. (Х.).—Лѣсъ близъ Щекавцева по р. Дубенкѣ, Бгр. у.; лѣсъ по р. Миленкѣ близъ Дубровки, Дмит. у. (Н.).—Близъ Серпухова—Коншинскій лѣсъ (Гжск. Бот. Лаб.).—Рождествено на р. Нарѣ въ Глаховскомъ лѣсу, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).

288. *Ramischia Opiz.*

Столбикъ длинный, выдающійся изъ цвѣтка; завязь у основанія съ железистымъ, 10-раздѣльнымъ кольцомъ; пыльники безъ рожковъ; пыльцевыя зерна свободныя, не въ тетрадахъ; края створокъ съ войлочной оторочкой.

707. *R. secunda* Garcke. Пет., стр. 254.

Pirola secunda L. F. O., № 6, p. 86.—Цин., № 935.

Pyrola secunda L. Бух. II, № 270.—Бух. I, № 260.—Кауф. II, № 485.—Кауф. I, стр. 316.—Lind., p. 136.—Ann., C. III, № 238.—Дв., № 420.—Макс., № 395.—Hoff. II., № 3137.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 75.—St. II, p. 26.—St. I, № 283.



Ramischia secunda.

Полукустарникъ съ длиннымъ корневищемъ, простыми или вильчато-вѣтвистыми стеблями съ овальными зелеными чешуйками; листья свѣтло-зеленые, слегка кожистые, яйцевидные, длиннѣе черешковъ, мелкозубчатые; цвѣточная стрѣлка до 12 см., б. ч. красноватая, съ нѣсколькими ланцетными чешуевидными листочками; кисть б. ч. однобокая, многоцвѣтковая; цвѣты желто-зеленоватые на короткихъ цвѣтоножкахъ, съ болѣе длиннымъ травянистымъ прицвѣтникомъ каждая; зубцы чашечки треугольные, слегка заостренные, слабо зазубренные; тычиночныя нити прямыя, шиловидныя; коробочка повислая.

По лѣсамъ, очень часто. Цвѣтеть съ середины іюня до конца іюля; плоды съ середины августа.

73 сем. Monotropáceae A. Br.

Цвѣты 4—5-тые; вѣничек раздѣльнолепестный, опадающій, колокольчато-цилиндрической; лепестки у основанія съ мѣшкообразной выпуклиной; чашечка раздѣльнолистная; чашелистики слегка лопатчатые; тычиночек 8—10 на прямыхъ нитяхъ; пыльники почковидные, вскрываются поперечной полукольцевой трещиной; пыльца простая, не въ тетрадахъ; завязь верхняя; рыльце воронковидное; коробочка не вполне 4—5-гнѣздная, дѣлится перегородками только до середины, вскрывается 4—5 створками; сѣмена очень мелкія, съ свободно облекающей ихъ мѣшкообразной кожурой; зародышъ изъ нѣсколькихъ кѣловокъ въ мясистомъ бѣлкѣ. Очень сочныя бѣловатыя растенія безъ хлорофилла и безъ настоящихъ листьевъ, съ однимъ чешуевидными (сапрофиты).

289. Monótropha L.

708. *M. Hypopitys* (L.) Wallr. Пет. Кр. II, стр. 68. — F. O., № 6, p. 86. — Ann., C. II, № 140. — Дв., № 412. — Макс., № 389. — Hoff. II., № 3101. — Gold. C., p. 19. — Mart., p. 74. — St. II, p. 25.

Monotropa Hypopitys L. β . *hirsuta* Roth. Sch. III, № 677. — Бух. II, № 272. — Бух. I, № 257. — Кауф. II, стр. 326. — Кауф. I, стр. 317.

Hypopitys multiflora Scop. Пет., стр. 203. — Цин., № 938.

Листовыя чешуйки чаще яйцевидно-округлыя, б. ч. сидяція широкимъ основаніемъ, къ верхушкѣ суженныя, закругленно-островатыя; цвѣты вздуто-продолговато-колокольчатые; чашелистики продолговато-ланцетные, немного короче лепестковъ, обыкновенно нѣсколько острые и самый нижній цвѣтокъ съ большимъ черешчатымъ прицвѣтникомъ; лепестки лопатчатые, суженные къ основанію и закругленные на верхушкѣ, по верхнему краю бахромчатые и съ замѣтной мѣшетчатой выпуклиной у основанія; тычинки двурядныя, внутренній короче и всѣ значительно короче столбика; всѣ части цвѣтка опушенные; чашелистики же только съ внутренней стороны; коробочка продолговатая съ б. или м. длиннымъ столбикомъ.



Monotropa Hypopitys.

По хвойнымъ лѣсамъ, часто. Цвѣтетъ съ середины іюля до конца августа; плоды съ середины августа.

709. *M. Hypophegea* Wallr. Пет. Кр. II, стр. 68.

Monotropa Hypopitys L. α . *glabra* Koch. Кауф. II, стр. 326. — Кауф. I, стр. 317.

Листовыя чешуйки продолговато-эллиптическія или же обратно-яйцевидныя, сидяція узкимъ основаніемъ, къверху часто съ широко

округленной верхушкой; цвѣты узкіе, продолговато-кувшинчатые; чашелистики эллиптическіе, очень короткіе, почти вдвое короче лепестковъ; прицвѣтники не крупнѣ листовыхъ чешуекъ; лепестки широко-ланцетные, часто съ закругленной верхушкой и лопастно-пильчатымъ краемъ; мѣшеччатая выпуклина у основанія лепестковъ очень короткая; всѣ тычинки одинаковой длины и доходятъ до рыльца, или же нѣсколько длиннѣ столбика; всѣ части цвѣтка голыя; коробочка почти шаровидная, часто съ короткимъ столбикомъ.



Monotropa Hypophaea.

По смѣшаннымъ березовымъ и хвойнымъ лѣсамъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ половины іюля; плоды съ середины августа. Архангельское, Зви. у. (герб. Ген.).—Въ лѣсу близъ селца Ланкова на Москвѣ рѣкѣ, Руз. у. (П.). Еловый лѣсъ близъ ст. Удѣльная М.-Ряз. ж. д., Брн. у. (П. и С.).

74 сем. *Ericáceae* DC.

Цвѣты обоеполые; цвѣточныя покровы 4—5-ные, раздѣльные или надрѣзные, прикрѣплены къ наружному краю медоноснаго диска; чашечка свободно- или сростнолистная; вѣничекъ трубчатый, кубарчатый или колокольчатый, сростнолепестный, рѣже раздѣльнолепестный; тычинки б. ч. прикрѣплены у основанія пестика, число ихъ вдвое болѣе частей вѣничка; пыльники прикрѣплены къ нитямъ концомъ или серединой, двугнѣзные, б. ч. вскрываются на верхнемъ концѣ дырочками или трещинами, рѣже продольной трещиной и часто съ 2 рожекми или придатками; пыльца въ тетрадахъ; завязь верхняя или нижняя, 4—5-гнѣзная; сѣменосы срединные; столбикъ одинъ съ головчатымъ рыльцемъ; плодъ ягодообразный или коробочка, вскрывающаяся створками; сѣмя со свободной или плотно прилегающей кожурой и съ короткимъ прямымъ зародышемъ въ большомъ бѣлкѣ. Кустарники или полукустарники съ простыми, часто перезимовывающими листьями, безъ прилистниковъ.

Обзоръ семейства.

A. Почки прикрыты чешуйками; листья плоскіе, очередные; вѣничекъ опадаетъ.

I. Rhododendroidéae Niedenau.

Завязь верхняя; пыльники безъ придатковъ, каждая половина вскрывается наверху круглой дырочкой; коробочка вскрывается по перегородкамъ.

Ledum.

II. *Siphonandroïdæe* A. Br.

Завязь верхняя или нижняя; пыльники вскрываются боковыми трещинками; ягода, костянка или коробочка, вскрывающаяся посрединѣ створокъ между перегородками.

Vaccinium, Arctostaphylus, Andromeda, Cassandra.

В. Почки безъ чешуекъ; листья игловатые, остающіеся, мутовчатые; вѣничикъ остается; завязь верхняя; пыльники вскрываются боковыми продолговатыми дырочками; коробочка вскрывается посрединѣ створокъ или по перегородкамъ.

III. *Ericoidæe* Klotzsch.

Calluna.

Опредѣлитель родовъ.


1. Завязь нижняя или полунижняя. *Vaccinium.*
Завязь верхняя. 2.
2. Чашечка раздѣльнолистная о 4 листочкахъ, много длиннѣ вѣничка и окрашена въ его цвѣтъ; вѣничикъ глубоко-4-надрѣзной; тычинокъ восемь. *Calluna.*
Чашечка всегда короче вѣничка, 5-ная; вѣничикъ 5-лепестный или спайнолепестный съ 5 зубчиками; тычинокъ десять. 3.
3. Вѣничикъ раздѣльнолепестный или только у самого основанія слегка спаятъ. *Ledum.*
Вѣничикъ спайнолепестный, только по краю съ 5 зубчиками. 4.
4. Чашелистики тупые; плодъ—ягодообразная костянка. *Arctostaphylus.*
Чашелистики заостренные; плодъ—коробочка. 5.
5. Чашечка съ 2 прицвѣтниками; гнѣзда пыльниковъ вытянуты въ трубчатые отростки, вскрывающіеся дырочками. *Cassandra.*
Чашечка безъ прицвѣтниковъ; гнѣзда пыльниковъ на верхушкѣ съ шиловиднымъ согнутымъ придаткомъ, вскрываются подъ нимъ дырочкой. *Andromeda.*

290. *Lédum* L.

Чашечка маленькая, 5-зубчатая, вѣничикъ 5-лепестный, звѣздчатый, съ свободными лепестками или слегка спаянными у основанія; завязь верхняя; столбикъ длинный остается при плодѣ; коробочка 5-гнѣздная, вскрывается снизу до-верху 5 створками; сѣменосовъ 5, висячихъ, прикреплённыхъ къ верхушкѣ срединнаго столбца; сѣмена узкія, крылатыя.

710. *L. palústre* L. F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 210. — Кауф. II., № 489. — Цип., № 930. — Кауф. I, стр. 318. — Lind., p. 136. — Ann., C. II, № 137. — Дв., № 413. — Маке., № 390. — Hoff. II., № 3112. — Gold. C., p. 19. — Mart., p. 74. — Lib. Tr., p. 26. — St. II, p. 25. — St. I, № 277. — Pal., № 843.

Кустарникъ до 1.25 м.; кора на старыхъ вѣтвяхъ сѣрая; молодыя



Ledum palustre.

вѣтви, нижняя сторона листьевъ, цвѣтопожки и коробочки густо покрыты ржаво-бурымъ войлокомъ; листья очередные, б. ч. линейные, съ завернутыми внутрь краями, сверху темно-зеленые, слегка лоснящіеся, остаются на зиму; цвѣты бѣлые, рѣдко розоватые, въ густыхъ верхушечныхъ зонтичныхъ кистяхъ; цвѣтопожки длинныя, тонкія, железистыя, при плодахъ отгибаются книзу; тычинки равны вѣничку или нѣсколько длиннѣе его; нити у основанія рѣсничатыя; рыльце слабо 5-лопастное; коробочка 6—8 мм. дл.; все растение съ сильнымъ одуряющимъ запахомъ.

По торфянымъ болотамъ, часто. Цвѣтетъ иногда съ половины мая до середины юня.

291. *Vaccinium* L.

Чашечка 4—5-зубчатая, рѣже съ цѣльнымъ краемъ, сросшаяся съ завязью; вѣничекъ 4—5-зубчатый или раздѣльный; тычинокъ 8—10; завязь нижняя; столбикъ питевидный; рыльце усѣченное, почти такой же толщины, какъ и столбикъ; плодъ 4—5-гнѣздная ягода, съ 4—5-или многосѣменными гнѣздами.

1. Вѣничекъ колесовидный, глубоко надрѣзной съ отвороченными долями, такъ что вѣничекъ кажется раздѣльнолепестнымъ. 2.

Вѣничекъ колокольчатый, шаровидный или яйцевидно-кувшинчатый съ маленькими зубчиками. 3.

2. Листья 6—11 мм. дл.; цвѣтоносы опушенные; зубцы чашечки на концѣ рѣсничатые. *V. Oxycoccus* L.

Листья 2—3 мм. дл.; цвѣтоносы голые; зубцы чашечки безъ рѣсничекъ. *V. microcarpum* (Turcz.) J. D. Hook.

3. Листья явственно мелко-городковые, съ плоскими краями; чашечка безъ зубчиковъ. *V. Myrtillus* L.

Листья съ слегка завернутыми внутрь краями, цѣльными или слабо зубчатыми; чашечка съ зубчиками. 4.

4. Цвѣты въ верхушечныхъ однобокихъ кистяхъ; гнѣзда пыльниковъ вытянуты, но безъ рожковъ. *V. Vitis idaea* L.

Цвѣты по 2 или одиночные; пыльники съ 2 дугообразными рожками. *V. uliginosum* L.

711. *V. Myrtillus* L. Бух. II, № 266.—Бух. I, № 255.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 298.—Кауф. II, № 478.—Цин., № 923.—Кауф. I., стр. 311.—Lind., p. 136.—Ann., C. II, № 26.—Дв., № 423.—Макс., № 400.—Hoff. II., № 2948.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 70.—Lib. Tr., p. 223.—St. II, p. 23.—St. I, № 257.—Pal., № 770.

Не высокій полукустарникъ 15—40 см., съ длиннымъ ползучимъ корневищемъ; стебли примостоящіе или приподнимающіеся, у основанія почти цилиндрическіе, съ сѣрой корой, выше стебли и вѣтви остро-граністые, зеленые; листья очередные, слегка кожистые, опадающіе, яйцевидные или продолговато-яйцевидные, съ тупой или слегка заостренной верхушкой, по краямъ мелко-городковые съ маленькой железкой на каждомъ городкѣ; цвѣты одиночные, рѣже по 2, вазушные, на поникшихъ цвѣтоножкахъ; чашечка приросшая къ завязи, съ цѣльнымъ краемъ; вѣнчикъ шаровидно-кувшинчатый, съ 5 (4—6) отогнутыми зубчиками, зеленый или слегка красноватый; тычинки съ большими, нѣсколько расширенными къ основанію, нитями и съ большими двурогими пыльниками; ягода черно-синяя съ налетомъ, внутри малиновая.

По сырымъ лѣсамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ начала до конца мая; плоды съ половинны іюня.



Vaccinium Myrtillus.



Vaccinium uliginosum.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. *turfosum* Choroschkov. Хор. II, стр. 16.—Хор. Отч. I, стр. 10.

Вѣтви жесткія, вверхъ торчащія, сжатые; вѣнчикъ красный. По рѣдкимъ кустарникамъ и открытымъ болотистымъ мѣстамъ. Близъ д. Вялки, Бри. у. (X).—Опушка лѣса близъ Михнева и близъ Боровскаго кургана, Бри. у. (С.).

β. *epuinosum* Aschers. et Magnus.

Ягоды черныя безъ налета. Близъ Храпунова поста на 41 верстѣ Ниж. ж. д. (X).

712. *V. uliginosum* L. Бух. II, стр. 29.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 298.—Кауф. II, № 479.—Цин., № 924.—Кауф. I, стр. 312.—Lind., p. 136.—Ann., C. II, № 136.—Дн., № 424.—Макс., № 401.—Hoff. II., № 2950.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 70.—St. II, p. 24.—St. I, № 258.—Pal., № 771.

Кустарникъ до 1 м., сильно вѣтвистый съ цилиндрическими вѣтвями; листья опадающіе, обратно-яйцевидные, тупые, цѣлюкрайніе, съ слегка


завернутыми краями, сверху темно-зеленые, снизу светло-зеленые, съ сильно выдающимися сѣтчатыми жилками; цвѣты одиночные или парные, на длинныхъ бѣлыхъ или розоватыхъ цвѣтоножкахъ; чашечка съ 5 тупыми зубчиками; вѣничикъ яйцевидно-кувшинчатый, бѣлый или розоватый, съ 4—5 отогнутыми зубчиками; тычиночныя нити голыя, нѣсколько расширены къ основанію; пыльники съ 2 длинными рожками, слегка бугорчатые; ягода синевато-черная, внутри зеленая.

По болотамъ и сырмъ кустарникамъ, часто. Цвѣтетъ съ середины мая до середины іюня; плоды съ конца іюня.

713. **V. Vitis idaea L.** Sch. V, № 1481.—Бух. II, № 267.—Бух. I, № 256.—F. O., № 6, p. 86.—Пер., стр. 298.—Кауф. II, № 480.—Цин., № 922.—Pinz., p. 15.—Кауф. I, стр. 319.—Lind., p. 136.—Дв., № 425.—Макс., № 402.—Hoff. II, № 2951.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 70.—Lib. Tr., p. 233.—St. I, № 259.—Pal., № 772.

Vaccinium Vitis Idaea L. Ann., C. III, № 235.—St. II, p. 24.

Полукустарникъ въ 10—25 см., съ ползучимъ корневищемъ и прямостоящими вѣтвистыми стеблями, въ молодости опушенными; листья зимующіе, кожистые, эллиптическіе или обратно-яйцевидные, верхушка ихъ округлая или слабо выемчатая, съ слегка завернутыми цѣльными или слабо зубчатыми краями, сверху темно-зеленые, лоснящіеся, снизу свѣтло-зеленые съ сѣтчатыми жилками и темными точечными железами; цвѣты поникшіе въ густой односторонней кисти на концѣ прошлогоднихъ вѣтвей; чашечка съ 4 (5) короткими, треугольными острыми зубчиками, по краямъ часто рѣсничатыми; вѣничикъ колокольчатый, розовый или почти бѣлый, съ 4 (5) отвороченными яйцевидными зубчиками; тычиночныя нити короткія, часто съ наружной стороны опушенные; пыльники безъ рожковъ, но только вытянутые; ягода ярко-красная.



Vaccinium Vitis idaea.

По лѣсамъ, кустарникамъ и кочкамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ середины мая до конца іюня, часто второй разъ съ половины августа; плоды съ августа.

714. **V. Oxycoccus L.** Ann., C. III, № 236.—Макс., № 373.—Hoff. II, № 2949.—Mart., p. 69.—St. II, p. 24.—St. I, № 260.—Pal., № 773.

Oxycoccus palustris Pers. Бух. II, стр. 29.—F. O., № 6, p. 86.—Пер., стр. 234.—Кауф. II, № 477.—Цин., № 925.—Кауф. I, стр. 311.—Lind., p. 136.—Дв., № 395.—Макс., № 373.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 69.

Стелющійся полукустарникъ съ длинными ползучими вѣтвями въ 10—30 см.; листья мелкіе, 6—11 мм. дл., очередные, эллиптическіе, за-

острейшие, съ цельными завернутыми внутрь краями, сверху темно-зеленые, лоснящиеся, съ вдавленной срединной жилкой, снизу сизо-сѣрые; цвѣты на концѣ прошлогоднихъ вѣтвей по 1 или по 2—4, поникшіе на длинныхъ красноватыхъ, опушенныхъ цвѣтоносахъ, съ 2 почти супротивными маленькими прицвѣтниками выше середины, а внизу еще съ 1 большимъ; чашечка сперва зеленая, потомъ красная, съ 4 округлыми зубчиками, на концѣ рѣсничатыми; вѣничикъ розовый или свѣтло-малиновый, глубоко 4-надрѣзной; доли его ланцетныя, отвороченныя назадъ, такъ что вѣничикъ кажется 4-лопестнымъ; тычиночныя нити буроватыя, по краямъ рѣсничатыя; оба гнѣзда пыльниковъ въ верхней части не сросшіяся и сильно вытянутыя; ягода темно-красная, бурбюющая, до 12 мм. въ поперечникѣ.

По торфянымъ болотамъ, часто. Цвѣтеть съ конца мая до начала іюля; зрѣлые плоды съ октября.

715. *V. microcárpum* (Turcz.) J. D. Hook. Хор. II, стр. 17.—Хор. Отч. I, стр. 10.



Vaccinium Oxycoccus.



Vaccinium microcarpum.

Стелющийся полукустарникъ образуетъ дерновинки съ длинными ползучими вѣтвями въ 10—40 см.; листья очень мелкіе, 2—3 мм. дл., эллиптическіе, сильно заостренные съ цельными завернутыми внутрь краями, сверху темно-зеленые, лоснящиеся, снизу сизо-сѣрые; цвѣты на концѣ прошлогоднихъ вѣтвей, почти всегда по одному, очень рѣдко по два, поникшіе на длинныхъ красноватыхъ голыхъ цвѣтоносахъ съ 2 почти супротивными маленькими прицвѣтниками выше середины, и внизу еще съ однимъ большимъ; 4 зубца чашечки безъ рѣсничекъ; вѣничикъ розовый или свѣтло-малиновый, такой же какъ у *V. Oxycoccus*, но вдвое мельче; ягода красная, потомъ бурбюющая, не крупѣе 6 мм.

По торфянымъ болотамъ, очень рѣдко. Цвѣтеть съ конца мая до конца іюня; зрѣлые плоды въ сентябрѣ. На торфяномъ болотѣ у Лукова озера, Бгр. у. (X).

292. *Arctostáphylus* Adans.

Чашечка 5-раздѣльная, не приросшая; вѣничикъ кувшинчатый съ 5 отогнутыми зубчиками на верхушкѣ; пыльники на верхушкѣ съ 2 рож-

ками; завязь верхняя 5-гнѣздная; плодь—5-гнѣздная костянка съ мучнистою мякотью и съ 1 косточкою въ каждомъ гнѣздѣ; зародышъ въ большемъ бѣлкѣ.

716. A. úva úrsi (L.) Spreng. Ф. Б., № 56.—Пет., стр. 139.

Arctostaphylos Uva ursi Spreng. Пет. Кр. II, стр. 69.—Кауф. II, № 493.—Цип., № 926.—Кауф. I, стр. 320.—Lind., p. 136.

Arbutus Uva ursi L. Дв., № 416.—Макс., № 399.—Хоф. II, № 3131.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 75.—St. I, № 280.—Pal., № 852.



Arctostaphylos uva ursi.

Стелющийся вѣтвистый кустарникъ въ 30—90 см., съ красно-бурой корой; молодыя вѣтви зеленая покрыты пушкомъ, какъ и края молодыхъ листьевъ; листья зимующіе, обратно-яйцевидные, иногда почти лопатчатые, на верхушкѣ округлые, цѣлюкрайніе, съ верхней стороны темно-зеленые, съ нижней—свѣтлѣе, съ обѣихъ сторонъ съ вдавленными сѣтчатыми жилками, безъ точечныхъ железокъ; цвѣты бѣлые, къ верхушкѣ розовые, поникающіе, въ 2—10-цвѣтковой конечной кисти; чашечка съ тупыми зубчиками; тычиночныя нити у основанія расширены и опушены; пыльники черно-красные; костянка ярко-красная.

По песчанымъ лѣсамъ, рѣдко. Цвѣтеть въ маѣ; плоды съ начала іюля.

Близъ Кузьминоѣ (герб. Ген.).—Угренн (П.).—Карачарово. Кли. у. (кн. Г. Г. Гагаринъ), тамъ же (П. и П.).

293. *Andrómeda* L.

Чашечка безъ прицвѣтничковъ; завязь верхняя; гнѣзда пыльниковъ на верхушкѣ съ шиловидными согнутыми рожками, подъ которыми гнѣзда вскрываются дырочками; коробочка вскрывается 5 створками съ перегородками посрединѣ.

717. A. Polifolia L. Пет., стр. 136.—Макс., № 397.—St. I, № 278.

Andromeda polifolia L. F. O., № 6, p. 86.—Кауф. II, № 492.—Цип., № 927.—Кауф. I, стр. 320.—Lind., p. 136.—Ann., C. I, № 32.—Дв., № 414.—Хоф. II, № 3127.—Mart., p. 74.—Gold. C., p. 19.—St. II, p. 25.—Pal., № 847.

Кустарникъ 10—40 см., съ лежащимъ стволомъ и прямо торчащими вѣтвями; листья зимующіе, ланцетные или широко-ланцетные, цѣлюкрайніе съ завернутыми внутрь краями, сверху темно-зеленые, снизу сизо-сѣрые, съ обѣихъ сторонъ съ сѣтчатыми жилками; цвѣты на концѣ годовалыхъ вѣтвей въ малоцвѣтковомъ зонтикѣ, розовые, поникающіе;

цвѣтоножки темно-розовыя, у основанія съ окрашенными прицвѣтниками; тычиночныя нити къ основанію расширенныя, опушенныя; пыльники темно-красныя; столбикъ зеленый; рыльце красное.

По торфянымъ болотамъ, часто. Цвѣтетъ съ начала мая до средины іюня; плоды поспѣваютъ только глубокой осенью.

α. fl. albo.

Съ бѣлыми цвѣтами. Косино Св. озеро (II.).

294. *Cassándra* Don.

Чашечка съ 2 прицвѣтниками; завязь верхняя; гнѣзда пыльниковъ вытянуты въ трубчатые отростки, вскрывающіеся на верхушкѣ дырочками; наружная оболочка коробочки отдѣляется отъ внутренней и распадается на 10 створокъ.

718. *C. calyculáta* Don. Пет., стр. 163.—Цил., № 928.—Lind., p. 136.

Andromeda calyculata L. F. O., № 6, p. 86.—Кауф. II, № 491.—Кауф. I, стр. 319.—Ann., C. IV, № 27.—Дв., № 415.—Макс., № 398.—Hoff. H., № 3123.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 75.—St. II, p. 26.—St. I, № 279.—Pal., № 848.



Andromeda Polifolia.



Cassándra calyculata.

Кустарникъ 15—60 см., съ лежачимъ стволомъ и вверхъ торчачими вѣтвями; листья, молодые вѣтви и чашечки покрыты мелкими бѣловатыми чешуйками; листья овально-ланцетные или иногда почти овальные, тупые или съ очень короткимъ остріемъ; края ихъ очень мелко и неясно зубчатые, слегка завернуты внутрь; цвѣты бѣлые, поникающіе, въ пазухахъ верхнихъ менѣе крупныхъ листьевъ въ однобокой кисти; чашечка блѣдно-зеленая, большая, зубцы ея заостренные.

По торфянымъ болотамъ, часто. Цвѣтетъ весь май, второе цвѣтеніе съ начала августа.

295. *Calluna* Salisb.

Чашечка 4-раздѣльная, остающаяся, окрашена въ цвѣтъ вѣнчика и вдвое длиннѣе его; вѣнчикъ глубоко 4-раздѣльный; завязь верхняя; тычинокъ 8; гнѣзда пыльниковъ у основанія съ зубчатымъ языковиднымъ придаткомъ, обращеннымъ внизъ, вскрываются продольною щелью; коробочка 4-гнѣздная, вскрывается 4 створками, перегородки же остаются на срединномъ столбцѣ.

719. *C. vulgaris* (L.) Hull.

Calluna vulgaris Salisb. Пет., стр. 153.—Кauf. II, № 490.—Цип., № 929.—Kauf. I, стр. 319. — Lindl., p. 136. — Arn., C. I, № 33. — Дв., № 396.—Макс., № 374.—Hoff. H., № 2953.—Gold. C., p. 19.—Mart., p. 70.

Erica vulgaris L. Макс., № 374. — Mart., p. 70. — St. II, p. 24. — St. I, № 261. — Pal., № 774.



Calluna vulgaris.

Сильно вѣтвистый кустарникъ въ 25—70 см., съ красновато-бурой корой; листья зимующіе, очень мелкіе, супротивные, линейно-ланцетные, игольчатые, почти 3-гранные, при основаніи съ 2 вытянутыми шиловидными ушками; цвѣты красновато-лиловые, поникающіе, б. ч. въ односторонней кисти, переходящей въ листовую вѣтвь; у каждого цвѣтка при основаніи 4 травянистые прицвѣтника, похожіе на зеленую чашечку; тычиночные нити розовыя, къ основанію расширенныя; пыльники оранжевыя; сѣмена овальныя, бурья, слабо борозчатые.

По сухимъ кустарникамъ и безплоднымъ мѣстамъ, рѣже по лѣсамъ на песчаной и глинистой почвѣ, очень часто. Цвѣтетъ съ конца іюля до середины сентября.

α. albiflora Michot.

Съ бѣлыми цвѣтами. Близъ Борисова, Срп. у. (С.).

Порядокъ *Primulales*.75 сем. *Primulaceae* Vent.

Цвѣты обоеполые, б. ч. 5-ные (рѣже 4—9-ные); чашечка раздѣльная, надрѣзная или зубчатая; вѣнчикъ раздѣльный или надрѣзной, ворончатый, колокольчатый, гвоздевидный или колесовидный, съ тычинками, прирѣсанными къ его трубкѣ супротивъ его долей; иногда между тычинокъ стаминодіи; пыльники вскрываются продольной щелью; завязь верхняя, рѣже полунижняя, одногнѣздная, съ осевымъ сѣменосомъ и со мно-

гими съменочками; столбикъ одинъ съ головчатымъ рыльцемъ; плодъ—коробочка многосъменная, вскрывающаяся створками по числу долей чашечки; часто створки наверху раздвоенныя; рѣже коробочка, вскрывающаяся поперекъ крышечкой, еще рѣже не вскрывающаяся; съмена 6, 4, плоскія, цитовидныя; зародышъ прямой посрединѣ бѣлка. Травы безъ прилистниковъ.

Опредѣлитель родовъ.

1. Вѣничикъ 4-раздѣльный; коробочка вскрывается поперекъ крышечкой. *Centunculus*.

Вѣничикъ 5—9-раздѣльный; коробочка вскрывается створками. 2.

2. Цвѣты желтые. 3.

Цвѣты иной окраски. 5.

3. Стебель безъ листьевъ, послѣдніе только корневые. *Primula*.

Стебель покрытъ листьями. 4.

4. Тычинки длиннѣе вѣничика; между долями вѣничика маленькіе зубчики; цвѣты мелкіе въ частой пазушной кисти.

Naumburgia.

Тычинки короче вѣничика; между долями вѣничика зубчиковъ нѣтъ; цвѣты крупныя, одиночныя или въ метельчатой кисти.

Lysimachia.

5. Листья гребенчато-перисто-раздѣльные.

Hottonia.

Листья цѣльные или зубчатые. 6.

6. Цвѣты бѣлые или слегка розоватыя; листья сидячіе или коротко-черешковые. 7.

Цвѣты малиновыя; листья на длинныхъ черешкахъ. *Cortusa*.

7. Цвѣты крупныя до 16 мм. въ поперечникѣ; доли вѣничика острыя.

Trientalis.

Цвѣты очень мелкіе; доли вѣничика округлыя, тупыя.

Androsace.

296. *Centunculus* L.

Чашечка 4-раздѣльная; вѣничикъ почти шаровидный съ 4 надрѣзами; тычинокъ 4, прикрѣпленныхъ къ основанію долей вѣничика; пыльники сердцевидныя; коробочка многосъменная, вскрывается поперекъ крышечкой.

720. *C. minimus* L. Мос., № 31.—Пет. Кр. II, стр. 131.—Ф. Б., № 80.—Пет., стр. 165.—Кауф. II, № 626.—Цин., № 957.—Руур., стр. 88.—Кауф. I, стр. 407.—Дв., № 174.—Мак., № 161.—Hoff. II., № 1125.—Mart., p. 30.—St. II, p. 11.

Маленькое растеніе въ 3—10 см., совершенно голое, простое или



Centunculus minimus.

вѣтвистое; листья почти сидячіе, округло-яйцевидные, на концѣ заостренныя, цѣльно-крайніе; цвѣты очень мелкіе, одиночныя въ пазухахъ листьевъ, бѣлые или розовые, на короткихъ ножкахъ; вѣнчикъ короче чашечки; доли чашечки линейно-ланцетныя, заостренныя, нѣсколько длиннѣе коробочки.

По холмамъ на глинистой почвѣ, очень рѣдко. Въ цвѣту 24 іюня, съ послѣдними цвѣтами и зрѣлыми плодами въ началѣ августа. Раменки—за Воробьевыми горами (К. и П.).—Имѣніе Ольгино, Мож. у. (Ф. Б.).—С. Михайловское, въ саду на воздѣланной почвѣ, Пдл. у. (Мос.).

297. *Trientalis* L.

Цвѣты 7-ые (рѣже 5—9-ые); чашечка глубоко-раздѣльная; вѣнчикъ колесовидный, раздѣльный почти до основанія; тычинки свободныя, прикрѣплены къ основанію вѣнчика, съ большими нитями; пыльники прикрѣплены къ нитямъ почти своимъ основаніемъ; коробочка вскрывается отворачивающимися створками; сѣмена съ сѣтчатой наружной кожурой.

721. *T. europaea* L. Бух. II, № 342. — Бух. I, № 323. — F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 292. — Кауф. II, № 625. — Цин., № 952. — Кауф. I, стр. 407. — Lind., p. 138. — Ann., C. I, № 42. — Дв., № 382. — Hoff. II, № 2897. — Gold. C., p. 19. — Mart., p. 67. — St. II, p. 23. — Pal., № 753.

Trientalis Europaea L. Макс., № 363. — St. I, № 249.



Trientalis europaea.

Корневище бѣлое, ползучее съ длинными нитевидными подземными побѣгами, на концѣ утолщенными въ видѣ клубенька; стебель тонкій, 5—25 см., простой, внизу съ рѣдкими и мелкими чешуйчатыми листьями; средніе листья маленькіе, очередные, разставленные, обратно-яйцевидные, тупые; верхніе листья крупныя, очень неравныя, скучены мутовкою вверхъ стебля, продолговато-эллиптическіе или обратно-яйцевидные, коротко-заостренныя, къ основанію клиновидно-суженныя, цѣльно-крайніе или очень мелко городковые; цвѣты одиночныя въ пазухахъ верхнихъ листьевъ (всѣхъ цвѣтовъ бываетъ 1—5), на тонкихъ цветоножкахъ; послѣднія обыкновенно въ верхней части железистыя; вѣнчикъ бѣлый, у основанія съ желтымъ

кольцомъ; доли его эллиптическія, острые, длиннѣе тычинокъ и чашечки.

По сырмъ лѣсамъ на перегнойной почвѣ, часто. Цвѣтеть съ середины мая до середины іюня; плоды съ іюля.

298. *Naumburgia Moench.*

Цвѣтокъ 6-ной (рѣже 5—7-ной); чашечка глубоко-раздѣльная; вѣничекъ ворончатый, глубоко-раздѣльный съ маленькими зубчиками между его долями; тычинки длиннѣе вѣничка, голыя, у основанія сросшіяся въ очень короткое кольцо; завязь железистая; коробочка какъ у *Lysimachia*.

722. *N. guttata Moench.*

Naumburgia thyrsoflora Rehb. Her., стр. 227.—Цин., № 953—Lind., p. 138.

Lysimachia thyrsoflora L. Бух. II, № 339.—Бух. I, № 320.—F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, № 622.—Piaz., p. 18.—Кауф. I, стр. 406.—Ann., C. V, № 45.—Дв., № 214.—Макс., № 197.—Hoff. II, № 1390.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 37.—Hoff., № 1988.—Ad., p. 107.—St. II, p. 12.—St. I, № 130.—Pal., № 322.

Корневище ползучее съ побѣгами; стебель 30—70 см., прямостоящій, внизу съ рѣдкими и мелкими чешуйчатыми листьями, въ верхней части, какъ и цвѣтоножки, пушистый; листья узколанцетные, острые, цѣльнокрайніе, сидячіе, слегка стеблеобъемлющіе, супротивные, рѣже мутовчатые по 3—4, покрыты съ обѣихъ сторонъ, какъ чашелистики и концы лепестковъ, красноватыми точечками; иногда нижняя сторона листьевъ опушена; цвѣточныя кисти густыя, продолговато-яйцевидныя въ пазухахъ среднихъ листьевъ на болѣе или менѣе длинныхъ цвѣтоносахъ, но значительно короче листьевъ; чашелистики линейные, островатые, короче желтаго вѣничка; столбикъ нитевидный съ тупымъ рыльцемъ; коробочка шаровидная, у верхушки съ красными точечками.



Naumburgia guttata.

По болотамъ, канавамъ, по берегамъ рѣкъ и прудовъ, часто. Цвѣтеть съ начала іюня до середины іюля; плоды съ половины іюля.

299. *Lysimachia L.*

Цвѣтокъ 5-ной (рѣже 4-ной); чашечка глубоко-раздѣльная; вѣничекъ съ очень короткой трубкой, колесовидный, глубоко-раздѣльный, безъ промежуточныхъ зубцовъ между долями; тычинки короче вѣничка, б. ч.

у основанія сросшіяся; завязь безъ железокъ; коробочка 5-створчатая, рѣже вслѣдствіе срастанія створокъ 2—3-створчатая.

723. *L. vulgaris* L. Бух. II, № 340.—Бух. I, № 321.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 219.—Кауф. II, № 623.—Цил., № 954.—Pinz., p. 18.—Кауф. I, стр. 406.—Lind., p. 138.—Дв., № 213.—Макс., № 198.—Hoff. H., № 1392.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 37.—Hoff., № 1990.—Ad., p. 106.—St. II, p. 12.—St. I, № 129.—Pal., № 320.

Корневище ползучее съ б. или м. длинными побѣгами; стебель прямостоящій. 60—150 см., слабо гранистый, пушистый, особенно въ верхней части, какъ цветоножки и нижняя сторона листьевъ; листья мутовками по 3—5 или супротивные, на очень короткихъ черешкахъ, яйцевидно-ланцетные или продолговато-ланцетные, заостренные, цѣльно-крайніе, рѣже нижніе слабо волнисто-городковые, поверхность усьяна черно-бурыми просвѣчивающими железками; цвѣты желтые собраны небольшими метельчатыми соцвѣтіями верхушечными и въ углахъ верх-



Lysimachia vulgaris.



Lysimachia nummularia.

нихъ листьевъ; доли вѣничка яйцевидныя, тупыя, по краю голыя; доли чашечки ланцетныя, острыя, съ темно-красной каймой и по краю железисто-рѣсничатыя; тычинки срались почти до середины въ кольцо и прикрываютъ завязь; коробочка съ остающимся столбикомъ.

По канавамъ, по сырмъ, опушкамъ и по сырмъ кустарникамъ, часто. Цвѣтетъ съ середины іюня до середины августа; зрѣлые плоды съ середины августа.

724. *L. nummularia* L. Бух. II, № 341.—Бух. I, № 322.—Пет., стр. 219.—Кауф. II, № 624.—Цил., № 955.—Pinz., p. 18.—Кауф. I, стр. 406.—Lind., p. 138.—Ann., C. V, № 46.—Дв., № 215.—Макс., № 196.—Gold. C., p. 18.—Hoff. H., № 1388.—Mart., p. 37.—Hoff., № 1987.—Ad., p. 107.—St. I, № 130.—Pal., № 323.

Lysimachia nummularia L. F. O., № 7, p. 102.

Стебель 10—60 см., тонкій, лежачій, ползучій, укореняюційся, голый, какъ и все растеніе; листья супротивные на очень короткихъ черешкахъ, округлые, тупые, у основанія слегка сердцевидные, съ очень мелкими и рѣдкими бурыми точечными железками; цвѣты одиночные, пазушные, на 4-гранныхъ цвѣтоножкахъ, не превышающихъ листья и покрытыхъ бурими точечками; доли чашечки яйцевидно-сердцевидныя, острые; вѣничикъ ярко-желтый, въ 2—3 раза длиннѣе чашечки и съ внутренней стороны съ бурими точечками, б. ч. 5-раздѣльный, но бываетъ и 4-раздѣльнымъ; тычинки спаяны только у самого основанія.

По сырымъ мѣстамъ, кустарникамъ и по лугамъ, часто. Цвѣтетъ съ середины іюня до середины августа.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

2. *longepedunculata* Weinm. F. O., № 7, p. 102.—Цин., стр. 297.

Цвѣтоножки значительно длиннѣе листьевъ. Мож. у. (Ф. О.).—Откосъ къ р. Пахрѣ близъ с. Зеленаго, Брн. у. (С.).

300. *Andrósace* L.

Цвѣтокъ 5-ной; чашечка колокольчатая или трубчатая; вѣничикъ блюдчатый, трубка его кубичная, къ зѣву суженная и въ зѣвѣ съ коронкой изъ 5 полыхъ чешуекъ; тычинки прикрѣплены къ трубкѣ вѣничика, съ короткими свободными нитями; пыльники округлые; столбикъ б. ч. короткій; коробочка вскрывается наверху 5 створками.

1. Вѣничикъ короче чашечки.

A. elongata L.

Вѣничикъ длиннѣе чашечки. 2.

2. Чашечка 5-гранная; растеніе покрыто б. или м. густо вѣтвистыми волосками.

A. septentrionalis L.

Чашечка округлая не гранная; растеніе почти голое или особенно въ верхней части покрыто железистыми волосками.

A. filiformis Retz.

725. *A. elongata* L. Пет. Кр. II, стр. 130. — Пет., стр. 136. — Кауф. II, № 617. — Цин., № 948. — Рупр., стр. 88. — Кауф. I, стр. 404.

Листья только корневые, розеткой, эллиптическо-ланцетные или ланцетные, пильнокрайніе или съ 2—3 зубцами въ верхней половинѣ, по краямъ и по поверхности съ вильчатыми волосками; цвѣточная стрѣлка одна или ихъ нѣсколько, б. ч. почти равной высоты (3—10 см.), съ вильчатыми волосками, какъ цвѣтоножки и чашечки; цвѣтоножки сперва 0.5—1.5 см. дл. къ созрѣванію коробочки удлинняются и часто достигаютъ длины стрѣлки; прицвѣтники въ видѣ обертки, листочки ея часто почти столь же крупныя, какъ и листья; вѣничикъ бѣлый, опадающій, на половину короче 5-гранной желтоватой чашечки съ зелеными зубцами, равными ей трубкѣ; коробочка съ твердыми стѣнками, вскрывается до середины большими прямыми зубцами; сѣменосъ тонкій, почти линейный; сѣмянъ не болѣе 20.


По паровымъ полямъ и холмамъ, не рѣдко. Цвѣтетъ съ начала мая; зрѣлые плоды съ начала іюня. Строгино. Щукино. Протопоново. Невѣрово. Кзм. у. (К.).—Тушино (Гей.).—Шеламово. Вер. у.; Симоновъ монастырь (Н.).—Близъ Боровскаго кургана. Бри. у.; Лужки. Зиброво. Срп. у. (С.).—Рождествено на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

726. A. septentrionalis L. Пет. Кр. II, стр. 130.—Бух. II, стр. 35.—Пет., стр. 136.—Кауф. II, № 618.—Цин., № 946.—Pinz., p. 18.—Кауф. I, стр. 404.—Lind., p. 138.—Ann., С. III, № 246.—Дв., № 208.—Макс., № 193.—Hoff. II., № 1342.—Gold. С., p. 18.—Mart., p. 35.—Ad., p. 102.—Jab. Tr., p. 119.—St. II, p. 12.—St. I, № 125.—Pal., № 313.

Листья только корневые. розеткой, къ основанію суженные, цѣльно-крайніе, въ верхнихъ двухъ третяхъ зубчатые, съ обѣихъ сторонъ и по краямъ покрыты вѣтвисто-вилчатыми волосками; цвѣточная стрѣлка одна, чаще ихъ нѣсколько, при чемъ средняя (7—25 см.) много длиннѣ боковыхъ*), всѣ покрыты вѣтвистыми волосками; цвѣты въ 10—25-лу-



Androsace elongata.



Androsace septentrionalis.

чевомъ зонтикѣ; цвѣтоножки во время цвѣтенія короткія, около 1 см., потомъ удлинняются до 3,5 см. и б. ч. неравной длины; у основанія каждой цвѣтоножки маленькій ланцетный прицвѣтникъ; вѣличекъ бѣлый, опадающій, длиннѣ чашечки, послѣдняя 5-гранная желтоватая съ зелеными зубцами, короче ея трубки; коробочка съ твердыми стѣнками, вскрывается до середины большими прямыми зубцами; сѣменосъ тонкій, почти липкій, сѣмянъ не болѣе 20.

По лугамъ, холмамъ и паровымъ полямъ, часто. Цвѣтетъ съ начала мая до начала іюня; плоды съ середины іюня.

*) Часто встрѣчаются особи съ сплюснутымъ стеблемъ.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

2. *gigantéa* Goldb. Пет. Кр. II, стр. 130.

Во всѣхъ частяхъ много крупнѣе: средняя стрѣлка до 35 см.; цвѣтоножки очень тонкія, не короче 2 см., во время плодоношенія до 5,5 см., очень неравной длины. Серпуховъ, опушка лѣса (II).—Серебряный боръ близъ Хорошова (II и С).—Боровскій курганъ, Бри. у. (С).

727. *A. filifórmis* Retz. Пет. Кр. II., стр. 130.—Бух. II, № 338.—Бух. I, № 324.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 136.—Кауф. II, № 619.—Мил., № 29.—Гор., № 37.—Цин., № 949.—Рупр., стр. 87.—Кауф. I, стр. 404.

Листья только корневые, розеткой, суженные въ черешокъ, въ верхнихъ двухъ третяхъ выемчато-зубчатые, овальные или яйцевидные, съ обѣихъ сторонъ голые или съ рѣдкими железистыми волосками; цвѣточная стрѣлка 5—18 см., одна или нѣсколько, но срединная всегда выше боковыхъ, въ нижней части стрѣлки голая, въ верхней—б. или м. густо покрыта железистыми волосками; цвѣтоножки очень тонкія, въ числѣ 3—50, къ созрѣванію коробочки удлинняются и часто равны стрѣлкѣ; прицвѣтники очень мелкіе, ланцетные; вѣничекъ бѣлый, не опадающій, прикрываетъ коробочку; чашечка округлая, безъ граней, зеленоватая; коробочка становится тонкостѣнной, просвѣчивающей и вскрывается 5 маленькими закручивающимися зубчиками; сѣменосъ толстый; сѣмена очень мелкія, многочисленныя, до 140 въ коробочкѣ.



Androsace filiformis.

По сырымъ травянистымъ мѣстамъ въ лѣсахъ и по лѣснымъ дорогамъ. Цвѣтетъ почти съ начала мая до августа. Лосинный островъ (М.).—Спасская платформа М.-Яр. ж. д.: Останкино, Свиблѣво (Гей.).—Пушкино въ лѣсу „Царь-Даръ“ (С.).—Воскресенскъ, Зви. у. (Кр.).—По дорогѣ изъ Новаго Іерусалима въ Звенигородъ (Экск. Бот. Лаб.).—Борисовскій удѣльный лѣсъ, Мож. у. (Мос.).—Корчагино, Кли. у. (II).—Михайловское, Илл. у. (Б.).—Лѣвый берегъ р. Пахры близъ д. Канаково, по берегу Юрьевского озера, Илл. у. (X.).—Рождествено на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

301. *Primula* L.

Цвѣтокъ 5-ной; чашечка колокольчатая или трубчато-колокольчатая, 5-зубчатая, остается при плодѣ; вѣничекъ съ длинной трубкой, воронковидный или гвоздевидный; тычинки съ очень короткими нитями прикрѣплены къ трубкѣ вѣничка, въ мѣстѣ прикрѣпленія трубка расширена; лѣвъ б. ч. съ чешуйками; коробочка вскрывается наверху 5 створками.

часто 2-раздѣльными. Встрѣчаются особи, у которыхъ тычинки прикрѣплены близь зѣва вѣнчика, и тогда столбикъ короткій, длиною около половины трубки, или особи съ тычинками, прикрѣпленными въ срединѣ трубки, и тогда столбикъ длинный, равный трубкѣ, а рыльце доходить до зѣва вѣнчика.

728. *P. veris* (L. excl. var. β et γ .) Huds.

Primula officinalis Jacq. Пет. Кр. II, стр. 129.—Бух. II, № 337.—Бух. I, № 319.—Ф. О., № 7, p. 102.—Пет., стр. 251.—Кауф. II, № 616.—Цин., № 943.—Кауф. I, стр. 403.—Lind., p. 138.—Ann., C. I, № 43.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 36.

Primula veris L. Дв., № 209.—Hoff. H., № 1362.—Hoff., № 2601.—Ad., p. 103.—St. I, № 126.

Primula veris L. α . *officinalis* Mart. Макс., № 194 α .—Pal., № 314 α .

Primula veris L. β . *Elatior* Mart. n. v. Макс., № 194 β .—Pal., № 314 β .

Primula elatior Jacq. Дв., № 210.—Mart., p. 36.—Ad., p. 103—104.

Primula vulgaris Sm. Hoff. II., № 1365.



Primula veris.

Листья только корневые, морщинистые, продолговатые или яйцевидные, тупые постепенно или быстро сужены въ крылатый черешокъ, по краямъ волнисто-городковые, съ обѣихъ сторонъ или только съ нижней бархатисто-пушистые, какъ цветоножки и стрѣлка; послѣдняя 10—30 см.; цвѣты поникающіе въ одну сторону, собраны зонтикомъ, къ созрѣванію плода плодоножки торчатъ вверхъ; прицвѣтники ланцетно-шиловидные; чашечка 5-гранная, зубцы ея яйцевидные, заостренные; вѣнчикъ желтый съ вогнутымъ отгибомъ и въ зѣвѣ съ 5 оранжевыми пятнами; коробочка яйцевидная, короче чашечки.

По кустарникамъ, лѣсамъ и полямъ, очень часто. Цвѣтетъ съ начала мая до первыхъ чиселъ іюня; плоды съ середины іюля.

302. *Hottónia* L.

Цвѣты 5-ные; чашечка глубоко-раздѣльная; вѣнчикъ гвоздевидный, съ довольно длинной трубкой, въверху которой прикрѣплены тычинки съ очень короткими нитями; столбикъ длинный, остается при плодѣ; коробочка овальная, вскрывается съ боковъ 5 створками, въверху и внизу спаянными; сѣмена овальные, у основанія съ рубчикомъ. У однихъ особей тычинки выдаются изъ вѣнчика, а столбикъ равенъ трубкѣ, у другихъ—столбикъ далеко выдается изъ вѣнчика, а тычинки равны трубкѣ.

729. *H. palústris* L. Ф. Б., № 79.—Ф. О., № 7, p. 102.—Пет., стр. 202.—Кауф. II, № 621.—Цин., № 942.—Кауф. I, стр. 405.—Lind., p. 138.—Дв., № 195.—Hoff. II., № 1378.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 36.—Ad., p. 105.—St. II, p. 12—St. I, № 128.—Pal., № 319.

Стебель 6. ч. погруженъ въ воду, членистый, до 60 см., съ мутовчатыми листьями, сближенными у основанія цветошной стрѣлки почти розеткой; листья гребенчато-перисто-раздѣльные, ярко-зеленые, съ острыми линейными дольками, совершенно голые, лоснящіеся; стрѣлка въ началѣ цвѣтенія не высокая, постепенно удлиняется и перѣдко достигаетъ 45 см., въ верхней части железисто-волосистая, какъ чашечка и цветоножки, сперва торчащая, потомъ отогнутая книзу; цвѣты на стрѣлкѣ мутовками по 3—6; прицѣтки почти линейныя; чашечныя доли линейно-ланцетныя; вѣничекъ бѣлый, розоватый или лиловатый, съ желтымъ зѣвомъ; доли его продолговатыя, тупыя.

По канавамъ и медленно текущимъ водамъ, не часто; по высыханіи канавъ растеніе лежитъ на тинѣ и кажется болотнымъ, а не воднымъ. Цвѣтетъ съ конца мая, иногда до конца іюня; зрѣлые плоды съ начала іюля. Кунцово (А.). — Симоновъ монастырь; Измайлово, (Мар.). — Раменское, Бри. у. (К.). — Близъ Воробьевыхъ горъ (Ген.). — Горенки (Шатерникова). — Близъ Тюфелевой рощи; Вилки, Бри. у. (Х.). — Алексѣевка, Ваулино, Починки, Соколово, Мож. у. (Ф. О. и Ф. Б.). — Городище, Райки, Бгр. у. (П.). — Близъ Боровскаго кургана, Бри. у.; близъ Лужковъ, Сри. у. (С.). — Въ канавѣ у казеннаго лѣса близъ Вирева, Клн. у. (П. и С.). — Засѣменье, Клн. у. (П.).



Hottonia palustris.



Cortusa Matthioli.

303. *Cortusa* L.

Цвѣты 5-ные; чашечка глубоко-раздѣльная; вѣничекъ ворончатый, глубоко-раздѣльный, съ острыми лопастями, трубка его очень короткая; тычинки прикрѣплены у основанія вѣничка; нити очень короткія, спаяны въ кольцо; пыльники обратно-сердцевидные, длинно-заостренные, сходящіеся; столбикъ длиннѣе вѣничка; коробочка вскрывается на верхушкѣ 5 створками.

730. **C. Matthioli L.** Пет. Кр. II, стр. 131.—Ф. Б., № 78.—Пет., стр. 171.—Кауф. II, № 620.—Гор., № 68.—Цин., № 950.

Листья только корневые на длинных шерстистых черешках; пластинка их въ очертаніи сердцевидно-округлая, съ 7—13 не глубокими лопастями, по краямъ зубчатыми, съ верхней стороны темнѣе, съ обѣихъ сторонъ б. или м. густо шерстистоволосистая; цвѣточные стрѣлки 10—30 см., всегда длиннѣе листьевъ; цвѣты малиновые, собраны зонтикомъ, попкающіе, на неравныхъ цвѣтоножкахъ и у основанія съ продолговато-клиновидными прицвѣтниками, образующими какъ бы обвертку; зубцы чашечки треугольно-ланцетные, короче вѣничка.

Цвѣтетъ съ начала мая; въ плодахъ въ концѣ іюня. На известнякахъ по берегу Москвы рѣки близъ Григорова, Руз. у. (II. и Ч.).—Тамъ же, по близъ погоста Кортиня (Ф. О. и Ф. Б.).—Тамъ же, по близъ ст. Мухино по берегу р. Москвы „Полевскій приломъ“ (С.).

Порядокъ Contortae.

76 сем. Oleaceae Lindl.

Цвѣты обоеполые, рѣже однополые, голые или съ покровами, и тогда чашечка 4-зубчатая или надрѣзная; вѣничикъ правильный, въ почко-сложеніи створчатый, о 4 зубцахъ или надрѣзахъ; двѣ супротивныя тычинки чередуются съ плодоносниками и прикрѣплены къ трубкѣ вѣничка или, если его нѣтъ, то у основанія завязи; пыльники вскрываются продольной трещиной; завязь верхняя, 2-гнѣздная съ однимъ столбикомъ и съ 2-лопастнымъ или головчатымъ рыльцемъ; сѣмечекъ въ каждомъ гнѣздѣ 2—висячихъ, изъ которыхъ развивается въ сѣмя часто только одна; плодъ—коробочка, крылатка или ягода; сѣмя съ бѣлкомъ и прямымъ зародышемъ. Деревья и кустарники съ супротивными листьями безъ прилистниковъ.

* Syringa L.

Цвѣты обоеполые; чашечка 4-зубчатая; вѣничикъ гвоздевидный, съ длинной трубкой и 4-раздѣльнымъ отгибомъ; тычинки прикрѣплены къ трубкѣ вѣничка и заключены въ ней; рыльце двулопастное; плодъ—двустворчатая коробочка; гнѣзда 1—2-сѣменные; створки кожистыя съ продольной перегородкой посрединѣ.

* **S. vulgaris L.** Пет. Кр. II, стр. 69.—Пет., стр. 288.—Кауф. II, стр. 330.—Цин., стр. 298.—Кауф. I, стр. 321.—Дв., № 6.—Макс., № 8.—Нoff. II., № 61.—Mart., p. 4.—St. II, стр. 4.—St. I, № 5.—Pal., № 24.

Кустарникъ или дерево въ 3—4 м., съ сѣрой корой; листья на черешкахъ въ 1.5—2 см., продолговато-сердцевидные или сердцевидно-овальные, къ верхушкѣ заостренные, голые, цѣльнокрайніе; цвѣты лиловые или бѣлые, пахучіе, въ конечныхъ густыхъ пирамидальныхъ ме-

телкахъ, часто парныхъ; чашечка съ нѣскольکو неравными зубчиками; вѣничекъ слегка железисто-опушенный, трубчато-гвоздичный.

Разводится по садамъ. Цвѣтеть съ половины мая.

α. fl. pleno Hort.

Съ махровыми цвѣтами.

* *S. Josikaea Jacq. fil.* Пет. Кр. II, стр. 69.

Кустарникъ въ 2—4 м., съ сѣрой корой и съ молодыми опушенными вѣтвями; листья нѣсколько кожистые на длинныхъ черешкахъ, эллиптическіе или эллиптическо-ланцетные, иногда обратно-яйцевидные, къ основанію сужены, б. или м. быстро переходить въ черешокъ, къ верхушкѣ



Syringa vulgaris.



Syringa Josikaea.

заостренные, цѣльнокрайніе, съ верхней стороны темно-зеленые, съ нижней—сѣровато-зеленые; цвѣты темно-лиловые, слабо-пахучіе, въ конечныхъ, рѣдкихъ, узкихъ пирамидальныхъ метелкахъ; чашечка съ неясными, острыми зубчиками; вѣничекъ трубчато-булавовидный.

Разводится по садамъ. Цвѣтеть съ начала іюня.


304. *Fráxinus L.*

Цвѣты обоеполые или разнополые, безъ околоцвѣтника; мужскіе изъ 2 тычинокъ; обоеполые—изъ 2-гнѣздной завязи съ короткимъ столбикомъ, 2-лопастнымъ рыльцемъ, и изъ 2 тычинокъ, прикрѣпленныхъ у основанія завязи; плодъ—сплюснутая крылатка, односѣменная.

731. *F. excelsior L.* Пет. Кр. II, стр. 69.—Бух. II, № 273.—Ф. Б., № 57.—Бух. I, № 261.—Пет., стр. 189.—Кауф. II, № 494.—Цин., № 958.—Кауф. I, стр. 321.—Lind., p. 138.—Ann., C. IV, № 28.—Дв., № 44.—Макс., № 9.—Hoff. H., № 7934.—Gold. C., p. 23.—Gold. Sp., p. 140.—Mart., p. 176.—Hoff., № 1387.—St. II, p. 57.—Pal., № 2192.

Высокое развѣсистое дерево съ буро-черными бархатистыми почками, сѣро-зелеными вѣтвями и сѣрой корой; листья непарно-перистые, о 9—15 почти сидячихъ листочкахъ, послѣдніе 6—11 см. дл. и 1,5—4,5 см. ш., продолговато-эллиптическіе или яйцевидно-ланцетные, на верхушкѣ заостренные, къ основанію б. или м. суженные, особенно непарный листокъ, основаніе котораго часто бываетъ длинно-клиновидное; все листочки по краямъ зубчатые, гоные, снизу свѣтлѣе, иногда вдоль срединной жилки опушенные; цвѣты въ маленькихъ кистяхъ, собранныхъ пучками, распускаются до листьевъ; плодъ—крылатка, линейно-продолговатая, въ верхней части нѣсколько расширенная, на верхушкѣ б. ч. съ выемкой.

Дикимъ встрѣчается рѣдко, чаще одичалое и разводится; въ сѣверной части губерніи страдаетъ отъ мороза. Цвѣтеть съ конца апрѣля; плоды съ середины августа. Воробьевы горы, Куцово, Петрово (К.).—Между Шутиковымъ и Софьинымъ, Мож. у. (В.).—Между ст. Мухино и имѣніемъ Барановка, Ряз. у. (Г. О.).—Близъ Анофриева, Ряз. у.; Боровскій курганъ, Брн. у. (П. и С.).—Вороново, Михайловское, Пдл. у. (В.).—Рождествено на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).



Fraxinus excelsior.



Fraxinus americana.

Еще разводится слѣдующая форма:

2. *monophylla* Desf.

Fraxinus excelsior L. b. *simplicifolia* Mart. Пет. Кр. II, стр. 69.—Mart., p. 176.

Листья простые, яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, иногда у основанія съ 1—2 лопастями, близъ верхушки неравно- и крупно-зубчатые, иногда мѣстами надрѣзано-зубчатые.

* ***F. americana* L.** Пет. Кр. II, стр. 69.—Цин., стр. 298.—Pal., № 2194.

Высокое дерево съ ржаво-сѣрыми почками; вѣтви сѣроватыя съ бѣлыми точками и сѣрой корой; листья непарно-перистые о 5—9 листочкахъ; послѣдніе 8—12 см. дл. и 3—6 см. ш. на короткихъ че-

решкахъ, яйцевидные, яйцевидно-ланцетные или продолговато-ланцетные, у основания б. ч. закругленные или очень быстро суженные, быстро или постепенно заостренные, почти цѣлюкрайніе, рѣже неравно- и неясно-зубчатые, особенно бѣлизъ верхушки, сверху ярко-зеленые, снизу сѣровато-зеленые, въ молодости слегка опушенные, потомъ голые или слабо опушенные только вдоль срединной жилки; цвѣты какъ у *F. excelsior* L.; крылатки продолговатыя или продолговато-ланцетныя, къ верхушкѣ нѣсколько расширенныя и б. ч. съ выемкой, 3—3,5 см. дл. и 5—6 мм. ш.; сѣмя равно половинѣ или трети крыла.

Иногда разводится.

77 сем. *Gentianáceae* Juss.

Цвѣты правильные, обоюполые; чашечка 4—5-надрѣзная или раздѣльная; вѣничикъ трубчатый, колокольчатый, колесовидный или гвоздевидный. 4—5 (рѣдко 8)-надрѣзной; тычинки по числу долей вѣничика и чередуются съ послѣдними; завязь верхняя изъ 2 плодolistиковъ, одногнѣзная, рѣже двугнѣзная или съ 2 неполными гнѣздами и съ 2 или 4 стѣнными сѣменосами у края створокъ; сѣменочекъ на каждомъ сѣменосѣ много въ нѣсколько рядовъ; столбикъ одинъ съ головчатымъ или двулопастнымъ рыльцемъ или рыльце сидячее; плодъ—двустворчатая коробочка, часто на ножкѣ и съ остающимся засохшимъ вѣничкомъ, рѣже плодъ вскрывается неправильно или не вскрывается; сѣмянъ горизонтальныхъ много, съ маленькимъ прямымъ зародышемъ и большимъ бѣлкомъ. Травы безъ прилистниковъ.

Опредѣлитель родовъ.

1. Цвѣты желтые; растеніе водяное; листья плавающие.

Limnanthemum.

Цвѣты иной окраски; растенія наземныя или болотныя, листья не плавающие. 2.

2. Листья тройчатые.

Menyanthes.

Листья простые. 3.

3. Столбикъ длинный, нитевидный; цвѣты розовые. *Centaurium*.

Рыльце почти сидячее; цвѣты синіе или лиловые. *Gentiana*.

305. *Menyanthes* L.

Чашечка 5-раздѣльная; вѣничикъ нѣсколько мясистый, воронковидный, 5-раздѣльный, доли его съ внутренней стороны мохнатыя; вокругъ основанія завязи рѣсничатое кольцо; столбикъ нитевидный съ двулопастнымъ рыльцемъ; коробочка одногнѣзная, почти шаровидная, вскрывается неправильно 2 створками; сѣменосы по срединѣ створокъ; сѣмена съ толстой твердой кожурой.

732. *M. trifoliata* L. Бух. II, № 277, — Бух. I, № 264. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 224. — Кауф. II, № 501. — Цин., № 972. — Кауф. I, стр. 328. — Lind., p. 140. — Ann., C. II, № 142. — Др., № 211. — Макс., № 200. — Hoff. II., № 1377. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 36. — Hoff., № 2089. — Ad., p. 104. — St. II, p. 12. — St. I, № 127. — Pal., № 318.

Корневище длинное, толстое, ползучее, чешуйчатое, въ узлахъ съ пучками тонкихъ корней; листья тройчатые на длинныхъ цилиндрическихъ черешкахъ, къ основанію расширенныхъ въ охватывающее стебель влагалище; листочки на очень короткихъ черешкахъ, продолговато-обратно-яйцевидные, туповатые, голые, какъ и все растение; края ихъ цельные, рѣже съ не частыми маленькими, едва замѣтными городками; цветочная стрѣлка боковая, 12 — 35 см.; цветы собраны кистью, иногда въ кисти какъ бы мутовчато; у каждого цвѣтка прицвѣтникъ нѣсколько короче цветоножки; чашечка съ тупыми долями; вѣнчикъ бѣлый, внутри часто розоватый, съ острыми долями.

По болотамъ, берегамъ рѣкъ и канавъ, часто. Цвѣтетъ съ половины мая до половины іюня, иногда во второй разъ въ концѣ августа; плоды съ конца мая.



Menyanthes trifoliata.



Limnathemum nymphaeoides.

306. *Limnánthemum* Gmel.

Чашечка 5-раздѣльная; вѣнчикъ колесовидный, въ зѣвѣ рѣсничатый, отгибъ его 5-раздѣльный, по краямъ бахромчатый; тычинки съ короткими нитями; у основанія завязи 5 маленькихъ железокъ, чередующихся съ тычинками; столбикъ короткій съ двулопастнымъ рыльцемъ; плодъ одногнѣздный, яйцевидный съ стѣнными сѣменосами, вскрывается неправильно или не вскрывается.

733. *L. nymphaeoides* (L.) Link.

Корневище ползучее; стебель 60—150 см., плавающий; листья сверху темно-зеленые, лоснящіеся, снизу покрыты буроватыми желе-

лиственными бугорками, какъ стебель и черешки; корневые и нижніе стеблевые листья на длинныхъ черешкахъ, верхніе стеблевые—супротивные, на короткихъ черешкахъ, съ влагалищемъ, вѣтвляющіеся на поверхности воды, округлые съ глубокой и узкой выемкой у сердцевиднаго основанія; края глянцевые или едва замѣтно угловатые; цвѣты желтые на длинныхъ цветоножкахъ, пучками въ пазухѣ одного изъ листьевъ; въ сущности, цвѣточный пучекъ верхушечный рядомъ съ почкой вѣтви, которая, развиваясь, служить продолженіемъ стебля; вѣничикъ до 3 см. въ поперечникѣ, доли его обратно-яйцевидныя, на верхушкѣ округлыя; коробочка яйцевидная, сплюснутая; плодоножки загибаются дугообразно книзу.

Въ рѣкѣ Сѣтунѣ близъ д. Нѣмчинова, въ большомъ количествѣ; пока только одно мѣстонахожденіе; найдено впервые въ августѣ 1905 г. (гр. Е. и В. Соллогубъ). Цвѣтетъ съ начала іюня, весь августъ.

307. *Gentiana L.*

Чашечка трубчатая или колокольчатая, 4—5-раздѣльная или надрѣзная (рѣдко надрѣзовъ у чашечки бываетъ до 10), иногда чашечка однобокая наподобіе влагалища въ видѣ свернутаго листа, наверху зубчатого; вѣничикъ трубчатый, колокольчатый или трубчато-колокольчатый, въ почкосложеніи скрученный, съ 4—5-надрѣзнымъ отгибомъ, иногда съ маленькими зубчиками между долями; тычинки заключены въ вѣничикъ; пыльники не скручиваются; рыльце почти сидячее, двулопастное; коробочка иногда на ножкѣ, продолговато-ланцетная, одногнѣздная съ 2 стѣнными сѣменосами.

1. Цвѣты въ зѣвѣ съ длинными бахромками. 2.

Цвѣты въ зѣвѣ безъ бахромокъ. 3.

2. Междоузлій 3—6; средніе листья тупые; доли чашечки б. или м. неровныя, съ острыми выемками между ними; рыльца овальныя.

G. linguata C. A. Agardh.

Междоузлій 6—12; средніе листья острые; доли чашечки почти равныя, съ тупыми или округлыми выемками; рыльца ланцетныя.

G. axillaris F. W. Schmidt.

3. Цвѣты крупныя, темно-синіе; вѣничикъ съ 5 долями.

G. Pneumonanthe L.

Цвѣты внутри голубые, снаружи сѣро-зеленые, средней величины; вѣничикъ обыкновенно съ 4 долями.

G. cruciata L.

734. *G. cruciata L.* Мос., № 20.—F. O., № 6, p. 86.—Кауф. II, № 498.—Цин., № 971.—Кауф. I, стр. 326.—Lind., p. 140.—Ann., C. III, № 239.—Дв., № 280.—Макс. Пут., стр. 78.—Hoff. H., № 2101.—Mart., p. 49.—Hoff., № 1440.—St. II, p. 17.

Gentiana Cruciata L. Пет., стр. 193.—Макс., № 266.—Pal., № 524.

Корневище толстое; стебли 15—50 см., прямостоящие или основаніемъ приподнимающіеся, съ 2 слабыми ребрышками, голые, какъ и все



Gentiana cruciata.

растение; листья нѣсколько мясистые, супротивные, продолговато-ланцетные, туповатые, сросшіеся своимъ основаніемъ въ влагалище, очень длинное у нижнихъ и болѣе короткое у верхнихъ; цвѣты скучены пучками въ пазухахъ верхнихъ листьевъ и на верхушкѣ стебля; чашечка равна трети вѣнчика, перепончатая съ 4 линейно-ланцетными долями, изъ которыхъ обыкновенно двѣ супротивныхъ длиннѣе двухъ другихъ; вѣнчикъ средней величины (20—24 мм.), булавовидно-колокольчатый, снаружи сѣро-зеленый, внутри голубой, съ 4 яйцевидными долями, между которыми 4 ланцетныхъ маленькихъ промежуточныхъ долекъ; трубка вѣнчика съ 4 гранями; коробочка на короткой ножкѣ.

На известняковой и глинистой почвѣ, по лугамъ и кустарникамъ. Цвѣтеть съ половины іюли до конца августа. Близъ Петропа, Раменки; Каропчеево, Кзм. у. (К.).—Амшево, Троицкое (А.).—Воробьевы горы (Ген., Дв.).—Звенигородъ (Маевск.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.).—Рѣсная поляна близъ р. Десны между Скобелевымъ и Лантевской мельницей, Пдл. у. (Мос.).—Добрытино близъ Подольска (Куль.).—Между д. Съяново и Повлинской, Пдл. у. (Х.).—Близъ Серпухова (Ар.).—Рождествено на р. Нарѣ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Сырой лугъ между Шильковымъ и Ильинимъ по р. Медвѣдкѣ, Кзм. у. (П. и С.).—Протопоново, Бѣлые Колодези, Кзм. у. (П.).—Боровскій курганъ, Бри. у. (С.).

735. *G. Pneumonánthe* L. Бух. II, № 276. — Ф. О., № 6, p. 86. — Пет., стр. 193. — Кауф. II, № 499. — Цин., № 970. — Кауф. I, стр. 326. — Lind., p. 140. — Алп., С. I, № 34. — Дв., № 283. — Макс., № 267. — Макс. Пут., стр. 242. — Hoff. II, № 2215. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 49. — St. II, p. 17. — St. I, № 172. — Pal., № 521.

Корневище толстое съ толстыми корнями и однимъ или нѣсколькими стеблями; послѣдніе до 60 см., простые, голые, какъ и все растение, или слегка шереховатые; нижніе листья очень маленькіе, почти чешуевидные, остальные—линейно-ланцетные, туповатые, съ завернутыми внутрь краями, сверху темно-зеленые, снизу свѣтлѣе, супротивные, сросшіеся основаніемъ въ короткое влагалище *); цвѣты одиночные или парные въ

*) Н. Кауфманъ встрѣчалъ въ Павловскомъ посадѣ, Бгр. у., съ широкими, овально-ланцетными листьями.

пазухахъ верхнихъ листьевъ и на верхушкѣ стебля въ видѣ кисти; у основания чашечки два прицвѣтника въ видѣ листьевъ; вѣнчикъ крупный (3—4 см.), ярко-синій съ 5 зеленоватыми полосками снаружи и крапинками внутри, ворончато-колокольчатый, съ 5 явственными долями, между которыми треугольныя промежуточныя дольки; чашечка б. ч. короче половины вѣнчика; пыльники сперва слипшіеся, потомъ свободныя; коробочка на длинной ножкѣ.

По кустарникамъ и сырýmъ лугамъ. Цвѣтетъ съ середины іюля до сентября. Измайлово, по дорогѣ изъ Братцова въ Павшино; Воскресенскъ. Бри. у. (К.).—Зыково (А.).—Кусково; Звенигородъ (Маевск.).—Мытищи (С.). Сатино, не далеко отъ Малоярославскаго шоссе. Пдл. у. (Б.).—Ватутинки, Пдл. у. (Я. В. Байковъ).—Семеновское за Калужской заставой; Городецъ подъ Павловскимъ посадомъ, Вгр. у.; Вострянское, Клм. у.; Губино, Бри. у. (П.).—Сырой лугъ между Шильковымъ и Пльинскимъ по р. Медвѣдкѣ, Клм. у. (П. и С.).—Невѣрово, Клм. у.; Можайскъ (Сюз.).—Между Таганьковымъ и Пазарьевымъ, Зви. у.; близъ д. Канустиной, Бри. у. (X.).

736. *G. lingulata* C. A. Agardh. Пет. Кр. II, стр. 72.—Бух. II, № 275.

Gentiana Amarella L. γ . *livonica* Esch. Бух. I, № 263.

Gentiana Amarella L. β . *livonica* Esch. F. O., № 6, p. 86.—Кауф. II, стр. 336.—Кауф. I, стр. 327.

Gentiana Amerella L. Цин., № 968.—Lind., p. 140. — Ann., C. II, № 143. — Макс., № 269.—Mart., p. 49.—St. I, № 174.—Pal., № 523.

Gentiana amarella L. Дв., № 282.

Gentiana campestris L. Цин., № 969.—Borg., p. 700.—Макс., № 268.—Макс. Пут., стр. 242.—Mart., p. 49.—St. II, p. 17.

Gentiana spatulata Pinz. Pinz., p. 15.



Gentiana Pneumonanthe.



Gentiana lingulata.

Стебель прямостоящій, 3—35 см., о 3—6 междоузліяхъ, изъ нихъ второе или третье длиннѣе прочихъ, а средняя б. или м. длиннѣе листьевъ; корневые листья лопатчатые, тупые или закругленные; стеблевые—овально-

продолговатые или продолговатые, туповатые, прямостоящие или отклоненные; верхніе—овально-ланцетные, заостренные; все голые или близъ верхушки слегка по краямъ шероховатые; цвѣты конечные и на боковыхъ вѣтвяхъ; послѣдній объ одномъ или немногихъ цвѣтахъ; чашечка съ ланцетными б. или м. неравными долями, раздѣленными острыми или островатыми выемками; вѣничикъ съ 5 долями безъ мелкихъ промежуточныхъ долекъ, лиловый съ желтоватой трубкой, въ зѣвѣ съ длинными бахромками; рыльца овальные; коробочка сидячая.

По сырýmъ лугамъ и кустарникамъ. Цвѣтеть съ середины іюня до середины іюля. Строгино, Гиллуша близъ Иванькова; Денисьево, Зви. у. (К.).—Близъ Богородскаго (А.).—Мытницы (С.).—Бузаево, Зви. у. (Х.).—Чижово; Макарово, Ряз. у. (Куль.).—Егорье (Георгіевскій погостъ) на р. Ламѣ, Вол. у. (Ч.).—Сырой лугъ близъ Косица; Охотино на р. Торгошѣ, Дмит. у.; Руза, Анофриево, Ряз. у.; Бородино, Мож. у.; по заливному лугу р. Нстры подъ Качабровымъ, близъ Матвѣйкова, Семеново, Зви. у.; Мячково, Брн. у. (П.).

737. *G. axillaris* F. W. Schmidt. Пет. Кр. II, стр. 72.

Gentiana Amarella L. *g. axillaris* Richb. F. O., № 6, p. 86.—Кауф. II, стр. 335.—Кауф. I, стр. 327.

Gentiana Amarella L. *g. pratensis* Froel. F. O., № 6, p. 86.—Кауф. II, стр. 336.—Кауф. I, стр. 328.

Gentiana pratensis Froel. Дв., № 281.—Макс., № 270.—Макс. Пут., стр. 242.—Хоф. II., № 2216.—Gold. C., p. 18.—Gold., Sp. p. 123.

Hippion axillaris Schmidt. Gold. Sp., p. 123.



Gentiana axillaris.

Стебель прямостоящій, до 60 см., о 6—12 почти равныхъ между собой междоузлїяхъ, изъ коихъ среднїя и нижнїя б. ч. не длиннѣе или короче листьевъ; корневые листья лопатчатые, тупые или закругленные; среднїе и верхнїе—оттопыренные, овально-ланцетные или ланцетные, на верхушкѣ острые, голые или по краямъ слегка шероховатые; цвѣты конечные и на боковыхъ вѣтвяхъ; послѣдній о немногихъ или о многихъ цвѣтахъ; доли чашечки линейно-ланцетныя, почти равныя, раздѣлены тупыми или округлыми выемками; вѣничикъ съ 5 долями безъ мелкихъ промежуточныхъ долекъ, лиловый съ желтоватой трубкой и въ зѣвѣ съ длинными бахромками; рыльца ланцетныя; коробочка сидячая.

По сухимъ лугамъ и холмамъ, рѣдко. Цвѣтеть съ конца іюля до сентября. Подъ Серпуховымъ (Макс.).—Мытницы, паровое поле (П. и С.).—Близъ Псупова, Брн. у. (С.).

308. *Centaurium Gilib.*

Чашечка трубчатая, гранистая, 5 надрѣзная; вѣничикъ съ длинной трубкой и 5—4-раздѣльнымъ отгибомъ, въ почкосложеніи скрученный,

воронковидный; тычинки выдаются из вѣнчика; пыльники послѣ цвѣтенія скручиваются; столбикъ длинный, нитевидный съ двулопастнымъ рыльцемъ; коробочка продолговато-линейная, отъ вдающихся внутрь сѣмьносовъ почти двугрѣзная, многосѣменная.

738. *umbellátum* Gilib.

Erythraea Centaurium Pers. Хор. II, стр. 19.—Пет. Кр. II, стр. 70.—Бух. II, № 274.—Бух. I, № 262.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 186.—Кауф. II, № 497.—Цин., № 966.—Pinz., p. 16.—Кауф. I, стр. 325.—Lind., p. 140.—Ann., C. IV, № 30.—Макс., № 201.—Hoff. II., № 1785.—Gold. C., p. 18.


Erythraea centaurium Pers. Дв., № 242.

Chironia Centaurium Schmidt. Mart., p. 42.—Hoff., № 859.

Gentiana Centaurium L. Дв., № 242.—Mart., p. 42.—St. II, p. 15.—St. I, № 173.—Pal., № 522.

Стебель прямостоящій, 15—45 см., съ 4 ребрами и у основанія съ б. или м. густой розеткой листьевъ; послѣдніе тупые или закругленные, продолговато-обратнояйцевидные, суженные въ черешокъ; стеблевые листья супротивные, сидячіе, ланцетные, заостренные; все растение голое; соцветіе верхушечное въ щитковидномъ полузонтикѣ съ верхушечнымъ цвѣткомъ почти сидячимъ; у каждаго развѣтвленія соцветія два супротивныхъ линейно-ланцетныхъ прицвѣтника; чашечка при распусканіи цвѣтка почти вдвое короче бѣловатой трубки вѣнчика; послѣдній розовый, рѣдко бѣлый, 1—2 см. дл., раскрывается въ срединѣ дня въ солнечную погоду.

По кустарникамъ, опушкамъ и холмамъ, на глинистой и песчаной почвѣ. Цвѣтетъ съ середины іюня почти до конца августа; плоды съ середины августа. Давыдково, Петрово. Братцово. Раменки (К.).—Лосиный островъ (А.).—Близъ Михайловскаго, Пдл. у. (В.).—По дорогѣ отъ г. Подольска къ д. Крюкова, Пдл. у. (Куль.).—По лѣвому берегу р. Нахры близъ д. Булатово и Чириково, Пдл. у. (Х.).—Рождествено на р. Нарѣ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Дракино, Сри. у. (С.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.).—Б. Алексѣевское. Бѣлые Колодези. Невѣрово. Кдм. у.; по дорогѣ изъ Мелехова въ Талежъ, Сри. у.; Ланково, Руз. у.; подъ Звенигородомъ (П.).



Centaurium umbellatum.

739. *C. pulchellum* (Sw.) Druce.

Erythraea pulchella Fries. Пет. Кр. II, стр. 70.

Стебель 5—15 см., съ 4 острыми гранями, почти съ основанія сильно вѣтвистый; корневой розетки лѣтъ, а только 2 маленькихъ супротивныхъ листа, ко времени цвѣтенія б. ч. уже увидшихъ; стеблевые

листья супротивные, продолговатые или продолговато-ланцетные, туповатые; верхние—почти линейные, острые: до разветвления всего 2—3 коротких междоузлия; все растение голое; цветы свѣтло-розовые, конечные и въ разветвленіяхъ стебля и вѣтвей на цветоножкахъ въ 4—6 мм., по отцвѣтаніи удлинняющихся почти вдвое; чашечка во время цвѣтенія почти равна трубкѣ вѣнчика; послѣдній открывается въ среднѣ дна и въ солнечную погоду, но его острые ланцетныя доли отстоятъ не горизонтально, а нѣсколько приподнято.

Найдено только разъ В. М. Арнольдъ подъ Владычнымъ монастыремъ близъ Серпухова по дорогѣ за д. Березиной на песчаной почвѣ.



Centaurea pulchellum.

78 сем. Аросуна́еае R. Br.

Цвѣты правильные, обоеполые; чашечка 5-надрѣзная или почти 5-раздѣльная; вѣнчикъ съ 5-раздѣльнымъ отгибомъ, въ почкосложеніи скрученнымъ, въ зѣвѣ безъ чешуекъ; пять свободныхъ тычинокъ на короткихъ нитяхъ чередуются съ долями вѣнчика и заключены въ его трубку; пыльники вскрываются продольной щелью, обращены внутрь и на верхушкѣ часто съ острымъ продолженіемъ связника; пыльцевыя зерна обособленныя, очень рѣдко соединены по 4; завязь верхняя; пестиковъ 2, сросшихся только своими верхушками съ однимъ столбикомъ, кольцообразно расширеннымъ подъ головчатымъ или двураздѣльнымъ рыльцемъ; плоды очень разнообразны; у нашихъ видовъ состоятъ изъ 2 одногнѣздныхъ листовокъ со многими сѣменами на стѣнныхъ сѣменосахъ въ каждомъ гнѣздѣ; сѣмя съ прямымъ зародышемъ и обильнымъ бѣлкомъ. Деревья, кустарники и травы съ супротивными листьями безъ прилистниковъ.

309. *Vinca* L.

740. **V. mīnor** L. Пет., стр. 306. — Кауф. II, стр. 332. — Цин., № 960. — Кауф. I, стр. 324. — Lind., p. 140. — Алл., С. II, № 141. — Borg., p. 700. — Дв., № 262. — Макс., № 246. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 46. — Lib. Tr., p. 86. — St. I, № 139. — Pal., № 468.

Стебель вѣтвистый, лежачій, до 60 см., съ прямостоящими цвѣтущими вѣточками въ 10—15 см.; листья эллиптическіе или ланцетные, заостренные, зимующіе, сверху лоснящіеся; короткій листовой черешокъ

вверху съ 2 железками; цвѣты одиночные, пахучіе, на длинныхъ цветоножкахъ, свѣтло-голубые или свѣтло-лиловые; доли чашечки ланцетныя, туповатые, голыя, въ нѣсколько разъ короче трубки вѣнчика; послѣдній до 25 мм. въ поперечникъ съ тупоусѣченными косыми долями отгиба; плодъ цилиндрическій съ согнутой верхушкой, свѣтло-бурый.

Одичалое по паркамъ и запущеннымъ садамъ. Цвѣтетъ съ половины мая до половины іюня. Царицыно, Петровское-Разумовское, Кунцово (К.).



Vinca minor.

79 сем. *Asclepiadaceae* R. Br.

Цвѣты правильные, обоюполые; чашечка 5-раздѣльная или надрѣзная; вѣнчикъ глубоко 5-раздѣльный; 5 тычинокъ съ расширенными почти лепестковидными нитями, часто сросшимися и прикрепленными у основанія завязи; пыльники 2-гнѣздые, снаружи съ придатками, образующими коронку; связникъ наверху расширенъ въ маленькую пластинку; пыльца склеена въ пыльцевую массу и снабжена ножкой, пристающей къ железистымъ кружечкамъ по угламъ рыльца; завязь верхняя; пестикъ изъ 2 свободныхъ плодонистиковъ и съ очень короткими столбиками, сросшимися въ одну большую щитовидную пятигранную головку съ рыльцами въ нижней части и по угламъ съ железистыми кружечками; по опыленіи плодонистики расходятся и развиваются въ многосѣменные мѣшечки, вскрывающіеся по брюшному шву; сѣмена съ пучкомъ волосковъ, сидятъ на сѣменной вдоль шва; зародышъ прямой посрединѣ небольшого бѣлка. Кустарники и травы съ млечнымъ сокомъ.

310. *Vincetóxicum* Moench.

741. **V. officinále Moench.** Пет., стр. 306.—Цин., № 964.—Pinz., p. 15.—Lind., p. 140.—Ann., C. IV, № 29.

Cynanchum Vincetoxicum L. Kayf. II, № 964.—Рупр., стр. 87.—Макс., № 249.

Asclepias Vincetoxicum L. Дв., № 284.—Макс. Пут., стр. 242.—Gold. C., p. 18.—Pal., № 482.

Корневище ползучее съ толстыми желтоватыми корнями; стебли прямостоящіе, часто съ извивающейся верхушкой; междоузлія его съ одной стороны опушенные; листья супротивные, коротко-черешковые, по жилкамъ и по краямъ опушенные, цѣлюкрайніе, съ округлымъ или почти сердцевиднымъ основаніемъ, заостренные; нижніе—яйцевидные,

средніе—яйцевидно-ланцетные, верхніе—ланцетные; цвѣты въ полузонтикахъ на пазушныхъ цвѣтоносахъ, опушенныхъ, какъ и цвѣтоножки, съ очень узкими маленькими прицвѣтниками; чашечка съ острыми долями; вѣнчикъ бѣлый, снаружи у основанія зеленоватый; мѣшечки продолговато-коническіе, заостренные, голые; сѣмена яйцевидныя, сплюснутыя, съ очень узкимъ крыломъ и съ пучкомъ бѣлыхъ шелковистыхъ волосковъ. Растеніе ядовитое.

На песчаной и известняковой почвѣ, по берегамъ рѣкъ и по холмамъ. Цвѣтеть съ начала іюня до конца іюля; плоды съ конца іюля. Покровское Филіи: Ильинское, Зви. у. (К.).—Архангельское, Зви. у. (А.).—Звенигородъ и Игнатьево, Зви. у. (Маевск.).—Близъ Зпѣрова, Борисово, Срп. у. (С.).—Бѣлыя Колодези, между Бацмановымъ и Протопоповымъ, Кзм. у. (П.).—На лѣвомъ берегу р. Мѣчи противъ д. Родневой, Пдл. у. (Х.).



Vincetoxicum officinale.



Vincetoxicum officinale α. *laxum*.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. *laxum* (Bartl.) Wildm. et Dur.

Cynanchum Vincetoxicum, R. Br. β. *angustifolium* Kauffm. Кауф. II, стр. 331.—Кауф. I, стр. 323.

Vincetoxicum laxum Gren. et. Godr.

Стебель тонкій, на верхушкѣ почти выющійся; средніе листья длинно-заостренные, верхніе—узко-ланцетные. Близъ Каропчесва и Протопопова, Кзм. у.; близъ Лужковъ, Срп. у. (К.).—Бѣлыя Колодези, Кзм. у. (П.).

Порядокъ Tubiflorae.

80 сем. Convolvulaceae Juss.

Цвѣты правильные, обоеполые; чашечка 5-раздѣльная или надрѣзая; вѣнчикъ 5 (4)-лопастный, трубчатый, вадутый или ворончато-коло-

кольчатый, вдоль складчатый; тычинокъ 5, прикрѣпленныхъ къ трубкѣ вѣника; пыльники вскрываются продольной щелью; завязь верхняя на кольцообразномъ дискѣ. 1—2 4-гнѣзная съ 1—2 прирастающими съеменочками, прикрѣпленными у основанія осевыхъ съеменосовъ; столбикъ одинъ съ 2 рыльцами или съ головчатымъ рыльцемъ, рѣже 2 столбика; плодъ—коробочка, вскрывающаяся крышечкой, створками или не вскрывающаяся; перегородки срастаются съ осевымъ съеменосомъ; съемена съ изогнутымъ или улиткообразнымъ зародышемъ съ скомканными съеменодолями или безъ съеменодлей и съ небольшимъ бѣлкомъ. Вьющіяся травы съ очередными листьями или съ маленькими чешуйками вмѣсто листьевъ.

Обзоръ семейства.

Подсемейство I. *Convolvuloidéae* Choisy.

Съ зелеными листьями и съ съеменодолями; плодъ коробочка.

Calystegia, Convolvulus.

Подсемейство II. *Cuscutoidéae* Link.

Чужеядныя растенія безъ зеленыхъ листьевъ; плодъ—коробочка, вскрывающаяся или не вскрывающаяся; зародышъ улиткообразный безъ съеменодлей.

Cuscuta.

Опредѣлитель родовъ.

1. Растенія чужеядныя безъ зеленыхъ листьевъ. *Cuscuta.*
Растенія съ зелеными листьями. 2.
2. У чашечки два крупныхъ зеленыхъ прицвѣтника. *Calystegia.*
У чашечки прицвѣтниковъ нѣтъ. *Convolvulus.*

III. *Calystégia* R. Br.

Прицвѣтники крупные, зеленые, длиннѣе долей чашечки и покрываютъ ее; цвѣтоножки объ одномъ цвѣткѣ; рыльце двулопастное съ короткими лопастями; подпестичный дискъ слегка 5-угольный; коробочка не вполне 2-гнѣзная, вскрывается многими продольными щелями.

742. *C. sépium* (L.) R. Br. Пет., стр. 153. — Цин., № 977. — Макс., № 203. — Hoff. Н., № 1454.

Convolvulus sepium L. Кауф. II, № 503. — Кауф. I, стр. 330. — Lind., p. 140. — Дв., № 217. — Hoff. Н., № 1454. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 37. — Hoff., № 988. — Ad., p. 109. — St. II, p. 13. — St. I, № 133. — Pal., № 333.

Convolvulus Sepium L. Ф. Б., № 58. — Макс., № 203.

Съ ползучими подземными побѣгами; стебель вьющійся, 3—5 м., слегка угловатый, голый, какъ и все растеніе; листья на длинныхъ черешкахъ, удлиненно-стрѣловидно-сердцевидные, заостренные; лопасти ихъ косо-устьеченныя или иногда съ 2—3 зубцами; цвѣты пазушные на

длинные; цветоножкахъ, очень крупныя, бѣлыя; края отгиба слабо 5-лопастные; тычиночныя нити къ основанію расширенныя; зубцы чашечки яйцевидныя, заостренныя.

По сырымъ кустарникамъ, часто. Цвѣтеть съ начала іюля почти весь августъ.


Распадается на слѣдующія формы:

α. *tyricum* GB.


Цветоножки 4-гранныя; лопасти листьевъ выемчато-косо-усѣченныя, тупыя, иногда 2—3-зубчатыя, рѣдко округлыя.

β. *silvestris* Röm. et Schultz.

Цветоножки безъ граней, цилиндрическія; лопасти листьевъ выемчато 2—4-зубчатыя. Воробьевы горы (П.).



Calystegia sepium.



Convolvulus arvensis.

312. *Convolvulus* L.

Прицѣпники мелкіе, отодвинуты отъ цвѣтка; цветоножки обѣ 1—3-цвѣткхъ; лопасти рыльца нитевидныя; цвѣтъ кольцевой, б. ч. безъ угловъ; коробочка вскрывается близъ перегородокъ или вполнѣ неправильно.

743. *C. arvensis* L. Бух. II, № 279. — Бух. I, № 266. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 170. — Kayф. II, № 504. — Цин., № 976. — Kayф. I, стр. 330. — Lind., p. 140. — Др., № 216. — Макс., № 202. — Hoff. II, № 1434. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 37. — Hoff., № 977. — Ad., p. 108. — Lib. Tr., p. 92. — St. II, p. 13. — St. I, № 132. — Pal., № 332.

Convolvulus arvensis L. γ. *vulgaris*. Lind., p. 140.

Convolvulus arvensis L. β. *carneus*. Mart., p. 37.

Корни длинныя съ придаточными почками; стебель стелющійся или вьющійся. 30—70 см., слегка ребристый, голый или покрытъ короткими волосками, какъ и листья на длинныхъ черешкахъ, продолговато-яйцевидныя или ланцетныя съ туповатой или вытянутой верхушкой и осно-

ванієм стрѣловиднымъ или сердцевиднымъ; цвѣты пазушные, на длинныхъ цвѣтоносахъ по 1—3, у основанія цвѣтоножки два маленькіе линейные прицѣвнички; чашечка почти до основанія раздѣлена на округлыя или слегка выемчатые доли, голыя или опушенныя, плотно облегающія цилиндрическую, голую коробочку; вѣнчикъ корончатый, блѣлый или розовый съ 5 розовыми полосками снаружки, слегка пахучій.

По паровымъ полямъ, посѣвамъ, по берегамъ рѣкъ и по безплоднымъ мѣстамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ середины іюня до конца августа.

Можно различить слѣдующія формы:

α. *cordifolius* Lasch.

Листья яйцевидные, длина ихъ не болѣе двойной ширины; часто.

β. *hastifolius* Lasch.

Листья, особенно въ верхней половинѣ стебля, удлиненно-яйцевидные или широко-ланцетные, длина ихъ въ $2\frac{1}{2}$ —4 раза болѣе ширины. Берегъ Москвы р. близъ Хорошова (П. и С.).

313. *Cuscuta* L.

Чашечка 5 (4)-лопастная или раздѣльная; вѣнчикъ 5 (4)-лопастный, трубчатый или кувшиноватый, съ 5 (4) бахромчатыми чешуйками, прикрѣпленными ниже вычюлокъ; послѣднія чередуются съ долями вѣнчика и прикрѣплены къ его трубкѣ; завязь двугубная съ 2 столбиками, рѣже съ однимъ; коробочка 4-ственная, вскрывается поперекъ крышечкой. Чужеродныя растенія безъ зеленыхъ листьевъ.

744. *C. europaea* L. Пет. Кр. II, стр. 73. — Бух. II, № 280. — Бух. I, № 267. — F. O. № 6, p. 86. — Пет., стр. 174. — Kayf. II, № 505. — Цин., № 981. — Pinz., p. 16. — Kayf. I, p. 331. — Lind., p. 140. — Hoff. II, № 1184. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 31. — Ad., p. 86. — St. II, p. 11. — St. I, № 106.

Cuscuta Europaea L. Дл., № 181. — Макс., № 265.

Cuscuta major Bauh. Ann., C. V, № 39.

Cuscuta vulgaris Pers. Mart., p. 31.

Стебель очень тонкій, вѣтвистый, вначалѣ зелено-желтый, потомъ темно-розовый, голый, вьющійся *); цвѣты на короткихъ ножкахъ, сгущены въ шаровидные клубочки, у основанія которыхъ маленькія кроющіяся листочки; чашечка до середины 5-лопастная съ тупыми яйцевидными лопастями, у основанія нѣсколько выемчатая, вѣнчикъ короче вѣнчика; послѣдній розовый, 5-лопастный; лопасти немного короче трубки, отогнутыя, яйцевидныя, тупыя, съ внутри загнутой верхушкой; столбики нитевидные расходящіяся, равны завязи; коробочка яйцевидно-шаровидная.

По сырымъ и тѣнистымъ мѣстамъ. Цвѣтетъ съ конца іюня до сре-

*) Замѣчено чужероднымъ на слѣдующихъ растеніяхъ: *Urtica dioica* L., *Humulus Lupulus* L., *Tanacetum vulgare* L., *Vicia Cracca* L., *Solanum Dulcamara* L. и *Aegopodium Podagraria* L.

дины августа; плоды съ начала августа. Иваньково, Соколово, Перерва, Серпуховъ (К.).—По берегу р. Сѣтунь близъ Иѣмчинова, Широково на Клязьмѣ, берегъ р. Учи у ст. Мамонтовка М.-Яр. ж. д.; Быково, Бри. у. (С.).—Воробьевы горы; Щеглово близъ Талиць, Дмит. у.; островъ на Ока противъ Бачманова, Калм. у. (П.).—Рождествено на р. Нарѣ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).

745. *C. lupulifórmis* Krocker. Пет. Кр. II, стр. 73. — Пет., стр. 174. — Кауф. II, № 506.—Гор., № 60.—Цин., № 983.



Cuscuta europaea.



Cuscuta lupuliformis.

Стебель вьющійся, вѣтвистый до 3 м., толщиною въ тонкую веревку, темно-розовый, покрытъ рѣдкими бородавочками *); цвѣты въ прерывчатыхъ колосовидныхъ кистяхъ, розовые; чашечка до половины 5-лопастная съ туповатыми лопастями; вѣнчикъ трубчатый, вдвое длиннѣе чашечки, съ 5 торчащими лопастями, вначалѣ равными трубкѣ, потомъ вдвое короче ея; тычинки прикрѣплены къ срединѣ трубки вѣнчика, подъ ними двулопастныя чешуйки, иногда послѣднія едва замѣтны; столбикъ одинъ, въ 3—4 раза длиннѣе 2-лопастного рыльца; коробочка крупная яйцевидно-коническая.

По сырымъ кустарникамъ, не часто. Цвѣтетъ съ половины іюля весь августъ; плоды съ половины августа. Близъ Серпухова (К.).—По ивнякамъ у берега р. Оки въ Сри. и Калм. уу. (П., Эжск. Бот. Лаб. и С.).

81 сем. Polemoniáceae Vent.

Цвѣты правильные, обоеполые; чашечка 5-раздѣльная; вѣнчикъ 5-лопастный, въ почкосложеніи скрученный вправо; тычинокъ 5, чередующихся съ долями вѣнчика; нити тычинокъ книзу расширены и при-

*) Замѣчено паразитомъ на слѣдующихъ растеніяхъ: *Salix nigricans* Sm., *Salix triandra* L., *Salix Gmelinii* Pall., *Salix acutifolia* Willd., *Prunus spinosa* L., *Cornus sanguinea* L. и на какомъ-то злакѣ, на которомъ колосковъ еще не было.

крѣплены къ трубкѣ вѣнчика; завязь верхняя, у основанія съ зубчатымъ дискомъ, 3-гнѣздная, съ осевымъ сѣменосомъ и съ многочисленными сѣменочками въ каждомъ гнѣздѣ; столбикъ длинный съ 3 рыльцами; плодъ — 3-створчатая коробочка; перегородки отрываются отъ осевого столбца и остаются посрединѣ створокъ; сѣмя съ прямымъ зародышемъ въ срединѣ мясистаго бѣлка.

314. *Polemonium* L.

746. *P. coerúleum* L. Бух. II, № 278. — Бух. I, № 265. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 244 — Кауф. II, № 502. — Цин., № 974. — Pinz., p. 16. — Кауф. I, стр. 329. — Lind., p. 140. — Ann., C. II, № 144. — Дв., № 218. — Макс., № 199. — Макс. Пут., стр. 242. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 38. — Поф., № 2541. — Ad., p. 109 et 110. — St. II, p. 13. — St. I, № 138. — Pal., № 352.

Стебель примостоящій, 45—140 см., голый, только въ верхней части железисто-опушенный; листья очередные, нижніе — на длинныхъ черешкахъ, верхніе — сидячіе, все — непарно-перистые; листочки ихъ яйцевидно-ланцетные, цѣльнокрайніе, заостренные, 3 верхніе — у верхушечныхъ листьевъ внизу спаянные; цвѣты голубые или лиловато-голубые, рѣдко бѣлые, въ продолговатомъ метельчатомъ соцветіи; цвѣтоножки железисто-пушисты; чашечка съ яйцевидно-ланцетными долями; доли вѣнчика яйцевидно-округлая, тупые или слегка заостренные; тычиночныя нити у основанія волосистыя; коробочка яйцевидная.

По сырýmъ лугамъ, тѣнистымъ мѣстамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до конца іюля; плоды съ начала августа.



Polemonium coeruleum.

82 сем. *Borragináceae* Juss.

Цвѣты обоеполые, правильные, рѣже слегка неправильные; чашечка 5-раздѣльная, надрѣзная или зубчатая, остается при плодѣ; вѣнчикъ сростнолепестный съ 5-лопастнымъ отгибомъ, опадающій; тычинки прикрѣплены къ трубкѣ вѣнчика, все равной длины или нѣсколько неравныя; пыльники вскрываются долевою щелью; завязь верхняя съ подпестичнымъ дискомъ, двугнѣздная, но каждое гнѣздо раздѣлено ложной перегородкой на двѣ части съ одною висячею сѣменочкой въ каждой; эти четыре гнѣзда завязи сильно вздуваются, такъ что сама завязь кажется четырехдольной; столбикъ одинъ посрединѣ завязи; рыльце двулопаст-

ное или головчатое; плод изъ 4 орѣшковидныхъ плодиковъ; зародышъ прямой, бѣлка б. ч. пѣть. Травы съ очередными листьями безъ прилистниковъ. б. ч. покрытыя щетинистыми волосками; соцвѣтіе — завитокъ, передъ цвѣтеніемъ улиткообразно свернутый.

Обзоръ семейства.

I. *Cynoglossae* DC.

Орѣшки прикрѣплены внутреннею стороною къ возвышенному срединному столбцу.

Asperugo, Lappula, Cynoglossum, Omphalodes.

II. *Anchúseae* DC.

Орѣшки у основанія выдолбленные съ возвышеннымъ краемъ вокругъ углубленія.

Borrage, Lycopsis, Nonnea, Symphytum, Pulmonaria.

III. *Lithospermæae* DC.

Орѣшки прикрѣплены не углубленнымъ основаніемъ.

Echium, Onosma, Lithospermum, Myosotis.

Опредѣлитель родовъ.

1. Чашечка 5-раздѣльная или надрѣзная. 2.

Чашечка 5-раздѣльная, но между надрѣзовъ съ 2 маленькими зубчиками, но оплодотвореніи сильно разрастается въ 2 сложенные выемчато-зубчатые листочка. *Asperugo.*

2. Тычиночныя нити съ шиловиднымъ отросткомъ; пыльники сходятся конусомъ. *Borrage.*

Пыльники не сходятся конусомъ, а если сходятся, то тычиночныя нити всегда безъ шиловиднаго отростка. 3.

3. Тычинки сильно выдаются изъ вѣничка. *Echium.*

Тычинки заключены въ трубку вѣничка или только едва выдаются пыльниками. 4.

4. Орѣшки покрыты крючковатыми шипиками. 5.

Орѣшки гладкіе или морщинистые, но безъ крючковатыхъ шипиковъ. 6.

5. Цвѣты голубые; вѣничикъ 3—4 мм. *Lappula.*

Цвѣты темно-пурпуровые; вѣничикъ 6—7 мм. *Cynoglossum.*

6. Цвѣты бѣлые или зеленовато-бѣлые, мелкіе, 5—8 мм. дл. *Lithospermum.*

Цвѣты иной окраски, а если бѣловатые, то крупныя, 15—20 мм. 7.

7. Зѣвъ вѣничка безъ чешуекъ, голый; цвѣты палевые. *Onosma.*

Зѣвъ вѣничка съ чешуйками или съ пучками волосковъ вмѣсто чешуекъ. 8.

8. Вѣничикъ въ 3 раза и болѣе длиннѣ чашечки; чешуйки въ зѣвѣ длинно-заостренныя, шиловидныя. *Symphytum.*

Вѣничикъ не болѣе 2 разъ длиннѣ чашечки; чешуйки тупыя или вмѣсто нихъ пучки волосковъ. 9.

9. Вѣничикъ темно-красно-бурый. *Nonnea.*

Вѣничекъ голубой или синій, или же вначалѣ розовый, потомъ голубой. 10.

10. Трубка вѣничка согнутая, отгибъ косой, слегка неправильный; все растение покрыто оттопыренными колючими щетинками.

Lycopsis.

Трубка вѣничка прямая, отгибъ правильный; все растение покрыто мягкими волосами, рѣже жесткими, но не колючими щетинками. 11.

11. Чашечка трубчатая, 5-гранная; цвѣты крупные 15—20 мм. дл., въ зѣвѣ вмѣсто чешуекъ пучки волосковъ. *Pulmonaria.*

Чашечка не гранистая; цвѣты не столь крупные съ 5 тупыми чешуйками въ зѣвѣ. 12.

12. Цвѣты одиночные въ пазухахъ листьевъ; орѣшки опушенные, круглые, сверху сплюснутые, снаружи блюдчатые.

Omphalodes.

Цвѣты въ рѣдкой кисти, наверху свернутой завиткомъ; орѣшки яйцевидные, голые, лоснящиеся.

Myosotis.

315. *Asperúgo* L.

Чашечка 5-надрѣзная и между надрѣзовъ съ 2 маленькими зубчиками; по оплодотвореніи чашечка сильно разрастается въ 2 сложенные выемчато-зубчатые листочка съ крючковатыми щетинками на зубцахъ; вѣничекъ ворончатый, не длиннѣе чашечки, съ чешуйками въ зѣвѣ; послѣднія тупыя, опушенные; орѣшки сплюснутые, яйцевидные, приросшіе къ столбцу выше середины ихъ внутренняго края.

747. *A. procumbens* L. Пет., стр. 141.—Кauf. II, № 615.—Цип., № 1016.—Kauf. I, стр. 401.—Lind., p. 144.—Дв., № 205.—Макс., № 190.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 35.—Ad., p. 99.—St. II, p. 12.

Растеніе однолѣтнее; стебель лежащій до 70 см., вѣтвистый, ломкій, ребристый, съ отогнутыми щетинками; нижніе листья очередные, средніе и верхніе—по 2 супротивные или по 4 сближенные, всѣ продолговато-эллиптическіе, коротко-заостренные, цѣльнокрайніе или слабо выемчато-зубчатые, съ обѣихъ сторонъ покрыты жесткими волосками, по краямъ щетинистыми; цвѣты одиночные или по 2—4 на короткихъ прямо торчащихъ цвѣтоножкахъ, по отцвѣтаніи поникающихъ; вѣничекъ сперва фіолетовый, потомъ голубой съ бѣлой трубкой; чашечка съ сѣтчатыми жилками, при плодахъ ея два листочка 10—15 мм. ш.; орѣшки до 3 мм. дл., съ частыми бородавочками.



Asperugo procumbens.

На известняковой и песчаной почвѣ, а также по огородамъ и близъ жилья. Цвѣ-

теть съ середины мая до середины июля; плоды съ середины июня. Мячково, Бри. у.; Бочманово, Кам. у. (К.).—Бѣлые Колодези, Кам. у.; Лужники (П.).—Серпуховъ, Прилуки, Сри. у. (С.).—Московка, близъ Рождествена на р. Нарѣ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Озюбишино, Пдл. у. (X.).

316. *Lappula Moench.*

Чашечка 5-раздѣльная; вѣничикъ гвоздевидно-ворончатый съ короткой цилиндрической трубкой и тупыми чешуйками въ зѣвѣ; столбикъ короткій съ головчатымъ едва 2-лопастнымъ рыльцемъ; орѣшки яйцевидно-3-гранные, покрыты крючковатыми шипиками, снаружи выпуклые и приросшіе всѣмъ внутреннимъ краемъ къ столбцу.

748. *L. Myosótis Moench.*

Echinospermum Lappula Lehm. Мос., № 30.—Бух. II, стр. 34.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 181.—Кауф. II, № 614.—Цил., № 1013.—Кауф. I, стр. 401.—Lind., p. 144.—Ann., C. V, № 40.

Echinospermum Lappula Swartz. Макс., № 183.

Myosotis Lappula L. Дв., № 198.—Макс., № 183.—Hoff. II, № 1215.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 33.—Hoff., № 2151.—Ad., p. 93.—St. II, p. 12.—St. I, № 115.—Pal., № 283.

Стебель 15—60 см., прямостоящій, простой или вѣтвистый, прижатощершаво-волосистый; все растеніе сѣро-зеленое; нижніе листья линейно-лопатчатые, сужены въ черешокъ, средніе и верхніе — линейно-ланцетные, всѣ—цѣлюкрайніе, по краямъ длинно-щетинисто-рѣснитчатые, на поверхности съ прижатыми почти щетинистыми волосками на бородавочкахъ; цвѣты въ однобокихъ листовыхъ завиткахъ; чашечка при плодахъ съ растопыренными чашелистниками, на торчащей цвѣтоножкѣ короче самой чашечки; вѣничикъ 3—4 мм. дл., сперва розовый, потомъ голубой съ желтоватыми чешуйками, отгибъ его короче трубки; орѣшки по краямъ съ 2 рядами крючковатыхъ щетинокъ въ ширину мелко-бугорчатого орѣшка.



Lappula Myosotis.

По безплоднымъ мѣстамъ, паровымъ полямъ и известнякамъ, часто. Цвѣтетъ съ середины мая до середины июля, иногда второй разъ въ августѣ.

317. *Cynoglossum L.*

Чашечка 5-раздѣльная, при плодахъ раскрытая или отвороченная; вѣничикъ ворончатый съ тупыми выпуклыми чешуйками въ зѣвѣ; рыльце почти головчатое; орѣшки яйцевидные или овальные, приросшіе верхнею

частью внутреннего края къ столбцу, со спинки приподнятые, покрыты крючковатыми волосками и окаймлены выдающимся краемъ.

749. C. officinale L. Бух. II, № 336.—Ф. Б., № 77.—Бух. I, № 317.—Нет., стр. 174.—Кауф. II, № 612.—Цин., № 1017.—Кауф. I, стр. 400.—Lind., p. 142.—Дв., № 200.—Макс., № 185.—Нойф. II, № 1262.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 33.—Нойф., № 1108.—Ad., p. 96.—St. II, p. 12.—St. I, № 117.—Pal., № 287.

Корень длинный, веретенообразный, двулѣтний; стебель 30—100 см., прямостоящій, сѣрый отъ мягкихъ волосковъ, какъ и все растение; нижніе листья длинно-эллиптическіе, вытянутые въ черешокъ; средніе и верхніе — продолговато-ланцетные или ланцетные, сидячіе, съ полустеблеобъемлющимъ основаніемъ; вѣтвлюкрайніе, заостренныя; цвѣты въ рѣдкихъ кистяхъ, собранныхъ метельчато завитками; чашечка съ тупыми долями на отогнутыхъ плодоножкахъ; вѣтчикъ 6—7 мм. дл., красно-бурый съ черно-бурыми волосистыми чешуйками въ зѣвѣ; орѣшки 6—7 мм. дл.



Cynoglossum officinale.

На каменистыхъ, песчаныхъ открытыхъ мѣстахъ и по берегамъ рѣкъ. Цвѣтетъ съ конца мая до конца іюля; плоды съ средины іюля. Хорошово, Спаское, Воробьевы горы: Архангельское, Зви. у.; Карпачево, Кзм. у. (К.).—Близъ Измайловскаго звѣршца по шоссе; Мячково, Бри. у. (С.).—Волоколамскъ (П. Баршевъ).—Близъ Рузы (Ф. Б.).—Борисово, Мож. у. (В.).—Тесово, Мож. у. (Мос.).—Дровнино, склонъ къ р. Нахрѣ, Илл. у. (В.).—Бавыкино, Чудиново, Срп. у. (П.).—Рождествено на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Серпуховъ: между Ильинскимъ и Павлѣвымъ, Бѣлые Колодези, Кзм. у. (П.).—Певѣрово, Кзм. у. (Х.).

318. *Omphalodes Moench.*

Чашечка 5-раздѣльная; вѣтчикъ колесовидный съ короткой трубкой и тупыми чешуйками въ зѣвѣ; рыльце двулопастное; орѣшки круглые сверху сплюснутые и углубленные блюдечкомъ, съ перепончатымъ завороченнымъ краемъ, приросшіе только основаніемъ внутренней стороны къ столбцу.

750. O. scorpioides Schrank. Нет. Кр. II, стр. 128.—Нет., стр. 230.—Кауф. II, № 613.—Мил., № 28.—Гор., № 67. и Addenda № 3.

Стебель 10—25 см., вѣтвистый, слабый, лежачій, слегка 4-гранный, покрытъ прижатыми волосками; корневые листья лопатчатые, суженные въ черешокъ; нижніе стеблевые — супротивные, продолговато-обратно-яйцевидные; верхніе — очередные, продолговато-ланцетные, съ верхней

стороны шероховатые от коротких, но жестких волосков, ветвь очень пѣжные, при сушкѣ легко чернѣютъ; цвѣты въ развилинахъ стебля и супротивъ листьевъ (кажутся пазушными) на длинныхъ цветоножкахъ, по отцвѣтании еще удлинняющихся и отгибающихся книзу; доли чашечки продолговато-яйцевидныя, при плодахъ раскрытыя; вѣнчикъ до 7 мм. дл., голубой съ желтыми чешуйками въ зѣвѣ; орѣшки около 3 мм., буроватые, опушенные.



Omphalodes scorpioides.

Въ листовыхъ лѣсахъ на перегнойной почвѣ, рѣдко. Цвѣтетъ съ конца апрѣля до конца юня; плоды съ конца мая. Кунцово, близъ Проклятаго мѣста (М.).—Боровскій курганъ, Бри. у. (С.).—Въ липовой рошѣ близъ Пгнатъева, Кал. у. (Экс. Бот. Лаб.); теперь эта рошца сводится.

* *Borrágо* L.

Чашечка глубоко 5-раздѣльная, раскрытая; вѣнчикъ колесовидно-звѣздчатый съ короткими чешуйками въ зѣвѣ; пыльники выставляются изъ вѣнчика и сходятся конусомъ; тычиночныя нити съ шиловиднымъ отросткомъ; завязь съ подпестичнымъ дискомъ; орѣшки яйцевидные, слегка морщинистые.

* *B. officinális* L. Бух. II, стр. 34.—Бух. I, стр. 22.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 148.—Кауф. II, № 611.—Цип., № 990.—Кауф. I, стр. 400.—Lind., p. 142.—Дв., № 204.—Макс., № 189.—Mart., p. 34.—Ad., p. 98.—St. II, p. 12.—St. I, № 121.—Pal., № 301.

Растеніе однолѣтнее; стебель 40—100 см., толстый, сочный, вѣтвистый, усаженный, какъ и листья, жесткими щетинистыми волосками; все растеніе при разламываніи пахнетъ огурцамъ; корневые и нижніе стеблевые листья эллиптические, суженные въ черешокъ, по краямъ часто волнистые; средніе и верхніе—продолговатые, сидячіе, почти стеблеобъемлющіе и б. ч. слегка низбѣгающіе; цвѣты въ малоцвѣтковыхъ кистевидныхъ завѣткахъ съ листьями; доли чашечки почти линейныя, заостренныя, при плодахъ сходящіяся; вѣнчикъ синій, рѣдко бѣлый, 20—26 мм. въ поперечникъ, съ яйцевидными заостренными долями; шиловидныя придатки тычиночныхъ нитей темно-фіолетовые; орѣшки 5—6 мм. дл.



Borrágо officinális.

Разводится по садамъ и огородамъ, иногда дичаетъ. Цвѣтетъ съ юня до конца юля.

319. *Lycopsis* L.

Чашечка глубоко 5-раздѣльная; отгибъ вѣнчика косой, слегка неpravильный; трубка его согнутая; зѣвъ съ бороватыми чешуйками; орѣшки на выпукломъ плодоложѣ неравнобокіе, сѣтчато-морщинистые, у основанія съ углубленіемъ.

751. *L. arvensis*. L. Пет. Кр. II, стр. 128. — Бух. II, № 335. — Ф. В., № 75. — Бух. I, № 318. — Ф. О., № 7, p. 102. — Пет., стр. 219. — Кауф. II, № 609. — Цин., № 995. — Кауф. I, стр. 399. — Lind., p. 142. — Дв., № 206. — Макс., № 191. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 35. — Ad., p. 99 et 100. — St. II, p. 12. — Pal., № 306.

Lycopsis orientalis Steph. Ad., p. 99 et 100. — St. I, № 122.

Однолѣтнее; стебель 15 — 50 см., б. ч. вѣтвистый, сочный, слегка ребристый, покрытъ, какъ и все растеніе, жесткими оттопыренными колючими щетинками на луковичкахъ; листья продолговато-ланцетные или продолговатые, тупые или заостренные, выемчато-зубчатые, по краю часто волнистые; нижніе—сужены въ черешокъ, верхніе—сидячіе, полустеблеобъемлющіе; цвѣты съ прицвѣтными листьями, сперва очень скученные, потомъ въ кистевидныхъ, часто вѣтвистыхъ завиткахъ; чашечка съ продолговатыми долями; вѣнчикъ голубой, 5—7 мм. дл., съ бѣлой трубкой, равной чашечкѣ; орѣшки 3—4 мм. дл.

По паровымъ полямъ, пашнямъ и огородамъ. Цвѣтетъ съ половины юня до осени.



Lycopsis arvensis.

320. *Nõnnea* Medic.

Чашечка колокольчатая, 5-надрѣзная, плодоносная вздутая; вѣнчикъ съ прямою трубкою, ворончато-цилиндрической съ маленькими бороватыми чешуйками ниже зѣва; орѣшки сѣтчато-морщинистые съ сильно складчатымъ колечкомъ при основаніи.

752. *N. púlla* (L.) DC. Мос., № 29. — Пет. Кр. II, стр. 128. — Ф. В., № 76. — Ф. О., № 7, p. 102. — Пет., стр. 229. — Кауф. II, № 610. — Гор., № 36. — Цин., № 989. — Рупр., стр. 88. — Кауф. I, стр. 399

Lycopsis pulla L. Макс., № 192. — Макс. Пут., ч. II, стр. 82.

Растеніе одно-двулѣтнее; стебель 15 — 50 см., прямостоящій или приподнимающійся, въ верхней части вѣтвистый, покрытъ, какъ и все растеніе, щетинистыми и рѣдкими железистыми волосками; нижніе листья

продолговато-ланцетные, суженные въ черешокъ, средніе и верхніе—ланцетные, заостренныя, сидячіе, полустеблеобъемлющіе, всѣ—сѣро-зеленые, цѣльнокрайніе или неясно-выемчато-зубчатые; цвѣты въ рѣдкоцвѣтковыхъ, вѣтвистыхъ, облиственныхъ завиткахъ; чашечка надрѣзана на одну четверть, съ острыми зубцами, по отцвѣтаніи разрастается и поникаетъ; вѣничикъ 10—15 мм. дл., темно-красно-бурый, отгибъ его равенъ трубкѣ; орѣшки около 4 мм. дл.

По известнякамъ, холмамъ, по берегамъ рѣкъ и по паровымъ полямъ и огородамъ. Цвѣтетъ съ начала іюня до середины іюля.

Между Мытищами и Рупосовымъ, близъ 10 версты М.-Яр. ж. д.: Боровскій курганъ и близъ Мячкова, Брн. у. (С.).—Горенки (Гей.).—Косино; Бочманово, Кзм. у. (Сюз.).—Протопопово, Кзм. у. (К.).—Городище подъ Коломной (П.).—Близъ Дракина, Срп. у. (Г.).—Лопасня, у ж.-д. моста, Срп. у. (П.).—Между Рождественымъ и д. Московской, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Между Вѣлопесонкой слободой и Старой Каширой, Срп. у. (Х.).—Собольки, Мож. у.; Остафьево, Пдл. у. (Мос.).—Шеламово, Вер. у. (Разумовъ).



Nonnea pulla.



Symphytum officinale.

321. *Symphytum* L.

Чашечка 5-лопастная или 5-раздѣльная; вѣничикъ трубчато-колокольчатый съ короткими широкими лопастями, съ шиловидными, длинно-заостренными чешуйками, сходящимися конусомъ въ зѣвѣ; столбикъ выдается изъ вѣничика; орѣшки косые, гладкіе, у основанія съ рубчатýmъ колечкомъ.

753. *S. officinale* L. Пет. Кр. II, стр. 126.—Бух. II, № 334.—Ф. Б., № 74.—Бух. I, № 311.—Пет., стр. 288.—Кауф. II, № 608.—Гор., № 66.—Цин., № 991.—Lind., p. 142.—Дв., № 203.—Макс., № 188.—Hoff. II, № 1278.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 34.—Hoff., № 3203.—Ad., p. 97.—St. II, p. 12.—St. I, № 120.—Pal., № 296.

Стебель 30—100 см., прямостоящій ребристый, покрытъ жесткими, но не колючими волосками на бородавочкахъ; нижніе листья крупные, яйцевидно- или продолговато-ланцетные, суженные въ крылатый черешокъ, остальные—ланцетные или широко-ланцетные, заостренные, сидячіе, длинно-низбегающіе по стеблю, шероховатые отъ щетинистыхъ волосковъ; цвѣты въ завѣткахъ безъ листьевъ; чашечка съ ланцетными заостренными, щетинисто-волосистыми долями; вѣничекъ 12—18 мм. дл. въ 4—5 разъ длиннѣе чашечки, у мѣста прикрѣпленія тычинокъ нѣсколько расширенъ, зубцы его треугольные, отвороченные; снаружи вѣничекъ б. или м. густо опушенный; пыльники на короткихъ нитяхъ, заостренные, равны чешуйкамъ въ зѣвѣ; орѣшки гладкіе, лоснящіеся, черные.

По болотамъ, берегамъ рѣкъ или по огородамъ, какъ сорное. Цвѣтетъ съ половины мая до августа.

Встрѣчаются слѣдующія формы:

α. **ochroleúcum DC.** Пет. Кр. II, стр. 127.

Symphytum officinale L. (album). Mart., p. 34.

Symphytum bohemicum Schm.

Вѣничекъ бѣловато-желтый; очень рѣдко. Соколыники близъ Яузы въ канавѣ у огорода (С.).

β. **pátens Sibth.** Пет. Кр. II, стр. 127.—Макс., № 188.

Symphytum patens Sibth. (purpureum). Mart., p. 34.

Вѣничекъ грязно-пурпуровый, фіолетовый или грязно-лиловый. Между Амниневымъ и Вольнскимъ (Г. О.).—Кузьминки (бр. Сабанѣвы).—Куцово, Соколыники (А. Асѣ).—Горенки (Шатерниковъ).—Богородское (Гей.).—Лужники; Софьино на шлюзѣ, Бри. у. (II.).—Быково по болотистому лугу и близъ Мячкова, Бри. у. (II. и С.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Между Дракинымъ и Спасской мельницей на Протвѣ, Сри. у.; между Каропчевымъ и Коломною (Экс. Бот. Лаб.).—Между Клишевымъ и Заболотьемъ, Бри. у. (С.).

754. **S. ásperrum Lep.** Сыр. Отч. I, стр. 15.—Пет. Кр. II, стр. 127.—F. O., № 7. p. 102.—Кауф. II, № 607.—Рупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 398.

Symphytum asperrimum Sims. Пет., стр. 288.—Цик., № 992.

Symphytum asperrimum MB. Hoff. II., № 3202.—Hoff., № 1273.

Стебель 30—150 см., прямостоящій, вѣтвистый, покрытъ колючими, слегка загнутыми книзу щетинками; корневые и нижніе стеблевые листья яйцевидные или продолговато-яйцевидные на черешкахъ, нѣсколько крылатыхъ; средніе и верхніе—сидячіе или почти сидячіе, съ слегка клиновиднымъ основаніемъ, но не низбегаютъ по стеблю; все—цѣльнокрайніе, съ обѣихъ сторонъ покрыты прижатыми щетинистыми волосками, снизу вдоль жилки бѣже крупными; цвѣты въ завѣткахъ безъ листьевъ; чашечка съ линейно-ланцетными, тупыми, щетинисто-волосистыми долями, при плодахъ сильно разрастается и доли ея заостряются; вѣничекъ 13—17

мм. дл., въ 4—5 разъ длиннѣе чашечки, съ прямыми, тупыми яйцевидными зубцами, вначалѣ розовый, потомъ голубой; пыльники равны нитямъ и чешуйкамъ въ зѣвѣ; орѣшки морщинистые съ мелкими бугорками.

Одичалое по пустырямъ, песчанымъ откосамъ рѣкъ и близъ жилья. Цвѣтетъ съ половины мая почти до половины августа; плоды съ половины юля. Пушкино (Г.).—Петровское-Разумовское (М.).—Косино близъ церкви (П. и С.).—Берегъ р. Учи близъ фабрики Дююн (С.).—Екатериновка, Зви. у. (Дубровингъ).—Райки, Бгр. у. (П.).

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. *hispidum* Kauffm. Кауф. II, стр. 411.—Кауф. I, стр. 398.

Symphytum officinale L. β. *hispidum* Kauffm. Пет. Кр. II, стр. 128.

Листья и цветники болѣе тонкіе, бородавочекъ подъ щетинками нѣтъ, доли чашечки острья, столбикъ прямой, послѣ цвѣтенія согнутъ подъ угломъ близъ верхушки. По тѣнистымъ мѣстамъ. Братцово (К.).—Имѣніе Суканово, Пдл. у. (Гей.).

β. *fol. aureo-marginatis*.

Листья съ желтой росписью, верхніе почти сплошь желтые.

Высокій берегъ р. Учи близъ фабрики Дююн. между тиничной формой (С.).



Symphytum asperum.



Pulmonaria officinalis α, obscura

322. *Pulmonaria* L.

Чашечка 5-зубчатая, 5-гранная, при плодахъ вздуто-колокольчатая; вѣничекъ трубчато-ворончатый, въ зѣвѣ противъ каждой доли вѣничка съ пучкомъ волосковъ вмѣсто чешуекъ; рыльце 2-лопастное; орѣшки шаровидно-яйцевидные, лоснящіеся, у основанія съ колечкомъ, надъ которыми нѣсколько перетянуты, основаніе же нѣсколько углублено; цвѣты бываютъ двухъ родовъ: съ крупнымъ вѣничкомъ, и тогда столбикъ длинный, а тычинки прикрѣплены у середины трубки, или вѣничекъ не столь крупный, столбикъ не длиннѣе половины трубки, а тычинки прикрѣплены у зѣва вѣничка.

755. *P. officinális* L. Пет. Кр. II, стр. 121.—Бух. II, № 328.—Бух. I, № 312.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 253.—Кауф. II, № 597.—Цин., № 1001.—Кауф. I, стр. 393.—Lind., p. 142.—Ann., C. I, № 35.—Др., № 202.—Макс., № 186.—Hoff. II, № 1270.—Mart., p. 34.—Ad., p. 97.—St. II, p. 12.—St. I, № 119.—Pal., № 294.

Корневище толстое, бурое; стебли 10—30 см., слегка ребристые, покрыты отстоящими жесткими волосками, которые кверху к стеблям становятся гуще и перемешиваются с мягкими многоклеточными железистыми волосками; также опушены цветоножки и чашечки; корневые листья яйцевидные в $1\frac{1}{2}$ —2 раза длиннее ширины, б. ч. с сердцевидным основанием, заостренные, быстро переходят в узко-крылатый черешок; нижние стеблевые—яйцевидные, сужены в широко-крылатый черешок; средние—сидячие к основанию сужены; верхние—яйцевидно-округлые или яйцевидно-продолговатые, сидячие; верхняя сторона листьев покрыта разбрызанными щетинистыми волосками и очень редкими железистыми; цветы сперва розовые, потом фиолетовые и наконец синие, отгиб их 8—10 мм.; доли вичника округлые или туповатые; зубцы чашечки равны одной трети или четверти последней, яйцевидно-треугольные, заостренные; плодоносная чашечка вверху шире чем внизу; орешки 3,5—4 мм. дл.

По листьям и опушкам, часто. Цветет с середины апреля, иногда до конца мая; плоды с конца мая.

У нас только:

2. *obscura* Dumort.

Листья без пятен или с едва заметными зелеными пятнами, корневые—на очень длинных черешках, превышающих длину пластинки *).

756. *P. angustifolia* L. Пет. Кр. II, стр. 121.—Пет., стр. 253.—Цин., № 1003.—Др., № 201.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 34.—Ad., p. 97.—St. II, p. 12.—St. I, № 118.—Pal., № 293.

Pulmonaria angustifolia Mart. Макс., № 187.

Pulmonaria azurea Bess. Кауф. II, № 598.—Гор., № 35.—Руур., стр. 88.—Кауф. I, стр. 393.—Ann., C. IV, № 31.—Макс., № 187.

Корневище толстое, бурое с толстыми длинными корнями; стебель 10—40 см., слабо ребристый, покрыт, особенно густо в верхней части, жесткими, почти щетинистыми волосками, иногда перемешанными с железистыми; корневые листья без пятен, линейно- или продолговато-ланцетные, длинно-заостренные, постепенно переходят в б. или м. широко-крылатый черешок; ширина листа в несколько раз меньше его длины, верхняя поверхность густо покрыта короткими щетинистыми волосками; стеблевые листья ланцетные или линейно-ланцетные, верхние—полустебельообъемлющие, немного низбегающие, нижние слегка сужены к

*) Типичной формы (typica G.B.) у нас пока не найдено; она отличается от *P. obscura* Dumort. корневыми листьями на коротких черешках, не превышающих пластинку, которая покрыта белыми пятнами.

основанию; цветы сначала розовые, потомъ ярко-снѣгіе; доли вѣнчика округлыя; зубцы чашечки заостренныя, равны одной трети или половины всей длины чашечки; послѣдняя при плодоношеніи внизу иверху одинаковой ширины или даже внизу шире; орѣшки 4 мм. дл.

По лѣсамъ и опушкамъ. Цвѣтетъ съ конца апрѣля, иногда до конца мая; плоды съ конца мая. Серебряный боръ близъ Хорошова (А.).—Кузьминки (герб. Гольдб.).—Токарева (Ген.).—Между Троицкимъ-Бутурлинскимъ и д. Катерикиной (Г.).—Близъ ст. Удѣльная М.-Каз. ж. д., Бри. у. (Х.).—Рождествено на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Бѣлые Колодези, Кзм. у. (Же. Бот. Лаб.).—По всей береговой полосѣ р. Оки, какъ въ Срп., такъ и въ Кзм. уу. (П. и С.).



Pulmonaria angustifolia.



Echium vulgare.

323. *Échium* L.

Чашечка глубоко 5-раздѣльная; вѣнчикъ трубчато-ворончатый съ неравно-лопастнымъ, слегка двугубымъ отгибомъ, въ зѣвѣ безъ чешуекъ; тычинки неравной длины выдаются, какъ и столбикъ, изъ вѣнчика; рыльце 2-лопастное; орѣшки яйцевидно-3-гранные бугорчатые, съ треугольнымъ плоскимъ основаніемъ.

757. *E. vulgare* L. Пет. Кр. II, стр. 120.—Бух. II, № 327.—Бух. I, № 310.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 181.—Кауф. II, № 596.—Цин., № 985.—Кауф. I, стр. 392.—Lind., p. 142.—Borg., p. 700.—Дв., № 207.—Макс., № 177.—Макс. Пут., стр. 242.—Hoff. II, № 1324.—Mart., p. 35.—Hoff., № 1252.—Ad., p. 100.—St. II, p. 12.—St. I, № 123.—Pal., № 308.

Корень веретенообразный, дву-многолѣтний; стебель 30—100 см., прямостоящій, покрытъ, какъ и листья, короткими волосками и рѣдкими длинными щетинками на луковичкахъ; корневые и нижніе стеблевые листья продолговато-ланцетные, суженные въ черешокъ, остальные—

узко-ланцетные, с широким закругленным основанием, вефъ обѣ 1 жилкѣ, цѣльнокрайніе; цвѣты въ однобокихъ завиткахъ, расположенныхъ рѣдкой метелкой, которая начинается съ средины стебля; каждый цвѣтокъ съ линейнымъ прицвѣтникомъ; доли чашечки линейныя, заостренныя; вѣнчикъ сперва розовый, потомъ голубой, рѣже бѣлый. 15—20 мм. дл., вдвое длиннѣе чашечки; столбикъ опушенный; орѣшки 2, 5—3 мм. дл.

По сухимъ и открытымъ мѣстамъ, по лугамъ и паровымъ полямъ. Цвѣтеть съ средины іюня до средины августа. Петровскій паркъ. Бутырки. Братцово: Пальнское, Зви. у. (К.).—Мытницы: опушка лѣса между дамбой Сенежскаго озера и Богородскомъ, Кли. у.; близъ Лужковъ, Срп. у.; Бачманово, Протопопово, Кзм. у. (С.).—Серпуховъ (Макс.).—Рождествено на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Саввинскій монастырь, Зви. у.; Бѣлонесоцкая слобода, Срп. у. (Х.).—Дровишно, склонъ къ р. Нахрѣ, Пдл. у. (В.).—Хмѣтьево, Кли. у.; скитъ близъ Сергіевскаго посада, Дмт. у.; шлюзъ на Москвѣ р. близъ с. Сѣверскаго, Кзм. у.; Быково, Бри. у. (Н.).

324. *Onósmā* L.

Чашечка глубоко 5-раздѣльная; вѣнчикъ трубчато-булавовидный съ короткими 5 зубчиками и въ зѣвѣ белъ чешуекъ; пыльники линейные, у основанія стрѣловидные, на верхушкѣ съ вытянутымъ перепончатымъ связникомъ; столбикъ выставляется изъ вѣнчика; рыльце слабо 2 лопастное; орѣшки яйцевидно-3-гранные съ плоскимъ основаниемъ.

758. *O. tinctoria* MB.

Стебель 20—60 см., прямостоящій или слегка приподнимающійся, покрытъ короткимъ пушкомъ и жесткими щетинистыми волосками на утолщеніяхъ, вверхъ обращенными и оттопыренными; листья широко-линейные, тупые, верхніе — линейно-ланцетные; цвѣты въ облиственныхъ завиткахъ; чашечка при плодахъ мало разрастается; вѣнчикъ 10—13 мм. дл., почти цилиндрическій, спереди мало расширенъ, съ короткими, вначалѣ прямыми, потомъ отвороченными зубчиками, сперва бѣловато-желтоватый, потомъ красноватый и наконецъ синевато-фіолетовый; пыльники при началѣ цвѣтенія скрыты въ вѣнчикѣ, потомъ, когда зубчики отворачиваются, слегка выдаются изъ него; орѣшки продолговато-треугольные съ бурыми сливающимися крапинками.

Найдено занесеннымъ съ первыми цвѣтами 20 мая по откосу ж. д. между Царицынымъ и Бирюлевымъ (Куль.).



Onosma tinctoria.

325. *Lithospérmum* L.

Чашечка 5-раздѣльная; вѣничекъ трубчато-воронковидный съ открытымъ зѣвомъ и съ мелкими чешуйками или бархатистыми складками въ немъ; тычинки заключены въ трубку вѣничка; орѣшки съ большимъ плоскимъ основаніемъ, яйцевидные, иногда почти 3-гранные, очень твердые, почти каменные, часто, вслѣдствіе недоразвитія, орѣшкови бываютъ отъ одного до трехъ.

759. *L. officinale* L. Пет. Кр. II, стр. 122.—Мос., № 28.—Ф. Б., № 73.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 216.—Кауф. II, № 599.—Мил., № 27.—Цин., № 999.—Pinz., p. 16.—Кауф. I, стр. 394.—Lind., p. 142.—Ann., C. V, № 41.—Gold. Sp., p. 122.—Pal., № 284.

Стебель 30—80 см., прямостоящій, густо покрытъ листьями, вѣтвистый, шероховатый, какъ и все растение, отъ прижатыхъ волосковъ съ утолщеннымъ основаніемъ; листья широко-ланцетные, заостренные, пѣльнокрайніе, съ выдающимися боковыми жилками, сверху темно-зеленые, снизу свѣтлѣе; цвѣты въ длинныхъ облиственныхъ завиткахъ; чашечка съ линейными долями, при плодахъ разрастается; вѣничекъ зеленовато- или желтовато-бѣлый, 5 мм. дл., съ короткою трубкою и маленькими бархатистыми чешуйками въ зѣвѣ; пыльники туповатые; орѣшки гладкіе, лоснящіеся, бѣлые, яйцевидные, вверху слегка заостренные.



Lithospermum officinale.

По сухимъ и открытымъ мѣстамъ, б. ч. на известнякахъ. Цвѣтеть съ половины мая; плоды съ половины іюня. Между Тушинымъ и Спаскимъ (К.).—По берегу р. Десны близъ Лантевской мельницы, Пдл. у. (Мос.).—Между Дубровицами и Подольскомъ (Г.).—Красный Станъ, Руз. у. (Ч.).—По гористому берегу р. Колочи близъ с. Новаго, Мож. у. (Куль.).—Семеново, Мож. у.; близъ Борисова, Сри. у. (М.).—На берегу р. Лопасни, около Отраднаго, Сри. у. (П.).—Серпуховъ (П.).—Бѣлые Колодези, Кдм. у. (Жк. Бот. Лаб.).—Близъ с. Зеленаго на р. Нахрѣ, Бри. у. (С.).—По известняковому берегу р. Мѣчи близъ д. Жаркова, Пдл. у. (Х.).

760. *L. arvense* L. Пет. Кр. II, стр. 122.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 216.—Кауф. II, № 600.—Цин., № 998.—Кауф. I, стр. 394.—Lind., p. 142.—Дв., № 199.—Макс., № 184.—Hoff. II., № 1230.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 33.—Hoff., № 1920.—Ad., p. 94.—St. II, p. 11.—St. I, № 116.—Pal., № 285.

Стебель 15—45 см., прямостоящий, простой или въ верхней части вѣтвистый, покрытъ, какъ и все растеніе, прижатыми почти щетинистыми волосками съ утолщеннымъ основаніемъ; корневые и нижніе стеблевые листья продолговатые, часто лопатчатые, туповатые; верхніе—продолговато-ланцетные, заостренныя; всѣ цѣльнопокрайнніе и безъ выдающихся боковыхъ жилокъ; цвѣты на короткихъ цвѣтоножкахъ въ облиственныхъ завиткахъ; чашечка съ линейно заостренными долями при плодахъ разрастается; вѣнчикъ 6—8 мм. дл., бѣловатый, съ длинной трубкой и съ 5 выдающимися продольными складками въ зѣвѣ; пыльники заостренныя; орѣшки бугорчатые, тусклые, буроватые, яйцевидно-треугольные, остро-ватые.



Lithospermum arvense.

По открытымъ мѣстамъ, холмамъ, обрывамъ рѣкъ, по посѣвамъ и паровымъ полямъ, часто. Цвѣтетъ съ половины мая; плоды съ половины іюня.

326. *Myosótis* L.

Чашечка колокольчатая, 5-зубчатая или надрѣзная; вѣнчикъ колесовидный съ короткой трубкой и съ 5 маленькими тупыми голыми чешуйками, образующими въ зѣвѣ выпуклое кольцо; тычинки заключены въ трубку или выставляются только пыльниками; орѣшки яйцевидные, на синикѣ б. ч. съ килемъ, гладкіе, лоснящіеся.

1. Чашечка (особенно ясно при плодахъ) покрыта прижатыми волосками. 2.

Чашечка (особенно ясно при плодахъ) покрыта отстоящими щетинистыми, часто крючковатыми волосками. 3.

2. Столбикъ длинный, часто доходитъ до верхушки чашечки; зубцы послѣдней короче ея трубки; отгибъ вѣнчика длиннѣе его трубки.

M. palustris (L.) Hill.

Столбикъ короткій, много короче чашечки; зубцы послѣдней равны ея трубкѣ; отгибъ вѣнчика равенъ трубкѣ.

M. caespitosa Schultz.

3. Цвѣтоножки короче чашечки. *M. micrantha* Lehm.

Цвѣтоножки равны чашечкѣ или длиннѣе ея. 4.

4. Завитки въ нижней половинѣ покрыты листьями, такъ что нижніе цвѣты кажутся пазушными. *M. sparsiflora* Mik.

Завитки безъ листьевъ. 5.

5. Цвѣты, особенно при началѣ цвѣтенія, крупныя, б. ч. не мельче 5 мм.; отгибъ вѣнчика длиннѣе его трубки; чашечка покрыта

отстоящими щетинистыми волосками, между которыми иногда встрѣчаются и крючковатые. *M. silvatica Hoffm.*

Цвѣты не крупнѣе 4 мм.; трубка вѣнчика нѣсколько длиннѣе отгиба; чашечка покрыта отстоящими часто отогнутыми книзу крючковатыми волосками. *M. scorpioides L. excl. var. β.*

761. *M. palustris* (L.) Hill.

Myosotis palustris With. Пер. Кр. II, стр. 122.—Бух. I, № 313.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр., 225.—Кауф. II, № 601.—Цин., № 1004.—Кауф. I, стр. 395.—Дв., № 193.—Mart., p. 32.

Myosotis palustris Roth. Макс., № 178.

Myosotis scorpioides L. Дв., № 193.—Hoff. H., № 1225.—Gold. C., p. 18.—Hoff., № 2155.—Ad., p. 91.—St. II, p. 11.

Myosotis scorpioides L. β. *palustris* L. St. I, № 114.—Pal., № 202.



Myosotis palustris.

Растеніе многолѣтнее: стебель 15—50 см., съ подземными побѣгами, приподнимающійся, ребристый, простой или вѣтвистый, шероховатый отъ волосковъ; листья продолговато-ланцетные, къ основанію суженные, у нижнихъ—верхушка тупая или округлая, у верхнихъ—б. ч. заостренная; завитки безлистные; вѣнчикъ крупный, сперва розовый, потомъ голубой съ желтыми чешуйками въ зѣвѣ, отгибъ его длиннѣе трубки; чашечка покрыта прижатыми волосками, съ зубцами короче ея трубки, при плодахъ раскрытая; пыльники туповатые; столбикъ длинный, часто доходить до верхушки чашечки; орѣшки 1—1,5 мм. дл., кругомъ съ каймой.

По берегамъ рѣкъ, по болотамъ, сырымъ лугамъ и канавамъ, часто. Цвѣтетъ съ середины мая до глубокой осени.

Распадается на слѣдующія формы:

α. *mémor Kittel.*

Стебель въ нижней половинѣ и листья покрыты отстоящими волосками, верхняя часть стебля часто голая. По берегу р. Сѣтуни, близъ Семилуки, Брянск. ж. д. (II).—Быково, Брн. у. (С.).

β. *strigulosa (Rchb) Mert. et Koch.* Пер. Кр. II, стр. 122.

Myosotis palustris L. b. *scabra*. Mart., p. 32.

Стебель и листья покрыты прижатыми щетинистыми волосками, очень часто. Если всѣ листья съ округлой верхушкой, то это: f. *obtusifolia* GB.—Успенское, Зви. у. (X).—Если цвѣты очень мелкіе 4—5 мм. въ поперечникѣ, то это: f. *gracilis* Boenn.,—наипаче по кочкамъ по берегу р. Сѣтуни близъ 17-ой версты Брянск. ж. д. (С.).—Вялки, Брн. у. (X).

762. *M. caespitosa* C. F. Schultz. Пет. Кр. II, стр. 123.—Бух. II, стр. 34.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 226.—Кauf. II, № 602.—Цин., № 1005.—Kauf. I, стр. 396.

Myosotis lingulata Lehm. Asperif. I, p. 110 (1818).

Растение одно-двулетнее; стебель 15—50 см., съ подземными побѣгами. б. ч. съ самаго основанія вѣтвистый, рѣже простой, цилиндрическій, съ слабыми ребрышками у листьевъ, покрытъ короткими прижатыми щетинками; листья широко- или узко-ланцетные, на концѣ б. ч. округлые или тупые, къ основанію сужены почти въ черешокъ, съ обѣихъ сторонъ покрыты рѣдкими прижатыми щетинистыми волосками; завѣтки рѣдкоцвѣтныя, у основанія съ 2—3 листочками; цветоножки при плодахъ горизонтально отклоненныя, вдвое длиннѣе чашечки; вѣнчикъ мелкій, свѣтло-голубой, отгибъ его равенъ трубкѣ, которая короче чашечки; послѣдняя съ рѣдкими прижатыми щетинистыми волосками, при плодахъ раскрытая, до половины надрѣзная; зубцы широко-ланцетные, ровные; столбикъ много короче чашечки.

По сырымъ мѣстамъ, по берегамъ рѣкъ и прудовъ, по болотамъ и на пескѣ, рѣдко. Цвѣтетъ съ начала іюня до половины іюля; плоды съ половины іюня. Раменское, Бри. у.; Кунава, Бгр. у. (К.).—Болото у подножія Боровскаго кургана, Бри. у. (С.).—Дарыно, Зви. у. (Х.).—Михайловское, Пдл. у. (И. В. Байковъ).—Останкино (Карельниковъ).—Серебряный боръ близъ Хорошова (Ш.).



Myosotis caespitosa.



Myosotis micrantha.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

а. *pumila* Choroschkov. Хор. II, стр. 15.

Myosotis caespitosa C. F. Schultz *nana*, Хор. Отч. I, стр. 10.

Карликовая форма съ простымъ стеблемъ въ 3,5—14 см.

Раст. густой группой близъ д. Булгаковой по болотистому лугу, Бгр. у. (Х.).—По прав. берегу р. Пахры, между с. Зеленымъ и Песуповымъ, близъ ручья, Бри. у. (С.).

763. *M. micrántha* (Pall.) Lehm.

Myosotis arenaria Schrad. Пет. Кр. II, стр. 126.

Myosotis stricta Link. Бух. II, № 332.—Бух. I, № 314.—F. O., № 7, p. 102.—Пет. стр. 226.—Кауф. II, № 605.—Цин., № 1009.—Кауф. I, стр. 397.—Апп., С. III, № 240.

Myosotis arvensis Ehrh. Дв., № 195.—Макс., № 182.—Hoff. II, № 1210.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 33.—Hoff., № 2149.

Однолѣтнее; стеблей нѣсколько или одинъ до 20 см., отъ основанія вѣтвистый, покрытъ оттопыренными волосками; корневые листья розеткой, ложковидные, суженные въ черешокъ; нижніе стеблевые—овальные или овально-ланцетные; верхніе—ланцетные, сидячіе; завитки начинаются почти отъ основанія стебля и въ нижней части покрыты листьями; вѣнчикъ слегка вогнутый, свѣтло-голубой, 1,5 мм. въ поперечникѣ; трубка его короче чашечки; послѣдняя при плодахъ замкнутая и въ нижней части покрыта отогнутыми крючковатыми волосками; плодоножки короче чашечки; орѣшки около 1 мм. дл.

По полямъ, паровымъ полямъ, бесплоднымъ и возвышеннымъ мѣстамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ начала мая до средины іюня, иногда во второй разъ въ августѣ; плоды съ начала іюня.

764. *M. silvática* Hoffm. Хор. II, стр. 19.—Сыр. Отч. II, стр. 19.—Пет. Кр. II, стр. 124.—Бух. II, № 330.—Пет., стр. 226.—Цин., № 1006.—Дв., № 194.

Myosotis silvatica Ehrh. Макс., № 179.—Mart., p. 32.

Myosotis silvatica Hoffm. *β. alpestris* Koch. F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, № 603.—Кауф. I, стр. 396.

Myosotis montana Bess. Рупр., стр. 88.

Растеніе дву-многолѣтнее; стебель одинъ или ихъ нѣсколько, въ 10—40



Myosotis silvatica.

см., прямостоящихъ, слегка ребристыхъ, съ отстоящими б. или м. густыми волосками; корневые листья часто розеткой, язычковые или длинно-эллиптическіе, на длинныхъ черешкахъ; нижніе стеблевые—ланцетные или линейно-ланцетные, суженные въ короткій черешокъ; остальные сидячіе, линейные или линейно-ланцетные, нѣсколько уширены къ основанію; цвѣты въ 2—5 верхушечныхъ завиткахъ безъ листьевъ; вѣнчикъ сперва блѣдно-розовый, потомъ голубой, трубка его короче отгиба и равна глубоко-надрѣзной чашечкѣ; послѣдняя покрыта прямыми щетинистыми волосками, рѣже нѣкоторые волоски крючковатые и при плодоношеніи у основанія чашечки отогнутые; пыльники заостренныя; столбикъ короче чашечки; плодо-

ножки торчащія, равны чашечкѣ или длиннѣе ея, покрыты прижатыми волосками; орѣшки 1,5—2 мм. дл. съ замѣтной каймой.

По лугамъ и кустарникамъ. Цвѣтетъ съ начала мая; зрѣлые плоды

съ конца мая до середины юня. Печатиново, Перерва, Кате́льники: Раменское, Бри. у.; Трепарево, Мож. у.; Городище близъ Коломны (К.).—Нижние Котлы (Шт.).—Симоновъ монастырь (П.).—Между Вешняками и Косиными: С. Константиновское и между д. Булатовой и Шиганиной, Пдл. у. (Х.).—Малаховка, Бри. у. (Гей.).—Между Красной Пахрой и Остафьевымъ, Пдл. у. (Б.).—Тутъ близъ Боровскаго кургана на Москвѣ р., Бри. у.; на дугу противъ церкви с. Усова—откосъ къ Москвѣ р., Зви. у. (С.).—Рождествено на р. Нарѣ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ). И по заливнымъ лугамъ и опушкамъ всей береговой полосы р. Оки, какъ въ Сри., такъ и въ Кзм. уу.

α. *lactea* Boenn. Пет. Кр. II, стр. 124.

Цвѣты бѣлые. Подъ Серпуховымъ и близъ с. Озеръ, Кзм. у. (П.).

765. *M. scorpioides* L. excl. var. β.

Myosotis intermedia Link. Бух. II, № 331.—Бух. I, № 315.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 226.—Кауф. II, № 604.—Цил., № 1007.—Кауф. I, стр. 397.—Lind., p. 142.

Myosotis arvensis Roth. Пет. Кр. II, стр. 125.—Ad., p. 91 et 92.—St. II, p. 11.

Myosotis scorpioides L. α. *arvensis* L. St. I, № 114.

Myosotis scorpioides L. Pal., № 282.

Myosotis collina Ehrh. Дв., № 196.—Mart., p. 33.

Одно-двухлѣтнее, рѣдко многолѣтнее растеніе; стебель одинъ или нѣсколько, до 50 см., слегка гранистыхъ, б. или м. густо покрытыхъ, какъ и все растеніе, оттопыренными волосками; вѣтви только въ верхней части стебля или почти отъ основанія; корневые листья часто розеткой, обратно-яйцевидные, суженные въ черешокъ; стеблевые—продолговато-ланцетные; нижніе—суженные въ короткій черешокъ, верхніе—сидячіе и иногда внизу слегка уширенные; цвѣты въ б. или м. длинныхъ завиткахъ, безъ листьевъ; вѣничикъ въ поперечникѣ 2—3 мм., слегка вогнутый, голубой, съ желтыми чешуйками; трубка его нѣсколько длиннѣе отгиба и короче чашечки; послѣдняя покрыта отстоящими и даже отогнутыми крючковатыми волосками; надрѣзы ея глубокіе, доходить до половины чашечки и нѣсколько неровные, при плодахъ б. ч. смыкаются, или открытые; плодоножки въ 2 и болѣе разъ длиннѣе чашечки; столбикъ короткій; орѣшки съ 3 острыми ребрами.



Myosotis scorpioides.

Цвѣтеть съ конца мая до осени; плоды съ середины юня. Распадается на слѣдующія формы по мѣсту обитанія:

α. *agrëstis* Schlecht.

Растеніе вѣтвится б. ч. только съ половины стебля; завитки короче стебля; корневые листья ко времени цвѣтенія увядаютъ; стеблевые—густо покрыты волосками, отчего сѣроватые.

По паровымъ полямъ, межамъ и кустарникамъ, очень часто.

β. silvéstris Schlecht.

Высокое, почти от основанія сильно вѣтвистое растеніе, съ очень длинными завитками; корневые листья ко времени цвѣтенія не увидаются; стеблевые—широко-ланцетные, зеленые, покрыты не густыми волосами. По лѣсамъ, не часто.

766. *M. sparsiflora* Mik. Пет. Кр. II, стр. 126.—Бух. II, № 333.—Бух. I, № 316.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 226.—Кауф. II, № 606.—Цин., № 1010.—Pinz., p. 16.—Кауф. I, стр. 397.—Ann., C. IV, № 32.—Дв., № 197.—Макс., № 180.—Hoff. II., № 1226.—Gold. C., p. 18.—Gold. Sp., p. 121.—Mart. p. 33.—Ad., p. 92.

Myosotis sparsiflora Mik. var. *major*. Макс., № 180.—Макс. Пут. II, p. 91.

Myosotis collina Ehrh. Макс., № 181.—и герб. № 28 suppl.

Однолѣтнее; стебель до 40 см., граннѣтый, простой или чаще от основанія сильно вѣтвистый, ломкій, покрытъ жесткими, вѣнзъ обращенными щетинистыми волосами, свѣтло-



Myosotis sparsiflora.

зеленый, какъ и все растеніе; листья широко или узко-ланцетные, корневые и нижніе стеблевые сужены въ черешокъ, верхніе—почти сидячіе, съ обѣихъ сторонъ и по краямъ щетинисто-волосистые; завитки рѣдкоцвѣтные, до половины покрыты листьями, такъ что нижніе цвѣты кажутся пазушными; цвѣтоножки къ созрѣванію плодовъ сильно удлиняются и отгибаются книзу; вѣнчикъ блѣдно-голубой, маленькій, отгибъ его короче трубки, которая короче чашечки; послѣдняя во время плодоношенія въ нѣсколько разъ короче плодоножки, глубоко надрѣзная, съ длинными заостренными зубцами, рас-

крытая и въ нижней части покрыта отстоящими крючковатыми волосами; орѣшки до 2 мм. дл.

Сорное, по огородамъ, близъ жилья и по тѣнистымъ мѣстамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины мая весь іюнь; плоды съ конца мая.

83 сем. Labiátae Juss.

Цвѣты обоеполые, б. ч. неправильные, рѣже почти правильные; вѣнчикъ сростнолепестный, двугубый; верхняя губа двураздѣльная, иногда шлемовидная, нижняя—трехраздѣльная, съ болѣе крупной средней лопастью; въ цвѣткѣ съ вѣнчикомъ, почти правильнымъ, верхняя губа короткая, почти равна лопастямъ нижней, и вѣнчикъ кажется 4-лепестнымъ; чашечка сростнолистная, пятизубчатая или двугубая; верхняя губа о 3, нижняя—о 2 зубцахъ, рѣже обѣ губы чашечки цѣльныя; тычинокъ 4, изъ нихъ 2 верхнихъ длиннѣе 2 нижнихъ, рѣже наоборотъ, или тычи-

ночь только 2; во всѣхъ случаяхъ тычинки прикрѣплены къ трубкѣ вѣнчика; пыльники двугибдные, съ параллельными или расходящимися гибдами, вскрываются продольною щелью; иногда гибда сливаются и тогда вскрываются одною общею щелью; завязь верхняя, окружена у основанія дискомъ, сперва двугибдная, потомъ, вследствие разрастанія ложной перегородки, 4-гибдная, съ одною сѣменочкой въ каждомъ гибдѣ; столбикъ одинъ, выходитъ изъ средня завязи между ея долями; рыльце двулопастное, рѣже простое; плодъ сложный изъ 4 орѣшкообразныхъ плодиковъ (орѣшкочковъ); сѣмя съ прямымъ зародышемъ безъ бѣлка. Растенія съ четырехграннымъ стеблемъ и супротивными листьями безъ прилистниковъ, усеяны железками съ эфирнымъ масломъ.

Обзоръ семейства.

I. *Saturejeae Benth.*

Отгибъ вѣнчика плоскій или почти плоскій; тычинокъ 4, иногда верхнихъ нѣтъ, и тогда тычинокъ 2; орѣшки гладкіе или мелко зернистые.

Elssholzia, Mentha, Lycopus, Origanum, Thymus, Satureja.

II. *Monardeae Benth.*

Вѣнчикъ нашихъ видовъ ясно двугубый; тычинокъ 2; орѣшки гладкіе или мелко зернистые.

Salvia.

III. *Nepeteae Benth.*

Чашечка б. ч. о 13—15 жилкахъ; вѣнчикъ двугубый; тычинокъ 4, заднія длиннѣе; орѣшки гладкіе или мелко зернистые.

Nepeta, Glechoma, Dracocephalum.

IV. *Stachydeae Benth.*

Чашечка о 5—10 жилкахъ; вѣнчикъ двугубый; тычинокъ 4, изъ коихъ 2 переднія длиннѣе.

Lamium, Galeopsis, Stachys, Ballota, Leonurus, Chaeturus, Scutellaria, Brunella.

V. *Ajugeae Benth.*

Вѣнчикъ почти одногубый; верхняя губа его очень короткая, иногда ея вовсе нѣтъ, и тогда остаются только ея 2 лопасти; тычинокъ 4, двѣ переднія длиннѣе; орѣшки б. ч. сѣтчато-ячеистые.

Ajuga.

Опредѣлитель родовъ.

1. Верхняя губа вѣнчика очень короткая, такъ что вѣнчикъ кажется одногубымъ. *Ajuga.*
Вѣнчикъ ясно двугубый или неясно двугубый, и тогда неправильный о 4 почти равныхъ лопастяхъ. 2.
2. Тычинокъ двѣ. 3.
Тычинокъ четыре. 4.

3. Вѣичикъ крупный, ясно-двугубый. *Salvia.*
Вѣичикъ маленькій, неправильный, 3-лопастный. *Lycopus.*
4. Вѣичикъ 4-лопастный, неясно двугубый. 5.
Вѣичикъ ясно двугубый. 6.
5. Трубка вѣичика внутри съ волосистымъ кольцомъ; глѣзда пыль-
никовъ расходящіяся. *Elssholzia.*
Трубка вѣичика внутри безъ волосистаго кольца; глѣзда пыльниковъ параллельныя. *Mentha.*
6. Чашечка двугубая; верхняя губа о 3, нижняя—о 2 зубцахъ или
обѣ губы цѣльныя. 7.
Чашечка 5-зубчатая, иногда одинъ зубецъ шире четырехъ остальныхъ. 10.
7. Обѣ губы чашечки цѣльныя. *Scutellaria.*
Верхняя губа о 3, нижняя—о 2 зубцахъ. 8.
8. Внутри трубки вѣичика близъ основанія волосистое кольцо.
Brunella.
Внутри трубки вѣичика волосистаго кольца нѣтъ. 9.
9. Трубка чашечки колокольчатая, короткая, прямая. *Thymus.*
Трубка чашечки цилиндрическая, длинная, изогнутая. *Satureja.*
10. Изъ 5 зубцовъ чашечки одинъ много шире остальныхъ.
Dracoccephalum.
Все зубцы чашечки одинаковой ширины или 3 шире остальныхъ
двухъ. 11.
11. Внутри трубки вѣичика волосистое кольцо. 12.
Трубка вѣичика безъ волосистаго кольца. 16.
12. Чашечка съ 5 выемчатыми зубцами и въ выемкѣ съ колючимъ
шиловиднымъ отросткомъ. *Phlomis.*
Чашечка съ 5 простыми зубцами. 13.
13. Боковыя лопасти у нижней губы острые или ихъ нѣтъ, вмѣсто
нихъ по маленькому зубчику. *Lamium.*
Боковыя лопасти нижней губы б. или м. крупныя, округленныя. 14.
14. Трубка вѣичика не выдается изъ чашечки; листья глубоко-лопа-
стные или пальчато-надрѣзные. *Leonurus.*
Трубка вѣичика б. или м. выдается изъ чашечки; листья зубча-
тые, но не лопастные. 15.
15. Чашечка съ 5 равными зубцами; при каждомъ цвѣткѣ по одному
узкому прицвѣтнику короче чашечки; тычинки по отцвѣтаніи
примыя. *Ballota.*
Чашечка съ 5 нѣсколько неравными зубцами; узкихъ прицвѣт-
никовъ нѣтъ; двѣ тычинки послѣ цвѣтенія скручиваются и
отгибаются паружу. *Stachys.*
16. Боковыя лопасти у нижней губы ясно замѣтны, съ округлой
верхушкой. 17.
Боковыхъ лопастей нѣтъ, а вмѣсто нихъ по острому зубцу съ
каждой стороны. *Lamium.*

17. Средняя лопасть нижней губы съ двумя полными рожекми у основанія. *Galeopsis.*
 Полныхъ рожекъ у средней лопасти нѣтъ. 18.
 18. Чашечка въ зѣвѣ съ волосистымъ кольцомъ. *Origanum.*
 Въ зѣвѣ чашечки волосистаго кольца нѣтъ. 19.
 19. Трубка вѣничка выдается изъ чашечки. 20. *Chaeturus.*
 Трубка вѣничка не выдается изъ чашечки. *Hyssopus.*
 20. Тычинки сильно выдаются изъ вѣничка, много длиннѣе верхней губы.
 Тычинки не длиннѣе верхней губы. 21.
 21. Чашечка съ 5 жилками. *Stachys.*
 Чашечка съ 15 жилками. 22.
 22. Стебель слабый, ползучій; средняя лопасть губы съ ровнымъ или слабо извилистымъ краемъ. *Glechoma.*
 Стебель твердый, прямостоящій; средняя лопасть нижней губы съ городчато-зубчатымъ краемъ. *Nepeta.*

327. *Elsshölzia* Willd.

Вѣничекъ неясно двугубый, съ 4-лопастнымъ отгибомъ; нижняя лопасть нѣсколько длиннѣе остальныхъ, верхняя съ небольшою выемкой; трубка вѣничка близъ основанія перетянута и внутри съ волосистымъ кольцомъ; чашечка трубчато-колокольчатая, 5-зубчатая, съ волосками въ зѣвѣ; тычинокъ 4, выдающихся изъ вѣничка; глѣзда пыльниковъ расходятся, прикрѣплены какъ бы поперекъ, потомъ сливаются.

767. *E. Patrínii* (Lep.) Garcke. Пер. Кр. II, стр. 101.

Elsshölzia cristata Willd. Пер., стр. 182. — Кауф. II, № 556. — Гор., № 31. — Цин., № 1102. — Кауф. I, стр. 367.

Стебель 20 — 50 см., вѣтвистый, слегка опушенный, какъ и черешки листьевъ; листья яйцевидные или продолговато-яйцевидные, заостренные, къ основанію суженные, по краямъ городковые съ туповатыми городками; цвѣты полумутовками въ пазухахъ крупныхъ прицвѣтниковъ, образуютъ на концѣ стебля и вѣтвей густые, двурядные, односторонніе колосы; прицвѣтники зеленые, широко-яйцевидные, быстро заостренные, рѣсничатые, крупнѣе, чѣмъ вся мутовка цвѣтовъ; чашечка по жилкамъ опушенная съ точечными железками, какъ и прицвѣтники; вѣничекъ маленький, 2 мм. дл., свѣтло-лиловый, снаружи слегка опушенный; растеніе пахучее.

По берегамъ рѣкъ и по холмамъ одиночное, рѣдко. Цвѣтетъ съ начала іюля. Одиночное по берегу Москвы р. на гористыхъ мѣстахъ (герб. Борхмана).—



Elsshölzia Patrínii.

Серпуховъ подъ Владычнымъ монастыремъ (Г.). — Подъ Зибровымъ, Срп. у. (Гей.). — Лужки, Срп. у., на песчаной почвѣ по лѣсовѣ (П. Х. и Кречетовичъ).

328. *Méntha L.*

Вѣнчикъ неясно-двугубый, колокольчато-ворончатый, съ 4-лопастнымъ отгибомъ; верхняя лопасть 2-лопастная и нѣсколько шире остальныхъ; чашечка колокольчатая или трубчатая, 5-зубчатая; тычинокъ 4 съ параллельными гнѣздами; встрѣчаются цвѣты двухъ родовъ: съ длинными, выдающимися изъ вѣнчика тычинками и длиннымъ столбикомъ, и тычинками, заключенными въ вѣнчикъ, но съ длиннымъ столбикомъ, въ послѣднемъ случаѣ тычинки мало развиты.

1. Цвѣточные мутовки въ пазухахъ листьевъ, которые много длиннѣе мутовокъ; верхушка стебля заканчивается пучкомъ листьевъ. 2.

Цвѣты въ мутовкахъ, собранныхъ въ длинные прерывчатые или не прерывчатые колосы на концѣ стебля и вѣтвей. 3.

2. Основаніе листьевъ округлое или даже почти сердцевидное.

M. arvensis L.

Основаніе листьевъ сужено въ черешокъ, но не округлое и не сердцевидное.

M. austriaca Jacq.

3. Цвѣты собраны въ продолговатое или почти головчатое соцветіе.

M. aquatica L.

Цвѣты собраны въ длинные колосы, прерывные или не прерывные. 4.

4. Верхніе листья сидячіе или почти сидячіе, черешокъ не длиннѣе 1—2 мм. 5.

Верхніе или все листья на черешкахъ, у нижнихъ черешокъ длиннѣе 2 мм.

M. piperita L.

5. Листья голые или только вдоль жилокъ слабо волосистые.

M. spicata Huds.

Листья съ обѣихъ сторонъ б. или м. густо опушенные, съ нижней стороны бѣло- или сѣро-войлочные.

M. longifolia (L.) Huds.

768. *M. longifolia (L.) Huds.*

Mentha longifolia L. Пет. Кр. II, стр. 101 и 102.

Mentha silvestris L. Пет., стр. 223. — Кауф. II, № 557. — Цип., № 1103. — Рупр., стр. 88. — Кауф. I, стр. 368. — Дв., № 556. — Макс., № 540. — Поф. II., № 4311. — Mart., p. 100. — Pal., № 1208.

Стебель 30—75 см., б. или м. вѣтвистый, въ нижней части почти голый или покрытъ бѣлыми прижатыми волосками, къ верхушкѣ опушеніе становится гуще и переходитъ въ бѣлый войлокъ; листья эллиптическо-ланцетные или яйцевидно-ланцетные, заостренные или короткозаостренные, у основанія иногда цѣльнокрайніе, по краямъ зубчатые; нижніе — на черешкахъ, верхніе — почти сидячіе; верхняя сторона ихъ голая или опушенная, темно-зеленая, нижняя — всегда бѣло- или сѣроваточная; цветочные колосы верхушечные и на концѣ вѣтвей, 2—8 см. дл., не прерыванные или только у основанія прерывные; прицвѣтники длиннѣе мучонокъ; чашечка колокольчатая, зубчики ея шиловидные, равные, но короче трубки вѣнчика, рѣже равны ей; вѣнчикъ лиловый или розовый, снаружи опушенный.

Цвѣтетъ въ августѣ. У насъ только слѣдующая форма:



Mentha longifolia.



Mentha spicata.

α. vulgaris Koch.

Mentha silvestris L. *α. vulgaris* Koch. Кауф. II, стр. 379.—Кауф. I, стр. 368.

Стебель и листья покрыты бѣловатымъ войлокомъ; листья плоскіе или слегка морщинистые; форма *b.* Koch.: листья сверху зеленые, покрыты пушкомъ, нижняя сторона ихъ и стебель съ прижатымъ бѣлымъ войлокомъ. По сырымъ мѣстамъ и лѣснымъ холмамъ очень рѣдко. Вблизи Измайловскаго звѣринца (герб. Ген.).—Нахрино, Пдл. у. (Мар.).—Въ гербаріи Гольдбаха.—Воробьевы горы (Ш.).

* *M. spicata* Huds.

Mentha viridis L. Нер. Кр. II, стр. 103.—Цин., стр. 339., Др., № 566.—Макс., № 544.—Gold. Sp., p. 129.—Mart., p. 100.—St. II, p. 33.—St. I, № 386.—Pal., № 1209.

Стебель 30—80 см., простой или вѣтвистый, голый; листья овально-ланцетные или овальные, рѣже сердцевидно-овальные, по краямъ зубчатые, съ обѣихъ сторонъ голые или по жилкамъ слабо волосистые, въ

сидячие или только самые нижние на коротких черешках въ 1—2 мм. дл.; цвѣточныя мутовки въ тонкихъ, б. ч. прерванныхъ колосьяхъ на концѣ стебля и вѣтвей; прицвѣтники голые или слабо рѣсничатые, длиннѣе цвѣточныхъ мутовокъ; цвѣтоножки голыя; чашечка короткая, колокольчатая, голая или слабо опушенная; зубцы ея треугольно-шило-видные, рѣсничатые; вѣничикъ лиловый или розовый.

Разводится.

* *M. piperita* L. St. II, p. 33.

Стебель 30—100 см., вѣтвистый, часто красноватый, покрытъ короткими и рѣдкими щетинистыми волосками, по угламъ стебля болѣе густо; листья яйцевидно-продолговатые или ланцетные, голые или по жилкамъ покрыты короткими щетинистыми волосками, по краямъ неровно и крупно остро-зубчатые, всё на б. или м. длинныхъ черешкахъ въ 6—8 мм. дл. и съ нижней стороны густо устѣяны точечными железками; цвѣточные колосы прерванные на концѣ стебля и вѣтвей; прицвѣтники очень узкіе рѣсничатые, то короче, то длиннѣе мутовокъ; чашечка голая, фіолетовая, покрыта рядами желтыхъ точечныхъ железокъ; зубцы ея прямо-торчащіе, рѣсничатые; трубка вѣничка бѣловатая, равна чашечкѣ, отгибъ лиловый.

Разводится.



Mentha piperita.



Mentha aquatica.

769. *M. aquatica* L. Пет. Кр. II, стр. 102.—Пет., стр. 224.—Кауф. II, № 558.—Цин., № 1104.—Кауф. I, стр. 368.—Дв., № 567.—Макс., № 543.—Хоф. II., № 4289.—Март., p. 100.—Хоф., № 2082.—St. II, p. 33.—St. I, № 387.

Корневище съ длинными, ползучими листовыми побѣгами; стебель 30—90 см., вѣтвистый, почти голый или покрытъ б. или м. густо, особенно въ верхней части, внизъ обращенными волосками, отчего шероховатый; листья то голые, то опушенные, по краямъ зубчатые, на б. или м. длинныхъ черешкахъ, яйцевидно-сердцевидные или продолговатые, съ сердцевиднымъ основаніемъ, или же основаніе быстро сужено въ чере-

ножки мутовки цвѣтовъ сближены на верхушкѣ стебля и вѣтвей въ продолговатое или почти головчатое сочѣтѣіе; цветоножки покрыты вѣнзъ обращенными волосками, рѣже голыя; чашечки то голыя, то покрыты отстоящими волосками, но всегда съ точечными железами, какъ и листья; трубка чашечки борозчатая, зубцы съ шиловиднымъ остріемъ; вѣнчикъ красновато-лиловый, 6—8 мм. дл., снаружи опушенный, рѣже голый; орѣшки мелко точечные.

Около воды. Цвѣтеть въ іюлѣ. Указана одинъ только разъ—въ гербаріи Гофмана за № 4289.

770. *M. arvensis* L.

Стебель 15—50 см., простой или вѣтвистый, со всѣхъ сторонъ густо опушенный; листья линейные или эллиптическо-продолговатые, основаніе ихъ округлое или даже почти сердцевидное, не сужено въ черешокъ, по краямъ тупо пильчатые, съ обѣихъ сторонъ б. или м. густо опушенные, иногда сѣро-войлочные, б. ч. на короткихъ черешкахъ; цвѣты мутовками въ пазухахъ листьевъ, верхнія мутовки б. ч. сближены; прицвѣтиски линейно-ланцетные, густо опушенные и рѣсничатые; чашечки и цветоножки б. или м. густо опушенныя, рѣдко цветоножки почти голыя; зубцы чашечки широко-треугольные; вѣнчикъ розовато-лиловый или лиловый.

По межахъ, паровымъ полямъ и пашнямъ, какъ кажется, очень рѣдко. Цвѣтеть съ іюня до осени.



Mentha arvensis.



Mentha austriaca.

771. *M. austriaca* Jacq. Пет. Кр. II, стр. 103.—Дв., № 569.—Макс., № 542.—Hoff. II., № 4291.—Gold. C., p. 20.—Gold. Sp., p. 129.—Mart., p. 100.—St. II, p. 33.

Mentha arvensis L. Бух. II, № 307.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 223.—Кauf. II, № 559.—Цин., № 1105.—Kauf. I, стр. 369.—Lind., p. 148.—Ann., C. II, № 147.—Дв., № 568.—Макс., № 541.—Mart., p. 100.—St. II, p. 33.—St. I, № 389.

Стебель 15—90 см., прямостоящій или приподнимающійся, внизу б. ч. голый, верху б. или м. по угламъ опушенный, простой или вѣт-

вистый; листья яйцевидно-эллиптические или продолговато-ланцетные, къ концу заостренные, къ основанію суженные въ б. или м. длинный черешокъ, по краямъ тупо или остро-зубчатые; цвѣты мутовками въ пазухахъ листьевъ; прицвѣтники линейно-ланцетные, рѣсничатые; чашечка коротко-колокольчатая, коротко опушенная; цвѣтоножки голыя или почти голыя, окрашенные, рѣдко зеленые; вѣтчикъ красовато-лиловый или лиловый, 4—5 мм. дл.

По берегамъ рѣкъ, ручьевъ, по паровымъ полямъ и по канавамъ, часто. Цвѣтеть съ іюня до осени.

Можно различить слѣдующія формы:

α. *typica* GB.

Mentha arvensis L. β. *glabriuscula* Koch. Бух. I, № 309.—Кауф. II, стр. 380.—Кауф. I, стр. 369.

Листья яйцевидно-ланцетные, б. или м. остро-зубчатые, 2—4 см. дл. и 1—1,7 см. ш., съ обѣихъ сторонъ голые или почти голые, какъ черешки и цвѣтоножки. Часто.

β. *nemórum* (Boreau) GB.

Стебель въ нижней части голый, въ верхней, особенно по угламъ, опушенный; листья тонкіе, широко-яйцевидно-эллиптические, 4—8 см. дл. и 1,5—4,25 см. ш., очень слабо опушенные или голые, часто лоснящіеся, по краямъ б. ч. тупо-зубчатые; чашечка, какъ и ея остро-треугольные зубчики, опушенная; цвѣтоножки голыя. Тѣлесная форма. Мытищи; берегъ пруда близъ д. Пзмалково, Зви. у.; между Борисовымъ и Лужками, Сри. у. (С.).—Въ тѣни противъ Тверитина близъ Рождествена на р. Нарѣ, Сри. у. (гр. Е. Соллогуѣ).

γ. *parietariaefolia* (Becker).

Походить на β. *nemogum*, но отличается продолговато-ланцетными листьями съ длиннымъ клиновиднымъ основаніемъ, островатыми зубцами и очень длинными черешками листьевъ, много длиннѣе мутовокъ. Успенское, Зви. у. (X.).

δ. *multiflora* Host.

Mentha arvensis L. α. *conferta* Kautf. m. Кауф. II, стр. 380.—Кауф. I, стр. 369.

Стебель опушенный, по угламъ съ болѣе длинными волосками, чаще вѣтвистый; листья яйцевидно-ланцетные, тупые или заостренные, по краямъ зубчатые и рѣсничатые, съ обѣихъ сторонъ б. или м. густо опушенные, какъ и черешки; цвѣтоножки голыя или почти голыя; чашечка густо опушенная, зубцы ея коротко-треугольные. Походить на α. *typica*, но отличается отъ нея опушеніемъ и короткими зубцами чашечки. Гладышево на р. Сѣтунн (II.).

329. *Lýcopus* L.

Вѣтчикъ колокольчатый, слегка неправильный, 4-лопастный; верхняя лопасть слегка выемчатая; чашечка колокольчатая, нѣсколько глубже

половины 5-зубчатая; тычинокъ только 2, выдающихся изъ вѣнчика, цвѣ другія или совсѣмъ не развиты, или же въ видѣ двухъ тонкихъ нитей безъ пыльниковъ; пѣзда пыльниковъ расходящіяся, вскрываются отдѣльно; орѣшки сжатые, съ утолщеннымъ краемъ, къ основанію суженные.

772. *L. europaeus* L. Пер. Кр. II, стр. 104. — Бух. II, № 380. — Бух. I, № 290. — F. O., № 7, p. 102. — Пер., стр. 219. — Кауф. II, № 560. — Цик., № 1107. — Кауф. I, стр. 370. — Lind., p. 148. — Ann., C. IV, № 36. — Дв., № 32. — Макс., № 35. — Hoff. H., № 197. — Gold. C., p. 17. — Mart., p. 7. — Hoff., № 1981. — Ad., p. 14. — St. II, p. 4. — St. I, № 21. — Pal., № 48.

Lycopus vulgaris, Mart., p. 7.

Корневище съ длинными тонкими побѣгами, на концѣ укореняющимися; стебель 30 — 100 см., прямостоящій, простой или вѣтвистый;



Lycopus europaeus.



Lycopus exaltatus.

листья продолговато-ланцетные, заостренныя, суженныя въ короткій черешокъ, грубо надрѣзано-зубчатые; нижніе — почти перисто-надрѣзные, б. ч. съ цѣльнокрайними надрѣзами; къ верхушкѣ листья становятся мельче и не столь глубоко зубчатые; цвѣты 4 — 5 мм. дл., собраны въ пазушныя мутовки; прицвѣтники маленькіе, линейно-ланцетные, по краямъ рѣсничатые, переходятъ въ колочку; чашечныя зубцы колючіе, опушенныя; вѣнчикъ бѣлый съ красными точками; средняя лопасть нижней губы вѣнчика почти 4-угольная, вдвое шире боковыхъ; орѣшки 1,5 — 2 мм. дл., опушенныя, но б. ч. безъ железокъ.

По сырмъ мѣстамъ, канavamъ, по берегамъ рѣкъ и прудовъ, часто. Цвѣтетъ съ начала іюля до поздней осени; плоды съ конца іюля.

У насъ пока только:

2. *glabrescens* Schmiedely.

Стебель и листья голые или почти голые, съ нижней стороны листья по жилкамъ б. ч. опушенныя.

773. *L. exaltátus* *L. fil.* Пет. Кр. II, стр. 104.—Пет., стр. 219.—Кауф. II, № 561.—Цип., № 1108.—Рупр., стр. 86.—Кауф. I, стр. 370.—Макс., № 36.

Lycopus pinnatifidus Pall. Дв., № 33.—Макс., № 36.

Стебель 50—150 см., простой или слегка вѣтвистый, коротко и курчаво пушистый, листья яйцевидно-продолговатые, верхніе — ланцетные, вѣ перисто-надрѣзные или -раздѣльные, съ долями линейными или ланцетными, иногда у нижнихъ листьевъ доли съ одного края зубчатые; у верхнихъ — доли почти всегда цѣлюкрайніе; вѣ листья съ обѣихъ сторонъ опушенные, особенно густо съ нижней стороны по жилкамъ; чашечные зубцы колокольч.; вѣнчикъ бѣлый или бѣдно-лиловый; вѣ 3 лопасти нижней губы яйцевидныя, почти одинаковыя и средняя съ полудуннымъ краснымъ пятномъ; орѣшки опушенные, съ железками.

По берегамъ рѣкъ, прудовъ и по болотамъ, не часто. Цвѣтетъ съ средины іюня до сентября; плоды съ средины іюля. Гербаріи Максимовича.—По берегу р. Нахры подъ Подольскомъ (Рупр.).—По берегу пруда у Серпухова (К.).—Бѣлые Колодези, Кал. у.; устье р. Ломани, Лукин. Спр. у. (II.).

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. glabrátus *).

Листья совершенно голые, только съ нижней стороны вдоль жилокъ покрыты короткими прижатыми волосками. Бѣлые Колодези, Кал. у. (II.).

330. *Origanum* *L.*

Вѣнчикъ двугубый; верхняя губа почти плоская, на верхушкѣ съ выемкой, нижняя — 3-лопастная; чашечка колокольчатая, 5-зубчатая, вѣ вѣтвѣ съ волосистымъ кольцомъ; тычинокъ 4, расходящихся; пыльники разобщены почти треугольнымъ связникомъ, гнѣзда ихъ почти параллельныя.

774. *O. vulgáre* *L.* Пет. Кр. II, стр. 107.—Бух. II, № 310.—Бух. I, № 292.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 233.—Кауф. II, № 566.—Цип., № 1109.—Кауф. I, стр. 373.—Lind., p. 150.—Ann., C. I, № 39.—Дв., № 589.—Макс., № 563.—Hoff. II., № 4415.—Gold., C., p. 21.—Mart., p. 104.—St. I, № 406.—Pal., № 1242.

Корневище косое, ползучее съ побѣгами; стебель 30—80 см., прямо-стоящій, б. или м. опушенный, простой, рѣже слегка вѣтвистый; листья на опушенныхъ черешкахъ, яйцевидные или яйцевидно-продолговатые, туповатые, верхніе—часто заостренные, цѣлюкрайніе или слабо зубчатые, по краямъ рѣсничатые, голые или особенно снизу вдоль жилокъ опушенные; цвѣты въ продолговатыхъ колоскахъ, расположенныхъ щит-

*) *Lycopus exaltatus* *L. fil. α. glabratus*.

folia toto glabra, solum in venis paginae inferioris pilis brevibus adpressis instructa.

ковидною метелкою; зубцы чашечки почти равные, треугольно-заостренные, вѣнчикъ красно-лиловый или розовато-лиловый, 4—6 мм. дл., снаружи опушенный; орѣшки 0,8—1 мм. дл., бурые. Все растение сильно пахучее.

По кустарникамъ, лѣсамъ и холмамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ начала юля до середины августа.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. *glabrēscens* GB.

Стебель и листья слабо опушенные; прицвѣтники яйцевидные, почти все сплошь пурпуровые, голые или только по краю шероховатые вполowiнцу корочецвѣтовъ; чашечка въ нижней части голая или только железисто-опушенная. Близъ Карпочеева, Кзм. у. (II.).



Origanum vulgare.

β. *virēns* Benth.

Origanum vulgare L. *virēns* Hoffm. et Link. Kayf. II, стр. 385.—Kayf. I, стр. 373.
Origanum vulgare L. δ. *hirtum* de Visiani. Pinz., p. 17.

Б. или м. густо опушенное; прицвѣтники зеленые, съ внутренней стороны слабо железисто-опушенные.

γ. *albiflorum* Lej.

Origanum vulgare L. b. *humile* (album). Mart., p., 104.

Съ бѣлыми цвѣтами.

331. *Thymus* L.

Вѣнчикъ двугубый; верхняя губа почти плоская, съ маленькой выемкой, нижняя—3-лопастная; чашечка двугубая, съ 10 жилками и въ зѣвѣ съ волосистымъ кольцомъ; верхняя губа чашечки широкая, 3-зубчатая, нижняя—двураздѣльная; тычинки такіе же, какъ у (*Origanum* *).

*) Проф. Веленовскій пытался сгруппировать виды *Thymus* на основаніи соотношенія цвѣтоносныхъ вѣтвей къ листоноснымъ и схематически изобразилъ типы установлен-ныхъ имъ трехъ группъ: *Suberecti*, у которыхъ стебель заканчивается цвѣтучою вѣтвью, а листоносныя вѣтви прямостоячія, и двухъ другихъ съ листоносными ползучими побѣгами; у одной изъ нихъ *Repentes*—стебель заканчивается листоноснымъ побѣгомъ, а цвѣтучіе стебли боковые, пазушные, у другой же группы—*Pseudorepentes* ползучій побѣгъ развивается въ цвѣтучій стебель. При этомъ Веленовскій замѣчаетъ, что для опредѣленія видовъ по установленнымъ имъ признакамъ необходимо располагать тщательно и полно собранными экземплярами съ листоносными вѣтвями и побѣгами. Къ сожалѣнію, ни на одномъ изъ довольно большого числа экземпляровъ, собранныхъ въ Московской губерніи различныхъ формъ *Thymus*, между которыми было нѣсколько очень тщательно засушенныхъ, никакихъ ползучихъ побѣговъ нельзя было замѣтить, и потому пришлось отказаться отъ опредѣленія по тѣмъ признакамъ, которые были выдвинуты Веленовскимъ. Тѣмъ не менѣе д-ръ К. Доминъ

1. Вѣточки 4-гранныя, покрыты вдоль реберъ или только двурядно внизъ обращенными волосками. *T. glaber* Mill.

Вѣточки цилиндрическія или слабо гранистыя, покрыты сплошь волосками. 2.

2. Листья эллиптическіе или продолговато-эллиптическіе, 5—11 мм. дл.; цвѣты въ головкахъ. *T. Serpyllum* L.

Листья продолговатые или даже линейные, 10—20 мм. дл.; цвѣты въ прерванныхъ колосьяхъ. *T. Marschallianus* Willd.

775. *T. Serpyllum* L. Хор. I, стр. 18.—Пет. Кр. II, стр. 108.—Пет., стр. 291.

Thymus Serpyllum L. *γ. vulgaris* Ledeb. Кауф. II, стр. 386.—Кауф. I, приб. къ стр. 374.

Полукустарникъ образуетъ дерновники, б. ч. съ деревянистымъ подземнымъ укореняющимся стволемъ и скученными вѣточками, прямо-



Thymus Serpyllum.

стоящими или приподнимающимися, въ 2—10 см.; вѣточки почти цилиндрическія или слабо-гранистыя, сплошь коротко опушенныя; листья душистые, мелкіе, эллиптическіе или продолговато-эллиптическіе, въ 5—11 мм. дл. и до 3,5 мм. ш., коротко-черешковые, голые или опушенныя, иногда у основанія по краю съ рѣсничками; цвѣты въ плотныхъ головкахъ, розовато-лиловые; чашечка покрыта длинными волосками; вѣничикъ снаружи опушенный, 6—8 мм. дл.

Близъ жилья и по дорогамъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ конца мая до осени. Близъ Сѣтуни и близъ Нижнихъ Котловъ (Ш.).—Саввинскій монастырь, Зви. у. (Маевск.).—Близъ Новой Чудинки, Бгр. у. (П. П.).—


Протопоново, Кзм. у. (П.).—Д. Троицкая, Пдл. у., известняковый берегъ р. Мѣчи (Х.); растенія, найденныя въ Пдл. у. и *f. albiflora* Доминъ отнесъ къ *T. Lövyanus* Opiz.

У насъ встрѣчаются еще слѣдующія формы:

α. angustifolius (Pers.) Wallr.

сумѣлъ разобраться въ переданномъ ему на просмотръ матеріалѣ и успѣлъ выдѣлать два новыхъ для Московской губерніи вида, разнящихся отъ коренныхъ видовъ, главнымъ образомъ порядкомъ или характеромъ вѣтвленія, а именно: *Th. Lövyanus* Opiz, который долженъ отличаться отъ *Th. Marschallianus* только вазушными ползучими побѣгами, и *Th. ovatus* Mill., сходный съ *Th. Chamaedrys* Fr. (*Th. glaber* Mill.), но съ конечными побѣгами, заканчивающимися цвѣточными стеблями, а не ползучими побѣгами, какъ у *Th. Chamaedrys* Fr. Мало того, Доминъ различилъ еще не то промежуточную форму, не то помѣсь между послѣдними двумя видами, которую онъ предварительно назвалъ *Th. fallax* и которая отличается главнымъ образомъ вытянутымъ соцветіемъ съ разставленными цвѣточными мутовками. Форма эта найдена П. Г. Ивановымъ близъ с. Богородскаго, Вер. у., и хранится въ Московскомъ Сельско-Хозяйственномъ Институтѣ. Не располагая никакими явными морфологическими признаками для разграниченія такихъ вышнимъ образомъ очень сходныхъ формъ, какъ приведенныя выше, достаточно ограничиться лишь сдѣланнымъ примѣчаніемъ. А. Петуниниковъ.

Листья линейно-продолговатые или узко-эллиптические до 5 мм. дл. и не шире 2 мм., у основания по краю и по черешку съ длинными волосками; въ пазухахъ съ укороченными вѣточками. Найдено пока только разъ С. Темель, въ окрестностяхъ с. Останкина (опр. К. Доминъ); экземпляръ хранится въ Московскомъ Сельско-Хозяйственномъ Институтѣ.



Thymus Serpyllum α. angustifolius.

β. *albiflorus* (Choroschkov).

Thymus serpyllum L. v. *angustifolius* Pers. f. *albiflorus*. Хор. I, стр. 18.

Съ бѣлыми цвѣтками. Д. Троицкая, по крутому известняковому берегу р. Мѣчи, Пдл. у. (X.).

776. *T. Marschallianus* Willd. Нер. Кр. II, 108.—Рупр., стр. 86.

Thymus Serpyllum L. β. *Marschallianus* Ledb. Sch. II, № 383.—Кауф. II, стр. 386.—Цин., стр. 342.—Кауф. I, стр. 374.

Thymus vulgaris L. Макс., № 566.

Полукустарникъ съ деревянистымъ подземнымъ стволѣмъ и прямо-стоящими вѣточками въ 6—20 см.; послѣднія сплошь опушенные короткими внизъ направленными волосками, близъ верхушки отстоящими, довольно длинными; часто вѣточки почти войлочныя; листья сильно душистые, продолговатые, продолговато-линейные или даже линейные, 10—20 мм. дл., голые, у основанія по краямъ съ рѣсничками; цвѣты въ конечныхъ прерванныхъ колосьяхъ; чашечка покрыта длинными волосками; вѣнчикъ опушенный, лиловый или лилово-розовый; губа съ темными крапинками.



Thymus Marschallianus.

По холмамъ и на открытыхъ мѣстахъ, по известнякамъ и на пескѣ, не часто. Цвѣтетъ съ конца мая до осени. Протопопово, Кзм. у. (Макс.).—Каропчеево, Кзм. у. (К.).—Клычево, Кзм. у. (П.).—Близъ ст. Удѣльная М.-Ряз. ж. д., Бри. у., по откосу полотна (С.).

777. *T. gláber* Mill. *)

Thymus Chamaedrys Fr. Нер. Кр. II, стр. 108.

Thymus Serpyllum L. α. *Chamaedrys* Koch. Sch. V, № 1531.—Кауф. II, стр. 385.—Цин., стр. 342.—Кауф. I, стр. 374.

*) Объ синонимикѣ этого вида см. статью: K. Domin et A. Brüge Jackson. The british species of *Thymus*. The Journal of Botany British and foreign. 1908, February, № 542.

Thymus Serpyllum L. γ. *vulgaris* Ledb. Бух. II, № 311. — Бух. I, № 291. — Рур., стр. 86.

Thymus vulgaris L. Пет., стр. 291.

Thymus Serpyllum L. F. O., № 7, p. 102. — Мил., № 26. — Lind., p. 150. — Дв., № 590. — Макс., № 564. — Макс., Пут. II, стр. 11. — Hoff. Н., № 4441. — Gold. С., p. 21. — Mart., p. 104. — Hoff., № 3261. — St. II, p. 34. — St. I, № 407. — Pal., № 1244.

Полукустарникъ образуетъ дерновники, б. ч. съ деревянистымъ подземнымъ укореняющимся стволемъ и вѣточками, приподнимающимися или примостоящими, въ 5—25 см.; вѣтви 4-гранныя, покрытыя вдоль реберъ или только двурядно внизъ обращенными волосками; листья густые, яйцевидные, эллиптическіе или продолговато-ланцетные, иногда лопатчатые, до 1 см. дл., на короткихъ черешкахъ, б. ч. голые; цвѣты въ плотныхъ головкахъ, розовато-лиловые; чашечка голая или опушенная; вѣничикъ б. ч. голый.

По лугамъ, оврагамъ, склонамъ и по дорогамъ, не рѣдко. Цвѣтетъ съ половины мая до осени. Анненгофская роща (герб. Ген.).—Сокольники, Симоновъ монастырь (герб. Гольдб.).—Перово (герб. Гофм.).—Б. Мытищи близъ фермы Перлова (С.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Протопопово, Кзм. у. (герб. Макс.).—Фаустово, Бри. у. (П.). Иванова гора на р. Нарѣ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).



Thymus glaber.



Hyssopus officinalis.

* *Hyssopus* L.

Вѣничикъ двугубый съ трубкой, нѣсколько выдающейся изъ чашечки; верхняя губа почти плоская, выемчатая, нижняя — 3-лопастная, съ выдающейся срединной лопастью, въ свою очередь двулопастною; чашечка съ 15 жилками, 5-зубчатая; 4 расходящихся тычинки выдаются изъ вѣничка; пѣзда пыльниковъ расходящихся, вскрываются общою щелью.

* *H. officinalis* L. St. II, p. 33. — Pal., № 1191.

Полукустарникъ съ примостоящими или приподнимающимися стеблями въ 30—50 см., слегка шереховатыми отъ короткихъ бѣлыхъ при-

жатыхъ волосковъ; листья ланцетные или линейно-ланцетные почти сдвигіе, цѣльнокрайніе, по краямъ остро-шершавые отъ короткихъ щетинистыхъ волосковъ; цвѣты въ довольно густомъ прерванномъ, однобокомъ ложномъ колосѣ, покрытомъ листьями; вѣнчикъ темно-синій или лиловый, рѣко розовый или бѣлый, 7—10 мм. дл.; чашечка 6—8 мм. дл., съ острыми зубцами, опушенная, съ точечными железками; орѣшки 2 мм. дл., бурые.

Все растеніе имѣетъ пріятный запахъ. Разводится.

332. *Satureja* L.

Вѣнчикъ двугубый, верхняя губа почти плоская, слегка выемчатая, нижняя—3-лопастная съ болѣе широкой и выемчатой срединной лопастью; чашечка двугубая съ 13 жилками, цилиндрическая, длинная, изогнутая; верхняя ея губа 3-зубчатая, нижняя—2-раздѣльная; тычинокъ 4, переднія длиннѣе заднихъ, согнуты дугой и сближены подъ верхней губой; гифада пыльниковъ параллельныя или расходящіяся, разобщены широкимъ связникомъ.

778. *S. Ácinos* (L) Scheele.

Calamintha arvensis Lam. Иер. Кр. II, стр. 109.

Calamintha Acinos Clairv. F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 152.—Кауф. II, № 568.—Цин., № 111.—Кауф. I, стр. 375.—Lind., p. 150.—Ann., C. I, № 40.

Calamintha Acinos L. Мое., № 25.

Thymus Acinos L. Дв., № 591.—Макс., № 565.—Hoff. II, № 4419.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 105.—Hoff., № 3255—St. II, p. 34.—St. I, № 408.

Calamintha Acinos Clairv. var. *acuminata* Rehb. fil. Pinz., p. 17.

Acinos vulgaris Pers. Mart., p. 105.

Растеніе одно- или двулѣтнее съ однимъ стеблемъ или ихъ нѣсколько, простыхъ или вѣтвистыхъ, въ 15—40 см.; внизу стебли опушенные слабо, къ верхушкѣ б. или м. густо покрыты внизъ отогнутыми волосками; листья яйцевидные, туповатые или заостренные, суженные въ черешокъ, цѣльнокрайніе или съ 1—2 зубчиками съ каждой стороны, верхніе—болѣе часто-зубчатые; цвѣты въ полумутовкахъ въ пазухахъ листьевъ по 3; чашечка 4—6 мм. дл., железисто-опушенная и по выступающимъ жилкамъ покрыта щетинистыми отстоящими или внизъ обращенными волосками; вѣнчикъ 6—10 мм. дл., лиловый, въ зѣвѣ опушенный; нижняя губа у основанія съ полудушнымъ бѣлымъ пятномъ, окаймленнымъ по бокамъ черно-пурпуровыми или темно-лиловыми пятнами; орѣшки 1,2—1,5 мм. дл., съ легкимъ бѣлымъ налетомъ.



Satureja Acinos.

По холмамъ, открытымъ мѣстамъ, паровымъ полямъ и по песчанымъ берегамъ рѣкъ, часто. Цвѣтетъ съ половиною іюня до конца августа; плоды съ начала іюля.

779. *S. Clinopodium* Caruel.

Calamintha Clinopodium Benth. Пер. Кр. II, стр. 109.

Clinopodium vulgare L. Бух. II, № 312.—Бух. I, № 293.—F. O., № 7, p. 102.—Пер., стр. 169.—Кауф. II, № 569.—Цил., № 1112.—Pinz., p. 17.—Кауф. I, стр. 375.—Лав., С. III, № 244.—Дв., № 588.—Макс., № 562.—Нойф. II., № 4406.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 104.—Нойф., № 933.—St. II, p. 34.—St. I, № 405.

Корень многолѣтній, ползучій, съ побѣгами; стебли 30—60 см., б. ч. простые, рѣже вѣтвистые, густо мохнатые, какъ и черешки; листья мягкіе, пушистые, снизу блѣднѣе, яйцевидные или яйцевидно-продолговатые, тупые или слегка заостренныя, цѣльнокрайніе или слабо зубчатые; мутовки цвѣтовъ головчатая, въ пазухахъ верхнихъ паръ листьевъ, и верхушечныя, окружены шловидными щетинисто-мохнатыми прицвѣтниками; чашечка 6—8 мм. дл., покрыта длинными щетинистыми волосками; вѣничикъ свѣтло-малиновый, 12—15 мм. дл., съ длинной трубкой и съ бородкой у основанія нижней губы; орѣшки округлые съ тонкими и рѣдкими продольными линіями.



Satureja Clinopodium.

По лѣснымъ полянамъ, опушкамъ и кустарникамъ, не рѣдко. Цвѣтетъ съ половины іюня до конца августа; плоды съ

средины іюля.

α. variegatum Mart. Mart., p. 104.

Съ бѣлыми цвѣтами и съ пестрыми, почти цѣльнокрайними листьями, меньшихъ размѣровъ. Очень рѣдко.

333. *Sálvia* L.

Вѣничикъ двугубый; верхняя губа шлемовидная, сжатая съ боковъ, нижняя—3-лопастная, съ болѣе крупной и слегка выемчатой средней лопастью; чашечка двугубая, ея верхняя губа цѣльная или 3-зубчатая, нижняя—2-надрѣзанная; тычинокъ 2, съ пыльниками, сближенными подъ верхней губой вѣничика; нити очень короткія; связникъ очень длинный, дугообразный, сочлененъ съ тычиночной нитью; одно колѣно его поднято къ верхней губѣ и оканчивается одногнѣзднымъ пыльникомъ, а другое короткое опущено внизъ, съ маленькимъ другимъ гнѣздомъ или безъ гнѣзда.

1. Цвѣты свѣтло-желтые. *S. glutinosa* L.
Цвѣты синіе, лиловые, лилово-розовые, рѣдко бѣлые. 2.
2. Цвѣточныя мутовки густыя 20—30-цвѣтковыя; внутри трубки
вѣничка волосистое кольцо. *S. verticillata* L.
Цвѣточныя мутовки 4—8-цвѣтковыя; вѣничекъ безъ волосистаго
кольца въ трубкѣ. 3.
3. Верхняя часть стебля, цвѣтоножки и чашечки покрыты желези-
стыми волосками; прицвѣтники зеленые. *S. pratensis* L.
Чашечки, цвѣтоножки и стебель, хотя и опушены, но желези-
стыхъ волосковъ нѣтъ; прицвѣтники окрашенные. 4.
4. Цвѣты мелкіе 8—11 мм., сине-лиловые или лиловые; прицвѣт-
ники яйцевидные, коротко заостренные. *S. nemorosa* L.
Цвѣты болѣе крупныя—до 15 мм., синіе; прицвѣтники яйцевид-
ные, длинно-заостренные, подъ конецъ горизонтально отстоящіе.
S. silvestris L.

780. *S. glutinosa* L. Пет. Кр. II, стр. 105.—Ф. Б., № 66.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 269. Кауф. II, № 562.—Гор., № 32.—Цин., 1114 №.—Рупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 371.—Дв., № 37.—Макс., № 40.—Нoff. II., № 248.—Gold. C., p. 17. — Mart., p. 8.—Ad., p. 15. — Pal. № 72.

Стебель 70—125 см., покрытъ мягкими, въ нижней части стебля внизъ обращенными волосками; верхняя часть, цвѣтоножки и чашечки густо покрыты железистыми волосками, отчего клейкія; корневой розетки листьевъ нѣтъ; стеблевые листья на длинныхъ волосистыхъ черешкахъ, плоскіе, мягкіе, пушистые, треугольно-яйцевидные, заостренные, съ сердцевидно-коньевиднымъ основаніемъ, по краямъ городчато-зубчатые; цвѣточныя мутовки разставленныя; прицвѣтники овальные, заостренные, короче чашечки; послѣднія 10—20 мм. дл., верхняя губа съ цѣлюкрайяная, нижняя—съ 2 заостренными зубцами; вѣничекъ 30—40 мм. дл., съ длинной трубкой, свѣтло-желтый, внутри съ буро-красными крапинками, снаружи опушенный и съ лиловыми точечными железками; орѣшки обратно-яйцевидные, буро-оливковые, 4 мм. дл.



Salvia glutinosa.

По лѣсамъ и опушкамъ, на известняковой почвѣ, не часто. Цвѣтетъ съ начала іюля. Близъ д. Далматовой, Кин. у. (Ген.).—Близъ Можайска и Звенигорода (Макс.).—Дубровка, Вер. у. (Г. О.).—Городковскій оврагъ близъ Верей (Оке. Бот. Лаб.).—Между Костинымъ и Краснымъ Станомъ.

Руз. у. (Ч. и П.).—На берегу Глубокаго озера, Руз. у. (Г. О. и Ф. Б.).—Апофріево озеро. Руз. у.; подъ Саввинскимъ монастыремъ. Зыл. у. (П.).—Певѣрово, Кзм. у. (К.).—Близъ Воскресенска, Кзм. у. (М.).—Сельцо Новое. Мож. у. (Куль.).

781. *S. pratensis* L. Хор. I, стр. 18.—Пет. Кр. II, стр. 105.—Пет., стр. 269.—Кауф. II, № 563.—Гор., № 33.—Цин., № 1115. Рупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 371.—Дв., № 34.—Макс., № 38.—Mart., p. 8.—Ad., p. 14.—St. II, p. 5.—St. I, № 22.—Pal., № 65.

Стебель 30—100 см., по гранямъ слегка вогнутый, покрытъ мягкими курчавыми волосками, въ верхней части, а также чашечки и цвѣтоножки съ железистыми волосками, отчего липкій, и все растеніе съ тяжелымъ своеобразнымъ запахомъ; нижніе листья на черешкахъ, сердцевидно-яйцевидные или почти яйцевидные; стеблевые, особенно верхніе — сидячіе, сердцевидно-продолговатые, заостренные; всѣ листья по краю двоякозубчатые, иногда слегка лопастные, морщинистые, сверху голые, снизу покрыты волосками; цвѣточныя мутовки въ простомъ или вѣтвистомъ соцвѣтѣ; прицвѣтники овальные, заостренные, зеленые, короче чашечки; послѣдняя 7—10 мм. дл., по жилкамъ покрыта длинными волосками, а между жилокъ точечными желтыми железками; верхняя ея губа съ 3 короткими зубчиками и 2 бороздками, нижняя—съ 2 болѣе длинными зубцами; вѣчикъ 15—25 мм. дл. *).



Salvia pratensis.

темно-сине-лиловый или синій, снаружи покрытъ волосками и точечными железками; орѣшки кругловатые, черно-бурые, 2 мм. дл.

По лугамъ. Цвѣтетъ съ середины мая до конца іюня. Верхніе Котлы (Ш.).—Горенки (Гей.).—Близъ Серпуховскаго шоссе въ Троицкомъ, близъ Черемушекъ (К.).—Иванова гора на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Между Елиной и Коневымъ Боромъ, Кзм. у. (Х.).—Въ канавѣ по Серпуховскому шоссе близъ Подольска (Куль.).—И по всему берегу р. Оки, какъ въ Срп., такъ и въ Кзм. уу.

α. fl. albo.

Цвѣты бѣлые. Дракино, Срп. у. (Гей.).

782. *S. silvestris* L. Хор. II, стр. 17.

Стебель 20—60 см., къ верхушкѣ вѣтвистый, рѣже простой; все растеніе, не исключая верхней стороны листьевъ, сѣрое отъ короткихъ, мягкихъ, прижатыхъ волосковъ, но волоски не столь густы, какъ у

*) А. Н. Петуниниковъ нашель въ Бѣлыхъ Колодезяхъ, Кзм. у. экземпляръ съ мелкимъ вѣчикомъ, длина котораго колебалась отъ 10 до 15 мм.

S. nemorosa L., иногда нижняя часть стебля почти голая; нижние листья на длинных черешках, продолговато-эллиптические, у основания сердцевидные или слабо-сердцевидные, верхушка их тупая; средние листья на коротких черешках, тупые или заостренные, верхние—сидячие, заостренные; все — морщинистые и просто- или двояко-зубчатые съ округлыми зубчиками, иногда у верхних листьевъ зубчики островатые; цветы мутовками въ кистяхъ, по мѣрѣ расцвѣтанія удлиняющихся; прицвѣтники яйцевидные, длинно-заостренные, стеблеобъемлющіе, рѣсничатые, окрашенные, до расцвѣтанія черенчато покрываютъ одинъ другого, подъ конецъ горизонтально отклоненные; особенно ясно выступаютъ ихъ заостренные длинные кончики; вѣтчикъ крупный до 15 мм., снѣгій, снаружи опушенный и съ желтыми точечными железами.

Пока найдено только разъ, расцвѣтающимъ 26 іюня близъ д. Манькина гора, Цдл. у., на известняковомъ щебнѣ (X.); замѣчено только три особи.



Salvia silvestris.



Salvia nemorosa.

783. *S. nemorosa* L. *) Пет. Кр. II, стр. 106.—Макс., № 39.—Пал., № 63.

Salvia silvestris L. Пет., стр. 269.—Кауф. II, № 564.—Гор., № 64.—Цип., № 1117.—Кауф. I, стр. 372.—Дв., № 35.

Стебли 30—60 см., б. ч. простые, рѣже къ верхушкѣ вѣтвистые; все растение, исключая верхней поверхности листьевъ, сѣрое отъ короткихъ и мягкихъ волосковъ, то прижатыхъ, то отстоящихъ; нижние листья на длинныхъ черешкахъ, продолговато-эллиптические, у основанія слегка

*) Въ флористы, начиная съ Jacquin Fl. Astr. III, p. 7, t. 212 (1775), смѣшиваютъ виды *S. nemorosa* съ *S. silvestris*, и даже Reichenbach, въ Iconogr. Bot., t. VI, tab. 526 et 527 перемѣшавъ эти два вида. Впервые разобрался въ нихъ А. Kerner, въ Schedae ad Fl. Exs. Austr.-Hung. № 948, и только одинъ Г. Beck von Managetta приводитъ эти виды правильно, остальные же флористы новаго времени игнорируютъ разъясненіе А. Kerner. Линней въ Sp. pl. ed. II, p. 35 (1762), при описаніи *S. nemorosa* ясно указываетъ, что его видъ соответствуетъ описанному Clusius, въ Hist. plant., lib. IV, p. 31, гдѣ послѣдній отмѣчаетъ этотъ видъ, какъ „*Norminum silvestris quinti species prior*“, въ отличіе отъ другого

сердцевидные или косо-сердцевидные; средние—на коротких черешкахъ, верхніе—сидячіе, яйцевидно-продолговатые или почти ланцетные; всё—заостренные, морщинистые, по краямъ просто или doubly-зубчатые съ округлыми зубчиками; цвѣты мутовками въ кистяхъ, по мѣрѣ расцвѣтанія удлиняющихся; прицвѣтники яйцевидные, коротко-заостренные, стеблеобъемлющіе, рѣсничатые, окрашенные; вѣтчикъ сине-лиловый, лиловый, рѣдко розоватый, 8—11 мм. дл. (по Beck'у до 13 мм.), снаружи опушенный и съ желтыми точечными железками.

По известнякамъ, рѣдко. Цвѣтетъ весь іюнь до половины іюля; плоды съ конца іюня. Въ гербаріи Максимовича за № 407. — Протопопово, Кзм. у. (Г.).—Каменоломни близъ с. Зеленаго, Брн. у. (С.).

784. *S. verticillata* L. Хор. I, стр. 18.—Пет. Кр. II, стр. 107.—Бух. II, № 309.—Ф. В., № 68.—Бух., I, № 307.—Пет., стр. 268.—Кауф. II, № 565.—Мил., № 25.—Гор., № 34.—Цин., № 1119.—Руур., стр. 88.—Кауф. I, стр. 372.—Borg., p. 700.—Дв., № 36.—Макс., № 37.—Pal., № 71.

Стебель 30—80 см., простой или вѣтвистый; все растеніе шершаво-волосистое; листья на черешкахъ, треугольно-яйцевидные или у нижнихъ—еще съ ушкообразными придатками на черешкѣ, такъ что листья какъ бы лпровидные; самые верхніе—сидячіе; всё крупно и неровно зубчатые; цвѣты въ густыхъ 20—30-цвѣтковыхъ разставленныхъ мутовкахъ; верхнія мутовки сближенныя; прицвѣтники маленькіе, яйцевидные, заостренные, не длиннѣе цвѣтоножекъ, по отцвѣтаніи поникающихъ; чашечка трубчато-колокольчатая, 5—8 мм. дл., б. ч. окрашенная, верхняя губа ея о 3 зубчикахъ; 2 зубца нижней губы почти равны верхнимъ; вѣтчикъ 10—13 мм. дл., очень разнообразенъ по окраскѣ: сине-лиловый, лилово-розовый или рѣдко почти бѣлый; губы его снаружи опушены и внутри трубки съ волосистымъ кольцомъ; орѣшки эллиптическіе, бурые, 1,5—1,8 мм. дл.



Salvia verticillata.

вида „*Horminum silvestris quinta species altera*“, который Линней назвалъ *S. silvestris*. Рисунокъ, изображенный у Clusius на той же страницѣ и соответствующій второй цитатѣ свидѣтельствуетъ, что *S. silvestris* L. должна быть съ крупными цвѣтами и съ прицвѣтниками длинно-заостренными; рисунокъ настолько хорошъ, что по нему можно судить объ ошибкѣ всѣхъ флористовъ, выдававшихъ *S. nemorosa* L. за *S. silvestris* L., и обратно. Что же касается до мнѣнія, что *S. silvestris* L. есть помѣсь между *S. nemorosa* L. и *S. pratensis* L., то это еще требуетъ подтвержденія культурой. Фактъ же находки А. А. Хорошкова *S. silvestris* L. въ Подольскомъ уѣздѣ, гдѣ *S. nemorosa* L. до сихъ поръ еще не была най-

Близъ дорогъ, по пашнямъ, по открытымъ и безплоднымъ мѣстамъ, на известнякахъ и по берегамъ рѣкъ. Цвѣтетъ съ начала юня до середины августа; плоды съ середины юля. Близъ Пушкина около Прохоровской фабрики (Г.).—Двичье поле подъ Москвой (Г. С.).—Куново, между Братовицкой и Новой Деревней (Асѣ.).—Царицыно, Горенки (Гей.).—Соколышки и шоссе близъ В. Мытищъ (С.).—Косино (Сюз.).—По дорогѣ къ Верѣ (герб. Макс.).—Близъ Картина на Москвѣ р., Руз. у. (Г. О.).—Известняки по берегу р. Нахры близъ Подольска (Мил.).—Между Васильевымъ и д. Бѣлой, Бр. у. (Х.).—Невѣрово, Протопоново, Карончеево, Кзм. у.; Лужки, Срп. у. (К.).—Близъ д. Канакова, Идл. у. (В.).—Иванова гора и у д. Московки близъ Рождествена на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Сериуховъ; д. Поновка близъ Удина, Дмт. у. (Н.).

334. *Népeta* L.

Вѣнчикъ двугубый съ тонкою и длинною трубкою, вверху расширенной; верхняя губа нѣсколько вогнутая съ выемкой; нижняя—3-лопастная съ округлою, городчато-зубчатою, вогнутой лопастью; чашечка съ 15 жилками, трубчатая, о 5 почти равныхъ зубцахъ; тычинки сближены подъ верхней губой, послѣ цвѣтенія отгибаются кнаружи; гнѣзда пыльниковъ расходящиеся, сливаются верхушками и развѣваются продольною общею щелью.

785. *N. Catária* L. Пет. Кр. II, стр. 109.—Ф. Б., № 69.—Пет., стр. 228.—Кауф. II, № 570.—Цин., № 1120.—Кауф. I, стр. 376.—Lind., p. 150.—Дв., № 564.—Макс., № 538.—Gold. C., p. 20.—Gold. Sp., p. 129.—Mart., p. 99.—Pal., № 1193.

Стебель примостоящій, 40—100 см., простой или вѣтвистый, покрытъ, какъ и листья, короткими волосками, отчего бархатисто-пушистый; листья на черешкахъ, треугольно-сердцевидные, крупно и нѣсколько косо-городковые, съ нижней стороны сѣро-зеленые отъ болѣе густого опушенія; цвѣточные пучки частые, скучены въ короткую, иногда прерванную, колосовидную кисть; чашечка слегка согнутая съ косымъ зѣвомъ, верхній ея зубецъ нѣсколько длиннѣе остальныхъ и отогнутъ; вѣнчикъ 10 мм. дл., спаружи опушенный, бѣлый или розоватый, съ малиновыми крапичками на нижней губѣ; пыльники сине-пурпуровые; орѣшки эллипсоидальные, бурые, 1,5 мм. дл. Все растеніе пахучее.

Сорное; по безплоднымъ мѣстамъ и близъ жилья. Цвѣтетъ съ половины юня до половины



Nepeta Cataria.

дека, свидѣтельствуя скорѣе о томъ, что *S. silvestris* L. нужно считать самостоятельнымъ видомъ, а не помѣсью.

Жаль, что у А. П. Петуникова въ Кр. Обз. Моск. Фл., вкрадась опечатка въ выш. II, стр. 106, первая строчка снизу, гдѣ у него вмѣсто *S. silvestris* L. поставлена *S. nemorosa* L., отчего оба разсматриваемые виды какъ бы спутаны.

августа. Близъ устья Яузы и близъ Введенскихъ горъ (Мар.).—Бутырки (А.).—Между Татаровымъ и Крылатскимъ (А. Асѣъ).—Симоновъ монастырь (Гей.).—Подъ Даниловымъ монастыремъ (Куль.).—На Боровскомъ курганѣ, Бри. у. (К.).—Тишиково, Срп. у. (П.).

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. citriodora Dumoulin ex Lej. Rev. Fl. Spa (1824).

Nepeta Cataria L. citriodora Becker. Кауф. II, стр. 388.—Кауф. I, стр. 376.

Nepeta Cataria L. suaveolens Henn. Gold. Sp., p. 129.—Mart., p. 99.

Растеніе съ сильнымъ лимоннымъ запахомъ. Въ старомъ саду на Новой Басманной (К.).

β. immaculata *).

Нижняя губа безъ малиновыхъ крапинокъ. Боровскій курганъ, Бри. у. (П. и С.).—Близъ Саввы Звенигородскаго монастыря и по берегу р. Пахры близъ д. Луковня, Пдл. у. (Х.).

786. **N. nuda** L. Sch. III, № 733.—Пет. Кр. II, стр. 110.—Ф. Б., № 70.—Пет., стр. 228.—Кауф. II, № 571.—Цин., № 1122.—Рупр., стр. 86.—Кауф. I, стр. 376.—Pal., № 1196.

Nepeta ucranica L. Цин., № 1124.—Макс., № 539.

Стебель 50—100 см., б. ч. въ верхней части вѣтвистый, съ вверхъ торчащими вѣтвями, голый или почти голый, какъ и листья; послѣдніе про-



Nepeta nuda.

долговато-ланцетные, съ слегка сердцевиднымъ основаніемъ, на короткихъ черешкахъ, туповатые, верхніе—сидячіе или почти сидячіе, заостренные, всѣ—не крупно гороховые и на нижней сторонѣ съ обильными точечными железками; цвѣточные полусонтики рѣдкіе, въ длинныхъ кистяхъ, б. ч. метельчато расположенныхъ; чашечка прямая съ горизонтальнымъ зѣвомъ; зубцы ея почти равные; вѣничекъ 5—8 мм. дл., бѣлый или съ слабымъ фіолетовымъ оттѣнкомъ и съ трубкой нѣсколько выдающейся изъ чашечки; орѣшки эллипсоидальные, до 2 мм. дл., на верхушкѣ бородавчатые.

По высокимъ известняковымъ берегамъ рѣкъ, по открытымъ мѣстамъ и по опушкамъ на песчаной почвѣ. Цвѣтетъ съ середины іюня до августа. Лужки, Срп. у.; Карпачево, Бачманово, Протопоново, Кдм. у. (К.).—Клычево, Кдм. у. (С.).—Бѣлые Колодези, Кдм. у. (П.).—Бавыкино, по дорогѣ въ Баранцево, Срп. у. (П.).—Близъ с. Отрады, Срп. у. (кн. П. Д. Долгоруковъ).—Иванова гора, Хмлюво, д. Московка близъ Рождествена на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

*) *Nepeta Cataria* L. β. *immaculata*.

Labium interius maculis purpureis destitutum.

335. *Glechoma* L.

Вѣнчикъ двугубый съ тонкою и длинною трубкою,верху расширенной; верхняя губа нѣсколько волнистая съ выемкой, нижняя 3-лопастная, средняя лопасть волнистая, въ зѣвѣ бородачатая; чашечка съ 15 жилками, трубчатая, о 5 шиловидныхъ зубцахъ; тычинки такія же, какъ у *Xereta*, но гнѣзда пыльниковъ располагаются подъ тупымъ угломъ, соприкасаются у каждой пары тычиночекъ, образуя изъ гнѣздъ крестъ.

787. *G. hederacea* L. Пет. Кр. II, стр. 110.—Бух. II, № 313.—Бух. I, № 294.—Ф. О., № 7, р. 102.—Пет., стр. 196.—Кауф. II, № 572.—Цин., № 1125.—Кауф. I, стр. 377.—Ann., C. IV, № 38.—Др., № 570.—Макс., № 545.—Hoff. II., № 4319.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 101.—Hoff., № 1479.—St. II, p. 33.—St. I, № 390.—Pal., № 1216.

Glechoma hederacea L. *β. major* Gaud. Кауф. II, стр. 389.—Кауф. I, стр. 377.

Glechoma grandiflora. Mart., p. 101.

Стебель ползучій, 15—60 см., укореняющійся; цвѣтоносныя вѣтви приподнимающіяся или прямостоящія, 10—35 см.; все растеніе сильно пахучее, б. или м. волосистое; листья на длинныхъ черешкахъ, нижніе—кругло-почковидные, верхніе—сердцевидные, всѣ по краямъ крупно и округло-городковые; цвѣты въ пазухахъ листьевъ, пучками по 3—6, такъ что вся мутовка 6—12-цвѣтковая; чашечка съ косымъ зѣвомъ, на короткой цвѣтоножкѣ, потомъ поникающей; вѣнчикъ 10—15 мм. дл., снаружн опушенный, лиловый или розовато-лиловый; нижняя губа съ темными пятнышками; орѣшки эллипсоидальныя, 0,8 мм. дл., у основанія съ 2 маленькими ямочками. Форма, выросшая на жирной почвѣ, во всѣхъ частяхъ болѣе крупная, съ вѣнчикомъ до 22 мм. дл., есть *β. major* Gaud.



Glechoma hederacea.

Внизъ жилия, по садамъ, паровымъ полямъ, оврагамъ и кустарникамъ, часто. Цвѣтетъ съ начала мая до конца іюня, иногда во второй разъ въ августѣ.

α. glabriuscula Neilr.

Во всѣхъ частяхъ голое или почти голое.

336. *Dracocéphalum* L.

Вѣнчикъ двугубый съ длинною трубкою, у зѣва расширенной; верхняя губа вѣнчика волнистая, выемчатая, съ отогнутыми кончиками, нижняя—3-лопастная съ болѣе крупною обратно-сердцевидною срединною лопастью; чашечка трубчатая, съ 15 жилками, 5-зубчатая, съ верхнимъ

зубцомъ болѣе широкимъ, или чашечка двугубая; 4 тычинки сходятся подъ верхней губой, верхній длиннѣе нижнихъ; гнѣзда пыльниковъ расходящіяся, вскрываются общей щелью; орѣшки 3-гранные.

788. *D. thymiflorum* L. Пет. Кр. II, стр. 111.—Мос., № 26.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 180.—Кауф. II, № 573.—Цин., № 1126.—Pinz., p. 17.—Кауф. I, стр. 377.—Ann., C. I, № 41.—Borg., p. 700.—Дв., № 594.—Макс., № 568.—Hoff. II., № 4462.—Gold. C., p. 21.—Gold. Sp., p. 130.—Mart., p. 105.—Hoff., № 1240.—St. II, p. 34.—St. I, № 410.—Pal., № 1260.

Dracocephalum nutans L. Дв., № 593.—Макс., № 569.—Gold. Sp., p. 130.—Mart., p. 105.—Hoff., № 1235.—St. II, p. 34.—St. I, № 411.

Стебель 15—75 см., прямостоящій, простой или вѣтвистый, коротко опушенный, какъ и все растеніе; корневыя листья на длинныхъ черешкахъ,



Dracocephalum thymiflorum.

продолговато-яйцевидные съ сердцевиднымъ основаніемъ, крупно-зубчатые; средніе — продолговато-ланцетные, городчато-пильчатые на короткихъ черешкахъ; верхніе—почти ланцетные, сидячіе, часто цѣльнокрайніе; соцветіе очень длинное изъ многоцвѣтковыхъ мутовокъ, нижнихъ—разставленныхъ, верхнихъ—сближенныхъ; прицвѣтники обратно яйцевидные, рѣсничатые; чашечка по жилкамъ съ жесткими щетинистыми волосками, выше середины суженная и нѣсколько согнутая; верхній ее зубецъ широкій, округлый, остальные ланцетные, всѣ съ остріями; вѣничикъ снаружи опушенный, маленькій, до 8 мм. дл., мало выдается изъ чашечки, лиловый

или голубовато-лиловый; нижняя губа у основанія бѣловатая съ темными пятнами; пыльники голые.

По холмамъ, безплоднымъ мѣстамъ и паровымъ полямъ, очень часто. Цвѣтетъ иногда съ начала мая до середины іюля.

789. *D. Ruyschiána* L. Пет. Кр. II, стр. 111.—Ф. Б., № 66.—Пет., стр. 180.—Кауф., II, № 574.—Цин., № 1127.—Pinz., p. 17.—Кауф. I, стр. 378.—Lind., p. 150.—Borg., p. 700.—Дв., № 592.—Макс., № 567.—Hoff. II., № 4460.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 105.—Hoff., № 1238.—St. II, p. 34.—St. I, № 409.—Pal., № 1253.

Dracocephalum hyssopifolium Mart. p. 105.

Корневище вѣтвистое, почти деревянистое; стебли 30—70 см., прямостоящіе, голые и только близъ верхушки коротко опушенные, въ листовыхъ пазухахъ съ короткими вѣточками; листья ланцетные или линейно-ланцетные, туповатые съ цѣльными завернутыми краями, голые, жесткіе, лоснящіеся; цвѣточныя мутовки наверху стебля въ головчатомъ частомъ колосѣ, иногда у основанія прерванномъ однимъ междо-

узкими; прицветники яйцевидно-ланцетные, ресничатые; чашечка коротко опушенная; вѣничек до 25 мм. дл., яркий, снаружи опушенный, въ 2—3 раза длиннѣе чашечки; пыльники мохнатые.

По опушкамъ, лѣснымъ полянамъ и кустарникамъ. Цвѣтеть съ половины іюня до половины іюля. Зыково, Воеводское, Иваньково (К.).—Серебряный боръ близъ Хорошева (А.).—Ростокино (Ф.).—Троицкое-Лыково (Гей.).—Мытищи; между Борисовыми и Лужками, Срп. у. (С.).—Ходынка—береговой обрывъ Москвы р.; близъ Краснаго Стана, Руз. у.; Денисьево, Зви. у. (П.).—Введенское близъ Звенигорода (П. и С.).—Архангельское, Зви. у. (Ш.).—Серпуховъ (Макс.).—Рождествено на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).



Dracocephalum Ruyschiana.

337. *Lámium* L.

Вѣничек двугубый; трубка б. ч. превышаетъ чашечку и обыкновенно внутри близъ основанія съ волосистымъ кольцомъ; верхняя губа шлемовидная, волнистая, нижняя—3-лопастная съ болѣе крупной срединной лопастью, выемчатою и у основанія суженною; боковыя лопасти чаще въ видѣ острыхъ зубцовъ; чашечка съ 5—10 жилками, трубчато-колокольчатая съ 5 шпильковидными зубцами; 4 тычинки параллельныя, прижаты къ верхней губѣ; глѣзда пыльниковъ расходящіяся, вскрываются общемою щелью; орѣшки 3-гранные, сверху тупые.

1. Цвѣты желтые. *L. Galeobdolon (L.) Crantz.*

Цвѣты пурпуровые, розовые или бѣлые. 2.

2. Цвѣты бѣлые. *L. album* L.

Цвѣты пурпуровые или розовые. 3.

3. Верхніе листья сидячіе, стеблеобъемлющіе.

L. amplexicaule L.

Все листья на б. или м. длинныхъ черешкахъ. 4.

4. Листья глубоко и неровно надрѣзочно-зубчатые.

L. hybridum Vill.

Листья зубчатые или неравно-зубчатые, но не надрѣзанные. 5.

5. Цвѣты не крупныя, 10—15 мм. дл.; цвѣточныя мутовки во время цвѣтенія скучены на верхушкѣ стебля. *L. purpureum* L.

Цвѣты крупныя 20—30 мм. дл.; цвѣточныя мутовки во время цвѣтенія разбѣшены междоузліями. *L. maculatum* L.

790. *L. amplexicaule* L. F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 208. — Кауф. II, № 575. — Цин., № 1147. — Кауф. I, стр. 379. — Lind., p. 152. — Дв., № 574. — Макс., № 549. — Gold. C., p. 20. — Mart., p. 101. — Hoff., № 1820. — St. II, p. 33. — St. I, № 394.

Стебли 10—40 см., б. ч. разветвленные, опушенные, как и листья, прямостоящие или приподнимающиеся; листья почковидные, надрезанно-городковые, верхние под цветочными мутовками сидячие, стеблеобъемлющие, нижние без цветочных мутовок—на черешках; цветы по 6—10 в пазушных мутовках, разставленных, близ верхушки сближенных; чашечка пушистая, зубцы короче ее трубки, по отцветании прямые или сходящиеся; вичник 10—20 мм. дл., снаружи густо опушенный, темно-малиновый; боковые лопасти нижней губы с одним тупым зубцом; вся губа с пятнышками; трубка вичника внутри без волосистого кольца, почти в 3 раза длиннее чашечки; тычиночные нити голые; пыльники рбеничатые; орешки 2,5—3 мм. дл., бурые, часто с светлыми бородавочками. Не редко с вичником, не вполне развитым, равным чашечкѣ=L. amplexicaule L. clandestinum Rehb.

Сорное, по огородам, садам и на известняках, не часто. Цвѣтеть с начала мая до поздней осени. Воробьевы горы (А.).—Кусково (герб. Борхм.).—Симоновъ монастырь; Карачеево, Кал. у. (П.).—Близ Подольска (К.). Рождествено на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).



Lamium amplexicaule.



Lamium purpureum.

791. *L. purpureum* L. Бух. II, № 314.—Бух. I, № 295. — F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 208.—Кауф. II, № 576.—Цин., № 1148.—Кауф. I, стр. 380. — Lind., p. 152. — Ann., C. IV, № 41. — Др., № 573. — Макс., № 548.—Hoff. H., № 4327. — Gold. C., p. 20.—Mart., p. 101.—Hoff., № 1823.—St. II, p. 33. — St. I, № 393.—Pal., № 1220.

Стебель 10—40 см., б. ч. приподнимающийся, разветвленный, голый или по углам опушенный; листья яйцевидно-сердцевидные, с неровными косыми, тупыми городками; нижние — туповатые, на длинных черешках, верхние—заостренные, на коротких черешках, всё коротко и прижато-опушенные; цветы в мутовках по 6—10 в пазухах листьев, верхушечная мутовка сближена; зубцы чашечки несколько

длиниѣ ея трубки, по отцвѣтаѣи растопыренныя; вѣничикъ 10—15 мм. дл., снаружки опушенный, пурпуровый, рѣдко розовый; боковыя лопасти нижней губы съ 2 зубцами, средняя — крапчатая; трубка вѣничика нѣсколько длиннѣе чашечки, внутри съ волосистымъ кольцомъ; тычиночныя нити голыя; пыльники длинно-рѣсничатые; орѣшки 2—2.5 мм. дл., сѣрые.

Сорное, по огородамъ, садамъ и близъ жилья, часто. Цвѣтеть съ начала мая до поздней осени.

× *L. hybridum* Vill. = *L. amplexicaule* × < *purpureum*. Пет. Кр. II, стр. 112.

Lamium purpureum L. β. *subincisum* Kauffm. Кауф. II, стр. 391. — Кауф. I, стр. 380.

Стебель 10—40 см., развѣтвленный, приподнимающійся, б. ч. опушенный, какъ и листья; всѣ листья б. или м. глубоко и неровно надрѣзано-зубчатые; нижнѣе — сердцевидно-яйцевидныя или округло-сердцевидныя, на черешкахъ; верхнѣе — яйцевидно-ромбическія, быстро переходя въ короткій черешокъ; цвѣты въ мутовкахъ по 6—10 въ пазухахъ листьевъ; верхушечныя мутовки сближенныя; зубцы чашечки по отцвѣтаѣи растопыренныя; вѣничикъ 10—15 мм. дл., пурпуровый; трубка вѣничика съ кольцомъ, но безъ волосковъ, очень рѣдко слабо опушена.

Сорное, по огородамъ и садамъ, рѣдко. Цвѣтеть съ начала мая до осени. Въ огородѣ близъ Данилова кладбища (К.). — Михайловское, на грядахъ, Пдл. у. (Мос.).



Lamium hybridum.



Lamium maculatum.



Lamium maculatum β. *truncatum*.

792. *L. maculatum* L. Бух. II, № 315. — Бух. I, № 296. — F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 208. — Кауф. II, № 577. — Цип., № 1151. — Рупр., стр. 87. — Кауф. I, стр. 380. — Lind., p. 152. — Ann., C. IV, № 42. — Дв., № 571. — Макс., № 546. — Hoff. II, № 4326. — Gold. C., p. 20. — Mart., p. 101. — Hoff., № 1822. — St. II, p. 33. — St. I, № 391. — Pal., № 1218.

Стебель ползучій съ побѣгами; все растеніе покрыто короткими волосками, по стеблю нѣсколько отстоящими, на листьяхъ — прижатыми; цвѣтущіе стебли 15—60 см., прямостоящіе или приподнимающіеся, б. ч. простые;

листья на б. или м. длинных черешкахъ, сердцевидно-яйцевидные или яйцевидные, б. ч. doubly-зубчатые, заостренные, иногда съ бѣлыми пятнами ¹⁾; цвѣты въ пазухахъ по 6—12 въ мутовкѣ; чашечка съ длинными ланцетными зубцами, б. ч. длиннѣе ея трубки; вѣнчикъ 20—30 мм. дл., ²⁾ пурпуровый или розовый, снаружи коротко-опушенный; верхняя губа съ короткими рѣсничками по краю; боковыя лопасти нижней губы съ 1 шпоровиднымъ зубцомъ; средняя лопасть съ темными крапинками; трубка внутри съ поперечнымъ волосистымъ кольцомъ, выступаетъ изъ чашечки.

По сырымъ мѣстамъ, кустарникамъ, близъ рѣкъ и ручьевъ и по лѣсамъ. Цвѣтетъ съ середины мая до осени.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. crenátum Peterm.

Верхніе листья съ сердцевиднымъ основаніемъ, яйцевидно-треугольные, тупо- и просто- или почти просто-зубчатые. Берегъ Клязьмы близъ Черкизова (С.).—Воробьевы горы (П.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.).

β. truncátum GB.

Основаніе верхнихъ листьевъ какъ бы ссѣзано или быстро сужено въ черешокъ, длина ихъ почти равна ширинѣ и по краямъ doubly-городковые. Серебряный боръ близъ Хорошова (П. и С.).—Воробьевы горы, Татарово (П.).

γ. fl. roseo.

Вѣнчикъ блѣдно-розовый при сушкѣ темнѣетъ. По берегу р. Сѣтуни, между 17-й верстой Брянск. ж. д. и Суквымъ (С.).

δ. immaculátum ³⁾. Сыр. Отч. II, стр. 18.

Вѣнчикъ темно-малиновый съ нижней губой, болѣе темной и совершенно безъ росниси. Берегъ р. Сѣтуни, между 17-й верстой Брянск. ж. д. и Пѣмчиновымъ (С.).

793. **L. álbum** L. Бух. II, № 316. — Бух. I, № 297. — Пет., стр. 208. — Кауф. II, № 578. — Цил., № 1150. — Кауф. I, стр. 381. — Lind., p. 152. — Ann., С. II, № 148. — Дв., № 572. — Макс., № 547. — Hoff. II, № 4321. — Gold. С., p. 20. — Mart., p. 101. — Hoff., № 1819. — St. II, p. 33. — St. I, № 392. — Pal., № 1219.

Съ длинными подземными побѣгами; все растеніе покрыто короткими прижатыми волосками; стебель 15—60 см., простой, прямостоящій;

¹⁾ Тихичное *L. maculatum* L. съ широкой бѣловатой продольной полосой на листьяхъ, по свидѣтельству П. Кауфмана, у насъ не встрѣчается; но Röhling, въ Deutschlands Flora B. IV, p. 264, не придаетъ значенія пятнистости листьевъ, говоря, что пересаженное имъ *L. maculatum* L. съ пятнистыми листьями на слѣдующій годъ дало листья безъ пятенъ.

²⁾ А. А. Хоротковъ нашелъ близъ платформы 17-я верста Брянск. ж. д. экземпляры съ мелкими цвѣтами, длина у которыхъ колебалась отъ 15 до 20 мм.

³⁾ *Lamium maculatum* L. **δ. immaculatum.**

Corolla obscure purpurea, labio inferiore obscuriore, non sculpto.

листья на б. или м. длинных черешкахъ, сердцевидно-яйцевидные, заостренные, крупно- и иногда doubly-городковые, къ верхушкѣ стебля листья становятся уже и болѣе заостренными; цвѣты въ мутовкахъ по 6—12; зубцы чашечки узкіе, линейные, б. ч. длиннѣе ея трубки; вѣнчикъ 20—25 мм. дл., бѣлый или изжелта-бѣлый, снаружи мохнатый; верхняя губа по краю длинно-рѣсничатая; боковыя лопасти нижней губы съ однимъ шпоровиднымъ зубцомъ и 2—3 болѣе короткими; средняя лопасть у основанія съ свѣтло-зелеными крапинками; трубка внутри съ косымъ волосистымъ кольцомъ; тычиночныя нити опушенныя; пыльники длинно-рѣсничатые. *)

Какъ сорное, близъ жилья, у заборовъ и въ садахъ, рѣже по хвойнымъ лѣсамъ, часто. Цвѣтетъ съ начала мая до поздней осени.



Lamium album.



Lamium Galeobdolon.

794. *L. Galeobdolon* (L.) Crantz. Lind. p. 125.

Galeobdolon luteum Huds. Her. Kr. II, стр. 112.—Бух. II, № 317.—Бух. I, № 298.—
F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 191.—Кауф. II, № 579.—
Цин., № 1152.—Кауф., стр. 381.—Ann., C. II, № 149.—
Дв., № 579. — Макс., № 553.—Gold. C., p. 20. — Mart.,
p. 102,

Galeobdolon luteum Smith. Hoff. II, № 4334.

Galeobdolon vulgaris Pers. Hoff., № 1880.

Galeopsis Galeobdolon L. Макс., № 553.—St. I, № 398.—Pal., № 1222.

Leonurus Galeobdolon Scop. Hoff., № 1880.—St. II, p. 34.

Цвѣтущіе стебли простые, прямостоящіе, 15—60 см., не цвѣтущіе—длинные, стелющіеся, до 1 м. дл. въ узлахъ укореняющіеся; все растение коротко- и рѣдко-опушенное; листья на черешкахъ, округло-яйцевидные съ сердцевиднымъ основаніемъ, часто съ бѣловатыми пят-

*) Стефанъ и Марциусъ приводятъ разновидность съ малиновыми цвѣтами, позднѣе нѣкъмъ не упоминаемую; не было ли это *L. maculatum* L. безъ росписи. На западѣ впервые объ *L. album* L. var. *roseum* Dumort. упоминается въ Fl. Belg. (1827) p. 45.

нами; верхніе яйцевидные, заостренныя, всѣ—косо- и неравно-зубчатые; цвѣты въ пазухахъ по 3—6; прицвѣтники узкіе, линейно-ланцетные, отогнутые; чашечка б. или м. густо покрыта щетинистыми волосками; вѣничекъ желтый, до 25 мм. дл., снаружи опушенный; трубка его не выдается изъ чашечки; губа съ 3 почти равными заостренными лопастями, средняя лопасть и основаніе боковыхъ съ оранжевой росписью; тычиночныя нити опушенныя; пыльники голые; орѣшки 3—3,5 мм. дл., черные.

По лѣсамъ, часто. Цвѣтеть съ половины мая до конца іюня, иногда во второй разъ въ концѣ августа; плоды съ середины іюня.

338. *Galeopsis* L.

Вѣничекъ двугубый съ длинной трубкой, близъ зѣва расширенной и внутри безъ волосистаго кольца; верхняя губа шлемовидная съ 2 зубчиками на верхушкѣ, нижняя—3-лопастная съ крупною срединною лопастью, у основанія которой съ каждой стороны по полному рожку; чашечка трубчато-колокольчатая съ 10 жилками и 5 шлемовидно-колючими зубцами; 4 параллельныхъ тычинки прижаты къ верхней губѣ; гнѣзда пыльниковъ расходящіеся, вскрываются поперекъ 2 створками, изъ которыхъ меньшая рѣсничатая; орѣшки обратно-яйцевидные, сжатые съ боковъ и сверху округлые.

1. Стебель по узламъ съ мягкими волосками, по междоузліямъ съ короткими прижатыми волосками; зубцы чашечки вдвое короче ея трубки. *G. Ladanum* L.

Стебель по узламъ и междоузліямъ покрытъ отстоящими щетинистыми волосками, рѣже голый; зубцы чашечки не короче ея трубки. 2.

2. Вѣничекъ крупный, 20—40 мм. дл., желтый, съ лиловой губой; трубка его въ 3—4 раза длиннѣе чашечки.

G. speciosa Mill.

Вѣничекъ пурпуровый, лиловый, бѣлый, рѣдко желтый, но всегда мелкій, 9—16 мм. дл., и трубка его б. ч. равна чашечкѣ или нѣсколько длиннѣе ея. 3.

3. Средняя доля у нижней губы по отцвѣтаніи съ сильно завернутыми краями; у насъ пока только съ желтыми цвѣтами и фіолетовой средней долей нижней губы.

G. bifida Boenn.

Средняя доля нижней губы по отцвѣтаніи съ плоскими, не завернутыми краями; вѣничекъ пурпуровый, лиловый, рѣдко бѣлый, но никогда не желтый.

G. Tetrahit L.

795. *G. Ladanum* L. Пет. Кр. II, стр. 112. — Ф. О., № 7, p. 102. — Пет., стр. 191. — Кауф. II, № 580. — Цин., № 1140. — Кауф. I, стр. 382. — Lind., p. 152. — Дв., № 575. — Макс., № 550. — Hoff. H., № 4332. — Gold. C., p. 20. — Mart., p. 102. — Hoff., № 1409. — St. II, p. 34. — St. I, № 395.

Стебель 15—35 см., красноватый, б. ч. сильно вѣтвистый, покрытъ короткими прижатыми волосками, между которыми попадаются железистые; листья коротко-черешковые, яйцевидно-ланцетные или даже линейно-ланцетные, острые или заостренные, по краямъ зубчатые, короткоопушенные; цвѣты въ мутовкахъ, б. или м. разставленныхъ; чашечка опушенная, часто железистая; зубцы ея ланцетовидные, колючие, вдвое короче трубки; вѣничикъ 15—25 мм. дл., почти въ 3 раза длиннѣе чашечки, грязно-малиновый, снаружи прижато волосистый; нижняя губа съ темной росинкою и у основанія съ 2 бѣлыми или желтыми пятнами.

У насъ пока только:



Galeopsis Ladanum.



Galeopsis Tetrabit α. arvensis.

α. intermédia (Vill.) Briq. Пет. Кр. II, стр. 113.

Galeopsis Ladanum L. γ. *canescens* Koch. Кауф. II, стр. 394. — Кауф. I, стр. 382.
Galeopsis latifolia Hoffm. Mart., p. 102.

Листья яйцевидные, яйцевидно-ланцетные или продолговато-ланцетные съ частыми крупными зубцами, съ каждой стороны по 4—8; чашечка съ оттопыренными волосками, зеленоватая, б. ч. железистая. По паровымъ полямъ, межамъ и по посѣвамъ, часто. Цвѣтетъ съ начала юля до поздней осени; плоды съ конца юля.

796. G. Tétrahit L. Бух. II, № 318. — Бух. I, № 299. — F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 191. — Кауф. II, № 581. — Цип., № 1141. — Кауф. I, стр. 382. — Lind., p. 152. — Анн., C. IV, № 40. — Дв., № 577. — Макс., № 552. — Hoff. H., № 4333. — Gold. C, p. 20. — Mart., p. 102. — St. II, p. 34. — St. I, № 396. — Pal., № 1221.

Стебель 30 — 80 см., прямостоящій, б. ч. вѣтвистый; узлы почти всегда покрыты густыми отстоящими щетинистыми волосками, вперемѣшку съ железистыми, рѣдко безъ нихъ; междоузлья тоже съ отстоящими щетинистыми волосками, рѣже голыя; листья ланцетные, яйцевидно-ланцетные или яйцевидные, заостренные, по краямъ зубчатые;

опушение очень разнообразное; цветы въ пазухахъ листьевъ мутовками чашечка б. или м. густо покрыта щетинистыми волосками, зубцы ея жесткіе, шиловидные; вѣничекъ не крупный, 9—16 мм. дл., трубка его обыкновенно нѣсколько длиннѣе чашечки; основной цвѣтъ вѣничка пурпуровый, грязно-малиновый, лиловый или бѣлый; средняя лопастъ нижней губы къ верхушкѣ ясно расширена, съ выемкой, рѣдко слабо расширена, у основанія близъ зѣва съ яркимъ желтымъ или золотистымъ пятномъ и отъ пятна до верхушки съ темной или лиловой росинкою и съ широкой свѣтлой каймой; очень рѣдко вся нижняя губа съ боковыми лопастями одного цвѣта.

Цвѣтетъ съ половины іюня до поздней осени. Распадается на слѣдующія формы:



Galeopsis Tetrahit β. *silvestris*.



Galeopsis Tetrahit γ. *Reichenbachii*.

α. *arvensis* Schlecht.

Узлы густо покрыты отстоящими щетинистыми волосками вмѣстѣ съ железистыми; междоузлія б. или м. густо щетинисто-волосистыя; листья свѣтло-зеленые, яйцевидно-ланцетные, съ основаніемъ быстро суженнымъ или почти округлымъ; зубцовъ съ каждой стороны по 6—15, б. ч. 10, наружная сторона зубцовъ слабо выпуклая, верхушка заостренная; верхняя сторона листьевъ б. или м. густо покрыта прижатыми щетинистыми волосками, нижняя — частыми простыми волосками и безцвѣтными или желтоватыми железками. По открытымъ мѣстамъ и паровымъ полямъ, какъ сорное, очень часто.

β. *silvestris* Schlecht.

Междоузлія покрыты разбѣнными щетинистыми волосками или голыя; листья тонкіе, темно-зеленые, съ основаніемъ клиновидно-суженнымъ и съ зубцами туповатыми, съ наружной стороны сильно выпуклыми, въ числѣ 8—10; верхняя сторона листьевъ разбѣнно-прижато-волосистая, нижняя — съ очень короткими пѣж-

ными и рѣдкими волосками, б. ч. безъ железокъ. По лѣсамъ, въ тѣни. Пушкино, лѣсъ близъ Братовицны, Дтр. у.; Раменское, Брян. у. (С.).

γ. *Reichenbáchii* Rapin. Хор. II, стр. 16.—Сыр. Отч. II, стр. 19.

Очень высокое и б. ч. вѣтвистое растеніе; не рѣдко верхушки нижнихъ вѣтвей достигаютъ верхушки стебля; узлы послѣдняго густо щетинисто-волосистые вперемѣнку съ железистыми волосками; междоузлія покрыты б. или м. густо жесткими отогнутыми щетинками и иногда еще мягкими прижатыми волосками; листья темно-зеленые, съ быстро суженымъ или округлымъ основаниемъ и 5—12 зубцами съ каждой стороны; послѣдніе крупные, туповатые съ выпуклымъ наружнымъ краемъ; мутовки многоцвѣтковые, густые, почти шаровидныя, верхнія — сближенныя; чашечка съ очень длинными, жесткими, колючими зубцами, длиннѣе ея трубки. Растеніе часто достигаетъ 1,7 м. *)

По порубкамъ и по опушкамъ. Пинцры, Пдл. у., по склону оврага на порубѣ (X.). — По вырубѣ близъ опушки лѣса, между 17-й верстой Брянск. ж. д. и Пѣмчиновымъ (С.).

797. *G. speciosa* Mill. Пет. Кр. II, стр. 114.

Galeopsis versicolor Curt. Бух. II, № 319.—Бух. I, № 300.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 191.—Кауф. II, № 582.—Цин., № 1143.—Pinz., p. 17.—Кауф. I, стр. 383.—Lind., p. 152.—Дв., № 578.—Макс., № 551.—Hoff. II, № 4329.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 102.—Hoff., № 1411.

Galeopsis cannabina Roth. Макс., № 551.—Hoff. II, № 4329.—Mart., p. 102.—St. II, p. 34.—St. I, № 397.

Стебель 30—100 см., б. ч. вѣтвистый, на узлахъ съ грубыми отстоящими щетинками безъ железистыхъ волосковъ; междоузлія съ отстоящими щетинистыми волосками, рѣже почти голыя и съ слабымъ сизоватымъ налетомъ; листья ланцетные, яйцевидно-ланцетные или даже ромбоидальныя, съ суженымъ, округлымъ или слегка сердцевиднымъ основаниемъ, заостренныя, по краямъ съ 5—17 зубцами съ каждой стороны; опушеніе очень разнообразно; цвѣточныя мутовки густыя на верхушкѣ стебля и вѣтвей нѣсколько сближенныя; чашечка б. или м. опушенная, у зѣва щетинисто-волосистая; вѣничикъ крупный, 20—40 мм. дл., съ трубкой въ 3—4 раза длиннѣе чашечки, желтый или свѣтло-желтый; верхняя губа сильно вогнутая, снаружы съ отстоящими волосками; нижняя губа у зѣва съ ярко-желтымъ пятномъ и б. ч. съ 3 пурпуровыми или фіолетовыми линиями, изъ коихъ 2 по краямъ пятна и одна посрединѣ; средняя лопасть нижней губы обратно-сердцевидная, рѣже съ почти параллельными краями, фіолетовая, б. ч. безъ росписи, рѣже съ неясной росписью и съ узкой бѣловатой каймой; боковыя лопасти бѣлыя, рѣже свѣтло-фіолетовыя, но много свѣтлѣе средней.

Цвѣтетъ съ половины іюня до поздней осени. Распадается на слѣдующія формы:

*) Между всѣми тремя формами можно наблюдать переходы, но все же крайнія очень характерны.

α. laeta Porsch.

Междоузлія съ б. или м. густыми щетинистыми волосками, по угламъ часто буроватыя; листья свѣтло-зеленые, ланцетные или яйцевидно-ланцетные, клиновидно-суженные въ черешокъ, рѣже съ округлымъ основаніемъ; зубцовъ съ каждой стороны 10—17, б. ч. острыхъ, съ почти прямой или слабо выпуклой наружной стороной; верхняя сторона листьевъ б. или м. густо покрыта щетинистыми прижатыми волосками, нижняя сторона съ волосками болѣе короткими, нѣжными и съ точечными железками или безъ нихъ; жилки на чашечкѣ не сильно выдаются, зубцы ея сильно расширены къ основанію, железисто-волосистые, б. ч. равны трубкѣ. Сорное, по полямъ, огородамъ и открытымъ мѣстамъ, часто.



Galeopsis speciosa α. laeta.



Galeopsis speciosa β. obscura.

β. obscura Porsch.

Междоузлія съ тонкими щетинистыми волосками или голая; листья темно-зеленые, тонкіе, б. ч. широко-яйцевидные, съ основаніемъ б. ч. округлымъ, иногда даже сердцевиднымъ, съ 9—17 зубцами съ каждой стороны, б. ч. туповатыми, съ почти прямой или выпуклой наружной стороной; верхняя сторона листьевъ съ разбѣшными прижатыми щетинистыми волосками, нижняя — съ очень нѣжными тонкими разбѣшными простыми волосками или почти голая, б. ч. безъ железокъ; чашечка слабо волосистая или почти голая съ выдающимися жилками. По тѣнистымъ мѣстамъ, опушкамъ и полянамъ. Воробьевы горы (П.).

798. G. bifida Boenn.

G. Pernhofferi Wettst.

Стебель 15—60 см., б. ч. вѣтвистый, на узлахъ съ густыми отстоящими щетинистыми волосками безъ железистыхъ, рѣже съ желези-

стями, на междоузлияхъ съ болѣе рѣдкими, отстоящими или отогнутыми щетинистыми волосками, и иногда еще коротко опушены; листья на черешкахъ, ланцетные или яйцевидно-ланцетные, острые или заостренные, почти всегда съ основаніемъ постепенно суженымъ, по краямъ туповато-зубчатые, съ каждого края не болѣе какъ по 12 зубцовъ, съ обѣихъ сторонъ б. или м. густо опушены прижатыми бѣлыми волосками, съ нижней—на молодыхъ листьяхъ иногда попадаются железистые волоски; цвѣточные мутовки не густыя; чашечка покрыта щетинистыми волосками, рѣже короткимъ пушкомъ или голая; вѣничекъ маленький, трубка его мало превышаетъ чашечку, иногда даже короче ея; основная краска вѣничка пурпуровая, свѣтло-лиловая, (у насъ пока только) сѣрно-желтая, рѣже бѣлая *); средняя доля нижней губы къ верхушкѣ расширена, слегка сердцевидная или продолговато-язычковидная съ почти параллельными краями, во всѣхъ случаяхъ у основанія суженная, по отцвѣтаніи съ сильно завернутыми краями; зѣвъ губы золотисто-желтый и б. ч. съ 3 параллельными темными пурпуровыми линиями, остальная часть губы темно-пурпуровая, пурпурово-фіолетовая или (у насъ) фіолетовая, безъ росписи или съ слабо замѣтной росписью и съ очень узкой свѣтлой каймой.



Galeopsis bifida.

Найдено только разъ А. А. Хорошковымъ близъ Успенскаго, Зви. у.

339. *Stachys* L.

Вѣничекъ двугубый; трубка его внутри близъ основанія съ волосистымъ кольцомъ и кверху б. ч. нѣсколько ушнрена, рѣже волоси-

*) У насъ пока найдено съ цвѣтами сѣрно-желтыми и съ фіолетовой нижней губой. Экземпляръ, найденный А. А. Хорошковымъ, былъ посланъ для опредѣленія проф. Wettstein и былъ имъ опредѣленъ какъ *G. Pernhofferi*. При обработкѣ московскихъ *Galeopsis* я руководствовался монографіей Otto Porsch, Die Oesterreichischen *Galeopsis*arten der Untergattung *Tetrahit* Reichb. Этотъ авторъ въ своей монографіи, равно какъ *G. Beck*, въ *Fl. von Nieder-Oesterreich*, и Ascherson не различаютъ *G. bifida* отъ *Pernhofferi*; послѣдніе же два автора даже приводятъ *G. bifida* на разновидность *G. Tetrahit*. Wettstein, въ *Schedae ad. Fl. exsicc. Austro-Hungaricam*, № 2138, гдѣ онъ впервые описываетъ *G. Pernhofferi*, говоритъ, что этотъ видъ отличается отъ *G. bifida* главнымъ образомъ окраской цвѣтка и присутствіемъ железистыхъ волосковъ; оба эти признака, по свидѣтельству Porsch, очень измѣнчивы, и у *G. bifida* встрѣчаются железистые волоски, а что касается окраски, то къ монографіи приложена таблица съ изображеніемъ цѣлой серіи вѣничковъ этого вида со всевозможными окрасками: пурпуровой, розовой, желтой и бѣлой. Если откинуть эти два непостоянныхъ признака, то различіе между *G. bifida* и *G. Pernhofferi* почти неувидимо, и я, слѣдуя монографіи Otto Porsch, не различаю эти два вида и помѣщаю найденный видъ подъ болѣе старымъ именемъ.

стаго кольца нѣтъ; верхняя губа вогнутая, прямостоящая или нѣсколько отклонена назадъ; нижняя — 3-лопастная, съ среднею долею обратно-сердцевидной или овальной; чашечка трубчато-колокольчатая съ 5 — 10 жилками и 5 колючими зубцами; тычинки параллельныя или обѣ длинныя тычинки по опыленіи скручиваются и отгибаются наружу; гнѣзда пыльниковъ расходятся прямолинейно, рѣже почти параллельныя, вскрываются продольной трещиною; орѣшки нѣсколько сжатые, почти 3-гранные.

1. Цвѣты пурпуровые или грязно-малиновые. 2.

Цвѣты свѣтло-желтые. 4.

2. Трубка вѣничка внутри безъ волосистаго кольца; цвѣточныя мутовки въ плотномъ верхушечномъ колосѣ. *S. Betonica Benth.*

Трубка вѣничка внутри съ волосистымъ кольцомъ; цвѣточныя мутовки б. или м. разставленныя, особенно нижнія. 3.

3. Нижніе листья длинно-черешковые, сердцевидные или сердцевидно-овальные. *S. silvatica L.*

Нижніе листья на очень короткихъ черешкахъ, продолговато-ланцетные или продолговато-линейные. *S. palustris L.*

4. Нижніе листья продолговато-ланцетные; зубцы чашечки треугольные, опушенные, съ голой колючкой. *S. recta L.*

Нижніе листья яйцевидно-продолговатые; зубцы чашечки ланцетные, съ колючимъ остриемъ, сплошь опушенные.

S. annua L.

799. *S. silvatica L.* Пет. Кр. II, стр. 114.—Бух. II, № 320.—Бух. I, № 301.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 285.—Кауф. II, № 583.—Цин., № 1136.—Кауф. I, стр. 384.—Lind., p. 152.—Апп., С. III, № 245.—Дв., № 581.—Макс., № 555.—Hoff. H., № 4363.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 103.—St. II, p. 34.—St. I, № 400.—Pal., № 1224.



Stachys silvatica.

Корневище ползучее съ длинными побѣгами; все растеніе съ тяжелымъ запахомъ; стебель 40—100 см., прямо-стоящій, сверху часто вѣтвистый, б. или м. густо покрытъ отстоящими волосками, сверху железистыми, отчего клейкій; листья на черешкахъ, верхніе — продолговато-сердцевидные, нижніе — сердцевидные, по краямъ крупно и иногда неровно-городковые, б. или м. опушенные; цвѣточныя мутовки образуютъ б. ч. прерваные длинные колосы на концѣ стебля и вѣтвей; при мутовкахъ маленькіе линейные или линейно-ланцетные прицвѣтные листья; чашечка 5—9 мм. дл., съ треугольно-ланцетными колючими зубцами; вѣничкъ 14—18 мм. дл., темно-малиновый, снаружи железисто-пушистый; нижняя губа съ бѣловатой росписью; трубка не расширена къ верхушкѣ; орѣшки нѣсколько шероховатые, 2 мм. дл.

По сырмъ тѣнистымъ мѣстамъ, часто. Цвѣтеть съ середины іюня до конца августа; плоды съ середины іюля.

800. *S. palustris* L. Пет. Кр. II, стр. 114.—Бух. II, № 321.—Бух. I, № 302.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 285.—Кауф. II, № 584.—Цин., № 1137.—Кауф. I, стр. 384.—Lind., p. 152.—Дв., № 582.—Макс., № 556.—Hoff. II, № 4357.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 103.—St. II, p. 34.—St. I, № 401.—Pal., № 1225.

Корневище ползучее съ длинными ползучими, подземными побѣгами, на концѣ клубнеобразно утолщенными; стебель приподнимающійся прямостоящій, 40—125 см., простой или слегка вѣтвистый, съ жесткими, вниз отогнутыми и прижатыми волосками, иногда внизу стебли на узлахъ съ отстоящими; листья продолговато-ланцетные или продолговато-линейные, съ сердцевиднымъ основаніемъ, въ 4—6 разъ длиннѣе ширины, заостренные, съ частыми и мелкими городками, б. или м. густо коротко-волосистые; нижніе—на очень короткихъ черешкахъ, верхніе—сидячіе, полустеблеобъемлющіе; цвѣточныя мутовки о 6—12 цвѣтахъ образуютъ длинный колосъ, въ нижней части иногда прерванный; прицвѣтные листья сходны съ стеблевыми, но много мельче, б. ч. отогнуты или они такъ коротки, что почти не видны изъ-за мутовокъ; чашечка 6—8 мм. дл., густо опушенная и железистая; зубцы ея треугольные, съ колючей шиловидной верхушкой; вѣничикъ 12—15 мм. дл., грязно-розовый съ темными и бѣловатыми крапинками; верхняя губа снаружи опушенная и железистая; трубка вѣничика сверху расширена; орѣшки слегка шероховатые, 1,5—2 мм. дл.



Stachys palustris.

По огородамъ, межамъ, поѣздамъ и по канавамъ, очень часто. Цвѣтеть съ половины іюня до конца августа; плоды съ конца августа.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. *serratum* Kauffm. Пет. Кр. II, стр. 114.—Кауф. II, стр. 396.—Кауф. I, стр. 384.

Отличается отъ типичной формы менѣе волосистымъ стеблемъ, длинными, тонкими и шиловидно-зазубренными листьями съ удаленными широкими и короткими зазубринами; волоски по угламъ стебля и на чашечкахъ длиннѣе, чѣмъ у типичной формы.

По сырмъ кустарникамъ, рѣдко. Растокнио (К.).

801. *S. ánnua* L. Пет. Кр. II, стр. 114.—Пет., стр. 286.—Кауф. II, № 585.—Цин., № 1138.—Рупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 384.—Lind., p. 152.—Дв., № 583.—Макс., № 557.—Hoff. II, № 4344.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 103.—Hoff., № 3165.—St. II, p. 34.—St. I, № 402.

Растеніе однолѣтнее, рѣже двулѣтнее; стебель 10—40 см., простой или чаще вѣтвистый, б. или м. густо покрытъ короткими прижатыми и

вниз обращенными волосками; нижние листья яйцевидно-продолговатые, зубчатые, на черешках; средние—уже, продолговато-ланцетные, к основанию суженные; верхние и прицветные—ланцетные, все пёжные, светло-зеленые; цветочные мутовки в длинных прерванных колосьях на конце стебля и ветвей; чашечка 6—9 мм. дл., колокольчатая, волосистая, зубцы ее ланцетно-шиловидные, колючие, равны трубке или короче ее, сплошь опушенные и по краям ресничатые; венчик 13—16 мм. дл., вдвое длиннее чашечки, светло-желтый, снаружи опушенный; нижняя губа с красноватыми крапинками; орешки 1.5—2 мм. дл., почти яйцевидные, пёжно сѣтчато-морщинистые.

По полям, пашням, огородам и холмам, сорное. Цветет с середины июня до поздней осени.

802. *S. recta* L. Пет. Кр. II, стр. 114.—Пет., стр. 386.—Кауф. II, № 586.—Гор., № 65.—Цин., № 1139.—Кауф. I, стр. 385.—Дв., № 584.—Маск., № 558.



Stachys annua.



Stachys recta.

Растение многолетнее; стебель 30—150 см., простой или ветвистый, прямостоящий или приподнимающийся, шершавый от редких прижатых волосков; листья продолговато-ланцетные или линейно-ланцетные, суженные к обоим концам, шероховатые, по краям зубчатые, нижние—на очень коротких черешках, остальные—сидячие; все темно-зеленые, плотные; цветочные мутовки в длинных прерванных колосьях на конце стебля и ветвей; чашечка до 8 мм. дл., покрыта жесткими щетинистыми волосками; зубцы ее треугольные с голой колючкой; венчик сѣрно-желтый, 13—15 мм. дл., снаружи опушенный, в зѣве оранжевый; нижняя губа с красными крапинками; орешки 2—2.5 мм. дл., очень пёжно сѣтчатые.

По известнякам и пескам, очень редко. Цветет с середины июля до осени. Перово (герб. Борхм.).—Дракино, Срп. у. (Г. М.).

803. *S. Betónica Benth.*

Betonica officinalis L. Пет. Кр. II, стр. 115. — Бух. II, № 322. — Пет., стр. 146. — Кауф. II, № 587. — Цинк., № 1135. — Кауф. I, стр. 385. — Lind., p. 152. — Ann., C. IV, № 39. — Mart., p. 103. — Hoff., № 490. — St. II, p. 34. — St. I, № 399. — Pal., № 1223.

Betonica officinalis Pall. Макс. Нут. II, p. 92.

Betonica officinalis L. γ . *stricta* Koch. Бух. I, № 303. — F. O., № 7, p. 102. — Кауф. II, стр. 397. — Кауф. I, стр. 385.

Betonica stricta Ait. Дв., № 580. — Макс., № 554. — Макс. Нут. II, p. 92. — Hoff. II, № 4341. — Gold. C., p. 20.

Корневище короткое; одинъ или нѣсколько стеблей изъ пазухъ пучка корневыхъ листьевъ, примостоящихъ, 20—100 см., б. ч. простыхъ, рѣже слегка вѣтвистыхъ, б. или м. густо опушенныхъ; листья продолговато-яйцевидные, у основанія сердцевидные, б. ч. туповатые, по краямъ городковые, волосистые, рѣже голые; корневые и нижняя пара стеблевыхъ—на длинныхъ черешкахъ; верхнiе—коротко-черешковые или почти сидячіе; цвѣточныя мутовки густыя многоцвѣтковыя, въ плотномъ верхушечномъ колосѣ или нижняя мутовка отдалена; чашечка б. или м. густо- и жестко-волосистая; зубцы ея треугольно-ланцетные, колючіе; вѣничикъ 12—16 мм. дл., малиновый или лилово-малиновый, снаружи коротко опушенный и съ звѣздчатыми волосками; трубка выдается изъ чашечки; пыльники бѣловатые, орѣзки продолговатые, шероховатые, 3 мм. дл.



Stachys Betonica.

По кустарникамъ, лѣсамъ, опушкамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ середины іюня до поздней осени; плоды съ конца іюля.

Можно различить слѣдующія формы:

1. *týpica* GB.

Все растеніе б. или м. густо покрыто жесткими, б. ч. отстоящими волосками; чашечка тоже покрыта жесткими и звѣздчатыми волосками.

2. *legitíma* Aschers.

Betonica officinalis L. 3. *glabrata* Koch.

Стебель голый или только по угламъ покрытъ отогнутыми внизъ и прижатыми волосками; листья почти голые; чашечка голая или почти голая съ коротко-рѣсничатыми зубцами. Мытищи (С.).

3. *álba* (Mart. sp.). Хор. II, стр. 18. — Mart., p. 103.

Съ бѣлыми цвѣтами.

340. *Ballóta* L.

Вѣничикъ двугубый, трубка его внутри съ волосистымъ кольцомъ; верхняя губа вогнутая, нижняя—3-лопастная, съ болѣе крупною обратно-

сердцевидною срединною лопастью; чашечка трубчато-ворончатая съ выдающимися 10 жилками и 5 равными колючими треугольно-овальными зубцами: тычинки параллельныя; гнѣзда пыльниковъ расходятся прямолинейно и вскрываются общею продольною щелью; орѣшки продолговатобратно-яйцевидные.

804. *B. nigra* L. Пет. Кр. II, стр. 117. — Пет., стр. 145. — Кауф. II, № 588. — Цин., № 1153. — Рупр., стр. 86. — Кауф. I, стр. 386. — Дв., № 585. — Макс., № 560. — Gold. C., p. 20. — Pal., № 1230.

У насъ только:

α. ruderalis Sw.

Ballota nigra L. *α. foetida* Koch. Хор. II, стр. 19. — Хор. I, стр. 18. — Кауф. II, стр. 397. — Кауф. I, стр. 386.



Ballota nigra α. ruderalis.

Корневище многолѣтнее; стебель 50—120 см., простой или вѣтвистый, б. или м. густо шершаво-пушистый, рѣже почти голый; листья на черешкахъ, широко- или узко-яйцевидные, у основанія слегка сердцевидные, слегка округлые или слегка клиновидные, на концѣ туповатые или заостренные, по краямъ крупно- и неровно-городковые, съ тупыми или островатыми городками, съ обѣихъ сторонъ съ короткими бѣлыми волосками, съ нижней—иногда железистыми; къ верхушкѣ листья становятся мельче, острѣе и черешки короче; цвѣты не въ густыхъ полузонтикахъ на короткихъ цвѣтопосахъ въ пазухахъ листьевъ; чашечка опушенная, железистая; трубка ея отъ 5 до 7,5 мм. дл., изъ которой выдается верхняя часть трубки вѣнчика; зубцы чашечки отъ 2 до 4 мм. дл., въ

очертаніи очень измѣнчивы: отъ треугольно-ланцетныхъ, б. или м. постепенно суженныхъ въ остъ, до яйцевидныхъ, съ остью, б. или м. ясно отграниченной отъ остальной части зубца; вѣнчикъ 10—17 мм. дл., снаружи густо-волосистый, грязно-розовый; губа съ бѣлою росписью; орѣшки 2 мм. дл. *). По безплоднымъ мѣстамъ, близъ жилья, на пескѣ и известнякахъ. Цвѣтетъ съ

*) Типичной *B. nigra* L. *α. foetida* Koch. у насъ нѣтъ, и вотъ какой діагнозъ даетъ А. А. Хорошковъ, который разобрался въ этихъ двухъ формахъ по большому гербарному матеріалу изъ Моск. Сада и изъ Имп. Академіи Наукъ: „У *Ballota foetida* Lam. чашечная трубка отъ 7,5 до 9 мм. дл., вполнѣ или почти вполнѣ скрывающая трубку вѣнчика, а зубцы чашечки короткіе отъ 1,5 до 2,5 мм. дл., изъ которыхъ 0,5—1 мм. падаетъ на остъ; зубцы широко-яйцевидные, округлые или усѣченно-округлые съ остью, ясно отграниченной отъ остальной части зубца. Найти какія либо діагностическія отаичія для *B. ruderalis* и *B. foetida* въ строеніи листовой пластинки, какъ дѣлаетъ Günther-Beck v. Mappa-getta, Fl. von Nieder—Oesterreich. 1893, p. 1020., я не могъ. Aschers. и Graebn., въ Fl. d. Nordost-deutsch. Flachl. 1898/9, p. 606, также не дѣлають подобной попытки по отношенію къ этимъ двумъ формамъ“.

начала июля весь август. Петровское-Разумовское (Шр.).—Дужки, Срп. у. (К.).—Серпуховъ близъ Кремля (П.).—Соколова Пустьнь, Срп. у. (Х.).—Дракино, Срп. у.; Бѣлые Колодези, Клм. у. (Мил.).—Бочманово, Клм. у. (С.).

341. *Leonurus L.*

Вѣчникъ двугубый съ трубкою, не выдающейся изъ чашечки, и внутри съ волосистымъ кольцомъ; верхняя губа продолговатая, вогнутая, нижняя—3-лопастная, съ тупыми лопастями, вкорѣ послѣ распускания скручивающаяся; чашечка трубчато-колокольчатая съ 5 жилками и 5 отстоящими колючими зубцами, изъ коихъ 2 нижнихъ нѣсколько длиннѣе и отогнуты; тычинки параллельныя, по отцвѣтаніи скручиваются и отгибаются кнаружи; глѣзда пыльниковъ параллельныя вскрываются продольными трещинами; орѣшки остро-3-гранные, наверху плоскіе.

805. *L. Cardifaca L.* Пет. Кр. II, стр. 117.—Бух. II, № 323.—Бух. I, № 304.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 212.—Кауф. II, № 589.—Цин., № 1144.—Кауф. I, стр. 386.—Lind., p. 152.—Дв., № 586.—Макс., № 559.—Ноев. II, № 4381.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 103.—Hoff., № 1879.—St. II, p. 34.—St. I, № 403.—Pal., № 1235.

Leonurus villosus Desf. Pinz., p. 17.

Стебель 50—150 см., прямостоящій, простой или вѣтвистый, б. или м. мохнато-пушистый, рѣже почти голый; листья на длинныхъ черешкахъ, съ верхней стороны темно-зеленые, слабо опушенные, съ нижней—свѣтлѣе, б. или м. густо опушенные; нижніе листья округлые съ сердцевиднымъ основаніемъ, пальчато-5—7-раздѣльные, остальные—съ клиновиднымъ основаніемъ, не глубоко 3-раздѣльные, доли надрѣзочно-зубчатые, какъ и у нижнихъ; макушечные листья цѣльнокрайніе или съ 1—2 зубцами; цвѣточныя мутовки многоцвѣтковые, пазушныя; прицвѣтники мелкіе, линейные, колючіе; чашечка почти голая, зубцы ея колючіе; вѣчникъ 10 мм. дл., снаружн густо опушенный, розовый; нижняя губа блѣдно-розовая съ темно-розовыми пятнышками; орѣшки 2—2,5 мм. дл. на верхушкѣ опушенные.



Leonurus Cardifaca.

По безплоднымъ мѣстамъ, близъ жилья, по берегамъ рѣкъ и ручьевъ, очень часто. Цвѣтетъ съ середины іюля до конца августа; плоды съ половины іюля.

806. *L. tatáricus L.*

Leonurus cardiaca L. var. tataricus L. (sp.) Мое., № 27.

Стебель 50—150 см., прямостоящій, простой или слабо вѣтвистый, голый или едва опушенный; листья на черешкахъ, сверху темно-зеле-

низе, почти голые, съ нижней стороны свѣтло-зеленые, покрыты короткимъ прижатымъ пушкомъ; нижніе листья почти до черенка пальчато-5—7-раздѣльные, съ узкими надрѣзочно-зубчатыми долями; зубцы ихъ линейные; верхніе листья разсѣчены на 3 узкія, линейныя, почти цѣльно-крайнія доли; у среднихъ листьевъ, б. ч. тоже 3-раздѣльныхъ, доли съ рѣдкими линейными зубцами; прицвѣтники мелкіе, линейные, колючіе; чашечка почти голая или коротко опушенная съ колючими зубцами; вѣнчикъ розовый, снаружи густо опушенный, средняя доля нижней губы съ округлой или слабо выемчатой верхушкой.

Найдено только разъ въ цвѣту 8 іюля, близъ жилья, въ Михайловскомъ, Пдл. у. (Мос.).



Leonurus tataricus.



Chaeturus marrubiastrum.

342. *Chaetúrus* Willd.

Вѣнчикъ двугубый съ трубкой, не выдающейся изъ чашечки и безъ волосистаго кольца внутри; верхняя губа нѣсколько вогнутая, нижняя—3-лопастная съ тупыми боковыми лопастями и среднею обратно-сердцевидною; нижняя губа не скручивается; чашечка съ 10 жилками и 5 колючими, б. или м. равными зубцами; тычинки параллельныя, по отцвѣтаніи не скручиваются; гнѣзда пыльниковъ расходятся и вскрываются одной общей продольной трещиной; орѣшки остро-3-гранные, сверху тупые.

807. *C. marrubiástrum* (L.). Rchb.

Chaeturus Marrubiastrum Ehrh. (Willd.). Пет. Кр. II, стр. 117.

Leonurus Marrubiastrum L. Ф. В., № 5.

Стебель 40—100 см., примостоящій, б. ч. вѣтвистый, коротко и бархатисто-пушистый, какъ и нижняя сторона листьевъ; послѣдніе на черенкахъ, крупно и неровно-зубчатые, сверху зеленые, слабо опушенные, снизу сѣрые, нижніе—яйцевидно-ланцетные, туповатые или заостренные.

средние и верхние—ланцетные съ длиннымъ клиновиднымъ основаніемъ и заостренною верхушкой, иногда самые верхніе—цѣльнокрайніе; цвѣтотъныя мутовки многоцвѣтковые въ пазухахъ листьевъ; прицвѣтники щетиновидные, колочіе, равны чашечкѣ; послѣдняя покрыта короткими щетинистыми волосками и железами; зубцы ея равные колочіе; вѣничекъ мелкій, 5—7 мм. дл., бѣловато-розовый, снаружи опушенный; орѣшки 2 мм. дл., черныя, съ опушеною верхушкой.

Цвѣтетъ съ конца іюня весь августъ. Очень рѣдко. Между Прилуками и Никифоровымъ, на холмахъ, Срп. у. (В. М. Арнольдъ).—Близъ ст. Ока, М.-Курск. ж. д. (С.).

343. *Phlomis* L.

Вѣничекъ двугубый, трубка его короткая, не выступаетъ изъ чашечки и внутри съ волосистымъ кольцомъ; верхняя губа шлемовидная, сжатая съ боковъ, нижняя—3-лопастная съ обратно-сердцевидной срединной лопастью; чашечка съ 10 жилками, трубчатая, съ 5 выемчатыми зубцами и въ выемкѣ съ острокопечіемъ; тычинки параллельныя, 2 верхнія у основанія съ серповидными отростками; гнѣзда пыльниковъ расходящіяся, вскрываются одною общою продольною щелью; орѣшки 3-гранные, на верхушкѣ округлыя или усѣченные.

808. *P. tuberosa* L. Пет. Кр. II, стр. 117.—Ф. Б., № 71.—Пет., стр. 239.—Кауф. II, № 590.—Цин., № 1155.—Рушр., стр. 62 и 86.—Кауф. I, стр. 387.—Дв., № 587.—Макс., № 561.—Макс. Пут. II, стр. 10.—Gold. C., p. 20.—Gold. Sp., p. 130.—Mart., p. 104.—Hoff., № 2445.—St. II, p. 34.—St. I, № 404.—Pal., № 1239.



Phlomis tuberosa 2. *typica*.



Phlomis tuberosa 3. *longifolia*.

Корни длинныя, утолщенные въ шаровидные клубни; стебель 50—150 см., прямостоящій, простой или вѣтвистый, голый, темно буровато-пильовый; нижніе листья на черешкахъ, широко-треугольныя съ глубокимъ сердцевиднымъ основаніемъ и туповатой верхушкой; средніе—

на болѣе короткихъ черешкахъ, сердцевидно-продолговатые: верхніе — почти сидячіе, длинно-треугольно-ланцетные; всѣ—крупно-городковые, съ верхней стороны темно-зеленые, голые, съ нижней — свѣтлѣе и опушенные; цвѣточныя мутовки густыя, б. или м. разставленныя; прицвѣтники нѣсколько длиннѣе чашечки, щетиновидные, съ длинными щетинистыми волосами; чашечка голая, зубцы ея колючіе; вѣтчикъ 15—20 мм. дл., грязно-розовый, снаружи бѣло-войлочный, вдвое длиннѣе чашечки; верхняя губа по краю зубчатая и рѣсничатая; орѣшки черноватые, 6 мм. дл., съ опушеной верхушкой.

Цвѣтеть съ половины іюня до конца августа. Распадается на слѣдующія формы:

α. *typica*.*)

Стебель б. ч. вѣтвистый; листья у цвѣточныхъ мутовокъ короткіе, равны мутовкѣ или нѣсколько длиннѣе ея. По сухимъ возвышеннымъ мѣстамъ, близъ дорогъ и по известнякамъ, не часто. Сернуховъ, Лужки, Срп. у.; Городище, Каропчеево, Протопоново, Кзм. у. (К.).—Бѣлые Колодези, Кзм. у.; Старая Кашира, Срп. у. (П.).—По дорогѣ изъ Райковъ въ Щелково, Вгр. у. (П.).

β. *longifolia*.**)

Стебель б. ч. простой; всѣ листья съ длинно-вытянутой верхушкой; у цвѣточныхъ мутовокъ листья очень крупныя, много длиннѣе междоузлій. По опушкамъ, въ тѣни. Бѣлые Колодези, Кзм. у. (П.).—Лужки, Срп. у. (С.).

344. *Scutellária* L.

Вѣтчикъ двугубый, съ длинной трубкой, постепенно расширяющейся; верхняя губа шлемовидная, съ маленькой выемкой на верхушкѣ и по бокамъ у основанія съ 2 лопастями; нижняя — простая, не 3-лопастная; чашечка колокольчатая, двугубая, съ цѣльными губами; верхняя губа съ поперечнымъ полымъ выростомъ, по отцвѣтаніи губы замыкаются, при созрѣваніи плода чашечка растрескивается вдоль и верхняя губа отпадаетъ, при плодахъ остается одна нижняя; тычинки параллельныя, двѣ верхнія съ расходящимися двугибдыми рѣсничатыми пыльниками, раскрывающимися одною общею продольною щелью; у двухъ нижнихъ тычинокъ пыльники недоразвитые, одногібдые; орѣшки почти шаровидные.

*) *Phlomis tuberosa* L. α. *typica*.

Caulis plerumque ramosus, folia fulcrantia brevia, verticillastrum aequantia seu paulo eum superantia.

**) *Phlomis tuberosa* L. β. *longifolia*.

Caulis plerumque simplex, folia tota apice longe attenuata, folia fulcrantia magna, inflorescentia paulo superantia.

809. *S. galericulata* L. Пет. Кр. II, стр. 118. — Бух. II, № 324. — Бух. I, № 305. — F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 274. — Кауф. II, № 591. — Цин., № 1131. — Кауф. I, стр. 387. — Lind., p. 152. — Ann., C. II., № 150. — Дв., № 596. — Макс., № 570. — Hoff. H., № 4492. — Gold. C., p. 21. — Mart., p. 105. — Hoff., № 2916. — St. II, p. 35. — St. I, № 412. — Pal., № 1270.

Корневище ползучее съ длинными тонкими подземными побѣгами; стебель 15—60 см., прямостоящій, простой или вѣтвистый, голый или блѣднѣе верхушки съ короткими прижатыми, обращенными внизъ волосками; листья на очень короткихъ черешкахъ, продолговато-ланцетные, усѣченно-сердцевидные, туповатые или слегка заостренныя, по краямъ съ рѣдкими туповатыми городками, съ верхней стороны голые, съ нижней—только вдоль жилокъ коротко-опушенные или голые; цвѣты пазушные, по одному въ каждой пазухѣ, обращены въ одну сторону, короче листьевъ; цветоножки коротко-опушенныя съ двумя маленькими шло-видными прицвѣтниками; чашечка голая или почти голая; вѣничикъ 15—21 мм. дл., снаружи опушенный, голубовато-фіолетовый; орѣшки около 1 мм. дл., бородавчатые.



Scutellaria galericulata.



Scutellaria hastifolia.

По канавамъ, ручьямъ, по берегамъ рѣкъ и по тонкимъ мѣстамъ, поросшимъ кустарникомъ, часто. Цвѣтетъ съ середины юня до конца августа; плоды съ середины юля.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

а. *pubescens* Benth.

Стебель и нижняя сторона листьевъ б. или м. густо покрыты короткими волосками; чашечка тоже опушена; вѣничикъ мало открытъ. Саввинское озеро, Вер. у. (II.).

810. *S. hastifolia* L. Пет. Отч., стр. 13. — Пет. Кр. II, стр. 118. — Пет., стр. 274. — Мил., № 8.

Корневище съ короткими побѣгами; стебель 15—45 см., прямостоящій, простой, рѣже вѣтвистый голый или слабо опушенный, какъ и листья;

последніе на коротких опушенных черешках; нижніе — яйцевидные, округло-тупые; средніе—продолговато-ланцетные или ланцетные, копьевидные, съ расходящимися въ бока лопастями и иногда близъ лопасти съ 1—2 маленькими зубчиками, въ остальной части, какъ и верхніе листья, цѣлюкрайніе; цвѣты въ пазухѣ верхнихъ прицвѣтныхъ листьевъ, все длиннѣе ихъ, обращены въ одну сторону и собраны кистью; чашечка железисто-опушенная; вѣничекъ 17—22 мм. дл., голубовато-фіолетовый, снаружи б. или м. густо железисто-волосистый.

По лѣсистымъ берегамъ, кустарникамъ и известнякамъ, рѣдко. Цвѣтеть съ половины іюня весь іюль. Между Соколовой пустыней и Копелевкой и между Лужками и Прилуками, Срп. у. (Мил.).—Дракино, Срп. у. (Ф. А. Гриневскій). — Между Рождественымъ на р. Парѣ и д. Воздвиженской, Срп. у. (гр. Е. Сологубъ). — Между Вѣлопесочкой слободой и Старой Каширой, Срп. у.; Вѣлые Колодези, Кзм. у. (И.).

345. *Brunella* L.

Вѣничекъ двугубый съ трубкой перетянутой близъ основанія и выпуктри на перетяжкѣ съ волосистымъ кольцомъ; верхняя губа вогнутая, шлемовидная, нижняя—3-лопастная съ боковыми лопастями, отогнутыми внизъ, и срединною широкою, вогнутою, по краямъ зубчатою; чашечка двугубая, сжатая, верхняя губа ея широкая, съ 3 короткими зубцами, нижняя—2-раздѣльная на 2 длинно-треугольныхъ зуба, по отцвѣтаніи чашечка замкнутая; тычинки параллельныя, подъ пыльниками съ зубцомъ или бугоркомъ; гнѣзда пыльниковъ расходящіеся, раскрываются отдѣльными продольными щелями, по краямъ рѣсничатые; орѣшки 3-гранные, продолговатые.

811. *B. vulgaris* L. Sch. I, № 74.—Пет., стр. 150.—Цин., № 1129.

Prunella vulgaris L. Пет. Кр. II, стр. 118.—Бух. II, № 325.—Бух. I, № 306.—F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, № 592.—Pinz., p. 17. — Кауф. I, стр. 388.—Lind., p. 150.—Ann., C. IV, № 43.—Дв., № 597.—Маке., № 571.—Hoff. II., № 4508.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 106.—Lib. Tr., p. 72.—Hoff., № 2605.—St. II, p. 35.—St. I, № 413.—Pal., № 1274.

Корневище ползучее, съ укореняющимися побѣгами, на концѣ съ нучкомъ листьевъ; стебель 5—45 см., простой, рѣже вѣтвистый, голый или по угламъ и подъ листьями съ б. или м. густыми короткими волосками; листья на черешкахъ округло-яйцевидные или яйцевидно-продолговатые, съ клиновиднымъ или округлымъ основаніемъ и тупой или заостренной верхушкой, цѣлюкрайніе или рѣдко-городковые; цвѣточныя мутовки собраны въ плотную головку или продолговатый колосъ на концѣ стебля и вѣтвей; б. ч. подъ самымъ колосомъ пара сидячихъ листьевъ; прицвѣтники плечатые, округло-почковидные, быстро сужены въ короткое остріе, часто окрашены, опушены и по краямъ съ рѣсничками; ча-

щечка б. ч. темно-вишневая, верхняя губа ее съ зубцами очень короткими, по равным, остроконечным; вѣнчикъ не болѣе какъ вполтора раза длиннѣе чашечки, до 13 мм. дл., темно-синій или лиловый; нити у длинныхъ тычинокъ съ шиловиднымъ зубцомъ.

По лугамъ, полямъ, лѣсамъ, опушкамъ и близъ жилья, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до поздней осени; плоды съ половины іюля.

α. albiflora Tin.

Цвѣты бѣлые. Дарьино, Звн. у. (X.).

812. *B. grandiflora* (L.) Jacq. Пет., стр. 150.—Цин., № 1128.

Prunella grandiflora Moench. Пет. Отч., стр. 13.—Пет. Кр. II, стр. 118.—Кауф. II, № 593.—Рупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 388.—Lind., p. 150.—Дв., № 597.—Макс., № 572.—Mart., p. 106.

Prunella vulgaris L. *β. grandiflora*. St. I, № 413.—Pal., № 1274.

Корневище членистое, иногда развѣтвленное; стебель 10—40 см., б. ч. простой, б. или м. опушенный отстоящими волосками, рѣже голый;



Brunella vulgaris.



Brunella grandiflora.

листья на черешкахъ яйцевидно-продолговатые или яйцевидно-ланцетные, быстро суженные въ черешокъ, рѣдко съ слегка округлымъ основаніемъ, туповатые, цѣльнопольные или неясно-и рѣдко-городковые; цвѣточные мутовки собраны въ плотный колосъ до 7 см. дл.; между колосомъ и верхними листьями всегда междоузліе въ 1,5—9 см. дл.; прицвѣтники съ сѣтчатыми жилками, полукруглые, быстро вытянутые въ кончикъ, б. ч. зеленые или покрашенные, съ наружной стороны опушенные и по краямъ рѣсничатые; чашечка б. ч. вишневая, верхняя губа ее съ болѣе выдающимся широко-3-угольнымъ, кверху шиловидными зубцами; вѣнчикъ крупный, въ 2—3 раза длиннѣе чашечки, 20—25 мм. дл., темно-сине-лиловый; нити длинныхъ тычинокъ съ короткимъ тупымъ бугоркомъ.

По кустарникамъ или по лѣсамъ, очень рѣдко. Цвѣтетъ съ половиною іюня до конца августа. Близъ Лужковъ, Срп. у. (С.). — Иванова гора на р. Нарѣ, близъ Рождествена, Срп. у. (гр. Е. Соллогуѣ).

346. *Ájuga* L.

Вѣничкъ двугубый, съ длинной бѣлизѣ основанія перетянутой трубкой и на перетяжкѣ внутри съ волосистымъ кольцомъ; верхняя губа очень короткая, вмечатая или двураздѣльная, нижняя—3-лопастная съ обратно-сердцевидною срединною лопастью; по отцвѣтаніи вѣничкъ засыхаетъ и остается при плодѣ; чашечка колокольчатая, 5-зубчатая; тычинки параллельными, выдаются надъ верхней губой; гнѣзда пыльниковъ расходящіяся, подъ конецъ сливаются и вскрываются одной общей продольной трещиной; орѣшки морщинистые.

813. *A. réptans* L. Пет. Кр. II, стр. 119.—Бух. II, № 326.—Бух. I, № 308.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 132.—Кауф. II, № 594.—Цип., № 1159.—Pinz., p. 17.—Кауф. I, стр. 389.—Lind., p. 154.—Ann., C. II, № 151.—Дв., № 563.—Макс., № 535.—Hoff. H., № 4195.—Gold. C., p. 20.—Mart., p. 99.—Hoff., № 76.—St. II, p. 33.—St. I, № 384.—Pal., № 1177.

Ajuga reptans L. β . *simplex* Kauffm. Бух. II, № 326 β .—Бух. I, № 308 β .—Кауф., II, стр. 401.—Кауф. I, стр. 389.

Корневище короткое, съ длинными укореняющимися побѣгами*); стебель 5—35 см., голый, только по 2 ребрамъ волосистый, рѣже покрытъ



Ajuga reptans.

волосками, простой, прямостоящій; корневые листья обратно-яйцевидные или овальные, суженные въ черешокъ, съ слегка волнисто-вмечатыми или округло-зубчатыми краями, съ верхней стороны голые; стеблевые—сидячіе, обратно-яйцевидно-продолговатые, слегка волнисто-зубчатые; нижніе прицвѣтные—походятъ на стеблевые или округлые, длиннѣе цвѣтовъ; верхніе—овальные или продолговатые, цѣльнокрайніе, короче цвѣтовъ; цвѣточные мутовки образуютъ длинный ложный колосъ, сплошной или прерванный; чашечка опушенная, зубцы ея треугольные, заостренные, равны трубкѣ; вѣничкъ снаружи опушенный, 12—17 мм. дл., синій, основаніе губы и трубка бѣлые; пыльники желтые,

орѣшки эллипсоидальные, 2 мм. дл., слегка опушенные.

*) Иногда по время цвѣтенія побѣги еще не успѣваютъ развиться или бываютъ только въ зачаточномъ видѣ. Такія особи были описаны Н. Кауфманомъ, какъ разновидность *A. reptans* L. β . *simplex*. Аналогичная форма была описана, какъ самостоятельный видъ, подъ названіемъ *A. alpina* Vill., который отличается отъ *A. reptans* L. тоже только тѣмъ, что у него нѣтъ побѣговъ или они очень маленькіе; но нѣкоторыми новѣйшими флористами *A. alpina* Vill. даже не признается разновидностью *A. reptans* L., а считается только синонимомъ этого вида. Что-же касается опушенія, то А. Н. Петунниковымъ и мною были наблюдаемы особи почти совершенно голыя и притомъ безъ побѣговъ.

По полямъ, лѣсамъ, опушкамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвѣтеть съ середины мая до середины юля, иногда во второй разъ въ концѣ августа; плоды—съ конца юня.

α. albiflora Tin.

Съ бѣлыми цвѣтами. Бѣлые Колодези, Клм. у. (П.).—Лѣсъ близъ Пѣмчинова (С.).

β. roseiflora Wildm. et Durand.

Ajuga carnea Mart. Mart., p. 99.

Съ розовыми цвѣтами. Серебряный боръ близъ Хорошова (П.).—Татарское-Сакино, Пдл. у. (Х.).—Мытници, Пушкино, лѣсъ близъ Братовщины (С.).

814. A. genevensis L. Хор. II, стр. 17.—Хор. I, стр. 18.—Пет. Кр. II, стр. 119.—Ф. Б., № 72.—Пет., стр. 132.—Кауф. II, № 595.—Цин., № 1161.—Pinz., p. 18.—Рупр., стр. 86.—Кауф. I, стр. 390.—Дв., № 562.—Макс., № 537.—Макс. Пут. I, стр. 157. II, стр. 14.—Mart., p. 99.

Ajuga lanata Mart. Дв., № 562.—Mart., p. 99.

Ajuga pyramidalis Willd. Borg., p. 700.—Дв., № 561.—Макс., № 536.—Макс. Пут. II, стр. 10 и 81.—Mart., p. 99.—St. II, p. 33.—St. I, № 383.

Ajuga pyramidalis L. Цин., № 1160.

Побѣговъ нѣтъ; стебель 5—40 см., простой, прямостоящій, сплошь покрытый отстоящими курчавыми волосками; корневыхъ листьевъ во время цвѣтенія б. ч. уже нѣтъ; стеблевые—обратно-яйцевидные или продолговатые, клиновидно-суженные въ черешокъ, б. ч. выемчато-зубчатые; нижние прицвѣтные листья яйцевидные, чаще тоже выемчато-зубчатые или округло-зубчатые; верхние—цѣльнокрайніе, не рѣдко окрашенные; цвѣточныя мутовки б. ч. прерванныя, только верхушечныя сближенныя; чашечные зубцы яйцевидно-длинно-заостренные, равные ея трубкѣ; вѣничикъ снаружи опушенный, 15—20 мм. дл., темно-синій, трубка бѣлая.

По открытымъ мѣстамъ, опушкамъ, на песчаной и известняковой почвѣ, не часто. Цвѣтеть съ середины мая до конца юня, иногда во второй разъ въ концѣ юля. Боровскій курганъ, Брн. у.; близъ Верей; Городище на р. Коломенскѣ, Клм. у. (Макс.).—Каропчеево, Протополово, Клм. у. (К.).—Коломна, Лысово на р. Коломенскѣ. Бѣлые Колодези, Клм. у.; близъ Серпухова, подъ Туровымъ, Срп. у. (П.).—Хлыново на р. Нарѣ и Шириеево, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Зиброво, Срп. у.; Быково, Брн. у. (С.).—Булатово (съ лиловыми цвѣтами), Роднево, Пдл. у. (Х.).

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. elatior Fries.

Нижние и средние прицвѣтные листья 3-лопастные, длиннѣе цвѣтовъ; верхние—короче цвѣтовъ или равны имъ. Близъ Тишкова



Ajuga genevensis.

и Дракина, Срп. у. (П. и С.).—Между Борисовымъ и Лужками, Срп. у. (X.).—Бавыкино на р. Лопаси, Срп. у. (II.).

β. *foliōsa* Traut.

Нижние и средние прицветные листья какъ у *a. elatior* Fr., но верхние много длиннѣе цвѣтовъ. Лужки, Срп. у. (II.).—Въ лѣсу близъ ст. Удѣльная М.-Ряз. ж. д., Врн. у. (С.).

γ. *albiflōra*.

Съ бѣлыми цвѣтами.

δ. *roseiflōra*. Хор. II, стр. 17.

Съ розовыми цвѣтами. Между Сернуховымъ и Лужками, Срп. у. (П. и С.).—Булатова, Пдл. у. (X.).

A. *genevensis* × *reptans*.

Растеніе безъ побѣговъ или съ короткими побѣгами и почти всегда съ розеткою корневыхъ листьевъ; стебель б. ч. опушенъ по двумъ ребрамъ и еще курчавыми волосками или же только курчавыми; кромѣ главнаго стебля часто еще боковые приподнимающіеся; листья и прицветники то болѣе походятъ на *A. genevensis*, то на *A. reptans*; верхние прицветные листья б. ч. покрашены и короче цвѣтовъ.

Дер. Манькина Гора по лѣвому берегу р. Пахры, по известняковому склону и деревня Булатова, по известняковому склону, Пдл. у. (X.).

84 сем. *Solanáceae* Juss.

Цвѣты обоеполые, правильные, рѣже слегка неправильные; вѣничекъ спайнолепестный, 5 (6—7)-лопастный или надрѣзной, въ почкосложеніи створчато- или черепичато-складчатый, опадающій; чашечка спайнолистная, о 5 (6—7) зубцахъ или надрѣзахъ, остается при плодѣ и иногда сильно разрастается; тычинки по числу долей вѣничка, прикрѣплены къ его трубкѣ и чередуются съ его лопастями; пыльники вскрываются продольными щелями или наверху дырочками; завязь верхняя, 2- рѣже 4-многогнѣзная съ многочисленными сѣменочками на срединномъ, очень толстомъ сѣменосѣ; рыльце головчатое, рѣже двулопастное; плодъ—коробочка 2-гнѣзная или у основанія 4-гнѣзная, вскрывается крышечкой или створками, или же плодъ—сочная, рѣже сухая ягода дву-многогнѣзная; сѣмена б. ч. сплюснутыя съ согнутымъ, рѣже съ прямымъ зародышемъ и съ мясистымъ бѣлкомъ. Травы и древесныя растенія, часто ядовитыя, безъ прилистниковъ и съ листьями очередными, рѣже попарно сближенными.

Обзоръ семейства.

I. Solanáceae G. Don.

Плодъ—сочная, рѣдко сухая ягода.

Lycium, Solanum, Nicandra.

II. *Hyoscyameae* Endl.

Плодь—2-гнѣздная коробочка, вскрывающаяся крышечкой.

Hyoscyamus.

III. *Datúreae* Endl.

Плодь—коробочка вверху двугнѣздная, у основанія 4-гнѣздная, вскрывается створками.

Datura.

Опредѣлитель родовъ.

1. Пыльники сближены конусомъ; вѣничикъ колесовидный.

Solanum.

Пыльники не сближены конусомъ; вѣничикъ ворончатый или колокольчатый. 2.

2. Кустарникъ; чашечка 2—3-лопастная.

Lycium.

Травянистыя растенія; чашечка о 5 доляхъ или зубцахъ. 3.

3. Чашечка вздутая съ острыми, у основанія стрѣловидными долями; плодь—сухая 3—5-гнѣздная ягода; отгибъ вѣничика синевато-фіолетовый.

Nicandra.

Доли чашечки безъ стрѣловиднаго основанія; плодь—2-гнѣздная или только у основанія 4-гнѣздная коробочка; цвѣты бѣлые или грязно-желтоватые. 4.

4. Цвѣты крупныя, бѣлыя, пахучіе; коробочка снаружи съ зелеными иглами, вскрывается 4 створками.

Datura.

Цвѣты грязно-желтоватые; коробочка снаружи безъ шишковъ, вскрывается крышечкой.

Hyoscyamus.

* *Lycium* L.

Чашечка колокольчатая, 2—3-лопастная, не разрастаясь, остается при плодѣ, каждая ея лопасть 1—4-зубчатая; вѣничикъ ворончатый, съ плоскимъ 5-лопастнымъ отгибомъ; рыльце головчатое; тычинки выдаются изъ вѣничика; пыльники вскрываются продольными щелями; плодь—мало-мясистая ягода, двугнѣздная, малосѣменная.

* *L. halimifolium* Mill.

Lycium barbatum L. Пет. Кр. II, стр. 75.—Пет., стр. 217.—Pal., № 431.

Кустарникъ до 2 м., съ длинными, тонкими, часто дугообразно отогнутыми вѣтвями съ колючками; кора желтовато-сѣрая; листья б. ч. ланцетные, всего шире посрединѣ, цѣльнокрайніе или слабо волнисто-выемчатые, съ обѣихъ сторонъ сѣро-зеленыя отъ мушкетастаго налета, снизу свѣтлѣе; цвѣты пазушные, по 1—4, на длинныхъ цвѣтоножкахъ; чашечка б. ч. 3-лопастная, одна лопасть двузубчатая, рѣже чашечка 2-лопастная; вѣничикъ свѣтло-фіолетовый, въ зѣвѣ съ волосками; тычи-

ночные нити близъ основанія густо войлочно-мохнатыя; ягода ярко-красная, яйцевидно-продолговатая.

Разводится.



Lycium halimifolium.



Solanum Lycopersicum.

347. *Solánum* L.

Чашечка 5(9)-зубчатая или 5(9)-лопастная, остается при плодѣ; вѣнчикъ колесовидный, 5(9)-лопастный, въ почкосложеніи складчато-створчатый; рыльце головчатое или 2-лопастное; тычиночныя нити короткія; пыльники сближены конусомъ, свободные или спающиеся вытнутыми въ шиловидный отростокъ связниками; гнѣзда вскрываются на верхушкѣ дырочками или продольною щелью; плодъ—ягода дву-многогнѣздная.

1. Листья прерывчато-нечерноперистые. 2.

Листья простые или у основанія съ 2 маленькими листочками, отчего иногда листъ кажется состоящимъ изъ 3 листочковъ. 3.

2. Цвѣты желтые съ ланцетными долями. *S. Lycopersicum* L.

Цвѣты бѣлые, розовые или фіолетовые; вѣнчикъ 5-угольный.

S. tuberosum L.

3. Цвѣты бѣлые.

S. nigrum L.

Цвѣты фіолетовые. 4.

4. Стебель прямостоящій; вѣнчикъ снаружи покрытъ тонкимъ войлокомъ; цвѣтоножка и чашечка съ шипиками; плодъ крупный, овальный, фіолетово-синій. *S. Melanogena* L.

Стебель длинный, лазающій; вѣнчикъ снаружи голый; цвѣтоножка и чашечка безъ шипковъ; плодъ не крупный, яйцевидный, ярко-красный. *S. Dulcamara* L.

* **S. Lycopérsicum** L. Pal., № 417.

Lycopersicum esculentum Mill. Пет. Кр. II, стр. 75.—Пет., стр. 218.

Стебель до 1 м., б. ч. вѣтвистый, покрытъ, какъ и все растеніе, длинными отстоящими волосками и железисто-пушистый; листья прерывчато-непарноперистые съ черенчатыми сердцевидно-яйцевидными листочками, по краямъ надрѣзочно-крупно-зубчатыми; цвѣты на длинныхъ цвѣтоножкахъ, въ выплазнувшихъ завиткахъ; доли чашечки линейно-ланцетныя; вѣничикъ желтый съ ланцетными долями; ягода крупная, сплюснуто-шаровидная, часто бороздчатая, лоснящаяся, ярко-красная.

Цвѣтетъ съ іюля. Разводится по огородамъ.

* **S. Melanogéna** L. Pal., № 419.

Стебель 30—75 см., простой или вѣтвистый, покрытъ, какъ и листья, тонкимъ сѣроватымъ войлокомъ изъ звѣздчатыхъ волосковъ; листья яйцевидные, выемчато-лопастные, волнистые; цвѣты б. ч. по одному, супротивны листьямъ, на поникающихъ цвѣтоножкахъ, усаженныхъ вмѣстѣ съ чашечкой шишками; вѣничикъ фіолетовый, внутри желтый, снаружи тонко-войлочный, въ два раза крупнѣе чашечки; плодъ крупный, овальный, часто къ основанію нѣсколько суженный, съ тупой или закругленной верхушкой, темно-фіолетово-синій.

Разводится по огородамъ.



Solanum Melanogena.



Solanum tuberosum.

* **S. tuberósum** L. Пет. Кр. II, стр. 75.—Пет., стр. 281.—Кауф. II, стр. 344.—Цин., стр. 317.—Кауф. I, стр. 335.—Hoff. N., № 1722.—St. II, p. 14.—Pal., № 416.

Растеніе съ клубнями на тонкихъ подземныхъ побѣгахъ; стебель до 80 см., слегка гранистый, часто вѣтвистый, покрытъ, какъ и листья, короткими прижатыми волосками; листья прерывчато-непарноперистые, о 7—11 яйцевидныхъ листочкахъ, заостренныхъ, у основанія косыхъ.

часто сердцевидныхъ; цвѣты въ верхушечномъ, часто раздвоенномъ полузонтикѣ, какущимся боковымъ, на длинномъ цвѣтоножѣ; цвѣтоножки сочленены; чашечка въ 2—3 раза короче вѣнчика, послѣдній 5-угольный, бѣлый, розоватый, голубоватый или фіолетовый; ягода шаровидная, зеленая.

Цвѣтетъ съ середины іюня весь іюль. Разводится по огородамъ и полямъ.

815. *S. nigrum* L. F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 282. — Кауф. II, № 509. — Цин., № 1024. — Кауф. I, стр. 334. — Lind., p. 144. — Дв., № 240. — Макс., № 218. — Hoff. H., № 1708. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 42. — Hoff., № 3117. — St. II, p. 15. — St. I, № 141. — Pal., № 418.

Растеніе однолѣтнее; стебель 20—50 см., чаще вѣтвистый, съ слегка гранистыми и сплюснутыми вѣтвями, голый или слабо опушенный, какъ и все растеніе; листья яйцевидные или яйцевидно-ромбическіе, суженные въ черешокъ, цѣльнокрайніе или выемчато-зубчатые, съ тупой или островатой верхушкой; цвѣты въ ложныхъ зонтикахъ, супротивныхъ листьямъ или въ верхней трети междоузлія съ супротивной стороны листа; цвѣтоножки нѣсколько утолщаются къ цвѣтку; плодоножки обращены внизъ; вѣнчикъ бѣлый, длиннѣе чашечки; доли его яйцевидно-ланцетныя, заостренныя; доли чашечки широко-яйцевидныя, тупыя; ягода шаровидная, лоснящаяся.



Solanum nigrum.

Сорное, по огородамъ, близъ жилья, по садамъ и по берегамъ рѣкъ, часто. Цвѣтетъ съ середины іюня до поздней осени.

Можно различить слѣдующія формы:

α. vulgaris L.

Solanum nigrum L. α. *vulgare* Coss. et Germ. Бух. II, № 283. — Бух. I, № 270. — Кауф. II, стр. 343. — Кауф. I, стр. 335.

Зрѣлыя ягоды черныя.

β. chlorocarpum Spenner.

Solanum nigrum L. β. *ochroleucum* Coss. et Germ. Пет. Кр. II, стр. 74. — Кауф. II, стр. 343. — Кауф. I, стр. 334.

Solanum villosum Lam. Дв., № 241. — Макс., № 219. — Hoff. H., № 1724. — Mart. p. 42.

Зрѣлыя ягоды зеленыя или желто-зеленыя. Въ герб. Максимовича.

816. *S. Dulcamára* L. Пет. Кр. II, стр. 75. — Бух. II, № 282. — Бух. I, № 269. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 282. — Кауф. II, № 510. — Цин., № 1023. — Кауф. I, стр. 335. — Lind., p. 144. — Дв., № 239. — Макс., № 217. — Hoff. H., № 1690. — Mart., p. 42. — Hoff., № 3108. — St. II, p. 14. — St. I, № 140. — Pal., № 412.

Solanum dulcamara L. Gold. C. p. 18.

Корневище толстое, ползучее, многолѣтнее; стебель лазичій, отъ 40 см. до 5 м., у основанія нѣсколько деревянистый, голый, вѣтвистый; листья цѣльнокрайніе, продолговато-яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, заостренные, у основанія съ 2 маленькими дольками, иногда же настолько крупными, что листья кажутся трехдольными, тѣмъ не менѣе верхушечная доля листа много крупнѣе боковыхъ; цвѣточныя полузонтики поникшіе на длинныхъ цвѣтоносахъ, супротивныхъ листьямъ; чашечка маленькая, блюдчатая, зубцы ея короткіе, широко-треугольные; вѣничикъ лиловый съ отвороченными яйцевидно-ланцетными заостренными долями, у основанія которыхъ по 2 зеленыхъ пятнышка съ бѣлымъ ободкомъ; ягода на слегка повислой плодоножкѣ, яйцевидная, ярко-красная, лоснящаяся.

По сырымъ кустарникамъ, по берегамъ рѣкъ и ручьевъ, часто. Цвѣтетъ иногда съ начала іюня до конца августа; плоды съ конца іюля.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

***α. indivisum* Boiss.**

Solanum Dulcamara L. *persicum* Willd. Иер. Кр. II, стр. 75.—Кауф. II, стр. 732.

Всѣ листья, даже верхушечные, простые, безъ долекъ, продолговато-яйцевидные, заостренные, у основанія слегка сердцевидные. Каропчеево на обрывахъ, Кзм. у. (К.).—Протопоново, Кзм. у. (П.).—Близъ Серпухова (Ар.).—Тѣнистый оврагъ между с. Зеленымъ и Песновымъ, Бри. у. (С.).



Solanum Dulcamara.



Nicandra physaloides.

348. *Nicandra* Adans.

Чашечка 5-раздѣльная, вздуто-колокольчатая, остро-пяти-гранная, съ острыми и при основаніи стрѣловидными долями; вѣничикъ колокольчатый, съ слабо-пяти-лопастнымъ плоскимъ отгибомъ; рыльце головчатое; тычиночныя нити короткія, но длиннѣе пыльниковъ; послѣдніе вскры-

ваются продольными щелями: плод—сухая, 3—5-гнѣзная ягода, заключенная во вздутую и разросшуюся чашечку, вскрывается неправильно.

817. *N. physaloides* (L.) Gaertn. Пет. Кр. II, стр. 74. — Пет., стр. 228. — Кауф. II, стр. 342. — Цин., стр. 316. — Кауф. I, стр. 334.

Atropa physaloides Jacq. Pal., № 403.

Стебель 30—100 см., вильчатый, съ ребристыми вѣтвями, голый, какъ и все растение; листья овальные или яйцевидные, глубоко-выемчато-зубчатые, суживаются б. ч. клиновиднымъ основаніемъ въ черешокъ; цвѣты одиночные, довольно крупные, верхушечные и въ развилинахъ стебля супротивны листьямъ; вѣнчикъ синеватый, трубка его бѣлая; плодовая чашечка съ сѣтчатыми жилками, поникшая; ягода почти шаровидная.

Запасенное растение, найдено только разъ съ вполне зрѣлыми плодами въ срединѣ іюля близъ селца Апенково, Бгр. у. (Гум.).

349. *Hyoscyamus* L.

Чашечка кувшинчатая, при плодѣ разрастается и нѣсколько деревянится; вѣнчикъ широко-ворончатый, слегка неправильный, съ косымъ отгибомъ и съ 5, нѣсколько неравными, лопастями; рыльце головчатое; тычинки согнутыя; коробочка 2-гнѣзная, къ основанію слабо расширенная, вскрывается крышечкой.

818. *H. niger* L. Пет. Кр. II, стр. 74. — Бух. II, № 281. — Бух. I, № 268. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 203. — Кауф. II, № 508. — Цин., № 1022. — Кауф. I, стр. 333. — Lind., p. 144. — Дв., № 238. — Макс., № 221. — Hoff. II, № 1642. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 41. — Hoff., № 1676. — St. II, p. 14. — St. I, № 135. — Pal., № 392.

Стебель 30—100 см., простой или вѣтвистый, покрытъ, какъ и все растение, мягкимъ железистымъ клейкимъ пушкомъ, отчего имѣетъ тяжелый непріятный запахъ; нижніе листья черешковые, продолговато-яйцевидные, выемчато-перисто-надрѣзные; стеблевые — полустеблеобъемлющие, нѣсколько низбѣгающіе, яйцевидно-ланцетные, выемчато-крупнозубчатые; цвѣты почти сидячіе въ обливственныхъ завиткахъ; вѣнчикъ грязно-желтовато-бѣлый съ фіолетовыми сѣтчатыми жилками и въ зѣвѣ темно-фіолетовый; лопасти вѣнчика округлы и иногда слабо выемчатые; пыльники фіолетовые; плодовая чашечка 20—25 мм. дл., съ колючими острыми зубцами; сѣмена почковидная, 1,5 мм. дл., сѣро-бурая, грубо-бородавчатая.



Hyoscyamus niger.

Сорное. Цвѣтетъ съ половины іюня, весь августъ.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

a. pallidus (Kit.) Koch. Пет. Кр. II, стр. 74.—Кауф. II, стр. 342.—Цин., стр. 315.—Кауф. I, стр. 333.

Hyoscyamus niger L. *β. pallidus* Wald. et Kit. Макс., № 221 *β.*

Вѣичикъ блѣдно-желтый безъ сѣтчатыхъ жилокъ или съ едва замѣтными сѣтчатыми жилками. Въ гербаріяхъ Борхмана и Максимовича.—Ознобишино, Пдл. у. (X).

350. *Datura L.*

Чашечка трубчатая съ 5 гранями, 5-зубчатая, отдѣляется кольцомъ отъ нижняго основанія, которое остается при плодѣ, разрастаясь въ толстый щитокъ; вѣичикъ ворончатый, складчатый, съ 5-лопастнымъ угловато-выемчатымъ отгибомъ; рыльце двулопастное; пыльники вскрываются продольными трещинами; коробочка 2-гнѣзная, внизу раздѣлена ложными перегородками на 4 гнѣзда, вскрывается по перегородкамъ 4 створками.

819. D. Stramonium L. Пет. Кр. II, стр. 74.—Пет., стр. 176.—Кауф. II, № 507.—Цин., № 1021.—Кауф. I, стр. 333.—Дв., № 237.—Макс., № 220.—Hoff. H., № 1636.—Mart., p. 41.—Hoff., № 1151.—St. I, № 134.—Pal., № 388.

Стебель 30—100 см., б. ч. вѣтвистый, гладкій, голый, какъ и все растеніе; листья на черешкахъ, яйцевидные или продолговато-яйцевидные, заостренные, по краямъ крупно-выемчато-зубчатые, иногда двояко-зубчатые; цвѣты на короткихъ ножкахъ, б. ч. одиночные въ пазухахъ листьевъ и въ развѣтвленіяхъ стебля, съ одуряющимъ запахомъ; вѣичикъ бѣлый, 4—10 см. дл., лопасти его тонко-заостренныя; коробочка торчащая, 2—5 см. дл., яйцевидно-округлая, слегка опушенная, покрыта мягкими зелеными шипами; сѣмена почковидныя, сплюснутыя, яченсто-морщинистыя, 3—3,5 мм. дл.

Цвѣтетъ съ іюля весь августъ. Близъ жилья и по пустырямъ, рѣдко, одичалое. Воробьевы горы близъ Васильевского (Мар.).—Воробьевы горы на пустырь (герб. Борхм.).—Берегъ Москвы р. близъ Голицынской больницы (герб. Ген.).—Угreshи.



Datura Stramonium.

85 сем. *Scrophulariaceae* R.Br.

Цвѣты неправильные, рѣже почти правильные; чашечка 4—5-зубчатая, надрѣзная или раздѣльная, рѣже 2-листная, остается при плодѣ; вѣичикъ колесовидный или колокольчатый, слегка неправильный, или же

вѣнчикъ двугубый: верхняя губа 2-лопастная, рѣже цѣльная, нижняя—3-лопастная; тычинокъ 4, изъ коихъ 2 длиннѣе 2 другихъ, рѣже тычинокъ 5 или 2, въ послѣднемъ случаѣ бываютъ иногда еще 2 или 3 стаминодія; пыльники б. ч. 2-гнѣздные съ параллельными или расходящимися гнѣздами, вскрываются продольными щелями, рѣже пыльники одногнѣздные; у основанія пестика б. или м. замѣтный дискъ или спереди медовая железка; завязь верхняя, б. ч. 2-гнѣздная, рѣже одногнѣздная; въ первомъ случаѣ сѣменосы на перегородкѣ, во второмъ—2 стѣнныхъ сѣменоса; столбикъ съ головчатымъ или 2-лопастнымъ рыльцемъ; плодъ—коробочка, вскрывающаяся двумя створками по перегородкамъ или вдоль гнѣздъ, рѣже коробочка вскрывается на верхушкѣ зубчиками или дырочками; сѣмянъ въ каждомъ гнѣздѣ б. ч. много съ бѣлкомъ и прямымъ зародышемъ.

Обзоръ семейства.

I. *Verbásceae Benth.*

Вѣнчикъ колесовидный безъ медовыхъ ямочекъ; листья спиральные.

Verbascum.

II. *Chelónéae Benth.*

Вѣнчикъ ясно двугубый съ трубкой, безъ медовыхъ ямочекъ; листья б. ч. супротивные.

Scrophularia.

III. *Antirrhíneae Benth.*

Чашечка 5-раздѣльная; вѣнчикъ двугубый, у основанія съ шпорою; тычинокъ 4, изъ коихъ 2 длиннѣе другихъ; коробочка б. ч. вскрывается близъ верхушки 1—2 дырочками, края которыхъ расщепляются на нѣсколько зубчиковъ.

Linaria.

IV. *Gratióleae Benth.*

Вѣнчикъ б. ч. 5-лопастный, нѣсколько неправильный или двугубый, безъ шпоры и безъ медовыхъ ямочекъ.

Mimulus, Gratiola, Limosella.

V. *Digitáleae Benth.*

Вѣнчикъ трубчатый съ очень короткимъ 4-лопастнымъ отгибомъ; коробочка вскрывается по перегородкамъ.

Digitalis.

VI. *Veroníceae Benth.*

Вѣнчикъ колесовидный, 4—5-раздѣльный, съ очень короткой трубкой; коробочка вскрывается вдоль гнѣздъ двумя створками.

Veronica.

VII. *Euphrasíeae Benth.*

Вѣнчикъ съ явственною трубкой, двугубый, открытый; верхняя губа б. или м. шлемовидная, нижняя—3-лопастная или-зубчатая; тычинокъ (у нашихъ родовъ) 4, изъ коихъ 2 длиннѣе

остальных: коробочка 1—2-гнездная, вскрывается вдоль гнѣздъ двумя створками.

Odontites, Euphrasia, Alectorolophus, Pedicularis, Melampyrum, Lathraea.

Опредѣлитель родовъ.

1. Растеніе безъ хлорофилла, съ одними чешуевидными листьями.

Lathraea.

Растенія зеленія съ хлорофилломъ и съ зелеными листьями. 2.

2. Вѣничекъ колесовидный, 4—5-лопастный съ очень короткой трубкой. 3.

Вѣничекъ 6. ч. съ длинной трубкой, двугубый или колокольчатый. 4.

3. Вѣничекъ 5-лопастный; тычинокъ 5.

Verbascum.

Вѣничекъ 4-лопастный; тычинокъ 2.

Veronica.

4. Чашечка о 4 зубахъ или надрѣзахъ. 5.

Чашечка о 5 зубахъ или надрѣзахъ, или же 2-лопастная. 8.

5. У основанія нижней губы двѣ выпуклины или два бугорка; коробочка яйцевидная, заостренная.

Melampyrum.

У нижней губы выпуклины нѣтъ; коробочка сплюснутая. 6.

6. Цвѣты желтые; чашечка при плодахъ нѣсколько разрастается, сплюснутая и нѣсколько вздутая.

Alectorolophus.

Цвѣты бѣлые, свѣтло-фіолетовые или грязно-малиновые, чашечка трубчато-колокольчатая, иногда слегка сдвлена съ боковъ, но не вздутая. 7.

7. Цвѣты бѣлые съ фіолетовыми жилками или свѣтло-фіолетовые; верхняя губа коротко 2-лопастная съ отвороченными краями.

Euphrasia.

Цвѣты грязно-малиновые; верхняя губа цѣльная или едва выемчатая, края ея не отворочены.

Odontites.

8. Изъ 4 тычинокъ волюнѣ развиты только 2, двѣ другія съ болѣе длинными и тонкими нитями безъ пыльниковъ или только съ зачатками пыльниковъ (стаминодін), иногда еще чешуевидный стаминодій нѣсколько выше развитыхъ тычинокъ.

Gratiola.

Всѣ 4 тычинки волюнѣ развиты, иногда подъ верхней губой стаминодій въ видѣ мясистой чешуйки. 9.

9. Вѣничекъ явственно двугубый. 10.

Вѣничекъ колокольчатый, 5-зубчатый или вздуто-колокольчатый, съ неясно двугубымъ отгибомъ. 13.

10. Вѣничекъ съ 6. или м. длинной шпорою.

Linaria.

Вѣничекъ безъ шпоры. 11.

11. Чашечка гранистая съ сильно выдающимися углами; рыльце явственно 2-лопастное.

Mimulus.

Чашечка безъ граней; рыльце головчатое, иногда безъ утолщенія, рѣже едва замѣтно 2-лопастное. 12.

12. Цвѣты крупныя; верхняя губа шлемовидная, б. ч. сжатая съ боковъ; листья перисто-раздѣльные. *Pedicularis.*

Цвѣты мелкія; верхняя губа почти плоская, 2-лопастная; листья цѣльные, зубчатые. *Scrophularia.*

13. Растеніе очень мелкое, безстебельное; цвѣты очень мелкія — 2—2,5 мм. дл., бѣлые или розоватыя; пыльники одногнѣздные.

Limosella.

Растеніе крупное, съ стеблемъ, покрытымъ листьями; цвѣты крупныя—20—40 мм. дл., желтыя; пыльники двугнѣздные.

Digitalis.

351. *Verbáscum* L.

Чашечка 5-раздѣльная или 5-зубчатая; вѣничикъ слегка неправильный, колесовидный, 5-лопастный; одна или три нижнія лопасти нѣсколько крупнѣе остальныхъ; 5 тычинокъ прикрѣплены почти у основанія вѣничика, 3 верхнія нити мохнатыя, короче остальныхъ, или же всѣ нити мохнатыя; пыльники одногнѣздные, вскрываются цѣлью; плодъ — коробочка яйцевидная или шаровидная, вскрывается двумя створками, цѣльными или 2-раздѣльными. Растенія съ очередными, рѣже съ супротивными листьями.

1. Цвѣты фіолетовыя.

V. phoeniceum L.

Цвѣты желтыя. 2.

2. Тычиночныя нити съ фіолетовой шерстью. 3.

Тычиночныя нити съ бѣлой или желтоватой шерстью. 4.

3. Верхніе листья слегка изогбающіе, нижніе — сужены въ черешокъ; цвѣтоножки очень короткія, никогда не длиннѣе чашечки.

V. collinum Schrad.

Верхніе листья не изогбающіе, нижніе—б. ч. съ сердцевиднымъ или округлымъ основаніемъ; цвѣтоножки часто въ два раза длиннѣе чашечки.

V. nigrum L.

4. Всѣ 5 тычинокъ бѣло-шерстистыя.

V. Lychnitis L.

Три тычинки шерстистыя, двѣ—голыя. 5.

5. Листья не изогбающіе или слегка изогбающіе не далѣе, какъ до половины междоузлій.

V. phlomoides L.

Листья изогбающіе по всему междоузлію до слѣдующаго листа. 6.

6. Цвѣты 13—23 мм. въ поперечникѣ; 2 голыя тычиночныя нити въ 4 раза длиннѣе пыльниковъ; рыльце головчатое.

V. Thapsus L.

Цвѣты 30—45 мм. въ поперечникѣ; 2 голыя тычиночныя нити не болѣе, какъ въ два раза длиннѣе пыльниковъ; рыльце длинно-булавовидное, часто почти линейное.

V. thapsiforme Schrad.

820. **V. Thápsus L.** Пет. Кр. II, стр. 75. — Бух. II, № 284. — F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 299. — Кауф. II, № 511. — Цин., № 1025. — Кауф. I, стр. 339. — Дв., № 232. — Макс., № 292. — Mart., p. 40. — Hoff., № 3413. — St. II, p. 19. — St. I, № 136. — Pal., № 379.

Verbascum Schraderi Mey. Ann., C. V, № 42.

Стебель 0,3—2 м., торчащий, простой, крылатый отъ низобъгающихъ листьевъ, густо покрытъ, какъ и послѣднiе, желтоватымъ войлокомъ изъ звѣздчатыхъ волосковъ; листья плоскіе, по краямъ мелко-городковые; корневые — удлинненно-эллиптическіе или продолговато-ланцетные, туповатые или заостренныя, сужены въ б. или м. длинный черешокъ; нижніе стеблевые — на короткихъ черешкахъ, низобъгающихъ узкими крыльями; средніе — сидячіе, продолговато-ланцетные, низобъгають до слѣдующаго листа болѣе широкими крыльями; верхніе — яйцевидно-ланцетные, длинно-заостренныя, тоже сидячіе; цвѣты пучками по 3—4 въ длинной колосообразной кисти, у основанiя часто прерванной; цвѣтоножки очень короткія, даже при плодахъ короче половины чашечки; послѣдняя съ ланцетными заостренными долями; вѣничекъ желтый, 13—23 мм. въ поперечникъ, съ нѣсколько приподнятыми долями, отчего кажется слегка блюдчатымъ, не болѣе какъ въ 2 раза длиннѣе чашечки; тычиночныя нити желтыя, три верхнія бѣло-шерстистыя, двѣ нижнія голыя, длиннѣе остальныхъ; пыльники голыхъ тычинокъ въ 4 раза короче нитей; рыльце головчатое.



Verbascum Thapsus.

По кустарникамъ, песчанымъ склонамъ и лѣснымъ полянамъ, часто. Цвѣтетъ съ начала iюля до середины августа.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. silvaticum Schultz.

Войлокъ на листьяхъ очень тонкій, сѣрый; листья мягкіе, тонкіе.

Тѣневая форма. Серебряный боръ близъ Хорошова (С.).

821. **V. thapsifórmе Schrad.** Пет. Кр. II, стр. 75. — Моск., № 24. — Пет., стр. 299. — Кауф. II, № 512. — Цин., № 1026. — Кауф. I, стр. 339. — Дв., № 233. — Макс., № 223. — Hoff. H., № 1628. — Gold. C., p. 18. — Gold. Sp., p. 122.


Стебель до 2 м., прямостоящий, простой, крылатый отъ низобъгающихъ листьевъ, покрытъ, какъ и послѣднiе, сѣрымъ или желтоватымъ войлокомъ изъ звѣздчатыхъ волосковъ; листья какъ у *V. Thapsus* L., но длинно-заостренныя, особенно верхніе, нижніе — иногда туповатые; цвѣты пучками (по 1—4) въ длинной колосообразной кисти, простой, рѣдко съ

1—2 вѣточками и часто у основанія прерванной; цвѣтоножки во время цвѣтенія нѣсколько короче чашечки, во время плодоношенія часто равны ей; вѣничекъ желтый, 30—45 мм. въ поперечникѣ, вполнѣ колесовидный; тычиночныя нити желтыя, 3 верхнія—болѣе короткія, густо бѣло-шерстистыя, остальные 2 голыя, съ длинными пыльниками, не болѣе какъ въ два раза короче нитей; рыльце длинно-булавовидное, иногда почти линейное.

По дугамъ, опушкамъ и берегамъ рѣкъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ начала іюля. Въ гербаріяхъ Геншинга и Гофмана.—Верея (Макс.).—Архангельское, Зви. у. (Х.).—Михайловское въ паркѣ, Пдл. у. (Мос.).—Близъ Серпухова (Вар.).—Демьяново, Кли. у. (П.).—Между Бочмановымъ и Протопоновымъ, Кзм. у., на известнякахъ (С.).



Verbascum thapsiforme.



Verbascum phlomoides.

822. *V. phlomoides* L. Пер. Кр. II, стр. 76.—Пет., стр. 299.—Кауф. II, № 513.—Цин., № 1027.—Рупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 339.—Дв., № 234.—Макс., № 224.—Mart., p. 41.—Pal., № 318.

Стебель до 1,5 м., прямостоящій, б. ч. простой, густо покрытъ, какъ и все растеніе, желтоватымъ войлокомъ изъ звѣздчатыхъ волосковъ; нижніе листья постепенно сужены въ черешокъ, широко-эллиптическіе, не изобѣгающіе; средніе и верхніе изобѣгаютъ очень мало, рѣдко до половины междоузлія, сидячіе, сердцевидно-стеблеобъемлющіе, вытянуты въ б. или м. длинный кончикъ; цвѣты по 2—4, образуютъ прерванную колосовидную кисть; цвѣтоножки короче чашечки; вѣничекъ желтый, 30—50 мм. въ поперечникѣ, колесовидный; три тычиночныя нити въ верхней части, бѣло-шерстистыя, остальные 2 голыя и длиннѣе; рыльце длинно-булавовидное, иногда почти линейное.

По песчанымъ холмамъ и склонамъ, очень рѣдко. Цвѣтетъ іюнь, іюль. Въ гербаріи Максимовича.

823. **V. Lychnitis L.** Пет. Кр. II, стр. 76. — F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 300. — Кауф. II, № 514. — Цин., № 1029. — Рупр., стр. 62 и 86. — Кауф. I, стр. 339. — Дв., № 235. — Макс., № 225. — Pal., № 382.

Стебель 0,5—1,5 м., прямостоящий, въ верхней части, какъ и вѣтви, тонко и остро ребристый, покрытъ тонкимъ бѣлымъ войлокомъ изъ звѣздчатыхъ волосковъ; нижніе листья овальные, продолговато-эллиптическіе или широко-ланцетные, туповатые или заостренные, суженные въ нѣсколько крылатый черешокъ; средніе—на очень короткихъ черешкахъ; верхніе—сидячіе, обратно-яйцевидные съ длинно-заостренной верхушкой; все неровно-городковые; верхняя сторона ихъ зеленая, слабо опушенная или голая, нижняя сѣрая отъ тонкаго войлока изъ звѣздчатыхъ волосковъ; соцветіе пирамидальное, сильно вѣтвистое; вѣтви пучками по 3—6 на цветоножкахъ, равныхъ или длиннѣе ея; послѣдняя, какъ и цветоножки, густо опушена; вѣнчикъ лимонно-желтый, 10—20 мм. въ поперечникѣ; все тычиночныя нити желтыя, бѣло-шерстистыя; пыльники почковидные, оранжевые; рыльце головчатое; коробочка овальная, вдвое длиннѣе чашечки.

По лугамъ, опушкамъ и близъ дорогъ, по сухимъ, песчанымъ и известняковымъ мѣстамъ, не часто. Цвѣтетъ съ конца іюня до середины августа. По береговой полосѣ р. Оки, какъ въ Срп., такъ и Км. уу.—Близъ устья р. Колочи, Мож. у. (В.).—Успенское, Зви. у. (Х.).



Verbascum Lychnitis.



Verbascum collinum.

× **V. collinum Schrad.** = *V. Thapso* × *nigrum* Schiede. Пет. Кр. II, стр. 76. — F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 299. — Кауф. II, № 517. — Цин., № 1032. — Рупр., стр. 88. — Кауф. I, стр. 340.

Стебель до 1,5 м., красновато-бурый, б. или м. густо войлочно-опушенный, слегка ребристый; листья сверху зеленые, слабо опушенные, снизу б. или м. густо сѣро-войлочные отъ звѣздчатыхъ волосковъ; нижніе — продолговато-эллиптическіе или широко-ланцетные, сужены въ черешокъ, тупо-городковые; средніе—ланцетные или широко-ланцетные.

мелко-городковые, суженнымъ основаніемъ сидячіе и, какъ верхніе, слегка изгибающіе; у верхнихъ—верхушка нѣсколько вытянута и заострена; соцветіе б. ч. простое, удлиненное, прерывчатое, рѣдко у основанія съ 1—2 вѣточками; цвѣты по 4—8 пучками; чашечка густо опушенная, на цвѣтоножкѣ очень короткой или равной чашечкѣ; вѣничикъ ярко-желтый, такой же, какъ у *V. nigrum* L., 15—25 мм. въ поперечникѣ; шерсть у тычинокъ фіолетовая.

По открытымъ холмамъ и по берегамъ рѣкъ, очень рѣдко. Цвѣтеть съ половины іюля до конца августа; плоды съ половины августа. Между Никольскимъ и Лизаветинымъ (К.).—Лѣсъ на берегу р. Пахры близъ д. Луковня, Илл. у. (Куль.).—Мож. у. (Ф. О.).—Простѣка въ лѣсу между ст. Удѣльной и д. Вилками, каменоломни на Москвѣ р. близъ Каменной Тяжины, Бри. у. (С.).—

824. *V. nigrum* L. Пет. Кр. II, стр. 75. — Бух. II, № 285. — Бух. I, № 271. — Ф. О., № 7, р. 102. — Пет., стр. 300. — Кауф. II, № 516. — Цип., № 1031. — Кауф. I, стр. 340. — Lind., р. 144. — Дв., № 236. — Макс., № 226. — Hoff. II., № 1618. — Gold. C, р. 18. — Mart., р. 41. — Hoff., № 3410. — St. II, р. 14. — St. I, № 137. — Pal., № 383.

Стебель 0.3—1.25 м., простой, рѣже вѣтвистый, б. ч. красно-бурый, слегка опушенный и вверху съ тонкими ребрышками; нижніе листья на длинныхъ черешкахъ, яйцевидные съ сердцевиднымъ основаніемъ; средніе—на болѣе короткихъ черешкахъ, широко-яйцевидные, съ основаніемъ менѣе глубоко сердцевиднымъ или даже округлымъ; верхніе—почти сидячіе, иногда съ основаніемъ слегка суженнымъ; всѣ листья неровно-и иногда двояко-городковые, съ верхней стороны темно-зеленые, голые или почти голые, съ нижней б. или м. густо бархатисто-пушистые; соцветіе простое или вѣтвистое; цвѣтоножки иногда до двухъ разъ длиннѣе чашечки; доли послѣдней ланцетныя, заостренныя; вѣничикъ ярко-желтый, 10—20 мм. въ поперечникѣ; всѣ 5 тычинокъ съ фіолетовой шерстью; рыльце маленькое, головчатое. *)



Verbascum nigrum.

Близъ рѣкъ, по холмамъ, откосамъ, кустарникамъ и близъ дорогъ, часто. Цвѣтеть съ середины іюня до конца августа.

*) А. Н. Тулова нашла между Малаховкой и Удѣльной М.-Ряз. ж. д. уродливую форму съ укороченнымъ вѣтвистымъ и очень густымъ соцветіемъ; вѣничикъ очень мелкій, зеленый ворончатый, снаружи густо опушенный; цвѣтоножки сильно удлиненныя; все растение 30 см.

Можно различить слѣдующія формы:

α. *genuinum* Koch.

Нижняя сторона листьевъ покрыта очень тонкимъ войлокомъ; очень часто.

β. *alopecúrus* Thuill.

Verbascum nigrum L. β. *thyrsoideum* Koch. Пет. Кр. II, стр. 75. — Кауф. II, стр. 349. —
Кауф. I, стр. 340.

Verbascum nigrum L. var. *lanatum* Schrad. Pinz., p. 16.

Нижняя сторона листьевъ покрыта очень густымъ войлокомъ, края б. ч. ясно двойко-городковые. Свиболово (К.). — Откосъ М. Яр. ж. д. близъ ст. Мамонтовка (С.). — Лужники по берегу Москвы р., Серебряный боръ близъ Хорошова; Ланково, Руз. у.; по лѣвому берегу р. Несты подъ Воскресенскомъ, Зви. у. (П.). — Красный Станъ, Руз. у. (Сюз.). — Близъ с. Зеленаго, Бри. у. (С.).

γ. *glabrátum* Sonder.

Листья съ обѣихъ сторонъ голые или почти голые. Лужники, по берегу р. Москвы (П.). — Пушкино (С.).

δ. *cordátum* Kauffm. Пет. Кр. II, стр. 75. — F. O., № 7, p. 102. — Кауф. II, стр. 349. —
Кауф. I, стр. 340.

Verbascum orietale MB. F. O., № 7, p. 102. — Кауф. II, № 515. — Гор., № 61. —
Цин., № 1030.

Вѣт. листья при основаніи сердцевидные, нижніе часто почти ланцетные, т.-е. на черешкѣ съ 2 маленькими боковыми пластинками; стебель почти на всемъ протяженіи угловатый; кисти при основаніи вѣтвистыя, всегда сжатые; листья сидятъ чаще, чѣмъ у типичной формы. Перерва (К.). — По берегу р. Протвы на Протвинскомъ хуторѣ, Мож. у. (Ф. О.). — Деревня Верея, Бри. у.; Новоіерусалимская ст. Винд. ж. д. (X.).

ε. *bracteátum* G. Mey.

Verbascum nigrum L. var. *cuspidatum* Wirtgen. Пет. Кр. II, стр. 75.

Верхніе листья вытянуты въ длинные кончики. Бѣлые Колодези, Кзм. у. (П.).

825. V. *phoeníceum* L. Пет. Кр. II, стр. 76.

Стебель 30—100 см., б. ч. простой, покрытъ железистыми волосками; корневые листья яйцевидно-округлые или эллиптическіе, тупые, съ основаніемъ суженымъ въ черешокъ, рѣже округлымъ или слегка сердцевиднымъ; стеблевые — обыкновенно очень мелкіе, б. ч. сидячіе, стеблеобъемлющіе; вѣт. листья по краямъ двойко-городковые или иногда съ слабо волнисто-выемчатымъ краемъ, сверху голые, снизу б. или м. опушенные, иногда только по жилкамъ; цвѣточная кисть рѣдкоцвѣтковая; цвѣтоножки длинныя, много длиннѣе чашечки, послѣдняя съ продолговато-ланцетными долями; вѣшникъ 20—28 мм. въ поперечникѣ, фіолетово-

вый съ желтоватой трубкой; тычиночныя нити съ фіолетовой шерстью; столбикъ фіолетовый; рыльце зеленое.

Найдено только разъ у забора занесеннымъ. Б. Мытищи, въ цвѣту 20 іюня (С.).



Verbascum phoeniceum.



Scrophularia nodosa.

352. *Scrophularia* L.

Чашечка 5-надрѣзная съ широкими лопастями; вѣнчикъ съ вздутой трубкой, почти шаровидной и косымъ 5-лопастнымъ двугубымъ отгибомъ; верхняя губа 2-лопастная, нижняя 3-лопастная отогнутая; тычинокъ 4, изъ коихъ 2 длиннѣе двухъ другихъ; подъ верхней губой б. ч. стаминодій въ видѣ мясистой чешуйки; коробочка 2-створчатая, вскрывается по перегородкамъ; створки цѣльныя или у верхушки 2-надрѣзныя; листья супротивные.

1. Цвѣты въ пазушныхъ 7—9-цвѣтковыхъ полузонтикахъ; вѣнчикъ зелено-желтый, доли его почти одинаковыя; стаминодія нѣтъ.

S. vernalis L.

Цвѣты въ конечныхъ вѣтвистыхъ соцвѣтіяхъ; вѣнчикъ зелено-бурый, съ бурой верхней губой, которая крупнѣе нижней; стаминодій есть. 2.

2. Стебель крылато-4-гранный; листья просто- и остро-пильчатые; доли чашечки округлыя съ широкой перепончатой каймой.

S. alata Gilib.

Стебель остро-4-гранный, листья б. ч. двояко-зубчатые; доли чашечки округло-яйцевидныя съ узкой перепончатой каймой.

S. nodosa L.

826. ***S. nodosa* L.** Пет. Кр. II, стр. 77. — Бух. II, № 286. — Бух. I, № 272. — F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 274. — Кауф. II, № 519. — Цин., № 1045. — Pinz., p. 16. — Кауф. I, стр. 342. — Lind., p. 146. — Дв., № 613. — Макс., № 586. — Hoff. II., № 4678. — Gold. C., p. 21. — Mart., p. 109. — Hoff., № 2906. — St. II, p. 35. — St. I, № 428.

Корневище мясистое, клубневидное, дает побѣги; стебель 50—150 см., остро-4-гранный, простой или вѣтвистый, голый, часто бурый; листья продолговато-яйцевидные съ основаніемъ прямымъ или сердцевиднымъ, по краямъ б. ч. doubly-зубчатые, у основанія листа зубцы крупнѣе; нижніе листья на длинныхъ черешкахъ, туповатые; средніе—острые, на короткихъ черешкахъ; верхніе—почти сидячіе, все—голые, сверху темно-зеленые, снизу свѣтлѣе; цвѣты въ конечномъ вѣтвистомъ соцвѣтѣи, вѣтви котораго и нижняя половина цвѣтоножекъ покрыты железистыми волосками; доли чашечки округло-яйцевидныя, съ узкой перепончатой каймой; вѣнчикъ 7—10 мм., зеленовато-грязно-бурый съ темно-бурой верхней губой; стаминодій сверху цѣльный, часто вдавленный; тычиночныя нити бѣлыя, съ короткими железистыми волосками; коробочка яйцевидная, заостренная.

По канавамъ, по берегамъ рѣкъ и по сырымъ лѣсамъ, часто. Цвѣтеть съ начала іюня до середины августа, иногда во второй разъ въ сентябрѣ; плоды съ середины августа.

827. *S. alata* Gilib. Пет. Кр. II, стр. 77. — Ф. Б., № 60. — Ф. О., № 7, p. 102. — Пет., стр. 273. — Кауф. II, № 520. — Гор., № 25. — Цин., № 1044. — Рупр., стр. 88. — Кауф. I, стр. 342.

Scrophularia aquatica L. Дв., № 614. — Макс., № 587. — Hoff. II., № 4663. — Mart., p. 109. — Hoff., № 2902. — St. II, p. 35. — St. I, № 429. — Pal., № 1301.

Стебель 60—200 см., голый, примостоящій, б. ч. вѣтвистый, 4-гранный, по угламъ крылатый; листья голые, яйцевидные, широко-ланцетные или продолговатые, съ основаніемъ слегка сердцевиднымъ, округлымъ или быстро суженнымъ въ черешокъ, б. ч. заостренные, по краямъ ровно и остро-пильчатые; нижніе—черешковые, верхніе—почти сидячіе; цвѣты въ конечныхъ вѣтвистыхъ соцвѣтѣяхъ; цвѣтоножки въ нижней половинѣ покрыты железистыми волосками; доли чашечки почти округлыя, съ широкой перепончатой каймой; вѣнчикъ 5—8 мм. дл., желтовато-зеленый, съ красно-бурымъ отгибомъ и буроватой верхней губой; стаминодій 2-лопастный, съ расходящимися лопастями; коробочка округлая, коротко-заостренная.

По сырымъ мѣстамъ, опушкамъ, берегамъ рѣкъ и ручьевъ, рѣдко. Цвѣтеть съ начала іюня до середины августа. Въ гербаріяхъ Борхмана и Максимовича.—Близъ д. Борисовъ городокъ. Мож. у. (Бор.).—Тарбушево. Кѣм. у. (С. П. Ростовцевъ).—Берегъ р. Оки у д. Комарова. Кѣм. у. (П.).—Дубенка на р. Лопаснѣ, Срп. у. (П.).



Scrophularia alata.

828. *S. vernális* L. Пет. Кр. II, стр. 77. — Пет., стр. 273. — Кауф. II, стр. 352. — Цин., № 1043. — Кауф. I, стр. 343. — Дв., № 615. — Макс., № 588. — Макс. Пут. II, стр. 14. — Gold. C., p. 21.

Стебель 30—60 см., простой, 4-гранный, покрыт мягкими отстоящими волосками; в верхней части железистыми; листья супротивные или по три,



Scrophularia vernalis.

широко-сердцевидные, заостренные, крупно- и doubly-зубчатые, ярко-зеленые, сверху голые, с нижней стороны по жилкам мягко-волосистые; цветы по 7—9 в пазушных полузонтиках; цветоносы железисто-пушистые; цветоножки короче чашечки; доли последней продолговато-овальные, туповатые без перепончатой каймы; вичник зеленовато-желтый; трубка его кувшинчатая, под зевом сильно стянутая; лопасти почти одинаковые; тычинки под конец выдаются из вичника; стаминодия нет; коробочка яйцевидная, заостренная.

По опушкам, очень редко. Цветет в мае; плоды в июне. Кусково, занесено (Гольдб.). — В роще близ д. Городище на р. Коломенск, Кзм. у. (Макс.).

353. *Linaria* Adans.

Чашечка глубоко-5-раздельная; вичник 2-губый, с б. или м. длинной трубкой, с передней стороны у основания с шпорой; верхняя губа 2-лопастная; нижняя — 3-лопастная и у основания с большой выемкой, которая б. ч. закрывает зев; тычинок 4, две из них длиннее остальных; гнезда пыльников разобщены; коробочка с двумя почти равными гнездами, вскрывающимися двумя створками или близ верхушки дырочками; створки 2—5-зубчатые; семена дискообразные или блюдчатые, б. ч. окаймленные.

1. Все растение густо покрыто железистыми волосками.

L. minor Desf.

Все растение голое, только цветоножки и иногда ветви соцветия железисты. 2.

2. Цветы желтые.

L. vulgaris Mill.

Цветы лиловые. 3.

3. Вичник мелкий, 6—9 мм. дл. (вместе с шпорой); цветы в длинных многоцветковых кистях.

L. canadensis Dumont.

Вичник крупный, до 2,5 см. (вместе с шпорой); цветы в коротких малоцветковых кистях. *L. bipartita* Willd.

829. *L. vulgaris* Mill. Пет. Кр. II, стр. 78. — Бух. II, № 287. — Бух. I, № 273. — F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 214. — Кауф. II, № 522. — Цин., № 1035. — Кауф. I, стр. 343. — Lind., p. 144. — Ann., C. V, № 43. — Макс., № 585. — Hoff. II, № 4646. — Gold. C., p. 21. — Mart., p. 109.

Antirrhinum Linaria L. Дв., № 612. — Макс., № 585. — Mart., p. 109. — Hoff., № 257. — St. II, p. 35. — St. I, № 427. — Pal., № 1294.

Растение многолетнее съ длинными подземными побѣгами; стебель 30—80 см., прямостоящій, простой или въ верхней части вѣтвистый, голый, только вѣтви соцветія и цвѣтоножки железисты; листья очередные, ланцетные, линейно-ланцетные или почти линейные, сидячіе, заостренные, съ цѣльнымъ слегка завернутыми краями, съ срединной жилкой, сверху давленной и 2 боковыми; цвѣты въ конечной густой кисти; цвѣтоножки нѣсколько длиннѣе чашечки, зубцы которой ланцетные, острые, о 3 жилкахъ; вѣнчикъ*) 20—34 мм. дл. (вмѣстѣ съ шпорой), свѣтло-желтый, съ оранжевой выпуклиной, заслоняющей зѣву; шпора нѣсколько согнутая, почти равна остальной части вѣнчика; коробочка эллипсоидальная, вдвое длиннѣе чашечки; сѣмена плоскія съ широкимъ перепончатымъ ободкомъ, въ среднѣ бугорчато-шереховаты.



Linaria vulgaris.

По сухимъ и открытымъ холмамъ, канavamъ и полямъ, очень часто какъ сорное. Цвѣтетъ съ середины іюня до конца августа; плоды съ начала августа.

830. *L. minor* (L.) Desf. Пет. Кр. II, стр. 78. — Пет., стр. 214. — Кауф. II, № 521. — Гор., № 26. — Цин., № 1041. — Рупр., стр. 88. — Кауф. I, стр. 343. — Макс., № 584. — Hoff. II, № 4624. — Gold. C., p. 21. — Mart., p. 109. — Hoff., № 261.

Antirrhinum minor L. Дв., № 611. — Макс., № 584. — Mart., p. 109. — Hoff., № 261. — St. II, p. 35. — St. I, № 426.

Растение однолетнее; стебель 10—30 см., прямостоящій, б. ч. отъ основанія вѣтвистый, покрытъ, какъ и все растение, железистыми волосками; листья продолговато-ланцетные, верхніе—почти линейные, б. ч. туповатые, сужены въ короткій черешокъ; нижніе—супротивные, остальные—очередные; цвѣты мелкіе въ пазухахъ листьевъ; цвѣтоножки въ 3—4 раза длиннѣе чашечки, доли которой продолговато-линейныя, туповатыя; вѣнчикъ 4—8 мм. дл. (вмѣстѣ съ шпорой), свѣтло-лиловый съ блѣдно-желтой выпуклиной, не заслоняющей зѣва; шпора вдвое короче вѣнчика; коробочка яйцевидная, на верхушкѣ съ выемкой, железисто-

*) Встрѣчается иногда съ правильнымъ 5-надрѣзнымъ вѣнчикомъ (*Peloria*).

опушенная; съмена продолговатая безъ перепончатого ободка, съ продольными бороздками.

По известнякамъ и пескамъ, по берегамъ рѣкъ, въ огородахъ и по старымъ стѣнамъ, не часто. Цвѣтетъ съ іюня до поздней осени. Въ гербаріи Генинга и Максимовича. На Кремлевской стѣнѣ въ Александровскомъ саду (Рупр.).—Въ Кремлѣ у пушкѣ; берегъ Москвы р. у Заозерья и известняки у Каменной Тяжины, Бри. у. (С.).—Между Серпуховымъ и Дракинымъ (Г.).—Лузки, Сри. у. (Гей.).—По берегу р. Оки близъ Каропчеева, Бочманова, Протопопова, Кзм. у.; Перерва (П.).—Выково по путямъ Каз. ж. д., Бри. у. (Куль.).



Linaria minor.



Linaria canadensis.

831. *L. canadensis* (L.) Dumont. Пет. Кр. II, стр. 78.—Ф. Б., № 3.

Однолѣтнее или двулѣтнее голое растеніе; цвѣтущіе стебли до 60 см., прямостоящіе или восходящіе, очень тонкіе, простые или вѣтвистые съ разставленными очередными листьями; не цвѣтущіе побѣги распростерты на землѣ или лежачіе, съ листьями частыми, обыкновенно супротивными или по три; листья линейные или линейно-продолговатые, цѣльнокрайніе, сидячіе, узкіе; цвѣты мелкіе въ тонкихъ и длинныхъ кистяхъ, на короткихъ железистыхъ цвѣтоножкахъ, прямоторчащихъ или прижатыхъ, съ очень мелкими прицвѣтниками; доли чашечки линейно-ланцетныя острыя, длиною съ коробочку; вѣничекъ 6—9 мм. дл. (вмѣстѣ съ шпорою), лиловый, съ отогнутой нижней губой; зѣвъ бѣлый, немного выпуклый; шпора нитевидная, согнутая, такой же длины или длиннѣе остальной части вѣничка; коробочка скрывается наверху 2 створками о 3 зубцахъ каждая; съмена угловатая безъ каймы

Цвѣтетъ съ начала іюля до конца августа; заносное. Окраина большого торфяного болота, такъ наз. Краснаго, за Б. Мытищами, въ большомъ числѣ. (П.). Городской питомникъ за Б. Мытищами, какъ сорное. (С.).

832. *L. bipartita* (Vent.) Willd. Пет. Кр. II, стр. 78.—Сюз., стр. 6.

Растение однолетнее; стебель 10—30 см., голый, простой или съ маленькими вѣточками въ пазухахъ листьевъ; послѣднѣ узко-ланцетные, почти линейные, супротивные; цвѣты въ конечной малоцвѣтковой кисти; цвѣтоножки много длиннѣ чашечки и, какъ послѣдняя, покрыты рѣдкими железистыми волосками; доли чашечки узко-ланцетныя, почти линейныя, заостренныя; вѣничекъ крупный до 25 мм. дл. съ шпорой, синеватый съ оранжевымъ звѣтомъ, съ верхней губой глубоко двураздѣльной и съ длинной, тонкой, согнутой шпорой, равной остальному вѣничку.

Цвѣтеть съ начала юля, весь августъ; заносное. Подъ Клементьевымъ по дугамъ р. Исконы, Руз. у., обильно (Сюз.)



Linaria bipartita.



Mimulus luteus.

354. *Mimulus* L.

Чашечка трубчатая, гранистая, 5-зубчатая; вѣничекъ 2-губый, съ длинной трубкой; верхняя губа 2-лопастная, нижняя—3-лопастная; 4 тычинки прикрѣплены у основанія трубки вѣничка, изъ нихъ двѣ длиннѣ двухъ другихъ; гнѣзда пыльниковъ разобщены или сблизились только кончиками; рыльце 2-лопастное; коробочка вскрывается по гнѣздамъ простыми створками, рѣже послѣднія на верхушкѣ расщепленныя.

833. *M. luteus* L. Пет. Кр. II, стр. 80. — Пет., стр. 224. — Кауф. II, стр. 354. — Гор., № 62.

Стебель 15—35 см., б. ч. простой, 4-гранный, очень ломкій, голый, какъ и все растение; листья супротивные, округлые или округло-яйцевидные, нижнѣе—на черешкахъ, верхнѣе—полустебельнообъемлющѣ, переходя въ прицвѣтные листья, все—выемчато-мелко-зубчатые или двояко-зубчатые; цвѣты одиночные, пазушные, на длинныхъ цвѣтоножкахъ; чашечка съ яйцевидно-заостренными зубцами; вѣничекъ крупный, желтый

съ мелкими буровато-красными крапинками въ зѣвъ и у основанія нижней губы; сѣмена очень мелкія.

Цвѣтетъ въ іюнѣ и въ іюлѣ; заносное. Близъ г. Воскресенска подъ самымъ монастыремъ на берегу р. Нстры и на берегу той же рѣки противъ д. Ивановской. Зви. у. (Ш.). — Въ 5—6 верстахъ отъ Воскресенска близъ д. Макенмовки (А. Д. Анитова). — На песчаномъ берегу р. Москвы близъ д. Барвихи. Зви. у. (Е. Денггинъ). — Въ 2 верстахъ отъ Нового Иерусалима по Клинской дорогѣ въ лѣсу (Куль.). — По обоимъ берегамъ Москвы р. между Заозерьемъ и д. Колодецъ, Бри. у. (П. и С.).

355. *Gratiola* L.

Чашечка 5-раздѣльная: вѣнчикъ неясно 2-губый, съ длинной трубкой: верхняя губа выемчатая, нижняя—3-лопастная; 2 верхнія тычинки съ развитыми пыльниками на короткихъ нитяхъ, прикрѣплены къ срединѣ трубки, 2 другія почти безъ пыльниковъ (стаминодій) на длинныхъ нитяхъ, прикрѣпленныхъ почти у основанія трубки; иногда между верхними тычинками бываетъ еще стаминодій въ видѣ чешуйки; гнѣзда пыльниковъ параллельныя, разобщенныя; рыльце 2-лопастное; коробочка вскрывается вдоль перегородокъ 2 створками, на верхушкѣ б. ч. расщепленными на 2 зубца.

834. *G. officinális* L. Пет. Кр. II, стр. 30. — Пет., стр. 197. — Кауф. II, № 523. — Цин., № 1048. — Рупр., стр. 86. — Кауф. I, стр. 344. — Borg., p. 700. — Дв., № 27. — Макс., № 30. — Gold. C., p. 17. — Mart., p. 7. — Hoff., № 1512. — Ad., p. 12 et 13. — St. II, p. 4. — St. I, № 19. — Pal., № 42.

Корневище ползучее, членистое; стебли 15—50 см., приподнимающіеся, прямостоящіе, простые или слегка вѣтвистые, въ верхней части 4-гранные, голые, какъ и все растение; листья супротивные, слегка стеблеобъемлющіе, нижніе—яйцевидно-ланцетные, б. ч. о 5 продольныхъ жилкахъ, остальные—ланцетные или даже линейно-ланцетные, о 3 жилкахъ, всѣ—только въ верхней половинѣ зубчатые, основаніе цѣльнокрайнее; цвѣты одиночные, пазушные, на длинныхъ тонкихъ цвѣтоножкахъ, близъ чашечки съ двумя линейно-ланцетными заостренными прицвѣтниками; доли чашечки линейно-ланцетныя, заостренныя; вѣнчикъ 15—20 мм. дл., бѣлый или розоватый, съ угловатой желтой трубкой; зѣвъ внутри опушенный; коробочка короче чашечки; сѣмена сѣтчатая.



Gratiola officinalis.

По песчанымъ берегамъ рѣкъ и по сырмь мѣстамъ около воды, очень рѣдко. Цвѣтетъ въ іюнѣ и въ іюлѣ. Въ гербаріяхъ Борхмана и Макенмовича, въ послѣднемъ—изъ подъ Серпухова съ берега р. Оки. — По сырмь мѣстамъ на Окѣ близъ воды. Сри. у. (Ш.).

356. *Limosella* L.

Чашечка колокольчатая, 5-зубчатая; вѣничек почти правильный, 5-надрѣзной съ короткой трубкой; тычинокъ 4; пыльники одногыздые, прикрѣплены къ нити попережъ; коробочка только внизу 2-гыздная, вскрывается по перегородкѣ или не вскрывается.

835. *L. aquática* L. Пет. Кр. II, стр. 87. — Бух. II, № 296. — Ф. Б., № 62. — Ф. О., № 7, р. 102. — Пет., стр. 213. — Кауф. II, № 540. — Цин., № 1049. — Кауф. I, стр. 354. — Lind., р. 146. — Ann., С. III, № 242. — Дв., № 618. — Макс., № 590. — Hoff. II., № 4756. — Gold. C., р. 21. — Mart., р. 110. — St. II, р. 36. — St. I, № 430.

Очень маленькое растение въ 3—5 см., состоящее изъ густой розетки листьевъ съ пазушными ползучими и укореняющимися побѣгами; листья нѣсколько мясистые, овальные или продолговато-ланцетные, туповатые, очень маленькіе, на очень длинныхъ черешкахъ; цвѣты одиночные, пазушные, на цвѣтоножкахъ много короче листьевъ; чашечка почти вдвое короче вѣничка и коробочки; доли ея яйцевидныя, заостренныя; вѣничекъ бѣлый или розоватый, 2—2,5 мм. дл., съ долями продолговатыми, туповатыми; трубка его зеленоватая; пыльники чернобурые; коробочка яйцевидная (рис. 1).

По берегамъ рѣкъ, по канавамъ и по лужамъ. Цвѣтетъ съ іюня до поздней осени. Петровское - Разумовское (А.). — Близъ Коломенскаго (Гольдб. герб.). — Раменки; Невѣрово, Км. у. (К.). — Между Куцновымъ и Крылатскимъ (Г.). — Берегъ Клязьмы близъ Черкизова; берегъ р. Оки между Лужками и Зибровымъ, Срп. у.; берегъ Москвы р. близъ Заозерья, Бри. у. (С.). — Между Братовишной и Алешковымъ (П.). — Ольгино, Алексѣевка, Артемки, Юдишка, Мож. у. (Ф. Б.). — Бѣлосоецкая слобода, Срп. у. (Х.). — Бочманово, Вѣлье Колодези, Км. у. (П.).

Кромѣ общераспространенной формы еще:

а. *tenuifolia* Lej.

Limosella aquatica L. *tenuifolia* Hoffm. Пет. Кр. II, стр. 87. — Кауф. II, стр. 364. — Кауф. I, стр. 354. — Mart., р. 110.

Листья линейные, пластинка не шире черешка; цвѣтоножки часто равны листьямъ (рис. 2).

б. *diandra* (Krock.) Mart. Пет. Кр. II, стр. 87. — Кауф. II, стр. 364. — Кауф. I, стр. 354. — Mart., р. 110.

Цвѣты только съ двумя тычинками.



Limosella aquatica.

357. *Digitális L.*

Чашечка 5-раздѣльная; вѣничекъ вздуто-колокольчатый, трубка его наклонена, у основанія сужена, отгибъ очень короткій, неясно-двугубый; верхняя губа очень короткая, слегка выемчатая, нижняя — 3-лопастная съ болѣе широкой средней лопастью; 4 тычинки вверхъ изогнутыя, изъ нихъ 2 длиннѣе остальныхъ; пыльники 2-гнѣздные, верхніе кончики гнѣздъ сраслись; рыльце 2-лопастное; коробочка вскрывается по перегородкѣ двумя простыми створками.

836. *D. ambigua Murr.*

Digitalis grandiflora Lam. Пер. Кр. II, стр. 76.—Ф. В., № 59.—Пер., стр. 178.—Кауф. II, № 518.—Цин., № 1050.—Кауф. I, стр. 341.

Digitalis ochroleuca Jacq. Borg., p. 700.—Дв., № 616.—Макс., № 589.

Стебель прямостоящій, до 1 м., простой, рѣже съ маленькими вѣточками, покрытъ длинными мягкими волосками, на верхушкѣ железистыми, вмѣстѣ съ прицвѣтниками, чашечками



Digitalis ambigua.

и коробочками, отчего клейкій; листья овально-ланцетные, ланцетные или продолговато-ланцетные, б. ч. заостренные, неравно- или двояко-зубчатые, съ верхней стороны голые или почти голые, съ нижней—съ сильно выступающими жилками и по жилкамъ густо опушенные; нижніе — переходятъ въ широкій черешокъ, средніе—сидячіе, верхніе — стеблеобъемлющіе; цвѣты въ однобокой многоцвѣтковой кисти; прицвѣтники ланцетные не превышаютъ чашечки или длиннѣе ея; доли послѣдней ланцетныя, заостренные, часто отвороченныя; вѣничекъ 25 — 45 мм. дл., желтый, внутри съ красновато-бурой сѣтчатой и пятнистой росписью, снаружи железисто-пушистый; коробочка яйцевидная съ 2 глубокими и 2 слабыми бороздками.

По тѣнистымъ мѣстамъ и затененнымъ паркамъ, занесенное, рѣдко. Цвѣтетъ съ іюля. Воробьевы горы (Бор.). — Въ паркѣ при с. Тесовѣ, Мож. у. (Мос.). —

358. *Veronica L.*

Чашечка 4—5 раздѣльная; вѣничекъ съ очень короткой трубкой, колокольчатый, слегка неправильный, 4-раздѣльный, верхняя его доля нѣсколько шире боковыхъ, нижняя—уже; тычинокъ 2, далеко выдающихся изъ вѣничка; гнѣзда пыльниковъ почти параллельныя, разобщенныя, рѣже сраслись верхушками; рыльце головчатое; коробочка б. ч. сплюснутая перпендикулярно перегородкѣ, вскрывается вдоль гнѣздъ 2 створками.

Обзоръ рода *Veronica*.*I. Chamaedrys Koch.*

Кисти б. ч. пазушныя; всѣ листья супротивные; вѣшникъ съ очень короткой трубкой.

V. scutellata, *V. Anagallis-aquatica*, *V. Beccabunga*, *V. chamaedrys*,
V. officinalis, *V. prostrata*, *V. Teucrium*, *V. austriaca*.

II. Pseudolysimachium Koch.

Листья супротивные или мутовками, верхніе—иногда очередные; трубка вѣшника длиннѣ своей ширины или нѣсколько короче зѣва и чашечки.

V. spuria, *V. longifolia*, *V. spicata*, *V. incana*.

III. Veroniástrum Koch.

Прицвѣтные листья, особенно верхніе, переходятъ въ прицвѣтники; цвѣты въ конечныхъ кистяхъ.

V. gentianoides, *V. serpyllifolia*, *V. arvensis*, *V. verna*, *V. triphyllus*.

IV. Alsinoídes Koch.

Всѣ цвѣты въ пазухахъ листьевъ; верхушечные листья походить на стеблевые, только нѣсколько мельче; плодоножки дугообразно отогнутыя.

V. opaca, *V. agrestis*.

Опредѣлитель видовъ.

1. Цвѣты одиночные въ пазухахъ листьевъ, не отличающихся отъ стеблевыхъ. 2.

Цвѣты въ густыхъ конечныхъ или пазушныхъ кистяхъ, или же въ пазухахъ прицвѣтныхъ листьевъ, отличающихся отъ стеблевыхъ, образуютъ рѣдкоцвѣтковую конечную кисть. 3.

2. Коробочка густо покрыта короткими волосками и болѣе длинными железистыми; остающійся столбикъ равенъ выемкѣ плода или нѣсколько выступаетъ изъ нея; листья темно-зеленые.

V. opaca Fries.

Коробочка слабо опушенная и по краямъ съ болѣе длинными железистыми волосками; остающійся столбикъ короче выемки плода; листья желто-зеленые.

V. agrestis L.

3. Стебли и иногда вѣтви оканчиваются б. или м. густой кистью цвѣтовъ. 4.

Стебли и вѣтви оканчиваются листьями, цвѣты же въ б. или м. густыхъ кистяхъ на длинныхъ цвѣтоносахъ въ пазухахъ листьевъ. 12.

4. Стебли оканчиваются б. или м. густой кистью цвѣтовъ, иногда у основанія съ нѣсколькими боковыми цвѣточными вѣточками. 5.

Цвѣты въ пазухахъ б. или м. крупныхъ прицвѣтныхъ листьевъ образуютъ рѣдкоцвѣтковую верхушечную кисть. 9.

5. Прицвѣтники равны цвѣтоножкамъ или много короче ихъ. 6. Прицвѣтники длиннѣе цвѣтоножекъ. 7.
6. Нижніе стеблевые листья супротивные, почти цѣльнокрайніе или слабо-зубчатые. *V. gentianoides Vahl.*
Нижніе листья по 3—4 въ мутовкѣ, по краямъ крупно- и иногда двояко-зубчатые. *V. spuria L.*
7. Верхняя часть стебля цвѣтоножки, прицвѣтники и чашечки б. или м. густо покрыты отстоящими коротко-членистыми волосками и такими же железистыми, иногда замѣтными только на прицвѣтникахъ. *V. spicata L.*
Растеніе опушенное или голое, но отстоящихъ коротко-членистыхъ и железистыхъ волосковъ на цвѣтоножкахъ, чашечкахъ и прицвѣтникахъ нѣтъ. 8.
8. Все растеніе бѣлое отъ шерстистаго войлока или только стебель цвѣтоножки или чашечки б. или м. густо покрыты длинными шерстистыми волосками. *V. incana L.*
Все растеніе голое или слегка опушенное короткими и б. ч. прижатыми волосками, длинныхъ шерстистыхъ волосковъ ни на какой части растенія нѣтъ. *V. longifolia L.*
9. Листья цѣльнокрайніе или зубчатые. 10. Средніе листья глубоко 3—7-лопастные или пальчато-лопастные. 11.
10. Вѣтчикъ крупнѣе чашечки, блѣдно-лиловый или почти бѣлый съ лиловыми жилками; столбикъ длинный, почти равенъ коробочкѣ. *V. serpyllifolia L.*
Вѣтчикъ короче чашечки, голубой; столбикъ очень короткій, короче выемки коробочки. *V. arvensis L.*
11. Средніе листья пальчато-5-лопастные; цвѣтоножки длиннѣе чашечныхъ долей; плодоножки дугообразныя, длиннѣе прицвѣтныхъ листьевъ. *V. triphyllus L.*
Средніе листья 3—7-лопастные, но не пальчатые; цвѣтоножки короче чашечныхъ долей; плодоножки короче прицвѣтныхъ листьевъ. *V. verna L.*
12. Листья, иногда только нижніе, глубоко-надрѣзочно-зубчатые или перисто-раздѣльные. *V. austriaca L.*
Листья зубчатые или почти цѣльнокрайніе. 13.
13. Чашечка о 5 доляхъ, иногда одна доля очень маленькая. 14. Чашечка о 4 доляхъ. 15.
14. Стеблей много густымъ пучкомъ, частью лежащихъ, частью восходящихъ; верхушечные листья почти линейные; вѣтчикъ блѣдно-лиловый или розовато-лиловый; коробочка голая. *V. prostrata L.*
Стебель одинъ или ихъ немного, б. ч. прямостоящихъ; верхушечные листья яйцевидные или узко-яйцевидные, зубчатые; вѣтчикъ синій; коробочка опушенная. *V. Teucrium L.*

15. Листья по краямъ б. или м. явственно зубчатые, рѣдко почти цѣлюкрайніе, но тогда широко-яйцевидные. 16.

Листья узко-линейно-ланцетные или ланцетные, почти цѣлюкрайніе, съ рѣдкими едва замѣтными зубчиками.

V. scutellata L.

16. Стебель и листья б. или м. густо опушенные. 17.

Все растение голое, иногда только цветоножки съ стебельчатыми железками. 18.

17. Кисти только въ пазухѣ одного изъ супротивныхъ листьевъ; вѣничикъ голубовато-лиловый или лиловый, 5—7 мм.; коробочка железисто-опушенная.

V. officinalis L.

Кисти супротивныя въ пазухахъ листьевъ; вѣничикъ голубой, 9—12 мм.; коробочка просто опушенная.

V. chamaedrys L.

18. Средніе и верхніе листья сидячіе, часто стеблеобъемлющіе; стебель слабо 4-гранный.

V. Anagallis-aquatica L.

Вѣ листья сужены въ короткій черешокъ; стебель цилиндрическій.

V. Beccabunga L.

837. *V. scutellata* L. Пет. Кр. II, стр. 82.—Бух. II, № 291.—Бух. I, № 276.—Пет., стр. 301.—Кауф. II, № 528.—Цин., № 1063.—Кауф. I, стр. 348.—Lind., p. 146.—Ann., C. IV, № 34.—Дв., № 12.—Макс., № 16.—Hoff. H., № 142.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 6.—Ad., p. 9.—St. II, p. 4—St. I, № 15.

Veronica scutellata L. typica. F. O., № 7, p. 102.

Стебель 10—50 см., тонкій, гибкій, въ нижней части 4-гранный, стелющийся, укореняющийся или приподнимающийся; все растение голое; листья узко-линейно-ланцетные или ланцетные, длинно-заостренные, сидячіе, по краямъ съ рѣдкими очень мелкими зубчиками, иногда обращенными внизъ; зубчики такъ мелки, что листь кажется цѣлюкрайнимъ; кисти рѣдкоцвѣтковые въ пазухѣ одного изъ супротивныхъ листьевъ; цветоносы очень тонкіе, нитевидные; цветоножки много длиннѣе прицвѣтниковъ; 4 доли чашечки продолговатыя, заостренные, почти равныя; вѣничикъ 4—5 мм., голубоватый или свѣтло-лиловый съ лиловыми жилками, въ два раза крупнѣе чашечки; коробочка сильно сплюснутая, глубоко-выемчатая.

По болотистымъ мѣстамъ, канавамъ, берегамъ рѣкъ и ручьевъ, часто. Цвѣтетъ съ середины іюня до середины августа; плоды съ іюля.



Veronica scutellata.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

2. pilósa Vahl.

Veronica scutellata L. *parmularia* Poit. et Turp. Пет. Кр. II, стр. 82.—Mart., p. 6.

Veronica scutellata L. *pubescens* Среп. F. O., № 7, p. 102.

Все растение б. или м. густо опушенное или же только стебель. Встрѣчается должно быть очень рѣдко. Мож. у. (Ф. О.).—Успенское, Зви. у. (X.).

338. V. Anagállis-aquatica L.

Veronica Anagallis L. Бух. II, № 289.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 301.—Кауф.

II, № 529.—Цин., № 1055.—Кауф. I, стр. 349.—Lind., p. 146.—

Дв., № 13.—Макс., № 17.—Hoff. II., № 72.—Gold. C., p. 17.—

Mart., p. 5.—Hoff., № 3434.—Ad., p. 9.—St. II, p. 4.—St. I, № 14.

Стебель 30—80 см., голый, слабо 4-гранный, прямостоящий или у основанія горизонтальный, укореняющійся, простой или вѣтвистый.



Veronica Anagallis-aquatica.

голый, какъ и все растение; листья супротивные, сидячіе полустеблеобъемлющіе, продолговато- или линейно-ланцетные, заостренные, по краямъ мелко-зубчатые, рѣже почти цѣльно-крайніе, нижніе — иногда на очень короткихъ черешкахъ; кисти многоцвѣтковые, пазушные, б. ч. длиннѣ листьевъ; цвѣтоножки длиннѣ прицвѣтниковъ и чашечки; послѣдняя съ 4 ланцетными или продолговатыми острыми долями; вѣшчикъ 3—5 мм., голубовато-лиловый съ темными жилками; доли его яйцевидныя, тупыя; коробочка округлая или яйцевидно-округлая съ маленькой выемкой, равна чашечкѣ или длиннѣ ея. *)

По ручьямъ, канавамъ и берегамъ рѣкъ.

Цвѣтетъ съ начала іюня до конца августа.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

2. latifóla Schultz.

Листья широко-яйцевидные, или широко-овальные, слабо-зубчатые; все растение очень крупное. Герб. Гени.—По берегу рѣки Сѣтунн близъ Сукова (II. и X.).

3. anagallifórmis Boreau.

Цвѣтоножки, основаніе чашечки и иногда цвѣтоносы покрыты рѣдкими стебельчатыми железистыми волосками. Кузьминки, по

*) Форма коробочки и отношеніе ея длины къ длинѣ чашечки не такой стойкій признакъ, чтобы можно было на него указывать, какъ на отличительный между видами *V. Anagallis-aquatica* L. и *V. anagalloides* Guss., какъ это дѣлаютъ нѣкоторые флористы. По моимъ наблюденіямъ и, какъ говоритъ E. Pospichal, въ Fl. des Oesterreich. Küstenlandes II, p. 630 (1899), коробочка у *V. Anagallis-aquatica* L. бываетъ разной длины по отношенію къ чашечкѣ, особенно на пышныхъ экземплярахъ коробочка часто бываетъ длиннѣ чашечки.


болоту; по берегу р. Клизмы въ Павловскомъ посадѣ; Бѣлые Колодези, Бочманово, Кѣм. у. (П.).

γ. *terrestris* Schleich.

Растеніе очень мелкое, 10 — 15 см.; стебель б. ч. отъ самаго основанія вѣтвистый съ вѣточками, частью лежащими на землѣ; кисти б. ч. густыя, въ нѣсколько разъ длиннѣ листьевъ, вверхъ торчашія; цвѣтоножки б. ч. съ железистыми волосками. Наземная форма по берегамъ рѣкъ на пескѣ. Бочманово, Кѣм. у. (П.).— По берегу р. Оки, противъ Каширы, Срп. у. (П. и X.).

839. **V. Beccabunga** L. Бух. II, № 290.—Бух. I, № 275.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 301.—Кауф. II, № 530.—Цин., № 1056.—Кауф. I, стр. 349.—Lind., p. 146.—Дв., № 14.—Макс., № 18.—Hoff. H., № 78.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 5.—Ad., p. 8 et 9.—St. II, p. 4.—St. I, № 13.—Pal., № 35.

Стебель 30 — 60 см., съ горизонтальнымъ укореняющимся основаніемъ, приподнимающійся, почти цилиндрическій, б. ч. вѣтвистый, голый, какъ и все растеніе; листья супротивные, нѣсколько мясистые, овальные или продолговатые, б. ч. съ туповатой верхушкой, мелко- и неровнозубчатые, рѣже почти цѣльнокрайніе, вѣ— быстро сужены въ короткій черешокъ; кисти пазушныя длиннѣ листьевъ, многоцвѣтковые, съ нѣсколько разставленными цвѣтами; прицвѣтники б. ч. равны цвѣтоножкѣ или длиннѣ ея, особенно нижніе, рѣдко нѣ— сколько короче; чашечка съ 4 яйцевидноланцетными долями; вѣничикъ 4 — 9 мм., голубой съ синими жилками; коробочка округлая, на верхушкѣ съ очень маленькой выемкой, вздутая, равна чашечкѣ или короче ея.



Veronica Beccabunga.

По канавамъ, берегамъ рѣкъ, ручьевъ и по болотамъ. очень часто. Цвѣтетъ съ конца мая до середины августа.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. *tenerrima* Schmidt.

Во всѣхъ частяхъ болѣе мелкое растеніе; стебель 7—25 см., съ нижними вѣтвями частью лежащими на землѣ; цвѣтущія кисти частью только въ одной изъ пазухъ супротивныхъ листьевъ; цвѣтоножки б. ч. много длиннѣ прицвѣтниковъ. Наземная форма по берегамъ рѣкъ на пескѣ. Берегъ р. Оки близъ Лужковъ, Срп. у. (С.).

840. *V. chamaedrys* L.

Veronica Chamaedrys L. Бух. II, № 293. — Бух. I, № 278. — F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 301. — Кауф. II, № 532. — Цин., № 1061. — Кауф. I, стр. 350. — Lind., p. 146. — Дв., № 16. — Макс., № 20. — Hoff. H., № 85. — Gold. C., p. 17. — Mart., p. 6. — Ad., p. 9 et 10. — Lib. Tr., p. 146. — Hoff., № 3437. — St. II, p. 4. — St. I, № 17.

Корневище ползучее, вѣтвистое; стебли 10 — 30 см., приподнимающиеся и прямостоящие, простые или слегка вѣтвистые, съ двумя супротивными рядами густыхъ волосковъ; листья обратно-яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, опушенные, туповатые, по краямъ надрѣзано-городковые или зубчатые, слегка сердцевиднымъ основаніемъ почти сидячіе, нижніе—иногда на очень короткихъ черешкахъ; кисти пазушныя, длиннѣе листьевъ, по отцвѣтаніи сильно удлинняются; прицвѣтники линейно-ланцетные, нѣсколько короче цвѣтоножекъ, рѣже длиннѣе ихъ; 4 доли чашечки линейно-ланцетныя, опушенные, нѣсколько неравныя; вѣнчикъ довольно крупный, 9 — 12 мм., ярко-голубой, рѣдко розоватый или бѣлый, съ жилками; коробочка треугольно-обратно-сердцевидная, по краю рѣсниччатая, короче чашечки.

По лугамъ, кустарникамъ, опушкамъ и лѣсамъ, очень часто. Цвѣтеть съ половины мая до половины іюня, иногда во второй разъ въ августѣ; плоды съ половины іюля.

*Veronica chamaedrys.**Veronica officinalis.*

841. *V. officinális* L. Бух. II, № 292. — Бух. I, № 277. — F. O., № 7, p. 102. — Пет., стр. 301. — Кауф. II, № 531. — Цин., № 1061. — Кауф. I, стр. 349. — Lind., p. 146. — Ann., C. IV, № 33. — Дв., № 15. — Макс., № 19. — Hoff. H., № 123. — Gold. C., p. 17. — Mart., p. 5. — Hoff., № 3446. — Ad., p. 8. — St. II, p. 4. — St. I, № 11. — Pal., № 33.

Стебель 10—30 см., ползучій, укореняющійся, у основанія вѣтвистый, съ приподнимающейся верхушкой, б. или м. густо опушенный, какъ и все растение; листья супротивные, обратно-яйцевидные, эллиптическіе


болоту; по берегу р. Клязьмы въ Павловскомъ посадѣ; Бѣлые Колодези, Бочманово, Клм. у. (П.).

γ. *terrestris* Schleich.

Растеніе очень мелкое, 10—15 см.; стебель б. ч. отъ самаго основанія вѣтвистый съ вѣточками, частью лежащими на землѣ; кисти б. ч. густыя, въ нѣсколько разъ длиннѣ листьевъ, вверхъ торчащія; цвѣтоножки б. ч. съ железистыми волосками. Наземная форма по берегамъ рѣкъ на пескѣ. Бочманово, Клм. у. (П.).— По берегу р. Оки противъ Каширы, Срп. у. (П. и X.).

839. V. *Beccabunga* L. Бух. II, № 290.—Бух. I, № 275.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 301.—Кауф. II, № 530.—Цин., № 1056.—Кауф. I, стр. 349.—Lind., p. 146.—Дв., № 14.—Макс., № 18.—Hoff. II, № 78.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 5.—Ad., p. 8 et 9.—St. II, p. 4.—St. I, № 13.—Pal., № 35.

Стебель 30—60 см., съ горизонтальнымъ укореняющимся основаніемъ, приподнимающійся, почти цилиндрический, б. ч. вѣтвистый, голый, какъ и все растеніе; листья супротивные, нѣсколько мясистые, овальные или продолговатые, б. ч. съ туповатой верхушкой, мелко- и неровнозубчатые, рѣже почти цѣльнокрайніе, всѣ—быстро сужены въ короткій черешокъ; кисти пазушныя длиннѣ листьевъ, многоцвѣтковые, съ нѣсколько разставленными цвѣтами; прицвѣтники б. ч. равны цвѣтоножкѣ или длиннѣ ея, особенно нижніе, рѣдко нѣсколько короче; чашечка съ 4 яйцевидно-ланцетными долями; вѣнчикъ 4—9 мм., голубой съ синими жилками; коробочка округлая, на верхушкѣ съ очень маленькой выемкой, вздутая, равна чашечкѣ или короче ея.



Veronica Beccabunga.

По канавамъ, берегамъ рѣкъ, ручьевъ и по болотамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ конца мая до середины августа.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. *tenerrima* Schmidt.

Во всѣхъ частяхъ болѣе мелкое растеніе; стебель 7—25 см., съ нижними вѣтвями частью лежащими на землѣ; цвѣточные кисти частью только въ одной изъ пазухъ супротивныхъ листьевъ; цвѣтоножки б. ч. много длиннѣ прицвѣтниковъ. Наземная форма по берегамъ рѣкъ на пескѣ. Берегъ р. Оки близъ Лужковъ, Срп. у. (С.).

Корневище деревянистое; стебель 30—100 см., прямостоящий или основаніемъ приподнимающийся, простой, б. или м. густо покрытъ курчавыми



Veronica Teucrium.

волосками; листья супротивные, опушенные, яйцевидные или яйцевидно-продолговатые, съ округлымъ или сердцевиднымъ основаніемъ, б. ч. сидячіе, нижніе — туповатые, верхніе — слегка заостренные, все крупно- и просто- или двоякозубчатые, верхушка зубчиковъ тупая; цветошныя кисти (2—6) въ пазухахъ верхнихъ листьевъ на длинныхъ цветоносахъ, по мѣрѣ отцвѣтанія сильно удлиняются; прицвѣтники опушенные, линейно-ланцетные, равны цветоножкѣ или длиннѣе ея; чашечка о 5 неравныхъ доляхъ; вѣнчикъ крупный, 10—13 мм., синій, въ зѣвѣ опушенный; коробочка овально-обратно-сердцевидная съ небольшою острой выемкой, равна чашечкѣ или нѣсколько длиннѣе ея.

По кустарникамъ, опушкамъ, полянамъ и по холмамъ, не рѣдко. Цвѣтетъ съ начала іюня до конца іюля; плоды съ половины іюля.

У насъ пока только:

a. ssp. pseudochamaedrys (Jacq.) Nym. *)

Чашечка почти голая или слабо опушенная, какъ и коробочка.

a. major Schrad. Пет. Кр. II, стр. 83.

Veronica latifolia L. *a. major* Koch. Кауф. II, стр. 360.—Кауф. I, стр. 350.

Veronica latifolia Ait. *major* Schrad. Макс., № 22 а.

Листья съ основаніемъ сердцевиднымъ, стеблеобъемлющимъ (рис. 1).

b. minor Schrad. Пет. Кр. II, стр. 83.

Veronica latifolia L. *β. minor* Koch. Бух. II, № 294.—Бух. I, № 279.—Кауф. II, стр. 360.—Кауф. I, стр. 351.—Lind., p. 146.

Veronica latifolia Ait. *β. minor* Schrad. Макс., № 22 β.

Листья б. ч. продолговатые съ основаніемъ округлымъ (рис. 2).

844. V. austriaca L. Пет. Кр. II, стр. 83.—Пет., стр. 301.—Цин., № 1058.—Дв., № 20.—Макс., № 24.—Mart., p. 6.—Lon. G, p. 282.—Pal., № 38.

Veronica austriaca L. *β. pinnatifida* Koch. Кауф. II, стр. 361.—Кауф. I, стр. 351.

Стебли 20—50 см., простые или вѣтвистые, приподнимающиеся, покрыты курчавыми волосками; листья опушенные, яйцевидные или ланцетные, сужены въ короткій черешокъ, перисто-разрѣзные или подрѣзаннызубчатые, въ нижней части болѣе глубоко, а верхушка листа иногда

*) Опредѣляетъ В. Watzl.

только глубоко-зубчатая, зубцы туповатые; верхушечные листья часто узко-ланцетные, почти цельнокрайние; кисти такія же, какъ у *V. Teucrium* L., но узкія, не столь густыя; прицвѣтники опушенные, б. ч. равны цвѣтоножкамъ или длиннѣе ихъ; чашечка о 5 (4) неравныхъ доляхъ, ¹⁾ иногда одна доля такъ мала, что едва замѣтна; вѣнчикъ 8—10 мм., крупный, ярко-синій; коробочка обратно-сердцевидная, длиннѣе чашечки, слабо опушенная.

По лугамъ и окраинамъ болотъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ начала іюня. Горенки (Лондесъ).—Быково, болото близъ д. Верея, Брн. у. (Гей.).



Veronica austriaca.



Veronica austriaca ssp. *Jacquinii.*

Кромѣ предыдущей формы еще:

ssp. *Jacquinii* (Baumg.) Maly var. *bipinnatifida* Koch. ²⁾

Veronica multifida L. Пет. Кр. II, стр. 84.—Pal., № 38 β.

Veronica austriaca L. γ. *bipinnatifida* Koch. Кауф. II, стр. 361.—Кауф. I, стр. 351.

Veronica austriaca L. *foliis linearilanceolatis pinnato-dentatis.* Lon. G., p. 282.

Листья въ очертаніи яйцевидные, глубоко перисто-раздѣльные, съ линейными или ланцетными долями, б. ч. въ свою очередь надрѣзными или зубчатыми, съ линейными или ланцетными дольками, съ обѣихъ сторонъ коротко опушенные; кисти узкія; прицвѣтники б. ч. равны цвѣто-

¹⁾ Муріе флористы безъ оговорки относятъ этотъ видъ и *V. multifida* L. (= *V. austriaca* L. ssp. *Jacquinii* Maly) къ видамъ съ чашечкой 5-дольной, что не совсѣмъ вѣрно. Röhling, въ Deutschlands Flora I, p. 327, описываетъ *V. austriaca* L. съ 4-дольной чашечкой и только въ скобкахъ прибавляетъ, что у культурнаго растенія чашечка 5-дольная, да еще Schmidt, въ Flora Boemica I, p. 20 приводитъ у *V. dentata* (= γ. *austriaca* L.), чашечку 4-дольную. У *V. austriaca* L., найденной Гейденомъ въ Моск. губ., чашечка 5-дольная, но въ некоторыхъ цвѣтахъ одна доля чашечки такъ мала, что едва замѣтна, а у ssp. *Jacquinii* (Baumg.) Maly, найденной Кульковымъ близъ ст. Удѣльной, на одномъ и томъ же экземплярѣ можно было найти, какъ 4-, такъ и 5-дольную чашечку, а равно и чашечку съ пятою долею въ видѣ едва замѣтнаго зубчика, и только опять тотъ же Röhling на стр. 328 приводитъ для этого вида чашечку 4—5-дольную. Изъ вышеприведеннаго слѣдуетъ, что нельзя безъ оговорки приводить въ описаніи этихъ двухъ видовъ, а тѣмъ болѣе въ ключѣ, 5-дольную чашечку.

²⁾ Опредѣляя B. Watzl.

пожкѣ или длиннѣе ея: чашечка о 5 (4) доляхъ очень неравныхъ; вѣнчикъ 7—10 мм., ярко-синій.

По откосамъ и опушкамъ, очень рѣдко. Цвѣтетъ съ начала іюня. Горенки (Лондесъ). — По откосу М.-Ряз. ж. д., между ст. Удѣльная и ст. Малаховка, Брн. у. (Куль).

845. *V. gentianoides* Vahl. Sch. III, № 680. — Пет. Кр. II, стр. 86. — Сюз., стр. 6.

Стебель 30 — 60 см., прямостоящій, простой, покрытъ короткимъ пушкомъ, оканчивается длиннымъ не густымъ соцветіемъ; нижніе листья собраны какъ бы пучкомъ, обратно-яйцевидные или продолговатые, коротко-черешковые, тупые или слегка заостренные; нижніе стеблевые продолговато-ланцетные, почти сидячіе, супротивные; остальные мелкіе б. ч. очередные, ланцетные; всѣ б. ч. голые, нѣсколько мясистые и по краямъ тупо- и рѣдко-городковые, рѣже почти цѣльнокрайніе; цвѣтоножки въ 2—4 раза длиннѣе прицвѣтничковъ; чашечка железисто-пушистая; 4 доли ея продолговато-линейныя, туповатая; вѣнчикъ голубой съ широкими овальными слегка рѣсничатыми долями; коробочка округло-овальная, рѣсничатая, вздутая, наверху съ выемкой.

По кустарникамъ одичалое. Цвѣтетъ съ начала іюня.

Клементьево, Ряз. у., обильно (Сюз.).



Veronica gentianoides.



Veronica spuria.

846. *V. spuria* L. Пет. Кр. II, стр. 80. — Пет., стр. 302. — Кауф. II, № 524. — Цин., № 1051. — Рупр., стр. 86. — Кауф. I, стр. 346. — Дв., № 8. — Макс., № 11.

Veronica spuria L. β . *foliosa* W. et K. Макс., № 11 β .

Корневище горизонтальное; стебель 50—100 см., вверху вѣтвистый, рѣже простой, покрытъ очень короткимъ пушкомъ; листья по 3—4 (2) въ мутовкѣ, въ очертаніи очень разнообразны: то яйцевидно-продолговатые, то широко- или узко-ланцетные, съ основаніемъ то слегка сердцевиднымъ, то суженнымъ въ короткій черешокъ и съ верхушкой цѣльнокрайней, то туповатой, то острой, края же листьевъ крупно- и иногда двойко-зубчатые; цвѣты въ густыхъ кистяхъ, метельчато расположен-

ныхъ; прицвѣтники линейно-ланцетные, то равны опушенной цвѣтоножкѣ, то короче ея; цвѣтоножка чаще длиннѣе чашечки, но иногда бываетъ и короче ея; 4 доли чашечки овально-продолговатыя, б. ч. голыя, края ихъ постоянно голыя; вѣнчикъ голубой съ овально-продолговатыми слабо заостренными долями и съ трубкой, внутри почти голой; коробочка длиннѣе чашечки, слабо сплюснутая, вздутая, голая, съ не глубокой выемкой.

По пескамъ береговой полосы р. Оки и по олукамъ, рѣже по известнякамъ. Цвѣтетъ съ конца іюня до середины августа; плоды съ конца іюля. Лужки, Срп. у. (К.).—Зиброво, устье Лопасни, Срп. у. (Мил.).—Влизъ Борисова, Срп. у. (С.).—Серпуховъ (Сюз.).—Протопоново, Кзм. у. (П.).



Veronica longifolia.



Veronica longifolia γ, *maritima*.

847. **V. longifolia L.** Пер. Кр. II, стр. 81.—F. O., № 7, p. 102.—Пер., стр. 302.—Кауф. II, № 525.—Цин., № 1052.—Кауф. I, стр. 347.—Lind., p. 146.—Дв., № 9.—Hoff. II, № 118.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 5.—Ad., p. 6.—St. II, p. 4.—St. I, № 9.

Veronica longifolia Schrad. Маке., № 13.

Стебель 50—150 см., простой или вѣтвистый, покрытъ б. или м. густо, какъ и листья, короткимъ пушкомъ; листья супротивные, рѣже по 3—4 въ мутовкѣ, на черешкахъ, яйцевидно-ланцетные, ланцетные, рѣже линейно-ланцетные, сужены въ длинный, б. ч. вытянутый кончикъ, съ основаніемъ сердцевиднымъ, округлымъ или суженнымъ, по краямъ до самой верхушки остро-надрѣзочно-пильчатые или двояко-пильчатые; цвѣты въ густыхъ конечныхъ кистяхъ; прицвѣтники линейно-шиловидные или иногда почти нитевидные, длиннѣе цвѣтоножки и иногда длиннѣе чашечки; 4 доли чашечки заостренныя, опушенныя, часто по краямъ рѣсничатыя; цвѣтоножки опушенныя, б. ч. короче чашечки; вѣнчикъ 5—7 мм. дл., голубовато-лиловый, съ овальными долями и съ трубкой, внутри явственно опушенной; коробочка обратно-сердцевидная, голая.

По болотамъ, поросшимъ кустарникомъ, по канавамъ и лѣсамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ конца іюня до середины августа.

Можно различить слѣдующія формы:

- α. *glábra* Koch. Пет. Кр. II, стр. 81.—Кауф. II, стр. 357.—Кауф. I, стр. 347.

Листья съ обѣихъ сторонъ голые или почти голые. Мытищи болото близъ Лосиннаго острова (С.).—Вешняки (Х.).—Лужки. Срп. у (Сюз.).

- β. *pubescens* Kauffm. Пет. Кр. II, стр. 81.—Бух. II, № 288.—Бух. I, № 274.—Кауф. II, стр. 357.—Кауф. I, стр. 347.

Стебель и нижняя сторона листьевъ б. или м. густо опушены; листья яйцевидно-ланцетные или ланцетные, б. ч. съ сердцевиднымъ или округлымъ основаніемъ. Очень часто.

- γ. *marítima* L.

Veronica marítima Schrad. Дв., № 10.—Hoff. H., № 119.—Mart., p. 5.—Ad., p. 7.—St. II, p. 4.—St. I, № 8.—Pal., № 28.

Veronica media Schrad. Макс., № 12.

Veronica longifolia L. β. *pubescens*. Кауф. II, стр. 357.—Кауф. I, стр. 347.

Опушеніе какъ у β., но листья по 3—4 въ мутовкѣ, очень узкіе, линейно-ланцетные, съ округлымъ или клиновиднымъ основаніемъ. Лапково, Руз. у. (II.).

848. *V. spicáta* L. Пет. Кр. II, стр. 81. — Пет., стр. 302. — Кауф. II, № 526.—Цин., № 1053.—Pinz., p. 16. — Кауф. I, стр. 347. — Lind., p. 146.—Дв., № 7.—Макс., № 10.—Gold. C., p. 17. — Mart., p. 5.—Ad., p. 5 et 6.—Hoff. № 3452.—St. II, p. 4.—St. I, № 10.—Pal., № 30.

Veronica orchidea Crantz. Макс., № 14.

Стебель 15—50 см., прямостоящій или слегка приподнимающійся, простой или близъ верхушки съ нѣсколькими цвѣтущими вѣточками, б. ч. сѣровато-коротко-пушистый, къ верхушкѣ железисто-пушистый.



Veronica spicata.



Veronica spicata α. hybrida.

рѣже почти голый; листья супротивные, овальные, продолговатые или ланцетные, нижніе— б. или м. сужены въ длинный черешокъ; верхніе— почти сидячіе, мельче и острѣе нижнихъ; все покрыты тонкимъ сѣрымъ пушкомъ. рѣдко почти голые и по краямъ тупо-пильчатые, верхніе—почти

цѣлюкрайніе; цвѣты въ конечной густой кисти; прицвѣтники линейно-шиловидные; чашечка съ 4 эллиптическими или узко-овальными туповатыми долями, покрыта, какъ прицвѣтники, цвѣтоножки и цвѣтопосы оттопыренными коротко-членистыми и железистыми волосками; вѣнчикъ ярко-голубой, съ продолговатыми островатыми долями; коробочка округло-обратно-сердцевидная, покрыта короткими и рѣдкими железистыми волосками.

По холмамъ и берегамъ рѣкъ, не часто. Цвѣтеть съ половины іюня до половины августа. Воробьевы горы (Гени. и Мар.).—Денисьево, Зви. у. (Гольдб.).—Архангельское, Зви. у. (Мар.).—Звенигородъ (Макс.).—Близъ Гальева на Москвѣ р. (К.).—Усово, Барвиха, Зви. у. (П.).—Введенское, Зви. у. (П. и С.).—Успенское, Зви. у. (Гей.).

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. *hybrida* L.

Veronica spicata L. β. *hybrida* Krock. Макс., № 10 β.

Veronica hybrida L. Pal., № 31.

Veronica spicata L. γ. *latifolia* Koch. Цин., стр. 325.

Листья плотные, нижніе—яйцевидные или эллиптическіе съ сердцевиднымъ основаніемъ и тупой, часто почти округлой верхушкой, по краямъ иногда двояко-округло-городковые; все растеніе густо, но коротко опушенное. Подъ Саввинскимъ монастыремъ, Зви. у. (П.). Успенское, Зви. у. (X.).

β. *rosea* Mart. Mart., p. 5.

Съ розовыми цвѣтами.

849. **V. *incana* L.** Пет. Кр. II, стр. 82. — Пет., стр. 302. — Кауф. II, № 527.—Цин., № 1054.—Рупр., стр. 86. — Кауф. I, стр. 348.—Borg., p. 700.—Pal., № 29.

Стебель 15—60 см., простой или вверху близъ соцвѣтія вѣтвистый, густо бѣло-войлочный, какъ и все растеніе; нижніе листья широко-овальные или продолговатые, на длинныхъ черешкахъ; средніе—ланцетные, на болѣе короткихъ черешкахъ; верхніе—линейно-продолговатые, почти сидячіе; всѣ мелко-городковые, супротивные, рѣже верхніе очередные и иногда почти цѣлюкрайніе; цвѣты въ узкихъ, б. или м. густыхъ конечныхъ кистяхъ; прицвѣтники ланцетные; чашечка съ 4 ланцетными слегка заостренными долями, покрыта б. или м. густо, какъ и короткая цвѣтоножка бѣлымъ войлокомъ шерстистыхъ волосковъ безъ железистыхъ *); вѣнчикъ ярко-голубой съ продолговатыми долями; коробочка нѣсколько длиннѣе чашечки, округло-обратно-сердцевидная, опушенная или почти голая.

По холмамъ и опушкамъ на пескѣ, рѣдко.



Veronica incana.

*) Выдвинутое Кохомъ и А. Н. Петуниковымъ различіе между *V. incana* L. и *V. spicata* L., состоящее въ опушеніи чашечки, которое у *V. incana* L. представляетъ шер-

Цвѣтеть съ начала іюля до конца августа; плоды съ половины августа. Только по береговой полосѣ р. Оки, Срп. у. и Рождествено на р. Нарѣ. Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

Кромѣ общераспространенной формы еще:

а. *canescens* Schrad. Пет. Кр. II, стр. 82.—Кауф. II, стр. 357.—Кауф. I, стр. 348.

Veronica neglecta Vahl.

Листья по краямъ глубоко- и б. ч. остро-зубчатые, сверху иногда почти голые, снизу покрыты тонкимъ бѣлымъ войлокомъ, рѣже почти голые.

б. *fl. roseo*. Пет. Кр. II, стр. 82.

Съ розовыми цвѣтами.

γ. *fl. albo*. Пет. Кр. II, стр. 82.—Кауф. II, стр. 357.—Кауф. I, стр. 348.

Съ бѣлыми цвѣтами.

850. *V. serpyllifolia* L. Бух. II, № 295.—Бух. I, № 280.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 303.—Кауф. II, № 535.—Цин., № 1064.—Кауф. I, стр. 352.—Lind., p. 146.—Апп., С. II, № 145.—Дв., № 11.—Макс., № 15.—Hoff. II., № 143.—Mart., p. 5.—Ad., p. 8.—St. I, № 12.

Veronica serpyllifolia L. Gold., C., p. 17.—St. II, p. 4.—Pal., № 34.

Стебель лежачій, укореняющійся, часто вѣтвистый, съ приподнимающимися простыми цвѣтущими вѣточками въ 5 — 30 см., очень коротко опушенный; нижніе листья округлые или яйцевидные, переходить въ короткій черешокъ; средніе—яйцевидные, овальные или продолговатые, коротко-черешковые или сидячіе; верхніе — продолговато-ланцетные, постепенно переходить въ прицвѣтные; всѣ листья голые и б. или м. ясно зубчатые или нижніе цѣльнокрайніе; кисти конечныя, рѣдкоцвѣтковые; чашечка о 4 доляхъ, послѣдній продолговатая, неравная; вѣтчикъ блѣдно-лиловый или бѣлый съ лиловыми жилками, 4 — 6 мм., нѣсколько длиннѣе чашечки; коробочка широко-обратно-сердцевидная съ глубокой выемкой, покрыта железистыми волосками.

стистые тонкіе, гибкіе, не членистые или длинно-членистые волоски, а у *V. spicata* L.—коротко-членистые и болѣе толстые волоски и, по моимъ наблюденіямъ еще вперемѣшку съ железистыми, должно быть, принимая во вниманіе разновидность *V. incana* L. а. *canescens* Schrad., формулировано по сообщенію А. А. Хорошкова, слѣдующимъ образомъ:

„*Veronica incana* L. Опушеніе завязи, чашечки, цвѣтоножекъ, прицвѣтничковъ, листьевъ и стебля состоитъ изъ шероховатыхъ, т. е. извилистыхъ, не членистыхъ или длинно-членистыхъ волосковъ; опушеніе это на всѣхъ указанныхъ частяхъ растенія или густое, какъ у типичной формы, или въ видѣ скупо разбѣянныхъ волосковъ на какой-либо части растенія, какъ у *V. incana* L. а. *canescens* Schrad. У этой разновидности, кромѣ длинныхъ волосковъ, еще другіе въ видѣ не длинныхъ отроговъ (зачатки типичныхъ волосковъ).

Veronica spicata L. Опушеніе соответственныхъ частей состоитъ изъ коротко-членистыхъ, б. или м. прямыхъ волосковъ, перемѣшанныхъ въ большомъ числѣ съ железистыми, иногда ясно замѣтными только на прицвѣтникахъ. Различіе же въ прицвѣтникахъ *V. incana* L. и *V. spicata* L., приводимое А. И. Петуниковымъ и Маевскимъ, не можетъ быть выдвигаемо, пбо нижніе прицвѣтники у *V. spicata* L. часто заходятъ за верхушку чашечки и форма ихъ линейная или линейно-ланцетная; верхніе же прицвѣтники часто тоже заходятъ за верхушку чашечки, но иногда только до половины ея, форма же ихъ частью линейно-ланцетная, частью линейная и частью шиловидная“.

По кустарникамъ, дугамъ и паровымъ полямъ, очень часто. Цвѣтеть съ мая до середины іюля; плоды съ конца іюня.

851. **V. arvensis L.** Пет. Кр. II, стр. 85. — Мос., № 21. — Ф. О., № 7, p. 102. — Пет., стр. 303. — Кауф. II, № 536. — Цин., № 1065. — Кауф. I, стр. 352. — Дв. № 22. — Макс., № 25. — Hoff. II., № 75. — Gold. C., p. 17. — Mart., p. 6. — Ad., p. 11. — Pal., № 39.

Растеніе однолѣтнее; стебель 5—30 см., прямостоящій, простой или вѣтвистый б. ч. только у основанія, и тогда съ приподнимающимися вѣтвями, покрытъ отстоящими волосками; нижніе листья на короткихъ черешкахъ, туповатые, овально-эллиптическіе, съ слегка сердцевиднымъ основаніемъ, остальные сидячіе, верхніе—ланцетные; всѣ по краямъ рѣсничатые, зубчатые, только прицвѣтные часто цѣльнокрайніе; кисти конечныя, сперва густыя, потомъ сильно удлиняются и долго продолжаютъ развивать цвѣты, такъ что у основанія кисти уже зрѣлые плоды, а верхушка еще въ цвѣтахъ; цвѣтоножки короткія, торчащія, много короче прицвѣтныхъ листьевъ; чашечка 4-дольная, съ рѣсничатыми, ланцетными туповатыми долями; вѣнчикъ голубой, короче чашечки; коробочка сплюснутая, широко-обратно-сердцевидная, по краямъ рѣсничатая, съ глубокой выемкой; остающійся столбикъ короче выемки.



Veronica serpyllifolia.



Veronica arvensis.

По песчанымъ и паровымъ полямъ, очень рѣдко. Цвѣтеть съ начала мая до середины іюля; плоды съ середины іюня. Вблизи Военнаго госпиталя и Аннинская роща (Мар.).—Университетскій садъ, Горенки (герб. Гольдб.).—Между Покровскимъ и Никольскимъ; Архангельское, Звн. у. (К.).—Серпуховъ (Макс.).—Куришково, Сри. у. (П.).—Кунавна, Мож. у. (Ф. О.). Михайловское близъ Лаптевой мельницы, Пдл. у. (Мос.).

852. **V. vérna L.** Мос., № 22. — Бух. II, стр. 31. — Ф. О., № 7, p. 102. — Пет., стр. 303. — Кауф. II, № 537. — Цин., № 1066. — Кауф. I, стр. 352. — Lind., p. 146. — Ann., C. III, № 241. — Дв., № 25. — Макс., № 29. — Hoff. II., № 158. — Gold. C., p. 17. — Mart., p. 7. — Ad., p. 12. — St. II, p. 4. — St. I, № 18. — Pal., № 40.

Veronica triphyllos L. Mart., p. 4.

Растеніе однолѣтнее; стебель 5—20 см., простой или вѣтвистый, съ прямоторчащими вѣточками, часто красноватый, б. или м. густо



Veronica verna.



Veronica triphyllos.

покрытъ, какъ и все растеніе, отстоящими мягкими железистыми волосками; нижніе листья на черешкахъ, эллиптическіе, слегка зубчатые; средніе—туловатые, ланцетные, грубо-надрѣзные съ 3—7 лопастями, изъ коихъ верхняя крупнѣе остальныхъ; верхушечные—линейные, цѣльно-крайніе; цвѣты очередные въ конечныхъ кистяхъ, сперва б. или м. густыхъ, потомъ сильно удлинняющихся; торчащая цвѣтопожка короче прицвѣтныхъ листьевъ; чашечка 4-дольная; доли неравныя, ланцетно-линейныя, рѣсничатая; вѣничикъ короче чашечки, темно-голубой или иногда вначалѣ розоватый; коробочка широко-обратно-сердцевидная съ глубокой выемкой, по краямъ железисто-рѣсничатая; остающійся столбикъ равенъ выемкѣ или едва длиннѣе ея.

По паровымъ полямъ и песчанымъ мѣстамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ начала мая до середины іюня; плоды съ середины мая.

853. *V. triphyllos* L. Пет. Кр. II, стр. 85. — Пет., стр. 303. — Кауф. II, № 538. — Ципл., № 1067. — Кауф. I, стр. 353. — Дв., № 24. — Макс., № 28.

Veronica hederaefolia L. Дв., № 23. — Макс., № 27.

Растеніе однолѣтнее; стебель 5—20 см., простой или съ основанія вѣтвистый, покрытъ короткими мягкими и железистыми волосками; листья нѣсколько мясистые; нижніе—на черешкахъ, яйцевидные, крупнозубчатые; средніе—сидячіе, пальчато-5-лопастные съ широкой обратно-яйцевидной срединною лопастью; верхніе прицвѣтные—менѣе глубоко 5-лопастные или только 3-лопастные; верхушечные цѣльнокрайніе; кисть рѣдкоцвѣтковая; вѣничикъ синій, 6—9 мм., короче чашечки; послѣдняя съ 4 продолговато-обратно-яйцевидными, нѣсколько неравными долями, цѣльнокрайними или рѣдко съ однимъ зубцомъ; доли короче торчащей или дугобразно отогнутой плодоножки; коробочка широко-обратно-сердцевидная, железистая.

По пустырямъ, дорогамъ и паровымъ полямъ, очень рѣдко. Цвѣтеть съ начала мая. Въ гербаріи Максимовича.

854. **V. opaca Fries.** Пет. Кр. II, стр. 86

Veronica agrestis L. v. *opaca* Fr. (sp.). Мил., № 7.

Растеніе однолѣтнее; стебли 5—30 см., лежаціе и приподнимающіеся, б. ч. съ основанія вѣтвистые, коротко-пушисто-мохнатые; листья темно-зеленые, опушенные, округло-яйцевидные, съ округлымъ или чаще почти сердцевиднымъ основаніемъ, на короткихъ черешкахъ, тупо-заостренные, по краймъ крупно-зубчатые; цвѣтоножки почти равны листьямъ; плодоножки отогнуты дугообразно; цвѣты пазушные; чашечка съ 4 туповатыми, продолговато-эллиптическими долями, при плодахъ расходящимися; вѣнчикъ голубой, крупнѣе чашечки; коробочка округло-обратно-сердцевидная, сжатая, съ широкой выемкой, густо покрыта короткими прижатыми волосками и болѣе длинными железистыми; остающійся столбикъ равенъ выемкѣ или нѣсколько выступаетъ изъ нея.

По полямъ, очень рѣдко. Цвѣтеть съ мая все лѣто. Паровое поле близъ Крылатскаго (Мил.).



Veronica opaca.



Veronica agrestis.

855. **V. agræstis L.** Пет. Кр. II, стр. 86.—Мос., № 23.—Ф. Б., № 61.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 302.—Кауф. II, № 539.—Гор., № 27.—Цин., № 1068.—Кауф. I, стр. 353.—Дв., № 21.—Макс., № 26.—Hoff. II., № 67.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 6.—Hoff., № 3432.—Ad., p. 10.—St. II, p. 4.

Растеніе однолѣтнее; стебли 5—30 см., лежаціе или приподнимающіеся, часто красноватые, съ основанія вѣтвистые, мохнато-опушенные; листья желто-зеленые, продолговато-яйцевидные, съ округлымъ или слабо сердцевиднымъ основаніемъ, на короткихъ черешкахъ, по краймъ крупно-зубчатые, рѣсничатые, опушенные; верхніе—не отличаются отъ остальныхъ; цвѣты пазушные; цвѣтоножки часто длиннѣе листьевъ; плодо-

ножки отогнуты дугою; чашечка о 4 продолговато-яйцевидныхъ тупыхъ доляхъ, б. ч. длиннѣе вѣнчика, свѣтло-голубого цвѣта, иногда съ бѣлой нижней долей, рѣже почти бѣлаго; коробочка округло-обратно-сердцевидная, съ глубокой выемкой, слабо опушена и по краямъ съ болѣе длинными железистыми волосками; остающійся столбикъ короче выемки.

По полямъ, очень рѣдко. Цвѣтетъ съ мая все лѣто. Въ гербаріи Гольдбаха.—Бутырки (Траутш.).—Богородское (М.).—Хотьково, Дмит. у. (Макс.).—Маронно, имѣніе Панина, Дмит. у. (Маевск.).—Бородино (В.).—Трепарево, Мордвиново, Ромашево, Мож. у. (Ф. Б.).—Буньково, Звени. у. (П.).—Остафьево, на огородѣ, Пдл. у. (Мос.).—Рождествено на р. Нарѣ. Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

359. *Odontites Pers.*

Чашечка трубчатая или колокольчатая, 4-зубчатая; вѣнчикъ ясно 2-губый съ длинной трубкой; верхняя губа шлемовидная, цѣльная, края ея не отворочены, нижняя—2-лопастная; 4 тычинки, изъ нихъ 2 длиннѣе остальныхъ; пыльники 2-гнѣзные, на верхушкѣ спутаны волосками; оба гнѣзда съ длинно-заостренными основаниями; рыльце головчатое; коробочка сплюснутая перпендикулярно перегородкѣ, вскрывается по гнѣздамъ двумя створками; сѣмена висцїя, продольно-ребристая.

856. *O. rubra Gilib.* Пет. Кр. II, стр. 97.—Пет., стр. 229.—Цин., № 1071.—Mart., p. 108.

Euphrasia Odontites L. F. O., № 7, p. 102.—Кауф. II, № 549.—Кауф. I, стр. 360.—Lind., p. 146.—Ann., C. II, № 146. — Дв., № 607.—Макс., № 580.—Hoff. II., № 4542. — Gold. C., p. 21. — Mart., p. 108.—Hoff., № 1350.—St. II, p. 35.—St. I, № 416.—Pal., № 1280.

Стебель 10—60 см., б. ч. почти съ основанія вѣтвистый, рѣже простой, шершавый отъ внизъ обращенныхъ прижатыхъ волосковъ; листья ланцетные или линейно-ланцетные, съ рѣдкими короткими зубчиками, покрыты короткими прижатыми волосками; цвѣты въ длинныхъ одностороннихъ колосовидныхъ кистяхъ, на верхушкѣ часто согнутыхъ; прицвѣтники у нижнихъ цвѣтовъ походятъ на листья, постепенно укорачиваются къ верхушкѣ кисти; чашечка 6—7 мм. дл., опушенная, съ зубцами треугольно-ланцетными, почти равными трубкѣ; вѣнчикъ грязно-розовый, снаружи опушенный, 8—12 мм. дл.; коробочка эллипсоидальная, равна чашечкѣ или нѣсколько длиннѣе ея.



Odontites rubra.

По лугамъ, паровымъ полямъ и посявамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ іюля до поздней осени.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. serotina Lam.

Euphrasia Odontites L. *α. serotina* Kauffm. Бух. II, № 304 *α.*—Бух. I, № 287 *α.*—Кауф. II, стр. 370.—Кауф. I, стр. 360.

Нижние прицветники длиннее цветков и б. ч. отогнуты вниз, верхние—короче цветков, растение б. ч. ветвистое; листья, особенно к концу цветения, вниз отогнутые. *)

360. *Euphrasia* L.

Чашечка колокольчатая, 4-раздельная; вничью ясно 2-губый с длинной спереди расширенной трубкой; верхняя губа шлемовидная, коротко-2-лопастная с отвороченными краями, нижняя—3-лопастная; 4 тычинки, из коих 2 длиннее остальных; пыльники 2-гребенные, попарно сближенные, иногда спутаны волосками; гребень с тонко-заостренным основанием, иногда нижняя гребень коротких тычинок заострены длиннее; рыльце головчатое, коробочка сплюснутая перпендикулярно перегородке, вскрывается вдоль гребня двумя створками; семена многочисленны, продольно-ребристы.

1. Верхние листья, прилистники и чашечки с железистыми волосками. 2.

Верхние листья, прилистники и чашечки голые или опушенные, но без железистых волосков. 6.

2. Железистые волоски стебельчатые, ножка их длинная многоклеточная. 3.

Железистые волоски на очень короткой двухклеточной ножке. 4.

3. Растения б. ч. ветвисты с нижней половины стебля; стеблевые листья с острыми зубцами; цветет с начала июля до глубокой осени.

E. Rostkoviana Hayne.

Растения б. ч. с простым стеблем и удлиненными междоузлиями, очень редко в верхней части с немногочисленными маленькими веточками; стеблевые листья с тупыми или округлыми зубцами; цветет с начала июня до начала июля.

E. montana Jordan.

*) Встречающаяся у нас форма *O. rubra* Gilib. большею частью походит на *α. serotina* Lam. и некоторые особи можно вполне признать за таковую, но она попадает вперемешку с особями, которые несколько отличаются от типичной, и некоторые признаки приближают их к *O. verna* Bell.—А. И. Петуников совершенно прав, говоря в Крит. Обз. Моск. Флоры, II, стр. 99, что у нас эти два вида еще недостаточно обособились; тоже подтверждает Д. И. Литвинов в примечании к Schedae ad Herbarium Florae Rossicae, IV, № 1176. Хотя я привожу *O. rubra* Gilib. *α. serotina* Lam., исходя из того, что некоторые особи походят на эту разновидность, но правильнее, пока этот род не разработан монографически, удержать за ним только видовое название *O. rubra* Gilib.

4. Железистых волосковъ очень мало между короткими бѣлыми шиловатыми волосками, образующими густое опушеніе.

E. Murbekii Wettst.

Железистыхъ волосковъ много, особенно вдоль жилкоѣ и по краямъ. 5.

5. Стебель б. ч. вѣтвистый, рѣже простой; средніе стеблевые листья съ острыми зубцами. *E. brevipila Burnat et Gremli.*

Стебель б. ч. простой, рѣже только вверху съ короткими вѣточками, во время цвѣтенія внизу безлистный, съ вытянутыми междоузліями; стеблевые листья съ туповатыми зубцами, прицвѣтники съ острыми и короткими. *E. tenuis Brenner.*

6. Листья и прицвѣтники голые или почти голые. 7.

Листья и прицвѣтники б. или м. густо покрыты короткими шиловатыми волосками. 8.

7. Средніе и верхніе листья о 4—7 острыхъ, но не остистыхъ зубцахъ; вѣничикъ мелкій (4—6 мм. дл.); зрѣлая коробочка равна чашечкѣ или нѣсколько длиннѣе ея.

E. curta Fries a. glabrescens Wettst.

Средніе и верхніе листья о 3—5 остистыхъ зубцахъ; вѣничикъ крупный (6—10 мм. дл.); зрѣлая коробочка б. ч. короче чашечки.

E. stricta Host.

8. Вѣничикъ мелкій (4—6 мм. дл.); стебель б. ч. сильно вѣтвистый; листья сѣрые и остро-шершавые отъ густыхъ бѣлыхъ и очень короткихъ шиловатыхъ волосковъ.

E. curta Fries.

Вѣничикъ крупный (6—10 мм. дл.); стебель простой или слабо-вѣтвистый; листья, хотя и покрыты волосками, но не столь густо, а потому зеленые. 9.

9. Средніе и верхніе листья съ острыми или длинно-заостренными зубцами, но не остистыми; нижняя губа съ нижней стороны б. или м. густо покрыта волосками, часто рѣсничатая.

E. tatarica Fisch.

Средніе и верхніе листья съ остистыми зубцами; нижняя губа съ нижней стороны голая или опушено только ея основаніе; лопасти же голыя.

E. Reuteri Wettst.

857. *E. tatárica Fisch.* Пет. Кр. II, стр. 96 и 97.

Стебель 5—30 см., б. ч. простой, рѣже въ нижней части вѣтвистый, красноватый или бурый, покрытъ курчавыми внизъ обращенными волосками; нижніе листья клиновидные или обратно-линейвидные, туповатые съ 1—3 туповатыми зубцами; средніе и верхніе — овальные, острые, съ 1—7 заостренными зубцами; прицвѣтники овальные, въ нижней части всего шире, у основанія округлые или только самые верхніе клиновидные, о 4—7 длинно-заостренныхъ зубцахъ, нижніе — оттопыренные, верхніе — дугообразно отклоненные; всѣ листья и прицвѣтники зеленые,

α. serotina Lam.

Euphrasia Odontites L. *α. serotina* Kauffm. Вых. II, № 304 *α.*—Вых. I, № 287 *α.*—Кауф. II, стр. 370.—Кауф. I, стр. 360.

Нижние прицветники длиннее цветков и б. ч. отогнуты вниз, верхние—короче цветков, растение б. ч. ветвистое; листья, особенно к концу цветения, вниз отогнутые. *)

360. *Euphrasia*. L.

Чашечка колокольчатая, 4-раздельная; ввинчикъ ясно 2-губый съ длинной спереди расширенной трубкой; верхняя губа шлемовидная, коротко-2-лопастная съ отвороченными краями, нижняя — 3-лопастная; 4 тычинки. изъ коихъ 2 длиннее остальных; пыльники 2-гнѣздные, попарно-сближенные, иногда спутаны волосками; гнѣзда съ тонко-заостреннымъ основаніемъ, иногда нижняя гнѣзда короткихъ тычинокъ заострены длиннее; рыльце головчатое; коробочка сплюснутая перпендикулярно перегородкѣ, вскрывается вдоль гнѣздъ двумя створками; сѣмена многочисленныя, продольно-ребристыя.

1. Верхние листья, прилистники и чашечки съ железистыми волосками. 2.

Верхние листья, прилистники и чашечки голые или опушенные, но безъ железистыхъ волосковъ. 6.

2. Железистые волоски стебельчатые, ножка ихъ длинная многокѣлочная. 3.

Железистые волоски на очень короткой двукѣлочной ножкѣ. 4.

3. Растенія б. ч. ветвистыя съ нижней половины стебля; стеблевые листья съ острыми зубцами; цвѣтеть съ начала іюля до глубокой осени.

E. Rostkoviana Hayne.

Растеніе б. ч. съ простымъ стеблемъ и удлинненными междоузліями, очень рѣдко въ верхней части съ немногочисленными маленькими вѣточками; стеблевые листья съ тупыми или округлыми зубцами; цвѣтеть съ начала іюня до начала іюля.

E. montana Jordan.

*) Встрѣчающаяся у насъ форма *O. rubra* Gilib. большею частью походить на *α. serotina* Lam. и нѣкоторые особи можно вполне признать за таковую, но она попадаетъ въперемѣшку съ особями, которыя нѣсколько отличаются отъ типичной, и нѣкоторые признаки приближаютъ ихъ къ *O. verba* Bell.—А. И. Петуниновъ совершенно правъ, говоря въ Крит. Обз. Моск. Флоры, II, стр. 99, что у насъ эти два вида еще недостаточно обособились; то же подтверждаетъ Д. И. Литвиновъ въ примѣчаніи къ Schedae ad Herbarium Florae Rossicae, IV, № 1176. Хотя я привожу *O. rubra* Gilib. *α. serotina* Lam., исходя изъ того, что нѣкоторые особи походятъ на эту разновидность, но правильнѣе, пока этотъ родъ не разработанъ монографически, удержать за нихъ только видовое названіе *O. rubra* Gilib.

× *E. Reúteri* Wettst. = *E. stricta* × *curta*.

Отличается от *E. stricta*—более короткими зубцами на листьях, б. или м. густо покрытых короткими бѣлыми шиповатыми волосками. От *E. curta*—более крупнымъ вѣшникомъ, длинными остистыми зубцами на листьяхъ и стеблемъ слабо вѣтвистымъ или простымъ. *)

По лугамъ, оврагамъ и опушкамъ. Цвѣтетъ съ половины юля всю осень. Вблизи с. Озерецкаго и близь озера Перскаго, на лугу (П. и С.).— По известняковому берегу р. Мѣчи близь Татарскаго-Сакино, Пдл. у. (Х.).— Лапково, Руз. у.; Протопоново, Калм. у. (П.).



Euphrasia Reuteri.



Euphrasia brevifolia.

859. *E. brevifolia* Burnat et Gremli. Пер. Кр. II, стр. 94 и 97.

Стебель 5—35 см., б. ч. съ половины или нѣсколько ниже половины вѣтвистый, рѣже простой, красноватый, покрытъ курчавыми внизъ обращенными волосками; нижнiе стеблевые листья туповатые, съ 1—3 туповатыми зубцами; среднiе и верхнiе—овальные или овально-ланцетные, о 3—5 зубцахъ, очень острыхъ, почти остистыхъ; листья, прилистники и чашечки покрыты, кромѣ короткихъ простыхъ волосковъ, особенно вдоль жилокъ и по краямъ, короткими железистыми волосками б. ч. на двухлѣточной ножкѣ; прицвѣтники нѣсколько шире листьевъ, о 4—7 остистыхъ или длинно-заостренныхъ зубцахъ; вѣшникъ 6—10 мм. дл., свѣтло-лиловый или голубоватый, на основанiи нижней губы съ желтыми пятнами и темными жилками; трубка его послѣ опыленiя не удлиняется; коробочка клиновидно-обратно-йцевидная, сверху усѣченная или слабо-выемчатая, равна чашечкѣ или нѣсколько длиннѣе ея, по краю рѣсничатая, по бокамъ опушенная или голая.

По лугамъ и кустарникамъ, часто. Цвѣтетъ съ половины юня до сентября.

*) Можно наблюдать особи, то приближающiяся къ *E. curta*, то къ *E. stricta*.

860. *E. tenuis* Brenner. Пет. Кр. II, стр. 95 и 97.—Sch. II, № 279.

Стебель 5—30 см., б. ч. простой съ длинными вытянутыми междоузлиями, рѣже въ верхней половинѣ слегка вѣтвистый, зеленый или красноватый, покрытъ курчавыми вѣнзъ обращенными волосками; во время цвѣтенія нижніе листья б. ч. уже засохшіе, остальные — туповатые, съ 1—3 тупыми зубцами, рѣже зубцовъ 3—5; прицвѣтники шире листьевъ, съ 3—6 острыми зубцами; опушеніе листьевъ, прилистниковъ и чашечекъ такое же, какъ у *E. brevipila*; цвѣты крупные, особенно первые, собраны въ головку; окраска вѣнчика и коробочка такая же, какъ у *E. brevipila*.

По заливному лугамъ. Цвѣтетъ съ половины мая до конца іюня.

По сырому лугу р. Клизмы близъ Звягина, заливные луга р. Яузы близъ Б. Мытницъ на лугу у ручья между Братовицкой и Спасской, Дмт. у.; близъ Лантинки и близъ Мѣшкова, Зви. у. (С.).—Близъ д. Медвѣдково, Дмт. у.; близъ Денисьева, Зви. у. (X).—Заливной лугъ у Звенигорода: сырой лугъ близъ Бирева, Кш. у. (II. и С.).—Воскресенскъ по берегу р. Пстры, Зви. у.; Матвѣйцово, Руз. у. (II.).



Euphrasia tenuis.



Euphrasia curta.

861. *E. curta* Fries.

Стебель 5—20 см., толстый, б. ч. почти съ основанія вѣтвистый, рѣже простой или съ вѣтвями въ верхней половинѣ, красноватый или буро-красный, покрытъ бѣлыми курчавыми вѣнзъ обращенными волосками; нижніе листья съ 1—3 туповатыми зубцами, средніе и верхніе—овальные съ широкимъ основаніемъ и съ 4—7 острыми или длиннозаостренными зубцами, но не переходящими въ остъ; прицвѣтники шире листьевъ, отклоненные или дугобразно-отклоненные; зубцы ихъ длиннозаостренные, иногда коротко-остистые; листья, прилистники и чашечки б. или м. густо покрыты короткими бѣлыми шишковатыми волосками, отчего остро-шершавые; соцветіе по мѣрѣ отцвѣтанія вытягивается, но на верхушкѣ цвѣты сидятъ очень сближенно; вѣнчикъ 4—6 мм. дл.,

бѣлый или бѣдно-лиловый; нижняя губа съ темно-лиловыми жилками и часто съ желтымъ пятномъ; коробочка клиновидно-обратно-яйцевидная, зрѣлая равна чашечкѣ или нѣсколько длиннѣе ея, по бокамъ опушенная или голая, усѣченная или слабо выемчатая и по верхнему краю съ длинными рѣсничками.

По пастбищамъ и лугамъ. Цвѣтетъ съ половины юля всю осень.

Кромѣ типичной формы у насъ чаще еще:

2. *glabrescens* Wettst.

Листья, прилистники и чашечки почти голые. По р. Македоновкѣ близъ ст. Удѣльная, М.-Ряз. ж. д., Бри. у. (П.).—По берегу р. Сѣтунь близъ Иѣмчинова (П. и С.).—Михнево. Бри. у.; Дарьино. Звн. у. (X.).—Рождествено на р. Парѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

3. *E. Murbéckii* Wettst. = *E. curta* × *brevipila*.

Отличается отъ *E. brevipila* густымъ опушеніемъ короткими бѣлыми шиповатыми волосками, отчего остро-шершавое, и очень рѣдкими железистыми волосками; отъ *E. curta*—приеутствіемъ железистыхъ волосковъ. Найдено между *E. curta* близъ ст. Удѣльная, М.-Ряз. ж. д., Бри. у. по берегу р. Македоновки и въ Протопоповѣ, Кзм. у., по склону оврага противъ церкви (П.).—На лугу, близъ озера Перскаго (П. и С.).



Euphrasia Murbéckii.



Euphrasia Rostkoviana.

862. ***E. Rostkoviána* Hayne.** Пет. Кр. II, стр. 94 и 96.—Sch. II, № 330. — Бух. II, № 302.

Euphrasia officinalis L. Пет., стр. 187. — Кауф. II, № 548. — Цин., 1072. — Кауф. I, стр. 359. — Lind., p. 146 — Ann., C. I, № 38. — Дв., № 606. — Макс., № 579. — Hoff. H., № 4543. — Gold. C., p. 21. — Mart., p. 107. — Hoff., № 1351. — St. II, p. 35. — St. I, № 415. — Pal., № 1279.

Euphrasia officinalis L. α. *pratensis* Koch. Бух. I, № 286 α. — F. O., № 7, p. 102. — Кауф. II, стр. 369. — Кауф. I, стр. 360.

Стебель прямостоящій, 10—50 см., б. ч. вѣтвистый, рѣже простой. Листья курчавыми волосками, въ верхней части вперемѣшку съ длин-

ными многоклеточными железистыми волосками такъ же, какъ листья, прицвѣтники и чашечки: нижніе листья съ туповатыми зубцами, средніе и верхніе съ (3—6) острыми, но не остистыми зубцами; прицвѣтники походятъ на листья, но б. ч. нѣсколько шире и съ зубцами болѣе узкими, но тоже не остистыми; вѣнчикъ бѣлый или лиловатый, у основанія нижней губы съ желтыми пятнами и темно-лиловыми жилками, съ трубкой до опыленія 9—11 мм., послѣ опыленія удлинняющейся до 11—14 мм., измѣряя по снѣнкѣ: коробочка эллипсоидальная, съ слабой выемкой, равная чашечкѣ или нѣсколько длиннѣе ея, по верхнему краю длиннорѣсничатая, по бокамъ коротко опушенная. *)

По полянамъ, кустарникамъ и болотистымъ мѣстамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до осени.

863. *E. montana* Jordan. Сыр. Отч. II, стр. 18.

Стебель 15—25 см., тонкій, съ очень длинными междоузліями, б. ч. простой, рѣдко въ верхней части съ немногими короткими вѣточками, покрытъ курчавыми волосками, къ верхушкѣ впередѣшкѣ съ длинными железистыми, какъ у *E. Rostkoviana*; стеблевые листья овально-клиновидные, тупые съ тупыми, часто округлыми зубцами; верхніе и прицвѣтные листья съ острыми зубцами; опушеніе длинными железистыми волосками не густое, менѣе густо, чѣмъ у *E. Rostkoviana*; цвѣты сперва въ густыхъ головкахъ, потомъ соцвѣтіе удлинняется и становится прерывчатымъ; вѣнчикъ 9—11 мм. дл., по опыленіи 11—14 мм. дл., бѣлый или слегка лиловатый съ желтымъ пятномъ и лиловыми жилками на нижней губѣ; коробочка эллиптическая или продолговато-эллиптическая, съ длинными рѣсничками по краю.



Euphrasia montana.

По сыростатымъ лугамъ. Цвѣтетъ съ начала іюня до первыхъ чиселъ іюля; плоды съ іюля. Сырой лугъ по берегу р. Ликовки противъ Мѣшкова и по лугу ручья между р. Ступнюю и Передѣлками. Звн. у. (С.).

*) Нѣкоторыя встрѣчающіяся у насъ формы не совсѣмъ точно подходятъ къ *E. Rostkoviana*, а равно къ *E. brevipila* и *E. curta* и занимаютъ какъ бы промежуточное мѣсто между вышеупомянутыми осенними формами и соответствующими весенними. Впервые на это указалъ В. Н. Хитрово въ своей статьѣ: „Къ систематикѣ нѣкоторыхъ видовъ рода *Euphrasia*“, помѣщенной въ Труд. Бот. Муз. Имп. Ак. Наукъ, вып. III, и имъ же въ *Schedae ad Herb. Fl. Ross.*, Fasc. V, № 1578. Эти формы, кромѣ биологическаго признака—времени цвѣтенія, которое по наблюденіямъ В. Н. Хитрово приходится приблизительно въ промежутокъ между отцвѣтаніемъ весеннихъ и зацвѣтаніемъ осеннихъ, имѣютъ еще нѣкоторые морфологическіе признаки, на основаніи которыхъ онѣ занимаютъ среднее мѣсто между вышеупомянутыми крайними формами; эти признаки по указанію В. Н. Хитрово слѣдующіе: число безцвѣтковыхъ узловъ на стеблѣ, наклонности къ вѣтвленію, предѣльное количество узловъ и длина междоузлій. В. Н. Хитрово предлагаетъ наименовать эти среднія формы: *E. praerostkoviana*, *E. praebrevipila* и *E. praecurta*; послѣдній видъ описать имъ въ Гербаріи Русской Флоры за № 1578.

361. *Alectorólophus* All.

Чашечка несколько вздутая, съ боковъ сплюснутая, 4-зубчатая, при плодахъ несколько разрастается и вздувается; вѣнчикъ 2-губый съ цилиндрической трубкой; верхняя губа шлемовидная, съ боковъ сплюснутая, нижняя—коротко-3-лопастная; 4-тычинки, изъ коихъ 2 длиннѣе остальныхъ; пыльники волосистые, сближены попарно, съ обособленными, не заостренными гифадами; рыльце головчатое; коробочка сплюснутая, округлая, вскрывается вдоль гифадъ 2 створками; сѣмена дискообразныя, б. ч. окаймленные.

1. Трубка вѣнчика несколько согнутая; нижняя губа прижата къ верхней. *A. major* Rchb.

Трубка вѣнчика прямая; нижняя губа несколько отогнутая. 2.

2. Трубка вѣнчика ко времени опыленія удлинняется; темно-фіолетовые зубчики на верхней губѣ до 1 мм. дл.

A. fallax Sterneck.

Трубка вѣнчика не удлинняется ко времени опыленія; зубчики на верхней губѣ очень мелкіе, фіолетовые или бѣлые.

A. minor Wimm. et Grab.

864. *A. májor* (Ehrh.) Rchb. Sch. V, № 1529 в.—Пет. Кр. II, стр. 92.

Alectorolophus Crista Galli MB. Макс., № 573.

Rhinanthus Crista galli L. F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 258.—Кауф. II, № 547.—Цин., № 1073.—Pinz., p. 17.—Кауф. I, стр. 368.—Lind., p. 148.—Дв., № 598.—Hoff. H., № 4534.—Gold. C., p. 21.—Mart. p. 106.—Hoff., № 2684.—St. II, p. 35.—St. I, № 414.—Pal., № 1278.

Rhinanthus major Ehrh. Дв., № 598.

Rhinanthus Crista galli L. γ. vilosus Kauffm. Кауф. II, стр. 369.—Кауф. I, стр. 359.

Rhinanthus villosus Pers. Дв., № 600.—Макс., № 573.—Mart., p. 106.

Стебель 15—50 см., б. ч. съ мелкими продолговатыми черными полосками, голый или по угламъ съ короткими волосками, простой или вѣтвистый; боковыя вѣточки отходить подъ острымъ угломъ; стеблевые листья продолговатые или продолговато-ланцетные; нижніе — слегка яйцевидные, туповатые; верхніе—постепенно заостренные, иногда вытянутые въ кончикъ; все—голые, пылчатые, съ тупыми, б. ч. прижатыми зубчиками; прицвѣтники голые, нижніе—походятъ на листья, верхніе—желто-зеленые или почти блѣдно-желтые, треугольно-ромбическіе, часто вытянуты въ узкій кончикъ, по краямъ пылчатые, нижніе зубцы ихъ узко-треугольные, длинно-заостренные, къ верхушкѣ становятся короче; чашечка вздутая, голая, только по краю опушенная; вѣнчикъ желтый, до 2 см. дл., трубка его несколько согнутая.



Alectorolophus major.

ко времени опыленія удлинняется; нижняя губа короче верхней и

прижата къ ней: зубцы верхней губы фиолетовые, до 2 мм. дл., усеченно-конические.

По дугамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвѣтеть съ конца мая до половины юля, рѣдко позднѣе.

Распадается на слѣдующіе подвиды:

ssp. eumajor Sterneck.

Rhinanthus Crista galli L. β . major Kauffm. Бух. II, № 301 β .—Бух. I, № 285 β .—Кауф. II, стр. 368.—Кауф. I, стр. 359.

Сѣмена съ б. или м. широкимъ крылатымъ ободкомъ. Очень часто. **ssp. apterum Fries.**

Сѣмена безъ крылатого ободка. *)

Губино на р. Перекоей, Бри. у. (П.).—Болотистый кустарникъ вдоль р. Нары между Каменнымъ оврагомъ и Хлыновымъ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).



Alectorolophus minor.



Alectorolophus fallax.

865. A. minor (Ehrh.) Wimm. et Grab. Пет. Кр. II, стр. 92.

Rhinanthus Crista galli L. β . minor Ehrh. Макс., № 573 β .

Rhinanthus Crista galli L. α . minor Kauffm. Кауф. II, стр. 368.—Кауф. I, стр. 358.

Rhinanthus minor Ehrh. Дв., № 599.—Hoff. II, № 4535.—Gold. Sp., p. 130.—Mart. p. 106.

Стебель 7—50 см. б. ч. зеленый, съ слабымъ опушеніемъ по угламъ, простой или вѣтвистый; вѣтви отходятъ подъ острымъ угломъ; стеблевые листья много короче междоузлій, продолговато-ланцетные или линейно-

*) I. von Sterneck, въ Monographie der Gattung *Alectorolophus* (1901) p. 72 для ssp. *apterum* Fries еще приводитъ болѣе узкіе листья, чѣмъ у ssp. *eumajor* Sterneck, по у видѣнныхъ мною экземпляровъ изъ двухъ мѣстъ листья были различныя: у однихъ — действительно узкіе, а у другихъ — столь же широкіе, какъ у ssp. *eumajor*. Въ предварительной статьѣ своей, помѣщенной въ Oesterr. Bot. Zeischrift. (1895) № 1, Sterneck, хотя и приводитъ forma *apterum* Fries, но про листья умалчиваетъ, ограничиваясь только сѣменами, и E. Fries, въ Summa vegetabilium, p. 195, гдѣ онъ впервые описалъ эту форму, про листья не упоминаетъ.

ланцетные съ туповатыми прижатыми зубцами: прицветники голые, зеленые, треугольно-ромбические, заостренные въ короткій кончикъ, по краямъ зубчатые, съ нижними болѣе глубокими зубцами, тонко заостренными, но не переходящими въ остъ; чашечка голая, по краямъ шероховато-опушенная; вѣнчикъ до 1.5 см. дл., желтый, съ прямой не удлинняющейся трубкой; верхняя губа съ 2 очень маленькими округлыми зубчиками, бѣлыми или фиолетовыми; нижняя губа нѣсколько отогнута; сѣмена съ широкимъ крылатымъ ободкомъ.

По лугамъ, не рѣдко. Цвѣтетъ съ половины мая до половины юля.

× **A. fallax (Wimm. et Grab.) Sterneck.** = *A. major* × *minor*.

Rhinanthus Crista galli L. *α. fallax* Wimm. Бух. II, № 301 *α*.

Rhinanthus Crista galli L. *α. minor* Kauffm. Бух. I, № 285 *α*.

Отъ *A. major* отличается прямою трубкою вѣнчика, нѣсколько отогнутой нижней губой, зубчиками верхней губы, которые не длиннѣе 1 мм., и зелеными прицветниками. Отъ *A. minor* — удлинняющейся ко времени опыленія трубкой вѣнчика, самымъ вѣнчикомъ болѣе крупнымъ и болѣе крупными темно-фиолетовыми зубчиками верхней губы.

На Воробьевыхъ горахъ отцвѣтающимъ 19 июня (П.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).

362. *Pedicularis* L.

Чашечка зубчатая или колокольчатая, 5-зубчатая, рѣже 2-лопастная; вѣнчикъ двугубый съ длинной цилиндрической трубкой, иногда у верхушки расширенной; верхняя губа съ боковъ сжатая, шлемовидная, слегка 2-лопастная или вытянутая въ носикъ; нижняя—3-лопастная, у основанія часто съ двумя гребешками; 4 тычинки, изъ коихъ 2 длиннѣе остальныхъ; пыльники съ разбиченными гнѣздами, тупыми или на нижнемъ концѣ заостренными; рыльце головчатое; коробочка косая, сжатая съ боковъ, вскрывается вдоль гнѣздъ двумя простыми створками.

1. Цвѣты розовые или грязно-розовые. *P. palustris* L.

Цвѣты желтые. 2.

2. Цвѣты крупные, 30 — 40 мм.; нижняя губа спереди кроваво-красная; зѣвъ закрыть сходящимися губами.

P. spectrum Carolinum L.

Цвѣты 18 — 25 мм., все свѣтло-желтые; губы расходящіяся открываютъ зѣвъ.

P. comosa L.

866. **P. palustris** L. Пет. Кр. II, стр. 88.—Бух. II, № 299.—Бух. I, № 283.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 236.—Кауф. II, № 545.—Цин., № 1074.—Кауф. I, стр. 357.—Lind., p. 148.—Дв., № 608.—Макс., № 581.—Hoff. II, № 4573.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 108.—St. II, p. 35.—St. I, № 423.

Стебель 15—60 см., прямостоящій, б. ч. отъ основанія вѣтвистый, часто красноватый, голый, доверху покрытъ листьями; послѣдніе супротивные или очередные, перисто-раздѣльные; доли ихъ перисто-над-

рѣзные, съ бѣлыми утолщенными хрицеватыми кончиками; цвѣты пазушные въ верхнихъ стеблевыхъ листьяхъ и только верхушечные колосовидно-сучены, съ прицвѣтниками, похожими на мелкіе листья; чашечка 2-лопастная, съ надрѣзано-зубчатыми курчавыми лопастями; вѣничекъ 15—22 мм. дл., грязно-розовый или розовый; губы его почти одинаковой длины; верхняя—на кончикѣ усѣчена и близъ усѣченной верхушки съ двумя зубчиками, нижняя губа по краю рѣсничатая; коробочка яйцевидная съ заостренной верхушкой, едва выставляется изъ разросшейся чашечки.

По болотамъ и болотистымъ мѣстамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до половины іюля, иногда во второй разъ съ половины августа; плоды съ начала іюля.



Pedicularis palustris.



Pedicularis comosa.

867. ***P. comosa* L.** Хор. II, стр. 19.—Пет. Кр. II, стр. 88.—Бух. II, № 300.—Бух. I, № 284.—Пет., стр. 236.—Кауф. II, № 546.—Цип., № 1076.—Pinz., p. 16 и 17.—Рупр., стр. 87.—Кауф. I, стр. 358.—Ann., C. III, № 24%.—Дв., № 610.—Макс., № 582.—Hoff. Н., № 4561.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 108.—Hoff., № 2350.—St. II, p. 35.—St. I, № 425.

Pedicularis Kaufmanni Pinzger. Пет. Кр. II, стр. 89.—Pinz., p. 17.

Корни въ видѣ вертеенообразныхъ клубней; стебель 15—50 см., простой, б. или м. густо опушенный, рѣже почти голый, покрытъ листьями; послѣдніе линейно-ланцетные, нижніе на длинныхъ черешкахъ, перисто-раздѣльные; доли ихъ ланцетныя, перисто-надрѣзные, по краямъ зубчатыя, съ бѣлыми утолщенными хрицеватыми кончиками; цвѣты въ частой колосовидной кисти, по мѣрѣ цвѣтенія удлиняющейся; нижніе прицвѣтники походятъ на листья, остальные—линейно-ланцетные, цѣльные, къ верхушкѣ зубчатые *); чашечка о 5 короткихъ широкихъ цѣльныхъ зубцахъ; вѣничекъ 18—25 мм. дл., блѣдно-желтый; нижняя губа по краю

*) А. А. Хорошковъ нашелъ близъ Ознобишина, Подл. у. экземпляры съ очень длинными прилистниками, въ нѣсколько разъ превышающими цвѣтки.

рѣсничатая, короче верхней согнутой и съ 2 острыми зубчиками; коробочка продолговато-яйцевидная, выставляется изъ чашечки.

По лугамъ, холмамъ и опушкамъ. Цвѣтеть съ половины мая до начала іюли; плоды съ половины іюля. Аминево (А.).—Петровское-Разумовское, Куеково (Мар.).—Стѣгунъ, Кунцово (Гей.).—Между 17-й верстой Брянской ж. д. и Пѣмчиновымъ; близъ с. Зеленаго на р. Пахрѣ, Брн. у. (С.).—Измайлово, за Мякишинымъ по берегу Москвы р., Воробьевы горы, Ясенево; Шелаево, Вер. у.; Подольскъ; Серпуховъ (К.).—Малинки, Малословскій лѣсъ, Пдл. у. (Б.).—Д. Манькина гора, Пдл. у. (Х.).—Клементьево, Ряз. у. (Сюз.).—Лужки, Зиборова, Никифорово, Срп. у.; между Боровскимъ курганомъ и Заозерьемъ, Брн. у. (П.).—Рождествено на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

868. *P. sceptrum* Carolinum L.

Pedicularis Sceptum Carolinum L. Пет. Кр. II, стр. 88.—Ф. Б., № 63.—Пет., стр. 236.—Кауф. II, № 544.—Гор., № 29.—Шин., № 1078.—Кауф. I, стр. 357.—Дв., № 609.—Hoff. H., № 4582.—Mart., p. 108.

Pedicularis Sceptum L. Макс., № 583.—Gold. C., p. 21.—Hoff., № 2351.—St. II, p. 35.—St. I, № 424.

Стебли 30—100 см., простые, голые, часто красноватые, почти безлистные, оканчиваются рѣдкой, б. ч. длинной колосовидной кистью цвѣтовъ; листья корневыя пучкомъ, жесткіе, линейно-ланцетные на длинныхъ черешкахъ, перисто-раздѣльные или перисто-раздѣченные; доли ихъ продолговато-яйцевидныя, округло-городковыя, по краямъ мелко и неровно-



Pedicularis sceptum Carolinum.

зубчатая, верхняя сторона листьевъ темно-зеленая, нижняя—свѣтлѣе; прицвѣтнички яйцевидные, мелко зубчатые, нижніе — иногда длинно-яйцевидные и безъ цвѣтовъ, а верхніе—часто цѣлюкрайніе; чашечка о 5 зубчатыхъ лопастяхъ; вѣнчикъ 30—40 мм. дл., желтый; зѣвъ его закрытъ сходящимися губами, почти равными, нижняя спереди кроваво-красная, охватываетъ верхнюю съ боковъ; коробочка почти шаровидная.

По большимъ моховымъ болотамъ и топкимъ мѣстамъ, поросшимъ кустарникомъ, не часто. Цвѣтеть съ половины іюня до августа; плоды съ половины іюля. Горенки (герб. Гольдб.).—Кунцово (Дв.).—Перово (Гей. и Мар.).—В. Мытищи, Угрешн (Ш.).—

Люберцы (С.).—Никольское-Прозоровское, Дмит. у. (Л.).—Тимофеево торфяное болото по р. Яхромѣ, Дмит. у. (П. и С.).—Захарово, казенный лѣсъ, Кал. у. (П.).—Близъ Монашьева, Вгр. у. (П. П.).—Болото по берегу р. Македоновки близъ ст. Удѣльная, М. Ряз. ж. д., Брн. у. (Куль.).—Красный станъ и болото по берегу Анофріева озера близъ Никольскаго.

Руз. у. (Сюз.). — Близъ Ханунова поста (41 верст.), Ниж. ж. д. (X.). — Кудаво, Сри. у. (ки. Вяземскій).

363. *Melampýrum* L.

Чашечка трубчатая, 4-надръзная; вѣнчикъ 2-губый съ трубкой, постепенно расширяющейся; верхняя губа ялчмовидная съ отвороченными краями, нижняя — коротко-3-лопастная съ 2 бугорками у ея основанія; тычинокъ 4, изъ коихъ 2 длиннѣе остальныхъ; пыльники съ гнѣздами, нижній конецъ которыхъ постепенно заостренъ; коробочка яйцевидная, заостренная, вскрывается вдоль гнѣздъ двумя простыми створками; въ каждомъ гнѣздѣ 2 (1) крупныхъ сѣмени.

1. Цвѣты въ 4-гранномъ колосѣ; прицвѣтники вдоль сложены; 2 верхнихъ зубца чашечки длиннѣе нижнихъ.

M. cristatum L.

Цвѣты въ пазухахъ плоскихъ прицвѣтниковъ образуютъ рѣдкую колосовидную однобокую кисть; зубцы чашечки почти равные. 2.

2. Прицвѣтники покрашены въ сине-лиловый, малиновый, рѣдко бѣлый цвѣтъ.


M. nemorosum L.

Прицвѣтники зеленые.

M. pratense L.

869. *M. cristatum* L. Пет. Кр. II, стр. 87. — Пет., стр. 222. — Кауф. II, № 541. — Мил., № 24. — Гор., № 28. — Цин., № 1079. — Рувр., стр. 87. — Кауф. I, стр. 355. — Дв., № 601. — Макс., № 577. — Hoff. II, № 4549. — Gold. C., p. 21. — Mart., p. 107. — St. II, p. 35. — St. I, № 417. — Pal., № 1281.

Стебель 15—40 см., б. ч. вѣтвистый, тупо-4-гранный, шероховато-опушенный; листья остро-шершавые, сидячие, узко-ланцетные, длинно-заостренные, цѣлюкрайніе или верхніе у основанія съ 1—2 зубцами; цвѣты въ 4-рядномъ и 4-гранномъ частомъ колосѣ; прицвѣтники бѣловато-зеленые или розоватые, опушенные, гребенчато-зубчатые, по краямъ щетинистые, широко-сердцевидные, вдоль сложенные съ поднятыми краями, заостренные, иногда вытянутые въ длинный цѣлюкрайній кончикъ; чашечка опушенная, 2 верхнихъ зубца длиннѣе нижнихъ; вѣнчикъ 10—15 мм. дл., блѣдно-желтый съ бѣлой трубкой и ярко-желтой нижней губой или блѣдно-малиновый съ желтой нижней губой; коробочка полушаровидная.



Melampyrum cristatum.

По полянамъ, кустарникамъ и по берегамъ рѣкъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ начала іюня до половины іюля. По заливному лугу между Покровскимъ и Шелешихой (К.). — за Лужками. Сри. у. (Г.). — Близъ устья Лопаси. Сри. у. (Мил.). —

Близъ Никифорова. Срп. у.: по берегу р. Перской. близъ погоста Никола-Перскаго. Бри. у.: Хотьичи. Бгр. у. (П.).—Клементьево. Руз. у. (Сюз.).

870. *M. nemorosum* L. Пет. Кр. II, стр. 87.—Бух. II, № 297.—Бух. I, № 281.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 222.—Кауф. II, № 542.—Цин., № 1081.—Кауф. I, стр. 355.—Lind., p. 148.—Ann., C. I, № 37.—Дв., № 603.—Макс., № 574.—Hoff. II, № 4550.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 107.—Hoff., № 2065.—St. II, p. 35.—St. I, № 419.

Melampyrum arvense L. Дв., № 602.—Макс., № 578.—Hoff. II, № 4548.—Mart., p. 107.—St. II, p. 35.—St. I, № 418.—Pal., № 1282.

Стебель 15—60 см., прямостоящий, простой или вѣтвистый, коротко-мохнато-опушенный, особенно въ верхней части; листья яйцевидно или



Melampyrum nemorosum.

продолговато-ланцетные, длинно-заостренные, быстро суженные въ черешокъ или же основаніе ихъ округлое, рѣже усѣченные; иногда листья близъ основанія съ однимъ или нѣсколькими зубцами; цвѣты одиночные, обращены въ одну сторону въ пазухахъ листьевъ, которые постепенно переходятъ въ прицвѣтники; послѣдніе яйцевидно-ланцетные, у основанія сердцевидные, по краямъ надрѣзочно-зубчатые, съ узкими ланцетно-шиловидными зубцами, сине-лиловые, рѣдко малиновые или бѣлые; въ пазухахъ верхушечныхъ прицвѣтныхъ листьевъ цвѣтовъ нѣтъ; чашечка съ ланцетно-шиловидными оттопыренными зубцами, б. или м. опушенная, часто нѣсколько мохнатая; вѣнчикъ 12—15

мм. дл., ярко-желтый съ красно-бурой отогнутой трубкой; коробочка равна чашечкѣ.

По лѣсамъ, кустарникамъ и полямъ, очень часто. Цвѣтетъ съ начала іюня до осени; плоды съ начала августа.

871. *M. pratense* L. Пет. Кр. II, стр. 88.—Бух. II, № 298.—Бух. I, № 282.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 222.—Кауф. II, № 543.—Цин., № 1083.—Кауф. I, стр. 356.—Lind., p. 148.—Ann., C. IV, № 35.—Дв., № 604.—Макс., № 576.—Hoff. II, № 4559.—Gold. C., p. 21.—Mart., p. 107.—Hoff., № 2066.—St. II, p. 35.—St. I, № 420.

Melampyrum pratense L. typ. Бух. II, № 298 а.—Бух. I, № 282 а.

Стебель 15—40 см., б. ч. вѣтвистый, слабо-4-гранный, слегка опушенный; листья длинно-ланцетные или линейно-ланцетные цѣльнокрайніе, съ основаніемъ быстро суженнымъ; цвѣты одиночные, обращены въ одну сторону въ пазухахъ прицвѣтниковъ; послѣдніе зеленые, широкое-ланцетные, б. ч. съ вытянутымъ кончикомъ, при основаніи суженные или округленные, и съ 1—4 шловидными зубцами; чашечка съ линейно-

шиловидными, почти равными, вверх отогнутыми зубцами длиннее ея трубки; вѣничекъ въ 3—4 раза длиннѣе чашечки, свѣтло-желтый или почти бѣлый; коробочка вдвое длиннѣе чашечки.

По кустарникамъ, опушкамъ и лѣсамъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ половины іюня до конца августа; плоды съ начала іюля. По старой вырубкѣ между Разсказовкой и Вилковымъ и сосновый лѣсъ между Барвихой и Усовымъ, Звн. у.; лѣсъ близъ Михнева, Брн. у. (С.).



Melampyrum pratense.



Melampyrum pratense α. integerrimum.

Кромѣ типичной формы чаще еще:

α. integerrimum Doell.

Melampyrum pratense L. *β. integerrimum*. Гербарій Кауфмана.

Melampyrum pratense L. *β. pseudo-sylvaticum* Kauffm. Пет. Кр. II, стр. 88. — Бух. II, № 298 *β.* — Бух. I, № 282. *β.* — Кауф. II, стр. 366. — Цип., стр. 335. — Кауф. I, стр. 356.

Melampyrum sylvaticum L. Цип., № 1084. — Др., № 605. — Мако., № 575. — Mart., p. 107. — St. II, p. 35. — St. I, № 421. — Pal., № 1283.

Всѣ прицвѣтники цѣльнокрайніе. По лѣсамъ, очень часто.

364. *Lathráea* L.

Чашечка колокольчатая, 4-лопастная; вѣничекъ 2-губый, трубчатый; верхняя губа 2-зубая, нижняя — слегка 3-лопастная; 4 тычинки выдаются изъ вѣничка; гнѣзда пыльниковъ очушечные, основанія ихъ заостренныя; спереди у основанія пестика чешуевидная широкая медовая железа; рыльце головчатое; коробочка одногнѣздная, съ 2 боковыми сѣменосами, вскрывается 2 створками.

872. *L. squamaria* L.

Lathraea Squamaria L. Бух. II, № 305. — Бух. I, № 288. — Пет., стр. 209. — Кауф. II, № 551. — Цин., № 1099. — Кауф. I, стр. 362. — Lind., p. 148. — Ann., C. I, № 36. — Дв., № 619. — Макс., № 591. — Hoff. H., № 4553. — Gold. C., p. 21. — Mart., p. 110. — Hoff., № 1861. — St. II, p. 35. — St. I, № 29. — Pal., № 1784.

*Lathraea squamaria.*

Растение без хлорофилла, чужденное, преимущественно на оршниках; корневище длинное, ветвистое, толстое, белое с мясистыми частями супротивными чешуйками; стебель простой, прямо стоящий, покрыт редкими яйцевидными чешуйками, как и последний, белый или розоватый; с нижней стороны чешуйки голые, с верхней — слегка железисто-опушенные; цветки на коротких поникших цветоножках в густой однобокой кисти, до расцветания согнутой; чашечка покрыта редкими железистыми волосками; доли ее яйцевидные, островатые; венчик с малиновым оттенком. Все растение после сушки чернеет.

По лесам и кустарникам, не редко. Цветет с конца апреля до половины мая.

86 сем. *Utriculariaceae* Endl.

Цветы обоеполые, симметричные; чашечка двугубая, почти двураздельная; венчик двугубый, с очень короткой трубкой и с шпорой; эвиз б. ч. закрыт выгнутой; тычинок 2 на коротких нитях, прикрепленных к нижней губе; пыльники двугнездные с разобщенными или сливающимися гнездами, обращенными внутрь; завязь верхняя одногнездная из двух плодolistиков, с срединным семеносом с многими семеночками; столбик очень короткий; рыльце двугубое, иногда нижняя губа в вид пластинки; плод — одногнездная коробочка, вскрывающаяся двумя створками или неправильно; семена мелкие без белка; зародыш с очень короткими семядолями или без них. У нас водяные растения без корней с пузырьками на листьях, каждый пузырек с отверстием, закрытым клапаном, который открывается внутрь, вследствие чего мелкие водяные животные могут свободно проникать в пузырек, но обратно выйти не могут и, вероятно, погибая, служат пищей для растений.

365. *Utricularia* L.

1. Пузырьки на особых безцветных ветвях с зачаточными тоже безцветными листьями; зеленые листья без пузырьков расположены двурядно.
U. intermedia Hayne.

- Пузырьки на зеленыхъ листьяхъ, расположенныхъ во все стороны. 2. Цвѣты мелкіе, 7—11 мм.; выуклина не закрываетъ зѣва; шпора очень короткая, конусовидная, длина ея равна ширинѣ.

U. minor L.

Цвѣты крупныя, 12—22 мм.; зѣвъ закрытъ выуклиной; шпора много длиннѣе своей ширины. 3.

3. Верхняя губа въ 2—3 раза длиннѣе выуклины; тычинки сближены, но не слиплись; плодоножки торчащія или отогнутыя, но не дугообразно, много длиннѣе цвѣтоножекъ.

U. major Schmidel.

Верхняя губа короче или немного длиннѣе выуклины; тычинки слиплись пыльниками; плодоножки отклонены дугообразно, едва длиннѣе цвѣтоножекъ.

U. vulgaris L.

873. *U. vulgaris L.* Пет. Кр. II, стр. 100.—Бух. II, № 306.—Бух. I, № 289.—F. O., № 7, p. 102.—Пер., стр. 297.—Кауф. II, № 553.—Цип., № 939.—Кауф. I, стр. 363.—Lind., p. 138.—Ann., C. V, № 44.—Дв., № 29.—Макс., № 32.—Hoff. II, № 192.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 7.—Ad., p. 13.—St. II, p. 4.

Плавающий стебель въ 15—100 см. съ очередными листьями; послѣдніе 2—3 перисто-раздѣльные, 2—6 см. дл.; дольки ихъ ланцетовидныя, рѣсничатая; пузырьковъ на листьяхъ много (иногда попадаются листья безъ пузырьковъ), по б. ч. у самаго основанія листа на главномъ черешкѣ пузырьковъ нѣтъ; цвѣточный стебель буроватый, 15—35 см., съ 1—4 чешуйчатыми листочками; цвѣточная кисть о 4—15 цвѣтахъ на цвѣтоножкахъ въ 8—10 мм. дл.; плодоножки почти не удлиняются, но отклоняются и б. ч. отгибаются дугообразно; чашелистики яйцевидные, тупые; вѣнчикъ 12—20 мм., ярко-желтый съ красновато-бурыми полосками на выуклинѣ; верхняя губа округло-яйцевидная или яйцевидная съ отвороченными краями, короче или нѣсколько длиннѣе выуклины; нижняя губа округлая съ боковыми краями, отвороченными книзу; тычинки слиплись пыльниками.



Utricularia vulgaris.

По канавамъ, болотамъ и стоячимъ водамъ, часто. Цвѣтетъ съ іюня до осени.

874. *U. major Schmidel.*

Utricularia neglecta Lehm.

Стебель и листья такіе же, какъ у *U. vulgaris L.*, по б. ч. у самаго основанія листьевъ на главномъ черешкѣ два вполне развитыхъ пузырька или только зачатки пузырьковъ; цвѣточный стебель 10—40 см.,

часто зеленым или буроватым, съ 1—3 чешуйчатыми листочками; кисти 3—7-цветковые; цветоножки 15—12 мм. дл.; плодоножки сильно удлиняются, часто въ 2 раза, отстоять подь острымъ угломъ или даже горизонтально, но не отклонены дугообразно; вѣничекъ б. ч. крупнѣе, чѣмъ у *U. vulgaris* L., свѣтло-желтый и полосы на выпуклнѣ свѣтлѣе; верхняя губа въ 2—3 раза длиннѣе выпуклины, яйцевидная или яйцевидно-продолговатая, на верхушкѣ слегка выемчатая; нижняя губа округлая съ почти плоскими не отвороченными краями *); тычинки свободныя не сдвинулись пыльниками.



Utricularia major.



Utricularia intermedia.

По канавамъ: должно быть просматривалось. Цвѣтеть съ юня до осени. Кудиново въ ямѣ кирпичнаго завода, Бгр. у. (X.).—Б. Мытници въ ямѣ кирпичнаго завода (С.).

875. *U. intermedia* Hayne. Пет. Кр. II, стр. 100. — Пет., стр. 297. — Кауф. II, № 554.—Гор., № 63.—Цип., № 940.—Кауф. I, стр. 363 — Дв., № 30.—Макс., № 33.

Листоносный стебель 5—20 см. дл.; листья безъ пузырьковъ, двурядно-расположенные, повторно-вильчатые или раздѣленные на 3 доли тоже повторно-вильчатые; дольки плоскія, узко-линейныя, по краямъ съ 3—12 рѣсничками; пузырьки крупныя на длинныхъ безцвѣтныхъ побѣгахъ, съ слабо развитыми тоже безцвѣтными листьями; цвѣточный стебель 8—30 см., съ 1—2 маленькими чешуйчатыми листочками; кисти 2—6-цветковыя; вѣничекъ 10—15 мм., лимонно-желтый съ кроваво-красными полосками на выпуклнѣ, которая вдвое короче верхней губы; нижняя губа плоская, округлая; шпора острая, шпоровидная, равна нижней губѣ и прилегаетъ къ ней; плодоножки торчащія.

*) Для точнаго опредѣленія по сухому матеріалу необходимо располагать цвѣтками, сдвоенными съ боковъ, на которыхъ можно видѣть какъ длину верхней губы, такъ и длину выпуклины.

По моховымъ болотамъ и стоячимъ водамъ, не часто. Цвѣтетъ съ половины мая до конца іюля.

Распадается на слѣдующія формы:

α. *Grafiána Koch.*

Верхушки листовыхъ долекъ тупыя. *)

Болото у подножія Боровскаго кургана, Бри. у. (П. и С.).—По р. Работиѣ между ст. Мытищи и Рупосовымъ и болото истоковъ р. Иузы: болото Анофріева озера близъ Анофріева, Руз. у.; по болоту р. Македоновки, близъ ст. Удѣльная, Бри. у. (С.).

β. *Kochiána Čelak.*

Всѣ дольки на всѣхъ листьяхъ постепенно и длинно-заострены. Анофріево озеро, Руз. у. (П. и Ч.).—Косино, Черное озеро (П.).—Медвѣжья пустынь на р. Сестрѣ, Дмит. у. (П. и С.).

876. *U. minor L.* Пет. Кр. II, стр. 101.—Ф. Б., № 65.—Пет., стр. 297.—Кауф. II, № 555.—Гор., № 30.—Цип., № 941.—Кауф. I, стр. 364.—Lind., p. 138.—Дв., № 31.—Макс., № 34.—Hoff. II., № 191.—Mart., p. 7.—Ad., p. 13 et 14.—St. II, p. 4.—St. I, № 20.

Стебель 5—20 см.; листья съ мелкими пузырьками (едва въ 2 мм.), 3-раздѣльные съ повторно-выпуклыми долями; дольки интенидныя, голыя; цвѣточный стебель 5—15 см., съ 2—4 чешуйчатыми листочками; кисть 2—6-цвѣтковая съ яйцевидно-треугольными прицвѣтниками у основанія каждой цвѣтоножки; вѣничекъ 7—11 мм., свѣтло-желтый съ красными полосками на плоской выпуклнѣ, не закрывающей зѣва; верхняя губа на верхушкѣ съ выемкой, равна выпуклнѣ, нижняя—яйцевидная; боковые края ея послѣ опыленія отгибаются; шпора очень короткая, коническая; плодоножки вцѣзъ отогнутыя.



Utricularia minor.

По торфянымъ моховымъ болотамъ, канавамъ и стоячимъ водамъ, не часто. Цвѣтетъ съ начала іюля до половины августа. Горенки (Дв.).—Б. Мытищи, Кунцово (А.).—Петровское-Разумовское (К.).—Истоки р. Химки (П.).—Болото у д. Высокова за Мытищами (Гей.).—По болоту близъ озера Перскаго, Косино—Черное озеро (П. и С.).—Близъ Верей (Макс.).—Анофріево озеро, Руз. у. (П. и Ч.).—Близъ Ольгина въ болотѣ казеннаго лѣса, Мож. у. (Ф. Б.).—Близъ с. Чуденки, Бгр. у. (П. П.).

*) Иногда листья близъ цвѣточного стебля съ острыми долками, а остальные съ тупыми. Что касается количества рѣсничекъ по бокамъ листовыхъ долекъ, то оно очень непостоянно, и хотя, какъ для α. *Grafiána*, въ описаніи указывается, что рѣсничекъ должно быть 8—12, но на видѣнныхъ мною экземплярахъ съ долками совершенно тупыми рѣсничекъ часто было только 4.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. platylóba Meister.

Всѣ листья съ плоскими сплюснутыми линейными дольками въ 0,3—1 мм. ш. Торфяное болото близъ д. Тарасовки (П. и С.).— Торфяное болото близъ полустанка Спасское, М.-Яр. ж. д. (С.).

87 сем. *Orobancháceae* Lindl.

Цвѣты обоеполые; чашечка б. ч. изъ двухъ свободныхъ чашелистиковъ, простыхъ или двузубчатыхъ, иногда спереди слегка сросшихся, рѣже чашечка трубчатая, 4—5-зубчатая; вѣничикъ неправильный, двугубый съ длинной слегка согнутой трубкой; верхняя губа цѣльная или двулопастная, нижняя — 3-лопастная; тычинокъ 4, изъ коихъ 2 длиннѣе остальныхъ; пыльники 2-гнѣздные, прикрѣплены къ нитямъ поперекъ; гнѣзда съ нижнимъ концомъ длинно-заостреннымъ вскрываются продольною щелью; завязь верхняя изъ 2 плод.листиковъ, одногнѣздная; на каждомъ плод.листикѣ 2 стѣнныхъ сѣменоса съ многочисленными сѣмечками; столбикъ одинъ съ 2—4-лопастнымъ рыльцемъ, рѣже рыльце дискообразное или ворончатое; коробочка одногнѣздная, вскрывается двумя створками или двумя щелями; сѣмена очень мелкія съ неразвитымъ зародышемъ, состоящимъ только изъ нѣсколькихъ клеточекъ. Чужеродныя, б. ч. безхлорофилльныя растенія, съ чешуйчатыми очередными листьями и съ цвѣтами, собранными въ конечный колосъ.

366. *Orobánche* L.

877. *O. Libanotidis* Rupr. Пет. Кр. II, стр. 99. — Ф. Б., № 64. — Пет., стр. 233. — Кауф. II, № 550. — Цип., № 1096. — Кауф. I, стр. 361.

Orobanche alba Steph. Цип., № 1092. — Макс., № 592.

Orobanche Galii Duby. Цип., № 1093.

Orobanche caryophyllaceae Sm. Дв., № 620. — Макс., № 593. — Mart., p. 110.

Все растеніе буроватое, 25 — 40 см., б. или м. густо покрытое железистыми волосками; стебель ребристый, плотный, мясистый, послѣ сунки полный; чешуйчатые листья яйцевидно-ланцетные, иногда линейно-ланцетные; цвѣты въ плотномъ колосѣ; прицвѣтники ланцетные, б. ч. равные вѣничку; чашечка изъ 2 двунадрѣзныхъ чашелистиковъ, иногда спереди слегка сросшихся, равныхъ половинѣ вѣничка или нѣсколько короче половины его; послѣдній 12—17 мм. дл. (рѣдко 20 мм.), согнутый, снаружи железисто-опушенный; верхняя губа съ б. или м. отогнутыми назадъ лопастями, края губъ неравно- и мелко-зубчатые; тычинки прикрѣплены къ трубкѣ въ 1—3 мм. отъ основанія; нити книзу нѣсколько утолщены и снизу до половины покрыты съ одной стороны железистыми волосками; надъ пыльниками нѣсколько выдается связникъ.

Паразитируетъ на корняхъ *Libanotis*. Цвѣтетъ съ половины июля. Близъ Кускова (Мар.). — Въ лѣсу близъ Невѣрова, Кал. у. (К.). Въ сосновомъ лѣсу Коншина, близъ Серпухова (Вар. и Г.).



Orobanche Libanotidis.



Orobanche purpurea.

878. *O. purpurea* Jacq. Пет. Отч., стр. 12.

Растеніе въ 14—45 см.; стебель слегка ребристый, въ нижней части бурый, къверху синеовато-лиловый, железисто-опушенный; чешуйчатые листья ланцетные, сильно разставленные; цвѣты въ многоцвѣтковомъ частомъ и разставленномъ колосѣ; нижніе 2—3 цвѣтка на замѣтныхъ цвѣтоножкахъ, остальные—сидячіе; прицвѣтные листья ланцетные, равны чашечкѣ; прицвѣтники линейно-ланцетные, тоже равны чашечкѣ или короче ея; послѣдняя трубчато-колокольчатая, б. или м. густо опушенная, 5-зубчатая, 4 зубца длиннее и одинъ задній очень короткій; вѣничикъ 20—25 мм. дл., въ $2\frac{1}{2}$ раза длиннѣе чашечки, синеовато-лиловый, снаружи б. или м. густо железисто-опушенный; лопасти губъ островатыя, б. ч. отогнутыя; пыльники обыкновенно голые; рыльце 2-лопастное, бѣловатое.

Паразитируетъ на *Artemisia vulgaris* и *Achillea Millefolium*. Цвѣтетъ съ начала іюня. Въ первый разъ замѣчено въ 1902 году въ яблочномъ саду с. Рождествена на р. Нарѣ, Сри. у., затѣмъ въ огородѣ; цвѣтетъ ежегодно то въ большомъ, то въ меньшемъ количествѣ (гр. Е. Солдубъ).

Порядокъ *Plantagináles.*

88 сем. *Plantagináceae* Juss.

Цвѣты обоенные: чашечка 4 (3)-раздѣльная; вѣничикъ сухой, пленчатый, трубчатый, съ 4 отвороченными долями; 4 тычинки далеко выступаютъ изъ вѣничика на очень длинныхъ нитяхъ, прикрѣпленныхъ къ

трубки вѣничка супротивъ долей чашечки; нити тычинокъ до распусканія согнуты пополамъ внутрь; пыльники колеблющіеся, 2-гнѣздные, б. ч. съ слегка выдающимся связникомъ, вскрываются продольными трещинами; завязь верхняя, 2-гнѣздная, рѣже каждое гнѣздо раздѣлено неполной перегородкой, и тогда не вполне 4-гнѣздная; каждое гнѣздо съ одной или многими сѣменочками; столбикъ одинъ невидимый; плодъ — коробочка, вскрывающаяся поперекъ крышечкой, рѣже орѣшекъ; сѣмя съ прямымъ осевымъ зародышемъ и бѣлкомъ. Травы б. ч. многолѣтнія, съ корневищемъ и пучкомъ корневыхъ листьевъ, изъ пазухъ которыхъ выходятъ цвѣточныя стрѣлки или съ листоноснымъ стеблемъ, но всегда безъ прилистниковъ.

367. *Plantago* L.

1. Растеніе съ листоноснымъ стеблемъ; колосья собраны на верхушкѣ стебля и вѣтвей зонтикообразно.

P. ramosa (Gilib.) Aschers.

Растеніе безъ стебля съ одиѣми стрѣлками, оканчивающимися однимъ колосомъ; листья въ корневомъ пучкѣ. 2.

2. Двѣ переднія доли чашечки срастись въ одну обратно-сердцевидную долю, отчего чашечка кажется 3-дольной.

P. lanceolata L.

Всѣ четыре доли чашечки свободныя. 3.

3. Листья голые; тычиночныя нити въ 2—2½ раза длиннѣе трубки вѣничка; коробочка 8-сѣменная.

P. major L.

Листья опушенные; тычиночныя нити въ 4—5 разъ длиннѣе трубки вѣничка; коробочка 2—4-сѣменная. *P. media* L.

879. *P. májor* L. Пет. Кр. II, стр. 131.—Бух. II, № 343.—Бух. I, № 325.—Г. О., № 7, p. 102. — Пет., стр. 242. — Кауф. II, № 627. — Цип., № 1174. — Кауф. I, стр. 408. — Lind., p. 154.—Дв., № 169. — Макс., № 158. — Hoff. H., № 1102.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 29.—Ad., p. 80. — St. II, p. 10.—St. I, № 101.—Pal., № 248.

Листья голые, широко-яйцевидные или широко-эллиптическіе, съ 5—9 жилками, туповатые, съ основаніемъ округлымъ, слегка сердцевиднымъ или быстро суженнымъ въ широкій черешокъ, цѣлюкрайніе или слабо-зубчатые, съ болѣе замѣтными зубцами у основанія листа; колосья линейно-цилиндрическіе густые, 8—30 см. дл., на голыхъ или слегка опушенныхъ цвѣточныхъ стрѣлкахъ, равныхъ листьямъ, рѣже ихъ превышающихъ; прицвѣтники яйцевидные или эллиптическіе, съ узкой или широкой пленчатой каймой, равны чашечкѣ; доли послѣдней почти равныя, овальныя, тупыя, широко-перепончатая; вѣничикъ буроватый; тычиночныя нити бѣлыя въ 2—2½ раза длиннѣе вѣничка; коробочка

яйцевидная или яйцевидно-шаровидная, бурая, иногда съ фиолетовымъ оттѣнкомъ, о 8 сѣменахъ. *)

Около жилья и какъ сорное, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до осени.



Plantago major.



Plantago media.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. *intermedia* (Gilib.) Wildem. et Durand.

Листья прижаты къ землѣ съ 3—5 жилками, эллиптическіе или широко-ланцетные, заостренные, сужены въ черешокъ, б. ч. слегка опушенные и по краямъ слабо-зубчатые; колосъ коротко-цилиндрической, особенно толстой во время плодоношенія, 1—5 см. дл., приподнимающійся на лежачей цвѣточной стрѣлкѣ. На сырыхъ песчаныхъ берегахъ. По берегу р. Оки противъ Лужниковъ. Срп. у. (П. и Х.).—По песчанымъ отмелямъ Москвы р. близъ Заозерья, Брн. у. (С.).

β. *minima* Dumort.

Plantago major L. var. *minima* Ledb. Бух. II, стр. 35.—Бух. I, стр. 22.

Листья б. ч. цѣлюкрайніе съ 3 жилками; колосъ 3—10-цвѣтковый. На болотѣ „Пальница“, близъ Михайловскаго, Пдл. у. (В.).—Берегъ р. Пехорки близъ Леонова (Куль.).

880. *P. média* L. Пет. Кр. II, стр. 131.—Бух. II, № 344.—Бух. I, № 326.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 242.—Кауф. II, № 628.—Цинк., № 1117.—Кауф. I, стр. 409.—Lind., p. 154.—Ann., C. V, № 47.—Дв., № 170.—Макс., № 159.—Hoff. II, № 1105.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 29.—Hoff., № 2512.—Ad., p. 81.—St. II, p. 10.—St. I, № 102.—Pal., № 250.

*) Въ Раменскомъ, Бгр. у., мною найдена уродливая форма, у которой цвѣточные стрѣлки много длиннѣе листьевъ, а вмѣсто колоса пѣлое пирамидальное сложное соцветіе: на мѣстѣ каждого цвѣтка вѣтка отъ 1 до 3 см. дл., въ свою очередь или развѣтвленная или съ пѣвтами на длинныхъ цвѣтоножкахъ.

Листья опушенные, съ 5—9 жилками, эллиптические или яйцевидные, слегка заостренные, суженные въ очень короткій широкій черешокъ, почти цѣлюкрайніе или слегка зубчатые; цвѣточные стрѣлки въ нѣсколько разъ длиннѣ листьевъ, 20—50 см., тонко бороздчатые, покрыты въ нижней части отстоящими волосами, въ верхней—прижатыми; колосья густые, вначалѣ съ заостренной верхушкой, по отцвѣтаніи удлиняются до 7 см. и становятся цилиндрическими; прицвѣтники *) яйцевидные, заостренные или туповатые, съ пленчатымъ краемъ; чашелистики обратно-яйцевидные, тупые, съ широкимъ бѣлымъ пленчатымъ краемъ; трубка вѣника равна чашечкѣ, доли его бѣловатыя, лоснящіяся; тычиночныя нити розоватыя или лиловатыя, въ 4—5 разъ длиннѣ вѣника; коробочка эллиптическая, 2 (4)-сѣменная.

По лугамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины мая до осени.

881. *P. lanceolata* L. Пет. Кр. II, стр. 131.—Бух. I, № 327.—F. O., № 7, p. 102.—Пет., стр. 242.—Кауф. II, № 423.—Цин., № 1178.—Кауф. I, стр. 409.—Lind., p. 154.—Дв., № 171.—Макс., № 160.—Hoff. II., № 1099.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 29.—Hoff., № 2507.—Ad., p. 81.—St. II, p. 10.—St. I, № 103.—Pal., № 252.

Корень короткій, толстый, какъ бы обрубленный или удлиненный веретенообразный, въ обоихъ случаяхъ съ многочисленными тонкими



Plantago lanceolata.

вѣтвистыми боковыми корешками и близъ шейки съ чешуйками; листья пучкомъ, ланцетные, цѣлюкрайніе или слегка зубчатые, заостренные, суженные въ б. или м. длинный черешокъ, основаніе котораго б. ч. шерстисто опушено; пластинка листьевъ то почти голая, то опушенная съ 3—7 жилками; цвѣточные стрѣлки 15—50 см., ребристыя, б. ч. опушенныя; колосья густой, яйцевидно-продолговатый; прицвѣтники яйцевидные, длинно заостренные; 2 переднія доли чашечки сраслись, образуя обратно-сердцевидную пленчатую долю съ 2 бурыми или зеленоватыми полосками; верхушки долей то голая, то съ рѣсничками, остальные 2 доли чашечки ладьевидныя, тоже пленчатые, тупо-

килеватыя, тупо-заостренныя, на спинкѣ буроватыя или зеленоватыя, голая или опушенная; тычиночныя нити въ 4—5 разъ длиннѣ вѣника; послѣдній съ острыми долями.

*) О. В. Бухгольцъ въ примѣчаніи приводитъ *P. media* L. съ проросшими прицвѣтниками какъ это указано у Moquin-Tandon (*Pflanzenzeratologie*, p. 187) для *P. major* L. и *P. lanceolata* L.

По лугамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвететъ съ половины мая весь июнь.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. capitella Sonder.

Plantago lanceolata L. *sphaerostachya* M. et K. Пет. Кр. II, стр. 131 и 131.—Бух. II, № 343.

Растеніе во всѣхъ частяхъ мелкое; колосья почти шаровидные или коротко-яйцевидные, очень маленькіе, около 10 мм.; листья о 3, рѣже 5 жилкахъ, узкіе, около 1 см. ш.; черешокъ б. ч. у основанія съ длинной бородкой волосковъ¹⁾; очень часто.

β. silvatica Pers. Пет. Кр. II, стр. 132.

Plantago lanceolata L. var. *sylvatica* Mart. Дв., № 172.—Макс., № 160.
Plantago sylvatica (altissima). Mart., p. 29.

Растеніе во всѣхъ частяхъ очень крупное; цвѣточные стрѣлки до 75 см., ребристыя; колосья длинно-цилиндрической до 3 см. дл.; листья вытянутые, до 30 см. вмѣстѣ съ черешкомъ, б. ч. почти голые²⁾. Каропчеево, на известнякахъ, Кзм. у.; Усово, Зви. у. (П.).—Успенское и Дарьино, Зви. у. (Х.).—Влѣзъ 17-й версты, Брянск. ж. д.; известняки по р. Пахрѣ близъ с. Зеленаго, Брн. у. (С.).

882. P. ramosa (Gilib.) Aschers.

Plantago arenaria W. K. Хор. I, стр. 18.—Пет. Кр. II, стр. 132.—Ф. В., № 6.

Растеніе однолѣтнее; стебель 10—35 см., простой или вѣтвистый, покрытъ, какъ и все растеніе, короткими и длинными многокѣлочными волосками; листья супротивные, узкіе, линейные, цѣлюкрайніе или съ

¹⁾ Въ Б. Мытищахъ мною найденъ экземпляръ съ цвѣточной стрѣлкой въ нижней трети цилиндрической, въ остальной части слабо ребристой и съ передними долями чашечки, сросшимися только нижней третью.

²⁾ Типичное *P. altissima* L. отличается отъ *P. lanceolata* L. только цилиндрическимъ ползучимъ корневищемъ съ длинными простыми, довольно толстыми боковыми корнями; растеніе, собранное въ Австріи Dr. F. A. Tscherningъ съ такимъ корневищемъ и съ остальными признаками, присваиваемыми *P. altissima* L., получено мною отъ Dr. C. Baenitz. Признакъ, выдвигаемый почти всѣми флористами для *P. lanceolata* L. — стебель о 5 ребрахъ, а у *P. altissima* L. — о многихъ ребрахъ, оказался несостоятельнымъ послѣ изслѣдованія бывшаго у меня подъ рукой матеріала; у несомнѣннаго *P. lanceolata* L. съ очень мелкими колосьями стрѣлки были 4- 5-б - и 9-ребристыя, причемъ у одного экземпляра нижняя треть стрѣлки была почти безъ реберъ; несостоятельными оказались и другіе признаки, относящіеся къ формѣ и опушенію чашелистиковъ; послѣднее очень разнообразно и мною было наблюдаемо во всѣхъ переходахъ, начиная съ довольно густого опушенія до совершенно отсутствія волосковъ. Изъ вышеприведеннаго видно, что различить эти два вида можно только по корневищу во всѣхъ же остальныхъ признакахъ замѣчаются переходы отъ одного вида къ другому. У насъ *P. altissima* L. пока не найдено; оно указано только для южныхъ губерній, гдѣ растетъ по влажнымъ и болотистымъ лугамъ.

1—2 маленькими зубчиками, заостренные, нѣсколько мясистые, въ пазухахъ съ укороченными вѣточками; колосья яйцевидно-продолговатые, 6—20 мм. дл., на длинныхъ цвѣтоносахъ, расположенныхъ зонтикообразно на концѣ стебля и вѣтвей; у основанія каждого колоса 2—3 пу-



Plantago ramosa.

стые, на спинкѣ густо опушенные, обратно-яйцевидные прицвѣтника, съ вытянутымъ кончикомъ; остальные прицвѣтники плечатые, обратно-яйцевидные или лопатчатые, спереди закругленные или обрубленные, на спинкѣ коротко и курчаво волосистые, по краямъ мелко зубчатые; доли чашечки неравныя: 2 переднія — широко-лопатчатые, тупыя, рѣсничатые, 2 заднія — яйцевидно-ланцетныя или почти ланцетныя, острые; трубка вѣничка опушенная, доли его острые; тычиночныя нити много длиннѣе вѣничка; гнѣзда коробочки односѣменные.

На пескахъ и известнякахъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ конца іюня до осени. Дракино, Спр. у. (Мил.).—По берегу р. Оки за Лужками. Спр. у.; подъ Карончевымъ. Кзм. у. (П.).—Между Бѣлопесочкой слободой и Лужниками, Спр. у. (X).

Порядокъ Rubiáles.

89 Сем. Rubiáceae Juss.

Обработано А. А. Хорошковымъ *).

Цвѣты обыкновенно обоенные, б. ч. правильные; цвѣточные покровы чаще четверные или пятерные; вѣничекъ сростнолепестный, со створчатымъ, череничатымъ или скрученнымъ почкосложеніемъ; пыльники вскрываются б. ч. продольной щелью; дискъ 2-лопастный или трубчатый (рѣже его нѣтъ); плодolistики сросшіеся, б. ч. въ числѣ 2; завязь нижняя, обыкновенно двугнѣзная (рѣже одно- многогнѣзная) обь одной до многихъ обратныхъ сѣмечкахъ; столбикъ нитевидный съ головчатымъ окончаніемъ или дву- много-развѣтвленный; плодъ сухой—вскрывающійся или распадающійся, или сочный — ягодо- или костянообразный; сѣмя (иногда крылатое) съ кожистой, костеподобной или волокнистой оболочкой. Травы, кустарники или деревья съ супротивными и цѣльно-крайними (крайне рѣдко съ очередными и зубчатыми или лопастными) листьями съ прилистниками; цвѣты б. ч. въ метелкахъ или полузонтикахъ.

У насъ лишь представители группы:

*) Въ составъ гербарнаго матеріала, которымъ я пользовался при обработкѣ семейства, вошли также собранія московскихъ растений Московск. Сельско-Хоз. Института, Моск. Студ. Круга для изслѣд. Русск. Флоры и В. К. Чефрановой.

Galieae Dumort. ¹⁾

Чашечка обыкновенно не развита, рѣже въ видѣ 6-зубчатого рубца; вѣнчикъ колесовидный, колокольчатый или ворончатый; завязь 2 (рѣдко 3)-гнѣздная, гнѣзда по одной сѣмечкѣ; плодъ сухой, распадающійся на 2 дольки (изъ которыхъ одна иногда не развивается), или сочный — костяшкообразный; сѣмя б. ч. сросшееся съ околоплодникомъ; зародышъ прямой или согнутый въ роговомъ облѣкѣ. Травы съ прилистниками, развитыми б. ч. какъ листья.

1. Чашечка о 6 зубцахъ; цвѣты въ головчато-собранныхъ полузонтикахъ, съ оберткой изъ сросшихся въ нижней части листьевъ. ²⁾

Sherardia.

Чашечка не замѣтна. 2.

2. Вѣнчикъ съ б. или м. длинной трубкой—ворончатый или колокольчатый.

Asperula.

Вѣнчикъ съ очень короткой трубкой, плоскій—колесовидный.

Galium.

368. Sherardia Dill.

Чашечка о 6 зубцахъ; вѣнчикъ 4-лопастный, съ длинной трубкой, ворончатый; плодъ сухой о 2 долькахъ.

883. *S. arvensis* L. Пет. Кр. II, стр. 15. — Пет., стр. 278 — Кауф. II, стр. 278. — Кауф. I, стр. 227. — Гор., № 40. — Цин., № 641. — Pal., № 237.

Корень веретеновидный; стебель б. ч. вѣтвистый, лежащій, шероховатый отъ шпиковъ по угламъ; листья колюче-острые, нижніе лопатчатые — по 4 въ мутовкѣ, верхніе ланцетные — по 6; цвѣты въ головчато-собранныхъ полузонтикахъ, съ оберткой изъ 8—10 внизу сросшихся листьевъ; вѣнчикъ лиловый; плодъ шероховатый, на вершинѣ зубчатый; однолѣтнее растеніе

Найдено Нетупскимъ въ питомникѣ Финтельмана, бывшемъ въ Новой слободѣ. Занесенное растеніе.



Sherardia arvensis.

¹⁾ K. Schumann, Natürlich. Pflanzenfam. IV. 4, p. 16.

²⁾ Въ описаніи всѣ члены листовой мутовки именуются, краткости ради, листьями; при характеристикѣ послѣднихъ всегда подразумѣваются стеблевые листья.

369. *Aspérula* L.

Чашечка не развита; вѣничекъ съ б. или м. длинной трубкой — ворончатый или колокольчатый; плодъ сухой о 2 долькахъ.

1. Завязь и плоды съ частыми крючковатыми щетинками; соцветіе конечное изъ немногихъ полузонтиковъ. *A. odorata* L.

Завязь и плоды голые или съ рѣдкими прямыми щетинками. 2.

2. Стебель и листья по краямъ и жилкѣ остро-шероховатые, цѣпкіе, вѣничекъ колокольчатый. *A. rivalis* Sibth. et Sm.

Стебель гладкій, голый или мохнатый. 3.

3. Вѣничекъ колокольчатый, съ трубкой вдвое короче отгиба о 4 лопастяхъ; листья по 6—7 въ мутовкѣ. *A. galioides* MB.

Вѣничекъ ворончатый. 4.

4. Стебель прямой голый; вѣничекъ бѣлый, б. ч. о 3 лопастяхъ, равныхъ трубкѣ или короче ея. *A. tinctoria* L.

Стебель лежачій, мохнатый; вѣничекъ желтовато-бѣлый о 4 лопастяхъ, равныхъ трубкѣ или длиннѣе ея. *A. humifusa* Bess.

884. *A. tinctoria* L. Пет. Кр. II, стр. 9. — Пет., стр. 142. — Кауф. II, № 346. — Цин., № 642. — Рупр., стр. 86. — Кауф. I, стр. 225.



Asperula tinctoria.

Корневище ползучее, тонкое; стебель прямой, одиночный, вѣвистый, 4-гранный, 24 — 50 см.; листья по 4—6 въ мутовкѣ, линейные, до 2 мм. ш., острые или туповатые, по краямъ немного шероховатые; верхніе кроющіе листья полузонтиковъ яйцевидно-ланцетные; полузонтики въ рѣдкой метелкѣ, съ непарными вѣтвями; вѣничекъ бѣлый, ворончатый, 3 — 3,75 мм. дл., б. ч. о 3 лопастяхъ, равныхъ трубкѣ или короче ея; зрѣлые плоды крупно-морщинистые, голые, лоснящіеся, 1,75 — 2 мм. дл. Растеніе многолѣтнее.

По лѣсистымъ опушкамъ, на песчаной почвѣ. Цвѣтетъ съ половины мая до конца іюня. Въ Срп. у. часто: Лужки (К.). — Серпуховъ (Ч.). — Зиброво (Г.). — Борисово (М.). — Пикифорово (П.).

885. *A. galioides* MB. Пет. Кр. II, стр. 9. — Пет., стр. 142. — Кауф. II, № 349. — Цин., № 644. — Кауф. I, стр. 226. — Макс., № 145. — Hoff., № 1417.

Galium glaucum Jacq. Дв., № 164. — Hoff., № 1417. — Ad., p. 18. — St. II, p. 10.

Galium glaucum Mart. Макс., № 145. — Mart., p. 28.

Galium glaucum L. St. I, № 98.

Asperula galioides MB. Fl. taur.—cauc., I, p. 101 (1808).

Стебель прямой из восходящаго основанія, тупо 4-гранный, голый; листья по 6—7 въ мутовкѣ, линейные, со свернутыми краями, до 2 мм. ш.; соцветіе—метелка; вѣнчикъ бѣлый, колокольчатый, трубка его вдвое короче 4-лопастнаго отгиба; завязь голая.

α. glabra Wallr.

Стебель и листья голые. Находится въ гербаріи Кауфмана безъ указанія мѣстонахожденія.



Asperula galioides.



Asperula odorata.

886. **A. odoráta L.** Пет. Кр. II., стр. 9.—Бух. II, № 195.—Бух. I, № 185.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 124.—Кауф. II, № 347.—Цин., № 645.—Кауф. I, стр. 225.—Дв., № 152.—Макс., № 143.—Hoff. II., № 1003.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 27.—Ad., p. 75.—St. II, p. 10.—St. I, № 92.

Корневище ползучее, вѣтвистое, тонкое; цветоносные стебли (1—3) прямые, простые, гладкіе и голые, 4-гранные, 17—35 см.; листья по 6—10 въ мутовкѣ, тонкіе, мягкіе, съ колючкой на верхушкѣ, по краямъ съ слабими, къверху направленными шипиками; нижніе—мелкіе, обратно-яйцевидные или лопатчатые, сре́нне и верхніе—крупные, до 57 мм. дл. и 13 мм. ш., обратно-яйцевидно-ланцетные, тупые и ланцетные или острые на томъ же стеблѣ, или же всѣ листья ланцетные; при основаніи мутовокъ концы изъ короткихъ щетинокъ; соцветіе верхушечное изъ немногихъ полузонтиковъ; вѣнчикъ 2,75—6 мм. дл., бѣлый, съ трубкой короче 4-лопастнаго отгиба; плоды съ частыми крючковатыми щетинками, 3 мм. дл. Растеніе многолѣтнее по высыханіи пахучее.

Въ тѣнистыхъ лѣсахъ на богатой перегнойной почвѣ. Цвѣтеть съ половины мая до половины іюня. Кунцово, Воробьевы горы (К.).—Мож. у. (В.).—Пгнатъево, Клм. у. (П.).—Бисерово, Бгр. у. (П. П.).—Грачевники, Шебалы, Масловская гора, Пдл. у. (Б.).—Матюшино, Дмт. у. (В. К. Чефранова).

β. latifolia Marss.

Всѣ листья тупые, обратно-яйцевидно-ланцетные или продолговато-обратно-яйцевидные. Кунцово (К.).—Пгнатъево, Клм. у. (П.).

887. *A. rivális* Sibth. et Sm.

Asperula Aparine Schott. Пет. Кр. II, стр. 9. — Бух. II, № 196. — Бух. I, № 186. — Ф. О., № 6, p. 86. — Пет., стр. 142. — Кауф. II, № 348. — Цип., № 646. — Рупр., стр. 88. — Кауф. I, стр. 225. — Lind., p. 120. — Ann., C. I, № 26. — Дв., № 153. — Макс., № 144. — Mart., p. 27.

Asperula palustris Goldb. Hoff., № 1004. — Gold. C., p. 18.

Asperula rivalis Sibth. et Sm. Fl. gr. Prod. (1806), p. 87.

Корневище ползучее, тонкое; стебель вѣтвистый, до 120 см., острошероховатый и цѣпкій отъ частыхъ, книзу отогнутыхъ шишковъ по угламъ, почти крылатымъ; листья по 6—8 въ мутовкѣ, плотные, сверху лоснящиеся, острые или тупые, ланцетные или продолговатые обратно-ййцевидно-ланцетные, до 50 мм. дл. и до 9 мм. ш., на верхушкѣ съ колючкой, по краямъ и по жилкѣ снизу острошероховатые отъ частыхъ и крѣпкихъ, внизъ обращенныхъ шишковъ; полузонттики въ раскидистой метелкѣ; вѣнчикъ бѣлый, колокольчатый, 1.75—3 мм. дл., съ трубкой короче 4-лопастнаго отгиба; тычинки сидятъ въ звѣзъ вѣнчика; пылинки округлые или широко-эллиптическіе, но длинѣ не превышающіе двойной ширины пыльника; плоды мелко бородавчатые, голые, 1.25—1.75 мм. дл. Растеніе многолѣтнее.

Въ кустарникахъ по берегамъ рѣкъ и ручьевъ, очень часто. Цвѣтеть июль, августъ.



Asperula rivalis.



Asperula humifusa.

888. *A. humifúsa* Bess. Пет. Кр. II, стр. 10. — Кауф. II, стр. 229. — Цип., № 647. — Кауф. I, стр. 226. — Макс., № 146.

Galium humifusum MB. Дв., № 163. — Макс., № 146.

Стебель лежачій, съ частыми и длинными, къ верхушкѣ укорачивающимися вѣтвями, въ нижней части почти округлый, въ верхней ясно 4-гранный, мохнатый; листья по 6—8 въ мутовкѣ, плотные, узко-ланцетные, съ свернутыми краями, до 15 мм. дл. и до 2 мм. ш., колюче-острые, по краямъ и частью сверху съ шишками и съ обѣихъ сторонъ

съ не частыми мохнами; полузонтики многочисленныя, скупенныя, образующіе въ общемъ пирамидальную метелку; вѣничіе желтовато-бѣлый съ разбѣянными щетинками, коротко-ворончатый или ворончатый, 1.75—2 мм. дл., съ трубкой, равной 4-лопастному отгибу или немного короче его; завязь голая или съ разбѣянными прямыми щетинками. Растеніе многолѣтнее.

Вблизи ст. Выково, Моск.-Каз. ж. д., Бри. у., въ цвѣту 24 іюля 1897 г. (Куль.). Занесенное растеніе.

370. *Gálium L.*

Чашечка не развита. Вѣничіе 3—4-лопастный съ очень короткой трубкой, б. или м. плоскій, колесовидный. Плодъ сухой о 2 долькахъ.

1. Листья о 3 жилкахъ, по 4 въ мутовкѣ. 2.

Листья обѣ 1 жилкѣ. 3.

2. Листья мелкіе, наибольшіе на стеблѣ 20—40 мм. дл. и 4—8 мм. ш., линейно-ланцетные, ланцетные или продолговатые яйцевидно-ланцетные; завязь почти всегда съ частыми крючковатыми щетинками.

G. boreale L.

Листья крупныя, наибольшіе на стеблѣ 30—70 мм. дл. и 8—20 мм. ш., продолговато-яйцевидныя, яйцевидно-ланцетныя или продолговатые яйцевидно-ланцетныя; завязь голая или б. или м. крючковато-щетинистая.

G. rubioides L.

3. Листья на верхушкѣ безъ колючки, округлыя или притупленныя, по 4—6 въ мутовкѣ. 4.

Листья на верхушкѣ съ колючкой, острые или тупые, по 4—12 въ мутовкѣ. 5.

4. Вѣничіе о 4 лопастяхъ; цвѣтоножки голыя, гладкія.

G. palustre L.

Вѣничіе о 3 лопастяхъ; цвѣтоножки шероховатыя отъ вѣтвь обращенныхъ шишковъ.

G. trifidum L.

5. Стебель шероховатый отъ шишковъ по угламъ. 6.

Стебель гладкій, голый или пушистый. 9.

6. Вѣничіе 3—4.5 мм. въ поперечникѣ, шире плода; многолѣтнія растенія. 7.

Вѣничіе 0.75—1.5 мм. въ поперечникѣ, уже плода; растенія однолѣтнія. 8.

7. Цвѣты бѣлыя, въ сложныхъ полузонтикахъ, собранныхъ метельчато; листья мелкіе, дл. до 20 мм. *G. uliginosum L.*

Цвѣты зеленоватыя, въ простыхъ или двусложныхъ пазушныхъ полузонтикахъ; листья крупныя, дл. до 50 мм.

G. triflorum Michx.

8. Стебель заканчивается пучкомъ листьевъ; листья крупныя, до 50 мм. дл. *G. spurium L.*

Стебель заканчивается метельчатым соцветіемъ: листья мелкіе, до 10 мм. дл.

G. parisiense L.

9. Вѣнчикъ бѣлый, съ длинно-заостренными лопастями. 10.

Вѣнчикъ желтый или блѣдно-желтый. 11.

10. Листья зеленые, иногда сверху лоснящіеся: стебель по всей длинѣ 4-гранный, не хрупкій, лежачій, восходящій или прямо-стоящій.

G. Mollugo L.

Листья сѣро- или сине-зеленые, рѣже тусклые свѣтло-зеленые: стебель обыкновенно въ нижней части округлый, въ верхней 4-гранный, хрупкій, всегда прямо-стоящій.

G. Schultesii Vest.

11. Вѣнчикъ золотисто-желтый, лимонно-желтый или блѣдно-желтый, съ острыми или коротко-заостренными лопастями: листья линейные съ свернутымъ краемъ, иногда щетиновидные; стебель пушистый (какъ и вѣтви метелки) или голый; цвѣты сидятъ б. ч. скученно.

G. verum L.

Вѣнчикъ блѣдно-желтый: цвѣты не скучены. Остальные признаки частью средніе между *G. verum* и *G. Mollugo*, частью не измѣненные (чистые) того или другого вида.

G. Mollugo × *verum*.

889. *G. spurium* L.

Galium Aparine L. Мос., № 13. — Пет. Кр. II, стр. 11. — Пет., стр. 191. — Кауф. II, № 351. — Цинк., № 662. — Кауф. I, стр. 228. — Lind., p. 122. — Ann., С. III, № 224. — Дв., № 165. — Mart., p. 29. — Hoff., № 1414. — Ad., p. 80. — St. II, p. 10. — St. I, № 100. — Pal., № 244.

Galium infestum W. K. Макс., № 156. — Hoff. Н., № 1028. — Gold. C., p. 18.

Стебель лежачій, хрупкій, цѣпкій отъ частыхъ и крѣпкихъ книзу отогнутыхъ шишковъ по угламъ, надъ узлами жестко-волосистый, заканчивается пучкомъ листьевъ и достигаетъ выше 1 м.; листья по 6—9 въ мутовкѣ, линейно-ланцетные, до 50 мм. дл. и 6 мм. ш., колюче-острые, по краямъ и по жилкѣ съ частыми и крѣпкими внизъ обращенными шипиками; цвѣты лишь въ пазушныхъ сложныхъ полузонтикахъ, превышающихъ листья; вѣнчикъ зеленовато-бѣлый, не шире 1,5 мм., о 4 острыхъ лопастяхъ; плоды не длинѣе 3 мм., шире вѣнчика; растеніе однолѣтнее, цвѣтеть все лѣто.



Galium spurium.

α. typicum GB.

Galium Aparine L. *α. typicum* Kauffm. Кауф. II, стр. 231. — Кауф. I, стр. 228.

Galium Aparine L. *β. leiospermon* Wallr. Пет. Кр. II, стр. 11.

Плоды голые (рис. 1). Симоновъ монастырь (августъ 1888 г., Поповъ—въ гербаріи Моск. Студ. Кр. для изсл. Русск. флоры).

3. *Vaillantii* (DC.) Gren. et Godr.

Galium Aparine L. β . *Vaillantii* Koch. F. O., № 6, p. 86.—Кауф. II, стр. 231.—Цип., стр. 218.—Кауф. I, стр. 228.—Hoff. II., № 1028.

Galium Aparine L. α . *echinospermon* Wallr. Het. Kr. II, стр. 11.

Плоды съ частыми крючковатыми щетинками (рис. 2). На огородахъ, поляхъ и сорныхъ мѣстахъ, часто.

890. *G. parisiense* L.

Стебель не высокій, слабый, тонкій, съ длинными нитевидными вѣтвями, по угламъ остро-широковатый отъ внизъ направленныхъ шишковыхъ; листья по 4—6 въ мутовкѣ, линейно-ланцетные, колюче-острые, до 9 мм. дл., и до 1.5 мм. ш., по краямъ съ шишиками, вверхъ обращенными; цвѣты въ сложныхъ полузонтикахъ, боковыхъ и конечныхъ; вѣничикъ зеленовато-желтый, не шире 0.75 мм., о 1 туповатыхъ лопастяхъ; плодъ (обѣ дольки вмѣстѣ) около 1 мм. ш.—шире вѣничика; растеніе однолѣтнее.

α . *trichocarpum* Tausch.

Плоды съ крючковатыми щетинками.

β . *leiocarpum* Tausch.

Плоды голые, мелко-бородавчатые.

Обѣ формы найдены М. А. Максимовичемъ на Воробьевыхъ горахъ и хранятся въ его гербаріи подъ именемъ *G. uliginosum*; заносное растеніе.



Galium parisiense.



Galium uliginosum.

891. *G. uliginosum* L. Бух. II, № 198.—Бух. I, № 188.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 192.—Кауф. II, № 352.—Цип., № 652.—Pinz., p. 12.—Кауф. I, стр. 228.—Lind., p. 120.—Дв., № 159.—Макс., № 153.—Hoff. II., № 1053.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 28.—Ad., p. 79.—St. II, p. 10.—St. I, № 95.—Pal., № 240.

Корневище ползучее, нитевидное; стебель 10—80 см., тонкій—не болѣе 1 мм. въ поперечникѣ, б. ч. вѣтвистый, восходящій или лежащій,

остро-широховатый отъ внизъ обращенныхъ шишковъ по угламъ; листья по 5—8 въ мутовкѣ, ланцетные или линейно-ланцетные, до 19 мм. дл. и до 4 мм. ш., заканчиваются колючкой и несутъ по краямъ назадъ отогнутые шишки, сверху же часто еще два боковыхъ ряда впередъ направленныхъ шишковъ; цвѣты въ конечномъ и боковыхъ полузонтикахъ, иногда метельчато собранныхъ; вѣничикъ бѣлый 2,75—4,5 мм. ш., о 4 острыхъ лопастяхъ; плоды мелко-бородавчатые, голые, 1 мм. дл.; растение многолѣтнее.

Цвѣтеть все лѣто. По сырмъ лугамъ и кустарникамъ, берегамъ, канавамъ и окраинамъ болотъ, очень часто.

892. *G. palústre* L. Бух. II, № 201. — Бух. I, № 191. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 192. — Кауф. II, № 353. — Цип., № 653. — Кауф. I, стр. 228. — Lindl., p. 120. — Др., № 156. — Макс., № 149. — Hoff. II, № 1936. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 27. — Hoff., № 1421. — Ad., p. 76. — St. II, p. 10. — St. I, № 93.



Galium palustre.

Корневище нитевидное, ползучее; стебель слабый б. или м. широко-оватый отъ внизъ направленныхъ шишковъ по угламъ; листья по 4—6 въ мутовкѣ, на верхушкѣ безъ колючки, округлые или притупленные, по краямъ и жилкѣ снизу съ мелкими внизъ направленными шишками или почти гладкіе; сложные полузонтики собраны б. ч. въ рѣдкую метелку; вѣничикъ бѣлый, о 4 острыхъ лопастяхъ; плодоножки гладкія, прямые; плоды голые, гладкіе или мелко-бугорчатые; растение многолѣтнее.

Цвѣтеть въ юнѣ и юлѣ (въ тѣнистыхъ мѣстахъ иногда до конца августа); плоды съ половины юля. На болотистыхъ лугахъ, по болотамъ, по берегамъ рѣкъ и озеръ, по канавамъ и сырмъ лѣсамъ, очень часто.

а. *týpicum* GB.

Стебель 10—70 см. выш., 0,5—1 мм. въ поперечникѣ; листья линейные, линейно-клиновидные или узко-эллиптическіе, средние стеблевые 5—20 мм. дл. и 0,75—3 мм. ш.; вѣничикъ 2,5—3,5 мм. ш.; плоды 1—1,25 мм. дл. Въ болотистыхъ лѣсахъ встрѣчается форма *latifolium* Lange съ листьями болѣе тонкими, эллиптическими или широко ланцетными, средними стеблевыми 9—17 мм. дл., 3—5 мм. ш. и малоцвѣтковыми полузонтиками.

б. *máximum* (Moris) H. Br.


Болѣе мощное растение; стебель часто колѣнчато-восходящій. 25—75 см. выш., 0,75—1,5 мм. въ поперечникѣ; листья линей-

ные, линейно-ланцетные или эллиптические, средние стеблевые 12—20 мм. дл., 2—5 мм. ш.; вѣтчикъ до 5,25 мм. ш.; плоды 1,5—2,5 мм. дл. Сюда принадлежатъ 2 тѣневые формы: *umbrosum* Aschers. Листья тонкіе, эллиптические или ланцетные, средние стеблевые 16—30 мм. дл., 4—7 мм. ш.; полузонтики малоцвѣтковые; при слабо выраженныхъ соцвѣтияхъ эта форма часто встрѣчается съ пышнымъ развитіемъ облиственныхъ вѣтвей въ верхней части стебля, и такіа вѣтви отличаются листьями болѣе мелкими, обратно-яйцевидными, широко-эллиптической и округлой формы. По сырымъ лѣсамъ, въ тѣнистыхъ мѣстахъ по берегамъ рѣкъ и озеръ. Другая форма: *tenerifrons* (Choroschkov. *) Листья тонкіе, линейно-ланцетные, средние стеблевые 20—30 мм. дл., 2—4 мм. ш.; полузонтики малоцвѣтковые. Михневское озеро, Бри. у., въ ольшаникѣ (С.).

893. *G. trifidum* L. Хор. II, стр. 19. — Пет. Кр. II, стр. 11. — Ф. Б., № 38. — Пет., стр. 192. — Кауф. II, № 354. — Гор., № 41. — Цик., № 654. — Кауф. I, стр. 229. — Дв., № 157. — Маке., № 148. — Mart., p. 28. — St. II, p. 10.

Стебель тонкій, ползучій, очень вѣтвистый, по угламъ шереховатый отъ внизъ направленныхъ шипиковъ; листья по 4—5 въ мутовкѣ, линейные или узко-эллиптические, обыкновенно 6—11 мм. дл., 0,75—1,5 мм. ш., или продолговатые обратно-яйцевидно-ланцетные, до 19 мм. дл. и 4 мм. ш. (тѣневая форма), на верхушкѣ округлые или тупые, безъ колючки, по краямъ и по жилкѣ снизу съ рѣдкими шипиками; полузонтики б. ч. простые, 2—3-цвѣтковые, пазушные; цвѣтоножки съ шипиками, кинзу отогнутыми; вѣтчикъ бѣлый 1—1,35 мм. ш., о 3 островатыхъ или тупыхъ лопастяхъ; плодоножки шпитевидны, согнутыя дугой, 3—12 мм. дл.; плоды голые, гладкіе, 1—1,25 мм. дл.; растеніе многолѣтнее.

Цвѣтетъ все лѣто; плоды съ конца іюля. По торфянымъ болотамъ не рѣдко. Кушанин. Бгр. у. (Мар.).—Захарково (К.).—Косино, Мытищи, Озерное (П. и С.).—Медвѣжки озеро, Бгр. у. (П.).—Ольгино, Знаменское, Мож. у. (Ф. Б.).—Близъ Чижова (Куль.).—Гуково озеро, Бгр. у. (Х.).—Ст. Удѣльная, Каз. ж. д. Бри. у. (С.).—Въ гербаріи Мавенцова хранятся 3 листа *G. trifidum* безъ указанія мѣстонахожденія.



Galium trifidum.

*) *Galium palustre* L. β . *maximum* (Moris) H. Br. var. *tenerifrons* Choroschkov.

Folia tenera, lineari-lanceolata, media caulina 20—30 mm, longa, 2—4 mm. lata; cymae parviflorae.

894. *G. triflorum* Michx. Пет. Кр. II, стр. 10. — Бух. II, № 202. — Ф. Б., № 37. — Бух. I, № 192. — Ф. О., № 6, p. 86. — Пет., стр. 191. — Кауф. II, № 350. — Мил., № 17. — Цин., № 659. — Кауф. I, стр. 227. — Анн., С. II, № 129.

Galium umbrosum Dwigub. Дв., № 160.

Galium bryophyllum Goldb. Макс., № 157. — Hoff. H., № 1014.

Стебель лежачий, 30 — 85 см., б. ч. простой, съ разсыянными тонкими шипиками по угламъ; листья по 6 въ мутовкѣ, тонкіе, плоскіе.



Galium triflorum.



Galium Schultesii.

коротко-заостренные, по краямъ съ шипиками, вверхъ направленными; средніе—б. или м. крупныя, до 50 мм. дл. и 13 мм. ш., ланцетныя или эллиптическіе; нижніе—мелкіе, обратно-яйцевидныя; цвѣты обыкновенно лишь въ пазушныхъ полузонтикахъ, простыхъ или двусложныхъ; вѣнчикъ зеленоватый (или зеленовато-бѣлый на открытыхъ мѣстахъ?) до 3.25 мм. ш., съ длинно-заостренными лопастями; плоды съ частыми крючковатыми щетинками. Наше растеніе есть типичное *G. triflorum* Michx., какъ оно встрѣчается въ Сѣв. Америкѣ и описано у Torrey и Gray (Fl. of North Am., II. 1. с. 23, 1841); растеніе многолѣтнее.

Цвѣтетъ съ половины іюня до половины августа; зрѣлыя плоды въ половинѣ августа. По сырмъ хвойнымъ лѣсамъ. Погонно-Тосинскій островъ (А.).—Русиново, Мож. у.; Скитъ близъ Сергіевскаго посада, Кочергино, Сенежское озеро, Дмит. у. (П.).—Куровка, Картуново и другія мѣста близъ Олыгина, Мож. у. (Ф. Б.).—Богородское (Мил.).—Иванино, Зви. у. (Ф. Б. и Г. С.).—Масловскій лѣсъ, Пдл. у. (Б.).

895. *G. Schultesii* Vest.

Galium silvaticum L. Ф. Б., № 39. — Пет., стр. 192. — Кауф. II, № 359. — Цин., № 214. — Pinz., p. 12. — Рупр., стр. 88. — Кауф. I, стр. 231. — Дв., № 162. — Макс., № 152. — Hoff. H., № 1047. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 28. — Ad., p. 77 et 78.

Корневище ползучее, длинное, съ короткими подземными побѣгами, б. ч. обѣ 1—2 разставленныхъ стебляхъ, широко-вѣтвистыхъ, всегда прямо-

стоящихъ, хрушкихъ, гладкихъ, голыхъ, въ нижней части округлыхъ, въ верхней 4-гранныхъ (рѣже по всей длинѣ округлыхъ или 4-гранныхъ). 30—100 см. выш.; листья по 6—10 въ мутовкѣ, сѣро- или сине-зеленые (снизу свѣтлѣе) или тусклые свѣтло-зеленые, обыкновенно плоскіе (на открытыхъ мѣстахъ съ б. или м. свернутымъ краемъ), по краямъ шероховатые отъ вверхъ направленныхъ шипиковъ, съ колючкой на верхушкѣ, острые или тупые, ланцетные или линейно-ланцетные (обычная форма), продолговатые съ суженнымъ основаніемъ, эллиптические и обратно-яйцевидно-ланцетные, средніе стеблевые 20—60 мм. дл., 3—11 мм. ш.; общее соцвітіе—б. ч. крупная метелка съ широко-отстоящими вѣтвями; цветоножки до распусканія цвѣтовъ прямые, не поникающія; вѣдчикъ бѣлый 3—6 мм. ш., о 4 длинно-заостренныхъ лопастяхъ; незрѣлые плоды гладкіе, съ голубоватымъ восковымъ налетомъ, въ зрѣломъ состояніи слабо-морщинистые, безъ голубоватаго налета, 1—1,75 мм. дл.; растеніе многолѣтнее.

Цвѣтетъ съ начала іюля до половины августа. По тѣнистымъ мѣстамъ, довольно часто.

896. **G. Mollugo L.** Пет. Кр. II, стр. 13.—Бух. II, № 199.—Бух. I, № 189.—Ф. О., № 6, р. 86.—Пет., стр. 192.—Кауф. II, № 358.—Цил., № 651.—Pinz., р. 12.—Кауф. I, стр. 230.—Lind., р. 120.—Дв., № 161.—Макс., № 150.—Hoff. H., № 1032.—Gold. C., р. 18.—Mart., р. 28.—Hoff., № 1420.—Ad., р. 77.—St. II, р. 10—St. I, № 97.

Galium Mollugo L. β. ochroleucum Kauffm. F. O., № 6, р. 86.—Кауф. II, стр. 234.—Кауф. I, стр. 230.

Galium Mollugo L. β. ochroleucum Fries. Пет. Кр. II, стр. 14.

Galium Mollugo L. γ. insubricum Rehb. Кауф. II, стр. 234.—Кауф. I, стр. 231.

Galium Mollugo L. β. angustifolium Leyss. Пет. Кр. II, стр. 14.

Galium Mollugo L. α. latifolium Leyss. Пет. Кр. II, стр. 14.

Galium Mollugo L. b. pubescens. Mart., р. 28.

Корневище ползучее, обыкновенно о многихъ стебляхъ въ 15—125 см., восходящихъ, лежачихъ или прямо-стоящихъ, 4-гранныхъ, гладкихъ и голыхъ, какъ и вѣтви метелки (очень рѣдко—опушенныхъ: герб. Моск. Сельск. Хоз. Ист. и герб. Д. II. Сырейщикова). Листовыя мутовки при основаніи иногда съ рѣдкимъ кольцомъ короткихъ щетинокъ; листья зеленые, иногда слегка лоснящіеся, на верхушкѣ съ колючкой, тупые (б. ч.) или острые, по краямъ съ шипиками, вверхъ направленными, съ обѣихъ сторонъ гладкіе и голые, плоскіе или съ б. или м. свернутымъ краемъ (рѣдко и единично щетиновидные); средніе стеблевые по 6—9 въ мутовкѣ, разнообразной формы: отъ линейныхъ до продолговатыхъ обратно-яйцевидныхъ, мелкихъ или крупныхъ, 4—53 мм. дл. и 0,75—7 мм. ш.; сложные полусложники собраны въ метелку, узкую или широкую, съ пер-



Galium Mollugo.

вичными и вторичными вѣтвями обыкновенно разставленными и отходящими от стебля подъ б. или м. острымъ угломъ (очень рѣдко горизонтально-отстоящи—герб. В. М. Кулькова); цветоножки 0,5—1 мм. дл.; цвѣты сидятъ свободно или (рѣже) сжато; вѣничекъ 2,5—4,5 мм. ш., о 4 б. или м. лимонно-заостренныхъ лопастяхъ, бѣлый (очень рѣдко слегка желтоватый—герб. Д. Н. Сырейщикова); плоды голые, слабо-морщинистые или гладкіе, 1—1,5 мм. дл.; растение многолѣтнее.

Цвѣтеть съ конца мая до половины августа и, при благоприятныхъ условіяхъ, еще въ сентябрѣ (первое цвѣтеніе многолѣтника); плоды съ первой половины іюля. На лѣсныхъ опушкахъ, по кустарникамъ, у дорогъ, на открытыхъ склонахъ и известнякахъ, очень часто. *)

897. *G. verum* L. Бух. II, № 197. — Бух. I, № 187. — Ф. О., № 6, p. 86. — Пет., стр. 192. — Кауф. II, № 357. — Цин., № 660. — Pinz., p. 12. — Кауф. I, стр. 230. — Lind., p. 122. — Ann., C. II, № 130. — Дв., № 160. — Макс., № 151. — Hoff. H., № 1056. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 28. — Ad., p. 77. — St. II, p. 10. — St. I, № 96. — Pal., № 241.

Galium verum L. b. luteum. Mart., p. 28.

Корневище ползучее, обь 1—многихъ, крѣпкихъ стебляхъ въ 20—90 см., восходящихъ или прямостоящихъ, въ нижней и средней части почти округлыхъ, въ верхней—4-гранныхъ или по всей длинѣ гранистыхъ; листья по 6—12 въ мутовкѣ, плотные, сверху часто лоснящіеся, колюче-острые, по краямъ и иногда сверху съ короткими шипиками, линейные, съ б. или м. свернутыми краями, часто до полной щетиновидности; средіе стеблевые 7—45 мм. дл. и до 3,5 мм. ш.; сложные полусонтики собраны въ метелку—густую или рѣдкую, съ вѣтвями б. ч. длиннѣе междоузлій; цвѣты сидятъ б. ч. скученно; вѣничекъ золотисто-желтый, лимонно-желтый или блѣдно-желтый, 2,5—4 мм. ш., о 4 острыхъ или коротко-заостренныхъ лопастяхъ; плоды слабо-морщинистые или гладкіе, 1 мм. дл.; растение многолѣтнее.



Galium verum.

Цвѣтеть съ начала іюня до первой половины августа; плоды съ конца іюля. На лугахъ, лѣсныхъ опушкахъ и полянахъ, по кустарникамъ и на открытыхъ склонахъ, преимущественно на песчаной почвѣ; часто.

α. trachycarpum DC. Prodr., p. 603 (1830).

Galium verum L. *β. lasiocarpum* Ledeb. Цин., стр. 217.

Galium ruthenicum Willd.

Плоды опушенные.

*) *G. Mollugo* L. представлено въ Московской губ. цѣлымъ рядомъ формъ (около десяти), но оцѣнить и опредѣлить ихъ, при существующей, крайне противорѣчивой литературѣ, возможно лишь при помощи большого западно-европейскаго гербарнаго матеріала и опредѣленно направленныхъ культуръ.

3. *leiocárpum* Ledeb. Lind., p. 122.

Плоды голые.

Объ эти разновидности встрѣчаются какъ съ голыми стеблемъ, вѣтвями метелки и исподомъ листьевъ = *f. leiophyllum* Wallr., такъ и съ опушенными = *f. trachyphyllum* Wallr.

G. Mollugo × **vérum**.


Вѣничикъ бѣдно-желтый, съ лопастями длинно-заостренными, коротко-заостренными и острыми, или же (рѣже) вѣничикъ почти бѣлый съ лопастями острыми и коротко-заостренными; листья относительно короче и шире, чѣмъ у *G. verum*, отъ линейно-ланцетныхъ до продолговатыхъ, суженныхъ къ основанію, снизу голые; метелка не густая и цвѣты сидятъ не скученно; остальные признаки—общіе съ *G. Mollugo* и *G. verum*, безъ замѣтнаго преобладанія того или другого вида.

Подушкико. Зв. у. (X.).—Михнево, Бри. у.; Бочманово, Кэм. у. (С.).

898. **G. rubioides** L. Хор. II, стр. 19. — Мос., № 14. — Пет. Кр. II, стр. 12. — Пет., стр. 192. — Кауф. II, № 356. — Цин., № 657. — Pinz., p. 12. — Рупр., стр. 87. — Кауф. I, стр. 230. — Lind., p. 122. — Ann., G. V, № 28. — Дв., № 154. — Макс., № 147. — Mart., p. 27. — Ad., p. 75

Galium boreale × *rubioides*. Pinz., p. 12.

Корневище ползучее объ 1—3 стебляхъ, крѣпкихъ, прямостоящихъ или колѣчато-восходящихъ въ 35—90 см. и до 2,5 мм. въ поперечникѣ, б. или м. шероховатыхъ отъ короткихъ крючковатыхъ щетинокъ на углахъ и еще болѣе мелкихъ щетинокъ (пушокъ) на плоскостяхъ или (рѣдко) гладкихъ и голыхъ; 4-листные мутовки съ кольцомъ короткихъ щетинокъ при ихъ основаніи, иногда очень слабо развитымъ; листья плотные о 3 (рѣдко и единично о 4—5) жилкахъ, на верхушкѣ безъ колючки, тупые или притупленные, самые крупные на стеблѣ 30—70 мм. дл. и 8—20 мм. ш., продолговато-йцевидные, яйцевидно-ланцетные или продолговатые яйцевидно-ланцетные, по краямъ всегда съ щетинками вверхъ направленными, на жилкахъ снизу съ рѣдкими щетинками, рѣже почти голые; общее соцвѣтіе — метелка съ скученными или разставленными вѣтвями; цветоножки 0,75—6 мм. дл., цвѣты сидятъ сжато или свободно; оси полузонтиковъ и ихъ верхніе кроющіе листья голые, рѣже съ рѣдкими щетинками; вѣничикъ 3—5,5 мм. ш., бѣлый, о 4 лопастяхъ, острыхъ, туповатыхъ или грубо-заостренныхъ; зрѣлые плоды крупно-морщинистые отъ сжавшихся стѣнокъ на спинѣ и бокахъ, долекъ 2,25—3 мм. дл.; дольки слабо-вогнутыя



Galium rubioides.

съ брюшной стороны; съмена гладкія согнутыя. 2 — 2,5 мм. дл.; особи этого вида несутъ обыкновенно мало развитыхъ плодовъ и съмятъ: ¹⁾ растеніе многолѣтнее.

Цвѣтетъ съ половины іюня до половины августа; плоды съ конца іюля. На заливныхъ лугахъ, въ лѣсахъ, кустарникахъ и на известнякахъ, не рѣдко.

α) *trichocarpum* Choroschkov. ²⁾

Galium boreale L. β. *Pseudo-rubroides* Schur. Enum. pl. Transsylv., p. 280.

Плоды б. или м. крючkovато-щетинистые.

β. *leiocarpum* Choroschkov. ³⁾

Плоды совершенно голые.

899. *G. boreale* L. Пет. Кр. II, стр. 12.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 192.—Кауф. II, № 355.—Цин., № 658.—Кауф. I, стр. 229.—Lind., p. 122.—Ann., C. IV, № 16.—Дв., № 168.—Hoff. H., № 1013.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 29.—Hoff., № 1415.—Ad., p. 79.—St. II, p. 10.—St. I, № 99.—Pal., № 243.

Galium boreale L. α. *typicum* Kauffm. Бух. II, № 200.—Бух. I, № 190.—Кауф. II, стр. 232.—Кауф. I, стр. 229.

Galium boreale L. β. *hyssopifolium* Kauffm. Кауф. II, стр. 232.—Кауф. I, стр. 229.

Galium hyssopifolium Hoffm. F. O., № 6, p. 86.—Дв., № 155.—Hoff. H., № 1027.—Mart., p. 27.

Galium Rubroides L. β. *Hyssopifolium* Hoffm. (inv. Henning). Макс., № 147.

Корневище ползучее, объ 1—многихъ стебляхъ, крѣпкихъ, прямо-стоящихъ, 25—75 см., въ поперечникѣ 0,75—2 мм., б. или м. шероховатыхъ отъ короткихъ крючkovатыхъ щетинокъ на углахъ и еще болѣе мелкихъ щетинокъ (пушковъ) на плоскостяхъ или (очень рѣдко) гладкихъ, голыхъ; 4-листные мутовки съ кольцомъ короткихъ щетинокъ при ихъ основаніи, иногда очень слабо развитымъ; листья плотные, о 3 жилкахъ, на верхушкѣ безъ колючки, тупые или притупленные, самые крупные на стеблѣ 20—40 мм. дл. и 4—8 мм. ш., линейно-ланцетные, ланцетные, продолговатые яйцевидно-ланцетные или (рѣже) яйцевидно-ланцетные, по краямъ всегда съ щетинками, вверхъ направленными, на жилкахъ снизу съ частыми или рѣдкими щетинками, рѣже почти голые; общее соцвѣтіе—метелка съ скупенными или разставленными вѣтвями; длина цвѣтоножекъ 0,5—3 мм.; цвѣты



Galium boreale.

¹⁾ Въ культурахъ *G. rubroides* L. въ ботаническомъ саду Моск. Университета осенью 1909 г. я не нашелъ ни одной особи съ развитыми плодами, несмотря на обильное цвѣтеніе лѣтомъ.

²⁾ *Galium rubroides* L. α. *trichocarpum* Choroschkov.

Fructus plus minusve uncinato-hispidi.

³⁾ *Galium rubroides* L. β. *leiocarpum* Choroschkov.

Fructus glaberrimi.

сидятъ скато; вѣнички 2,5—4,5 мм. ш., бѣлые, о 4-лопастяхъ—острыхъ, туповатыхъ или грубо-заостренныхъ; зрѣлые плоды съ стѣнками плотно прилегающими къ сѣмени, 1,5—2,5 мм. дл.; дольки съ брюшной стороны сильно вогнуты, обыкновенно полулунной формы; сѣмена гладкія согнутыя, 1,25—2,25 мм. дл.; растение многолѣтнее. *)

Цвѣтетъ съ конца мая до половины августа; плоды со второй половины іюля.

α. scábrum DC.

Плоды съ частыми крючковатыми щетинками; оси полузонтиковъ и ихъ верхніе кроющіе листья съ частыми или рѣдкими щетинками. На лугахъ, сухихъ лѣсныхъ опушкахъ и по кустарникамъ, часто.

β. hyssopifólium (Hoffm.) DC., non Kauffm.

Плоды совершенно голые. Ст. Удѣльная Моск. Каз. ж. д., Брл. у., на лѣсостѣбѣ (С.).

90 сем. Caprifoliáceae Juss.

Цвѣты обоеполые, правильные или неправильные; чашечка о 5-дольхъ или зубчикахъ; вѣнички сростнолепестный, 5-дольный или 5-лопастный, или же двугубый; тычинокъ 4—5, б. ч. выдающихся изъ вѣничка; завязь нижняя или полунижняя изъ 2—5 плодolistиковъ, 1—5-гнѣздная съ висцерными сѣмепочками; столбикъ глубоко- 2—5-раздѣльный, рѣже простой или рыльце сидячая; плодъ—ягода или костянка; сѣмя съ маленькимъ прямымъ зародышемъ въ мясистомъ бѣлѣ. Кустарники, рѣже многолѣтники съ супротивными листьями безъ прилистниковъ или съ прилистниками.

1. Листья непарно перистые.

Sambucus.

Листья простые или лопастные. 2.

2. Цвѣты попарно на общемъ цвѣтоносѣ. 3.

Цвѣты въ развѣсистомъ полузонтикѣ, въ кистяхъ или въ клубочкахъ. 4.

3. Крупные кустарники съ сочными ягодами; тычинокъ 5; чашечка о 5 мелкихъ зубчикахъ.

Lonicera.

Мелкій стелющийся кустарникъ съ сухими 1-сѣменными ягодами; тычинокъ 4; чашечка о 5 шиловидныхъ опадающихъ зубчикахъ.

Linnæa.

4. Цвѣты скучены клубочками или кистями; завязь 4-гнѣздная; плодъ—2-сѣменная ягода съ губчатой мякотью.

Symphoricarpus.

*) Разграниченіе видовъ *G. rubioides* и *G. boreale*, остается произвольнымъ,—какъ и у всѣхъ фитографовъ, пытавшихся удержать за упомянутыми Линнеевскими видами самостоятельное значеніе, такъ какъ *G. boreale* L. является связаннымъ съ *G. rubicoides* L. переходными формами подобно тому какъ послѣднее въ свою очередь съ *G. articulatum* Lam. (*G. geniculatum* Roem. et Schult.).

Цвѣты въ развѣсистыхъ полузонтикахъ; завязь 3-гнѣздная; плодъ—мясистая костянка съ сплюснутой косточкой.

Viburnum.

371. *Sambucus L.*

Чашечка съ 5 маленькими зубчиками; вѣничекъ правильный, б. ч. колесовидный, 5-раздѣльный; тычинокъ 5; завязь полунижняя, 3-гнѣздная; столбикъ очень короткій или его нѣтъ, и тогда три сидячія рыльца; плодъ—мясистая костянка съ 3 косточками.

1. Стебель травянистый, однолѣтній; прилистники листовидные, яйцевидно-ланцетные. *S. Ebulus L.*

Кустарникъ; прилистниковъ нѣтъ или они въ видѣ бородавочекъ. 2.

2. Цвѣты въ торчащей густой яйцевидной метелкѣ; ягоды ярко-красныя; сердцевина вѣтокъ буроватая. *S. racemosa L.*

Цвѣты въ плоскомъ щиткѣ; ягоды черныя; сердцевина вѣтокъ бѣлая. *S. nigra L.*

900. *S. Ebulus L.* Пет. Кр. II, стр. 7. — Пет., стр. 269. — Кауф. II, № 341. — Цин., № 633. — Кауф. I, стр. 222. — Дв., № 327. — Макс., № 310. — Gold. C., p. 19. — Gold. Sp., p. 124. — Mart., p. 57. — Pal., № 593.

Корневище толстое, бѣлое, ползучее; стебли однолѣтніе, травянистые, до 1.5 м., бороздчатые, простые или вѣтвистые, слабо опушенные,



Sambucus Ebulus.

какъ и все растение; листья непарноперистые, о 7—9 листочкахъ, срединный черешокъ съ желобкомъ; листочки на очень короткихъ черешкахъ, яйцевидно-ланцетные или ланцетные, заостренные, съ неравнобокимъ основаніемъ, по краямъ пильчатые; прилистники походятъ на листочки, но очень маленькіе; всѣ цвѣты на цветоножкахъ въ зонтикообразномъ торчащемъ щиткѣ, вѣтвление котораго повторно-3-раздѣльное, послѣднее же вильчатое; вѣничекъ около 8 мм., бѣлый съ розоватымъ оттѣнкомъ, 5-лопастный, съ яйцевидными заостренными отогнутыми лопастями; тычинки вдвое длиннѣе вѣничка; пыльники сперва красныя, потомъ буро-красныя;

костянка около 4 мм., черная.

Разводится по садамъ, встрѣчается одичалымъ или заноснымъ. Цвѣтетъ съ июля. Воробьевы горы (герб. Гени.). — По известникамъ р. Пахры близъ с. Зеленаго, Брн. у. (С.).

* *S. nigra* L. Пет. Кр. II, стр. 7. — Пет., стр. 269. — Кауф. II, стр. 224. — Цин., № 634. — Кауф. I, стр. 222. — Lind., p. 120. — Дв., № 328. — Макс., № 311. — Mart., p. 57. — St. II, p. 19. — St. I, № 209. — Pal., № 594.

Кустарникъ или деревцо въ 2—6 м., съ свѣтло-бурой или сѣрой корой: годовалыя вѣтви съ чечевичками и съ бѣлой сердцевинкой; листья непарно-перистые, о 3—7 листочкахъ, главный черешокъ съ желобкомъ и часто у основанія съ зачатками прилистниковъ въ видѣ бородавочки; листочки на очень короткихъ черешкахъ, продолговато-эллиптические, суженные къ основанію и б. или м. длинно-заостренные, по краямъ пыльчатые, слабо опушенные или голые; плоскій цвѣтокъ дѣлится на 5 главныхъ вѣтвей; боковые цвѣты на послѣднихъ развѣтвленіяхъ сидятъ, остальные на ножкахъ; вѣтчикъ 6—9 мм., бѣлый или желтовато-бѣлый съ тупыми лопастями; пыльники желтые; костянка около 5 мм., лилово-черная.

Разводится по садамъ, страдаетъ отъ мороза. Цвѣтетъ въ іюнѣ.



Sambucus nigra.



Sambucus racemosa.

901. *S. racemosa* L. Sch. V, № 1575. — Пет. Кр. II, стр. 7. — Бух. II, стр. 23. — Пет., стр. 269. — Кауф. II, № 342. — Цин., № 635. — Кауф. I, стр. 222. — Дв., № 329. — Pal., № 595.

Sambucus rubra. Рупр., стр. 86.

Кустарникъ въ 2—3 м., съ красновато-бурой корой, на годовалыхъ вѣтвяхъ съ чечевичками и съ буроватой сердцевинкой; листья непарно-перистые, о 5—7 листочкахъ, у основанія съ 2 буровато-зелеными бородавочками вмѣсто прилистниковъ; листочки по краямъ пыльчатые, продолговато-овальные, заостренные, быстро суженные къ основанію, рѣдко основаніе ихъ почти округлое; вѣтви въ густомъ, торчащемъ яйцевидномъ соцветіи; вѣтчикъ около 4 мм., желтовато-бѣлый, съ округлыми или быстро-заостренными лопастями; пыльники желтые; костянка 4—5 мм., ярко-красная.

По лѣсамъ, кустарникамъ и часто разводится. Цвѣтетъ съ начала мая до половины іюня. Тюфелева роща, Братцово, Воробьевы горы (К.).—Сokolьники, Лосинный островъ: лѣса близъ ст. Удѣльная М.-Ряз. ж. д., Бри. у. (С.).—Близъ Михайловскаго въ лѣсу, Пдл. у. (Я. В. Байковъ).—Денисьево, Звл. у. (Х.).—Бочманово, Кзм. у. (П.).

α. serratifolia Hort.

Листочки глубоко надрѣзочно-зубчатые, рѣже почти перисто-надрѣзные. Иногда разводится по садамъ.

372. *Viburnum* L.

Чашечка съ 5 маленькими зубчиками; вѣтчикъ 5-надрѣзной, воронковидно-колокольчатый или въ безполыхъ цвѣткахъ съ вѣтчикомъ слегка неправильнымъ, колесовиднымъ; завязь нижняя, 3-гнѣзная; столбикъ короткій коническій, съ 2—3-раздѣльнымъ рыльцемъ; тычинокъ 5; плодъ—мясистая костянка, вслѣдствіе недоразвитія 2 гнѣздъ завязи, одногнѣзная, съ одною сплюсненною косточкою, оболочка которой хрищевато-кожистая.

* *V. Lantana* L. Пет. Кр. II, стр. 8.—Пет., стр. 303.—Цин., стр. 210.—Pal., № 588.

Кустарникъ 2—3 м. съ сѣрой корой; на годовалыхъ вѣтвяхъ кора свѣтло-бурая; молодыя вѣтви, листовые черешки, цвѣтоножки и нижняя сторона листьевъ покрыты сѣровато-бѣлымъ войлокомъ изъ звѣздчатыхъ волосковъ; листья овальные или яйцевидно-продолговатые, съ слегка сердцевиднымъ или округлымъ основаніемъ, коротко заостренные, по краямъ мелко-остропильтчатые, морщинистые, съ верхней стороны голые или слабо опушенные; черешки безъ железистыхъ бородавочекъ и безъ прилистниковъ; всѣ цвѣты обоюполые съ прицвѣтниками, въ конечныхъ вынуклыхъ щитковидныхъ полузонтикахъ; вѣтчикъ грязно-бѣлый, 6—8 мм.; костянка 7—10 мм., эллиптическая, нѣсколько сплюснутая, сначала свѣтло-зеленая, потомъ ярко-красная и, наконецъ, черная.



Viburnum Lantana.

Разводится по садамъ. Цвѣтетъ съ половины мая до половины іюня; плоды съ августа.

902. *V. Opulus* L. Бух. II, № 193. — Бух. I, № 183. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 303. — Кауф. II, № 343. — Цин., № 636. — Pinz., p. 12. — Кауф. I, стр. 223. — Lind., p. 120. — Дв., № 326. — Макс., № 309. — Golb. C., p. 19. — Mart., p. 56. — St. II, p. 19. — St. I, № 208. — Pal., № 589.

Высокій кустарникъ въ 2—5 м.; кора буроватая, на молодыхъ вѣтвяхъ бѣловато-сѣрая, иногда съ красноватымъ оттѣнкомъ; вѣтви, какъ

и листья, супротивные; послѣдніе б. ч. 3-лопастные, съ слегка сердцевиднымъ или суженнымъ основаніемъ; 2 боковыя лопасти часто, въ свою очередь, 2-лопастныя, тогда листъ кажется 5-лопастнымъ; края лопастей крупно-зубчатые, верхушка заостренная, верхняя сторона листьевъ ярко-зеленая, голая, нижняя—тусклая, слабо опушенная; черешки съ железистыми бородавочками; прилистники линейные, часто нитевидные; цвѣты пахучіе въ конечныхъ щитковидныхъ полузонтикахъ; краевые — безпалые, бѣлые, съ колесовиднымъ 5-лопастнымъ вѣнчикомъ, 10—20 мм. въ поперечникъ, лопасти его округлыя; средніе цвѣты обоеполые, желтовато-бѣлые, колокольчатые, 4—5 мм. дл., съ сильно выдающимися тычинками; костянка ярко-красная, 7—10 мм., горькая на вкусъ, съ непріятнымъ запахомъ.



Viburnum Opulus.

По кустарникамъ и дѣсамъ, часто. Цвѣтеть съ начала іюня; плоды съ начала августа.

373. Lonicéra L.

Чашечка съ 5 маленькими зубчиками; цвѣты сидятъ попарно, иногда срастаются завязями, каждая пара съ 2 прицвѣтниками и 4 округлыми прижатými чешуйками; вѣнчикъ ворончато-колокольчатый или чаще 2-губый, съ нѣсколько удлиненной трубкой, у основанія съ выпуклинной; верхушка верхней губы 4-лопастная, нижняя губа безъ лопастей; завязь нижняя, 2—3-гнездная; столбикъ длинный, съ головчатымъ рыльцемъ; тычинокъ 5; плодъ—сочная малосѣменная ягода.

1. Цвѣты почти правильные, ворончатые; завязи парныхъ цвѣтѣвъ совершенно срались; ягода сине-черная. *L. coerulea* L.

Цвѣты ясно двугубые; завязи срались только основаніемъ; ягоды красныя или желтовато-красныя. 2.

2. Листья и молодыя вѣтви б. или м. густо опушенные.

L. Xylosteum L.

Листья и вѣтви голые.

L. tatarica L.

903. *L. Xylósteum* L. Пет., стр. 216.—Кауф. II, № 344.—Цин., № 638. — Кауф. I, стр. 223.—Lind., p. 120.—Ду., № 230.—Макс., № 227.—Hoff. II., № 1601.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 40.—Hoff., № 1941.—St. II, p. 14.—St. I, № 151.—Pal., № 374.

Lonicera xylosteum L. Бух. II, № 194.—Бух. I, № 184.—F. O., № 6, p. 86.

Кустарникъ въ 1—3 м. съ сѣрой корой; листья на б. или м. короткихъ черешкахъ, цѣлюкрайніе, эллигическіе, обратно-яйцевидные.

рѣже продолговатые, нижніе иногда яйцевидно-округлые, съ основаніемъ округлымъ или суженнымъ и съ верхушкой б. ч. слегка заостренной, сверху зеленые или сѣро-зеленые, снизу сине-зеленые, съ обѣихъ сторонъ и по краямъ мягко-опушенные, какъ молодыя вѣтви, черешки и цветоносы; послѣдніе равны цвѣтамъ или въ полтора раза длиннѣе ихъ; вѣничикъ 10—15 мм. дл., снаружи и внутри опушенный, бѣлый или желтовато-бѣлый, потомъ желтѣетъ, иногда концы его долей снаружи розоватыя, отчего бутоны розоватые; завязи часто железисто-опушенные, сростись только основаніемъ; бѣлыя тычиночныя нити у основанія опушенные; ягоды ярко-красныя, шаровидныя.

По лѣсамъ и кустарникамъ, часто. Цвѣтетъ съ середины мая до середины іюня.


α. *syringifolia* GB.

Листья широко-яйцевидныя съ слегка сердцевиднымъ основаніемъ.

Ямской лѣсъ близъ Большого Бупькова, Бгр. у. (П.).



Lonicera xylosteum.



Lonicera tatarica.

* ***L. tatarica* L.** Пет., стр. 216. — Кауф. II, стр. 225. — Цин., № 637. — Кауф. I, стр. 223. — Дв., № 231. — Макс., № 228. — Hoff. II, № 1599. — Mart., p. 40. — Hoff., № 1940. — St. II, p. 14. — St. I, № 152. — Pal., № 373.

Кустарникъ въ 1,5—3 м. съ сѣрой корой, на молодыхъ вѣтвяхъ нѣсколько лоснящейся; листья яйцевидно-продолговатыя или яйцевидно-ланцетныя, туповатыя или заостренныя, съ округлымъ или слегка сердцевиднымъ основаніемъ, вѣдьнокрайніе, сверху зеленые, снизу сизоватыя, съ обѣихъ сторонъ голыя, какъ и все растение; черешки короткіе; цветоносы слегка утолщены къ цвѣтамъ, короче листьевъ; чашечка короче продолговато-ланцетныхъ прицвѣтничковъ; вѣничикъ 1,5.—2,5 см. дл., розовый, темно-розовый или бѣлый, снаружи голый, только въ трубкѣ съгнута опушенный; тычиночныя нити и столбикъ слегка опушенные; ягоды желтовато-красныя.

Разводится по садамъ. Цвѣтетъ съ половины мая до половины іюня.

904. *L. coerúlea* L.

Кустарникъ въ 1—1,5 м., б. ч. сильно вѣтвистый, съ красно-бурой корой; листья на очень короткихъ черешкахъ, овальные, продолговато-овальные, яйцевидные или обратно-яйцевидные, туповатые, съ нижней стороны сизоватые, съ обѣихъ сторонъ и по краямъ бархатисто-опушенные; цветоносы пушистые, короткіе, короче цвѣтовъ, но часто вдвое длиннѣе черешковъ листьевъ; завязи совершенно срослись между собой; вѣничекъ 10—13 мм., ворончатый, почти правильными, желтый или зеленовато-желтый, снаружи опушенный, особенно густо у основанія; ягоды эллиптическія сине-черныя, съ сизеватымъ налетомъ, безъ остающаеся чашечки.

По сырымъ лугамъ, очень рѣдко. Цвѣтетъ съ конца апрѣля до половины мая; плоды съ конца іюня. Близъ Дмитрова на сыромъ кощоватомъ лугу и въ низинѣ къ р. Яхромѣ на лѣвомъ берегу у дер. Спиридово, Дмит. у. (II. и X.).

*Lonicera coerulea.**Symphoricarpos racemosus.** *Symphoricárpus* Juss.

Чашечка 4—5-зубчатая; вѣничекъ ворончатый, почти правильный, 4—5-лопастный; завязь нижняя, 4-гнѣздная, изъ коихъ 2 гнѣзда съ нѣсколькими неразвивающимися сѣмечками и 2 съ одною висячею сѣмечкою въ каждомъ; столбикъ къ основанію толще, съ головчатомъ усѣченнымъ или 2-раздѣльнымъ рыльцемъ; тычинокъ 4—5; плодь—2-сѣменная, 4-гнѣздная ягода съ губчатой мякотью.

* *S. racemósus* Michx. Пет. Кр. II, стр. 8.

Кустарникъ въ 1—2 м., съ длинными отпрысками и нижними вѣтвями, часто лежащими на землѣ; листья яйцевидно-округлые, яйцевидно-продолговатые, овальные или эллиптическіе, съ округлымъ или слегка суженнымъ основаніемъ, тупые или быстро заостренные, цѣльнокрайніе, рѣже на сильныхъ отпрыскахъ зубчатые или выемчатые, сверху сине-

вато-темно-зеленые, снизу свѣтло-синеvато-зеленые, съ обѣихъ сторонъ голые; цвѣты въ конечныхъ головчатыхъ кистяхъ или колосьяхъ и иногда еще въ пазухахъ верхнихъ листьевъ по 1—2; вѣнчикъ 5—6 мм. дл., свѣтло- или темно-розовый, снаружи голый, внутри опушенный; голый столбикъ и тычинки заключены въ вѣнчикѣ; ягода бѣлая, около 10 мм. дл.

Разводится по садамъ. Цвѣтетъ съ начала іюня до осени.

374. *Linnaea Gronov.*

Чашечка 5-надрѣзная съ шнуровидными опадающими надрѣзами; вѣнчикъ ворончато-колокольчатый, слегка неправильный, 5-лопастный; нижняя лопасть крупнѣе остальныхъ; тычинокъ 4. ¹⁾ прикрѣпленныхъ у основанія вѣнчика, изъ нихъ 2 длиннѣе остальныхъ; завязь нижняя, 3-гнѣздная, одно гнѣздо съ одной сѣменочкой, остальные пустыя; столбикъ длинный, слегка согнутый съ головчатымъ рыльцемъ; плодъ—сухая, односѣменная ягода, сросшаяся съ прицвѣтниками.

905. *L. borealis* L. Пет. Кр. II, стр. 8. — Пет., стр. 214. — Кауф. II, № 345. — Пин., № 639. — Кауф. I, стр. 223. — Lind., p. 120. — Дв., № 617. — Макс., № 574. — Hoff. Н., № 4754. — Gold. С., p. 21. — Mart., p. 110. — Lib. Tr., p. 187. — Hoff., № 1912. — Lon., p. 282.

Степнойіся низкій кустарникъ съ главными очень тонкими, укореняющимся развѣтвленными стеблями въ 30—200 см. и боковыми прямостоящими или лежащими вѣточками до 20 см., съ прижатыми сѣрыми волосками; листья супротивные, зимующіе, слегка кожистые, округлые, 5—15 мм. дл. и 4—12 мм. ш., сужены въ короткій черешокъ, по краю рѣсничатые, молодые — покрыты рѣдкими волосками, нижняя половина ихъ цѣльнокрайняя, верхняя—съ 1—4 зубцами, верхняя сторона лоснящаяся, темно-зеленая, нижняя—свѣтло-зеленая; цвѣточныя стрѣлки железисто-опушенные, конечныя на боковыхъ вѣточкахъ оканчиваются 2 (1) ²⁾ повислыми цвѣтами на длинныхъ цвѣтоножкахъ, у основанія которыхъ два ланцетныхъ или линейно-ланцетныхъ прицвѣтника; на цвѣтоножкахъ въ 1—2 мм.



Linnaea borealis.

отъ завязи еще два болѣе мелкихъ прицвѣтника и у самой завязи еще

¹⁾ Въ гербаріи Гольдбаха имѣются экземпляры съ цвѣтами о 5 тычинкахъ, собранные имъ въ Горенкахъ въ 1818 году; пятая тычинка занимаетъ по длинѣ средину между короткими и длинными тычинками и по положенію своему не соответствуетъ нормальному положенію въ типѣ пятернаго цвѣтка *Carpifoliaceae*, а помѣщается въ промежуткѣ между длинной и короткой тычинкой.

²⁾ А. Н. Петунниковъ и я нашли въ лѣсу, близъ Михнева, Бри. у., экземпляры, стрѣлки которыхъ были съ четырьмя и тремя цвѣтками.

два зачатных и два очень маленьких округлых; завязь железисто-опушенная; вѣничикъ до 10 мм. дл., нахучій, бѣлый, внутри розовый или фіолетовый съ темно-розовой или фіолетовой росинкою; плодъ сухой.

По миннымъ хвойнымъ лѣсамъ. Цвѣтеть съ половины іюня до конца августа. Горенки (Мар.). — Серебряный боръ близъ Хорошова (Траутшюльте). — Измайлово; Завидово, Кн. у. (Ш.). — Серпуховъ (Рупр.). — Архангельское, Зви. у. (К.). — Денисьево, Зви. у.; Карачарово на Волгѣ, Кн. у. (Ш.). — Грибаново, Влк. у. (Ч.). — Медвѣжья пустынь на р. Сестрѣ, Дмит. у.; Бирево, Кн. у.; Раменское, лѣсъ близъ Михнева и ст. Удѣльной, Бри. у. (Ш. и С.).

Кромѣ общераспространенной форма еще:

α. micrántha Kauffm. Пет. Кр. II, стр. 8. — Кауф. II, стр. 226. — Кауф. I, стр. 224.

Цвѣты мелкіе; вѣничикъ вдвое длиннѣе чашечки или нѣсколько больше чѣмъ вдвое, или же рѣже едва длиннѣе ея.

Серебряный боръ близъ Хорошова. (К.).

91 сем. Adoxaceae Engl. *)

Цвѣты обоеполые въ конечной головкѣ, верхушечный цвѣтокъ съ колесовиднымъ 4-раздѣльнымъ вѣничкомъ и 2 (1)-лопастной чашечкой; боковые цвѣты съ 5-раздѣльнымъ вѣничкомъ и 3-лопастной чашечкой; тычинокъ въ верхушечномъ цвѣтѣ 4, въ боковыхъ по 5, по расщепленнымъ и прикрѣпленнымъ между долями вѣничка; на каждой части тычинки 2-гнездый пыльникъ; завязь полунижняя изъ 3—5 плодolistиковъ съ одною висцерою сѣменочкой въ каждомъ; нитевидныхъ столбиковъ 4—5, съ головчатыми рыльцами; плодъ—3—5-гнездая костянка съ остающимися столбиками и нѣсколько разрастающимися лопастями чашечки; косточекъ 1—5, съ маленькимъ зародышемъ и съ бѣлкомъ.


375. Adóxa L.

906. *A. moschatellína* L. Пет. Кр. II, стр. 7. — Бух. II, № 192. — Бух. I, № 182. — F.O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 131. — Кауф. II, № 310. — Цин., № 632. — Кауф. I, стр. 221. — Lind., p. 120. — Ann., C. I, № 25. — Дв., № 410. — Макс., № 387. — Hoff. II, № 3047. — Gold. C., p. 19. — Mart., p. 73. — Hoff., № 43. — St. II, p. 24. — St. I, № 275.

Корневище ползучее съ мясистыми чешуйками, у шейки луковичеобразно сближенными, съ длинными нитевидными побѣгами; стебель 5—15 см., съ 2 супротивными черешчатыми листьями выше середины; корневые листья на длинныхъ черешкахъ, тройчатые; листочки ихъ

*) О выдѣленіи въ семейство Adoxaceae см. работу А. Eichinger, Vergleichende Entwicklungsgeschichte von Adoxa und Chrysosplenium, München, 1907 (Sonderabdruck aus „Mitteilungen der Bayerischen Botanischen Gesellschaft“, 1907).

тоже на длинных черешках и въ свою очередь 3-лопастные, съ 2—3-надрѣзными лопастями или листочки глубоко- и неровно-лопастные; лопаст



Adoxa monschatellina.

пасти ихъ продолговато-обратно-яйцевидныя, тупыя, быстро переходя въ туповатый бѣлый кончикъ; стеблевые листья какъ листочки корневыхъ; все растеніе свѣтло-зеленое; цвѣты желто-зеленые съ мускуснымъ запахомъ, 3—6 мм. въ поперечникъ; при созрѣваніи плодовъ плодоножка сгибается.

По тѣнистымъ мѣстамъ и оврагамъ на перегнойной почвѣ. Цвѣтетъ съ конца апрѣля до половины іюня; плоды съ половины іюля.

Воробьевы горы, Кунцово, Лизаветино, Сокольники, Останкино (К.). — Петровское-Разумовское (Гей.). — Мытищи, Лосинный островъ, оврагъ между Ромашковымъ и Шулгинымъ; Мухино—оврагъ у Москвы р., Вер. у.; Боровскій курганъ, Бри. у. (С.). — Клементьево,

Руж. у. (Сюз.). Близъ Михайловскаго по тѣнистымъ обрывамъ р. Нахры. Подл. у. (Б.). — Роща близъ Пгнатьева, Км. у.; между Серпуховымъ и Лужками (П.).

92 сем. Valerianáceae DC.

Цвѣты обоеполые, рѣже двудомные, неправильные, не симметричныя; чашечка во время цвѣтенія мало замѣтная, позднѣе разрастается въ коронку или летучку; вѣнчикъ 5 (3—4)-лопастный съ колесовиднымъ отгибомъ и трубкою часто у основанія съ выпуклиной или короткой шпорою; тычинокъ 3 (или 1—4); завязь нижняя изъ 3 плодонетиковъ, 3-гнездная, но только одно гнездо съ одною висячею сѣмечкою, остальные —пустыя; столбикъ одинъ съ головчатымъ или 2—3-раздѣльнымъ рыльцемъ; плодъ односѣмennyй орѣшекъ безъ бѣлка съ прямымъ зародышемъ. Травы съ супротивными листьями безъ прилистниковъ.

376. Valeriána L.

907. *V. officinális* L. Пет. Кр. II, стр. 15.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 298.—Кауф. II, № 360.—Цин., № 667.—Кауф. I, стр. 232.—Lind., p. 122.—Ann., С II, № 131.—Дв., № 46.—Макс., № 44.—Hoff. H., № 317.—Gold. C., p. 17.—Mart., p. 8.—Hoff., № 8391.—Ad., p. 16.—St. II, p. 6.—St. I, № 24.—Pal., № 86.

Корневище какъ бы обрубленное, съ толстыми корнями, издаетъ сильный невяртный запахъ; стебель 50—150 см., б. ч. бороздчатый, въ нижней части покрытъ б. или м. густо волосками; листья непарноперистые, 6—12 парами; нижніе—на длинныхъ черешкахъ; верхніе—сидячіе или почти сидячіе съ полустеблеобъемлющимъ черешкомъ; листочки

ланцетные или линейно-ланцетные, заостренные или тупые, у верхних листьев цельнокрайние, у нижних — зубчатые или только по наружному краю зубчатые, к основанию листа листочки становятся мельче; цветы пахучие в конечном повторно-тройчато-вѣтвистомъ полузонтикѣ, у каждого вѣтвления два ланцетныхъ заостренныхъ прицѣвника съ бѣлымъ пленчатымъ и иногда рѣбчатымъ краемъ; у цветоѡвъ такіе же прицѣвники, но только мельче; чашечка едва замѣтная, свернута внутрь; вѣнчикъ розовый или лиловато-розовый, иногда почти бѣлый съ тупыми лопастями; пыльники желтые; орѣшки съ перистой летучкой, развивающейся изъ чашечки.

По болотамъ, опушкамъ, сырымъ лугамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ конца іюня до сентября.



Valeriana officinalis.



Valeriana officinalis *var. angustifolia*.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

2. **intermedia Rupr.** Пет. Кр. II, стр. 15. — Вух. II, № 203. — Вух. I, № 193. — Кауф. II, стр. 236. — Кауф. I, стр. 232.

Листочки ланцетные или широко-ланцетные, все съ обѣихъ сторонъ зубчатые; часто.

3. **angustifolia Wahlenb.**

Valeriana officinalis L. *var. angustifolia* Fries. Пет. Кр. II, стр. 15. — Кауф. II, стр. 235. — Кауф. I, стр. 232.

Все листочки цѣльнокрайние или у нижнихъ листьевъ узко-ланцетные и по наружному краю съ 1—3 широко-разставленными зубцами; у верхнихъ листьевъ листочки всегда цѣльнокрайние и часто линейные или узко-линейные. Звенигородъ (II). — Песчаные холмы за Лужками, Срп. у.; Боровскій курганъ, Брян. у. (С.).

4. **verticillata Zing.** Сыр. Отч. II, стр. 19. — Цин., стр. 219.

Все листья по 3, рѣже по 4 въ мутовкѣ. Серебряный боръ близъ Хорошова (II и С.). — Берегъ р. Серебрянки близъ Пушкина; берегъ р. Сѣтуни между ст. 17 верста Брянск. ж. д. и Ѳедосьинымъ, Зви. у. — по 4 листа (С.).

2. alternifolia Ledeb. Сир. Отч. II, стр. 19.—Пет. Кр. II, стр. 15.—Кауф. II, стр. 236.—Цил., стр. 219.—Кауф. I, стр. 232.—Макс., № 44.

Всѣ стеблевые листья или только нижніе очередные. Въ оврагѣ близъ Протопопова, Кзм. у. (Макс.).—Денисьево, Зви. у. (К.).—Болото по опушкѣ лѣса между Барвихой и Усовымъ, Зви. у.; лѣсъ между ст. Пушкино и Братовицкой; въ лѣсу по берегу р. Пахры между с. Зеленымъ и Песловымъ, Бри. у. (С.).

93 сем. Dipsacaceae Lindl.

Цветы обоюполые, собраны корзинкой съ общей оберткой: при каждомъ цветкѣ на общемъ цветоножкѣ по плечатому прицветнику или вмѣсто прицветника щетинки; чашечка двойная: наружная, состоящая изъ 2 вполне сросшихся и приросшихъ къ завязи предлестьевъ и выдающаяся надъ завязью въ видѣ коронки; другая — настоящая чашечка, б. ч. на тонкой ножкѣ надъ завязью, блюдцеобразная, по краямъ съ зубцами или съ щетинками, иногда при плодѣ образуетъ летучку; вѣничекъ ворончатый, опадающій, неравно—4—5-лопастный, иногда почти съ двугубымъ отгибомъ; часто наружные цветы въ головкѣ крупнѣе внутреннихъ; 4 тычинки, прикрепленные у основанія трубки, выставляются изъ вѣничка; пыльники колеблющіеся, вскрываются продольными трещинами; завязь нижняя, одногнѣздная, съ одною всячюю съменочкою; столбикъ 1 нитевидный, съ головчатымъ или 2-лопастнымъ рыльцемъ; плодъ—орѣшекъ съ остающеюся въ видѣ коронки чашечкой; зародышъ прямой въ бѣлкѣ. Травянистыя растения съ супротивными листьями безъ прилистниковъ.

1. Общее цвѣтоложе покрыто щетинками; внутренняя чашечка о 8 (и болѣе) щетиновидныхъ зубцахъ; орѣшекъ сплюснuto-4-гранный. *Knaútia.*

Общее цвѣтоложе съ плечатыми прицветниками, но безъ щетинокъ; внутренняя чашечка о 5 щетинкахъ или щетинистыхъ зубцахъ; орѣшекъ о 8 бороздкахъ или о 4 граняхъ и на каждой грани о 2 бороздкахъ. 2.

2. Всѣ цветы въ корзинкѣ одинаковые; вѣничекъ 4-лопастный, лиловый, сине-лиловый, розовый или бѣлый; листья цѣльные.

Succisa.

Красные цветы въ корзинкѣ съ неравными лопастями, крупнѣе среднихъ; вѣничекъ блѣдно-желтый; стеблевые листья перисто-раздѣльные. *Scabiosa.*

377. Knaútia Coult.

Общее цвѣтоложе безъ прицветниковъ, покрыто щетинками; вѣничекъ 4-лопастный; наружная чашечка б. ч. съ 4 короткими зубцами; внутренняя чашечка блюдчатая о 8 (до 16) щетиновидныхъ зубцахъ; орѣшекъ сплюснuto-4-гранный.


908. *K. arvensis* (L.) Coult. Пет. Кр. II, стр. 16. — Бух. II, № 204. — Бух. I, № 194. — Ф. О., № 6, p. 86. — Пет., стр. 206. — Кауф. II, № 361. — Цин., № 673. — Pinz., p. 13. — Lind., p. 122. — Ann., C. II, № 132.

Knautia arvensis Coult. α . typica. Бух. II, № 204 α . — Бух. I, № 194 α .

Trichera arvensis Schrad. Кауф. I, стр. 233.

Scabiosa arvensis L. Дв., № 148. — Макс., № 139. — Hoff. II., № 941. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 26. — Hoff., № 2853. — Ad., p. 73. — St. II, p. 10. — St. I, № 89. — Pal., № 229.

Корень веретенообразный; стебель 30 — 80 см., простой или въ верхней части вѣтвистый, покрытъ щетинистыми волосками, перемежающимися съ болѣе короткими мягкими и часто близъ цвѣтовъ железистыми; корневые листья и нижніе стеблевые продолговато-ланцетные или широко-ланцетные, заостренные и суженные въ черешокъ, по краямъ зубчатые, остальные стеблевые — перисто-раздѣльные, съ цѣльными или зубчатыми долями, коротко черешковые или сидячіе; всѣ — б. или м. густо покрыты щетинистыми волосками; цвѣточныя корзинки 1,5—4 см. въ поперечникѣ, плоско-выпуклыя, съ краевыми цвѣтами болѣе крупными; листочки обертки яйцевидно-продолговатые, заостренные; вѣничикъ лиловый (рѣдко бѣлый *); пыльники тоже лиловые.



Knautia arvensis.

По паровымъ полямъ, лугамъ и близъ жилья, очень часто. Цвѣтеть съ середины іюня до конца августа.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α . campéstris Bess.

Краевые цвѣты въ корзинкѣ такой же величины, какъ и срединыя.

β . integrifolia G. Mey.

Knautia arvensis L. β . integrifolia Coult. Бух. II, № 204 β . — Бух. I, № 194 β . — Кауф. II, стр. 237. — Цин., стр. 221.

Trichera arvensis Schrad. β . integrifolia Rupr. Кауф. I, стр. 233.

Knautia sylvatica Duby. Цин., № 674.

Scabiosa sylvatica Duby. Дв., № 149. — Макс., № 140. — Hoff. II., № 975. — Mart., p. 26. — Ad., p. 73 et 74. — St. II, p. 10. — St. I, № 90.

Всѣ листья продолговато-ланцетные или широко-ланцетные, зубчатые.

*) Аппенковъ нашелъ съ желтыми цвѣтами (var. *carpatica* Neuff.), а Чистяковъ на Сенежскомъ озерѣ нашелъ съ проросшими цвѣтами, т. е. обращенными въ побѣгъ, который состоялъ изъ 4 четырехраздѣльных вѣтвей, изъ коихъ одинъ несъ 4 тычинки, но заканчивался 2 рыльцами, завязь же вытянута въ длинное междоузліе.

γ. *bipinnáta* GB.

Всѣ листья перисто-раздѣльные, стеблевые—двойко-перисто-раздѣльные, или доли ихъ глубоко надрѣзочно-зубчатые. Воробьевы горы (II.).

378. *Succisa* Coult.

Общее цвѣтоложе съ пленчатыми прицвѣтниками; вѣтчикъ 4-лопастный; наружная чашечка чашевидная, волосистая, съ 4 травянистыми острыми и колющими зубцами; внутренняя чашечка блюдчатая съ 5 (4) щетиновидными зубцами; орѣшки призматическіе, 4-гранные, съ 2 бороздками на каждой грани.

909. *S. praemórsa* (Gilib.) Aschers.

Succisa pratensis Mocch. Бух. II, № 205. — Бух. I, № 195. — F. O., № 6, p. 86. — Пер., стр. 287. — Кауф. II, № 362. — Цви., № 678. — Кауф. I, стр. 234. — Lind., p. 122. — Ann., C. V, № 29.

Scabiosa Succisa L. Дв., № 147. — Макс., № 138. — Hoff. II., № 974. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 26. — Ad., p. 72-73. — St. II, p. 9. — St. I, № 88. — Pal., № 226.

Корневище короткое, косое, какъ бы обрубленное, съ толстыми корнями; стебель 50—120 см., простой или съ 2 супротивными цвѣтоносными вѣтвями, въ верхней части покрытъ прижатыми волосками, въ нижней части голый или покрытъ отстоящими волосками; корневые листья яйцевидно-эллиптическіе или ланцетные, заостренные, рѣже туповатые, сужены въ длинный черешокъ; стеблевые—въ 2—3 раздвинутыхъ парахъ, б. ч. ланцетные, съ сросшимися въ короткое влагалище черешками; самые верхніе—узколанцетные или почти линейные, сидячіе; всѣ цѣлюкрайніе или стеблевые иногда зубчатые; корзинки полусферовидныя съ краевыми цвѣтами такими же, какъ и срединные; листочки обертки ланцетные или широколанцетные, покрыты волосками; вѣтчикъ лиловый или сине-лиловый, снаружи опушенный.

Succisa praemorsa.

По лугамъ, кустарникамъ и лѣсамъ, часто. Цвѣтетъ съ конца іюня до сентября; плоды съ конца августа.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. *glabráta* (Schultz).

Все растение голое, исключая верхней части стебля.

β. *albiflóra* (Wildem. et Durand).

Цвѣты бѣлые.

γ. *rosiflóra*.

Цвѣты розовые.

379. *Scabiósa* L.

Общее цветоложе съ пленчатыми прицветниками; вѣничекъ б. ч. 5-лопастный; наружная чашечка почти цилиндрическая или колокольчатая со многими ребрышками, пленчатая, съ выемчато-зубчатымъ краемъ; внутренняя чашечка изъ 5 или болѣе щетинокъ, у основанія сросшихся; орѣшекъ съ 8 бороздками.

910. *S. ochroleúca* L. Пет. Кр. II, стр. 16.—Ф. Б., № 40.—Пет., стр. 271.—Кауф. II, № 363. — Цин., № 677. — Руур., стр. 62. — Кауф. I, стр. 234. — Дв., № 151. — Макс., № 142. — Mart., p. 26.—Ad., p. 74.—St. II, p. 10.—St. I, № 91.

Корень веретенообразный; стебель 30—80 см., въ верхней части вѣтвистый, иногда простой, густо покрытъ прижатыми мягкими волосками, рѣже въ средней части почти голый; пучки корневыхъ листьевъ и иногда нижние стеблевые эллиптическіе, узко-овальные или продолговатые, тупые, гороdkовые, сужены въ черешокъ, рѣже ланцетные; стеблевые листья перисто-раздѣльные или 2—3-перисто-раздѣльные, съ линейными туповатыми долями, у верхнихъ листьевъ конечная доля сильно удлиненная, иногда верхніе листья только 3-раздѣльные; всѣ—б. или м. густо опушенные; корзинки 1,5—3 см. въ поперечникъ, сперва почти полушаровидныя; листочки обертки ланцетно-линейные или узко-линейные, б. или м. густо-опушенные, особенно по краямъ; вѣничекъ свѣтло-желтый, снаружи коротко-опушенный; пыльники темно-желтые или свѣтло-оранжевые; щетинки внутренней чашечки рыжеватая, въ 3—4 раза длиннѣе наружной; плодовая корзинка яйцевидная; орѣшки покрыты волосками.



Scabiosa ochroleuca.

По песчанымъ и известняковымъ мѣстамъ, по опушкамъ и холмамъ. Цвететъ съ середины іюня весь июль; плоды съ середины іюля. По береговой полосѣ р. Оки, какъ въ Срп., такъ и въ Кзм. уу. — По берегу р. Лопаси у ж. д. моста, Срп. у., занесено (II.).

Порядокъ Campanulátae.

*** Cucurbitáceae Juss.**

Растенія одно- или двудомныя; цвѣты однополые съ чашевиднымъ цветоложемъ, къ которому прикрѣплена 5-раздѣльная или 5-лопастная чашечка, тычинки и вѣничекъ; послѣдній колокольчатый или колесовидный, 5-лопастный или 5-раздѣльный, въ почкосложеніи б. ч. складчато-

створчатый, опадающий вместе съ чашечкой; въ мужскихъ цвѣтахъ 5 тычинокъ, сросшихся попарно, и одна свободная или все 5 тычинокъ срослись въ одну колонку; пыльники извилистые, на каждой тычинкѣ двугрѣзная, отчасти сросшіеся; въ женскихъ цвѣтахъ завязь шнуровая, 3-грѣзная, изъ 3 мясистыхъ плодоносиковъ (рѣдко изъ 4—5), сросшіеся края которыхъ образуютъ 3 (4—5) толстыхъ 2-раздѣльныхъ сѣменоса, со многими сѣмепочками на каждомъ столбикѣ одинъ короткій съ 3 (4—5) мясистыми рыльцами, иногда въ женскихъ цвѣтахъ стаминодій; плодъ—ягода или ягодообразный, достигающій иногда очень большихъ размѣровъ, съ мясистымъ межлодонникомъ и сочнымъ внутренлодонникомъ; сѣмена б. ч. сплюснутыя съ прямымъ зародышемъ безъ бѣлка. Однолѣтнія, рѣже многолѣтнія лазящія растенія съ очередными листьями и съ одиночными усиками, сидящими близъ основанія черешка листьевъ.

1. Все 5 тычинокъ срослись въ булабовидную колонку; женскіе цвѣты съ 3 стаминодіями; усики вѣтвистые. *Cucurbita*.

Четыре тычинки срослись попарно, одна свободная; женскіе цвѣты безъ стаминодій; усики простые. 2.

2. Мужскіе цвѣты пучками; женскіе одиночные; надъ пыльниками выдается 2-раздѣльный связникъ; плодъ крупный, цилиндрическій или къ концамъ суженный, сперва зеленый, потомъ желтый. *Cucumis*.

Мужскіе цвѣты въ кистяхъ на длинномъ цвѣтоносѣ; женскіе—щиткомъ на короткомъ цвѣтоносѣ; связникъ не выдается; плодъ—шаровидная ягода съ тонкой кожурой. *Bryonia*.

* Cucúrbita L.

Растенія однодомныя; чашечка колокольчатая 5 (4—7)-лопастная; вѣничекъ колокольчатый, 5-лопастный; мужскіе цвѣты б. ч. одиночные; тычиночныя нити и пыльники срослись въ одну булабовидную колонку; рыльце б. ч. съ шпичками; женскіе цвѣты тоже одиночные съ 3 стаминодіями; завязь 3—5-грѣзная; рыльце 3—5 двуллопастныхъ; плодъ (тыква) б. ч. очень крупный, сочный, многосѣменный; сѣмена крупная, эллипсоидальная, сплюснутыя, съ толстымъ краемъ.

* С. Réro L. Пет., стр. 173.—Pal., № 2089.

Стебель 2—8 м., лежачій или лазящій, ребристый, покрытъ, какъ и все растеніе, жесткими, колюче-шершавыми волосками; листья крупные на длинныхъ торчащихъ черешкахъ, съ глубокимъ сердцевиднымъ основаниемъ, 5—7-лопастные, по краямъ мелко зубчатые; противъ основанія черешка листа 3—5-раздѣльный усикъ; цвѣтоножки тупо-5-гранныя; чашечка у мужскихъ цвѣтовъ близъ верхушки часто перетянута; вѣничекъ крупный, до 10 см., съ острыми лопастями; плодъ б. ч. очень круп-

ний, шаровидный или овальный, голый, зеленый, желтый или белый съ желтымъ, рѣже белымъ мясомъ.

Разводится по огородамъ. Цвѣтетъ съ іюня до конца августа; плоды съ августа.



Cucurbita Pepo.



Cucumis sativa.

* *Cúcumis* L.

Растенія однодомныя, рѣдко двудомныя; чашечка колокольчатая или съ трубка кубарчатая; вѣничекъ колесовидный или колокольчатый; мужскіе цвѣты пучками, очень рѣдко одиночныя; 4 тычиночныя нити срослись попарно, одна свободная; пасть пыльниковъ выдается 2-раздѣльный связникъ; женскіе цвѣты одиночныя; завязь 3 (рѣдко 5)-гнѣздная; рылецъ 3 (5) подковообразныхъ; плодъ съ 3 полными и 3 не полными перегородками, крупный многосѣмный, сочный; сѣмена яйцевидныя, сплюснутыя съ острымъ краемъ.

* *C. satíva* L. Пет., стр. 173. — Кауф. II, стр. 190. — Кауф. I, стр. 190. — Pal., № 2098.

Стебель лежачій или лазящій, голоче-шершаво-волосистый, какъ и все растеніе; листья 5-угольно-лопастные съ острыми неравно-зубчатыми лопастями, сердцевидные, съ узкою и глубокою выемкою у основанія; тычиночныя нити очень короткія; завязь колочая отъ короткихъ, сидящихъ на луковичкахъ волосковъ; плодъ крупный продолговатый, цилиндрическій или къ концамъ суженный, часто бородавчатый, сперва зеленый съ белымъ мясомъ, къ созрѣванію желтый. Разводится по огородамъ.

* *Bryónia* L.

Растенія одно-двудомныя; чашечка колокольчатая; вѣничекъ колокольчато-колесовидный, глубоко-5-раздѣльный; 4 тычиночныя нити срослись попарно, одна свободная; пыльники гладкія; завязь шаровидная, 3-гнѣздная; рыльца подковообразныя, сближенныя; плодъ—малосѣменная сочная ягода съ тонкой кожицей.

* *B. álba* L. Пет. Кр. II, стр. 186. — Пет., стр. 151. — Кауф. II, стр. 190. — Lind., p. 112. — Дв., № 898. — Макс., № 873. — Hoff. II., № 7666. — Gold. C., p. 23. — Gold. Sp., p. 139. — St. II, p. 54. — Pal., № 2100.

Растеніе однодомное; корень толстый, рѣдковидный, часто съ такими же боковыми толстыми корнями; стебли 2—4 м., гранитые, внизу голые, кверху покрыты жесткими волосками, перемежающимися съ маленькими булавовидными прозрачными волосками, легко обламывающимися; листья шершаво-коротко-волосистые на черешкахъ короче пластинки, съ сердцевиднымъ основаніемъ, дланевидно-3—5—7-лопастные, съ болѣе длинною конечною лопастью; лопасти почти треугольныя, зубчатая; противъ основанія черешка простой усикъ; нижній соцвѣтія мужскія въ кистяхъ на длинныхъ цвѣтоносахъ, верхній — женскія въ щиткахъ на короткихъ цвѣтоносахъ; вѣничекъ желтовато-зеленый съ зелеными жилками; доли его яйцевидныя, туповатая; женскіе цвѣты мельче мужскихъ; чашечка ихъ съ отогнутыми лопастями, почти равными вѣничку, отдѣлена отъ завязи короткой ножкой; рыльце голое; ягода 7—8 мм., сперва зеленая, потомъ черная съ зеленой мякотью и 4—6 яйцевидными сѣмечками.



Bryonia alba.

Разводится по садамъ, иногда дичаетъ. Цвѣтетъ съ начала іюня до половины августа; плоды въ августѣ.

94 сем. *Campanuláceae* Juss.

Цвѣты правильные, обоеполые; чашечка о 5 зубцахъ или 5 доляхъ; вѣничекъ колокольчатый или трубчатый, 5-лопастный или 5-надрѣзной, въ почкосложеніи створчатый, рѣже складчато-створчатый; тычинокъ 5, прикрѣпленныхъ къ основанію вѣничка или къ цвѣтоложу, свободныхъ или сросшихся основаніями, перѣдко расширенными; пыльники свободные или сомкнутые въ трубку, часто слипаются основаніями и вскрываются внутрь, и тогда пыльца выносятся изъ трубки волосками столбика; завязь нижняя изъ 3 (2—5) плодосетиковъ, 3 (2—5)-гнѣздная, съ срединнымъ сѣменосомъ и со многими сѣмечками въ каждомъ гнѣздѣ; столбикъ одинъ, съ слегка выемчатымъ рыльцемъ, или рылецъ столько, сколько плодосетиковъ; плодъ 3 (2—5)-гнѣздная коробочка, многосѣменная, вскрывается маленькими створками или дырочками съ очень маленькими клапанами близъ верхушки или у основанія плода; сѣмена очень мелкія съ прямымъ зародышемъ въ срединѣ бѣлка. Растенія съ очередными листьями безъ прилистниковъ, б. ч. съ млечнымъ сокомъ.

1. Цвѣты крупныя, колокольчатые или ворончатые, 5-лопастные съ треугольными лопастями. 2. Цвѣты мелкіе, глубоко-5-раздѣльные съ линейными долями, часто сдлиннѣвшими, собраны головками. 3. Столбикъ сильно выдается изъ вѣничка и вокругъ его основанія надпестичный кольцообразный или коротко-трубчатый дискъ.

Adenophora.

Столбикъ заключенъ въ вѣничекъ или едва выдается изъ него, безъ кольцообразнаго или коротко-трубчатого диска у основанія.

Campanula.

3. Тычиночныя нити съ расширенными основаніями; пыльники свободныя; доли вѣничка долго остаются сдлиннѣвшими и образуютъ изогнутую трубку.

Phyteuma.

Тычиночныя нити у основанія не расширены; пыльники срастлись основаніями; доли вѣничка скоро расходятся и не образуютъ изогнутой трубки.

Iasione.

380. *Iasione* L.

Чашечка глубоко-5-раздѣльная; вѣничекъ глубоко-5-раздѣльный съ линейными долями, отдѣляющимися одна отъ другой снизу вверхъ; тычинки свободныя, съ основаніями не расширенными; пыльники срастлись основаніями, верхняя ихъ часть свободная; завязь 2-гнѣздная; рыльце булабовидное, верхушка его слабо-2-лопастная; коробочка вскрывается на верхушкѣ двумя маленькими створками.

911. *I. montana* L. Пет. Кр. II, стр. 63.—Ф. Б., № 51.—Пет., стр. 204.—Кауф. II, № 466.—Цин., № 909.—Pinz., p. 14.—Кауф. I, стр. 305.—Borg., p. 700.—Дв., № 219.—Макс., № 204.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 38.—Hoff., № 1717.—Ad., p. 100.—St. II, p. 13.

Корень веретенообразный съ однимъ или нѣсколькими стеблями; послѣдніе 15—80 см., до половины густо покрыты листьями, голые или покрыты мягкими торчащими волосками; верхняя часть стебля, не покрытая листьями, голая, боковыя стебли короче срединнаго; нижніе листья продолговато-обратно-яйцевидные, суженные въ черешокъ, тупые; остальные—линейно-ланцетные, тупые или островатые; всѣ по краямъ волнисто-курчавые и то голые, то б. или м. густо покрытые торчащими волосками;*) головки густыя, всегда одиночныя, верхушечныя—съ оберточной изъ 10—20 яйцевидныхъ, часто слегка гороховыхъ листочковъ.

*) G. Beck различаетъ двѣ разновидности: *α. glabra* Peterm. и *β. hispida* GB. Первая должна быть голая или почти голая, вторая—густо покрыта волосками. Мнѣ приходилось наблюдать у насъ какъ ту, такъ и другую разновидность и всѣ переходы отъ одной къ другой, при чемъ обѣ разновидности росли вмѣстѣ.

А. А. Хорошковъ нашелъ близъ поселка Ново-Удѣльная, Бри. у., экземпляръ сильно вѣтвистый почти отъ основанія.

заостренныхъ, опушенныхъ, какъ и листья; доли чашечки линейныя; вѣличикъ голубой; пыльники до растрескиванія красно-фіолетовые; коробочка яйцевидная, 5-гранная.

По основнымъ лѣсамъ, опушкамъ, мемамъ и на песчаныхъ мѣстахъ. Цвѣтетъ съ начала іюля. Кушцово (Мар.).—Симоновъ монастырь, Тюфелева роща; Хвостово по р. Шошѣ, Клин. у.; Хотѣичи на р. Перской, Бгр. у.; близъ Лужковъ, между Калиновымъ и Иваньковымъ, Сри. у. (Н.).—Близъ Рыболова, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Серпуховъ, Звенигородъ (Дв.).—Верея (Макс.).—Грибаново, Влм. у. (Ч.).—Близъ Берлюковой пустыни, Бгр. у. (Н.).—На супесчаныхъ мѣстахъ противъ д. Кубякова, Мож. у. (Ф. Б.).—По мемамъ близъ Фофанова за Завидовымъ, Клин. у.; д. Марышка, Бри. у. (К.).—На пескахъ близъ д. Харлова и близъ Нехорки, Бри. у. (С.).



Lasione montana.



Phyteuma spicatum.

381. *Phyteuma* L.

Чашечка 5-зубчатая; вѣличикъ глубоко-5-раздѣльный, доли его линейныя, соединенныя верхушками, образуютъ изогнутую трубку, тогда какъ основанія долей уже разошлись; тычиночныя нити свободныя, основаніе ихъ расширено и опушено; пыльники б. ч. свободные; завязь 2—3-гнѣздная; рылецъ 2—3; коробочка 2—3-гнѣздная, вскрывается у основанія столькими же дырочками.

912. *P. spicatum* L.

Корень толстый, веретенообразный; стебель до 75 см., простой, ребристый, голый, какъ и все растеніе; корневые и нижніе стеблевые листья на длинныхъ черешкахъ, широко-яйцевидные, съ глубокимъ сердцевиднымъ основаніемъ, туповатые, по краямъ просто- или doubly-пильчатые; стеблевые листья на болѣе короткихъ черешкахъ, пластинка ихъ узкая, чѣмъ у нижнихъ, часто ланцетная; верхушечные—нерѣдко ли-

нейные; цветы въ густомъ конечномъ колосѣ, по отцвѣтаніи сильно удлиняющемся; вѣнчикъ бѣлый съ зелеными верхушками у долей; пыльники тоже зеленые.

У насъ найдена слѣдующая форма:

α. ovatum Schmidt.

Phyteuma spicatum L. Пет., стр. 239.—Кауф. II, стр. 319.

Phyteuma spicatum L. v. *nigrum*. Гор., № 58

Phyteuma nigrum Schmidt. Пет., Кр. II, стр. 65.

Вѣнчикъ свѣтло-голубой, голубой или сѣро-голубой; колосъ цилиндрическій, иногда почти шаровидный. Эта форма была найдена Р. И. Шредеръ въ Петровскомъ-Разумовскомъ одичалой и, по сообщенію С. Г. Павашина, появляется ежегодно. Золотницкимъ показана въ Петровскомъ парѣ.

382. *Campánula* L.

Чашечка глубоко-5-раздѣльная; вѣнчикъ колокольчатый, 5-лопастный; тычиночныя нити свободныя съ расширеннымъ рѣсничатымъ основаніемъ; пыльники не сдвинутыя; завязь 3 (5)-гнездная съ волосистымъ столбикомъ и съ 3 (5) рыльцами; коробочка вскрывается 3 (5) дырочками, расположенными въ верхней ея части, или у ея основанія.

1. Цветы сидячіе, скучены въ верхушечныя и пазушныя головки. 2.

Цветы на б. или м. длинныхъ цветоножкахъ въ кистяхъ, метелкахъ или одиночныя, но не въ головкахъ. 3.

2. Все растеніе густо покрыто жесткими, щетинистыми почти колючими волосками; чашелистики туповатые; столбикъ выдается изъ вѣнчика.

C. cervicaria L.

Стебель и листья голые или б. или м. опушенные мягкими волосками; чашелистики заостренные; столбикъ не выдается изъ вѣнчика.

C. glomerata L.

3. Между чашелистиками отогнутые внизъ придатки и прижатые къ завязи.

C. sibirica L.

Придатковъ у чашечки между чашелистиковъ нѣтъ. 4.

4. Корневые листья на длинныхъ черешкахъ, сердцевидные, сердцевидно-яйцевидные или почковидные, крупно-зубчатые; стеблевые—ланцетные или линейно-ланцетные. *C. rotundifolia* L.

Корневые и нижніе стеблевые листья мало отличаются отъ стеблевыхъ, только къ верхушкѣ стебля становятся мельче. 5.

5. Коробочка вскрывается близъ верхушки дырочками; листья узкіе, длина ихъ въ нѣсколько разъ болѣе ширины. 6.

Коробочка вскрывается у основанія дырочками; пластинка листа широкая, у нижнихъ и среднихъ листьевъ въ 2—2½ раза болѣе ширины. 7.

6. Вѣнчикъ очень крупный, до 40 мм., доли его слегка отогнутыя; цветы въ малоцветковой кисти; рыльца много длиннѣе столбика; листья слегка кожистые.

C. persicifolia L.

Вѣничекъ средней величины, не крупнѣе 27 мм.; доли его сильно отогнуты; цвѣты въ развѣистой, почти щитковидной метелкѣ; рыльца не длиннѣе столбика или короче его; листья не кожистые.

C. patula L.

7. Цвѣты повислые, б. ч. обращены въ одну сторону, въ длинной многоцвѣтковой кисти или метелкѣ; чашелистики отогнутые. 8. Цвѣты торчащіе или отклоненные, одиночные или по 2—4 въ пазухахъ верхнихъ б. или м. крупныхъ листьевъ; чашелистики прижаты къ вѣничку или отклонены. 9.

8. Листья съ нижней стороны покрыты мягкимъ сѣроватымъ пушкомъ; вѣничекъ 10—17 мм., по краю голый.

C. bononiensis L.

Листья съ обѣихъ сторонъ покрыты короткими жесткими волосками, рѣже голые; вѣничекъ 15—28 мм. дл., по краю слегка рѣсничатый.

C. rapunculoides L.

9. Стебель голый, туло-ребристый или внизу цилиндрическій; листья съ обѣихъ сторонъ покрыты прижатыми мягкими волосками, рѣже голые; нижніе стеблевые — яйцевидные, быстро сужены въ черешокъ.

C. latifolia L.

Стебель остро-ребристый, покрытъ, какъ и листья, рѣдкими жесткими волосками; нижніе стеблевые листья съ сердцевиднымъ основаніемъ.

C. trachelium L.

913. *C. rotundifolia* L. Бух. II, № 263. — Бух. I, № 252. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 154. — Кауф. II, № 473. — Цин., № 920. — Pinz., p. 14. — Кауф. I, стр. 309. — Lind., p. 136. — Ann., C. V, № 36. — Дв., № 220. — Маке., № 205. — Hoff. II, № 1527. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 38. — Ad., p. 111. — St. II, p. 13. — St. I, № 142. — Pal., № 353.

Campanula tenuifolia Hoffm. Mart., p. 38.

Campanula tenuifolia All. Маке., № 206.

Растеніе съ ползучимъ тонкимъ, вѣтвистымъ корневищемъ, часто образуетъ дерновинки; стебли 15 — 40 см., б. или м. густо покрыты листьями, голые или опушенные, особенно въ нижней части; прикорневые листья и листья не цвѣтущихъ укороченныхъ стеблей на длинныхъ черешкахъ, почковидные, сердцевидно-округлые или сердцевидно-яйцевидные, крупно-зубчатые; стеблевые листья ланцетные, линейно-ланцетные, линейные или узко-линейные, къ верхушкѣ стебли становятся уже, б. ч. цѣльнокрайніе съ слегка завернутыми краями, рѣже мелко-и очень разставленно-зубчатые, вообще листья очень измѣнчивы по своей формѣ; *)

*) Т. Witasch въ своей статьѣ: „Ein Beitrag zur Kenntniss der Gattung Campanula“, указывая на большое разнообразіе формъ листьевъ у *C. rotundifolia* L. и, хотя приводитъ 4 разновидности, приравнивая ихъ къ var. *parviflora* Lange, *stricta* Schumacher и *ovata* Petermann (четвертая разновидность альпійская), не даетъ такое описаніе листьевъ и цвѣтовъ безъ цифровыхъ величинъ, что подвести опредѣляемый экземпляръ къ той или другой разновидности затруднительно. Изучая *C. rotundifolia* L. по матеріалу, собранному А. Н.


цвѣты на длинныхъ цветоножкахъ въ сжатой или раскидистой малоцветковой метелкѣ; чашелистики линейно-яйцевидные, прижатые къ вѣтвику или слегка отогнутые; вѣничикъ голубой или свѣтло-яіловый, 12—20 мм.; коробочка повислая, вскрывается у самого основанія.

По лугамъ, опушкамъ и кустарникамъ, часто. Цвѣтетъ съ іюня до осени.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. *reflexa* Hausm.

Чашелистики отогнуты внизъ. Тюфелева роца (X.).



Campanula rotundifolia.



Campanula bononiensis.

- 914. *C. bononiensis* L.** Бух., II, стр. 28. — Пет., стр. 154. — Кауф., II, № 472. — Цип., № 916. — Рупр., стр. 88 и 90. — Кауф., I, стр. 309. — Lind., p. 136. — Ann., C. V, № 37. — Дв., № 226. — Макс., № 214. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 39.

Корень веретенообразный, вѣтвистый; стебель 30—100 см., въ нижней части цилиндрической, въ верхней ребристый, мягко опушенный, б. ч. простой; нижніе листья на длинныхъ черешкахъ, сердцевидные, заостренныя; остальные—яйцевидные или яйцевидно-продолговатые, б. или м. длинно-заостренныя, съ основаніемъ округлымъ или слегка сердцевиднымъ, сидячіе, къ верхушкѣ становятся мельче; всѣ мелко-гороховые, съ верхней стороны темно-зеленыя, слабо опушенные, съ нижней—густо покрыты мягкимъ сѣроватымъ пушкомъ, почти войлочныя; цвѣты на короткихъ цветоножкахъ, одиночныя или пучками въ длинномъ кисте-

Пегушиновымъ и А. А. Хорошковымъ изъ многихъ мѣстъ, я нашелъ экземпляры изъ одного и того же мѣста съ листьями очень разнообразными и съ цвѣтками очень различной величины, такъ что я не могъ съ увѣренностью отнести данныя экземпляры къ опредѣленной разновидности, а потому и не рѣшился привести разновидности, предлагаемыя J. Witaszek. Что же касается формъ, основанныхъ на опушеніи, то J. Witaszek не признаетъ ихъ, говоря, что въ просмотрѣнномъ имъ большомъ матеріалѣ, онъ находитъ всѣ переходы.

образномъ или метельчатомъ соцветіи; чашечка опушена слабо, съ ланцетными отстоящими чашелистиками; вѣничикъ свѣтло-лиловый или голубовато-лиловый, ворончато-колокольчатый, 10—17 мм., по краю голый; коробочка вскрывается у основанія.

По кустарникамъ, опушкамъ и холмамъ. Цвѣтеть съ начала іюля. Симоновъ монастырь, Петрово; Архангельское, Зви. у. (К.). — Перерва (Гольбл.). — Воскресенскъ, Зви. у. (Дв.). — Серебряный боръ близъ Хорошова; близъ Заозерья, Бри. у.; Хотьичи, Бр. у.; Тверитиново на р. Нарѣ, Срп. у.; Бѣлые Колодези, между Бочмановымъ и Протопоповымъ, Км. у. (П.). — Невѣрово, Клячево, Км. у.; Боровскій курганъ, Бри. р. (С.). — По возвышеннымъ мѣстамъ близъ д. Десна, Пдл. у. (И. В. Байковъ). — Рождествено на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

915. *C. rapunculoides* L. Вух. II, № 262. — Вух. I, № 251. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 154. — Кауф. II, № 471. — Цип., № 915. — Pirz., p. 14. — Кауф. I, стр. 308. — Lind., p. 136. — Ann., C. IV, № 24. — Дв., № 225. — Макс., № 212. — Hoff. II, № 1524. — Gold. Sp., p. 122. — Mart., p. 39. — Hoff., № 647. — St. II, p. 13. — St. I, № 147. — Pal., № 360.

Корень толстый, вѣтвистый, даетъ длинныя подземныя побѣги; стебель 30—100 см., б. ч. простой, слегка ребристый, голый или чаще покрытъ, какъ и все растеніе, короткими и жесткими волосками, отчего остро-шершавый; корневые и нижніе стеблевые листья на длинныхъ черешкахъ, сердцевидно-яйцевидные или продолговато-сердцевидно-яйцевидные; средніе—яйцевидные; верхніе—ланцетные, сидячіе; всѣ, иногда исключая только верхнихъ, неравно- и б. или м. остро-зубчатые; цвѣты на короткихъ цветоножкахъ, поникающіе, одиночныя въ длинной односторонней кисти; чашечка покрыта короткими, направленными внизъ волосками; чашелистики линейно-ланцетные, отвороченные; вѣничикъ голубовато-лиловый или свѣтло-лиловый, ворончато-колокольчатый, 15—28 мм.,*) по краю слегка рѣсничатый; рыльца иногда слегка выдаются изъ вѣничика; коробочка вскрывается у основанія.



Campanula rapunculoides.

По паровымъ полямъ, кустарникамъ, лѣсамъ, обрывамъ и близъ заборовъ, часто. Цвѣтеть съ конца іюня до половины августа; плоды съ начала августа.

*) А. А. Хорошковъ нашелъ въ тѣни близъ д. Луковля, Пдл. у., экземпляры съ тонкими слабыми, нѣсколько извилистыми стеблями и вѣничкомъ очень широко-колокольчатымъ, почти блюдчатымъ (1,8—2 см. дл. и 2,5—3 см. въ поперечникѣ) при чемъ на одномъ экземплярѣ одинъ верхушечный цвѣтокъ съ нормальнымъ, но болѣе мелкимъ вѣничкомъ.

Кроме общераспространенной формы еще:

α. macrophylla DC.

Растение высокое и почти от основания сильно ветвистое; ветви удлиненные, иногда разветвленные выходят из каждой пазухи листьев по 1—2 острыми углами; на ветвях нижние цветы на очень длинных цветоножках, до 4 см. дл.; венчик крупный, 23—28 мм.; листья очень крупные, нижние до 14 см. дл., крупно- и doubly-зубчатые. На обрывистом берегу р. Мочи близ Ознобишина, Пдл. у. (X.).

916. C. trachelium L.

Campanula Trachelium L. Пет. Кр. II, стр. 64. — Бух. I, № 250. — Пет., стр. 154. — Кауф. II, № 470. — Цин., № 914. — Кауф. I, стр. 308. — Lind., p. 136. — Ann., C. II, № 233. — Дв., № 227. — Макс., № 213. — Hoff. II., № 1541. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 39. — Hoff., № 655. — St. II, p. 13. — St. I, № 148. — Pal., № 361.

Campanula Trachelium L. α. typ. Бух. I, 250 α.

Корень толстый, слегка деревянистый; стебель 40—100 см., простой, остро-ребристый от нисходящих черешков листьев, покрыт редкими жесткими волосками, как и все растение, отчего острошершавый; листья крупно- и doubly-зубчатые; корневые — на длинных черешках, широко-сердцевидные, заостренные, особенно крупно-зубчатые; нижние стеблевые — на более коротких черешках, яйцевидные с б. или м. глубоким сердцевидным основанием, иногда с округлым, к верхушке стебля черешки становятся короче и листья уже; верхушечные — сидячие, ланцетные, к обоим концам заостренные; цветы на коротких цветоножках, одиночные или по 2—4 на цветоносе в пазухах верхних сближенных листьев, образуют облиственное метельчатое или кистистое соцветие; чашечка голая, только широко-ланцетные чашелистики ресничатые; венчик крупный 25—45 мм., колокольчатый, сине-лиловый или лиловый, по краям, внутри и по наружным жилкам с редкими ресничками; коробочка вскрывается у основания.



Campanula trachelium.

По опушкам, оврагам и тенистым местам. Цветет с начала июля до половины августа; плоды в конце августа. Близ селца Матюшина, Дмт. у. (В. Чефранова).

Чаще встречаются следующие формы:

α. urticifolia Lej. et Court.

Campanula Trachelium L. var. *urticifolia* Schmidt. Пет. Кр. II, стр. 64.

Campanula Trachelium L. β. *dasycarpa* Koch. Бух. II, № 261. — Бух. I, № 2503. — F. O., № 6, p. 86. — Кауф. II, стр. 316. — Цин., стр. 284. — Кауф. I, стр. 308.

Campanula urticifolia Schmidt. Макс., № 211. — Mart., p. 39.

Чашечка покрыта б. или м. густо жесткими щетинистыми волосками. Кунцово, Воробьевы горы, Раменки, Лизаветино, Братцево; Петрово, Зви. у. (К.).—Царицыно (Дв.).—Близъ Серпухова (Ар.).—Рождествено на р. Нарѣ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Красный Станъ, Руз. у. (Сюз.).—Успенское, Зви. у. (Х.).—Лѣсъ между Оедосынымъ и Внуковымъ, Зви. у.; близъ Боровскаго кургана, Бри. у. (С.).

3. *paniculata* Peterm. Сыр. Отч. II, стр. 18.

Цветоножки у нижнихъ цвѣтовъ или цветоносъ, если цвѣты сидятъ по 2—4, сильно удлинненные, до 15 см. дл., такъ что соцвѣтіе метельчатое. Лѣсъ между Оедосынымъ и Внуковымъ, Зви. у.; близъ Боровскаго кургана и близъ с. Зеленаго на р. Пахрѣ, Бри. у. (С.).

γ. *parviflora* Cel.

Вѣнчикъ около 2 см. дл. Сельцо Матюшино, Дмт. у. (В. Чефранова).

917. *C. latifolia* L. Бух. II, № 260.—Бух. I., № 249.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 154.—Кауф. II, № 469.—Ципл., № 913.—Кауф. I, стр. 307.—Lind., p. 134.—Апп., C. V, № 38.—Дв., № 223.—Макс., № 210.—Hoff., II., № 1503.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 39.—Hoff., № 636.—St. II, p. 13.—St. I, № 146.—Pal., № 359.

Корень толстый, нѣсколько мясистый, веретенообразный; стебель 50—125 см., въ нижней части цилиндрической, въ верхней слабо ребристый, б. ч. голый или едва опушенный; листья голые или покрыты разсѣянными прижатыми, мягкими волосками,



Campanula latifolia.

болѣе густо съ нижней стороны вдоль жилокъ, по краямъ не крупно-двояко-зубчатые, только вытянутая верхушка цѣльно-крайняя; нижніе стеблевые листья яйцевидные, б. или м. длинно-заостренные, быстро сужены въ длинный, слабо крылатый черешокъ, по крыльямъ рѣсничатый; средіе — широко-яйцевидно-ланцетные; верхніе — ланцетные, сидячіе; *) цвѣты одиночные (рѣдко по 2—3) въ пазухахъ верхнихъ сближенныхъ листьевъ; иногда листья такъ малы, что кажутся прицвѣтниками, и цвѣты расположены кистью; чашечка голая; вѣнчикъ 30 — 55 мм. дл., голубовато-лиловый или лиловый, безъ рѣсничекъ по

краю, рѣже съ извилистыми волосками; коробочка вскрывается у основанія.

По тѣнистымъ, сырымъ мѣстамъ и по оврагамъ. Цвѣтетъ съ конца іюня до половины августа; плоды съ конца августа. Воробьевы горы, Кунцово, Лизаветино, Никольское, Воскресенскъ, Троицкое, Спасское.

*) Н. Кауфманъ въ „Московской флорѣ“ замѣчаетъ, что встрѣчается форма съ нижними и средними сердцевидными листьями, съ болѣе длинными черешками и съ однимъ малочисленнымъ цвѣткомъ (герб. Гольдб.).

Звизу (Кл.).—Крылатское; Саввы Звенигородскаго монастыря (Х.).—Кураино (Гей.).—Берегъ Клязьмы близъ ст. Тарасовка М.-Яр. ж. д.; оврагъ въ лѣсу между 17-й верстой Брянск. ж. д. и Нѣмчиновымъ; по окраинѣ болотистаго лѣса противъ Мѣшково, Зви. у.; близъ Боровскаго кургана, Бри. у. (С.).—Близъ Серпухова (Ар.).—Рождествено на р. Нарѣ, Серп. у. (стр. Е. Сологубъ).

918. *C. patula* L. Бух. II, № 264.—Бух. I, № 253.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 155.—Кауф. II, № 474.—Цил., № 918.—Pinz., p. 14.—Кауф. I, стр. 310.—Lind., p. 136.—Дн., № 221.—Макс., № 207.—Hoff. II, № 1516.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 38.—Lib. Tr., p. 142.—St. II, p. 13.—St. I, № 143.—Pal., № 354.

Корень перетенообразный съ боковыми корешками; стебель 25—75 см., слегка ребристый, голый, какъ и все растеніе, или въ нижней части по ребрамъ покрытъ внизъ отогнутыми волосками; корневые и нижніе стеблевые листья эллиптическіе, ланцатные или обратно-ййцевидно-ланцетные, суженные въ короткій черешокъ, тупые или съ округлой верхушкой; средніе стеблевые — сидячіе ланцетные или линейно-ланцетные, заостренные, какъ и верхніе, линейно-ланцетные или линейные; веѣ — городковые; цвѣты въ верхушечной развѣсистой почти щитковидной метелкѣ; цвѣтоножки выше середины съ 2 шиловидными прицвѣтниками; чашелистики шиловидные съ туповатой выемкой между ними; вѣчикъ сине-лиловый или лиловый, ворончато-колокольчатый, *) 15—27 мм., съ отогнутыми, равными трубкѣ, лопастями; коробочка коническая на торчащей плодоножкѣ, вскрывается близъ верхушки.



Campanula patula.

По лугамъ, паровымъ полямъ, кустарникамъ, рѣже по лѣсамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ начала іюня до осени.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

2. *flaccida* Wallr. Хор. II, стр. 16.—Сир. Отч. II., стр. 19.

Съ болѣе развѣсистой метелкой, съ удлиненными, многочисленными, часто какъ бы спутанными вѣтвями; съ длинными цвѣтоножками; сильно отклоненными, часто отогнутыми внизъ чашелистиками и мелкимъ вѣчикомъ; листья дряблые, отогнутые отъ стебля. Форма тѣнистыхъ мѣстъ. Витенско (Н.).—Чириково и близъ Луковни въ лѣсу, Пдл. у. (Х.).—Лѣсъ между 17-й верстой Брянск. ж. д. и Нѣмчиновымъ (С.).

3. *albiflora*.

Цвѣты бѣлые.

*) Л. А. Хорошковъ нашелъ близъ Чегодаева, Пдл. у., одинъ экземпляръ, у котораго чашечка и вѣчикъ были 6- 7- 13- и 14-раздѣльными, а у 2. *flaccida* Wallr. чашечка и вѣчикъ часто наблюдались 3—4-раздѣльные.

919. *C. persicifolia* L. Бух. II, № 265. — Бух. I, № 254. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 154. — Кауф. II, № 475. — Цин., № 919. — Pinz., p. 14. — Кауф. I, стр. 310. — Lind., p. 136. — Ann., C. IV, № 25. — Дв., № 223. — Макс., № 209. — Hoff. II, № 1520. — Gold. C., p. 18. — Mart., p. 39. — Hoff., № 644. — St. II, p. 13. — St. I, № 145. — Pal., № 355.

Корень веретенообразный, косой; стебель прямостоящий, 40—100 см., слегка ребристый, б. ч. простой, голый, как и все растение; листья



Campanula persicifolia.

несколько кожистые; корневые — обратно-яйцевидно-ланцетные, суженные в черешок; нижние стеблевые — ланцетные или линейно-ланцетные; верхние — линейные или узко-линейные; все по краям зубчатые; средние и верхние сидячие; цветы в верхушечной малоцветковой кисти, иногда стебель оканчивается только одним цветком; цветоножки с двумя прицветниками; чашечка с ланцетными или линейно-ланцетными при цветах отстоящими чашелистиками, выемки между ними острые; вычник светло-лиловый, редко белый, 25—40 мм., широко-колокольчатый, лопасти его широко-треугольные; 3 рыльца длиннее столбика; коробочка на торчащей плодоножке, вскрывается

вверху под долями чашечки.

По холмам, лѣсамъ и кустарникамъ, часто. Цвететъ съ половины юня до половины августа.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. eriocarpa Koch.

Campanula persicifolia L. f. *dasicarpa* Kit. Сыр. Отч. II, стр. 18.

Трубка чашечки покрыта прозрачными чешуевидными волосками. Воробьевы горы (II.). — Луговинка въ лѣсу близъ 17-й вереты Брянск. ж. д.: известняки близъ устья р. Пахры, Бри. у. (С.). — Дарьино и близъ Новаго Иерусалима, Зви. у. (X.).

920. *C. cervicaria* L. Дв., № 229.

Campanula Cervicaria L. Бух. II, № 259. — Бух. I, № 248. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 153. — Кауф. II, № 468. — Цин., № 912. — Кауф. I, стр. 307. — Lind., p. 134. — Ann., C. IV, № 23. — Макс., № 216. — Hoff. II, № 1487. — Mart., p. 40. — Hoff., № 633. — St. II, p. 13. — St. I, № 150.

Корень толстый веретенообразный съ многими боковыми корешками; стебель 40—125 см., прямоторчащий ребристый, простой, густо покрыт., какъ и все растение, жесткими, отстоящими, щетинистыми, почти колючими волосками; листья свѣтло-зеленые, по краямъ мелко-городковые; нижние на длинныхъ черешкахъ, ланцетные или продолговатые, сужен-

ные къ обоимъ концамъ, туповатые; средніе—тоже ланцетные или узко-ланцетные, но съ черешкомъ болѣе короткимъ или почти сидячіе; верхніе—сидячіе, иногда съ нѣскольکو расширеннымъ основаніемъ и заостренной верхушкой; цвѣты въ верхушечной многоцвѣтковой головкѣ и часто еще съ менѣе крупными головками въ пазухахъ верхнихъ нѣскольکو оближенныхъ, листьевъ; чашелистики яйцевидные, туповатые, край выемки между ними нѣскольکو отвороченъ наружу; вѣничіе ворончато-колокольчатый, голубой, 12—20 мм., по краю и по наружнымъ жилкамъ щетинисто-рѣсничатый; рыльце выдается изъ вѣничка.

По лѣсамъ и кустарникамъ, часто. Цвѣтетъ съ середины іюня до августа.

2. *albiflora*.

Цвѣты бѣлые.



Campanula cervicaria.



Campanula glomerata.

921. *C. glomerata* L. Пет. Кр. II, стр. 64.—Бух. II, № 258.—Бух. I, № 247.—F. O. № 6, p. 86.—Пет., стр. 153.—Кайф. II, № 467.—Цин., № 911.—Pinz., p. 15.—Кайф. I, стр. 307.—Lind., p. 134.—Ann., C. III, № 224.—Дб., № 228.—Maxc., № 215.—Hoff. II., № 1498.—Gold. C., p. 18.—Mart., p. 39.—Hoff., № 634.—St. II, p. 13.—St. I, № 149.—Pal., № 362.

Корневище толстое, часто деревянистое; стебли 15—80 см., слабо-гранистые, часто красноватые, голые или опушенные мягкими волосками; листья нѣскольکو кожистые, мелко-городковые, сверху темно-зеленые, голые или слабо опушенные, снизу свѣтлые и б. или м. густо опушенные, иногда только по жилкамъ; корневые и нижніе стеблевые—на длинныхъ черешкахъ, яйцевидно-ланцетные, съ сердцевиднымъ или округлымъ основаніемъ, рѣже сердцевидные; средніе—нѣскольکو уже ширинихъ и на короткихъ черешкахъ; верхніе—сидячіе съ вытянутой и нѣскольکو отогнутой верхушкой и основаніемъ иногда полустебельообъемлющимъ; цвѣты въ верхушечной густой головкѣ и часто съ мелкими головками въ пазухахъ верхнихъ листьевъ; чашелистики ланцетные, заостренные;

край выемки между ними не отвороченъ; вѣничекъ темно-лиловый. 12—25 мм., ворончато-колокольчатый, снаружи голый или покрытъ очень короткими волосками, а по краямъ рѣсничатый; столбикъ не выдается изъ вѣничка.

По лугамъ, кустарникамъ и лѣсамъ, часто. Цвѣтетъ съ середины юня до поздней осени.

Распадается на слѣдующія формы:

α. **glabra Bluff.**

Стебель голый или почти голый; вѣничекъ снаружи голый или только по жилкамъ слабо опушенный; листья голые или опушенные. Если листья у основанія округлые или сердцевидные, то это—f. *subcordata* GB.; если съ клиновиднымъ основаніемъ, отчего ланцетные, то это — f. *subcuneata* GB.

β. **vulgata GB.**

Campanula glomerata L. β. *elliptica* DC. Пет. Кр. II, стр. 64.—Pinz., p. 15.

” ” γ. *aggregata* Vill. Пет. Кр. II, стр. 64.—Pinz., p. 15.

” ” η. *farinosa* DC. Pinz., p. 15.

Campanula salviaefolia Wallr. Mart., p. 40.

Campanula hirsuta Mart. Mart., p. 40.

Campanula diffusa Mart. Mart., p. 40.

Стебель б. или м. густо опушенъ обращенными вни́зъ волосками, особенно близъ верхушки; листья и чашечки б. или м. густо опушены; вѣничекъ снаружи коротко опушенный. Если листья съ сердцевиднымъ основаніемъ, то это—f. *viridis* Rehb.; если съ округлымъ, то это—f. *elliptica* Kit.

γ. **pusilla DC.**

Растеніе 10—15 см.; стебель оканчивается однимъ или немногими цвѣтками; въ пазухахъ верхнихъ листьевъ цвѣтковь нѣтъ. По кустамъ между Зибровымъ и Никифоровымъ, Срн. у. (II.).

922. **C. sibirica L.** Пет. Кр. II, стр. 65.—Гор., № 59.—Пет., стр. 154.—Pal., № 365.

Корень веретенообразный, толстый съ боковыми корешками; стебель 15—60 см., ребристый, покрытъ, какъ и все растеніе, коротко-щетиnistыми волосками, ребра часто красноватая; корневые и нижніе стеблевые листья лопатчатые или обратно-яйцевидно-ланцетные, суженные въ черешокъ, съ тупой или округлой верхушкой; остальные сидячіе, иногда слегка стеблеобъемлющіе, продолговато-ланцетные или линейные, островатые, къ верхушкѣ стебля становятся уже и короче; вѣт.—городковье и съ волнистыми краями; цвѣты поникающіе въ верхушечной узкой, кистистой метелкѣ, съ мало отклоненными вѣтвями; цвѣтоножки выше середины съ 2 ланцетными прицвѣтниками; чашечка съ линейно-ланцетными чашелиstниками и между ними съ отогнутыми придатками, б. ч. равными зазвям или нѣсколько короче ея; какъ придатки, такъ и чашелиstники грубо рѣсничатые; вѣничекъ 10—23 мм., узко-колокольчатый, сине-лиловый или лиловый; доласти его острия, голыя или по краямъ и по наружнымъ жилкамъ съ рѣзкими рѣсничками; коробочка вскрывается у основанія.

По холмамъ, кустарникамъ и опушкамъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ конца мая до конца юня; плоды съ начала юля. Между Лужками и Зибровымъ, Сри. у. (Артари). — Близъ Дракина, Сри. у. (С.). — Иванова гора на р. Нарѣ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ). — Оврагъ близъ Клычева и по откосу ж.-д. насыпи близъ ст. Воскресенскъ, Кзм. у. (Н. и С.). — Лугъ близъ „Плоховой дачи“, по дорогѣ къ д. Нехоркѣ, Бри. у. (Куль.).



Campanula sibirica.



Adenophora liliifolia.

383. Adenóphora Fisch.

Походитъ на Campanula, но столбикъ сильно выдается изъ вѣнчика и вокругъ его основанія надчлѣстничный, кольцообразный или коротко-трубчатый дискъ.

923. *A. liliifolia* Ledb. Ист. Кр. II, стр. 65.

Adenophora communis Fisch. Ф. Б., № 2.

Корень толстый веретенообразный, вѣтвистый; стебель до 1 м., простой ребристый, густо покрытъ листьями, б. ч. голый, какъ и все растение, у основанія съ розеткой листьевъ; послѣднѣе на длинныхъ черешкахъ, сердцевидно-округлые, крупно-зубчатые; нижнѣе стеблевые — обратно-яйцевидные или эллиптическіе, сужены въ короткій черешокъ; верхнѣе — широко-ланцетные; все — заостренные и зубчатые; верхушечные — сидячіе, иногда цѣльнокрайніе; цвѣты въ простой кисти или въ пирамидальной метелкѣ, вѣтви которой кистеобразныя; цвѣтоножки поникшія; при каждомъ развѣтвленіи и цвѣтоножкѣ одинъ ланцетный прицвѣтникъ, зубчатый или цѣльнокрайній; доли чашечки ланцетныя или треугольно-ланцетныя, иногда слегка зазубренныя; вѣнчикъ свѣтло-голубой или свѣтло-лиловый, колокольчатый, 14—20 мм.; коробочка почти обратно-грушевидная, до 10 мм., повислая, вскрывается у основанія.

По кустарникамъ и опушкамъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ половины юля. Близъ Зиброва, Сри. у. (Г. О.). — Тамъ же (Н.).

95 сем. *Compósitae* Vaill.

Цвѣты мелкіе на общемъ цвѣтоложѣ, плоскомъ, вогнутомъ или выгнутомъ, скупены въ корзинку, окруженную почти всегда общей оберткой изъ свободныхъ или снѣженныхъ листочковъ; цвѣтоложе съ пленчатыми прицвѣтниками или щетинистыми волосками, или же цвѣтоложе голое, б. ч. ямчатое; цвѣты обоеполые, разнополые, и тогда одно- или двудомные, или въ корзинкѣ встрѣчаются и безполые цвѣты; вѣнчикъ опадающій, б. ч. сростнолепестный, трубчато-ворончатый, 5-зубчатый (рѣже число зубцовъ меньше), въ почкосложеніи створчатый, или вѣнчикъ язычковый, рѣже двугубый или ворончатый; корзинка состоитъ только изъ трубчатыхъ или только изъ язычковыхъ цвѣтовъ, или же срединные цвѣты трубчатые, а наружные язычковые; чашечки нѣтъ или она состоитъ изъ коронки чешуекъ, щетинокъ или волосковъ, развивающихся при плодѣ въ хохолокъ; завязь нижняя изъ двухъ плодонистиковъ, однопѣздная съ одною сѣмечкою; столбикъ одинъ, нитевидный, у плодущихъ цвѣтовъ двулопастный, съ расходящимися дугообразно лопастями, внутреннюю сторону которыхъ занимаетъ рыльце, а наружная покрыта волосками; тычинокъ столько, сколько долей у вѣнчика (б. ч. 5) на свободныхъ, рѣже сросшихся нитяхъ и съ линейными сросшимися въ трубку пыльниками, вскрывающимися продольными щелями внутрь; пыльца выносятся изъ трубки волосами столбика, рѣдко пыльники свободные; плодъ—сѣмянка съ тонкой кожурой и часто съ хохолкомъ; сѣмя безъ бѣлка съ прямымъ зародышемъ.

Обзоръ семейства.

Подсемейство *Tubuliflorae* DC.

Растенія б. ч. безъ млечнаго сока; всѣ цвѣты въ корзинкѣ трубчатые, или краевые — язычковые, или же ворончатые, а остальные — трубчатые; цвѣты обоеполые, краевые же часто женскіе или безполые.

I. *Eupatoriæe* DC.

Всѣ цвѣты въ корзинкѣ трубчатые, обоеполые; лопасти столбика длинныя, цилиндрическія, тупыя, съ наружной стороны коротко-опушенныя, съ внутренней — съ двумя не сливающимися краевыми линиями рыльца; сѣмянки съ хохолкомъ изъ волосковъ.

Eupatorium.

II. *Astéreee* Nees.

Краевые цвѣты корзинки б. ч. язычковые женскіе, рѣдко безполые, остальные — трубчатые, обоеполые, рѣдко всѣ цвѣты трубчатые; лопасти столбика у обоеполыхъ цвѣтовъ линейныя или ланцетныя, на концѣ б. ч. заостренныя, спаружи плоскія, опушенныя; рыльце съ внутренней стороны кончается тамъ,

откуда начинается снаружи опушение; сѣмянки б. ч. съ хохолкомъ изъ волосковъ.

Solidago, Bellis, Aster, Erigeron.

III. *Inuleae* Cass.

Цвѣты трубчатые, обоюполые, рѣже краевые цвѣты женскіе и язычковые или почти нитевидные; пыльники у основанія стрѣловидные, съ остріями или хвостиками; столбикъ съ лопастями очень разнообразными; сѣмянки б. ч. съ хохолкомъ изъ волосковъ.

Filago, Antennaria, Gnaphalium, Helichrysum, Inula, Pulicaria, Buphthalmum.

IV. *Heliantheae* Less.

Корзинки очень разнообразны; краевые цвѣты б. ч. язычковые, остальные трубчатые или всѣ цвѣты трубчатые, рѣдко однополые, и тогда одно- или двудомные; краевые — женскіе или безполые; цвѣтоложе съ прицвѣтниками; пыльники у основанія безъ отростковъ, иногда только заострены; лопасти столбика плоскія, къ концамъ часто расширены, съ краевыми линиями рылецъ; сѣмянки часто сплюснуты, безъ хохолка или съ нѣсколькими щетинками или чешуйками.

Xanthium, Helianthus, Bidens.

V. *Anthemideae* Cass.

Листочки обертки по краю пленчатые; цвѣтоложе б. ч. съ прицвѣтниками; краевые цвѣты б. ч. язычковые женскіе или безполые, остальные — трубчатые, обоюполые; лопасти столбика припухлые; сѣмянки безъ хохолка или съ пленчатой оканной.

Anthemis, Achillea, Chrysanthemum, Matricaria, Artemisia.

VI. *Senecioëae* Cass.

Обертка состоитъ изъ одного ряда листочковъ, при основаніи которыхъ часто еще нѣсколько листочковъ; краевые цвѣты язычковые женскіе или всѣ цвѣты трубчатые обоюполые; цвѣтоложе голое; пыльники у основанія закругленные (рѣдко съ хвостиками); лопасти столбика у трубчатыхъ цвѣтовъ съ краевыми полосками рылецъ и на концѣ покрыты волосками въ видѣ кисточки; сѣмянки съ волосистымъ хохолкомъ.

Tussilago, Petasites, Lagularia, Senecio.

VII. *Cynáreae* Spreng.

Всѣ цвѣты въ корзинкѣ трубчатые обоюполые или краевые ворончатые, иногда почти двугубые безполые, рѣдко корзинки одноцвѣтковые; цвѣтоложе покрыто щетинками, рѣдко съ прицвѣтниками или почти голое; столбикъ ниже лопастей утолщенъ и съ волосатымъ кольцомъ; лопасти его короткія, часто почти сросшіяся; основаніе пыльниковъ б. ч. съ хвостикомъ; сѣмянки съ хохолкомъ.

Echinops, Carlina, Aretium, Carduus, Cirsium, Onopordon, Cynara, Silvestrum, Senecula, Centaurea.

Подсемейство Liguliflorae DC.

Растенія съ млечнымъ сокомъ; всѣ цвѣты въ корзинкѣ язычковые.

VIII. *Cichoriaceae* Vaill.

Столбикъ цилиндрическій безъ утолщенія; лопасти его тоже цилиндрическія, отогнутыя, тупыя, снаружи опушенныя.

Cichorium, *Lampsana*, *Hypochoeris*, *Leontodon*, *Pieris*, *Tragopogon*,
Scorzonera, *Taraxacum*, *Lactuca*, *Mulgedium*, *Sonchus*, *Crepis*,
Hieracium.

Опредѣлитель родовъ.

1. Растеніе однодомное: верхушечные цвѣты въ клубочкахъ—мужскіе; нижніе—пазушные женскіе; тычинки свободныя.

Xanthium.

Растенія обоеполия или съ цвѣтами разнополыми въ одной корзинкѣ. рѣже двудомныя, но пыльники спаиваны въ трубку, черезъ которую въ обоеполыхъ цвѣтахъ проходитъ столбикъ. 2.

2. Цвѣты въ корзинкѣ трубчато-ворончатые, ворончатые или краевые язычковые, остальные—трубчато-ворончатые. 3.

Всѣ цвѣты въ корзинкѣ язычковые. 38.

3. Соцвѣтіе шарообразное безъ общей обертки, состоящее изъ одиночныхъ цвѣтовъ съ черенчатой оберткой каждый; цвѣты бѣлые или голубоватые; пыльники синіе.

Echinops.

Цвѣты собраны въ корзинки съ общей оберткой. 4.

4. Хохолка на сѣмянкѣ нѣтъ или вмѣсто него 2—4 щетинки, или же пленчатая коронка. 5.

Хохолокъ на сѣмянкѣ изъ 6. или м. длинныхъ простыхъ или перистыхъ волосковъ. 16.

5. Всѣ цвѣты въ корзинкѣ трубчато-ворончатые. 6.

Краевые цвѣты въ корзинкѣ язычковые; остальные трубчато-ворончатые. 9.

6. Сѣмянки на верхушкѣ съ 2—4 зазубренными щетинками; листья супротивные.

Bidens.

Сѣмянки безъ щетинокъ, но на верхушкѣ часто неправильная пленчатая коронка или валикъ; листья очередные или только корневые. 7.

7. Цвѣтоложе коническое; сѣмянки съ внутренней стороны съ 3—5 сближенными ребрышками, часто слегка крылатыми.

Matricaria.

Цвѣтоложе плоское или полушаровидное; сѣмянки равномерные 2—10-ребристыя или безъ реберъ. 8.

8. Корзинки мелкія, не крупнѣе 4 мм., въ частыхъ метелкахъ.

Artemisia.

Корзинки 6—10 мм., частымъ щиткомъ. *Chrysanthemum*.

9. Цвѣтоложе голое безъ прицвѣтничковъ. 10.
Цвѣтоложе съ прицвѣтниками. 12.
10. Обвертка двурядная; всѣ листья корневые: стрѣлка обѣ одной
корзинкѣ. *Bellis*.
Обвертка многорядная черепчатая; листья стеблевые. 11.
11. Цвѣтоложе плоское или полусферическое; сѣмянки равномерно
5—10-ребристыя. *Chrysanthemum*.
Цвѣтоложе коническое; сѣмянки только съ внутренней стороны
съ 3—5 сближенными ребрышками, часто слегка крылатыми.
Matricaria.
12. Листья супротивные. *Bidens*.
Листья очередные, рѣдко супротивные, но тогда корзинки очень
крупныя. 13.
13. Сѣмянки съ 2—4 опадающими чешуевидными щетинками, ясно
замѣтными при цвѣткѣ. *Helianthus*.
Сѣмянки съ маленькой плечатой коронкой или совсѣмъ безъ
коронки, не замѣтной даже при цвѣтахъ. 14.
14. Листья крупныя, сердцевидно-яйцевидныя или яйцевидныя.
Buphthalmum.
Листья двояко-перисто-разсѣченныя или же листья линейно-лан-
цетныя. 15.
15. Корзинки мелкія; язычковые цвѣты съ округлымъ отгибомъ;
сѣмянки гладкія сплюснутыя. *Achillea*.
Корзинки крупныя; язычковые цвѣты съ продолговатымъ отги-
бомъ; сѣмянки сплюснутыя, 4-гранныя или со многими про-
дольными ребрышками. *Anthemis*.
16. Обвертка изъ одного ряда листочковъ, иногда у основанія ея
еще маленькіе чешуевидныя листочки или вмѣсто нихъ два
супротивныхъ узкихъ листочка. 17.
Обвертка 2-многорядная, черепчатая. 20.
17. У основанія оберстки 2 супротивныхъ удлинненныхъ листочка.
Ligularia.
Основаніе оберстки безъ листочковъ или съ маленькими чешуе-
видными листочками. 18.
18. Корзинка одна, конечная на цвѣтоносѣ, покрытомъ чешуевид-
ными листьями. *Tussilago*.
Корзинки въ кистяхъ, щиткахъ или метелкахъ. 19.
19. Стебель покрытъ листьями; цвѣты желтые; цвѣторасположеніе
щитковидное б. ч. раскидистое. *Senecio*.
Листья только корневые; цвѣты желтовато-бѣлые или розоватыя;
корзинки въ густыхъ конечныхъ кистяхъ, щиткахъ или ме-
телкахъ; стебель съ одними чешуйчатыми листьями.
Petasites.

20. Листья на стеблѣ супротивные. *Eupatorium.*
Листья очередные. 21.
21. Хохолокъ на сѣмянкѣ изъ перистыхъ волосковъ. 22.
Хохолокъ изъ простыхъ или зазубренныхъ гибкихъ волосковъ,
или же изъ щетинокъ. 25.
22. Листочки обертки внутреннего ряда пленчатые, линейные, окра-
шенные, походятъ на язычковые цвѣты; волоски въ хохолкѣ
срались пучками. *Carlina.*
Всѣ листочки въ оберткѣ не пленчатые и не походятъ на
язычковые цвѣты; волоски въ хохолкѣ не срались пучками. 23.
23. Листья лоснящіеся съ бѣлыми пятнами; тычиночныя нити сра-
лись въ нижней части. *Silybum.*
Листья безъ бѣлыхъ пятенъ; тычиночныя нити свободныя. 24.
24. Цвѣтоложе мясистое, какъ и нижняя часть листьевъ обертки. *Cynara.*
Листочки обертки не мясистые, какъ и цвѣтоложе. *Cirsium.*
25. Цвѣтоложе голое безъ прицвѣтниковъ или посрединѣ голое, а
по краямъ съ прицвѣтниками. 26.
Все цвѣтоложе покрыто прицвѣтниками или щетинками, или же
цвѣтоложе глубоко-ячеистое, края ячеекъ рѣсничатые или
неравно-зубчатые. 34.
26. Стебель, особенно въ верхней части близъ корзинокъ, густо
покрытъ бѣлымъ войлокомъ прижатыхъ или шерстистыхъ
волосковъ, или же все растеніе покрыто бѣлымъ войлокомъ. 27.
Растеніе хотя и бываетъ опушено, но не бѣлымъ войлокомъ. 30.
27. Листочки обертки вполнѣ пленчатые, окрашенные, ярко-желтые,
бѣлые или розовые. 28.
Листочки обертки съ широкимъ пленчатымъ буроватымъ краемъ
или наружные листочки травянистые, а внутренніе пленчатые. 29.
28. Листочки обертки ярко-желтые. *Helichrysum.*
Листочки обертки бѣлые или розовые. *Antennaria.*
29. Обертка овально-коническая, 5-гранная, въ пазухахъ ея ли-
сточковъ съ женскими цвѣтами; наружные листочки травя-
нистые, внутренніе — пленчатые; цвѣтоложе посрединѣ голое,
по краямъ съ прицвѣтниками. *Filago.*
Обертка яйцевидная или колокольчатая, безъ цвѣтовъ въ па-
зухахъ ея листочковъ, которые всѣ съ широкимъ пленчатымъ
краемъ; цвѣтоложе сплошь голое. *Gnaphalium.*
30. Красные язычковые цвѣты въ корзинкѣ лиловые или бѣлые. 31.
Краевые язычковые цвѣты въ корзинкѣ желтые. 32.
31. Краевые язычковые цвѣты въ корзинкѣ 2-многорядные, очень
узкіе, линейные или нитевидные. *Erigeron.*
Краевые язычковые цвѣты въ корзинкѣ одnorядные широкіе не
нитевидные. *Aster.*

32. Язычковыхъ цвѣтовъ въ корзинкѣ немного (5—9); соцветіе б. ч. удлинненное, метельчатое или въ однобокихъ кистистыхъ метелкахъ. *Solidago*.

Язычковыхъ цвѣтовъ много; корзинки одиночныя или собраны циткомъ. 33.

33. Хохолокъ изъ волосковъ, часто сросшихся основаніями. *Inula*.
Хохолокъ изъ волосковъ, окруженныхъ зубчатой короной, по краямъ неравно-зубчатой. *Pulicaria*.

34. Цвѣтоложе мясистое, яченстое; края ячеекъ рѣсничатые или неравно-зубчатые. *Onopordon*.

Цвѣтоложе не мясистое, сплошь покрыто щетинками. 35.

35. Хохолокъ изъ длинныхъ волосковъ, сросшихся основаніями въ кольцо. *Carduus*.

Хохолокъ изъ щетинокъ, не сросшихся основаніями въ кольцо. 36.

36. Листочки обертки оканчиваются крючковатымъ остриемъ

Arctium.

Листочки обертки оканчиваются прямымъ остриемъ или придаткомъ перисто-гребенчатымъ, или же сухимъ расщепленнымъ. 37.

37. Листочки обертки оканчиваются перисто-гребенчатымъ или сухимъ расщепленнымъ придаткомъ или краемъ; краевые цвѣты б. ч. ворончатые, остальные трубчато-ворончатые.

Centaurea.

Листочки обертки безъ придатка, но наружные съ остриемъ; всѣ цвѣты трубчато-ворончатые. *Serratula*.

38. Цвѣты голубые. 39.

Цвѣты желтые, рѣдко пурпуровые или розово-пурпуровые. 40.

39. Цвѣтоложе яченстое, съ щетинистыми прицвѣтниками только въ центрѣ; вмѣсто хохолка маленькая зубчатая корона; нижніе листья струговидно-надрѣзные или выемчато-зубчатые.

Cichorium.

Цвѣтоложе голое; хохолокъ изъ простыхъ очень ломкихъ волосковъ, окруженъ широкимъ остро-зубчатымъ колечкомъ; нижніе листья копьевидно-сердцевидные. *Mulgedium*.

40. Обертка однорядная или у основанія съ 1—5 очень маленькими чешуевидными листочками. 41.

Обертка 2-многорядная черепчатая. 42.

41. Хохолка нѣтъ.

Lampsana.

Хохолокъ есть.

Tragopogon.

42. Волоски въ хохолкѣ простые. 43

Волоски въ хохолкѣ перистые или внутренніе перистые, а наружные простые. 47.

43. Обертка цилиндрическая или коническая, длина ея въ 3 раза болѣе ширины; корзинки мелкія съ немногими цвѣтами.

Lactuca.

Обертка широкая, чашевидная или колокольчатая, рѣдко цилиндрическая, но длина ея не болѣе 2 разъ превосходитъ ширину; корзинки многоцвѣтковые. 44.

44. Наружныя листочки обертки отвернуты книзу; сѣмянки съ длиннымъ нитевиднымъ носикомъ. *Taraxacum*.

Наружныя листочки обертки не отвернуты; сѣмянки безъ носика или съ очень короткимъ носикомъ. 45.

45. Листья б. ч. колюче-зубчатые; сѣмянки сплюснутыя.

Sonchus.

Листья не колюче-зубчатые; сѣмянки цилиндрическія. 46.

46. Сѣмянки къ верхушкѣ сужены, иногда въ очень короткій носикъ; хохолокъ многорядный изъ бѣлыхъ мягкихъ волосковъ, рѣдко волоски слегка желтоватые. *Crepis*.

Сѣмянки слегка сужены книзу, а къ верхушкѣ усѣчены; хохолокъ 1—2-рядный изъ ломкихъ желтоватыхъ волосковъ.

Hieracium.

47. Корзинки въ щитковидномъ соцвѣтіи; стебель до верху покрытъ листьями; наружныя листочки обертки отогнуты.

Picris.

Корзинки по 1—3, на концѣ стрѣлки, съ длинными цветоносами; листья б. ч. корневые, или же стеблевыхъ 1—2; наружныя листочки обертки не отогнуты. 48.

48. Цвѣтоложе съ узкими плечатыми прицвѣтниками, опадающими къ созрѣванію сѣмянъ.

Hypchoeris.

Цвѣтоложе голое. 49.

49. Листья узко-линейные или эллиптическіе, цѣльнокрайніе.

Scorzonera.

Листья выемчато-зубчатые или выемчато-перисто-раздѣльные.

Leontodon.

384. Eupatorium L.

Обертка черешчатая 2- многорядная; всѣ цвѣты въ корзинкѣ одинаковые; вѣнчикъ узко-ворончатый, 5-зубчатый; цвѣтоложе голое безъ прицвѣтниковъ; сѣмянки 5-гранныя, съ усѣченной верхушкой и съ хохолкомъ изъ одного ряда волосковъ.

924. *E. cannabinum* L. Пет. Отч., стр. 13.—Пет. Кр. II, стр. 17.—Пет., стр. 186.—Кауф. II, № 364.—Цин., № 679.—Кауф. I, стр. 240.—Lind., p. 122.—Borg, p. 699.—Дв., № 784.—Макс., № 754.—Mart., p. 143.—St. I, № 553.—Pal., № 1824.

Корневище толстое, цилиндрическое; стебель 50—150 см., простой или вѣтвистый, прямостоящій, часто красноватый, коротко-опушенный;

листья супротивные, на коротких черешках, шероховатые от коротких прижатых волосков; нижние—5-ные, средние—тройчатые, верхние—часто простые; листочки яйцевидно-ланцетные или ланцетные, б. ч. длинно-заостренные, по краям неравно- и остро-зубчатые, средний листок несколько шире и длиннее боковых; соцветие густое, щитковидное; корзинки 4—7-цветковые; обертка около 6 мм. дл., листочки ее продолговато-ланцетные, с широким белым или розовым пленчатым краем; венчик лилово-розовый.



Eupatorium cannabinum.

По берегам ручьев и по сырým мѣстамъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ середины юня до сентября. Соколово по берегу р. Сходни (Ш.).—Юзасни, Срп. у. (Дв.).—Подъ Серпуховымъ (М.).—Близъ Тарбушева по берегу р. Оки, Кѣм. у. (С. П. Ростовцевъ).—Близъ с. Рождествено на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

385. *Solidago L.*

Обертка узко-колокольчатая, черепичатая; краевые цвѣты въ корзинкѣ б. ч. язычковые женскіе, остальные обоеполые, ворончато-трубчатые, 5-зубчатые; цвѣтоложе плоское, голое, безъ прицвѣтничковъ; сѣмянки цилиндрическія о 8—12 ребрышкахъ и съ хохолкомъ изъ одного ряда (рѣже изъ двухъ рядовъ) волосковъ.

925. *S. virga aurea L.*

Solidago Virga-aurea L. Бух. II, № 209.—Бух. I, № 199.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 282.—Кauf. II, № 373.—Цин., № 690.—Kauf. I, стр. 244.—Ann., C. III, № 225.

Solidago Virgaurea L. Дв., № 798.—Макс., № 774.—Hoff. II., № 6899.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 148.—St. I, № 573.—Pal., № 1884.

Корневище почти деревянистое; стебель прямостоящій, 30—100 см., часто красноватый, въ нижней части цилиндрическій, къ верхушкѣ становится ребристымъ, опушеннымъ; нижніе листья на длинныхъ, слегка крылатыхъ черешкахъ, эллиптическіе или обратно-яйцевидные, тупые или заостренные, зубчатые; къ верхушкѣ стебли листья уже, болѣе заостренные и мельче зубчатые, верхніе—сидячіе, часто цѣльнокрайніе; все листья по краямъ рѣсничатые, голые или слегка опушенные, снизу свѣтлые и съ просвѣчивающими сѣтчатыми жилками; цвѣты желтые въ кистяхъ, собраны узкою или вѣвистой метелкою; корзинки 6—12 мм. дл.; листочки обертки линейно-ланцетные голые или опушенные, зеленые съ белымъ пленчатымъ краемъ; язычковыхъ цвѣтовъ немного (5—9), продолговато-линейныхъ; сѣмянки слегка опушенные.

По лугамъ, полянамъ, кустарникамъ и лѣсамъ, часто. Цвѣтетъ съ середины юля до поздней осени.

Распадается на слѣдующія формы:

α. vulgaris Lam.

Корзинки собраны въ пазухахъ укороченныхъ листьевъ, образуютъ узкую метелку, или соцветіе густо-вѣтвистое; очень часто.

β. foliosa Fiori.

Корзинки собраны въ малоцвѣтковые кисти или даже одиночныя въ пазухахъ крупныхъ листьевъ, не отличающихся отъ стеблевыхъ; форма тѣнистыхъ мѣстъ. *) Лѣсъ между полотною Яр. ж. д. и Братовицкой, Дят. у. (С.).



Solidago virga aurea α. *vulgaris*.



Solidago virga aurea β. *foliosa*.

926. **S. canadensis L.** Пер. Кр. II, стр. 33. — Пер., стр. 282. — Пин., стр. 226. — Пал., № 1882.

Корневище вѣтвистое, многолѣтнее; стебли 1.5—2.5 м., прямостоящіе, мягко опушенные; листья голые или опушенные, ланцетные, къ обоимъ концамъ заостренные, по краямъ остро-зубчатые или при основаніи цѣльнокрайніе, съ 3 продольными жилками, изъ которыхъ 2 боковыя слабо выдаются; цвѣты золотисто-желтые, въ одностороннихъ отогнутыхъ кистяхъ, собранныхъ въ широкую метелку; корзинки мелкія, 2—4 мм. дл.; краевые язычковые цвѣты очень короткіе едва длиннѣе обертки, листочки которой продолговато-линейные туповатые.

*) По поводу этой формы Adv. Fiori въ Schedae ad Floram Italianam Exsiccatam, № 173 говоритъ, что можно наблюдать всѣ переходы ея къ α. *vulgaris* Lam. Это пришлось замѣтить и мнѣ, но крайнія формы очень характерны.

Одичалое по старым паркамъ, не часто. Цвѣтетъ въ августѣ. Горенки (К.).—Гирѣво (Куль.).



Solidago canadensis.



Bellis perennis.

386. *Bellis* Tourn.

Обертка полушаровидная, двурядная; краевые цвѣты въ корзинкѣ язычковые, женскіе, остальные обоюполые, ворончато-трубчатые 5 (4)-зубчатые, цвѣтоложе коническое, голое безъ прицѣпниковъ; сѣмянки безъ хохолка, продолговато-обратно-яйцевидныя, сплюснутыя, съ нѣсколькимъ возвышеннымъ верхнимъ краемъ.

927. *B. perennis* L. Хор. III, стр. 91.—Пет. Кр. II, стр. 19. — Ф. Б., № 41. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 146. — Кауф. II, № 370. — Цин., стр. 226.—Pinz., p. 13.—Кауф. I, стр. 243.—Ноев. Н., № 6963.—Pal., № 1897.

Корневище ползучее, часто вѣтвистое, многолѣтнее; все растение б. или м. густо покрыто волосами; листья только корневые розеткой, ланцатные или обратно-яйцевидные, сужены въ б. или м. длинный крылатый черешокъ, по краямъ неясно-зубчатые или неравно-городковые; цвѣточная стрѣлка обѣ одной корзинкѣ; листочки обертки 4—5 мм. дл., тупые съ едва замѣтнымъ клиемъ; язычковые цвѣты съ слегка опушенной трубкой, продолговато-линейные, съ тупой или выемчатой верхушкой, бѣлые или бѣлые съ розовымъ кончикомъ и розовой нижней стороной; трубчатые цвѣты желтые; сѣмянки слегка опушенные.

По лугамъ близъ жилья, одичалое. Цвѣтетъ съ половинны мая все лѣто. Лугъ близъ церкви въ Царицынѣ (К.).—Кушково (Ассѣ).—Останкино (П.). По берегу р. Сѣтуни близъ 17-й версты Брянск. ж. д. по берегу р. Македоновки близъ ст. Удѣльная Ряз. ж. д. Бри. ул. С.). —Оздобинино въ имѣніи, быв. Грачева, Пдл. у. (Х.).

387. *Áster* L.

Обвертка колокольчатая или полушаровидная, черепичато-2-много-
рянная съ листочками по краямъ пленчатыми; красные цвѣты язычковые,
женскіе или безплодные, остальные обоенные ворончато-трубчатые, 5-зуб-
чатые, рѣже все цвѣты трубчатые; цвѣтоложе плоское или выпуклое,
ямчатое, голое, безъ прицвѣтниковъ; сѣмянки б. ч. сплюснутыя опушен-
ныя, съ хохолкомъ изъ одного или нѣсколькихъ рядовъ волосковъ.

1. Стебель, особенно въ верхней части, съ 2—4 рядами волосковъ;
листья съ одной срединной жилкой и боковыми сѣтчатыми.

A. salicifolius Scholl.

Стебель равномерно или по всемъ ребрамъ покрытъ волосками;
листья, особенно нижніе, о 3 продольныхъ жилкахъ. 2.

2. Листья линейные или линейно-ланцетные съ просвѣчивающими
точечными железками.

A. sedifolius L.

Листья безъ точечныхъ железокъ, нижніе—эллиптическіе или про-
долговато-обратно-яйцевидные, верхніе—продолговато-ланцет-
ные или ланцетные.

A. Amellus L.

928. *A. sedifolius* L. *)

Aster acer L. Kayf. II, № 369.

Galatella punctata Lindl. Her. Kr. II, стр. 19.—Her., стр. 191.—Гор., № 42.—Цин.,
№ 686.—Pal., № 1872.

Корневище деревянистое; стебли прямостоящіе. 30—100 см., слегка
ребристые, шероховатые, какъ и все расте-
ніе, густо покрыты листьями; послѣдніе
линейные или линейно-ланцетные, заострен-
ные, цѣлюкрайніе, съ точечными просвѣ-
чивающими железками и 3 жилками; кор-
зинки до 25 мм. въ поперечникѣ, въ щитко-
образномъ метельчатомъ соцвѣтіи; листочки
обвертки 3—4 мм. дл., ланцетные, острые,
съ широкой пленчатой каймой; язычковые
цвѣты безплодные, немногочисленные, лиловые,
рѣдко почти бѣлые; трубчатые—желтые.



Aster sedifolius.

По опушкамъ и кустарникамъ, рѣдко.
Цвѣтетъ съ половины іюля весь августъ.
За Лужками, Срп. у (Г.).—Между Шкифо-
ровымъ и Лопасней, Срп. у. (II.).

*) Williams Fr. N., въ статьѣ: *Aster sedifolius* L. and its varieties (The Journal of Botany, 1905, p. 78—79), показалъ, что правильнѣе называть это растеніе вышеприведеннымъ именемъ, опубликованнымъ въ Species plantarum, editio I, p. 874, тогда какъ *A. acer* L. упо-
минается только во II изданіи p. 1228.

929. **A. Améllus L.** Пет. Кр. II, стр. 18.—Пет., стр. 143.—Кауф. II, № 368.—Шип., № 684.—Руур., стр. 86.—Кауф. I, стр. 242.—Pal., 1870.

Корневище короткое, толстое, черно-бурое; стебли 20—60 см., б. ч. простые, часто красноватые, покрыты, как и листья, короткими, жесткими волосками, отчего шершавые; листья заостренные или туповатые, пильнокрайние, рёбра слегка зазубренные; нижние эллиптические или продолговато-обратно-яйцевидные, сужены в черешок; верхние — ланцетные или продолговато-ланцетные сидячие или почти сидячие; соцветие верхушечное, щитковидное, не густое, рёбра стебель оканчивается одной корзинкой, 30—40 мм. в поперечник; листочки обертки яйцевидно-продолговатые, внутренние — ланцетные, травянистые, с пленчатым зеленым или буровато-лиловым, рёбничатым краемъ, наружные — часто отвороченные; язычковые цветы женские, голубовато-фиолетовые; трубчатые — желтые.

По береговой полосе р. Оки, какъ въ Срп., такъ и въ Кзм. уу., на пескахъ и на известнякѣ. Цвететъ съ половины юля весь августъ.

Нарѣдка у насъ встрѣчается еще слѣдующая форма:

α. laticeps GB.

Листочки обертки обратно-яйцевидно-ланцетные, на верхушкѣ округлые съ широкой почти пурпуровой пленчатой каймой. Каропчеево, Кзм. у. (П.).—Лужки, Срп. у. (С.).



Aster Amellus.



Aster salicifolius.

930. A. salicifolius Scholl.

Aster salicifolius Lam. Пет. Кр. II, стр. 18.—Бух. II, стр. 24.

Aster novi Belgii Nees. α. *ampliflorus* Nees. Бух. I, стр. 16.

Корневище толстое вѣтвистое, ползучее; стебель прямостоящій, 30—100 см., метельчато-вѣтвистый, въ нижней части голый, въ верхней части ребристый и съ 2—4 рядами короткихъ волосковъ; листья ланцетные, къ обоимъ концамъ заостренные, голые или по краямъ шероховатые, съ одной срединной жилкой и боковыми вѣтчатыми, пильно-

крайніе или съ не многими острыми зубцами; нижніе—иногда сужены въ короткій черешокъ; верхніе — сидячіе, полустеблеобъемлющіе и мельче нижнихъ; цвѣты въ конечныхъ малоцвѣтковыхъ кистяхъ; листочки обертки линейные, острые или заостренные, зеленые, съ узкой плечатой каймой, которая становится шире къ основанію листочковъ; корзинки 20—30 мм. въ поперечникѣ; язычковые цвѣты женскіе бѣлые или свѣтло-лиловые; трубчатые—желтые.

Разводится по садамъ и иногда дичаетъ; по паркамъ, по берегамъ прудовъ и по ручьямъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ половины іюля весь августъ. Близъ с. Воронцова, въ паркѣ (П. и Сюз.). — Кузьминки (бр. Сабанѣвы). — Семеново, Зви. у. (П.). — Михайловское, Идл. у. (В.). — С. Васильевское, Идл. у. (кн. Васильчиковъ). — Подольскъ, въ паркѣ; Горенки, близъ парка (Куль.). — По дорогѣ отъ Юдинской платформы Бреск. ж. д. въ Дарьино и по обрыву берега р. Самынки близъ д. Подушкино, Зви. у. (X.).

388. *Erigeron L.*

Обертка колокольчатая или полушаровидная, черешчатая, 2—3-рядная; красные цвѣты язычковые или почти нитевидные, женскіе — въ нѣсколько рядовъ, рѣдко всѣ цвѣты ворончато-трубчатые, обоенные, 4—5-зубчатые; цвѣтоложе плоское, голое безъ прицвѣтничковъ; сѣмянки сплюснутыя, опушенные, съ хохолкомъ изъ одного ряда волосковъ или изъ двухъ рядовъ неравной длины.

1. Язычковые цвѣты очень мелкіе, равны оберткѣ; корзинки не крупнѣе 5 мм. *E. canadensis L.*

Язычковые цвѣты длиннѣе обертки, иногда вдвое; корзинки крупнѣе 5 мм. 2.

2. Язычковые цвѣты многорядные; сѣмянки съ хохолкомъ изъ одного ряда волосковъ. *E. acer L.*

Язычковые цвѣты 2-рядные; сѣмянки у трубчатыхъ цвѣтовъ съ хохолкомъ изъ двухъ рядовъ волосковъ—наружнаго болѣе короткаго. *E. heterophyllus Mühlenb.*

931. *E. heterophyllus Mühlenb.*

Stenactis annua Nees, Пет. Кр. II, стр. 33.

Растеніе одно-двулѣтнее; стебель прямостоящій, 40—90 см., ребристый, покрытъ рѣдкими отстоящими волосками; нижніе листья на длинныхъ черешкахъ, эллиптически или обратно-яйцевидные, съ округлой верхушкой, по краямъ съ рѣдкими зубцами, къ верхушкѣ стебля листья становятся уже и на болѣе короткихъ черешкахъ; верхніе—ланцетные, сидячіе, заостренные и б. ч. цѣльнокрайніе; всѣ покрыты рѣдкими волосками или голые; цвѣты въ верхушечной щиткообразной метелкѣ; корзинки 10—18 мм. въ поперечникѣ; обертка изъ 2—3 рядовъ листочковъ въ 6—7 мм. дл., съ плечатымъ краемъ и рѣдкими длинными волосками; краевые цвѣты двурядные, язычковые бѣлые, вдвое длиннѣе

обвертки: остальные трубчатые желтые; сѣмянки у краевых цвѣтовъ съ хохолкомъ изъ одного ряда волосковъ, у остальныхъ изъ двухъ рядовъ—наружнаго болѣе короткаго.

Одичалое, рѣдко. Цвѣтеть съ конца іюня до конца іюля. Горенки (Гей.) — Б. Мытники на лугу близъ жилья (С.).



Erigeron heterophyllus.



Erigeron acer.

932. **E. ácer L.** Бух. II, № 207.—Цин., № 689.—Pinz., p. 13.

Erigeron acris L. Бух. I, № 197.—F. O., № 6, p. 86.—Нер., стр. 184.—Кауф. II, № 371.—Кауф. I, стр. 243.—Lind., p. 122.—Ann., C. I, № 28.—Дв., № 789.

Erigeron acre L. Макс., № 764.—Hoff. II, № 6748.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 146.—St. II, p. 49.—St. I, № 564.—Pal., № 1859.

Стебель 30—40 см., прямостоящій, ребристый, часто красноватый, б. или м. густо покрытъ, какъ и все растеніе, отстоящими многокѣлочными волосками; нижніе листья ланцетные или ланцетно-ланцетные, сужены въ черешокъ, туповатые или заостренные; къ верхушкѣ стебли листья становятся уже и острѣе, верхніе сидячіе; все цѣлюкрайніе, рѣбчатые, рѣже съ не многими зубцами; соцвѣтіе верхушечное, киститое, простое или сложное; корзинки 6—10 мм. дл.; листочки обвертки узко-линейные, заостренные, внутренніе—часто съ узкой пленчатой каймой; краевые цвѣты многорядные, почти въ два раза длиннѣе обвертки, голубовато-лиловые; наружныя—очень узко-язычковые, внутренніе—нитвидные; трубчатые цвѣты желтовато-зеленые; хохолокъ быстро разрастается и состоитъ изъ одного ряда волосковъ.

По паровымъ полямъ, дорогамъ, пустырямъ и открытымъ мѣстамъ, часто. Цвѣтеть съ начала іюня до августа, иногда во второй разъ въ сентябрѣ.

Распадается на слѣдующія формы:

2. **týpicus GB.**

Все растеніе, включая обвертку, густо покрыто отстоящими волосками.

3. *droebachiensis* O. F. Müller.

Стебель голый или слабо покрыть волосками; листья почти голые, по краямъ рѣсничатые, рѣже совсѣмъ голые; обвертка почти голая. По тѣмнымъ мѣстамъ и порубкамъ, не часто.

γ. *brachyglóssus* DC.

Краевые цвѣты не длиннѣе внутреннихъ. Между Вешняками и Косинымъ и близъ Ново-Удѣльной, Ряз. ж. д., Бри. у. (X.).

933. *E. canadensis* L. Sch. IV, № 1026. — Бух. II, № 208. — Бух. I, № 198. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 184. — Кауф. II, № 372. — Цин., № 688. — Кауф. I, стр. 244. — Lind., p. 122. — Ann., C. I, № 27.

Erigeron canadense L. Дв., № 790. — Макс., № 763. — Hoff. H., № 6751. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 146. — Hoff., № 1288. — St. II, p. 49. — St. I, № 563. — Pal., № 1857.



Erigeron canadensis.

Корень однолѣтній веретенообразный; стебель прямостоящій 25—125 см., тонко-ребристый, покрыть жесткими отстоящими волосками; листья ланцетные или линейно-ланцетные, по краямъ и снизу вдоль жилокъ щетиристо-рѣсничатые, цѣло-крайніе, нижніе иногда неясно-зубчатые; корзинки мелкія, 3—5 мм. дл., на длинныхъ цвѣтоножкахъ въ кистисто-метельчатомъ густомъ соцвѣтіи; обвертка изъ линейныхъ голыхъ листочковъ съ широко-перепончатымъ краемъ; краевые цвѣты въ корзинкѣ бѣлые, многорядные, съ узкимъ язычкомъ, едва превышающимъ обвертку, остальные — трубчатые; сѣмянки съ хохолкомъ изъ одного ряда волосковъ.

Занесено изъ Канады; встрѣчается какъ сорное, очень часто. Цвѣтетъ съ середины іюня до поздней осени.

389. *Filágo* L.

Обвертка овально-коническая, черепчатая, 5-гранная; наружные ея листочки травянистые, внутренніе — пленчатые; краевые цвѣты женскіе, литевидно-трубчатые, въ нѣсколько рядовъ, нѣкоторые въ пазухахъ внутреннихъ листочковъ обвертки, остальные цвѣты обоеполые, трубчато-ворончатые, 5(4)-зубчатые; цвѣтоложе посрединѣ голое, по краямъ съ прищептинками; сѣмянки цилиндрическія, съ опадающимъ хохолкомъ изъ одного или многихъ рядовъ волосковъ; у краевыхъ сѣмянокъ иногда хохолка нѣтъ.

934. **F. arvensis L.** Бух. II, № 214. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 188. — Кауф. II, № 380. — Цип., № 755. — Кауф. I, стр. 249. — Lind., p. 128. — Ann., C. III, № 226. — Дв., № 788. — Макс., № 762. — Mart., p. 153. — St. II, p. 52. — St. I, № 593. — Pal., № 1963.

Gnaphalium arvense Willd. Дв., № 788. — Макс., № 762. — Hoff. II, № 6691. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 153.

Растение однолѣтнее; стебель 15—40 см., б. ч. вѣтвистый, съ торчащими не вѣтвистыми вѣточками, густо покрытъ, какъ и все растение, бѣлымъ войлокомъ; листья сидячіе ланцетные или линейно-ланцетные, тупые или заостренные, цѣлюкрайніе; корзинки 4—5 мм. дл., въ пазухахъ верхнихъ листьевъ по 2—5 въ клубочкахъ на короткихъ цветоносахъ, образуютъ прерывающіе колосы; обертки при плодахъ горизонтально-раскрытыя.

По паровымъ поймамъ, посѣвамъ, дорогамъ и на песчаныхъ мѣстахъ, очень часто. Цвѣтетъ съ іюня до осени.



Filago arvensis.



Antennaria dioica.

390. *Antennaria* Gaertn.

Растение двудомное; обертка полушаровидная, черешчатая, многорядная, окрашенная; цвѣтоложе голое безъ прицвѣтничковъ; на женскихъ особяхъ всѣ цвѣты въ корзинкахъ только женскіе, питевидные; чашечка изъ многорядныхъ волосковъ, сросшихся основаниями; цвѣты въ мужскихъ особяхъ обоеполые, но не приносящіе плода, трубчато-ворончатые, 5-зубчатые; чашечка изъ одного ряда волосковъ, на концѣ перисто-булавовидно-расширенныхъ; сѣмянки цилиндрическія.

935. **A. dioica (L.) Gaertn.** Пет. Кр. II, стр. 23. — Пет., стр. 137. — Цип., № 754. — Ann., C. I, № 30.

Gnaphalium dioicum L. Бух. II, № 216. — Бух. I, № 205. — F. O., № 6, p. 86. — Кауф. II, № 383. — Pinz., p. 13. — Кауф. I, стр. 251. — Lind., p. 126. — Дв., № 785. — Макс., № 759. — Hoff. II, № 6695. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 145. — Hoff., № 1495. — St. II, p. 49. — St. I, № 559. — Pal., № 1850.

Gnaphalium masculum Mart. Mart., p. 145.

Gnaphalium femineum Mart. Mart., p. 145.

Корневище ползучее, вѣтвистое, съ укореняющимися, не цвѣтущими вѣточками, въ видѣ розетокъ листьевъ, и съ цвѣтущими простыми стеблями: все растение, иногда исключая верхней стороны листьевъ, покрыто бѣлымъ войлокомъ; корневые листья и листья укороченныхъ вѣточекъ лопатчатые или лопатчато-обратно-яйцевидные, тупые или быстро заостренные, сужены въ б. или м. длинный черешокъ; стебли 10—30 см., покрыты прижатыми листьями, которые къ верхушкѣ становятся уже и болѣе заостренными, верхніе же почти линейные; соцвѣтіе верхушечное, малоцвѣтковое, щитковидное; корзинки 5—10 мм. дл.; мужскія корзинки болѣе шаровидныя, женскія—болѣе продолговатыя; обертка бѣлая, бѣдно- или темно-розовая; листочки ея въ нижней части травянистые, войлочные, верхняя же ихъ часть кожистая, окрашенная; сѣмянки около 1 мм., гладкія или шероховатыя.

По лугамъ, кустарникамъ, опушкамъ и открытымъ мѣстамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ середины мая до іюля; плоды съ середины іюня.

Распадается на слѣдующія формы:

α. *gállica* Camus.

Верхняя сторона листьевъ голая, нижняя—бѣло-войлочная.

β. *boreális* Camus.

Листья съ обѣихъ сторонъ бѣло-войлочные, но съ верхней не столь густо; чаще предыдущей формы.

391. *Gnaphálium* L.

Обертка яйцевидная или колокольчатая, черешчатая; листочки ея съ очень широко-пленчатымъ краемъ; краевые цвѣты въ корзинкѣ женскіе, одно-многорядные, нитчато-трубчатые; остальные—обоюстные, ворончато-трубчатые, 5-зубчатые; цвѣтоложе выпуклое, голое, безъ прицвѣтничковъ; сѣмянки эллипсоидальныя, всѣ съ хохолкомъ изъ однородныхъ ломкихъ волосковъ.

936. *G. silvaticum* L. Пет. Кр. II, стр. 22. — Бух. II, № 215. — Бух. I, № 204. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 196. — Kayf. II, № 381. — Цин., № 753. — Kayf. I, стр. 250. — Lind., p. 126. — Ann. C. I, № 29. — Дв., № 786. — Макс., № 760. — Mart., p. 145. — St. II, p. 49. — St. I, № 560. — Pal., № 1851.

Gnaphalium rectum Sm. Макс., № 760. — Hoff. II, № 6712. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 145.

Растеніе многолѣтнее; стебли 30—100 см., прямостоящіе, простые, б. или м. густо покрыты бѣлымъ войлокомъ, особенно густо у цвѣточныхъ корзиннокъ; корневые листья и листья не цвѣтущихъ укороченныхъ стеблей удлинено-язычковидные, сильно вытянутые въ черешокъ, къ верхушкѣ стебля листья становятся уже и короче; верхніе—узко-ланцетные или почти линейные, сидятъ: всѣ заостренные, вѣдьнокрайніе, сверху зеленые, слабо опушенные, снизу покрыты тонкимъ бѣлымъ или сѣроватымъ войлокомъ; цвѣты въ пазухахъ верхнихъ листьевъ по одному или по нѣскольку въ укороченныхъ колоскахъ или почти въ головкахъ, образуютъ густой или прерванный колосъ; корзинки 6—7 мм. дл., цилиндрическія или нѣсколько сужены къ верхушкѣ; листочки обертки

тупые, наружные — яйцевидно-продолговатые, зеленые; внутренние — продолговатые, достигшие, сь широкимъ, буровато-желтымъ или бурымъ краемъ; цвѣты мелкіе, желтовато-бѣлые, сѣва превышаютъ обертку.

По лѣсамъ и кустарникамъ, часто. Цвѣтеть сь половины іюля до осени; плоды сь середины августа.

Распадается на слѣдующія формы:

2. **virgátum Kit.**

Стебли до 1 м.; цвѣточные колоски длинныя или цвѣты въ головкахъ по 2 или по нѣскольку въ пазухѣ листьевъ, которые становятся къ верхушкѣ такъ коротки, что не превышаютъ колосковъ (если соцвѣтіе сильно прерывчатое, то это: f. *umbrósa* Kit.).

3. **abbreviátum Kauffm.** Кауф. II, стр. 255. — Кауф. I, стр. 250.

Стебли укороченныя, выходятъ по нѣскольку изъ одного корня; колосья короткіе, сжатые. Соколышки въ лѣсу (K.).

γ. **straménticum GB.**

Всѣ листочки обертки свѣтло-соломенно-желтые. Лужки, Спр. γ. (H.).



Gnaphalium sylvaticum.



Gnaphalium uliginosum.

937. **G. uliginósum L.** Пет. Кр. II, стр. 23. — Бух. II, № 217. — Бух. I, № 206. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 196. — Кауф. II, № 382. — Цил., № 752. — Pinz., p. 13. — Кауф. I, стр. 251. — Lind., p. 126. — Ann., C. II, № 134. — Дв., № 787. — Макс., № 761. — Hoff. II., № 6717. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 145. — St. II, p. 49. — St. I, № 561. — Pal., № 1852.

Однолѣтнее растеніе; стебель 5—20 см., отъ основанія, рѣже сь середины, сильно вѣвистый, б. или м. густо покрытъ бѣлымъ войлокомъ, особенно густо у цвѣточныхъ корзинокъ; *) листья ланцетные или линейные, заостренныя, суженныя въ черешокъ, цѣлюкрайніе или иногда ниж-

*) Маршусъ приводитъ безъ указанія мѣстонахожденія еще форму *b. nudum* Hoffm., которая должна быть во всѣхъ частяхъ совершенно голая; но такой формы ни въ одномъ изъ московскихъ гербаріяхъ нѣтъ и послѣ Маршуса никѣмъ не упоминалась.

ніе, ко времени цвѣтенія уже засохшіе, съ не ясными и рѣдкими зубчиками; съ обѣихъ сторонъ покрыты б. или м. густо бѣлымъ войлокомъ. верхняя сторона иногда очень слабо опушена; цвѣточные корзинки 3—4 мм. дл., яйцевидныя, клубочками по 1—4 въ пазухахъ верхнихъ сближенныхъ листьевъ, которые много длиннѣе головокъ; листочки обертки продолговатые или ланцетные, наружныя—тупые, внутреннія—заостренныя, вначалѣ у основанія зеленые, травянистыя, потомъ буроватыя или бурые, лоснящіеся; цвѣты очень мелкіе, не превышаютъ обертку; сѣмянки 0.5 мм. дл., гладкія, голыя.

По дорогамъ, канавамъ, пустырямъ и высохшимъ болотамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до середины августа; плоды съ половины іюля.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. pseudopiluläre Scholz.

Отличается сѣмянками, покрытыми мелкими, нѣсколько отстоящими какъ бы колючими волосками. Раменки близъ Воробьевыхъ горъ, по дорогѣ (П.).

392. *Helichrysum Gaertn.*

Обертка черепчатая, многорядная, вполне пленчатая; краевые цвѣты женскіе, однорядные, остальные — обоимъ; цвѣтоложе голое; сѣмянки цилиндрическія, 5-гранныя, слегка сплюснутыя, съ хохолкомъ изъ одного ряда волосковъ.

938. *H. arenarium* (L.) Moench.

Helichrysum arenarium DC. Пет. Отч., стр. 13.—Пет. Кр. II, стр. 23. — Пет., стр. 198.—Кауф. II, № 384.—Цин., № 751.—Рупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 251.

Gnaphalium arenarium L. Hoff. H., № 6690.

Корневище деревянистое черно-бурое; стебли слегка приподнимающіеся или примостоящіе, простые, густо покрыты, какъ и все растеніе, бѣлымъ войлокомъ; корневыя и нижніе стеблевые листья обратно-яйцевидно-ланцетные или иногда почти ложковидные; верхніе—линейные сидячіе, полустеблеобъемлющіе; всѣ слегка заостренныя или тупыя, цѣльно-крайніе; цвѣты въ густомъ верхушечномъ, щитковидномъ соцвѣтіи; корзинки шаровидныя, 4—6 мм. дл.; листочки обертки лимонно-желтые, пленчатые; наружныя — округлыя, внутреннія — продолговатые, ложковидно-вогнутые; цвѣты желтые; сѣмянки около 1 мм. дл.



Helichrysum arenarium.

По песчанымъ мѣстамъ, на паровыхъ поляхъ и по дорогамъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ половины іюня до осени. Близъ Серпухова (герб. Борхмана).—Рождествено на р. Нарѣ, Сри. у. (гр. Е. Солмогубъ).—У шоссе близъ д. Овражки и Красково (Куль.).

393. *Ínula* L.

Обертка полушаровидная, черенчатая, многорядная; краевые лепесты женские, язычковые, остальные—обоеполые, ворончато-трубчатые, 5-зубчатые; цветоложе плоское или выпуклое, голое, без прицветников; сѣмянки цилиндрическія или 5-гранныя съ хохолкомъ волосковъ, часто сросшихся основаніями.

1. Наружные листочки обертки яйцевидные, внутренніе—лопатчатые, тупые. *I. Helenium* L.

Всѣ листочки обертки ланцетные или линейные, заостренные. 2.

2. Завязи и сѣмянки прижато-опушенные. *I. britannica* L.

Завязи и сѣмянки голыя. 3.

3. Стебель покрытъ жесткими отстоящими волосками, особенно густо въ верхней части; листочки обертки густо покрыты отстоящими щетинистыми волосками. *I. hirta* L.

Стебель голый или только въ нижней части покрытъ рѣдкими отстоящими или прижатыми волосками; листочки обертки голые, только по краю коротко-рѣсничатые. *I. salicina* L.

939. *I. Helénium* L. Пет. Кр. II, стр. 20.—Пет., стр. 204.—Кауф. II, № 374.—Цин., № 695.—Рупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 245.—Дв., № 799.—Макс., № 775.—Mart., p. 148.—St. II, p. 50.—St. I, № 575.—Pal., № 1888.

Корневище узловатое толстое деревянистое; стебель 60—150 см., прямостоящій, толстый ребристый, бархатисто-опушенный, только въ верхней части вѣтвистый; корневые и нижніе стеблевые листья крупные, до 50 см. дл., продолговато-эллиптическіе, суженные въ черешокъ; средніе стеблевые листья яйцевидно-продолговатые или яйцевидные, сидячіе, съ сердцевиднымъ основаніемъ, полустеблеобъемлющіе; самые верхніе много мельче, почти ланцетные; всѣ неравно- и мелко-зубчатые, съ верхней стороны слегка морщинистые, коротко-опушенные, съ нижней стороны густо покрыты сѣроватымъ или желтоватымъ войлокомъ; цветочныя корзинки 5—7 см. въ поперечникѣ, на длинныхъ толстыхъ цветоножкахъ, съ коротко-ланцетнымъ прицветникомъ посрединѣ; наружные листочки обертки широко-ланцетные, по краямъ мелкозубчатые, войлочные; средніе—лопатчатые, коротко-опушенные, зеленые, съ округлой отвороченной верхушкой; внутренніе—линейные голые



Inula Helenium.

пленчатые; цветы золотисто-желтые, язычковые — узкие, линейные, на концах 3—4-зубчатые; семянки 4—5-гранные, до 5 мм. дл.

Запасенное, очень редко, по сырым местам. Цветет с конца июня всю осень. Между Реутовым и Ивановским (И.). — Воробьевы горы (Гольдб.). — Близъ Екатериновки, Звн. у. (Дуб.).

940. *I. salicina* L. Бух. II, № 210. — Бух. I, № 200. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 205. — Кауф. II, № 375. — Цин., № 700. — Кауф. I, стр. 246. — Дв., № 801. — Макс., № 777. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 148. — Hoff., № 1743. — St. II, p. 50. — St. I, № 577.

Bupthalmum salicinum. Mart., p. 148.

Корневище тонкое, горизонтальное, часто с не длинными побѣгами; стебли прямостоящие, 30—90 см., иногда буровато-красноватые, ребристые, б. ч. голые или в нижней части покрыты отстоящими или прижатыми и нѣсколько курчавыми волосками; листья яйцевидно-ланцетные или ланцетные, б. ч. отогнутые от стебля; нижние — сужены къ основанію, средние и верхние — сидячие, с сердцевиднымъ основаніемъ полустеблеобъемлющие; все заостренные, по краямъ остро-шершаво-рѣсничатые, цѣльнокрайніе или мелкозубчатые, голые, с нижней стороны лопнящиеся и свѣтлѣе, иногда нижние листья вдоль жилокъ с нижней стороны опушенные; *) цветочная



Inula salicina.

корзинки 2,5—4 см. в поперечникѣ, верхушечныя, одиночныя или ихъ 2—5; цветоножки у самой корзинки нѣсколько утолщенныя; наружныя листочки обертки нѣсколько мясистые, желто-зеленые, с зеленымъ ланцетнымъ отогнутымъ и по краямъ рѣсничатымъ кончикомъ такъ же, какъ и средние, но болѣе длинныя; внутренніе листочки нѣсколько пленчатые, не отогнутые и длиннѣе остальныхъ; цветы золотисто-желтые, язычковые — линейные с 5 продольными линиями; семянки голыя, около 1,5 мм. дл.

По кустарникамъ, опушкамъ и полянамъ, не рѣдко. Цвететъ съ іюля до половины августа.

*) G. Beck, в своей монографіи „*Inula Europae*“, приводитъ для var. *genuina* GB., которая у насъ только и встрѣчается, двѣ формы: *glabra* GB. — совершенно голую или только у нижнихъ листьевъ съ нижней стороны по жилкамъ слегка опушенную, и *subhirta* C. A. Mey., у которой нижняя часть стебля опушенная, а равно нижняя сторона у нижнихъ листьевъ по жилкамъ тоже опушенная. Въ гербаріомъ матеріалъ, которымъ я располагаю, были все переходы одной формы въ другую и полное смѣшеніе признаковъ: одни экземпляры были вполне голые, другіе слабо опушенные; нашлись растенія съ опушеннымъ стеблемъ и совершенно голыми листьями, а также съ опушенными листьями и голымъ стеблемъ. Опираясь на вышележающее, я совсемъ не привожу формъ, различіе которыхъ основано только на опушеніи.

941. *I. hirta* L. Пет. Кр. II, стр. 20. — Пет., стр. 203. — Кауф. II, № 376. — Мил., № 18. — Гор., № 44. — Цин., № 698. — Рупр., стр. 88. — Кауф. I, стр. 246. — Borg., p. 699. — Дл., № 802. — Макс., № 778. — Mart., p. 148. — Hoff., № 1741. — St. II, p. 50. — St. I, № 578. — Pal., № 1893.

Корневище косое, деревянистое; стебли 30—60 см., прямостоящие, б. ч. простые, тонко-ребристые, красновато-бурые, покрыты жесткими отстоящими волосками; нижние листья эллипсовидно-ланцетные, къ основанію суженные; средние и верхние — ланцетные, сидячие, часто съ округлым основаніемъ; все туповатые или заостренные, по краямъ рѣсничатые и мелко-, но не часто остро-зубчатые, съ обѣихъ сторонъ короткоопушенные, съ нижней — лоснящиеся и съ сильно выдающимися сѣточными жилками; корзинки одиночныя, верхушечныя, крупныя, 3—5 см. въ поперечникѣ, у основанія съ ланцетными или узко-ланцетными прицвѣтниками; листочки обертки ланцетные, длинно-заостренные, травянистые, густо покрыты отстоящими щетинистыми волосками; внутренніе листочки пленчатые; цвѣты золотисто-желтые, язычковые въ два раза длиннѣе обертки, линейные съ 4—5 продольными линиями и 2—3 зубчиками на концѣ; сѣмянки до 2 мм. дл., голыя.

По опушкамъ, кустарникамъ, иногда по лугамъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ половины мая весь июнь, иногда до половины июля. Кароцеево, Кал. у. (К.). — За Лужками, Срп. у. (Мил.). — Близъ Зиброва, Срп. у. (П. и С.).



Inula hirta.



Inula britannica.

942. *I. británnica* L. Пет. Кр. II, стр. 20. — Бух. II, № 211. — Бух. I, № 201. — Ф. О., № 6, p. 86. — Пет., стр. 205. — Кауф. II, № 377. — Цин., № 705. — Pinz., p. 13. — Кауф. I, стр. 246. — Pal., № 1890.

Inula dysenterica L. Дл., № 800. — Макс., № 776. — Hoff. H., № 6925. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 142. — Hoff., № 1737. — St. II, p. 50. — St. I, № 576.

Conyza squarrosa L. Дл., № 789. — Макс., № 775. — Mart., p. 146. — St. I, № 562. — Pal., № 1856.

Корневище двулѣтнее, косое; стебли прямостоящие, 5—60 см., ребристые, простые или въ верхней части вѣтвистые, б. или м. густо по-

крыты мягкими, часто курчавыми волосками, рѣже почти голые; нижніе стеблевые листья эллиптическіе или яйцевидные, сужены въ черешокъ, остальные—ланцетные или продолговато-ланцетные, съ сердцевиднымъ стеблеобъемлющимъ основаніемъ, часто отогнутые; все заостренные, рѣже туповатые, цѣлюкрайніе или мелко-зубчатые, съ обѣихъ сторонъ б. или м. густо опушенные прижатыми волосками, съ нижней стороны болѣе густо, тусклые (иногда почти голые, это форма *viridis* Wahl.); корзинки верхушечныя, 2—4 см. въ поперечникѣ, у основанія съ 2—4 листовидными прицвѣтниками; цвѣтоножки густо опушенные; листочки обертки равныя, травянистыя, узко-линейныя, заостренные, б. ч. густо покрыты серебристыми волосками и короткими железистыми; внутренніе—пленчатые; цвѣты золотисто-желтые, язычковые длиннѣе листочковъ обертки; сѣмянки прижато-волосистыя, около 1,3 мм. дл.

По берегамъ рѣкъ и ручьевъ, по сырмь мѣстамъ и кустарникамъ, часто. Цвѣтетъ съ начала іюля всю осень.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. elliptica Petunnikov. Пет. Кр. II, стр. 21.

Растеніе высокое, около 60 см., обь одной корзинкѣ; все листья эллиптическіе съ туповатой или округлой верхушкой, нижніе—сужены въ черешокъ, остальные—съ глубокимъ сердцевиднымъ основаніемъ, сидячіе; прицвѣтные листья тоже эллиптическіе, разраслись и превышаютъ язычковые цвѣты. Тѣневая форма; близъ Успенскаго, Зви. у. (X.).

β. ramosissima Ledb.

Стебель высокій, очень сильно вѣтвистый, съ большимъ числомъ корзинокъ; листья овально-ланцетные съ сердцевиднымъ стеблеобъемлющимъ основаніемъ; обертка сильно разраслась; листочки ея ланцетные или широко-ланцетные, заостренные, длиннѣе краевыхъ язычковыхъ цвѣтовъ, нѣкоторые листочки обертки значительно длиннѣе; все по отцвѣтаніи отгибаются книзу. По берегу Москвы р. между Заозерьемъ и д. Коломецъ, Брн. у. (С.).

394. *Pulicária Gaertn.*

Походить на *Inula*, по хохолокъ у сѣмянокъ двойной: внутренній изъ простыхъ волосковъ и наружный—изъ коронки зубчиковъ, сросшихся основаніями и по краю неравно-зубчатыхъ.

943. ***P. prostráta* (Gilib.) Aschers.**


Pulicaria vulgaris Gaertn. Пет. Кр. II, стр. 21.—Кауф. II, стр. 251.—Цин., № 241.—Кауф. I, стр. 247.—Borg., p. 699.

Inula Pulicaria L. Pal., № 1892.

Однолѣтнее растеніе съ тяжелымъ непріятнымъ запахомъ; стебель прямостоящій, 5—35 см., сильно вѣтвистый, красноватый, слегка клейкій, б. или м. густо покрытъ мягкими курчавыми волосками, рѣже у очень

мелкихъ жезмиляровъ; стебель простой; листья продолговато-ланцетные, 6. или 8. или 1 м. густо покрыты курчавыми прижатыми волосками, туповатые или заостренные, съ волнистыми, слегка зубчатыми или цѣльными краями: нижніе — къ основанію суженные, остальные съ округлымъ полустеблеобъемлющимъ основаніемъ; корзинки 4—10 мм. въ поперечникѣ, на концѣ стебля и вѣтвей, одиночныя или по двѣ, по три; листочки обертки ланцетные, заостренные, зеленые, густо покрыты курчавыми волосками; цвѣты грязно-желтые, язычковые — почти равны оберткѣ или немного превышаютъ ее, узко-линейные, на концѣ съ 3 зубчиками; трубчатые цвѣты слегка железистые; сѣмянки опушенные, 1.5 мм. дл., съ хохолкомъ такой же длины, состоящимъ изъ 10—16 внутреннихъ щетинокъ.

По берегамъ рѣкъ, на пескѣ и известнякѣ, рѣдко. Цвѣтеть съ іюля до поздней осени. Близъ впаденія р. Нары въ р. Оку, Срп. у. (Вар.).—Близъ Зиброва, Срп. у. (Гей.).—Близъ ст. Ока, Срп. у. (С.).—Бѣлосенская слобода, Срп. у. (X.).—Бѣлые Колодези, Кзм. у. (II.).



Pulicaria prostrata.



Buphthalmium speciosum.

395. *Buphthalmum* L.

Обертка полушаровидная, черепчатая; краевые цвѣты женскіе, язычковые, однопорядные; остальные — обоюполые, ворончато-трубчатые, 5-зубчатые; цвѣтоложе плоско-выпуклое съ прицвѣтниками; краевыя сѣмянки 3-гранныя, по угламъ слегка крылатыя, остальные — цилиндрическія, многоребристыя, у всѣхъ вмѣсто хохолка коронка изъ неравныхъ треугольных чешуекъ, по краямъ зубчатыхъ и часто сросшихся основаніями.

944. *B. speciosum* Schreb.

Telekia speciosa Baumg. Пет. Кр. II, стр. 33.—Пет., стр. 289.—Кауф. II, стр. 252.—Гор., № 43.—Цип., стр. 230.

Растеніе многолѣтнее съ сильнымъ запахомъ; корневище толстое, узловатое, косое, бурое; стебель прямостоящій, до 1.5 м., простой или

вѣтвистый, бороздчатый, покрытъ прижатыми курчавыми волосками; корневые и нижніе стеблевые листья крупные — до 30 см., на длинныхъ опушенныхъ черешкахъ, широко-сердцевидные, вытянутые въ короткій кончикъ, крупно- и двойко-зубчатые; стеблевые—сидячіе, яйцевидные или яйцевидно-округлые, просто-зубчатые, вытянутые въ болѣе длинный кончикъ; все листья съ верхней стороны коротко-опушенные, рѣже почти голые, съ нижней—б. или м. густо мягко- и курчаво-волосистые; корзинки до 7 см. въ поперечникъ, одиночныя, конечныя, на густо-опушенныхъ цветоножкахъ; обертка изъ туповатыхъ, зеленыхъ, голыхъ или слабо-опушенныхъ листочковъ, наружныхъ — отогнутыхъ; цвѣты золотисто-желтые, язычковые—линейные, съ 2 зубчиками на концѣ или заостренные, много длиннѣе обертки.

Одичалое, по паркамъ и по сырымъ тѣнистымъ берегамъ. Цвѣтетъ съ іюня до осени. Свиблово на р. Яузѣ (М.).—Мытищи (С.).

396. *Xanthium L.*

Растеніе однодомное; цвѣты однополые; мужскіе цвѣты въ многоцвѣтковыхъ корзинкахъ съ малолистною оберткою; цвѣтоложе цилиндрическое съ прицвѣтниками; вѣничекъ трубчатый, 5-зубчатый; тычиночныя нити срастись въ трубку; пыльники свободныя; столбикъ зачаточный, булавовидный; завязи пѣты; женскія корзинки о двухъ цвѣткахъ, окруженныхъ малолистною оберткою; цвѣтокъ голый безъ вѣничка, состоитъ изъ завязи и длиннаго столбика съ двумя штевидными рыльцами; каждая завязь заключена въ свернутый трубкой листочекъ внутренней обертки, который, срастаясь съ соседнимъ парнымъ цвѣткомъ, образуетъ двурогій, двуглиздный плодъ, покрытый крючковатыми колючками; сѣмянки безъ хохолка.

945. *X. Strumarium L.* Пет. Кр. II, стр. 63. — Пет., стр. 308. — Кауф. II, № 464. — Цил., № 708. — Кауф. I, стр. 304. — Анн., С. III, № 232. — Дв., № 882. — Макс., № 882. — Hoff. Н., № 7510. — Gold. С., p. 23. — Mart., p. 169. — Hoff., № 3506. — St. II, p. 53. — St. I, № 653.

Растеніе однолѣтнее; стебель примостоящій, рѣже приподнимающійся или лежачій, 30—90 см., б. ч. вѣтвистый, продольно-полосатый, буроватый или грязно-лиловый, тусклый, покрытъ короткими, толстыми волосками; листья сѣро-зеленые, на длинныхъ толстыхъ черешкахъ, въ очертаніи треугольно-сердцевидные или яйцевидные, неравно-двойко-зубчатые или 3—7-лопастные, съ неравно-зубчатыми краями, покрыты короткими жесткими волосками, отчего шершавые; листья на вѣтвяхъ много мельче, чѣмъ стеблевые; мужскія корзинки 4—6 мм.; цвѣты зеленоватые, железисто-опушенные, около 2 мм. дл.; пыльники синевато-сѣрые; плоды эллиптическіе, 10—15 мм. дл., покрыты сѣрымъ войлокомъ и железками.

Около рѣкъ по пескамъ и по известнякамъ или какъ сорное. Цвѣтетъ съ середины юля до глубокой осени. Лужки, Срп. у.; Звенигородъ (К.).—Серпуховъ (гр. Е. Сологубъ).—Потылиха (Гей.).—Бочмапово, Протопоново, Кзм. у.; известняки по берегу р. Пахры близъ с. Зеленаго, и по берегу Москвы р. близъ Заозерья, Бри. у. (С.).



Xanthium strumarium.



Xanthium spinosum.

946. **X. spinosum L.** Пет. Кр. II, стр. 63.—Пет., стр. 303.—Кауф. II, № 465.—Цин., № 709.—Кауф. I, стр. 304.—Нолл. Н., № 7509.

Растенiе однолѣтнее; стебель прямостоящiй, 30—60 см., вѣтвистый, продольно-полосатый, лоснящiйся, у верхушки буроватый и покрытый какъ бы мукой; листья 3-лопастные; лопасти ланцетныя цѣлюкрайниія или съ не большимъ числомъ зубцовъ, срединная лопасть крупнѣе боковыхъ; основанiе листьевъ клиновидно-суженное, верхняя сторона ярко-зеленая, покрыта колючими волосками и по жилкамъ густо бѣло-опушенная; нижняя сторона листьевъ густо покрыта короткими бѣлыми волосками какъ бы осыпана мукой; у основанiя листового черешка длинная желтоватая, лоснящаяся 3-раздѣльная колючка; цвѣты желтоватые; пыльники сѣро-синiе; плоды коротко опушенные.

Занесено; изрѣдка какъ сорное. Цвѣтетъ съ половины юля до поздней осени. На плотинѣ Захаровской мельницы; Архангельское, Зви. у. (К.).—Никольское близъ р. Химки (Гей.).

* *Heliánthus L.*

Обертка полушаровидная, дву-многорядная; краевые цвѣты безполные, язычковые, однорядные, остальные обоеполные съ 5-зубчатымъ, ворончато-трубчатымъ вѣнчикомъ; цвѣтоложе плоское или вышуклое, съ прицвѣтниками, сложенными вдоль и окружающими обоеполные цвѣты; чашечка изъ 2—4 цвѣтнцѣ или чешуекъ, легко опадающихъ; сѣмянки продолговатыя, слабо-4-гранныя, слегка сплюснутыя, безъ хохолка.

* **H. ánnuus L.** Пет., стр. 198. — Кауф. II, стр. 254. — Кауф. I, стр. 249. — Hoff. H., № 7145. — Pal., № 1929.

Растение однолѣтнее; стебель прямостоящій, до 2 м., б. ч. простой, ребристый, покрытъ короткими, прижатыми щетинками, отчего шершавый; листья очередные, рѣже супротивные, очень крупныя—до 30 см., сердцевидные или широко-яйцевидные, коротко-заостренные, быстро суженные въ длинный черешокъ, края ихъ крупно-неравно-зубчатые, обѣ стороны покрыты короткими щетинками; корзинки верхушечныя, очень крупныя, 10—30 см. въ поперечникѣ, поникающія на утолщенномъ цветоносѣ, рѣже корзинки и пазушныя; наружныя листочки обертки широко-яйцевидные, быстро суженные въ длинный тонкій кончикъ; язычковые цвѣты свѣтло- или золотисто-желтые, яйцевидно-продолговатые или широко-ланцетные, 4—6 см. дл., съ округлой верхушкой или съ двумя очень маленькими зубчиками на округлой верхушкѣ; трубчатые цвѣты буро-желтые; сѣмянки 8—15 мм. дл., черныя или черныя съ бѣлыми продольными полосками.

Разводится по огородамъ, иногда заносно близъ жилья. Цвѣтетъ съ половины іюля до конца августа.



Helianthus annuus.



Helianthus tuberosus.

* **H. tuberósus L.** Пет., стр. 198. — Кауф. II, стр. 254. — Кауф. I, стр. 249. — Mart., p. 151. — St. H, p. 51. — Pal., № 1932.

Растение многолѣтнее; корневище ползучее съ продолговатыми мясистыми клубнями; стебли прямостоящіе, 1.3 м., б. ч. простые, ребристые, шероховатые отъ короткихъ щетинокъ; листья очередные на черешкахъ, крупно-зубчатые, шершавые, вытянутые въ б. или м. длинный кончикъ, на молодыхъ стебляхъ—ланцетные, на цвѣтущихъ—широко-яйцевидные или нижніе сердцевидные, а верхніе широко-ланцетные; цвѣточныя корзинки 4—6 см. въ поперечникѣ, верхушечныя или на концѣ верхнихъ короткихъ вѣтвей на торчащихъ цветоносахъ; наружныя листочки обертки ланцетные, длинно-заостренные; язычковые цвѣты 2—3 см. дл., узко-

эллиптические, съ стянутой верхушкой, ярко-золотисто-желтые, послѣ сушки бурѣютъ; сѣмянки сѣрыя или черныя.

Разводится по огородамъ. У насъ цвѣсти не можетъ, такъ какъ зацвѣтаетъ только въ октябрѣ.

397. *Bidens* L.

Обертка колокольчатая или полушаровидная, двурядная; красные цвѣты безножные, язычковые или ихъ нѣтъ, остальные цвѣты обоюполые, ворончато-трубчатые, 5-зубчатые; цвѣтолюже плоское или выпуклое, съ узкими прицвѣтниками, опадающими вмѣстѣ съ сѣмянками; послѣднія продолговато-обратно-яйцевидныя, сплюснутыя, 4-гранныя, часто съ носикомъ и вмѣсто хохолка съ разросшейся чашечкой въ видѣ 2—4 щетинокъ, покрытыхъ внизъ обращенными колочками.

947. *B. tripartitus* L. Бух. II, № 212. — Бух. I, № 202. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 147. — Кауф. II, № 378. — Цин., № 710. — Кауф. I, стр. 248.

Bidens tripartita L. Пет. Кр. II, стр. 22. — Lind., p. 124. — Дв., № 772. — Макс., № 752. — Hoff. H., № 6578. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 143. — Hoff., № 502. — St. II, p. 48. — St. I, № 551. — Pal., № 1816.

Растеніе однолѣтнее; стебель 3—80 см., прямостоящій, б. ч. сильно вѣтвистый, рѣже простой, голый или покрытъ короткими волосками, часто красно-бурый, съ супротивными вѣтвями и листьями; послѣдніе на короткихъ слегка крылатыхъ и у основанія рѣсничатыхъ черешкахъ, б. ч. 3-раздѣльные, съ болѣе крупною срединною долею, нерѣдко тоже 3-раздѣльною; рѣже всѣ листья, или только верхніе простые, равно какъ и доли, ланцетные, по краямъ крупно-зубчатые и шероховато-рѣсничатые; корзинки до 2 см. въ поперечникъ на концѣ стебля и вѣтвей, одиночныя или по 2—3, прямоторчащія; наружныя (4—8) листочки обертки походятъ на листья, б. ч. цѣлюкрайніе, по краямъ рѣсничатые, длина ихъ въ 2—2½ раза превосходитъ ширину; *) внутренніе — широко-овальные, буро-желтые; всѣ цвѣты ворончато-трубчатые, грязно-желтые, равны внутреннимъ листочкамъ обертки; сѣмянки съ 2 щетинками, рѣже съ 3 и 4, но тогда двѣ изъ нихъ длиннѣе.

По берегамъ рѣкъ и прудовъ и по сырмъ мѣстамъ очень часто. Цвѣтетъ съ середины іюня до поздней осени; плоды съ начала августа.

*) Мною найдены экземпляры, у которыхъ наружныя листочки обертки нѣкоторыхъ корзинокъ во много разъ превышаютъ длину корзинокъ и имѣютъ видъ вполне развитыхъ стеблевыхъ листьевъ на короткихъ черешкахъ, крупно- почти надрѣзочно-зубчатыхъ и длина ихъ въ 3—4 раза превышаетъ ширину.



Bidens tripartitus.

Распадается на слѣдующія формы:

α. *typicus* GB.

Всѣ листья 3-раздѣльные или даже средняя доля въ свою очередь 3-раздѣльная. Часто.

β. *integer* C. Koch.

Всѣ или почти всѣ листья простые, крупно-зубчатые; стебель высокій, 40—80 см., вѣтвистый. Воробьевы горы, Лужники (П.).—Одинцово—кирпичный заводъ, Зви. у. (С.).—Марына, близъ Перервы и Тюфелева роща (Х.).

γ. *pumilus* Roth.

Bidens tripartitus L. β. *minimus* Kauffm. Кауф. II, стр. 253.—Кауф. I, стр. 248.

Bidens tripartitus L. var. *tenuis* Turcz. Пет. Кр. II, стр. 22.—Цин., стр. 231.

Bidens minima. F. O., № 6, p. 86.

Bidens nana. - Gold. C., p. 22.

Стебли не высокіе, 3—30 см., б. ч. простые, обь одной корзинкѣ; рѣже корзинки на боковыхъ короткихъ вѣточкахъ; листья простые, крупно-зубчатые, иногда почти цѣльнокрайніе. Игнатьево—липовая роща, Клм. у. (П.).—Одинцово, Зви. у. (С.).

948. *B. cernuus* L. Бух. II, № 213.—Бух. I, № 203.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 147.—Кауф. II, № 379.—Цин., № 711.—Кауф. I, стр. 248.—Ann., C. V, № 30.

Bidens cernua L. Пет. Кр. II, стр. 22.—Дв., № 773.—Макс., № 753.—Hoff. H., № 6567.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 143.—St. II, p. 48.—St. I, № 552.

Однолѣтнее растеніе; стебель 3—80 см., прямостоящій или укореняющійся, приподнимающійся, отъ основанія вѣтвистый, цилиндрическій или ребристый, голый или покрытъ жесткими волосами; вѣтви и листья супротивные; послѣдніе голые, только по краямъ шероховато-рѣсничатые, ланцетные или узко-ланцетные, сидячіе, нѣсколько сросшіеся основаніями, рѣже къ основанію суженные какъ бы въ черешокъ, по краямъ остро-зубчатые, верхушка листа цѣльнокрайняя; корзинки до 3 см. въ поперечникѣ, поникающія, верхушечныя и въ пазухахъ верхнихъ листьевъ по 1—3; наружныя листочки обертки травянистыя, линейно-ланцетные, по краямъ шершаво-рѣсничатые, вдвое превышаютъ корзинку; внутренніе листочки эллиптическіе съ бурыми продольными линиями и свѣтло-зелено-желтыми краями; всѣ цвѣты



Bidens cernuus.

ворончатотрубчатые грязно-желтые или краевые язычковые золотисто-желтые; сѣмянки съ 4 равными щетинками.

По берегамъ рѣкъ и прудовъ и по сырмъ мѣстамъ, часто. Цвѣтетъ съ средины іюня до поздней осени; плоды съ половины августа.

Распадается на слѣдующія формы:

α. typicus GB.

Всѣ цвѣты въ корзинкѣ ворончато-трубчатые. Очень часто.

β. coreopsidis Dumort.

Bidens cernuus L. γ. *radiatus* Kauffm. Пер. Кр. II, стр. 22.—Бух. II, № 213 γ.—Бух. I, № 203 γ.—Кауф. II, стр. 253.—Кауф. I, стр. 248.—Mart., p. 143.

Bidens cernuus L. β. *radiatus* Ledeb. Цин., стр. 232.

Bidens γ. *Coreopsis* *Bidens* L. Макс., № 753.—Mart., p. 143.—St. II, p. 48.—St. I, № 552.

Краевые цвѣты у всѣхъ корзинокъ язычковые. Три горы (герб. Голѣдб.).—Бочманово, островъ на Окѣ противъ Бочманова, Клм. у.; заводъ р. Оки близъ Дракина, Срп. у. (П.).—Бѣлопесоцкая слобода, Срп. у. (X.).—Берегъ Москвы р. близъ Заозерья, Брп. у. (С.).

γ. minimus Lej.

Bidens cernuus L. β. *minimus* Kauffm. Кауф. II, стр. 253.—Кауф. I, стр. 248.

Bidens cernuus L. γ. *minimus* Ledeb. Цин., стр. 232.

Bidens cernua L. β. *minima* (L.) Пер. Кр. II, стр. 22.

Bidens pumila L. Mart., p. 143.

Растеніе маленькое 3—12 см., съ простымъ стеблемъ обѣ одной корзинкѣ, рѣже съ корзинками на боковыхъ короткихъ вѣточкахъ; корзинки очень мелкія, иногда съ 1—3 краевыми язычковыми цвѣтами; листья часто цѣльнокрайніе. *) Косино—берегъ Чернаго озера (П.).

398. *Ánthemis* L.

Обвертка полушаровидная, черешчатая, многорядная; краевые цвѣты женскіе, однорядные, язычковые; остальные—обоополые, 5-зубчатые, ворончато-трубчатые, съ трубкою посрединѣ нѣсколько перетянутой; цвѣтолюже выпуклое, булабовидное или цилиндрическое съ пленчатыми или щетиновидными прицвѣтниками; сѣмянки продолговатыя, сплюснутыя, 4-гранныя или со многими продольными ребрышками; хохолка нѣтъ, иногда вмѣсто него маленькая пленчатая коронка, часто односторонняя.

1. Язычковые цвѣты золотисто-желтые, рѣже ихъ нѣтъ; цвѣтолюже полушаровидное. *A. tinctoria* L.

Язычковые цвѣты бѣлые; цвѣтолюже б. ч. продолговато-коническое. 2.

2. Прицвѣтники почти щетиновидные; язычковые цвѣты безногие; сѣмянки бородавчатые, слегка ребристыя. *A. Cotula* L.

Прицвѣтники ланцетные; язычковые цвѣты женскіе; сѣмянки ребристыя безъ бородавочекъ. *A. arvensis* L.

*) А. А. Хорошковъ нашелъ на Луковомъ озерѣ, Бгр. у., промежуточную форму между α. *typicus* и γ. *minimus*. Стебли 12—25 см., б. ч. вѣтвистые; листья очень разнообразныя, начиная отъ цѣльнокрайнихъ до почти нормально зубчатыхъ, а на одномъ экземплярѣ одна пара листьевъ была съ одной глубокой лопастью, средніе же листья имѣли съ каждой стороны по одному супротивному не глубокому зубцу.

949. *A. tinctoria* L. Бух. II, № 222. — Бух. I, № 211. — Ф. О., № 6, p. 86. — Пет., стр. 137. — Кауф. II, № 393. — Цин., № 715. — Pinz., p. 13. — Кауф. I, стр. 237. — Lind., p. 124. — Дв., № 811. — Макс., № 787. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 151. — St. II, p. 50. — St. I, № 585. — Pal., № 1918.

Растение дву-многолѣтнее; корень веретенообразный, вѣтвистый; стебли до 80 см., прямостоящие или съ основаніемъ приподнимающимся, простые или въ верхней части вѣтвистые, курчаво-волосистые, почти войлочные, къ плодоношенію часто становятся почти голыми; листья сидячіе, перисто-раздѣльные, сперва съ обѣихъ сторонъ волосистые, потомъ верхняя сторона почти голая, а нижняя опушенная; доли ихъ продолговатыя или линейныя, надрѣзано- и часто-зубчатыя; зубчики съ твердыми остріями; корзинки 1,5 — 3,5 см. въ поперечникѣ, одиночныя, конечныя, на длинныхъ безлистныхъ цветоносахъ; листочки обертки курчаво-волосистые съ бѣлымъ или буроватымъ кончикомъ; цвѣты золотисто-желтые какъ язычковые, такъ и ворончато-трубчатые; прицвѣтники линейно-ланцетные, колючіе, равны ворончато-трубчатымъ цвѣтамъ; съмянки около 2 мм. дл. съ 10 ребрышками.

По паровымъ полямъ, холмамъ и открытымъ мѣстамъ, часто. Цвѣтеть съ половины іюня до поздней осени; плоды съ начала августа.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. discoidéa Vahl.

Язычковыхъ цвѣтовъ въ корзинкѣ нѣтъ — одни ворончато-трубчатые. Серебряный боръ близъ Хорошова (II.).



Anthemis tinctoria.



Anthemis arvensis.

950. *A. arvensis* L. Пет. Кр. II, стр. 26. — Ф. Б., № 43. — Пет., стр. 137. — Кауф. II, № 394. — Гор., № 46. — Цин., № 712. — Кауф. I, стр. 237. — Дв., № 809. — Макс., № 785. — Hoff. H., № 7045. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 150. — Hoff., № 227. — St. II, p. 50. — St., № 583.

Растение одно-двулѣтнее; стебель 15 — 40 см., прямостоящій или иногда почти лежачій, вѣтвистый, покрытъ прижатыми или курчавыми


волосками, рѣже почти голый; листья сидячіе, иногда нижніе коротко-черешковые, двояко-перисто-раздѣльные, съ обѣихъ сторонъ б. или м. густо курчаво-волосистые; доли листа ланцетныя или почти линейныя, мелко-зубчатыя; корзинки 15—25 мм. въ поперечникѣ, конечныя, на длинныхъ безлистныхъ цветоносахъ до 4 см. дл.; листочки обвертки б. или м. густо курчаво-волосистые, широко-овальные, на верхушкѣ свѣтло-бурые съ слегка расщепленнымъ краемъ; краевые цвѣты бѣлые язычковые, остальные ворончато-трубчатые желтые; прицвѣтники ланцетные, колочіе, съ нѣльными или слегка зазубренными краями; съмянки 2,5—3 мм. дл., кубарчатая, ребристая.

По полевамъ, паровымъ полямъ и дорогамъ, очень рѣдко. Цвѣтеть съ конца мая до августа; плоды съ половины іюля. Въ гербаріи, Гофмана. — Близъ Николю-Угренскаго монастыря (Л.). — Близъ Чуденской фабрики. Бгр. у. (П. Н.). — Паровыя поля близъ Жукова. Брн. у. (С.).

951. **A. Cótula L.** Пет. Кр. II, стр. 26. — Пет., стр. 137. — Кауф. II, № 395. — Кауф. I, стр. 257. — Дн., № 810. — Макс., № 786. — Mart., p. 150. — Hoff., № 232. — St. II, p. 50. — St. I, № 584. — Pal., № 1917.

Maruta Cótula DC. Цил., № 717.

Растеніе однолѣтнее съ непріятнымъ запахомъ, особенно у корзинокъ; стебель 15—60 см., прямостоящій или лежачій, б. ч. отъ основанія вѣтвистый, б. или м. густо покрытъ, какъ и все растеніе, прижатыми или курчавыми волосками, рѣже почти голый; листья сидячіе, двояко- или тройко-перисто-раздѣльные, съ узко-линейными, колочье-заостренными, цѣлюкрайными или слегка зазубренными дольками; корзинки одиночныя 1,5—2,5 см. въ поперечникѣ на короткихъ конечныхъ цветоносахъ; листочки обвертки б. или м. густо опушенные, узко-эллиптическіе, заостренные или туповатые, желтоватые, съ буровой или зеленой полоской на спинкѣ, по краямъ пленчатые; краевые цвѣты язычковые бѣлые, часто отворочены книзу; остальные—ворончато-трубчатые желтые; прицвѣтники очень узкіе, почти щетиновидные, заостренные, но къ срединѣ цвѣтоложа становятся нѣсколько шире; съмянки 1—2 мм. дл., слегка ребристыя и бородавчатая, съ очень маленькимъ почти шаровиднымъ возвышеніемъ на верхушкѣ.



Anthemis Cótula.

На пескѣ и известнякахъ, по открытымъ мѣстамъ и дорогамъ, не часто. Цвѣтеть съ середины іюня до конца августа; плоды съ середины іюля. По деревнямъ и селамъ на Окѣ, какъ въ Срп. такъ и въ Км. уу. и Рождествено на р. Нарѣ по шоссю, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

399. *Achilléa* L.

Обвертка овальная или рѣже полушаровидная, череничатая; листочки ея по краямъ пленчатые; красныя цвѣты въ корзинкѣ одиорядныя, б. ч. женскіе, съ язычковымъ отгибомъ быстро расширеннымъ, на верхушкѣ б. ч. 3-зубчатымъ; остальные—обоеполые, 5-зубчатые, съ сплюснутой трубкой, иногда у основанія расширенной; цвѣтоложе почти плоское или вынуклое, голое съ пленчатыми прицвѣтниками; сѣмянки сплюснутыя съ усѣченной верхушкой безъ хохолка.

1. Листья линейно-ланцетные или линейные, зубчатые. 2.

Листья 2—3-перисто-раздѣльные. 3.

2. Корзинки 13—17 мм. въ поперечникѣ; стеблевые листья голые безъ точечныхъ железокъ, 2—6 мм. ш. *A. Ptarmica* L.

Корзинки 6—10 мм. въ поперечникѣ; стеблевые листья (не на вѣточкахъ) до 11 мм. ш., б. или м. густо опушенные и б. ч. съ точечными железками на верхней сторонѣ. *A. cartilaginea* Ledeb.

3. Листья въ очертаніи продолговато-яйцевидные; число долей не болѣе 15. *A. nobilis* L.

Листья въ очертаніи ланцетные или почти линейные, о 20—51 долѣ.

A. Millefolium L.

952. *A. Ptarmica* L. Пер. Кр. II, стр. 25.

Корневище ползучее; стебель прямостоящій, простой или метельчато-вѣтвистый, ребристый, 30—150 см., въ нижней части голый, къверху б. или м. густо прижато-опушенный; листья простые, узко- или линейно-ланцетные, иногда почти линейные, шириною въ 2—6 мм., б. ч. голые, сидячіе, слегка сужены къ основанію или съ половины до основанія равной ширины, по краямъ мелко-зубчатые, отъ основанія до половины листа зубчики очень частые, съ половины до верхушки болѣе разставленные; наружная сторона зубчиковъ очень мелко зазубренная, съ верхушкою прижатою къ краю листа; корзинки 13—17 мм. въ поперечникѣ, въ верхушечномъ густомъ или малоцвѣтковомъ соцвѣтѣ; листочки обвертки свѣтло-зеленые, опушенные, съ бѣловатымъ или буроватымъ узкимъ краемъ; наружныя — треугольно-ланцетные, почти равны внутреннимъ; язычковые



Achillea Ptarmica.

цвѣты (9—13) бѣлые, 4—7 мм. дл., эллиптическіе или обратно-яйцевидные, равны обверткѣ или нѣсколько длиннѣе ея; сѣмянки 2 мм. дл.

По сырымъ лугамъ, по берегамъ рѣкъ и ручьевъ и по торфянымъ болотамъ, очень рѣдко. Цвѣтетъ съ начала іюля до половины августа. Люберцы—болото къ югу отъ ж.-д. ст., по краю рва (Гей.).

953. *A. cartilaginéa* Ledb. Хор. II, стр. 17.—Pinz., p. 13.

Achillea Ptarmica L. Пет., стр. 130.—Кауф. II, № 391.—Кауф. I, стр. 255.—Дв., № 812.—Макс., № 789.—Hoff. H., № 7115.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 151.—Hoff., № 20.—St. II, p. 50.—St. I, № 586.—Pal., № 1992.

Ptarmica cartilaginea Ledb. Пет. Кр. II, стр. 25.—Цин., № 718.

Корневище ползучее; стебель до 150 см., б. ч. метельчато-вѣтвистый, ребристый, чаще покрытъ прижатыми и курчавыми волосками; листья простые, продолговато-линейные, ширина ихъ часто достигаетъ 11 мм., б. ч. опушенные и покрыты точечными нѣсколько вдавленными железками, отъ основанія до верхушки почти равномерно-остро-шпильчатые; зубчики съ наружнаго края зазубренные и съ острымъ прямымъ или слабо пригнутымъ хрящеватымъ кончикомъ; корзинки 6—10 мм. въ поперечникѣ въ верхушечномъ густомъ цитковидномъ соцветіи; листочки обертки б. или м. густо опушенные, свѣтло-зеленые, одноцвѣтные или съ узкой буроватой каймой; наружные — коротко-треугольные, вполовину короче внутреннихъ; язычковые цвѣты (6—8) бѣлые, 2—4,5 мм. дл., широко-эллиптическіе, короче обертки, рѣдко равны ей; сѣмянки 2 мм. дл. *)

По берегамъ рѣкъ и ручьевъ, по канавамъ и торфянымъ болотамъ, не рѣдко. Цвѣтеть съ начала іюля до половины августа. Ашенгофская роща и Кушцово (Мар.). — Петровскій паркъ (Г. С.). — Красниковское болото за Б. Мытищами, Пушкино по берегу рѣки Серебрянки (С.). — Симоновъ монастырь; Павловскій посадъ, Бгр. у.; Раменское, Бгр. у.; Серпуховъ (К.). — Рождествено на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ). — Чириково, Пдл. у. (Х.). — Близъ Данилова монастыря; Машино, Дмт. у.; Михнево, Бгр. у.; Хотѣичи, Бгр. у.; Невѣрово, Км. у. (Н.).



Achillea cartilaginea.

954. *A. Millefolium* L. Пет. Кр. II, стр. 26.—Бух. II, № 221.—Бух. I, № 210.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 130.—Кауф. II, № 392.—Цин., № 719.—Pinz., p. 13.—Кауф. I, стр. 256.—Lind., p. 126.—Ann., C. IV, № 17.—Дв., № 813.—Макс., № 790.—Hoff. H., № 7107.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 151.—Hoff., № 18.—St. II, p. 50.—St. I, № 587.—Pal., № 1925.

*) Въ видѣнные мною экземпляры, исключая экземпляровъ Гейдена, хотя и слѣдуетъ признавать за *A. cartilaginea* Ledb., но далеко не у всѣхъ ясно выражены признаки, характеризующіе это растеніе; у нѣкоторыхъ экземпляровъ точечныя железки почти или совсѣмъ отсутствовали, а остальные признаки были ясно выражены; иногда опушеніе было едва замѣтно или на нижнихъ листьяхъ его совсѣмъ не было, но железки были; тѣмъ не менѣе всѣ эти экземпляры болѣе походили на *A. cartilaginea* шириною и формою листьевъ и сравнительно мелкими корзинками. Изъ вышеизложеннаго видно, что точечныя железки и опушеніе—признаки далеко не стойкіе и, можетъ быть, этотъ видъ лучше считать за разновидность *A. Ptarmica* L., отличіе отъ котораго сводится на величину корзинки и ширину листьевъ. Этотъ вопросъ можно рѣшить только культурой.

Корневище многолѣтнее, ползучее съ побѣгами; стебли 30—70 см., прямостоящіе или приподнимающіеся, б. ч. простые или въ верхней части слегка вѣтвистые, ребристые, б. или м. густо опушенные курчавыми прижатыми волосками, какъ и все растеніе, рѣже почти голые; листья въ очертаніи ланцетные или почти линейные, 2—3-перисто-раздѣльные, о 20—51 супротивной или слегка чередной долѣ; дольки линейно-ланцетныя, б. ч. въ 2—2½ раза длиннѣе своей ширины, вѣльно-крайнія, оканчиваются остріемъ; корзинки 4—5 мм. въ поперечникѣ, въ густомъ верхушечномъ щитковидномъ соцветіи; листочки обертки овальные, б. ч. опушенные, рѣже голые, зеленые или желто-зеленые, съ зеленой килеватой полоской на спинкѣ и съ бурой или черно-бурой каймой, на верхушкѣ рѣсничато-разорванной; язычковые цвѣты бѣлые, въ 2—3 раза короче обертки; сѣмянки 1,5—2 мм. дл.

По лугамъ, дорогамъ, опушкамъ, кустарникамъ и лѣсамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ начала іюня до поздней осени; плоды съ конца іюля.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

z. *purpureum* Mart. Mart., p. 151.


Achillea Millefolium L. β . *tanacetifolia purpurea*. Pal., № 1925 β .

Achillea magna L. Marc., № 788.

Язычковые цвѣты розовые или лиловато-розовые; листочки обертки голые или почти голые, часто почти лоснящіеся.



Achillea Millefolium.



Achillea nobilis.

955. **A. *nobilis* L.** Пет. Кр. II, стр. 26. — Пет., стр. 130. — Кауф. II, стр. 261. — Гор., № 45.

Корневище косое, почти деревянистое, дву-многолѣтнее; стебли 30—60 см., прямостоящіе или слегка приподнимающіеся, ребристые, простые или въ верхней части слегка вѣтвистые, покрыты, какъ и все растеніе, курчавыми прижатыми волосками, рѣже почти голые; корневые листья на черешкахъ, остальные—сидячіе, въ очертаніи продолговато-линейные, 2—3-перисто-раздѣльные, о 9—15 супротивныхъ или

слегка очередныхъ долейхъ; конечныя дольки коротко-продолговатыя съ короткимъ хрящеватымъ остріемъ; стержень листа отъ середины до верхушки между долями усаженъ очень мелкими, рѣдкими, часто зубчатыми дольками; корзинки 3—4 мм. въ поперечникѣ, яйцевидныя, въ верхушечномъ густомъ, щитковидномъ соцветіи; листочки обертки опушенные, овальные, желтоватыя, съ зеленоватою килевою полоской на спинкѣ и часто съ буроватою каймой; язычковые цвѣты бѣлые или слегка желтоватыя, часто отогнутые книзу, въ 3—4 раза короче обертки; сѣмянки 1 мм. дл.; все растение съ пріятнымъ запахомъ.

По открытымъ мѣстамъ, полямъ и откосамъ, не часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до глубокой осени. На паровомъ полѣ близъ Ступни (М.).—Мѣтлицы близъ станціи: паровое поле близъ Пехорки, Бри. у.; близъ Борнцова, Сри. у. (С.).—Городекой выгонъ близъ Калитникова кладбища; въ основномъ лѣсу близъ Бѣлоселцкой слободы, Сри. у. (Н.).—Паровое поле близъ Рождествена на р. Нарѣ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Паровое поле близъ д. Плещеево, Пдл. у. (Куль.).—Мило-славское, Кзм. у. (Х.).

400. *Chrysanthemum* L.

Обертка почти плоская или полушаровидная, черенчатая, края листочковъ пленчатые; краевые цвѣты женскіе, язычковые, рѣже все цвѣты въ корзинкѣ ворончато-трубчатые, 5 (4)-зубчатые; цвѣто-ложе плоское или выпуклое, безъ прищѣтничковъ; сѣмянки съ усѣчен-ной верхушкой, у обоеполыхъ цвѣтовъ равномерно 5—10-ребристыя, у краевыхъ иногда только съ 2—3 слегка крылатыми ребрышками; хо-холка нѣтъ, но часто вмѣсто него пленчатая коронка или неправиль-ные пленчатые зубчики.

1. Листья перисто- или 2—3-перисто-раздѣльные. 2.

Листья простые, часто зубчатые. 3.

2. Все цвѣты желтые ворончато-трубчатые или краевые съ едва замѣтными тоже желтыми язычками. *C. vulgaris* Bernh.

Краевые цвѣты язычковые бѣлые, остальные желтые.

C. corymbosum L.

3. Все цвѣты ворончато-трубчатые, желтые. *C. Balsamita* L.

Краевые цвѣты язычковые бѣлые, остальные ворончато-трубчатые, желтые.

C. Leucanthemum L.

956. *C. Leucanthemum* L. Пет. Кр. II, стр. 28.—Бух. II, № 226.—Бух. I, № 215.—F. O., № 6, p. 86.—Кауф. II, № 399.—Pinz., p. 13.—Кауф. I, стр. 260.—Дв., № 803.—Макс., № 779.—Hoff. H., № 6992.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 149.—Lib. Tr., p. 66.—Hoff., № 871.—St. I, № 579.

Leucanthemum vulgare Lam. Пет., стр. 213.—Цин., № 724.—Lind., p. 126.

Chrysanthemum montanum L. Кауф. II, стр. 266.—Цин., стр. 236.—Кауф. I, стр. 261.—Дв., № 804.—Макс., № 780.—Mart., p. 149.

Корневище многолѣтнее, узловатое; стебли 30—90 см., прямостоящие или съ приподнимающимся основаніемъ, простые или съ небольшо-



Chrysanthemum Leucanthemum.

числомъ вѣтокъ, продольно-бороздчатые, голые, какъ и все растеніе, рѣже слегка опушенные; корневые листья округло-лопаччатые или обратно-яйцевидные, суженные въ длинный черешокъ; стеблевые—узко-обратно-яйцевидные или широко-линейные, къ основанію суженные, сидячіе, полустеблеобъемлющіе, къ верхушкѣ становятся мельче; все крупно-зубчатые, иногда основаніе листа почти надрѣзочно-зубчатое; корзинки верхушечныя, 3—6 см. въ поперечникѣ, на б. или м. длинныхъ тонко-бороздчатыхъ цветоносахъ; листочки обертки яйцевидно-продолговатые или треугольно-ланцетные, голые, свѣтло-зеленые, съ бѣлымъ или буроватымъ пленчатымъ краемъ; язычковые цвѣты бѣ-

лые, ворончато-трубчатые — желтые; сѣмянки около 3 мм. дл., безъ коронки.

По лугамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ середины

іюня до поздней осени; плоды съ половины августа.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. auriculatum Peterm.

Кауф. II, стр. 266.—Кауф. I, стр. 260.

Сѣмянки у краевыхъ язычковыхъ цвѣтовъ съ односторонней пленчатой коронкой. Дарьино, Зви. у. (X.).

β. hispidum Roenn.

Chrysanthemum sylvestre. Mart., p. 149.

Стебли, особенно у основанія, густо покрыты короткими курчавыми волосками; листья, особенно съ нижней стороны вдоль жилокъ, коротко опушенные. Хотѣичи, Бгр. у. (II.).—Григорово, известняки, Вер. у. (X.).

***C. Balsamita L.**

Tanacetum Balsamita L. Пет. Кр. II, стр. 25. — Пет., стр. 288. — Ст. II, p. 49. — Pal., № 1837.

Pyrethrum Balsamita Willd. Цун., стр. 237.

Balsamita vulgaris Willd. Hoff. H., № 6632.

Корневище толстое, деревянистое; стебли прямостоящие 50 — 100 см., часто почти от основания вѣтвистые, ребристые, покрыты такъ же, какъ и листья, тонкимъ сѣроватымъ войлокомъ; корневые листья на длинныхъ черешкахъ, нижніе — на короткихъ, остальные — сидячіе, овальные, эллиптическіе или узко-эллиптическіе, тупые, мелко-зубчатые, съ точечными просвѣчивающими железами, къ верхушкѣ стебля листья мельче; корзинки 4—6 мм. въ поперечникѣ, на концѣ стебля и вѣтвей собраны въ негустые полузонтики; листочки обертки туповатые, сѣроватые съ широкой бѣлой каймой, спереди неравно-зубчатой; всѣ цвѣты ворончато-трубчатые свѣтло-желтые; сѣмянки желтоватая, 2 мм. дл., съ маленькой зубчатой коронкой.

Прежде часто разводилось въ садахъ за пріятный запахъ листьевъ, теперь рѣже. Цвѣтетъ съ конца іюля до поздней осени.



Chrysanthemum Balanet.

957. *C. vulgare* Bernh.

Tanacetum vulgare L. Sch. IV, № 974. — Пет. Кр. II, стр. 24. — Вых. II, № 220. — Вых. I, № 209. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 288. — Кауф. II, № 390. — Цил., № 750. — Кауф. I, стр. 255. — Lindl., p. 126. — Др., № 783. — Макс., № 755. — Hoff. H., № 6640. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 144. — Hoff., № 3215. — St. II, p. 49. — St. I, № 554.

Tanacetum Pischma. Pal., № 1836.

Корневище толстое, почти деревянистое; стебли 50 — 125 см., прямостоящие, бороздчатые, голые, какъ и все растение, или слабо опушен-



Chrysanthemum vulgare.



1 *Chrysanthemum vulgare.* 2 β. *tenuifolia.*

ные, простые или съ половиною вѣтвистые; нижніе листья на черешкахъ, остальные сидячіе, просто-или 2-перисто-надрѣзные; доли продолговато-

ланцетными, ланцетными или широко-линейными; надрѣзы у долекъ цѣльнокрайніе или неравно-зубчаты; зубчики оканчиваются маленькимъ остріемъ; соцветіе верхушечное, густое, щитковидное; корзинки 6—10 мм. въ поперечникѣ; листочки обертки плотно прижаты одинъ къ другому, сѣро-зеленые, голые съ широкимъ пленчатымъ краемъ; наружные—островатые, внутренніе—туповатые; всѣ цвѣты желтые ворончато-трубчатые или краевые съ косо-срѣзаннымъ очень маленькимъ язычкомъ, почти не превышающимъ обертку; сѣмянки сѣрыя, 1.5 мм. дл., съ 5 ребрышками.

По межамъ, паровымъ полямъ, близъ жилья и по кустарникамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до глубокой осени; плоды съ конца августа.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. *crispa* (Mart.).

Tanacetum vulgare L. b. *crispum* DC. Пет. Кр. II, стр. 25.

Tanacetum crispum. Mart., p. 144.

Tanacetum Pischma β. *crispum*. Pal., № 1836 β.

Съ курчавыми листьями. Въ гербаріи Гольдбаха.

β. *tenuifolia* Max.

Tanacetum vulgare L. var. *tenuifolia* Max. Пет. Кр. II, стр. 25.—Макс., № 755 β.

Съ очень узкими линейными долями листьевъ. Протопопово, Клм. у. (Макс.).

958. *C. corymbosum* L. Пет. Кр. II, стр. 27.—Пет., стр. 254.—Кауф. II, № 398.—Гор., № 48.—Кауф. I, стр. 260.—Дв., № 805. — Макс., № 781.—Mart., p. 149.—Нойс., № 869.—St. II, p. 50.—St. I, № 580.—Pal., № 1904.

Pyrethrum corymbosum Willd. Цип., № 728.—Mart., p. 149.

Корневище толстое, косое съ длинными корнями; стебель прямостоящій или косо-приподнимающійся, 30—90 см., б. или м. опушенный,



Chrysanthemum corymbosum.

какъ и все растеніе, продольно-ребристый, слегка лоснящійся и иногда красноватый; нижніе листья на черешкахъ, верхніе—сидячіе, 2—3-перисто-раздѣльные, съ 7—15 долями; дольки надрѣзано-зубчатыя или зубчатыя; зубчики переходятъ въ остріе; къ верхушкѣ листья становятся мельче; корзинки 3—5 см. въ поперечникѣ на б. или м. длинныхъ цвѣтоносахъ въ верхушечномъ 3—20-цвѣтковомъ щиткѣ, рѣже корзинки одиночныя, верхушечныя; листочки обертки яйцевидно-ланцетные, тупые, буровато-зеленые съ слабымъ буроватымъ килемъ, по краямъ съ узкой свѣтло-бурой пленчатой, у верхушки съ слегка рѣсничатой каймой; язычковые цвѣты бѣлые, ворончато-трубчатые—желтые; сѣмянки около 3 мм. дл., призматическо-

5-ребристыя съ неравно-зубчатой коронкой.

По опушкамъ и кустарникамъ, очень рѣдко. Цвѣтетъ въ юнѣ и юлѣ. Анненгофская роща и Куново (Мар.). — Въ гербаріи Максимовича.—Окрестности Петровской Академіи (Шр.).

401. *Matricaria* L.

Обвертка полушаровидная, черенчатая, края листочковъ перепончатые; краевые цвѣты въ корзинкѣ женскіе язычковые, рѣже всѣ цвѣты обоенные, ворончато-трубчатые съ 5 (4) зубчиками; цвѣтоложе коническое или полушаровидно-коническое безъ прицвѣтничковъ; сѣмянки часто слегка искривленные съ усѣченной верхушкой, внутренняя сторона ихъ съ 3—5 сближенными ребрышками, часто слегка крылатыми; хохолка нѣтъ, иногда вмѣсто него правильная или неправильная пленчатая коронка.

1. Корзинки безъ язычковыхъ цвѣтовъ съ одними ворончато-трубчатыми. *M. suaveolens* (Pursh) Buchenau.

Корзинки съ язычковыми цвѣтами. 2.


2. Сѣмянки съ внутренней стороны съ 5 тонкими ребрышками; язычковые цвѣты 2—6 мм. дл.; цвѣтоложе удлинненно-коническое, полое. *M. Chamomilla* L.

Сѣмянки съ внутренней стороны съ 3 выдающимися ребрышками, какъ бы гранями; язычковые цвѣты 10—17 мм. дл.; цвѣтоложе б. ч. полушаровидно-коническое, плотное. *M. inodora* L.

959. *M. Chamomilla* L. Пет. Кр. II, стр. 27. — Бух. II, № 223. — Бух. I, № 212. — Пет., стр. 221. — Кауф. II, № 396. — Цин., № 726. — Кауф. I, стр. 258. — Lindl., p. 126. — Дв., № 808. — Макс., № 784. — Hoff. H., № 7025. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 150. — Hoff., № 2034. — St. II, p. 50. — St. I, № 582. — Pal., № 1910.

Растеніе однолѣтнее съ своеобразнымъ ароматичнымъ запахомъ: стебель 10—40 см., б. ч. отъ основанія сильно вѣтвистый, ребристый, голый, какъ и все растеніе; листья сидячіе, 2—3-перисто-раздѣльные; дольки ихъ очень узкія, почти нитевидныя, цѣльнокрайнія, оканчиваются мягкимъ остріемъ; корзинки 1—1,5 см. въ поперечникѣ на тонко-ребристыхъ цвѣтоносахъ въ 2—8 см. дл., нѣсколько утолщающихся къ корзинкамъ; листочки обвертки продолговатые или яйцевидные, тупые, на спинкѣ съ зеленой килеватой полоской и съ бѣлымъ пленчатымъ краемъ; язычковые цвѣты бѣлые, 2—6 мм. дл., отгибаются книзу; ворончато-трубчатые—желтые, 4—5-зубчатые; цвѣтоложе коническое, полое; сѣмянки 1 мм. дл., почти бѣлыя, со спинки гладкія, съ внутренней стороны съ 5 тонкими ребрышками.

По дорогамъ, близъ жилья, по поѣздамъ и паровымъ полямъ. Цвѣтетъ съ конца мая до осени; плоды съ конца юня.



Matricaria Chamomilla.

960. *M. suaveolens* (Pursh) Buchenau.

Matricaria discoidea DC. Пет. Кр. II, стр. 27. — Sch. II, № 464-b. — Бух. II, № 224. — Бух. I, № 213. — Ф. О., № 6, p. 86. — Пет., стр. 221. — Кауф. II, стр. 264. — Мил., № 19. — Гор., № 47.

Очень походить на *M. Chamomilla* L., но отличается от нея: листьями, дольки которых не ланцетные, а линейно-ланцетные; корзинками 0,5—1,5 см. в поперечникъ, съ одними ворончато-трубчатыми, б. ч. 4-зубчатыми цвѣтами (язычковыхъ цвѣтовъ никогда не бываетъ); болѣе короткими цвѣтоносами, б. ч. не превышающими 1 см. дл. и болѣе крупными сѣмянками до 1,5 мм. дл., б. ч. съ 4 ребрышками по внутренней сторонѣ.

По дорогамъ и близъ жилья, очень часто. Растеніе занесено изъ Азии, но такъ сильно распространилось, что почти вытѣснило *M. Chamomilla* L. Цвѣтетъ съ конца мая до глубокой осени; плоды съ конца юня.

*Matricaria suaveolens.**Matricaria inodora.*961. *M. inodóra* L. Пет., стр. 221. — Дин., № 727. — Lind., p. 126.

Chrysanthemum inodorum L. Бух. II, № 225. — Бух. I, № 214. — Ф. О., № 6, p. 86. — Кауф. II, № 397. — Кауф. I, стр. 259. — Дл., № 807. — Макс., № 782. — Mart., p. 150. — St. II, p. 50.

Pyrethrum inodorum Sm. Gold. C., p. 22. — Mart., p. 150.

Растеніе одно-многолѣтнее съ слабымъ неприятнымъ запахомъ; стебель 25—70 см., прямостоящій, голый, какъ и все растеніе, продольно-бороздчатый, б. ч. въ верхней половинѣ вѣтвистый; листья сидячіе, 2—3-перисто-раздѣльные, съ линейными, часто почти ланцетными дольками, заостренными въ очень маленькую, мягкую колючку; корзинки 2—3 см. в поперечникѣ, на длинныхъ тонко-бороздчатыхъ цвѣтоносахъ; цвѣтоложе полушаровидно-коническое, плотное; листочки обертки овальные или продолговатые, туповатые, съ темно-зеленой килеватой полоской на спинѣ, по краямъ съ б. или м. широкой бѣлой или буроватой пленчатой каймой; язычковые цвѣты бѣлые, 10—13 мм. дл., ворончато-труб-

чатые—желтые: сѣмянки около 2 мм. дл., на внутренней сторонѣ съ 3 выдающимися крупными ребрышками, какъ бы гребнями, между ребрами наверху по одной черной масляной железкѣ, продолженной въ бурюю линію: съ наружной стороны сѣмянки выпуклыя, почти черныя, ячеисто-бородавчатая.

По берегамъ рѣкъ, по дорогамъ, паровымъ полямъ, посѣвамъ и близъ жилья. Цвѣтетъ съ начала іюня до поздней осени: плоды съ конца іюля.

Кромѣ типичной формы еще:

а. *ambiguum* (Rchb.).

Chrysanthemum inodorum L. *β. ambiguum* Rchb. F. O., № 6, p. 86.—Кауф. II, стр. 265.—Кауф. I, стр. 259.

Chrysanthemum inodorum L. *ambiguum* Aschers. et Graebn. Хор. III, стр. 91.

Листочки обертки съ черно-бурой или почти черной каймой: язычковые цвѣты 12—17 мм. дл.; корзинки до 4,5 см. въ поперечникѣ. По торфянымъ болотамъ, кустарникамъ и посѣвамъ. *)

402. *Artemisia* L.

Обертка овальная или шаровидная, черешчатая, съ листочками по краямъ б. ч. перепончатыми; краевые цвѣты женскіе, узко-трубчатые, 2—3-зубчатые, или всѣ цвѣты въ корзинкѣ обоюднояе, ворончато-трубчатые, 5-зубчатые; цвѣтоложе плоское или выпуклое, голое, безъ прицвѣтничковъ или покрыто волосами; пыльники на концѣ съ нитевиднымъ отросткомъ; сѣмянки цилиндрическія или обратно-яйцевидныя, иногда сплюснутыя, безъ ребрышекъ или съ два замѣтными ребрышками; хохолка нѣтъ, вмѣсто него очень тонкій кольцевой валикъ.

1. Листья ланцетные, цѣльнокрайніе. *A. Dracunculus* L.

Листья раздѣльные, иногда только верхушечные ланцетные. 2.

2. Цвѣтоложе покрыто длинными волосами.

A. Absinthium L.

Цвѣтоложе голое. 3.

3. Листовыя доли ланцетныя или продолговатыя.

A. vulgaris L.

Листовыя доли линейныя или почти нитевидныя. 4.

4. Листочки обертки б. или м. густо опушенные. 5.

Листочки обертки голые или слегка железисто-бородавчатые, но не опушенные. 6.

5. Все растение густо покрыто сѣрымъ войлокомъ; черенки листьевъ у основанія съ маленькими ушками. *A. austriaca* Jacq.

Все растение покрыто короткимъ прижатымъ пушкомъ, но не войлокомъ, рѣже почти голое; черенки листьевъ безъ ушковъ.

A. paniculata Lam.

*) По сообщенію А. А. Хорошкова чаще типичной формы.

6. Цвѣтущіе стебли приподнимающіеся, пучками, у основанія съ укороченными не цвѣтущими стеблями; корзинки 2—3 мм. дл., почти сидячія. *A. campestris* L.

Цвѣтущій стебель одинъ, примостоящій, у основанія безъ укороченныхъ не цвѣтущихъ стеблей; корзинки 1—2 мм. дл., на поникающихъ ножкахъ. *A. scoparia*. W.K.

962. *A. Absinthium* L. Бух. II, № 219.—Бух. I, № 208.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 140.—Кауф. II, № 385.—Цин., № 749.—Кауф. I, стр. 253.—Lind., p. 126.—Дв., № 781.—Макс., № 758.—Hoff. II, № 6642.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 144.—Hoff., № 328.—St. II, p. 49.—St. I, № 556.—Pal., № 1843.

Корневище толстое, вѣтвистое; растеніе съ сильнымъ ароматичнымъ запахомъ, покрыто прижатымъ сѣрымъ или серебристымъ войлокомъ; стебли до 1 м., у основанія деревянистые, тонко-продольно-бороздчатые; листья, исключая верхнихъ, на узко-крылатыхъ черешкахъ; на не цвѣтущихъ стебляхъ листья 3-перисто-раздѣльные съ туповатыми дольками; на цвѣтущихъ стебляхъ нижніе б. ч. 2-перисто-раздѣльные; къ верхушкѣ стебля становятся менѣ сложными, такъ что верхушечные только тройчатые, а у цвѣтовъ простые съ острыми дольками; соцвѣтіе густое, многоцвѣтковое, метельчато-вѣтвистое; корзинки почти шаровидныя, 3—4, 5 мм., на поникающихъ цвѣтоножкахъ; листочки обвертки очень широкіе, снаруж шерстистые, внутренніе—съ очень широкимъ прозрачнымъ пленчатымъ краемъ; цвѣтоложе съ длинными волосами, равными цвѣтамъ; цвѣты желтые, краевые женскіе—узко-трубчатые, 2-зубчатые; остальные обоеполые, ворончато-трубчатые, 5-зубчатые; сѣмянки около 1 мм. дл.



Artemisia Absinthium.

цвѣтоложе съ длинными волосами, равными цвѣтамъ; цвѣты желтые, краевые женскіе—узко-трубчатые, 2-зубчатые; остальные обоеполые, ворончато-трубчатые, 5-зубчатые; сѣмянки около 1 мм. дл.

Но паровымъ полямъ, межамъ, огородамъ и пустырямъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюля до конца августа.

963. *A. austriaca* Jacq.

Корневище толстое, ползучее, вѣтвистое; все растеніе покрыто густымъ, сѣрымъ, иногда слегка серебристымъ войлокомъ; стебли 15—60 см., у основанія деревянистые, примостоящіе или слегка восходящіе, часто въ верхней части вѣтвистые; нижніе листья на черешкахъ, у основанія съ маленькими ушками, 2—3-перисто-раздѣльные, съ линейными туповатыми или острыми дольками, конечныя дольки сближены какъ бы пучкомъ; къ верхушкѣ стебля листья менѣ сложные, самые верхушечные простые линейные; корзинки шаровидно-ййцевидныя или яйцевидно-

продолговатыя, 2—3 мм. дл., на поникающихъ цветоножкахъ въ вѣтвистыхъ метелкахъ; листочки обертки продолговатыя, тупые, съ широкимъ пленчатымъ краемъ, снаружи и даже по пленчатому краю шерстистые; цветоножке голое; цвѣты ворончато-трубчатые желтые или оранжевые, въ зѣвѣ густо-шерстистые; сѣмянки 1,5 мм. дл.

Занесено. Цвѣтетъ съ начала августа. У полотна М.-Ряз. ж. д. между Томлинымъ и Малаховкой (Куль.).



Artemisia austriaca.



Artemisia vulgaris.

964. *A. vulgáris* L. Sch. VI, № 1618.—Бух. II, № 218.—Бух. I, № 207.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 140.—Кауф. II, № 359.—Цин., № 746.—Кауф. I, стр. 254.—Lind., p. 126.—Дв., № 782.—Макс., № 757.—Hoff. II, № 6687.—Mart., p. 144.—Hoff., № 346.—St. II, p. 49.—St. I, № 557.—Pal., № 1844.

Корневище многолѣтнее, вѣтвистое, съ короткими побѣгами; стебли 1—2 м., прямостоящіе, въ верхней части метельчато-вѣтвистые, рѣже простые, въ нижней части почти деревянистые, голые или часто опушенные тонкимъ войлокомъ и перѣдко буро-красные; листья сверху темно-зеленые, голые или слабо опушенные, снизу покрыты тонкимъ бѣлымъ войлокомъ; нижніе—на черешкахъ 2-перисто-раздѣльные, средніе—перисто-раздѣльные, верхушечные—простые ланцетные; доли нижнихъ и среднихъ листьевъ ланцетныя, надрѣзочно-зубчатыя или крупнозубчатыя, заостренныя; соцветія кистистыя, облиственныя; корзинки 3—5 мм. дл., яйцевидныя или продолговатыя, на ножкахъ, поникающія или торчащія; листочки обертки снаружи б. или м. войлочнo-опушенные, внутренніе—съ пленчатымъ краемъ; цветоножке голое; цвѣты желтые или красноватыя, краевые—женскіе, узко-трубчатые, 2-зубчатые, остальные—обоюполные, ворончато-трубчатые, 5-зубчатые; сѣмянки 1,5 мм. дл., сплюснутыя, тонко-ребристыя.

По межахъ, пустырямъ, близъ жилья и по берегамъ рѣкъ и ручьевъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюля до конца августа.

965. *A. campestris* L. Мос., № 15. — Пет. Кр. II, стр. 24. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 141. — Кауф. I, № 387. — Цин., № 736. — Кауф. I, стр. 254. — Lind., p. 126. — Дв., № 780. — Макс., № 756. — Hoff. II, № 6648. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 144. — Hoff., № 332. — St. II, p. 49. — St. I, № 555. — Pal., № 1841.

Корневище вѣтвистое, многорѣзнее съ пучками цвѣтущихъ стеблей и нѣсколькими укороченными не цвѣтущими; цвѣтущіе стебли слегка приподнимающіеся,*) до 1 м., у основанія деревянистые, голые или опушенные, прутьевидные, простые или вѣтвистые; корневые и нижніе стеблевые листья 2—3-перисто-раздѣльные, съ линейными удлиненными, заостренными дольками; черешки листьевъ у основанія съ маленькими ушками, къ верхушкѣ листья мельче и менѣ сложные; верхніе — сидячіе, часто простые; соцветіе — метелка изъ одностроннихъ кистей; корзинки 2—3 мм. дл., овальныя или яйцевидныя, почти сидячія или на очень короткихъ торчащихъ или поникающихъ ножкахъ; листочки обвертки овальныя, голые или на спинкѣ слегка железисто-бугорчатые, по краю пленчатые; цветоножка голое; цвѣты желтые, краевые — женскіе, остальные — обоеполые; сѣмянки 1 мм. дл.



Artemisia campestris.

По паровымъ полямъ, межамъ, пустырямъ, дорогамъ и открытымъ мѣстамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ середины іюля до глубокой осени.

Распадается на слѣдующія формы:

α. *vulgáris* Marss.

Растеніе сперва слегка покрыто шелковистымъ пушкомъ, потомъ голое или почти голое. Если стебли свѣтло-зеленыя или желтоватыя, а корзинки соломенно-желтыя, то это: f. *stramenticia* GB.; если стебли красноватыя или почти пурпуровыя и корзинки красноватыя, то это: f. *purpurascens* GB.

β. *seríceá* Fries. Пет. Кр. II, стр. 24. — F. O., № 6, p. 86. — Кауф. II, стр. 259. — Цин., стр. 239. — Кауф. I, стр. 254.

Все растеніе густо серебристо-опушенное. По пригоркамъ, близъ Зюзина, Иванова; Каропчеево, Кѣм. у. (К.).

966. *A. scopária* W. K. Пет. Кр. II, стр. 24. — Пет., стр. 141. — Кауф. II, № 388. — Цин., № 738. — Рупр., стр. 62. — Кауф. I, стр. 254. — Макс., Пут., ч. II, стр. 82.

*) Петушиновъ, Хорошковъ и Кречетовичъ нашли близъ Лужковъ, Сри. у., на голыхъ пескѣхъ одинъ экземпляръ съ распростертыми, очень длинными темно-красными стеблями и болѣе крупными корзинками.

Корень одношлѣтный, веретенообразный; стебель одинъ безъ укороченныхъ не цвѣтущихъ стеблей, съ розеткою листьевъ, примостоящій, до 1 м., голый или опушенный отстоящими волосками, почти отъ основания сильно метельчато-вѣтвистый; листья голые или опушенные, особенно молодые, когда они серебристо-пушистые; корневые и нижніе стеблевые листья 2—3-перисто-раздѣльные, на черешкахъ съ маленькими ушками у основанія; дольки листьевъ линейныя, удлиненыя, заостренныя; верхніе листья сидячіе, менѣе сложные; соцвѣтіе — кистистая метелка; корзинки 1—2 мм. дл., почти шаровидныя, на поникающихъ ножкахъ; листочки обвертки округло-яйцевидныя, лоснящіеся, съ узкимъ пленчатымъ краемъ, голые или едва бугорчато-железистые; цвѣтоложе голое; цвѣты желтые, краевые — женскіе, остальные — обоеполые; сѣмянки 0,8 мм. дл.



Artemisia scoparia.

На пескѣ и известнякахъ, не часто. Цвѣтеть съ конца іюля до поздней осени; ко времени плодоношенія часто теряетъ всѣ листья. По береговой полосѣ р. Оки какъ въ Срп., такъ и въ Кіев. уу., и по берегу р. Москвы между Заозерьемъ и д. Коломенъ, Бри. у. (С.).

967. **A. paniculáta Lam.** Пет. Кр. II, стр. 23 и 24.

Artemisia procera Willd. Sch. IV, № 1024. — Ф. Б., № 42. — Пет., стр. 141. — Кауф. II, № 386. — Гор., № 22. — Цин., № 740. — Рупр., стр. 62. — Кауф. I, стр. 253.

Artemisia Abrotanum L. Gold. Sp., p. 137. — St. II, p. 49. — St. I, № 558. — Pal., № 1839.

Полукустарникъ до 1,5 м.; верхушки стеблей ежегодно отмираютъ, а нижняя часть деревенеетъ; все растеніе покрыто короткими прижатыми волосками, въ молодости почти войлокомъ, верхняя сторона листьевъ къ осени часто голая; листья на черешкахъ, нижніе 2—3-перисто-раздѣльные, съ узкими линейными вытянутыми дольками, туповатыми или заостренными; верхніе листья сидячіе и менѣе сложные, у цвѣтовъ простые, почти нитевидныя; соцвѣтіе густое, вѣтвистое, метельчатое; корзинки 2—2,5 мм. дл., полушаровидныя или яйцевидно-шаровидныя, на поникающихъ цвѣтоножкахъ; наружныя листочки обвертки овально-ланцетныя, внутреннія — почти овальныя, съ широкимъ пленчатымъ, зубчатымъ и слегка рѣсничатымъ шерстистымъ краемъ, всѣ снаружи опушенные; цвѣтоложе голое; цвѣты желтые, краевые — женскіе, узко-трубчатые, 2—3-зубчатые, остальные — ворончато-трубчатые, 5-зубчатые.

По берегамъ рѣкъ и заливымъ дугамъ на пескѣ и известнякахъ; часто разводится плѣза сильнаго ароматнаго запаха. Цвѣтеть съ конца

июля до поздней осени. По береговой полосѣ р. Оки какъ въ Срп., такъ и въ Кѣм. уу.—Тюшася у ж.-д. моста, Срп. у. (П.). — Берегъ Москвы р. близъ Петрова, Кѣм. у. (П.). — По берегу Москвы р. между Заозерьемъ и д. Коломѣцъ, Брн. у. (С.).



Artemisia paniculata.



Artemisia Dracunculus.

* **A. Dracunculus L.** Пет. Кр. II, стр.24—Пет., стр. 140.—Цин., № 735.—Pal., № 1845.

Корневище многолѣтнее съ побѣгами; стебли до 1 м., голые, какъ и все растеніе, ребристые, къ верхушкѣ кистисто-вѣтвистые, въ нижней части съ укороченными не цвѣтущими вѣточками; листья ланцетные, сидячіе, цѣлюкрайніе, нѣсколько лоснящіеся, заостренныя, у основанія безъ ушковъ; корзинки шаровидныя, 2,5—3 мм. дл., на поникающихъ цветоножкахъ, собраны въ кистистое соцветіе; листочки обертки голые, внутренніе съ широкой бѣлой каймой; цвѣты бѣловатыя, краевые—женскіе, остальные—обоеполые.

Разводится по огородамъ изъ-за пріятнаго запаха. Цвѣтетъ съ половины августа.

403. *Tussilágo L.*

Обертка колокольчатая изъ одного ряда листочковъ, у основанія ея маленькіе чешуевидные листочки; краевые цвѣты въ корзинкѣ женскіе, многорядные, язычковые, съ 2 нитевидными рыльцами, остальные цвѣты обоеполые, ворончато-трубчатые, 5-зубчатые съ булавовиднымъ, слегка 2-лопастнымъ рыльцемъ; цвѣтоложе плоское или выпуклое, голое, безъ прицвѣтничковъ; сѣмянки продолговато-цилиндрическія, съ хохолкомъ изъ многихъ рядовъ длинныхъ шелковистыхъ волосковъ.

968. *T. fáfárus L.*

Tussilago Farfara L. Бух. II, № 206.—Бух. I, № 196.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 296.—Кауф. II, № 365.—Цин., № 683.—Кауф. I, стр. 241.—Lind., p. 122.—Ann., C. II, № 133.—Дв., № 790.—Макс., № 766.—Hoff. H., № 6766.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 146.—Hoff., № 3370.—St. II, p. 49.—St. I, № 565.

Корневище толстое, ползучее, близъ верхушки покрыто чешуйками, ранней весной даетъ одну или нѣсколько стрѣлокъ съ одною корзинкою каждая; стрѣлки 5—25 см., прямостоящія, шерстисто-опушенные, покрыты яйцевидно-продолговатыми чешуйками, часто на концѣ буро-красными; цвѣты желтые, 10—20 мм. въ поперечникѣ; по отцвѣтаніи развертываются листья на длинныхъ черешкахъ, сердцевидно-округлые, угловатые, просто- или двояко-зубчатые, сперва съ обѣихъ сторонъ бѣло-войлочные, позднѣе съ верхней стороны голые, а съ нижней стороны войлочные; сѣмянки 3—4 мм. дл.



Tussilago farfara.

На глинистой и песчаной почвѣ, по обрывамъ, канавамъ, по берегамъ рѣкъ и ручьевъ, очень часто. Цвѣтеть какъ только появляются проталины, съ половины апрѣля до половины мая; плоды съ половины мая.

404. *Petasites* Adans.

Обертка колокольчатая изъ одного ряда листочковъ, у ея основанія маленькіе чешуевидные листочки; растеніе двудомное; женскія особи съ корзинками изъ небольшого числа срединныхъ обоеполыхъ цвѣтовъ и многихъ рядовъ краевыхъ женскихъ; мужскіе — только изъ обоеполыхъ цвѣтовъ или нѣсколько краевыхъ цвѣтовъ женскихъ; обоеполые цвѣты ворончато-трубчатые, 5-зубчатые, но пестикъ въ нихъ недоразвитъ; женскіе — шлемовидно-трубчатые, съ косо усѣченнымъ краемъ или почти язычковые; цвѣтоложе плоское, голое, безъ прицвѣтничковъ; сѣмянки цилиндрическія, слабо ребристыя; хохолокъ изъ многихъ рядовъ волосковъ.

969. *P. officinális* Moench. Пет. Кр. II, стр. 17 и 18.—Пет., стр. 237.—Кauf. II, № 366.—Цил., № 681.—Kauf. I, стр. 241.

Tussilago Petasites L. Дв., № 791.—Макс., № 767.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 147.—St. I, № 566.—Pal., № 1860.

Tussilago hybrida. Mart., p. 147.

Корневище толстое, мясистое, вертикальное или косое; стрѣлки прямостоящія, толстыя, полныя, 20—40 см., во время плодоношенія до 1 м., шерстисто-опушенные, красноватые, покрыты чешуевидными, ланцетными красноватыми листьями, которые въ нижней части стебля расширены въ маленькую округлую пластинку; цвѣты въ верхушечной густой кисти; корзинки съ обоеполыми цвѣтами на болѣе короткихъ цветоножкахъ, чѣмъ у корзинокъ съ женскими цвѣтами; обертка красноватая, у первыхъ 7—8 мм. дл., у вторыхъ 3—4 мм. дл., ко времени

плодоношения удлинняется до 5—7 мм.; вѣнчикъ красноватый, рѣже почти бѣлый. листья распускаются послѣ цвѣтенія, на длинныхъ черешкахъ, сердцевидно-треугольные или сердцевидно-округлые, неравно- и выемчато-зубчатые, съ пурпуровыми кончиками у зубцовъ; вначалѣ листья съ обѣихъ сторонъ войлочно-опушенные, подлѣ верхняя сторона разбѣнно-опушенная, а нижняя покрыта тонкимъ войлокомъ или почти голая; къ осени листья становятся очень крупными; сѣмянки 2—3 мм. дл.

Разводилось и рѣдко дичаетъ. Цвѣтетъ съ половины мая. Въ саду Голышинской больницы (К.).



Petasites officinalis.



Petasites tomentosus.

970. *P. tomentosus* DC. Пер. Кр. II, стр. 18.

Petasites spurius Rehb. Пер., стр. 237—Кауф. II, № 367.—Пил., № 682.—Рупр., стр. 86—Кауф. I, стр. 242.

Tussilago paradoxa Retz. Hoff., № 3371.

Корневище толстое, ползучее, вѣтвистое, на верхушкѣ утолщенное; вѣточныя стрѣлки 15—40 см., покрыты чешуйчатыми линейно-ланцетными тупыми листьями, свѣтло-зелеными, съ бѣлой каймой; листья на длинныхъ черешкахъ, появляются послѣ цвѣтовъ, треугольно-сердцевидные съ нижними лопастями 2—3-лопастными, по краямъ неравнозубчатые, вначалѣ съ обѣихъ сторонъ густо-бѣло-войлочные, потомъ съ нижней стороны бѣло-войлочные, съ верхней—кочкѣвидно-шерстистые; обоеполая корзинки въ яйцевидной метелкѣ у основанія часто съ мелкими вѣточками; женскія—въ щитковидной головкѣ; корзинки 5—8 мм. дл.; обоеполые цвѣты свѣтло-желтые; женскіе—почти бѣлые, слегка язычковые.

По песчанымъ берегамъ рѣкъ и по отмелямъ. Цвѣтетъ съ половины апрѣля до половины мая; плоды въ юнѣ. Пока только по всему берегу р. Оки какъ въ Срп., такъ и въ Калм. уу.

405. *Ligulária* Cass.

Обертка цилиндрическая или коническая, однорядная, листочки ее равные, на концѣ нѣсколько расширенные, верхними краями покрываютъ одинъ другого, такъ, что кажутся двурядными; у основанія обертки два супротивныхъ удлинненныхъ листочка; краевые цвѣты женскіе, одно-рядные, язычковые или вугубые, иногда съ зачатками тычинокъ; остальные — обоеполые, ворончато-трубчатые; цвѣтоложе плоское, голое, безъ прицвѣтничковъ; верхняя часть столбика и рыльца на всемъ протяженіи опушены; сѣмянки почти цилиндрическія, бороздчатые, съ хохолкомъ изъ длинныхъ многорядныхъ волосковъ.

971. *L. sibirica* Cass. Sch. III, № 621. — Пет., Кр. II, стр. 28. — Пет., стр. 213. — Кауф. II, № 400. — Цин., № 756. — Кауф. I, стр. 261. — Анн., С. V, № 31.

Стебель прямостоящій, 30 — 150 см., простой ребристый, часто красноватый, голый или опушенный; листья съ нижней стороны опу-шенные, корневые — на длинныхъ ребри-стыхъ черешкахъ, треугольно-концевид-ные или треугольно-сердцевидные, по кра-ямъ неровно-зубчатые; стеблевые (1—4) треугольные или треугольно-почковидные, къ верхушкѣ становятся много мельче, съ черешками крылатыми и сильно влага-лищно-вздутыми; соцветіе длинно-кисти-стое, часто нижніе цвѣты въ соцветіи на очень длинныхъ цветоножкахъ; прицвѣт-ники широко-ланцетные или линейные, часто красноватые; цветоножки, прицвѣт-ники и обертка опушены; листочки об-вертки на концѣ красноватые; цвѣты ярко-желтые, до 4 см. въ поперечникѣ, языч-ковыхъ цвѣтовъ 5—10.



Ligularia sibirica.

По тонкимъ торфянымъ болотамъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ начала іюля до конца августа; плоды съ конца августа. Б. Мытницъ (А.). — Тонкое торфя-ное болото близъ Б. Мытницъ, теперь это болото осушено, но растеніе можно еще встрѣтить у водовода близъ новой водокачки (С.).

406. *Senécio* L.

Обертка цилиндрическая, колокольчатая или коническая, одно-рядная; листочки ее часто сросшіеся и у основанія иногда маленькія чешуйки; краевые цвѣты женскіе, язычковые, иногда съ пластинкой очень короткой, или же все цвѣты въ корзинкѣ обоеполые, ворончато-трубчатые, 5-зубчатые; цвѣтоложе плоское или слегка выпуклое, голое;

рыльца на концѣ опушены кисточкою; сѣмянки цилиндрическія, 5-много-ребристыя, съ хохолкомъ изъ многорядныхъ ломкихъ волосковъ, у основанія сросшихся.

1. Всѣ листья ланцетные, линейные или продолговатые, остро-зубчатые. 2.
Листья перисто-раздѣльные или выемчато-зубчатые, или же нижніе — глубоко-выемчато-зубчатые, а верхніе — ланцетные, крупно-зубчатые. 3.
2. Листья съ обѣихъ сторонъ голые; чешуекъ у основанія обертки 3—5; язычковыхъ цвѣтовъ 6—8. *S. fluviatilis* Wallr.
Листья съ нижней стороны б. или м. густо паутинисто-опушенные; чешуекъ у основанія обертки 8—10; язычковыхъ цвѣтовъ 10—20. *S. paludosus* L.
3. Краевые язычковые цвѣты свернутые или при распусканіи плоскіе, потомъ свернутые, или же язычковыхъ цвѣтовъ совсѣмъ нѣтъ. 4.
Краевые цвѣты плоскіе, не свернутые. 6.
4. Язычковыхъ цвѣтовъ нѣтъ. *S. vulgaris* L.
Язычковые цвѣты есть. 5.
5. Все растеніе железисто-пушистое. *S. viscosus* L.
Все растеніе, хотя и опушенное, но не железистое; иногда железки встрѣчаются только на цвѣтоножкахъ и оберткѣ. *S. silvaticus* L.
6. Растеніе железисто-опушенное, безъ чешуекъ у основанія обертки. *S. palustris* DC.
Растеніе, хотя и бываетъ опушено, но безъ железокъ; чешуйки у основанія обертки есть — отъ 1 до двѣнадцати. 7.
7. Растеніе однолѣтнее; стебель мясистый, легко сплюсциваемый, покрытый, особенно въ молодости, отстоящими мягкими волосками, рѣже шерстисто-опушенный. *S. vernalis* W. K.
Растеніе многолѣтнее; стебель жесткій, не сплюсциваемый, голый или шерстисто-опушенный. 8.
8. Чешуекъ у основанія обертки 1—3; обертка въ 3—4 раза длиннѣе чешуекъ; краевыя сѣмянки голыя, остальные опушенные. *S. Jacobaea* L.
Чешуекъ у основанія обертки 4—6; обертка въ 2 раза длиннѣе чешуекъ; всѣ сѣмянки опушенные. *S. erucifolius* L.

972. *S. palustris* (L.) Hook.

Senecio paluster DC. Пет. Кр. II, стр. 32.—Пет., стр. 276.—Цин., № 771.

Cineraria palustris L. Кауф. II, № 408.—Кауф. I, стр. 261.—Ноев. Н., № 6916.—St. I, № 574.—Pal., № 1885.

Все растеніе свѣтло- или желтовато-зеленое, мягко- и железисто-опушенное; стебель прямостоящій, 30—100 см., полый, ребристый, вѣтвистый; листья нѣсколько мясистые; нижніе — широко-ланцетные, б. ч.

выемчато- или надрѣзочно-зубчатые, ко времени цвѣтенія увядають; остальные — ланцетные или широко-ланцетные, заостренные, зубчатые, рѣже пѣльнокрайніе, съ сидячимъ слегка сердцевиднымъ основаніемъ; соцветіе верхушечное, щитковидное, вѣтвистое; обвертка безъ маленькихъ чешуекъ у основанія; листочки ея съ пленчатымъ кончикомъ; корзинки 15—20 мм. въ поперечникѣ; цвѣты сѣрно-желтые, краевыхъ язычковыхъ цвѣтовъ 20—25; сѣмянки голыя, съ явственно выдающимися ребрышками.

По торфянымъ болотамъ и канавамъ, очень рѣдко. Цвѣтетъ съ половины іюня весь іюль. Находится въ гербаріи Гофмана.



Senecio palustris.



Senecio vulgaris.

973. *S. vulgaris* L. Бух. II, № 227.—Бух. I, № 216.—F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 277.—Кауф. II, № 401.—Цин., № 758.—Кауф. I, стр. 262.—Lind., p. 128.—Апп., С. III, № 227.—Др., № 792.—Макс., № 768.—Hoff. II., № 6819.—Gold. C., p. 22. — Mart., p. 147. — Hoff., № 2960.—St. II, p. 49.—St. I, № 567.—Pal., № 1862.

Растеніе однолѣтнее, голое или опушенное, слегка мясистое; стебель прямостоящій, б. ч. вѣтвистый, бороздчатый; листья перисто-лопастные или перисто-раздѣльные, съ округлыми или продолговатыми, иногда почти линейными долями, по краямъ неравно- и туповато-зубчатыми; нижніе—слегка сужены въ черешокъ, верхніе—сидячіе, полустеблеобъемлющіе; корзинки 7—10 мм. дл. въ не густыхъ щиткахъ на концѣ стебля и вѣтвей, на торчащихъ или поникающихъ цветоножкахъ; у основанія обвертки узкія, почти шлювидныя, прижатые чешуйки, на концѣ черныя; обвертка слегка колокольчатая, въ два раза длиннѣе ширины; листочки ея килеватые, съ черными кончиками; цвѣты желтые, веѣ ворончато-трубчатые; сѣмянки 1.5—2 мм. дл., опушенные.

Сорное, очень часто. Зацвѣтаетъ съ половины мая, цвѣтетъ все лѣто и осень.

974. *S. viscosus*. L. Пет. Кр. II, стр. 32.—Пет., стр. 277.—Кауф. II, № 402.—Гор., № 49.—Цил., № 759.—Кауф. I, стр. 265.—Макс., № 769.

Senecio viscidus L. Дв., № 795.

Растение однолетнее, сплошь покрыто отстоящими железистыми волосками, отчето липкое; стебель прямостоящий, 20—60 см., б. ч. сильно ветвистый; листья полустеблеобъемлющие, глубоко-перисто-лопастные или перисто-раздельные; лопасти ланцетные, туповатые, неравно- и выемчато-зубчатые; корзинки 8—10 мм. дл., в не густых щитковидных соцветиях на концѣ стебля и ветвей; чешуйки у основанія обертки линейныя, съ чернымъ кончикомъ, въ 2—3 раза короче ея; обертка въ 2 раза длиннѣ ширины; листочки ея слегка килеватые, съ бурными или черными кончиками; цвѣты желтые, красные язычковые очень короткіе, сперва съ прямымъ язычкомъ, потомъ свернутымъ; сѣмянки 3 мм. дл., бурная, продольно-тонко-бороздчатая, сперва слегка опушенная, потомъ голая.

По песчанымъ мѣстамъ, очень рѣдко. Цвѣтетъ съ половины іюня. Въ гербаріи Максимовича.



Senecio viscosus.



Senecio silvaticus.

975. *S. silvaticus* L. Хор. I, стр. 19.—Sch. II, № 319.—Пет. Кр. II, стр. 28.—Пет., стр. 277.—Кауф. II, № 403.—Мил., № 20.—Цил., № 760.—Рупр., стр. 88.—Кауф. I, стр. 262.—Дв., № 793.—Макс., № 770.—Mart., p. 147.—St. II, p. 49.—St. I, № 568.

Растение однолетнее, все б. или м. густо, но не железисто-опушенное; стебель прямостоящий, 20—85 см., б. ч. сильно ветвистый, ребристый; листья перисто-лопастные или перисто-раздельные, нижние—сужены почти въ черешокъ, верхніе—полустеблеобъемлющіе, у основанія съ ушками; лопасти продолговатые или линейныя, тупыя, неравно- и тупо-зубчатые, часто между лопастями маленькія дольки; корзинки 6—9 мм. дл., въ щитковидныхъ соцветіяхъ на концѣ стебля и ветвей; чешуекъ у основанія обертки нѣтъ или онѣ прижаты и очень мало замѣтны; об-

вертика цилиндрическая, въ 3 раза длиннѣе ширины, опушенная, какъ и цветоножки, часто слегка железисто-волосистая; листочки обертки слегка килеватые съ темными кончиками; цвѣты желтые, краевые — язычковые, съ очень короткими свернутыми язычками; сѣмянки 2, 5 мм. дл., опушенные.

По разрабатываемымъ торфянымъ болотамъ, опушкамъ, рѣже по лѣсамъ, рѣдко. Цвѣтеть съ половины іюля весь августъ. Шеламово, Вер. у. (Р.). — Ашенково, Бгр. у. (Гум.). — Между озерами Поганымъ и Чистымъ близъ с. Кудинова, Бгр. у. (Х.). — Красниковское болото за Б. Мытищами и заводъ Челюковыхъ близъ ст. Мытищи куда, должно-быть, занесено съ торфомъ; по вырубкѣ на торфяной почвѣ близъ Дергасева, Бри. у. (С.). Блошню, близъ фабрики (П.).

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. nānus Lackowitz.

Senecio sylvaticus L. b. *pumilus*. Mart., p. 147.

Все растение очень маленькое 12—20 см., б. ч. обь одной корзинкѣ, рѣже о 2—3. Село Кудиново, Бгр. у. (Х.).

976. S. vernālis W. K. Пет. Кр. II, стр. 32. — Ф. Б., № 1.

Растение однолѣтнее; стебель прямостоящій, 20—60 см., простой или вѣтвистый, покрытъ, особенно у молодыхъ растений, отстоящими мягкими волосками или паутинисто-шерстистый; листья волнистые, нижніе — на длинныхъ черешкахъ, продолговатые, выемчато-перисто-лопастные, двояко-зубчатые, лопасти треугольныя; стеблевые — сидячіе, стеблеобъемлющіе, менѣе глубоко-перисто-надрѣзные, иногда только выемчато-зубчатые; корзинки собраны не густыми щитками на концѣ стебля и вѣтвей; чешуйки у основанія обертки (6—12) съ черными кончиками, въ четыре раза короче ея; цвѣты желтые, краевые — язычковые (6—14) съ отстоящими, не свернутыми язычками, равными оберткѣ; сѣмянки прижатопушенные.

Какъ сорное, по полямъ, пустырямъ и лѣснымъ дорогамъ, очень рѣдко. Цвѣтеть въ маѣ и іюнѣ, иногда второй разъ осенью. По лѣсной дорогѣ близъ Новой Кунавины, Бгр. у. (П. П.). — Успенское, Зви. у. (Капелькинъ и Х.).



Senecio vernalis.

977. S. erucifolius L. Пет. Огч., стр. 13. — Пет., Кр. II, стр. 29. — Пет., стр. 276. — Кауф. II, № 404. — Цил., № 763. — Руир., стр. 88. — Кауф. I, стр. 263.

Растение многолѣтнее; стебель прямостоящій, 30—140 см., иногда красноватый, шерстисто-опушенный, какъ и все растение, рѣже почти голый, оканчивается вѣтвистымъ, щитковиднымъ соцветіемъ; листья глуп-

боко перисто-раздѣльные, верхніе—сидячіе съ ушками у основанія, нижніе—суженные въ короткій черешокъ; доли листа узко-ланцетныя или широко-линейныя, съ плоскими краями и только по одному краю съ 1—3 крупными зубцами; чешуйки у основанія обертки (4—6) ланцетныя, шерстистыя, въ два раза короче слегка колокольчатой обертки, листочки которой сильно килеватые, шерстистые и на концѣ слегка рѣсничатые; корзинки 12—15 мм. въ поперечникѣ; цвѣты золотисто-желтые, краевые—язычковые плоскіе, не свернутые; сѣмянки 2 мм. дл., опушенные.

По кустарникамъ и откосамъ, очень рѣдко. Цвѣтетъ съ начала августа.

Можно различить слѣдующія формы:

α. latilobus Boiss.

Senecio erucifolius L. β. *arenarius* MB. Пет. Кр. II, стр. 29.

Листья съ широкими долями, верхушка листа ланцетная. Въ гербаріи Гофмана.

β. tenuifolius DC. Пет. Кр. II, стр. 29.—St. I, № 570 β.

Доли листьевъ очень узко-линейныя съ краями, внутрь свернутыми. Раменки близъ Воробьевыхъ горъ (К. П. и М.).—Рождественно на р. Нарѣ въ лѣсу и близъ д. Новой, Срп. у (гр. Е. Соллогубъ).



Senecio erucifolius β. *tenuifolius*.



Senecio Jacobaea.

978. **S. Jacobaea L.** Пет. Кр. II, стр. 29. — Бух. II, № 228. — Бух. I, № 217. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 276. — Kayf. II, № 405. — Цик., № 765. — Kayf. I, стр. 263. — Lind., p. 128. — Дв., № 794. — Макс., № 771. — Gold. C., p. 22. — Hoff. H., № 6793. — Mart., p. 147. — Hoff., № 2953. — St. II, p. 49. — St. I, № 569. — Pal., № 1865.

Senecio aquaticus Huds. var. *Mosquensis* Pinz. *) Pinz., p. 13.

*) *Senecio aquaticus* Huds. var. *Mosquensis* Pinz. есть типичное *Senecio Jacobaea* L., какъ это впервые указалъ R. von Uechtritz въ статьѣ: zur Flora Ungarn, помещенной въ Oesterr. bot. Zeitschr. 1871, pag. 189.

Растение многолетнее, голое или шерстисто-опушенное; стебель прямостоящий, 30—150 см., борозчатый, часто красноватый, простой или вѣтвистый, оканчивается вѣтвистымъ щитковиднымъ соцветіемъ; листья очень разнообразны: обыкновенно нижніе на длинныхъ черешкахъ, продолговатые, овальные или обратно-яйцевидные, неравно- и туповато-зубчатые; средніе—лировидные; остальные—сидячіе, перисто-раздѣльные, съ линейными или къ концу нѣсколько расширенными долями, надрѣзано-зубчатыми; основаніе листа полустеблеобъемлющее съ надрѣзано-зубчатыми ушками, рѣже все листья перисто-надрѣзные; чешуйки у основанія обертки (1—3) прижатые; обертка голая или почти голая, листочки ея килеватые, на концѣ очень мелко-рѣсничато-зубчатые; корзинки 10—22 мм. въ поперечникѣ; цвѣты золотисто-желтые, краевые—язычковые плоскіе, не свернутые; сѣмянки слегка борозчатые, у краевыхъ цвѣтовъ голыя, у остальныхъ—опушенныя.

По кустарникамъ, опушкамъ и по открытымъ мѣстамъ, часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до середины августа.

979. **S. fluviatilis Wallr.** Пет. Кр. II, стр. 30 и 31.

Senecio sarracenicus L. Бух. II, № 229.—Бух. I, № 218.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 275.—Кауф. II, № 406.—Мил., № 21.—Цин., № 768.—Кауф. I, стр. 264.—Дв., № 797.—Макс., № 773.—Mart., p. 147.—St. I, № 572.

Корневище ползучее, съ длинными побѣгами; стебель прямостоящій, 100—200 см., ребристый, простой, голый, только вѣточки щитковидно-метельчатого соцветія иногда коротко- и слегка железисто-опушенныя; листья голые, нѣсколько кожистые, продолговато-ланцетные или продолговатые, б. или м. длинно-заостренные, къ основанію суженные, сидячіе, по краю очень мелко рѣсничатые, остро-, иногда нѣсколько неравно-зубчатые; зубчики нѣсколько искривлены къ краю листа; чешуйки у основанія обертки (3—5) линейныя или линейно-ланцетныя, почти равны оберткѣ или короче ея; обертка цилиндрическо-колокольчатая, голая или коротко-железисто-опушенная, б. ч. изъ 9—12 листочковъ; цвѣты ярко-желтые, краевыхъ язычковыхъ цвѣтовъ б. ч. 6—8; сѣмянки 3—4 мм. дл., тонко-ребристыя, б. ч. голыя.



Senecio fluviatilis.

По берегамъ рѣкъ, часто. Цвѣтетъ съ конца іюля весь августъ.

980. **S. paludosus L.** Пет. Кр. II, стр. 31.—Пет., стр. 276.—Кауф. II, № 407.—Цин., № 767.—Кауф. I, стр. 264.—Дв., № 796.—Макс., № 772.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 147.—St. II, p. 49.—St. I, № 573.

Корневище ползучее, многолѣтнее; стебель 70—200 см., прямостоящій, ребристый, голый, снизу б. ч. голый, близъ верхушки шерстистый.



Senecio paludosus.

опушенный, оканчивается щитковиднымъ соцветіемъ; листья линейно-ланцетные, заостренные, по краямъ остро- и мелко-зубчатые; зубчики нѣсколько искривлены къ краю листа; верхніе листья сидячіе, полустеблеобъемлющіе; нижняя сторона листьевъ б. или м. густо-паутинисто-опушенная; чешуйки у основанія обвертки (8—10) линейныя, въ половину короче колокольчато-шаровидной обвертки или почти равны ей; листочки обвертки голые, линейно-ланцетные, съ темнымъ и опушеннымъ кончикомъ; корзинки 25—40 мм. въ поперечникѣ на цветоножкахъ съ чешуйками; ячейки на цвѣтоложѣ окаймлены пленчатой каймой, отчего цвѣтоложе кажется опушеннымъ; цвѣты золотисто-желтые, краевыхъ языковыхъ цвѣтовъ 10—

20; сѣмянки 3 мм. дл., голыя.

По берегамъ рѣкъ и по болотистымъ кустарникамъ, очень рѣдко. Цвѣтетъ съ конца іюля весь августъ.

У насъ только:

α. nudiusculus Ledb. Пет. Кр. II, стр. 32.

Листья съ нижней стороны почти голые. Находится въ гербаріи Макейновича.

407. *Echinops* L.

Соцветіе въ видѣ шаровидной головки безъ общей обвертки; каждый цвѣтокъ съ череничатой обверткой, у которой наружныя листочки раздѣлены на тонкія щетинки, средіе—лопатчатые, а внутренніе—длиньше остальныхъ, линейно-ланцетные, килеватые, длинно-заостренные и по краю щетинистые; цвѣты ворончато-трубчатые, обоюполые, 5-зубчатые; сѣмянки покрыты прижатыми щетинками, цилиндрическія, съ хохолкомъ изъ короткихъ щетинокъ, у основанія сросшихся.

981. *E. sphaerocéphalus* L. Пет. Кр. II, стр. 33.—Ф. Б., № 45. — Пет., стр. 180.—Кауф. II, № 409. — Цик., № 773. — Руур., стр. 86. — Кауф. I, стр. 265.

Корневище многолѣтнее, веретенообразное, вѣтвистое; стебель прямостоящій, до 2 м., б. ч. вѣтвистый, крупно-ребристый, войлочный и железисто-шерстистый, отчего слегка клейкій; листья перисто-раздѣльные или перисто-надрѣзные, съ долями къ основанію расширенными, часто треугольными, по краямъ нерѣдко выемчато-зубчатыми; зубцы оканчиваются твердыми колючками; верхняя сторона листьевъ темно-зеленая, коротко- и железисто-опушенная, нижняя—бѣло- или сѣровато-войлочная; нижніе листья сужены въ черешокъ, верхніе—сидячіе, стеблеобъемлющіе;

стебель и вѣтви оканчиваются одиночными шаровидными головками въ 3—7 см. въ поперечникѣ; цвѣты бѣлые или голубоватые съ железисто-опушенной трубкой; пыльники синіе; внутренніе листочки обертки на спинкѣ железистые, вдвое длиннѣе наружныхъ щетинокъ; сѣмянки 7—8 мм. дл.

По открытымъ мѣстамъ на пескѣ и известнякахъ, не часто. Цвѣтеть съ середины іюля всю осень. По береговой полосѣ р. Оки какъ въ Срп., такъ и въ Калм. уу.—У ст. Лопасня, М.-Ряз. ж. д., Срп. у. (П.).



Echinops sphaerocephalus.



Carlina vulgaris.

408. *Carlina* L.

Обертка блѣдчатая или широко-колокольчатая, черешчатая; наружные ея листочки травянистые, по краямъ колючіе, средіе—гребенчато-колючіе, съ длинной колючею верхушкой; внутренніе—линейно-продолговатые, пленчатые, лепестковидные, окрашенные; всѣ цвѣты въ корзинкѣ обоюдолюые ворончато-трубчатые, 5-зубчатые; цвѣтоложе плоское, покрыто пучками щетинокъ, сросшихся основаниями; сѣмянки продолговатые, опушенныя, съ хохолкомъ изъ перистыхъ волосковъ, сросшихся пучками.

982. *C. vulgaris* L. Пет. Кр. II, стр. 39. — Бух. II, № 237. — Бух. I, № 226. — Ф. О., № 6, p. 86. — Пет., стр., 163. — Кауф. II, № 423. — Цил., № 777. — Кауф. I, стр. 275. — Lind., p. 128. — Ann., C. III, № 228. — Др., № 771. — Макс., № 736. — Hoff. H., № 6553. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 143. — St. II, p. 48. — St. I, № 550. — Pal., № 1808.

Корень веретенообразный, двулѣтній; стебель 20—70 см., простой или въ верхней части вѣтвистый, при чемъ вѣтви длиннѣе верхушки стебля; корневые и нижніе стеблевые листья ланцетные или длинно-ланцетные, суженные въ черешокъ; остальные—узко-клиновидно-ланцетные, или почти ланцетные, сидячіе, нѣсколько расширенными основаніемъ, полустеблеобъемлющіе, сверху голые, снизу въ молодости шерстисто-войлочные, потомъ голые или почти голые, только вдоль жилокъ опушенные, по краямъ doubly-зубчатые; болѣе крупныя зубы разсѣчены почти до основанія на двѣ колючки, которыя часто расходятся въ раз-

ныя плоскости: между этими зубцами мелкіе зубчики, переходящіе въ тонкую, болѣе короткую колючку; на нижнихъ листьяхъ различіе зубцовъ сглаживается; корзинки 2,5 — 4,5 см. въ поперечникѣ, одиночныя; наружныя травянистыя листочки обертки значительно короче внутренняго пленчатого лепестковиднаго ряда листочковъ, походящихъ на краевые соломенно-желтые язычковые цвѣты, иногда они почти бѣлые и съ наружной стороны, особенно у основанія, красноватые; вѣнчикъ темно-пурпуровый; сѣмянки 2—2,5 мм. дл.

По кустарникамъ, опушкамъ, рѣже по лѣсамъ, любитъ песчаныя мѣста. Цвѣтеть съ половины іюля весь августъ.

Распадается на слѣдующія формы:

α. *typica* GB.

Верхніе листья яйцевидно-ланцетные или ланцетные, нижніе— продолговатые, до 8—9 см. дл., сужены въ короткій черешокъ; средніе листочки обертки бурые или темно-бурые съ свѣтлыми кончиками у колючекъ.

β. *intermedia* Schur.

Корневые и нижніе стеблевые листья очень длинныя, почти линейныя, до 15 см. дл., болѣе мягкіе и не столь колючіе.

γ. *nigréscens* Forman.

Средніе листочки обертки совершенно черныя, лоснящіеся.

983. *C. longifolia* Rchb.

Корень веретенообразный, двулѣтній; стебель б. ч. простой, рѣже слабо-вѣтвистый; все листья очень удлинено-ланцетные, иногда почти линейныя, нижніе—постепенно переходятъ въ длинный черешокъ, остальные—суженнымъ основаніемъ сидячіе, все—съ нижней стороны густо-шерстисто-войлочные, съ верхней—голыя или почти голыя; все листья по краямъ нѣсколько неровно-рѣсничато-колючіе, у болѣе крупныхъ колючекъ основаніе расширено въ маленькій простой зубчикъ; корзинки 3—5 см. въ поперечникѣ; верхніе прицвѣтныя листья превышаютъ корзинку; наружныя травянистыя листочки обертки значительно длиннѣе внутренняго пленчатого лепестковиднаго ряда листочковъ; сѣмянки 4 мм. дл.



Carlina longifolia.

Пока только одинъ экземпляръ въ гербаріи А. П. Петуникова, найденный близъ Петровскаго на р. Москвѣ. *)

*) Экземпляръ, хранящійся въ гербаріи А. П. Петуникова, нѣсколько ненормальный: верхушечная корзинка была сломана и развились только двѣ боковыя вѣтки; все же вышеприведенныя признаки подходятъ къ этому экземпляру. Есть еще одинъ признакъ для

409. *Árctium* L.

Корзинки почти шаровидныя; обвертка черешчатая, листочки ея оканчиваются крючковой колпачкой; всё цвѣты обоюднояе, колокольчато-трубчатые, 5-надрѣзные; тычиночныя нити голыя; пыльники далеко выдаются изъ вѣнчика; цветолюже густо покрыто щетинками; сѣмянки продолговато-обратно-яйцевидныя, слегка сплюснутыя, вдоль ребристыя, съ легкими поперечными морщинками и съ легко опадающимъ хохолкомъ изъ многорядныхъ зазубренныхъ щетинокъ.

1. Внутренніе листочки обвертки окрашенные, широко-линейно-ланцетные, быстро переходятъ въ короткое прямое остріе, остальные листочки оканчиваются крючкомъ. *A. tomentosum* Mill.

Всѣ листочки обвертки оканчиваются крючкомъ. 2.

2. Корзинки 12 — 23 мм. въ поперечникѣ, собраны узкою кистью или узкою метелкою. *A. minus* (Hill) Bernh.

Корзинки 30—35 мм. въ поперечникѣ, собраны въ щитковидное соцвѣтіе, рѣдко на нижнихъ вѣтвяхъ кистью.

A. majus (Gaertn.) Bernh.

984. *A. május* (Gaertn.) Bernh.

Arctium Lapp. L. Gold. C., p. 22.—Mart., p. 139.—Hoff., № 306.—St. II, p. 47.—St. I, № 537.—Pal., № 1785.

Arctium Lapp. L. α. majus. Gold. Sp., p. 135.

Arctium majus Schkuhr. Дв., № 754.

Lappa major Gaertn. Пет. Кр. II, стр. 39.—Ф. Б., № 44. — F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 209.—Кауф. II, № 420.—Цин., № 816.—Кауф. I, стр. 274.—Lind., p. 130.

Корень двулѣтній, толстый, веретенообразный, мясистый; стебель до 1.5 м., вѣтвистый, ребристый, почти голый или слегка шерстистый, а близъ корзинокъ нѣсколько железистый; листья съ верхней стороны голые, съ нижней—покрыты очень тонкимъ сѣрымъ войлокомъ, по краямъ рѣдко- и не крупно-городковые; нижніе листья очень крупные на длин-

различіи этихъ двухъ видовъ, на который указываетъ Hallier Koch (третье изданіе) и G. Beck, это жилкованіе листьевъ. У *C. longifolia* Rehb. должны быть, кромѣ срединной, еще двѣ боковыя почти параллельныя жилки, что у *C. vulgaris* L. эти авторы отрицаютъ; Reichenbach, впервые описавшій *C. longifolia*, этого признака не приводитъ. У нашихъ *C. vulgaris* L. на среднихъ и верхнихъ листьяхъ можно различить, кромѣ срединной, двѣ боковыя жилки, отходящія у основанія листа подъ острымъ угломъ и исчезающія приблизительно близъ нижней трети листа; у этого мѣста отходить, тоже подъ острымъ угломъ, отъ срединной другая пара боковыхъ жилокъ и доходить до верхушки, въ верхней части листа почти параллельно; у нижнихъ листьевъ, особенно, когда они почти линейные, жилки идутъ почти параллельно, и тогда этотъ признакъ только сбивается. Въ Имп. Бот. Саду въ С.-Петербургѣ въ русскомъ гербаріи находятся *C. longifolia* Rehb. съ этикетками *C. vulgaris* изъ Орловской (Погоанко), Саратовской (Григорьевъ) и Уфимской губ. (А. Антоновъ) и еще одинъ экземпляръ очень типичный безъ обозначенія мѣстопоходженія; большинство экземпляровъ, помѣченное какъ *C. vulgaris* L. var. *longifolia* Rehb., относится къ *C. vulgaris* L. var. *intermedia* Schur.

ныхъ плотныхъ ребристыхъ черешкахъ, округло-сердцевидные; верхніе — на болѣе короткихъ черешкахъ, округло-йцевидные или яйцевидные; корзинки крупныя, 30 — 35 мм. въ поперечникѣ, въ щитковидномъ соцветіи, иногда на нижнихъ вѣтвяхъ корзинки собраны почти кистью; обертка голая, зеленая, лоснящаяся, всѣ ея листочки оканчиваются крючкомъ, *) шиловидные, иногда внутренніе слабо-паутинистые; вѣничекъ темно-малиновый, быстро переходитъ въ трубку; сѣмянки 6—7 мм. дл., темно-бурья, сплюснутыя, слабо-пятнистыя и въ верхней части нѣсколько морщинистыя.



Arctium majus.

По берегамъ рѣкъ и ручьевъ, по безплоднымъ мѣстамъ и по лѣсамъ, иногда близъ жилья, рѣдко. Цвѣтетъ съ половины іюля до половины августа. Кунцово (Ассъ).—Ваулино, Мож. у. (Ф. О.).—С. Степаньково, Дмит. у. (Фишеръ фонъ-Вальдгеймъ).—Ст. Пески, М.-Ряз. ж. д., Кзм. у. (Х.).—Раменское, Брн. у; близъ платформы Соколово Щелковской вѣтви, Бгр. у.; близъ Борисова, Срп. у.; островъ на Окѣ противъ Бочманова, Кзм. у. (С.).—Невфрово, Кзм. у. (К.).—Клычево, Кзм. у. (Г.).—Бѣлые Колодези, Кзм. у. (Н.).—Между Бѣлыми Колодезями и Горами, Кзм. у. (А. Флеровъ).

985. *A. minus* (Hill) Bernh. Дв., № 755. — Маке., № 750. — Hoff. Н., № 6455. — Gold. С., p. 22.—Gold. Sp., p. 135.

Arctium Lappa L. *minus*. Gold. Sp., p. 135.—Mart., p. 139.

Lappa minor DC. Бух. II, стр. 27. — F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 209.—Кауф. II, № 421.—Цин., № 817.—Кауф. I, стр. 274.—Lind., p. 130.—Ann., C. V, № 34.

Lappa officinalis All. Пет. Кр. II, стр. 39.

Корень двулѣтний, веретенообразный, деревянистый; стебель 60 — 100 см., прямостоящій, вѣтвистый, почти деревянистый, ребристый, опушенный; корневые и нижніе стеблевые листья на длинныхъ полыхъ ребристыхъ черешкахъ, сердцевидно-йцевидные, тупо- и слегка выемчато-городковые; остальные—на короткихъ черешкахъ, яйцевидные, просто- или doubly-тупо-городковые; всѣ сверху голые, снизу б. или м. густо сѣро-войлочные; корзинки 12 — 23 мм. въ поперечникѣ, на короткихъ ножкахъ, железисто-опушенныхъ, въ пазухахъ верхнихъ мелкихъ листьевъ собраны длинной кистью или въ пазухахъ листьевъ мелкія кисти образуютъ узкую метелку; листочки обертки шиловидные, до половины по краямъ очень мелко пильчатые, голые или едва паутинистые, всѣ на

*) У экземпляра, найденнаго мною близъ Соколова, листочки обертки внутренняго ряда не оканчивались крючкомъ, а были только постепенно заострены, въ остальныхъ же признакахъ вполне подходили къ типичному *A. majus*. Это уклонение наводитъ на мысль, не примѣшено ли въ данномъ экземплярѣ до нѣкоторой степени *A. tomentosum* Mill.

концы загнуты крючкомъ, обыкновенно наружные и средние—зеленые, внутренние — красноватые; *) вѣтчикъ розовато-красный или розовый; сѣмянки 5—7 мм. дл., слегка 5-ребристы, темно-бурыя, съ бурыми пятнами.

По пустырямъ, около дорогъ и близъ жилья, не рѣдко. Цвѣтеть съ конца іюня до середины августа; плоды съ середины августа.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

2. pubescens Boreau.

Корзинки нѣсколько крупнѣе—25 мм. въ поперечникѣ, на длинныхъ ножкахъ до 4 см., б. ч. одиночныя, образуютъ узкую кисть, рѣже у основанія кисти парныя корзинки на болѣе длинной ножкѣ; обертка болѣе паутинистая; все растеніе гуще опушено, особенно ножки. У ст. Серпуховъ (II.).



Arctium minus.



Arctium tomentosum.

986. A. tomentosum Mill. Дв., № 756.

Arctium Bardana Willd. Hoff. H., № 6453.—Gold. C., p. 22.—Gold. Sp., p. 135.—Mart., p. 140.

Lappa tomentosa Lam. Пер. Кр. II, стр. 39.—Бух. II, № 236.—Бух. I, № 225.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 209.—Кауф. II, № 422.—Цин., № 820.—Кауф. I, стр. 274.—Lind., p. 130.—Макс., № 751.

Корень двулѣтній, веретенообразный; стебель до 1,5 м., прямо-стоящій, вѣтвистый, ребристый, слегка войлочнo-шерстистый или почти голый; листья сверху голые, снизу тонко-бѣло- или сѣро-войлочные, по краямъ мелко- и неровно-городковые; нижние—на длинныхъ плотныхъ ребристыхъ черешкахъ, яйцевидно-сердцевидные; остальные—на болѣе короткихъ черешкахъ, яйцевидные или яйцевидно-продолговатые; корзинки 12—25 мм. въ поперечникѣ, клубочками на длинныхъ б. или м.

*) Въ Пушкинѣ мною найдено растеніе, у котораго всѣ листочки обертки были буровато-красныя, такъ что вся обертка была буро-красная.

железистыхъ цвѣтоносахъ собраны щитковиднымъ соцветіемъ, рѣже корзинки одиночныя на длинныхъ ножкахъ, тоже въ щитковидномъ соцветіи; обертка б. ч. густо-паутинистая, *) листочки ея по краямъ до самаго конца очень мелко пильчатые, нижніе и средніе—линейно-ланцетные, оканчиваются крючкомъ, листочки же внутренняго ряда почти равны вѣичику, окрашенные, широко-линейно-ланцетные, пленчатые, быстро сужены въ остріе безъ крючка; вѣичику темно-малиновый, рѣдко бѣлый, снаружи железистый, быстро суженъ въ трубку; сѣмянки 5—6 мм. дл., гранистыя, попереку слегка морщинистыя съ темными пятнышками.

По пустырямъ, около заборовъ, по открытымъ мѣстамъ и по берегамъ рѣкъ и ручьевъ, очень часто. Цвѣтетъ съ начала іюня до поздней осени.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

а. *glaberrima* Fries.

Листочки обертки голые или очень слабо-паутинистые, б. ч. окрашенные, отчего обертка темно-вишневая. Въ тѣнистомъ мѣстѣ по берегу р. Учи близъ Пушкина (С.).—Лужки, Срп. у. (Сюз.).

410. *Cárduus L.*

Обертка черепчатая, листочки ея оканчиваются колючкой, зеленые, исключая внутреннихъ, окрашенныхъ; всѣ цвѣты ворончато-трубчатые, 5-надрѣзные, обоюбые, надрѣзы ихъ узко-линейные; тычиночныя нити опушенные; столбикъ оканчивается двумя короткими рыльцами; цвѣтолюже густо покрыто щетинками; сѣмянки обратно-яйцевидныя, слегка сплюснутыя, иногда слабо-4-гранныя, голыя, съ легко опадающимъ хохолкомъ многорядныхъ, зазубренныхъ волосковъ, соединенныхъ основаніями въ кольцо.

1. Листья съ обѣихъ сторонъ голые или съ нижней стороны только вдоль жилокъ опушенные. 2.

Листья съ нижней стороны бѣло- или сѣро-шерстисто-войлочные, иногда только верхніе. 4.

2. Корзинки поникающія, крупныя 30—60 мм. дл.; нижніе и средніе листочки обертки посредніе нѣсколько перетянуты и отогнуты.

C. nutans L.

Корзинки не поникающія, 15—25 мм. дл., рѣдко до 30 мм. дл.; всѣ листочки обертки линейно-ланцетные или линейные, не перетянутые. 3.

3. Корзинки 15—25 мм. дл., по 2—3, рѣже по одной; листья перисто-лопастные, рѣже почти перисто-раздѣльные. *C. acanthoides L.*

*) По берегу р. Учи, близъ Пушкина, въ тѣни, мною найдено *a. glaberrima* Fries и всѣ переходы къ типичной формѣ; кромѣ того нѣкоторые экземпляры бросались въ глаза очень мелкими корзинками—не крупнѣе 15 мм. въ поперечникъ,—но были и экземпляры, на которыхъ корзинки были различной величины.

Корзинки около 30 мм. дл., одиночные, на длинныхъ или короткихъ ножкахъ; листья глубоко-перисто-раздѣльные, съ вытянутыми лопастями.

C. crispus × *nutans*.

4. Корзинки 15—20 мм. дл.; листочки обертки линейно-ланцетные, не шире 1 мм., нижніе иногда нѣсколько отогнуты.

C. crispus L.

Корзинки 25—30 мм. дл.; листочки обертки узко-ланцетные, около 2 мм. ш., нижніе—перетянуты по срединѣ и отогнуты внизъ.

C. polyacanthos Schleich.

987. *C. acanthoides* L. Пет. Кр. II, стр. 38.—Кауф. II, № 418.—Цинк., № 799.—Кауф. I, стр. 272.—Дв., № 761.—Макс., № 745.—Mart., p. 140.—Hoffm., № 677.—St. II, p. 48.—St. I, № 543.—Pal., № 1791.

Корень двулѣтний, веретенообразный, вѣтвистый; стебель до 150 см., примостоящій, вѣтвистый, упрямый, б. ч. голый, ребристый, крылатый отъ приобъгающихъ листьевъ; крылья зубчато-лопастныя, волнистыя, сильно колючія; листья нѣсколько кожистые, голые или съ нижней стороны только вдоль жилокъ нѣсколько опушенные, въ очертаніи продолговато-ланцетные, перисто-лопастные или почти перисто-раздѣльные; лопасти ромбическія, пальчато-2—5-лопастныя, по краямъ колюче-рѣсничатыя, каждая лопасть оканчивается длинной, жесткой желтоватой колючкой; нижніе листья сужены въ черешокъ, остальные сидячіе; корзинки 15—25 мм. дл., на очень короткихъ крылатыхъ ножкахъ, одиночныя и по 2—3, часто скучены клубочками; листочки обертки линейно-ланцетные, шло-видные, заостренныя въ колючку, наружныя нѣсколько отогнутыя; вѣнчикъ яркомалиновый, рѣдко бѣлый; сѣмянки 3—3,5 мм. дл., очень мелко-точечныя.



Carduus acanthoides.

По пустырямъ, близъ жилья и иногда на огородахъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ половины іюля весь августъ. Городъ Серпуховъ; близъ г. Коломны и откосъ у ж.-д. моста черезъ р. Оку, Кзм. у. (П.).—Каропчеево, Кзм. у. (А. Флеровъ).—Мытищи—пустырь близъ дачи Челюковыхъ; близъ ст. Люберцы, М.-Ряз. ж. д.; Бочманово, Протопоново, Кзм. у. (С.).—Берегъ р. Пехорки близъ с. Леонова (Куль.).

988. *C. crispus* L. Sch. VI, № 1670.—Бух. II, № 235 a. b. c.—Бух. I, № 224.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 156.—Кауф. II, № 417.—Цинк., № 802.—Кауф. I, стр. 272.—Lind., p. 130.—Дв., № 762.—Макс., № 746.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 140.—St. II, p. 48.—St. I, 544.

Корневище двулѣтнее, веретенообразное; стебель до 2 м., б. ч. вѣтвистый, слегка паутинисто-опушенный, ребристый и крылатый отъ

низобгающих листьев: крылья выемчато-зубчатые, колючия; листья с верхней стороны голые, ярко-зеленые, с нижней — сперва бѣло-войлочные,



Carduus crispus.

потомъ сѣро- или бѣло-шерстисто-войлочные; нижніе — сужены въ черешокъ, эллиптическіе, б. ч. перисто-надрѣзные; стеблевые — сидячіе, продолговатые, перисто-лопастные или перисто-выемчато-зубчатые и по краямъ колюче-рѣсничатые; каждый зубчикъ оканчивается жесткой колючкой; корзинки 15—20 мм. дл., на короткихъ ножкахъ въ малоцвѣтковой конечной кисти или по 2—5 въ клубочкахъ; листочки обертки линейно-ланцетные, не шире 1 мм., заостренные въ колючку, голые или слегка паутинистые, нижніе — отстоящіе, но не перегнутые; вѣнчикъ темно-малиновый, рѣдко бѣлый; сѣмянки

мелко-бугорчато-морщинистыя, 3 мм. дл.

По берегамъ рѣкъ и ручьевъ, близъ жилья и по тѣнистымъ мѣстамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ середины іюня до поздней осени.

Распадается на слѣдующія формы:

α. **subintegrifolius** Schatz.

Верхніе листья слегка зубчато-лопастные; лопасти зубчатые.

β. **sinuato-dentatus** Schatz.

Стеблевые листья перисто-лопастные; лопасти зубчатые.

γ. **pinnatifidus** Schatz.

Всѣ листья глубоко-перисто-надрѣзные; лопасти крупно-3—5-зубчатые; зубы б. ч. вытянуто-треугольные. Воробьевы горы; берегъ р. Оки близъ Бочманова, Кзм. у. (II.).

989. **C. nutans** L. Пет. Кр. II, стр. 38. — Пет., стр. 156. — Кауф. II, № 416. — Цин., № 798. — Кауф. I, стр. 271. — Lind., p. 130. — Ann., C. V, № 33. — Дв., № 760. — Макс., № 744. — Mart., p. 140. — Hoff., № 692. — St. II, p. 48. — St. I, № 542.

Carduus nutans L. α. *longipes* Kauffm. Пет. Кр. II, стр. 38. — Кауф. II, стр. 278.

Carduus nutans L. α. *longepedunculatus* Kauffm. Кауф. I, стр. 271.

Carduus nutans L. β. *strictus* Kauffm. Пет. Кр. II, стр. 38. — Кауф. II, стр. 278. — Кауф. I, стр. 271.

Корень двулѣтний, веретенообразный; растеніе очень колючее; стебель 30—125 см., простой или вѣтвистый, ребристый, шерстистый или съ верхушкой и особенно близъ корзиночекъ бѣло-войлочный; листья нѣсколько кожистые, голые или снизу вдоль жилки слегка шерстистые, продолговато-ланцетные, перисто-выемчато-зубчатые или перисто-лопастные; лопасти от 3—5 глубокихъ зубцахъ или надрѣзахъ; каждый зу-

бецъ оканчивается длинной жесткой и очень острой колючкой; край щетинисто-колючий; нижніе листья сужены въ черешокъ, остальные— сидячіе, длинно- и широко-ланцетные, такъ что стебель крылатый; крылья зубчато-лопастныя и очень колючія; корзинки поникающія, одиночныя, почти шаровидныя, 3—6 см., на 6. или м. длинныхъ безлистныхъ цветоносахъ; листочки обертки голые широко-ланцетные, клиноватые, переходя въ длинную колючку, приблизительно посрединѣ слегка перетянутые и въ этомъ мѣстѣ отогнутые; внутренніе — уже и часто покрашенные; вѣнчикъ ярко-малиновый, рѣдко бѣлый, съ приятнымъ запахомъ; сѣмянки 3—4 мм. дл. *)

По пустырямъ, близъ дорогъ и по открытымъ мѣстамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ середины іюня до поздней осени.



Carduus nutans.



Carduus polyacanthos.

× **C. polyacanthos Schleich.** = *C. crispus* × *nutans*.

Carduus nutans L. γ. *crispo-nutans* Koch. Пет. Кр. II, стр. 38. — Кауф. II, стр. 278. — Цин., стр. 254. — Кауф. I, стр. 272.

Стебель прямостоящій до 1 м., вѣтвистый; верхніе листья съ нижней стороны сѣровато-тонко-войлочные, все эллиптическіе, перисто-лопастные; лопасти слегка лопастныя или крупно-зубчатыя; каждый зубецъ оканчивается жесткой колючкой; вѣтви крылатыя, какъ и стебель до самыхъ корзинокъ съ листьями; корзинки 2,5—3 см. дл., то одиночныя, то по нѣскольку; листочки обертки узко-ланцетные, около 2 мм. ш., постепенно сужены въ колючку, нижніе—отогнутые. Отличается

*) П. Кауфманъ различаетъ двѣ формы: α. *longepedunculatus*, при чемъ во второмъ изданіи почему-то α. *longipes*, и β. *strictus*. Различіе между формами сводится на относительную длину цветоносовъ, относительное количество колючекъ и на болѣе разрывные листья у β; но первый признакъ далеко не стоекъ: можно наблюдать длинныя и очень короткіе цветоносы на одномъ и томъ же экземплярѣ; что же касается остальныхъ признаковъ, то въ большихъ группахъ этого растенія, такъ часто встрѣчающагося по пустырямъ, можно найти все переходы и признаки той и другой формы на одномъ растеніи.

отъ *C. nutans* L. войлочнымъ опушеніемъ нижней стороны листьевъ; отъ *C. crispus* L.—болѣе крупными корзинками и болѣе широкими отогнутыми листочками обертки. *)

Найдено близъ Симонова монастыря между *C. crispus* L. и *C. nutans* L. (K.).

4II. *Cirsium* Hall.

Сходенъ съ *Carduus*, но листочки обертки часто оканчиваются мягкой колочкой и на спинкѣ съ смолистой полоской; волоски въ холкѣ перистые.

1. Листья съ верхней стороны покрыты жесткими и короткими щетинками. 2.

Листья съ верхней стороны голые или опушенные, но щетинокъ нѣтъ, края же часто щетинисто-рѣсничатые. 4.

2. Листья б. или м. длинно-низбогающіе, отчего стебель часто крылатый. *C. lanceolatum* (L.) Hill.

Листья не низбогающіе, но только стеблеобъемлющіе; стебель ребристый. 3.

3. Листочки обертки густо-паутинистые, нижніе и средніе подъ колочкой лопатчато-ромбическо-расширенные; корзинки 6—8 см.

C. eriophorum Scop.

Листочки обертки голые, въ удлинено-ланцетные, не расширенные; корзинки около 3 см. *C. ciliatum* MB.

4. Корзинки окутаны яйцевидными, заостренными, свѣтло-желтовато-зелеными прицвѣтными листьями; цвѣты желтовато-бѣлые. 5.

Корзинки, хотя и бывають съ прицвѣтными листьями, но не окутаны ими; цвѣты малиновые, очень рѣдко бѣлые или желтоватые. 6.

5. Стеблевые листья стеблеобъемлющіе, сидячіе, но не низбогающіе.

C. oleraceum (L.) Scop.

Стеблевые листья низбогающіе по стеблю, иногда мало, но явственно замѣтно. *C. oleraceum* × *palustre*.

6. Цвѣты однополые, лиловато-розовые.

C. arvense (L.) Scop.

Цвѣты обоеполые, малиновые, рѣдко бѣлые или желтоватые. 7.

*) Мною найдена два раза эта помѣсь и тоже между родителями по берегу р. Работни, близъ Б. Мытищъ, но въ разное время. Оба экземпляра нѣсколько отличались отъ приведеннаго выше описанія. У одного листья походили на описанные, но корзинки 3 см. дл., одиночныя на длинныхъ крылатыхъ ножкахъ; листочки обертки очень узкіе, не шире 1 мм; у другого корзинки такой же величины, съ такими же листочками обертки, но ножки очень короткія, листья же съ нижней стороны почти голые, только вдоль жилокъ нѣсколько опушенные, сильно вытянутые, такъ что верхніе почти линейные, съ далеко разставленными короткими лопастями, а нижніе почти перисто-раздѣльные, съ сильно удлинненными лопастями, которыя, въ свою очередь, разставленно-лопастныя и зубчатые.

7. Стеблевые листья стеблеобъемлющие, но не низбегающие.

C. heterophyllum (L.) Hill.

Стеблевые листья б. или м. глубоко низбегают по стеблю. 8.

8. Стеблевые листья цельнокрайние, по краям щетинисто-рѣсничатые, рѣже слегка зубчатые. 9.

Стеблевые листья глубоко-перисто-лопастные или раздѣльные. 10.

9. Верхняя и нижняя стороны листьевъ почти одинаковаго цвѣта покрыты рѣдкими курчавыми волосками, нижняя—болѣе густо.

C. panonicum Gaud.

Верхняя сторона листьевъ темно-зеленая, б. ч. голая, нижняя—тонко-бѣло-войлочная.

C. heterophyllum \times *palustre*.

10. Стеблевые листья низбегаютъ почти до слѣдующаго листа, отчего стебель крылатый.

C. palustre (L.) Scop.

Стеблевые листья низбегаютъ недалеко по стеблю; стебель только ребристый, но не крылатый. 11.

11. Листья съ нижней стороны покрыты тонкимъ бѣлымъ войлокомъ, особенно верхніе.

C. Wankelii Reichardt.

Листья съ нижней стороны голые или, хотя и бываютъ опушенные, но не бѣлымъ войлокомъ.

C. oleraceum \times *palustre*.

990 *C. lanceolatum* (L.) Hill.

Cirsium lanceolatum Scop. Бух. II, № 232.—Бух. I, № 221.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 168.—Кауф. II, № 410.—Цин., № 804.—Кауф. I, стр. 267.—Lind., p. 130.—Дв., № 765.—Макс., № 738.

Cnicus lanceolatus L. Hoff. II., № 6519.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 141.

Carduus lanceolatus Hill. St. II, p. 48.—St. I, № 541.—Pal., № 1790.

Корень двулѣтній, веретенообразный, вѣтвистый; стебель прямо-стоящій, до 2 м., шерстисто-опушенный, ребристый, б. ч. вѣтвистый, сплошь или частью крылатый отъ низбегающихъ листьевъ; крылья выемчато-лопастныя, сильно колючія; листья съ верхней стороны б. или м. густо покрыты прижатыми щетинками, съ нижней—шерстисто-войлочные, рѣже почти голые, перисто-раздѣльные или перисто-лопастные; лопасти 2—3-лопастныя, каждая маленькая лопасть оканчивается жесткой лоснящейся колючкой; нижніе листья сужены въ черешокъ, остальные—сидячіе, жесткіе и очень колючіе; корзинки 3—5 см. дл. по 1—3 на концѣ стебля и вѣтвей, почти сидячіе или на короткихъ ножкахъ, съ прицвѣтными листьями у основанія; листочки обертки линейно-ланцетные, жесткіе, колючіе, клиеватые, слегка шерстисто-паутиново-опушенные, рѣже почти голые, внутренніе не колючіе, мягкіе;



Cirsium lanceolatum.

вѣшникъ малиновый, рѣдко бѣлый; сѣмянки 3,5—4 мм. дл., гладкія, слегка продольно-пятнистыя. *)

По кустарникамъ и лѣсамъ, по пустырямъ и близъ жилья, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до поздней осени.

C. ciliatum MB.

Найдено было, только разъ д-ромъ Вιάль близъ Голицынской больницы въ Москвѣ, но, какъ показалъ А. Н. Петуниковъ, было опредѣлено неправильно, и находящееся въ гербаріи д-ра Вιάль растение, несомнѣнно *C. serrulatum* MB., а не *C. ciliatum* MB.; какъ то, такъ и другое растение могутъ быть только занесенными, при чемъ *C. serrulatum* MB. встрѣчается только въ южныхъ губерніяхъ и послѣ д-ра Вιάль никѣмъ болѣе не найдено въ Московской губерніи.

991. C. eriophorum Scop.

Растеніе двулѣтнее съ веретенообразнымъ вѣтвистымъ корнемъ; стебель прямостоящій до 2 м., толстый, б. ч. вѣтвистый, ребристый, слегка шерстистый; листья глубоко-перисто-раздѣльные, съ верхней стороны покрыты прижатыми щетинками, съ нижней—тонкимъ шерстистымъ войлокомъ; доли у нижнихъ листьевъ пальчато-3-раздѣльныя, у остальныхъ — раздѣлены на 2 доли; послѣднія линейныя, по краямъ щетинисто-рѣсничатыя, оканчиваются жесткой желтой колючкой; нижніе листья на черешкахъ сравнительно мягкіе, стеблевые — жесткіе, торчащіе, сильно колючіе, сидячіе, стеблеобъемлющіе, но не низбегающіе; корзинки шаровидныя, 6 — 8 см., одиночныя, верхушечныя и на концѣ вѣтвей, рѣже 2 — 3, но тогда одна изъ нихъ крупнѣе остальныхъ; у основанія обертки прицвѣтные листья; листочки обертки узколанцетные, почти шиловидные, оканчиваются жесткой желтой колючкой, у нижнихъ листочковъ отогнутой; вся обертка, исключая колючекъ, б. или м. густо покрыта паутинистымъ войлокомъ; вѣшникъ темно-малиновый; сѣмянки 6 мм. дл.

Цвѣтетъ съ середины іюля весь августъ.

У насъ только:

α. platyonychium Wallr.

Cirsium spathulatum Gaud. Her. Kp. II, стр. 33 и 34.

Cirsium eriophorum Scop. Her. Отч., стр. 13.—Пет., стр. 169.—Кауф. II, № 411.—Гор., № 50.—Цин., № 805.—Кауф. I, стр. 267.—Макс., № 739.

Cnicus eriophorum Roth. Дв., № 766.—Mart., p. 141.—Hoff., № 946.

Carduus eriophorus L. St. II, p. 48.—St. I, № 546.

Листочки обертки подъ колючкой лопатчато-ромбическо-расширенные, красно-бурые, верхніе края ихъ зубчато-рѣсничатые. Въ гербаріи

*) Очень измѣняивое растеніе въ своихъ мелкихъ признакахъ, хотя общій обликъ довольно постояенъ. Въ отъясниыхъ мѣстахъ темно-зеленое, листья мягче и менѣе густо покрыты щетинистыми волосками; на открытихъ мѣстахъ сѣро-зеленое и очень густо опушено щетинистыми волосками; вторичныя лопасти листьевъ бываютъ то почти треугольныя, то длинно-вытянутыя; обертка то почти голая, то довольно густо паутинисто-опушенная.

Максимовича. — Близ с. Озеры, Кал. у. (Г.). — Близ Бочманова, Бѣлые Колодези и на ж.-д. насыпи у моста через р. Оку, Кал. у.; близ Дракина, Срп. у. (П.). — Невѣрово, Кал. у. (П. и С.). — Протопоново, Кал. у.; каменоломни по берегу р. Москвы близ Каменной Тяжины, Брл. у. (С.). — Рождествено на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ). — По известняковому берегу р. Мочи, близ д. Жаркова, Пдл. у. (Х.).



Cirsium eriophorum α. *platynychium*.



Cirsium oleraceum.

- 992 **C. oleraceum (L.) Scop.** Бух. II, № 230. — Бух. I, № 219. — Ф. О., № 6, p. 86. — Пет., стр. 168. — Кауф. II, № 413. — Цип., № 810. — Кауф. I, стр. 268. — Lind., p. 130. — Ann., C. I, № 31. — Макс., № 741.

Cnicus oleraceus L. Дв., № 770. — Hoff. II, № 6528. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 142. — Hoff., № 949. — St. II, p. 48. — St. I, № 549.

Корневище многолѣтнее, цилиндрическое, узловатое съ тонкими корнями; стебель до 2 м., прямостоящій, ребристый, простой, рѣже вверху слегка вѣтвистый, голый или слабо опушенный, близ корзинок паутинистый; корневые листья на длинныхъ черешкахъ, свѣтло-зеленые, въ очертаніи эллиптическіе или яйцевидные, глубоко-перисто-надрѣзные съ эллиптическими или ланцетными долями, по краямъ мелко-неравнозубчатые и неравно-зетинисто-рѣбчатые; въ верхней половинѣ стебля листья сидячіе съ расширеннымъ ушковатымъ, стеблеобъемлющимъ основаниемъ, по много мельче корневыхъ; верхніе—только зубчатые; корзинки 2—4 см. дл., на короткихъ ножкахъ, собраны на концѣ стебли и вѣтвей, окутаны яйцевидными заостренными блѣдно-желтовато-зелеными прицветными листьями, часто превышающими корзинки; листочки обвертки ланцетные или линейно-ланцетные, длинно-заостренные, мягкіе, нижніе иногда вытянуты въ мягкую колочку, голые или слегка паутинистые; вѣнчикъ бѣлый или желтовато-бѣлый; часто пыльники и рыльца слегка фіолетовые; сѣмянки 4 мм. дл., буроватыя.

По болотистымъ кустарникамъ и по берегамъ рѣкъ и ручьевъ, очень часто. Цвѣтеть съ конца іюля весь августъ.

× *C. oleraceum* × *palustre*.

Cirsium palustre-oleraceum Naeg. Сыр. Отч. II, стр. 19.—Пет. Кр. II, стр. 37.



Найденный мною въ четырехъ мѣстахъ помѣси этихъ двухъ видовъ представляли различные облики, приближаясь то къ одному, то къ дру-



Cirsium oleraceum × *palustre*.

гому, но у всѣхъ листья были нѣсколько низбегающіе и болѣе колючіе, чѣмъ у *C. oleraceum* Scop.; цвѣты же желтоватые или почти бѣлые, исключая одного экземпляра, у котораго цвѣты были розоватые; листья то почти совершенно голые, то съ нижней стороны опушенные, по формѣ то ближе къ *C. palustre*, то къ *C. oleraceum*, при чемъ на одномъ экземплярѣ верхніе стеблевые листья были нераздѣльные, а только крупнозубчатые; корзинки то многочисленныя, скученныя на короткихъ ножкахъ, обвернутыя продолговато-ланцетными прицвѣтными листьями, то нѣсколько раз-

ставленныя на болѣе длинныхъ ножкахъ, съ прицвѣтными листьями ланцетными, болѣе колючими и не превыщающими корзинокъ. Подвести къ *C. lacteum* Schleich. или къ *C. hybridum* Koch найденные мною экземпляры было нельзя: не подходили какіе-либо признаки, но усомниться въ томъ, что это были помѣси между *C. oleraceum* и *C. palustre*, тоже нельзя, вслѣдствіе ясно выраженныхъ признаковъ того и другого вида въ одномъ и томъ же экземплярѣ.



Cirsium oleraceum × *palustre*.

Окраина болота у селца Богородскаго (Н. и С.).—Мытищи.—Лосинный островъ: по болоту у ручья между р. Ступню и Передѣлками. Вен. у. (С.).—Берегъ р. Пехорки между Кучинымъ и Леоновымъ (Куль).

993. *C. heterophyllum* (L.) Hill.

Cirsium heterophyllum All. Пет. Кр. II, стр. 35. — Пет., стр. 168. — Цин., № 812. — Lind., p. 130. — Ann., C. IV, № 20. — Макс., № 742.

Cirsium helenioides All. Бух. II, № 231. — Бух. I, № 220. — F. O., № 6, p. 86. — Kayф. II, № 414. — Kayф. I, стр. 269.

Cnicus heterophyllus Willd. Hoff. H., № 6516. — Gold. C., p. 22.

Carduus helenioides L. St. II, p. 48. — Pal., № 1800.

Carduus heterophyllus L. St. I, № 547.

Корневище многолетнее, бурое узловатое съ побѣгами; стебель 10 — 125 см., прямостоящій, ребристый, слегка шерстистый или бѣло-войлочный, простой или въ верхней части вѣтвистый; листья съ верхней стороны голые, темно- или свѣтло-зеленые, съ нижней — тонко-бѣло- или сѣро-войлочные, по краямъ колюче-рѣсничатые, очень разнообразныя; обыкновенно корневые и нижне-стеблевые — яйцевидныя, эллиптическія или ланцетныя, суженныя въ б. или м. длинный крылатый черешокъ, заостренныя, цѣльно-крайнія или слегка зубчатые; среднія — продолговатыя съ расширеннымъ сидячимъ стеблеобъемлющимъ основаніемъ, въ верхней половинѣ перисто-лопастныя съ вытянутой заостренной верхушкой; лопасти линейныя или линейно-ланцетныя, вытянутыя, числомъ отъ 1 до 6 съ каждой стороны; верхнія листья ланцетныя, иногда почти линейныя, съ менѣе расширеннымъ основаніемъ; корзинки 3—5 см. дл., одиночныя, верхушечныя или 2—3 почти сидячія на общемъ пѣ-тоносѣ, или же, когда растеніе вѣтвистое, то каждая вѣтвь оканчивается корзинкой; листочки обертки голые или слегка опушенные, красновато-бурые, по краямъ коротко-рѣсничатые; среднія — яйцевидно-ланцетныя, туповатыя, быстро переходятъ въ маленькую колючку; внутреннія — узко-ланцетныя; вѣнчикъ темно-малиновый, рѣдко-бѣлый; сѣмянки 1—5 мм. дл.



Cirsium heterophyllum.

По болотистымъ лугамъ, оушкамъ и полянамъ, очень часто. Цвѣ-теть съ половины іюля до половины августа.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. *indivisum* DC. Пет. Кр. II, стр. 35.

Cirsium helenioides All. α. typ. Бух. II, № 231 α. — Бух. I, № 220 α.

Cnicus helenioides Willd. Дв., № 768. — Mart., p. 142.

Всѣ листья цѣльные нераздѣльныя.

β. *incisum* DC. Пет. Кр. II, стр. 35.

Cirsium helenioides All. β. *heterophyllum* All. Бух. II, № 231 β. — Бух. I, № 220 β. — F. O., № 6, p. 86. — Kayф. II, стр. 275. — Kayф. I, стр. 269.

Cirsium helenioides All. γ. *pinnatipartitum* Kauffm. Kayф. II, стр. 275. — Kayф. I, стр. 269.

Cnicus heterophyllus Willd. Дв., № 767. — Mart., p. 141.

Всѣ листья, исключая самыхъ верхнихъ и иногда корневыхъ, перисто-лопастные или перисто-надрѣзные.

× **C. Wankéllii Reichardt** = *C. heterophyllum* × *palustre*. Пет. Кр. II, стр. 35.

Общій обликъ *C. heterophyllum* (L.) Hill β . *incisum* DC.; всѣ листья, исключая верхнихъ, перисто-надрѣзные; лопасти ланцетныя, иногда по верхнему краю съ 1 — 2 зубцами, по краямъ колюче-рѣсничатыя; верхніе листья узко-ланцетные, мелко-нережно-зубчатые; верхушечные—почти цѣлюкрайніе; средніе и верхніе—сидячіе, полустеблеобъемлющіе и слегка изогбгающіе по стеблю; изогбгающія крылья съ болѣе крупными колючками, чѣмъ у листьевъ; корзинки какъ у *C. heterophyllum*, но нѣсколько мельче, по 1 — 3, сближены на верхушкѣ или на короткихъ ножкахъ; листочки обертки линкіе, нижніе съ болѣе жесткой колючкой.

Видомъ подходящій къ описанію экземпляръ былъ мною найденъ въ лѣсу близъ Пушкина, между полотною ж. д. и Стенаньковымъ. Мною же были найдены еще два экземпляра въ разное время въ Лосинномъ островѣ близъ Мытищъ, которые должны быть отнесены тоже къ помѣси *C. heterophyllum* × *palustre* и которые отличаются отъ *C. heterophyllum* (L.) Hill α . *indivisum* DC. только изогбгающими листьями и линкими листочками обертки корзинокъ, величина которыхъ не отличается отъ *C. heterophyllum* (L.) Hill.



Cirsium Wankellii.



Cirsium heterophyllum × *palustre*.

994. **C. pannonicum Gaud.** Sch. IV, № 1071. — Пет., Кр. II, стр. 36. — Кауф. II, стр. 276. — Цин., № 814. — Кауф. I, стр. 273.

Cnicus serratuloides Mart. Дв., № 769. — Mart., p. 142.

Carduus serratuloides Auct. Fl. ross. St. I, № 548. — Pal., № 1801.

Корневище многолѣтнее косое; стебель 40 — 90 см., прямостоящій, ребристый, слегка шерстистый, рѣже голый, простой, до половины покрытъ листьями, рѣже въ верхней трети вильчато-развѣтвленный; осно-

ваніе стебля окружено бурыми волокнами; листья ланцетные или нижніе яйцевидно-ланцетные, постепенно сужены въ черешокъ, заостренные, б. ч. опушены рѣдкими шерстистыми волосами, нижняя сторона болѣе густо; средніе и верхніе—сидячіе суженнымъ основаніемъ, слегка изогбающіе, иногда одна сторона изогбаетъ болѣе другой; края листьевъ неравно- и слегка колюче-рѣсничатые; корзинки 2—2,5 см. дл., одиночныя на длинныхъ безлистныхъ цвѣтоносахъ, близъ корзиночекъ почти войлочнo-опушенныхъ; листочки обертки на спинкѣ съ черноватымъ или красноватымъ килемъ, не линкіе, внутренніе—ланцетные, почти пленчатые, наружные—широко-ланцетные или яйцевидно-ланцетные, б. ч. оканчиваются очень маленькой колючкой; вѣнчикъ темно-малиновый; сѣмянки 3 мм. дл.



Cirsium pannonicum.

Цвѣтетъ съ середины іюня, весь іюль. Нока только близъ Бѣлыхъ Колодезей. Кім. у., по известнякамъ на крутыхъ обрывахъ въ значительномъ числѣ экземпляровъ (П.).

995. **C. palústre (L.) Scop.** Sch. VI, № 1671. — Пет. Кр. II, стр. 35. — Бух. II, № 223. — Бух. I, № 222. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 168. — Кауф. II, № 412. — Цин., № 806. — Кауф. I, стр. 268. — Lind., p. 130. — Make., № 737.

Caicus palustris Willd. Дв., № 764. — Hoff. H., № 6530. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 141.
Carduus palustris L. St. II, p. 48. — St. I, № 545.

Корневище двулѣтнее, какъ бы обрубленное, съ толстыми корнями; стебель прямостоящій, 50—200 см., простой или близъ верхушки вѣтвистый, б. или м. густо-шерстисто-войлочный, по всей длинѣ крылатый отъ изогбающихъ листьевъ; крылья зубчато-лопастныя съ жесткими колючками по краю; листья съ верхней стороны покрыты рѣдкими волосами, съ нижней—б. ч. шерстисто-войлочные; нижніе—на черешкахъ, остальные—сидячіе, изогбающіе, въ очертаніи продолговатые, ланцетные или даже линейные, перисто-выемчато-зубчатые или перисто-раздѣльные; лопасти 2—3-раздѣльныя или зубчатые, по краямъ колюче-рѣсничатые; каждый зубецъ оканчивается жесткой желтой колючкой; верхніе листья линейные, въ нижней трети зубчатые, остальная часть листа длинно-вытянутая; верхняя часть стебля обыкновенно безлистная или съ очень укороченными листьями; корзинки 1,5—2,5 см. дл., сидячія или на короткихъ ножкахъ, сгущены клубочками на концѣ стебля и вѣтвей; листочки обертки яйцевидно-ланцетные, по краямъ паутинистые, зеленые или красноватые, на спинкѣ линкіе, оканчиваются желтоватой или красноватой маленькой колючкой; вѣнчикъ малиновый, рѣдко бѣлый; сѣмянки 3 мм. дл.

По болотистымъ лугамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до конца августа.



Cirsium palustre.



Cirsium palustre α . *umbrosum.*

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α . *umbrosum* **Kauffm.** Пет. Кр. II, стр. 35.—Кауф. II, стр. 274.—Кауф. I, стр. 268.

Стебель до 2,5 м., б. ч. отъ основанія вѣтвистый, покрытъ листьями до самыхъ корзинокъ; листья дряблые, мягкіе, темно-зеленые, снизу тонко-сѣро-пушистые или голые; средніе и верхніе—съ короткими и широкими лопастями. По лѣсамъ и тѣнистымъ мѣстамъ. Соколыники. близъ Ширяева поля, на склонѣ къ р. Яузѣ (К.).—Мытищи. болото, поросшее ольхой, близъ новой водокачки и по кустарникамъ на берегу р. Серебрянки близъ Пушкина (С.).

996. *C. arvense* (L.) **Scop.** Пет. Кр. II, стр. 35.—Бух. II, № 234.—Бух. I, № 223.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 168.—Кауф. II, № 415.—Цин., № 808.—Pinz., p. 13.—Кауф. I, стр. 269.—Lind., p. 130.

Cirsium setosum DC. Макс., № 743.

Serratula arvensis L. Дв. № 758.—Gold. Sp., p. 135.—Mart., p. 140.—St. I, № 538.

Cnicus ruthenicus Henn. Hoff. II, № 6533.—Gold. C., p. 22.

Cirsium arvense Scop. α . mite Wimm. et Grab. Пет. Кр. II, стр. 35.—Бух. II, № 234 α .—Бух. I, № 223 α .—Кауф. II, стр. 276.—Кауф. I, стр. 270.

Cirsium arvense Scop. β . *setosum* Ledb. Пет. Кр. II, стр. 35.—Бух. II, № 234 β .—Бух. I, № 223 β .—Кауф. II, стр. 276.—Кауф. I, стр. 270.

Carduus arvensis Kalm. Lib. Tr., p. 32.

Корневини многолѣтнее, ползучее, залегаетъ глубоко подъ землею, есть не цвѣтущіе и цвѣтущіе стебли; послѣдніе до 175 см., прямостоящіе бороздчатые, голые или опушенные, оканчиваются метельчато-

щитковиднымъ соцветіемъ: листья сидячіе или на очень короткихъ черешкахъ, иногда слегка изгибающіе, по краямъ б. или м. жестко-и неравно-колюче-рѣсничатые или колючіе, продолговато-ланцетные, заостренные или туповатые, оканчивающіеся колючкой, цѣлюкрайніе, выемчато-зубчатые или перисто-лопастные, голые или снизу слегка паутинистые; корзинки *) двудомныя, 15—22 мм. дл., во время плодоношенія до 35 мм. дл.; листочки обертки по краямъ опушенные и рѣсничатые съ килемъ на спинкѣ, оканчиваются маленькой колючкой, наружныя — яйцевидно-ланцетные, отогнутые, постепенно становятся уже, внутренніе же ланцетные и безъ колючки; въичникъ лиловато-розовый; сѣмянки 3 мм. дл.



Cirsium arvense.

По посѣвамъ, паровымъ полямъ, огородамъ и близъ жилья, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до глубокой осени.

Распадается на слѣдующія формы:

а. commune GB.

Верхушка листьевъ постепенно заостренная переходитъ въ колючку.

а) setosum GB.

Все листья продолговато-ланцетные, цѣлюкрайніе или слегка зубчатые.

б) rudérale GB.

Листья часто волнистые, выемчато-зубчатые или перисто-лопастные; если колючки по краямъ мягкія, то это subf. mite W. et Gr., если очень жесткія и колючія, то это subf. horridum W. et Gr. **)

β. obtusifolium GB.

Листья съ округлой верхушкой быстро переходятъ въ колючку.

412. Onopórdon L.

Сходенъ съ Carduus, но цвѣтоложе мясистое, глубоко-ячеистое; ячейки съ рѣсничато- или неравно-зубчатымъ краемъ; волоски въ хохолкѣ многорядные, рѣсничатые, сростись основаніями въ кольцо, слабо-5-угольное.

*) Не разъ А. Н. Петушиниковъ и я встрѣчали экземпляры съ корзинками, у которыхъ все дѣлѣ было превращено въ побѣги или въ очень маленькія корзинки на довольно длинныхъ ножкахъ.

**) Subf. mite и horridum наблюдаются какъ у rudérale, такъ и у setosum, а у β. obtusifolium различаютъ: subrudérale GB., если листья выемчато-зубчатые или лопастные, и subhorridum GB., если листья жестко-колючіе.

997. *O. Acánthium* L. Пет. Кр. II, стр. 38. — Пет., стр. 231. — Кауф. II, № 419. — Цин., № 796. — Кауф. I, стр. 273. — Borg., p. 699. — Дв., № 779. — Макс., № 748. — Hoff. II., № 6543. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 142. — Pal., № 1804.

Корень двулѣтній, веретенообразный; стебель прямостоящій, до 1,5 м., вѣтвистый, сѣро-войлочно-шерстистый, какъ и все растение, широко-крылатый отъ самыхъ корзинокъ; крылья очень широкія, шире поперечника стебля, глубоко-зубчато-лопастныя: каждый зубчикъ оканчивается жесткой, желтой колючкой; нижніе листья сужены въ короткій черешокъ, широко-эллиптическіе или эллиптическіе, лопастныя, волнистыя; лопасти широко-треугольныя, неравно-выемчато-зубчатыя; каждый зубецъ, какъ и у остальныхъ листьевъ, оканчивается колючкой; стеблевые листья широко-ланцетные, туповатые, сидячіе, низбѣгающіе, къ верхушкѣ стебля листья становятся мельче; корзинки приплюснуто-шаровидныя,



Onopordon Acanthium.

3—4 см., одиночныя или рѣже 2—3, но тогда одна изъ нихъ крупнѣе; обертка вначалѣ слегка паутинистая, потомъ голая; листочки ея у

основанія яйцевидно-продолговатыя, вытянутые въ шпильковидную колючку, по краямъ мелко-пильчато-шероховатую; вѣничикъ темно-малиновый, рѣдко розовый или бѣлый; сѣмянки 4—5 мм. дл., сѣро-буроватыя, косо-морщинистыя.

По пустырямъ и близъ жилья, очень рѣдко. Цвѣтетъ съ начала іюля до глубокой осени. По обрыву къ р. Москвѣ близъ Симонова монастыря (К.).—За Семеновской заставой (Гей.).—На пустырь близъ Канатчиковой дачи и въ канавѣ близъ ст. Серпуховъ (П.).—По берегу р. Серпейки близъ Серпухова (Сюз.).

* *Cynára* Vaill.

Обертка яйцевидная или яйцевидно-шаровидная, черепичатая; листочки ея въ нижней части мясистые, въ верхней—кожистые, съ слегка выемчатой верхушкой и маленькой колючкой; цвѣты ворончато-трубчатые, обоюднолы: цвѣтоложе мясистое съ щетинистыми прицвѣтниками; сѣмянки 4-гранныя съ хохолкомъ многорядныхъ перистыхъ волосковъ, сросшихся основаніями въ кольцо.

* *C. Scólymus* L. Пет., стр. 174. — St. II, стр. 48. — Pal., № 1806.

Корень веретенообразный, двулѣтній; стебель до 1,5 м., прямостоящій, 5. ч. вѣтвистый, слегка ребристый и слабо-войлочно-шерсти-

стый; листья съ верхней стороны слабо-опушенные, съ нижней—сѣровойлочные, въ очертаніи продолговато-эллиптическіе или широко-ланцетные, перисто-надрѣзные; лопасти продолговатыя или ланцетныя, цѣлюкрайнія или зубчатыя, иногда зубы оканчиваются мягкой колючкой; нижніе листья сужены въ широкій черешокъ, остальные—сидячіе, самые верхніе—простые, ланцетные, нерѣдко зубчатые; корзинки очень крупныя—до 9 см. въ поперечникѣ, одиночныя на концѣ стебля и вѣтвей; листочки обертки голые; вѣнчикъ голубой; сѣмянки сѣробоурыя, продольно-полосатыя.

Разводится по огородамъ. Цвѣтетъ съ половины августа.



Cynara Scolymus.



Silybum Marianum.

413. *Silybum* (Vaill.) Adans.

Обертка яйцевидно-шаровидная, черепичатая изъ кожистыхъ отогнутыхъ колючихъ листочковъ, по краямъ колючихъ и рѣсничатыхъ; внутренніе листочки обертки продолговато-ланцетные, пленчатые, цѣлюкрайніе; тычиночныя нити сралисьъ нижнею частью между собой и снаружи опушенные; сѣмянки гладкія, безъ ребрышекъ, съ небольшою кольцевою коронкой на верхушкѣ и съ многоряднымъ хохолкомъ короткоперистыхъ волосковъ. Въ остальномъ какъ *Carduus*.

998. *S. Mariánum* (L.) Gaertn. F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 280. — Кауф. II, стр. 277. — Цип., стр. 254. — Кауф. I, стр. 270.

Carduus marianus L. Дл., № 763. — Hoff. II., № 6489. — Mart., p. 141. — St. II, p. 48.

Корень одно-двухлѣтній, веретенообразный; стебель до 1 м., вѣтвистый, ребристый, слегка шерстистый, особенно близъ корзиночекъ; листья кожистые, нѣсколько лоснящіеся съ бѣлыми пятнами и росписью по жилкамъ, рѣже одноцвѣтные, по краямъ рѣсничато-неравно-колючіе; нижніе—сужены въ черешокъ, широко-эллиптическіе или обратно-яйцевидные, тупые, волнисто-широко-лопастные; стеблевые—сидячіе съ сердце-

виднымъ стеблеобъемлющимъ основаніемъ, болѣе колючимъ; корзинки 1—5 см. дл., яйцевидныя, одиночныя; наружныя и среднія листочки обертки яйцевидныя, выпуклыя, съ отогнутымъ колючимъ придаткомъ; вѣничикъ лилово-малиновыя: сѣмянки 6—7 мм. дл., сплюснутыя, бурныя.

Разводилось и встрѣчается иногда одичалымъ. Цвѣтетъ съ начала іюля.

414. *Serrátula* L.

Обертка продолговато-яйцевидная или почти шаровидная, черенчатая изъ многорядныхъ остроконечныхъ листочковъ; цвѣты обоюполые или однополые, ворончато-трубчатые, 5-надрѣзные; цвѣтоложе покрыто щетинками; сѣмянки голыя, продолговатыя, иногда нѣсколько сплюснутыя, съ косымъ рубчикомъ у основанія и съ многоряднымъ хохолкомъ зазубренныхъ волосковъ, не сросшихся кольцомъ, а отваливающихся поодиночкѣ, при чемъ наружныя короче внутреннихъ.

999. *S. tinctoria* L. Sch. IV, № 925. — Пет. Кр. II, стр. 40. — Пет., стр. 277. — Кауф. II, № 424. — Гор., № 51. — Цин., № 823. — Кауф. I, стр. 276. — Borg., p. 699. — Дв., № 757. — Макс., № 747. — Mart., p. 140. — St. I, № 539.

Корень многолѣтній, косой, толстый; стебель прямостоящій, 30—120 см., ребристый, голый, какъ и все растеніе, простой или въ верхней части вѣтвистый; листья заостренныя, по краямъ нѣсколько неравно- и остро-пильчатые, края зубцовъ остро-шершавые; корневые и нижніе стеблевые листья на б. или м. длинныхъ черешкахъ, яйцевидно-продолговатыя, то цѣльныя, то лановидно-надрѣзные или перисто-надрѣзные; верхніе — сидячіе, продолговатыя, перисто-надрѣзные; корзинки 12—20 мм. дл., въ верхушечномъ щиткѣ или метелкѣ; листочки обертки голыя, яйцевидныя, заостренныя, б. ч. красноватыя и по краямъ опушенныя; вѣничикъ малиновыя или малиново-фіолетовыя; цвѣты вслѣдствіе недоразвитія тычинокъ или пестиковъ бываютъ часто то мужскіе, то женскіе, иногда только однополые, и тогда растеніе двудомное, съ мужскими корзинками овальными и женскими—продолговато-овальными: сѣмянки 5 мм. дл.



Serrátula tinctoria.

По кустарникамъ, опушкамъ и холмамъ, на пескѣ и известнякахъ, не часто. Цвѣтетъ съ половины іюля весь августъ.

У насъ пока только:

a. integrifolia Wallr.

Всѣ листья цѣльныя не раздѣльныя или стеблевые у основанія крупно-зубчатые или слегка надрѣзные. Въ гербаріи Максимовъ

вича.—Влизь Лужковъ, Срп. у. (Г.).—Между Лужками и Зибровымъ, Срп. у. (Экс. Бот. Лаб.).—Тамъ же съ бѣлыми цвѣтами (П.).—Рождествено на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Бѣлые Колодези, Клм. у. (П.).—По берегу р. Нахры между Подольскомъ и Семьковымъ, Пдл. у. (Куль.).

1000. *S. coronáta* L. Sch. IV, № 926.—Пет. Кр. II, стр. 40.—Пет., стр. 277.—Кауф. II, № 425.—Цин., № 824.—Рупр., стр. 86.—Кауф. I, стр. 276.
Serratula altissima Steph. Gold. Sp., p. 137.—St. I, № 540.

Корень многостѣбный; стебель прямостоящій, 60—150 см., простой или вѣтвистый, ребристый, голый, какъ и все растеніе; листья перисто-раздѣльные; доли яйцевидно-ланцетныя или почти ланцетныя, по краямъ остро-шершавыя, крупно- и нѣсколько неравно-остро-зубчатыя; конечная доля б. ч. 3-лопастная; къ основанію листа доли становятся мельче; нижніе листья черешковые, остальные — сидячіе; корзинки крупныя, 2,5—4 см. дл., яйцевидно-шаровидныя, одиночныя, рѣже парныя, на концѣ стебля и вѣтвей; наружныя листочки обвертки яйцевидныя, заостренныя въ очень короткое остріе, внутренніе — ланцетныя или линейно-ланцетныя, всѣ б. ч. красноватыя и б. или м. густо опушенныя; вѣничіе лиловато-розовый; краевые цвѣты длиннѣ остальныхъ, съ 3—4-раздѣльнымъ вѣничкомъ, женскіе, но часто съ 3—4 недоразвившимися тычинками; сѣмянки 6,5—7,5 мм. дл.



Serratula coronáta.

По лугамъ, опушкамъ и кустарникамъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ половины іюня весь августъ. Влизь Серпухова на заливныхъ лугахъ (К.).—Влизь Лужковъ, Срп. у. (Г.).—Прилуки и Никифорово, Срп. у. (П.).—Бѣлые Колодези, Клм. у. (П.).

415. *Centaurea* L.

Обвертка яйцевидная или шаровидная, черепичатая; листочки ея на концѣ съ перисто-гребенчатымъ или съ сухимъ расщепленнымъ придаткомъ или краемъ; краевые цвѣты крупнѣ остальныхъ, бесполое, широко-ворончатые, рѣже ихъ нѣтъ; остальные цвѣты обоополое, ворончато-трубчатые, 5-лопастные; цвѣтоложе плоское, покрыто щетинками; сѣмянки продолговато-яйцевидныя, сжатые или слабо-4-гранныя, съ косымъ боковымъ рубчикомъ у основанія и съ многоряднымъ хохолкомъ плоскихъ щетинокъ, рѣже безъ хохолка.

1. Цвѣты желтые.

C. ruthenica Lam.

Цвѣты иной окраски. 2.

2. Стеблевые листья цѣльные, рѣже перисто-лопастные, но тогда съ каждой стороны 2—3 лопасти, не болѣе. 3.

Стеблевые листья перисто- или двуперисто-раздѣльные; лопастей съ каждой стороны болѣе. 8.

3. Листья узкіе, линейно-ланцетные; листочки обертки съ узкой гребенчато-зубчатой каймой; краевые цвѣты обыкновенно лазоревые.

C. Cyanus L.

Листья б. или м. широкіе, ланцетные, рѣдко перисто-надрѣзные, съ 2—3 долями съ каждой стороны; листочки обертки съ пленчатыми ложковидными, ланцетными или узко-ланцетными придатками, зубчатыми или длинно- и тонко-бахромчатыми; цвѣты обыкновенно лиловато-красные. 4.

4. Всѣ листочки обертки съ ложковидными пленчатыми придатками, зубчатыми или падорванными, или же нижніе 2—3 ряда листочковъ по краямъ тонко-бахромчатые, а остальные—ложковидные; сѣмянки безъ хохолка.

C. Jacea L.

Всѣ листочки обертки, исключая внутренняго ряда, съ придатками, по краямъ длинно- и тонко-бахромчатыми, б. ч. вытянутыми въ нитевидный отогнутый кончикъ; сѣмянки съ хохолкомъ изъ щетинокъ, рѣже безъ хохолка. 5.

5. Сѣмянки безъ хохолка, иногда на верхушкѣ только опушены.

C. Jacea L. *δ. pratensis* Koch.

Сѣмянки съ хохолкомъ изъ щетинокъ. 6.

6. Придатки у листочковъ обертки округло-яйцевидные, по краямъ часто- и неровно-бахромчатые; верхушка придатка не вытянута въ длинный нитевидный кончикъ, превышающій боковыя бахромки; листья (у нашего растенія) перисто-лопастные.

C. austriacoides Woloszcz.

Придатки вытянуты въ длинный отогнутый нитевидный кончикъ, превышающій боковыя бахромки; листья простые. 7.

7. Придатки у нижнихъ листочковъ обертки широко-ланцетные, постепенно къ внутреннему ряду становятся шире, доходятъ до широко-клиновидной формы съ округлымъ основаніемъ.

C. phrygia L.

Придатки у нижнихъ листочковъ обертки ланцетные, постепенно къ внутреннему ряду переходить въ узко-ланцетные.

C. stenolepis Kerner.

8. Листочки обертки быстро расширены въ придатокъ, по краямъ бахромчатый, нижніе края листочка цѣльнокрайніе; стебель б. ч. сильно-вѣтвистый, почти до самыхъ корзинокъ покрытъ листьями.

C. maculosa Lam.

Листочки обертки съ придаткомъ по краямъ гребенчато-бахромчатымъ, низбѣгающимъ до низу листочка; стебель простой

или вѣтвистый; корзинки на длинныхъ безлистныхъ цветоносахъ. 9.

9. Стебель простой или съ вѣтвями нѣсколько отклоненными; обвертка 20—22 мм. дл. *C. Scabiosa* L.

Стебель съ многочисленными, вверхъ торчащими, вытянутыми цветоносными вѣтвями; обвертка 11—16 мм. дл.

C. stereophylla Bess.

1001. *C. ruthénica* Lam. Пет. Кр. II, стр. 43.

Корневище толстое, многолѣтнее; стебель прямостоящій, до 1 м. голый, какъ и все растение, ребристый, простой или слегка вѣтвистый; листья перисто-раздѣльные съ ланцетными или узко-ланцетными долями, по краямъ остро-пильчатыми; зубчики на концѣ хрящеватые, бѣлые, загнутые къ краю листа; корзинки одиночныя верхушечныя и на концѣ вѣтвей; обвертка цилиндрическо-овальная, 22—25 мм. дл. и около 20 мм. в поперечникѣ; листочки ея голые, кожистые, съ округлой верхушкой и узкой перепончатой каймой; наружныя—округлые, средніе—яйцевидные, внутренніе—продолговатые, съ расширенной пленчатой верхушкой; у всѣхъ листочковъ, начиная отъ пленчатой каймы, идутъ черныя тонкія линии, доходящія приблизительно до половины листочка; цвѣты свѣтло-желтые, краевые—ворончатые, нѣсколько длиннѣе остальныхъ; сѣмянки 5 мм. дл., съ хохолкомъ втрое короче сѣмянки.

Найдено пока только разъ занесеннымъ на откосѣ полотна Ник. ж. д., близъ ст. Крюково (II. II.); встрѣчается въ Тульской губ.



Centaurea ruthénica.



Centaurea jacea.

1002. *C. Jacéa* L. Пет. Кр. II, стр. 41.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 164.—Кауф. II, № 429.—Цин., № 783.—Кауф. I, стр. 280.—Lind., p. 128.—Дв., № 778.—Макс., № 793.—Hoff. II., № 7213.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 152.—Нойл., № 766.—St. II, p. 51.—St. I, № 592.

Многолѣтнее; стебель 30—100 см., прямостоящій или слегка приподнимающійся, ребристый, остро-шершавый, простой или вѣтвистый.

до самых корзинок покрыть листьями: листья остро-шершавые, ланцетные, широко-ланцетные, иногда почти яйцевидно-ланцетные, цѣльно-крайніе или зубчатые, или нижніе — выемчато-лопастные, рѣже почти перисто-надрѣзные, съ ланцетными, почти линейными лопастями; нижніе — сужены въ крылатый черешокъ, верхніе — сидячіе, всѣ — заостренные; корзинки одиночныя или по двѣ на концѣ стебля и вѣтвей; обертки около 15 мм. дл. и 12 мм. въ поперечникѣ; листочки ея съ бурыми ложковидными, пленчатыми, округлыми придатками, цѣльными или неправильно гребенчато-расщепленными, рѣже, особенно у нижнихъ рядовъ, длинно-бахромчатыми; цвѣты лилово-красноватые; сѣмянки 3 мм. дл., иногда съ слегка опушенной верхушкой, но безъ хохолка.

По лугамъ, кустарникамъ, опушкамъ и лѣсамъ, очень часто. Цвѣтеть съ середины іюня весь августъ; плоды съ середины августа.

Распадается на слѣдующія формы:

α. *genuína* Koch.

Всѣ листочки обертки ложковидные, не раздѣльные, только зубчатые или нѣсколько надорванные по краямъ.

β. *vulgáris* Koch.

Нижніе 1—3 листочка обертки по краямъ длинно-бахромчатые, остальные — ложковидные, зубчатые или надорванные.

γ. *lácera* Koch. Пет. Кр. II, стр. 41. — Бух. II, № 240. — Бух. I, № 229. — Кауф. II, стр. 288. — Цин., стр. 251. — Кауф. I, стр. 280.

Два—три нижнихъ ряда листочковъ обертки по краямъ длинно-бахромчатыхъ, остальные — ложковидные. Если растение покрыто тонкимъ бѣлымъ войлокомъ, то это: *f. candicans* Wimm. *)

δ. *praténsis* Koch.

Всѣ листочки обертки, исключая внутреннихъ рядовъ, съ заостреннымъ, удлиненнымъ, часто отогнутымъ придаткомъ, по краю длинно-бахромчатые.

ε. *bicolor* Peterm. Пет. Кр. II, стр. 41.

Краевые ворончатые цвѣты бѣлые, остальные ворончато-трубчатые, лилово-красноватые. Лапково, Руз. у. (II.).

× ***C. austriacóides* Woloszcz. = *C. Jacea* × *phrygia*.**

Стебель до 80 см., прямостоящій, ребристый, остро-шершавый, вѣтвистый; листья остро-шершавые, овальные или ланцетные, заостренные, нижніе — сужены въ крылатый черешокъ, иногда перисто-лопастные, съ линейными или ланцетными лопастями, верхніе — сидячіе; корзинки одиночныя на концѣ стебля и вѣтвей; обертка 16 мм. дл. и 14 мм. въ поперечникѣ; два внутреннихъ ряда листочковъ обертки съ ложковидными цѣльными, слегка зубчатыми или надорванными придатками, всѣ же остальные ряды съ придатками округло-яйцевидными, по краямъ часто-

*) Эта форма можетъ быть у *genuína* Koch и *vulgáris* Koch.

неравно- и длинно-бахромчатыми; все придатки темно-бурые и верхушки у нижних несколько отогнуты, но не вытянуты в длинный нитевидный кончик; цветы как у *C. Jascea* L.; сѣмянки около 4 мм. дл., съ хохолкомъ изъ щетинокъ, приблизительно равнымъ трети сѣмянки.

Встрѣчено только разъ на опушкѣ лѣса близъ Зиброва, Срп. у. (П.).*)



Centaurea austriacoides.



Centaurea phrygia.

1003. *C. phrygia* L., Fl. suec.

Centaurea Phrygia L. Sch. V, № 1480. — Пет. Кр. II, стр. 41. — Бух. II, № 241. — Бух. I, № 230. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 164. — Кауф. II, № 430. — Цик., № 787. — Кауф. I, стр. 281. — Lind., p. 128. — Ann., C. IV, № 18. — Дв., № 774. — Макс., № 791. — Hoff. II, № 7232. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 152. — Hoff., № 779. — St. II, p. 51. — St. I, № 588. — Pal., № 1943.

Растеніе многолѣтнее; стебель 30 — 125 см., прямостоящій, ребристый, простой или вѣтвистый; листья темно-зеленые, шероховатые, мелко-зубчатые или городковые, рѣже цѣльнокрайніе, продолговато-ланцетные или ланцетные, нижніе—сужены въ черешокъ, верхніе—сидячіе, полустеблеобъемлющіе; корзинки одиночныя на концѣ стебля и вѣтвей, рѣже корзинки скучены на верхушкѣ стебля; обертка яйцевидно-шаровидная, 15 — 17 мм. дл. и 14 — 15 мм. въ поперечникѣ; пленчатые придатки у внутренняго ряда листочковъ обертки ромбическіе, спереди зубчато-бахромчатые, бурые, выдаются изъ-за прикрывающихъ ихъ рядовъ; придатки двухъ слѣдующихъ рядовъ черно-бурые, съ округленнымъ или широко-клиновиднымъ основаніемъ, треугольныя, вытянутые

*) Экземпляръ, опредѣленный D-r. A. von Hayek, имѣть общій обликъ *C. Jascea* L. съ нижними листьями перисто-лопастными, но отличается сѣмянками съ хохолкомъ; отъ *C. phrygia* L. отличается листочками обертки, придатки которыхъ округло-яйцевидные, нѣсколько ложковидные и не столь обособленно-бахромчатые, съ верхушкой, не столь удлиненной и менѣе отогнутой. Не сходитъ съ описаніемъ, даннымъ A. von Hayek въ „Die Centaurea-Arten Oesterreich-Ungarns“ только перисто-лопастными листьями, что у *C. Jascea* L. такъ часто бываетъ и что не составляетъ существеннаго признака.

въ длинный нитевидный отогнутый кончикъ, края придатковъ съ 12—18 нитевидными бахромками съ каждой стороны; остальные ряды листочковъ съ широко-ланцетными черно-бурыми придатками, вытянутыми въ отогнутый волосовидный кончикъ въ 6 мм. дл. и по краямъ также нитевидно-бахромчатыми; цвѣты лиловато-красноватые съ болѣе крупными красными ворончатými цвѣтами; сѣмянки 3,5 мм. дл. съ хохолкомъ въ 1 мм. дл.

По кустарникамъ, полямъ и лѣсамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ конца іюня весь августъ.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. pallida Koch.

Придатки листочковъ обертки свѣтло-бурые, только основаніе ихъ темно-бурое или почти черное.

1004. C. stenolépis Kerner. Ист. Кр. II, стр. 42.

Centaurea conglomerata С. А. М. Кауф. II, № 431. — Рувр., стр. 86. — Кауф. I, стр. 281.

Centaurea Phrygia L. β. *fusca* Koch. Кауф. II, стр. 287. — Кауф. I, стр. 281.

Многолѣтнее растеніе; стебель 30—100 см., прямостоящій, б. ч. вѣтвистый, ребристый, нѣсколько паутинистый; листья свѣтло-зеленые, шероховатые, въ молодости часто слегка паутинистые, заостренные, по краямъ мелко-зубчатые; нижніе — широко-эллиптическіе или эллиптическо-ланцетные, суженные въ длинный черешокъ; остальные — сидячіе, эллиптическіе или ланцетные, часто суженные къ обоимъ концамъ; корзинки б. ч. скучены щиткомъ на верхушкѣ стебля, рѣже одиночныя; обертка цилиндрическо-яйцевидная, 15—18 мм. дл. и 10—14 мм. въ поперечникъ; наружныя и средніе листочки ея б. ч. слегка войлочноперистые, ланцетные, переходятъ въ черные узко-ланцетные придатки, вытянутые въ нитевидный отогнутый отростокъ въ 8 мм. дл. свѣтло-бурого цвѣта; бахромки по краямъ придатка не длинныя, нитевидныя, сближенныя, къ верхушкѣ придатка болѣе разставленныя, свѣтло-бурая; придатки не вполне прикрываютъ слѣдующіе листочки обертки;



Centaurea stenolepis.

внутренніе листочки съ слабо расширенными придатками, по краю слегка зубчатыми, мало выдаются изъ-за остальныхъ; цвѣты свѣтло-лиловато-красноватые, краевые — ворончатые, крупнѣе остальныхъ; сѣмянки 3,5 мм. дл.; хохолокъ равенъ приблизительно трети сѣмянки.

По лугамъ и кустарникамъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ конца іюня весь августъ. Близъ Боровскаго кургана, Бри. у.; близъ Серпухова на лугу (К.). — Близъ Зиброва, Сри. у. (П.). — Бѣлые Колодези, Кзм. у. (Г.).

1005. *C. Cyanus* L. Sch. III, № 771.—Бух. II, № 238.—Бух. I, № 227.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 164.—Кайф. II, № 426.—Цин., № 790.—Кайф. I, стр. 278.—Lind., p. 128.—Ann., C. IV, № 19.—Дв., № 775.—Макс., № 795.—Hoff. II, № 7201.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 152.—Hoff., № 757.—St. II, p. 51.—St. I, № 589.—Pal., № 1945.

Корень однодвудетный, веретенообразный; стебель прямостоящий, 30—100 см., б. ч. вѣтвистый, тонко-сѣро-шерстисто-войлочный, какъ и все растение; корневые листья б. ч. перисто-надрѣзные, съ узкими линейными лопастями, ко времени цвѣтенія увядають; стеблевые листья линейно-ланцетные; верхушечные — часто узко-линейные, заостренные, пѣлыо-крайние или очень рѣдко- и мелко-зубчатые; корзинки 12—18 мм. дл., одиночные на концѣ стебля и вѣтвей; обертка яйцевидно-продолговатая; наружные и средние листочки обертки яйцевидно-продолговатые, внутренне — продолговатые, все по краямъ гребенчато-длиннозубчатые; зубцы и края пленчатые, свѣтло-буроватые или почти бѣлые, рѣже у среднихъ листочковъ темно-бурые; красные цвѣты ворончатые, лазоревые, остальные ворончато-трубчатые, фиолетово-голубые, рѣже все цвѣты розоватые или бѣлые; сѣмянки 3—4,5 мм. дл., слегка опушенные.

Въ посѣвахъ и по паровымъ полямъ, очень часто. Цвѣтеть съ половины юля до поздней осени.



Centaurea Cyanus.



Centaurea Scabiosa.

1006. *C. Scabiōsa* L. Бух. II, № 239.—Бух. I, № 228.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 164.—Кайф. II, № 428.—Цин., № 791.—Pinz., p. 13.—Кайф. I, стр. 279.—Lind., p. 128.—Дв., № 777.—Макс., № 792.—Hoff. II, № 7247.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 152.—Hoff., № 757.—St. II, p. 51.—St. I, № 591.—Pal., № 1948.

Centaurea Scabiosa L. var. *vulgaris* Koch. Sch. VI, № 1619.

Корневище многолѣтнее, толстое деревянистое; стебли прямостоящие, 40—120 см., вѣтвистые, рѣже простые, голые, шершавые или слегка опушенные, у основанія съ волокнистыми остатками отмершихъ

листья: все листья б. ч. перисто-раздельные, часто съ мелкими долями между крупными долями, голые б. ч. шероховатые; доли линейные, ланцетные или овально-ланцетные, цельнокрайние или зубчатые; нижние листья сужены въ черешокъ, остальные—сидячіе, самые верхніе—часто простые, линейные; корзинки 22—40 мм. дл., одиночныя на концѣ стебли и вѣтвей; обертка шаровидно-яйцевидная, 20—22 мм. дл. и 16—18 мм. въ поперечникѣ; листочки ея прижаты одинъ къ другому, не вполне прикрываютъ ноготки сѣдующаго; нижніе и средніе листочки обертки яйцевидные или почти треугольные съ сухимъ пленчатымъ б. или м. широкимъ почти чернымъ изобѣгающимъ краемъ въ 1—2 мм. ш., образующимъ придатокъ гребенчато-бахромчатый, съ 8—12 бахромками съ каждой стороны; внутренніе листочки овально-ланцетные, съ сухой почти ромбическо-расширенной верхушкой, по краямъ надрѣзочно-зубчатой или бахромчатой; *) цвѣты лилово-красные, рѣже бѣлые, краевые—ворончатые; сѣмянки 5 мм. дл. съ хохолкомъ, почти равнымъ сѣмянкѣ. **)

По лугамъ, кустарникамъ и опушкамъ, часто. Цвѣтетъ съ конца іюня до конца августа.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. heteróphylla GB.

Нижніе листья цѣльные, не раздѣльные, эллиптическіе, суженные въ черешокъ, неравно-зубчатые или основаніе ихъ нѣсколько раздѣльное на почти линейныя или узко-ланцетныя доли; остальные листья гребенчато-перисто-раздѣльные. Каропчеево, Кзм. у. (II.).—Успенское, Звн. у. (X.).

β. melanocéphala Rupr. Кауф. II, стр. 285.—Кауф. I, стр. 279.

Обертки темно-бурыя съ листочками, почти покрывающими одинъ другого. Спасское (K.).

1007. C. stereóphylla Bess.

Centaurea Scabiosa L. γ. *Raczynskii* Kauffin. Бух. II, № 239γ.—Бух. I, № 228γ.—
Кауф. II, стр. 285.—Кауф. I, стр. 279.

*) Листочки обертки у этого вида бываютъ очень разнообразно окаймлены: то болѣе широко, то очень узко, и длина бахромокъ измѣчива. Одинъ экземпляръ, найденный близъ Петрова Н. Кауфманомъ и хранящійся въ гербаріи А. Н. Петуникова, и другой, совершенно схожій, найденный мною близъ Боровскаго кургана, настолько уклонились отъ типичнаго *C. Scabiosa* L., что Dr. A. von Hayek выразилъ предположеніе, не есть ли это помѣсь *C. stereóphylla* съ *orientalis* или съ *atropurpurea*, или же еще съ какимъ-либо близкимъ видомъ. Оба экземпляра имѣли бѣлые цвѣты и листочки обертки съ очень широкимъ свѣтло-бурымъ пленчатымъ краемъ и болѣе длинными бахромками, при чемъ у экземпляра, найденнаго Н. Кауфманомъ, листочки съ болѣе темнымъ краемъ, чѣмъ на моемъ. Предположить помѣсь съ *C. orientalis* или съ *C. atropurpurea*, на мой взглядъ, нельзя по той причинѣ, что оба эти вида растутъ много южнѣе, оба же наши экземпляра, очевидно, альбиносы, что выражено въ бѣлыхъ цвѣтахъ и слабо окрашенныхъ листочкахъ обертки; что же касается ширины каймы и длины бахромокъ, то, какъ уже выше сказано, онѣ бываютъ очень разнообразны.

**) А. Н. Петуниковъ и я нашли близъ Раменокъ уродливый экземпляръ этого вида, у котораго корзинки были очень мелкія; все листочки обертки и все цвѣты были превращены въ маленькіе зеленые линейно-ланцетные листочки.

Корень многолетний, толстый; стебель 20—60 см., прямостоящий, ребристый, голый, гладкий или остро-шершавый, съ многочисленными вверх торчащими и вытянутыми цветоносными ветвями; листья светло-зеленые, остро-шершавые; нижние — суженные в черешок, перисто-раздельные; доли их ланцетные, цельнокрайние или зазубренные, конечная доля крупнее остальных; стеблевые листья сидячие, перисто-раздельные, съ узкими почти линейными долями; самые верхние часто ланцетные или продолговато-ланцетные, цельные; корзинки 16—22 мм. дл., одиночные на концѣ стебли и ветвей; обертка 11—16 мм. дл. и 10—12 мм. в поперечникѣ; наружные и средние ея листочки ланцетные или широко-ланцетные, съ темно-бурой узкой бахромчатой каймой, снаружи б. ч. тонко-шерстистые; внутренние — ланцетные съ нѣскольکو ромбическо-расширенной сухой верхушкой и съ болѣе длинными бахромками; цвѣты лиловато-розовые, рѣдко бѣлые, б. ч. всѣ ворончато-трубчатые безъ краевых ворончатых; хохолокъ вдвое короче сѣмянки.

По холмамъ и кустарникамъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ начала іюля до конца августа. Между Ивановымъ и Братцовымъ, Хришная яма близъ Покровскаго; Подольскъ; Каропчеево, Кал. у. (К.). — Куркино и Соколово (П.). — Михайловское по р. Пахрѣ, Пдл. у. (Б.). Заброшенная каменоломня близъ с. Псупова, Бри. у. (С.).



Centaurea stereophylla.



Centaurea maculosa.

1008. *C. maculosa* Lam. *)

Centaurea Biebersteinii DC. Пер. Кр. II, стр. 40. — Пер., стр. 164. — Кауф. II, № 427. — Цин., № 795. — Рупр., стр. 62 и 86. — Кауф. I, стр. 278.

Centaurea paniculata L. Др., № 776. — Макс., № 794. — Mart., p. 152. — Hoff., № 777. — St. II, p. 51. — St. I, № 590. — Pal., № 1946.

*) О томъ, какъ правильнѣе именовать этотъ видъ, см. статью А. П. Петуляникова „О нѣкоторыхъ критическихъ формахъ рода *Centaurea* L.“ въ „Изв. Имп. Ак. Наукъ“, 1907.

Растение дву-многолѣтнее; стебель прямостоящій. 30—100 см., ребристый, тонко-сѣро-войлочный, какъ и все растение, кистисто-метельчато-вѣтвистый; листья слегка остро-шершавые, сидячіе, перисто- или двояко-перисто-раздѣльные, съ узкими, часто линейными цѣльнокрайними, заостренными долями; самые верхніе—простые, линейно-ланцетные; корневые—болѣе сложные, на длинныхъ черешкахъ, ко времени цвѣтенія пропадаютъ; корзинки до 20 мм. дл., одиночныя на концѣ стебля и вѣтвей; обертка 10—14 мм. дл. и 7—10 мм. въ поперечникѣ, шаровидно-яйцевидная; листочки ея голые, прижато-черепичатые, ребристые, съ треугольнымъ конечнымъ сухимъ темно-бурымъ придаткомъ, длинно-бахромчатымъ; бахромки б. ч. свѣтлѣе придатка, иногда почти бѣлыя, 5—8 съ каждой стороны; цвѣты свѣтло-лиловато-розовые, рѣдко бѣлые; сѣмянки 2,5—3 мм. дл.; хохолокъ равенъ половинѣ или тремъ четвертямъ сѣмянки.

Цвѣтетъ съ конца іюня весь августъ. По лугамъ, кустарникамъ и опушкамъ по всей береговой полосѣ р. Оки, Срп. и Кѣм. уу., какъ на пескѣ, такъ и на известнякахъ, а также на каменоломнѣ у устья р. Пахры, Бри. у. (С.).

416. *Cichórium* L.

Обертка цилиндрическая, двурядная; наружный рядъ изъ 5 отогнутыхъ болѣе короткихъ листочковъ, внутренній—б. ч. изъ 8 листочковъ, сросшихся основаніями; всѣ цвѣты язычковые; цвѣтоложе ячешчатое съ щетинистыми прицвѣтниками только въ центрѣ; сѣмянки 3—5-гранныя съ усѣченной верхушкой и вмѣсто хохолка съ маленькой пленчатой зубчатой коронкой.

1009. *C. Íntybus* L. Бух. II, № 243.—Бух. I, № 232. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 167.—Кауф. II, № 433.—Цин., № 842.—Кауф. I, стр. 283.—Др., № 753.—Макс., № 734. — Hoff. H., № 6449. — Gold. C., p. 22.—Mart., p. 139.—Hoff., № 884.—St. II, p. 47.—St. I, № 536.—Pal., № 1783.

Корень толстый, многолѣтній, длинно-веретенообразный; стебель прямостоящій до 1 м., простой или съ половины вѣтвистый, ребристый, голый или покрытъ щетинистыми и часто железистыми волосками; листья остро-шершавые, съ нижней стороны б. или м. густо покрыты жесткими волосками; корневые—сужены въ черешокъ, струговидные съ треугольными, неравно-зубчатыми лопастями; стеблевые—обратно-яйцевидные, расширеннымъ основаніемъ полустеблеобъемлющіе, по краямъ неравно-зубчатые; верхушечные—ланцетные, иногда почти линейные, цѣльнокрайніе; корзинки по 1—3, раскрытыя — 2,5—4 см. въ поперечникѣ, сидячія или на ножкахъ, верхушечныя и въ пазухахъ верхнихъ очень укороченныхъ листьевъ; листочки обертки покрыты стебельчатыми железками; цвѣты голубые; вѣличикъ съ нижней стороны железистый;

сѣмянки 2—2,5 мм. дл.; вмѣсто хохолка пленчатая коронка во много разъ короче сѣмянки.

По кустарникамъ, пустырямъ, лугамъ, по берегамъ рѣкъ и по каменистымъ мѣстамъ, очень часто. Цвѣтеть съ половины юня весь августъ.



Cichorium Intybus.



Cichorium Endivia.

* **C. Endivia L.** Пет., стр. 167.—Hoff. II., № 6448.—St. II, p. 47.—Pal., № 1784.

Корень многогѣтнѣй, мясистый, длинно-веретенообразный; стебель прямостоящій до 1 м., съ растопыренными вѣтвями, голый, покрытый щетинистыми волосками; листья въ молодости снизу вдоль жилокъ жестко-волосистые, потомъ голые; нижніе—продолговато-обратно-яйцевидные или продолговатые, выемчато-зубчатые или неправильно выемчато-перисто-раздѣльные съ волнистыми зубчатыми лопастями; верхніе листья укороченные, широко-яйцевидно-ланцетные, глубокимъ сердцевиднымъ основаніемъ стеблеобъемлющіе; корзинки по 2—5, раскрытыя—2,5 см. въ поперечникъ, верхушечныя и въ пазухахъ укороченныхъ верхнихъ листьевъ, сидячія или на ножкахъ; цвѣты голубые; листочки обертки по краю съ длинными волосками и слабо железистые; коронка въ 3 раза короче сѣмянки.

Родомъ изъ Восточной Индіи; разводится по огородамъ.

417. *Lámpsana* L.

Обертка цилиндрическо-колокольчатая изъ одного ряда членистыхъ листочковъ, у основанія ея 3—5 очень маленькихъ чешуевидныхъ листочковъ; при созрѣваніи плодовъ обертка остается съ вверху торчащими листочками; вѣтви цвѣты язычковые; цвѣтоложе плоское, голое; сѣмянки продолговатые, вѣсколку сплюснутыя, со многими продольными бороздками; хохолка нѣтъ, вмѣсто него едва замѣтный валикъ.

1010. *L. communis* L. Бух. II, № 242. — Бух. I, № 231. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 208. — Кауф. II, № 432. — Цин., № 840.

Lapsana communis L. Кауф. I, стр. 282. — Lind., p. 130. — Ann., C. V, № 32. — Дв., № 751. — Макс., № 735. — Hoff. H., № 6435. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 139. — Hoff., № 1832. — St. II, p. 47. — St. I, № 535. — Pal., № 1779.



Lapsana communis.

Корень веретенообразный, одно-двулетний; стебель прямостоящий, 30 — 100 см., голый или опушенный отстоящими волосками, в верхней части вѣтвистый; нижние листья на черешкахъ, въ очертаніи обратно-яйцевидные, лпровидные, съ очень крупной слегка выемчато-зубчатой конечной долей, часто слегка округло-сердцевидной; верхние листья сидячіе, яйцевидно-продолговатые или ланцетные, зубчатые или почти цѣлюкрайніе, рѣже всѣ листья яйцевидно-продолговатые, зубчатые; обертка голая, 4 — 6 мм. дл.; цвѣты лимонно-желтые; вѣничекъ 8 — 10 мм. дл.; сѣмянки свѣтло-буровато-зеленыя, 3,5—4 мм. дл., почти 3-гранныя.

По тѣнистымъ мѣстамъ, паровымъ полямъ и близъ жилья, часто. Цвѣтеть съ половины іюня весь августъ.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. glandulósa Freyn.

Стебель б. или м. густо покрытъ, кромѣ простыхъ еще железистыми волосками.

418. *Hypochoérís* L.

Обертка цилиндрическая или колокольчатая, черепичатая, многolistная; всѣ цвѣты язычковые; цвѣтоложе покрыто плепчатыми прицвѣтниками, опадающими къ созрѣванію сѣмянкокъ; послѣднія продолговато-линейныя, 5—15-ребристыя, сужены кверху въ б. или м. длинный носикъ, оканчивающійся хохолкомъ изъ одного ряда перистыхъ волосковъ или изъ двухъ рядовъ: внутренняго—изъ перистыхъ и наружнаго—изъ менѣе длинныхъ зазубренныхъ.

1011. *H. maculáta* L. Кауф. II, № 441. — Кауф. I, стр. 288. — Ann., C. III, № 230. — Дв., № 752. — Макс., № 710. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 139. — Hoff., № 1703. — St. II, p. 47. — St. I, № 534. — Pal., № 1778.

Achyrophorus maculatus Scop. Пет., стр. 130. — Цин., № 844. — Pinz., p. 14. — Lind., p. 132.

Корень многолѣтний, толстый, цилиндрическій, темно-бурый; стебель 30—120 см., у основанія съ бурными остатками отмершихъ листьевъ.

простой или слегка вильчато-вѣтвистый, тонко-ребристый, шероховатый, покрытъ б. или м. густо, особенно въ нижней части, мягкими отстоящими волосками; корневые листья широко-ланцетные или почти овальные, тупые, суженные къ основанію наподобіе черешка, слегка выемчато-зубчатые, рѣже почти цѣльнокрайніе, съ обѣихъ сторонъ б. или м. густо покрыты мягкими волосками, рѣже почти голые, по краямъ рѣсничатые, иногда съ верхней стороны съ буроватыми пятнами или безъ нихъ; стеблевыхъ листьевъ немного (1—2), такой же формы, какъ корневые, но мельче ихъ, сидячіе, полустеблеобъемлющіе, заостренные, рѣже стебель безъ листьевъ; корзинки одиночныя на концѣ стебля и вѣтвей; обертка 15—22 мм. дл.; листочки ея ланцетные или линейно-ланцетные, туповатые, покрыты щетинистыми волосками; цвѣты ярко-желтые; сѣмянки 15—17 мм. дл.



Hypochaeris maculata.

По лѣсамъ, опушкамъ и кустарникамъ, любитъ песчаную почву. Цвѣтетъ съ начала іюня до половины іюля; плоды съ конца іюня. Кунново (герб. Гольдб.).—Иваньково, Спасское; Архангельское, Зви. у.; Лужки. Срп. у. (К.).—Косино, Серебряный боръ близъ Хорошова; Денисьево, Зви. у.; Бѣлые Колодези, Кѣм. у.; Серпуховъ (П.).—Рождествено на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Лѣсъ близъ Выкова, Бри. у. (С.).

419. *Leontodon* L.

Обертка черепчатая, многорядная; всѣ цвѣты язычковые; цвѣтоложе голое безъ прицвѣтничковъ; сѣмянки продолговато-линейныя, тонко продольно-ребристыя, съ косыми поперечными морщинками, сужены въ б. или м. короткій носикъ съ хохолкомъ изъ перистыхъ волосковъ, основаніе которыхъ часто пленчато расширено.

1012. *L. autumnális* L. Бух. II, № 245.—Бух. I, № 234.—Г. О., № 6, p. 86.—Пет., стр. 212.—Кауф. II, № 434.—Цин., № 845.—Pinz., p. 13.—Кауф. I, стр. 284.—Lind., p. 132.—Макс., № 711.—St. I, № 521.—Pal., № 1752.

Apargia autumnalis Scop. Дв., № 734.—Hoff. II, № 6283.—Gold. C., p. 22.—Gold. Sp., p. 134.—Mart., p. 136.—Hoff., № 277.—St. II, p. 47.

Корневище многолѣтнее, косое, толстое, какъ бы обрубленное. съ довольно толстыми корнями; стебли 8—65 см., прястоходящіе или дугообразно-приподнимающіеся, въ верхней половинѣ вильчато-вѣтвистые, рѣже простые, голые, слабо опушенные, особенно близъ корзиночекъ, отъ начала развѣтвленія къ верхушкѣ покрыты рѣдкими чешуевидными листочками; листья только корневые розеткой, въ очертаніи линейно-продолговатые, постепенно сужены въ длинный, нѣсколько крылатый чере-

шохъ, туповатые, выемчато-зубчатые, гребенчато-перисто-надрѣзные или почти струговидные; зубы или лопасти треугольные, длинно-треугольные или почти линейные. цѣлюкрайніе; корзинки одиночныя на концѣ стебля и вѣтвей на нѣскольکو утолщенныхъ ножкахъ; обертка 8—12 мм. дл. б. ч. покрыта звѣздчатыми шерстистыми волосками; цвѣты желтые; рыльца темно-желтыя; сѣмянки 3,5—4,5 мм. дл.

По лугамъ, выгонамъ и по бесплоднымъ мѣстамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины іюня весь сентябрь; плоды съ середины августа.

Распадается на слѣдующія формы:

α. tūpicus GB.

Leontodon autumnalis L. β. *integrifolius* Kauffm. Кауф. II, стр. 290.—Кауф. I, стр. 284.

Листочки обертки покрыты звѣздчатыми шерстистыми волосками или почти голые; если листья почти цѣлюкрайніе или только выемчато-зубчатые, то это: *f. integrifolia* Kauffm; если листья гребенчато- или почти струговидно-перисто-надрѣзные съ узкими почти линейными лопастями, то это: *f. runcinata* Kit.

β. pratēnsis Koch. Мос., № 16.—Кауф. II, стр. 290.—Кауф. I, стр. 284.

Листочки обертки и часть цвѣтоносовъ покрыты б. или м. частыми бурыми или черно-бурыми волосками. Близъ Иванькова (К.).—Ашинское, Бгр. у. (Гум.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Дарьино, Зви. у. (X.).



Leontodon autumnalis.



Leontodon hispidus.

1013. **L. hispidus L.** Пет. Кр. II, стр. 62.—Pinz., p. 13.—Макс., № 712.—St. I, № 522.

Leontodon hastilis Koch. Пет., стр. 212.—Кауф. II, № 435.—Цин., № 846.—Кауф. I, стр. 284.—Lind., p. 132.—Ann., C. III, № 229.—Gold. Sp., p. 141.—St. I, № 520.—Pal., № 1750.

Leontodon hastilis Koch. α. *vulgaris* Koch. Бух. II, № 244.—Бух. I, № 233.—F. O., № 6, p. 86.—Кауф. II, стр. 290.—Цин., стр. 266.—Кауф. I, стр. 284.

Apargia hispida Willd. Дв., № 735. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 583. — Hoff., № 280. — St. II, p. 47.

Apargia hastilis Willd. St. II, p. 47.

Leontodon incanum Schrank. Макс., № 714.

Apargia incana Mart. Mart., p. 135.

Hieracium incanum Poll. St. I, № 523.

Корневище многолетнее, короткое, толстое, съ толстыми корнями; стрѣлки прямостоящія или восходящія, 30 — 70 см., б. ч. простыя, оканчиваются одной корзинкой, подъ которой утолщены; листья только корневые розеткой, въ очертаніи продолговато-ланцетные, постепенно суженные въ длинный черешокъ, тупые или заостренные, выемчато-зубчатые или перисто- и почти струговидно-лопастные, рѣже почти цѣльнокрайніе, съ обѣихъ сторонъ б. или м. густо покрыты 2 — 3-раздѣльными жесткими волосками; корзинки до распусканія поникшія; обертка 11—17 мм. дл., листочки ея туповатые или заостренные, б. или м. густо опушенные; цвѣты ярко-желтые; вѣнчикъ слегка опушенный; сѣмянки 5—7 мм. дл.

По лугамъ, кустарникамъ и лѣсамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ начала іюля до середины сентября; плоды съ конца іюля.

Кромѣ общераспространенной формы еще:

а. *danubiális* Jacq.

Leontodon hastilis Koch. *β. glabratus* Koch. F. O., № 6, p. 86. — Кауф. II, стр. 291. — Цин., стр. 266. — Кауф. I, стр. 284.

Все растеніе голое или только обертка нѣсколько опушенная.

420. *Picris* L.

Обертка яйцевидно-шаровидная или колокольчатая, черенчатая; внутренніе листочки ея въ 1—2 ряда равной длины, къ созрѣванію сѣмянъ съ твердѣющимъ у основанія килемъ; наружные листочки отогнутые, короче внутреннихъ; всѣ цвѣты язычковые; цвѣтоложе слегка рѣсниччатое, отчего шершавое; сѣмянки съ 5—10 продольными ребрышками, поперекъ морщинистыя, линейныя или продолговатыя, часто нѣсколько согнутыя, книзу и кверху сужены и вытянуты въ б. или м. длинный носикъ съ хохолкомъ изъ перистыхъ волосковъ, сросшихся расширенными основаніями въ колечко; иногда, кромѣ перистыхъ волосковъ, еще короткіе наружные нѣсколько шероховатые.

1014. ***P. hieracioides* L.** Бух. II, № 246. — Бух. I, № 235. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 240. — Кауф. II, № 436. — Цин., № 865. — Кауф. I, стр. 285. — Lind., p. 132. — Ann., C. II, № 135. — Дв., № 737. — Макс., № 709. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 136. — Hoff., № 2473. — St. II, p. 46. — St. I, № 513.

Корень вѣтвистый дву-многолѣтній; стебель прямостоящій, 50 — 150 см., б. ч. изъ верхней половинѣ вѣтвистый, ребристый, покрытъ жесткими, на концѣ крючковатыми волосками, рѣже почти голый; ниж-

ние листья обратно-яйцевидные, продолговатые или продолговато-ланцетные, суженные в б. или м. длинный черешок; верхние—ланцетные



Picris hieracioides.

или яйцевидно-продолговатые, расширенным почти сердцевидным основанием полустеблеобъемлющие, реже сидячие суженным основанием; все листья туповатые или заостренные, волнисто-выемчато-зубчатые, зубчатые, редко почти цельнокрайние, с обеих сторон остро-шершавые от жестких, на концы крючковатых волосков; корзинки по 1—4 на концы стебля и ветвей в щитковидном соцветии; обертка 10—15 мм. дл.; листочки ее на спинке б. или м. тонко-войлочные, реже почти голые и б. ч. с длинными, жесткими, на концы крючковатыми волосками, реже без них; цветы золотисто-желтые; семянки 2—3 мм. дл.

По кустарникам, опушкам и возвышенным местам, реже по лесам, очень часто. Цветет с конца июня до середины августа; плоды с начала августа.

421. *Tragopogon* L.

Обертка цилиндрическая, однорядная (редко у основания с одиночными маленькими листочками); листочки ее несколько срослись основаниями, при созревании семянков отворачиваются книзу; цветы язычковые; цветоложе голое; семянки цилиндрические с продольными ребрышками, сужены в б. или м. длинный носик с хохолком перистых волосков, сросшихся при основании колечком и отгибающихся цѣликомъ.

1. Цветы лилово-пурпуровые.

T. porrifolius L.

Цветы желтые. 2.

2. Цветы лимонно-желтые, равны обертке или короче ее.

T. pratensis L.

Цветы золотисто-желтые; обертка короче цветков, часто почти вдвое.

T. orientalis L.

* *T. porrifolius* L. Пет. стр., 291. — Hoff. II., № 6201. — Pal., № 1733.

Корень одно-двулетный, очень толстый веретенообразный; стебель 60—120 см., голый, простой, оканчивается одной корзинкой; нижние листья линейные, длинно-вытянутые, постепенно расширены влагалищно; остальные—ланцетные, сидячие, полустеблеобъемлющие, быстро вытянутые

въ длинный тонкій конецъ; корзинка на цветоносеѣ нѣсколько утолщен-
номъ; обертка голая, втрое длиннѣе цвѣтовъ; послѣдніе лилово-пурпу-
ровые; сѣмянки о 10 ребрышкахъ.

Разводится по огородамъ.



Tragopogon porrifolius.



Tragopogon pratensis.

1015. **T. pratensis L.** Мос., № 17. — Пет. Кр. II, стр. 43. — Ф. О., № 6, p. 86. — Пет., стр. 291. — Кауф. II, № 437. — Цин., № 852. — Кауф. I, стр. 286. — Lind., p. 132. — Макс., № 705. — Hoff. II, № 6202. — St. II, p. 46. — *Tragopogon pratense L.* Дв., № 723. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 133. — Hoff., № 3284. — St. I, № 512. — Pal., № 1731.

Корень двулѣтній, веретенообразный, почти безъ боковыхъ кореш-
ковъ; стебель прямостоящій, 40 — 125 см., б. ч. вѣтвистый, голый или
мѣстами ключковато-шерстистый; листья синебато-зеленые, узко-линейные,
длинно-вытянутые, заостренные, сидячіе, полустеблеобъемлющіе, иногда
основаніе ихъ нѣсколько расширено и какъ бы влагалищно обнимаетъ
стебель; корзинки конечныя, одиночныя съ цветоносомъ не утолщеннымъ
или слабо утолщеннымъ подъ корзинкой; обертка 8—15 мм. дл., равна
цвѣтамъ или нѣсколько длиннѣе ихъ; цвѣты лимонно-желтые; *) сѣ-
мянки 16—22 мм. дл.

По лугамъ, кустарникамъ, по берегамъ рѣкъ и близъ жилья, рѣдко.
Цвѣтеть съ конца мая весь июнь; плоды съ половины юня. Давыдово,
Лужники близъ Хорошова (П.).—Царицыно. Мытницы близъ дачи Чел-
ноковыхъ и на 17-й верстѣ. Брянск. ж. д. (С.).—Михайловское, Пдл. у.
(Мос.).—Дарьино, Зви. у. (X.).

Кромѣ типичной формы еще:

- а. **micranthes Wimm.** Кауф. II, стр. 292.—Кауф. I, стр. 286.

*) А. П. Петуниковымъ и мною близъ Лужковъ, Сри. у., найдена уродливая форма,
у которой всѣ цвѣты въ корзинкѣ и листочки обертки превратились въ очень медкія кор-
зинки на короткихъ ножкахъ.

Листья очень удлиненные, отогнутые дугообразно от стебля и повислые; корзинки мельче; листочки обертки почти вдвое длиннѣе цвѣтовъ. Останкино (герб. Ген.).

1016. **T. orientális L.** Пет. Кр. II, стр. 43.—Бух. II, № 247.—Бух. I, № 237.—F. O., № 6, p. 86.—Кауф. II, № 438.—Pinz., p. 13.—Рупр., стр. 62.—Кауф. I, стр. 286.—Дв., № 724.—Макс., № 707.—Mart., p. 134.—Pal., № 1732.

Корень веретенообразный; стебель прямостоящій, 30—80 см., голый или клочковато-шерстистый, простой или вѣтвистый, иногда отъ корня идутъ 2—4 слегка приподнимающихся стебля; листья линейные, длинные, б. ч. дугообразно отогнутые отъ стебля, длинно-заостренные, къ основанію расширенныя, влагалищно обнимаютъ стебель; корзинки одиночныя, конечныя; обертка 15—23 мм. дл.; цвѣты значительно длиннѣе обертки, иногда почти вдвое, золотисто-желтыя; пыльники нѣсколько темнѣе вѣнчика, съ 5 черноватыми продольными линиями, рѣдко только верхушка ихъ черноватая; краевыя сѣмянки неясно 5-гранныя, чешуйчато-колючія.



Tragopogon orientalis.

По заливымъ лугамъ, иногда по полямъ и дорогамъ. Цвѣтетъ съ начала іюля до половины августа; плоды съ середины іюля. Кушново; между Введенскимъ и Порѣчьемъ. Зви. у. (П.).—Мячково, Быково, Бри. у. (К.).—Ильинское, Зви. у. (Куль.).—Дракино, Сри. у. (С.).—Рождествено на р. Нарѣ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Михайловское—Вороновскій паркъ, Пдл. у. (Б.).

Кромѣ общераспространенной формы еще:

- а. **revolútus Bisch.** Пет. Кр. II, стр. 43.—Кауф. II, стр. 293.—Кауф. I, стр. 287.

Листья по краямъ сильно волнистыя, верхушка ихъ сильно удлиненная и часто завитая почти кольцомъ. Строгино, Татарово; Архангельское, Зви. у.; Серпуховъ; Каропчеево, Кдм. у. (К.).—Петровское на Москвѣ р.; Бѣлые Колодези, Кдм. у. (П.).—Близъ Боровскаго кургана, Бри. у. (С.).—Бѣлопесочная слобода, Сри. у. (Х.).

422. *Scorzonéra L.*

Обертка цилиндрическо-колокольчатая, многорядная; цвѣтоложе голое, ячешчатое, иногда съ волосистыми краями ячеекъ; цвѣты язычковые; сѣмянки линейныя, почти цилиндрическія, гранистыя или ребристыя, у основанія съ углубленнымъ рубчикомъ или близъ основанія съ полымъ придаткомъ, черезъ который проходитъ основаніе сѣмянки, съ

несколько суженной верхушкой; хохолокъ изъ многихъ рядовъ перистыхъ волосковъ не одинаковой длины.

1. Цвѣты лиловые или розовато-лиловые. *S. purpurea* L.

Цвѣты желтые. 2.

2. Краевыя сѣмянки гладко-ребристыя или едва замѣтно бугорчатая; стебли и черешки листьевъ б. ч. шерстисто-войлочные; стеблевыхъ листьевъ немного (1—5). *S. humilis* L.

Краевыя сѣмянки по ребрышкамъ остро-бугорчатая; стебли и черешки листьевъ голые или слабо-паутинистые; стеблевыхъ листьевъ много. *S. hispanica* L.

1017. *S. humilis* L. Пет. Кр. II, стр. 44. — Ф. Б., № 46. — Ф. О., № 6, p. 86. — Пет., стр. 273. — Кауф. II, № 439. — Гор., № 23. — Цин., № 858. — Кауф. I, стр. 287. — Borg., p. 699. — Дв., № 749. — Макс., № 708. — Pal., № 1736.

Многолѣтнее; корень толстый цилиндрическій, черно-бурый; стебель 10—60 см., покрытъ, какъ и черешки листьевъ, шерстистымъ войлокомъ, рѣже почти голый, оканчивается одной, рѣже 2—3 корзинками на б. или м. длинныхъ цвѣтоносахъ; корневыя листья на длинныхъ черешкахъ, яйцевидно-продолговатые или эллиптическіе, рѣже ланцетные, суженные къ обоимъ концамъ, заостренныя, цѣльнокрайніе; стеблевые (1—5) — ланцетные или узко-ланцетные, сидячіе; обертка 18—25 мм. дл., почти вдвое короче цвѣтовъ; листочки ея яйцевидно-продолговатые или почти ланцетные, тупые, войлочко-опушенные; цвѣты свѣтло-желтые; сѣмянки 7—9 мм. дл., гладко-ребристыя, рѣже съ едва замѣтными бугорками. *)



Scorzonera humilis.

По лугамъ и кустарникамъ, не часто.

Цвѣтеть съ начала мая до половины іюня. Денисьево, Зин. у. (герб. Гольдб.). — Близъ Борисова, Сри. у. (М.). — Близъ Никифорова, Сри. у. (Же. Бот. Лаб.). — Между Зибровымъ и Лужками, Сри. у. (Ф. Б. и Ф. О.). — Хлыново близъ Рождествена на р. Нарѣ, Сри. у. (гр. Е. Солугубъ). — Бѣлые Колодези и Горы, Кзм. у. (П.).

* *S. hispanica* L. Пет., стр. 272. — St. II, p. 46.

Многолѣтнее; корень толстый цилиндрическій, мясистый; стебель 60—130 см., прямостоящій, густо покрытъ листьями, вѣтвистый, голый

*) Измѣнкіе флористы приводятъ три формы: α) *angustifolia* Fl. dan., съ очень узкими листьями, β) *latifrons* GB., съ листьями широкими до 50 мм. ш., и γ) *ramosa* GB. — стебель съ 2—3 корзинками. У насъ всѣ формы растутъ вмѣстѣ и имѣются всѣ переходы отъ α до β, а γ бываетъ какъ съ узкими, такъ и съ широкими листьями.

или слабо паутинистый; листья зеленые или синеовато-зеленые, по краям очень мелко-зубчатые, отчего края остро-шершавые; нижние — эллиптические, заостренные, сидячие, полустеблеобъемлющие, рѣже все листья линейные; корзинки одиночныя на концѣ стебля и вѣтвей; обертка 20—30 мм. дл.; листочки ея яйцевидно-заостренные, по краямъ слегка шерстисто-опушенные; ячейки на цвѣтоложѣ по краямъ шерстисто-рѣсничатыя; цвѣты свѣтло-желтые; сѣмянки 15—16 мм. дл., краевыя съ 5 выдающимися остро-бугорчатыми ребрышками.

Разводится по огородамъ.



Scorzonera hispanica.



Scorzonera purpurea.

1018. *S. purpurea* L. Пет Кр. II, стр. 44.—Пет., стр. 272.—Кауф. II, № 440.—Гор., № 52.—Pal., № 1737.

Мнолѣтнее; корень толстый цилиндрическій; стебель 20—80 см., у основанія съ бурыми волокистыми остатками отмершихъ листьевъ, прямостоящій, голый, рѣже слегка паутинистый, простой или въ верхней части нѣсколько вѣтвистый; листья узко-линейные, до 3 мм. ш., верхніе—уже, корневыя—короче стебля; корзинки одиночныя на концѣ стебля и вѣтвей; обертка 14—22 мм. дл.; листочки ея яйцевидные или продолговатые, внутренніе—продолговато-ланцетные, часто съ нѣсколько расширенной пленчатой верхушкой, остальные—туповатые, голые или слабо-паутинисто-войлочные; цвѣты свѣтло-лиловые или розовато-лиловые, почти вдвое длиннѣе обертки; сѣмянки 12—13 мм. дл., слабо-10-ребристыя, гладкія или едва бородавчато-шероховатыя.

По лугамъ, кустарникамъ и опушкамъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ половины мая до половины іюня. Между Лужками и Зибровымъ, Срп. у. (С.).

423. *Taraxacum* Juss.

Обертка цилиндрическая или колокольчатая, состоитъ изъ короткихъ, отогнутыхъ наружныхъ и прямостоящихъ однорядныхъ внутреннихъ листочковъ, ко времени созрѣванія сѣмянъ отворачивающихся

лизу: цвѣты язычковые; цвѣтоложе голое; сѣмянки 4-гранныя сплюснутыя, съ продольными ребрышками остро-бугорчатыми, близъ верхушки съ шиповатыми чешуйками; носикъ сѣмянки нитевидный съ хохолкомъ изъ простыхъ одинаковыхъ волосковъ.

1019. *T. vulgäre* (Lam.) Schrank.

Taraxacum officinalis Wigg. Бух. II, № 248.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 289.—Цин., № 877.—Lind., p. 132.

Taraxacum officinalis Knaut. Бух. I, № 236.—Кауф. II, № 442.—Кауф. I, стр. 289.

Taraxacum officinalis Vill. Макс., № 715.

Leontodon Taraxacum L. Дв., № 732.—Hoff. II., № 6281.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 135.—Hoff., № 1878.—St. II, p. 47.—St. I, № 519.—Pal., № 1749.

Корень многолѣтний толстый веретенообразный; растение очень измѣнчиво по своему облику: листья только корневые розеткой, то прижатые къ землѣ, то почти прямостоящія, въ очертаніи длинно-обратно-йцевидно-продолговатые, къ основанію постепенно суженные въ крылатый черешокъ, выемчато-зубчатые, струговидные или струговидно-перисто-надрѣзные, съ острыми треугольными, узко-треугольными или иногда почти линейными лопастями, отогнутыми внизъ; конечная лопасть копьевидная, крупнѣе остальныхъ; корзинки одиночныя на полыхъ стрѣлкахъ, б. ч. слегка кочковидно-шерстистыхъ или голыхъ, въ 5—50 см.; обертка 10—25 мм. дл., сперва опушенная, потомъ голая; внутренній рядъ изъ 15—20 почти линейныхъ и наружный—изъ ланцетныхъ или линейно-ланцетныхъ листочковъ, по краямъ съ очень узкой пленчатой каймой; цвѣты свѣтло- или золотисто-желтые, съ приятнымъ запахомъ, длиннѣе обертки; сѣмянки 10—17 мм. дл.



Taraxacum vulgare.

По лугамъ, кустарникамъ, лѣсамъ и близъ жилья, очень часто. Цвѣтетъ съ конца апрѣля все лѣто и осень; плоды съ конца мая.

424. *Lactúca* L.

Обертка цилиндрическая, черенчатая, не отгибается при созрѣваніи сѣмянъ; внутренніе листочки ея равные и длиннѣе наружныхъ; цвѣты язычковые; цвѣтоложе голое; сѣмянки овальныя или продолговатыя, веретенообразныя, сплюснутыя, продольно-ребристыя, шероховатыя, б. или м. быстро-суженныя въ нитевидный носикъ съ хохолкомъ изъ простыхъ бѣлыхъ волосковъ.

1. Корзинки не болѣе какъ о 5 цвѣткахъ; нижніе листья суженные въ черешокъ стрѣловидно-стеблеобъемлющій.

L. muralis E. Mey.

Корзинки о 8—16 цвѣткахъ; всѣ листья сидячіе стеблеобъемлющіе. 2.

2. Листья повернуты на ребро съ колючими зубчиками по краямъ; метелка вначалѣ съ поникающими концами у вѣточекъ.

L. Serriola L.

Листья повернуты плоской стороной къ стеблю, хотя и съ острыми, но не колючими зубчиками; вѣточки торчащія.

L. sativa L.

1020. *L. Serrifolia* L.

Lactuca Scariola L. Пет., Кр. II, стр. 44.—Пет., стр. 207.—Кауф. II, № 443.—Цин., № 869. — Кауф. I, стр. 290. — Дв., № 730.—Макс., № 732.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 135.—St. II, p. 46.—St. I, № 517.

Корень одно-двулѣтній, веретенообразный, часто развѣтвленный; стебель прямостоящій. 50—150 см., цилиндрическій зеленый, иногда съ



Lactuca Serrifolia.

красными крапинками, голый, какъ и все растеніе, пирамидально-вѣтвистый, вначалѣ съ поникающими концами вѣтвей; листья повернуты на ребро, глубоко-выемчато-зубчатые или струговидные, съ угловатыми лопастями, нѣсколько отогнутыми книзу, треугольно-ланцетными или почти треугольными, по краямъ мелко и неровно-зубчатыми; каждый зубчикъ оканчивается маленькой колючкой; по средней жилкѣ съ нижней стороны тоже съ не частыми колючками; основаніе листьевъ стрѣловидно-стеблеобъемлющее; верхніе листья ланцетные или линейно-ланцетные; корзинки многоцвѣтковые (8—16); обертка 6—12 мм. дл.; цвѣты блѣдно-желтые; сѣмянки зеленовато-бурыя, вмѣстѣ съ носикомъ 6—7 мм. дл., послѣдній почти равенъ сѣмянкѣ.

Но безплоднымъ мѣстамъ, по дорогамъ и близъ жилья, не рѣдко. Цвѣтетъ съ середины іюля весь августъ; плоды съ середины августа.

* *L. sativa* L. Пет., стр. 206. — Кауф. II, стр. 296. — Цин., стр. 272. — Кауф. I, стр. 290.—St. II, p. 46.—Pal., № 1748.

Корень однолѣтній, веретенообразный; стебель 30—70 см., метельчато-вѣтвистый, цилиндрическій, бѣловатый, голый, какъ и все растеніе; нижніе листья обратно-яйцевидные, при основаніи суженные наподобіе черешка, съ округлой верхушкой, или быстро заостренные; остальные—обратно-яйцевидные или яйцевидно-округлые, тупо-заостренные, съ сердцевиднымъ стеблеобъемлющимъ основаніемъ; всѣ листья мелко-зубчатые, не колючіе, рѣже нижніе листья струговидные; соцветіе щитковидно-метель-

чатое; обертка 6—13 мм. дл.; наружные ее листочки яйцевидно-ланцетные, внутренние — продолговато-ланцетные; цветы светло-желтые, длиннее обертки.

Разводится по огородамъ.



Lactuca sativa.



Lactuca muralis.

1021. *L. muralis* (L.) E. Mey.

Lactuca muralis Gaertn. Сир. Отч., стр. 14.—Пет. Кр. II, стр. 45.—Ф. Б., № 47.—
Г. О., № 6, p. 86.—Пет., стр. 207.—Кауф. II, № 444.—
Гор., № 24.—Цик., № 870.—Кауф. I, стр. 290.

Prenanthes muralis L. Дв., № 731.—Макс., № 733.—Mart., p. 135., — Hoff.,
№ 2591.—St. II, p. 46.—St. I, № 518.

Корень многолѣтний, цилиндрическій, какъ бы обрубленный; стебель прямостоящій, 30—150 см., голый, какъ и все растеніе, въ верхней части съ растопыренно-вѣтвистымъ соцветіемъ; листья тонкіе, съ верхней стороны зеленые, съ нижней—синеватые, перисто-разсѣченныя или ланцетовидныя, верхніе—стрѣловиднымъ основаніемъ сидячіе, нижніе—сужены въ черешокъ, тоже стрѣловидно охватывающій стебель; лопасти листьевъ угловато-треугольныя, неравно-выемчато-зубчатыя, конечная доля много крупнѣе остальныхъ, треугольная или почти стрѣловидная, или же сердцевидно-стрѣловидная; соцветіе пирамидальное; корзинки не большія, не болѣе какъ о 5 цветкахъ; обертка 6—10 мм. дл., листочки ее линейные, часто съ пленчатой каймой; цветы желтые; съмянки 3—4 мм. дл., быстро сужены въ короткій носикъ.

По тѣнистымъ мѣстамъ и лѣсамъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ половины іюня до половины августа. Тренарево. Мож. у. (г-жа Армфельдъ).—Русино. Мож. у. (Ч. и П.).—Зашино, Анаренки, Куровка, Гальчина, Ксентьево. Мож. у. (Ф. Б.).—Подъ Борисовымъ. Мож. у. (Сюз.).—Близъ Михайловки. Мож. у. (П.).—Крюково (З. В. Кикина).—Мытищи, Лосинный островъ, Пушкино—лѣсъ между полотномъ ж. д. и Братовицкой, и лѣсъ между полотномъ ж. д. и Степаньковымъ (С.).

425. *Mulgédium* Cass.

Обертка цилиндрическо-колокольчатая, черепичатая, не отгибается при созревании сѣмян; цвѣты язычковые; цвѣтоложе голое; сѣмянки съ продольными ребрышками, безъ носика или сужены въ очень короткій носикъ; хохолокъ изъ простыхъ очень ломкихъ волосковъ, окруженъ у основанія широкимъ остро-зубчатымъ колечкомъ.

1022. *M. macrophyllum* (Willd.) DC. Пет. Кр. II, стр. 63.



Mulgédium macrophyllum.

Многолѣтнее: стебель примостоящій, 60—150 см., голый; листья по краямъ неравно-зубчатые, снизу вдоль жилки шершавые; нижніе—копьевидно-сердцевидные съ черешками постепенно расширенными въ влагалище; средніе—часто ланцетные съ треугольно-яйцевидной крупной конечной долей и боковыми долями угловатыми; верхніе листья сидячіе, яйцевидно-ланцетные или ланцетные, съ стрѣловиднымъ стеблеобъемлющимъ основаніемъ, верхушечные линейно-ланцетные; соцветіе—щитковидная метелка съ болѣе длинными нижними вѣтвями; обертка 14 мм. дл.; листочки ея железисто-щетиnistые, какъ и цвѣтопосы; наружныя—ланцетные, внутреннія—линейные, туповатые; цвѣты голубые.

Найдено занесеннымъ на берегу р. Москвы противъ Архангельскаго, Звн. у.

426. *Sónchus* L.

Обертка яйцевидная или колокольчатая, по отцвѣтаніи часто коническая, черепичатая; цвѣтоложе голое; цвѣты язычковые; сѣмянки овальныя, сплюснутыя, съ 6—20 ребрышками, безъ носика, но съ хохолкомъ изъ простыхъ мягкихъ бѣлыхъ волосковъ.

1. Сѣмянки съ каждой стороны съ 3 выдающимися ребрышками; стебель б. ч. почти отъ основанія вѣтвистый, полый, легко сплюсчиваемый; растеніе однолѣтнее. 2.

Сѣмянки съ каждой стороны не менѣе чѣмъ съ 5 выдающимися ребрышками; стебель простой, съ вѣточками только въ соцветіи, хотя и полый, но не сплюсчиваемый; растеніе многолѣтнее. 3.

2. Листья мягкіе съ мягкими колючками, тусклые; сѣмянки между ребрышками съ косыми морщинами и края ихъ шершавые.

S. oleraceus L.

Листья жесткіе, лоснящіеся; зубчики оканчиваются довольно жесткими колючками; сѣмянки между ребрышками гладкія; ребрышки гладкія или слабо-шероховатыя.

S. asper (L.) Hill.

3. Боковыя лопасти у листьевъ длинно-ланцетныя или линейно-ланцетныя; сѣмянки желтоватыя, среднее ребрышко ихъ сильно выдается надъ соседними боковыми, отчего сѣмянка кажется о 3 ребрышкахъ.

S. palustris L.

Боковыя лопасти у листьевъ треугольныя, треугольно-ланцетныя или выемчато-зубчатыя; сѣмянки темно-бурыя съ явственно выдающимися 5 ребрышками.

S. arvensis L.

1023. *S. oleráceus* L. Пет. Кр. II, стр. 45. — Ф. О., № 6, p. 86. — Пет., стр. 282. — Кауф. II, № 445. — Цин., № 889. — Кауф. I, стр. 291. — Lind., p. 134. — Дв., № 728. — Макс., № 730. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 134. — Поф., № 3137. — St. II, p. 46. — St. I, № 516. — Pal., № 1743.

Sonchus oleraceus L. α. laevis. St. I, № 516α.

Корень однолѣтній, веретенообразный; стебель 30—125 см., прямо-стоящій, голый, б. ч. вѣтвистый, голый или въ верхней части, какъ и обертки, съ стебельчатыми железками; листья голые, съ нижней стороны сизо-зеленые, съ верхней—темно-зеленые, тусклые, по краямъ мелко-выемчато-зубчатые; зубчики оканчиваются мягкой колючкой; нижніе стеблевые листья струговидные или ланцетовидные, суженные въ черешокъ, къ основанію б. ч. расширенный и стеблеобъемлющій; верхніе стеблевые — сидячіе, сердцевиднымъ основаніемъ стеблеобъемлющіе, обратно-яйцевидные или сходны съ нижними, но мельче; соцвѣтіе щитковидное; обертка 10—13 мм. дл., сперва слегка паутинистая, потомъ голая; цвѣты свѣтло-желтые, длинше обертки; сѣмянки 3 мм. дл., свѣтло-бурыя, съ 3 ребрышками съ каждой стороны, между ребрышекъ косо-морщинистыя и по краю шероховатыя.



Sonchus oleraceus.

По огородамъ и близъ жилья, очень часто. Цвѣтеть съ начала іюня до глубокой осени.

Распадается на слѣдующія формы:

α. *integrifolius* Wallr.

Верхніе листья обратно-яйцевидные, съ широкимъ сердцевиднымъ стеблеобъемлющимъ основаніемъ, нижніе—иногда ланцетные.

β. *lacerus* Coss. et Germ.

Sonchus oleraceus L. β. *lacerus* Wallr. Бух. II, № 249. — Бух. I, № 238. — Кауф. II, стр. 298. — Кауф. I, стр. 291.

Всѣ листья глубоко струговидно-перисто-раздѣльные или перисто-надрѣзные; конечная доля треугольная, крупнѣ боковыхъ.

1024. *S. áster* (L.) Hill.

Sonchus asper Vill. Пет. Кр. II, стр. 45.—Бух. II, № 250.—Бух. I, № 239.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 282.—Кауф. II, № 446.—Цин., № 890.—Кауф. I, № 291.—Дв., № 729.—Mart., p. 134.

Sonchus oleraceus L. *β. asper* L. Макс., № 730.—Hoff. II., № 6242.—St. I, № 516.

Однолѣтнее: стебель прямостоящій, 30—125 см., вѣтвистый, голый, голый или вѣточки соцвѣтій, всѣ или нѣкоторые съ стебельчатыми железками; корневые листья сужены въ крылатый черешокъ; нижніе стеблевые сходны съ корневыми; верхніе—сидячіе, сердцевиднымъ основаніемъ стеблеобъемлющіе; всѣ обратно-яйцевидные или продолговато-обратно-яйцевидные, иногда слегка выемчатые, тупые или заостренные, сверху темно-зеленые, лоснящіеся, снизу свѣтлѣе, по краямъ остро-неравно- и колюче-зубчатые, иногда волнистые; корзинки въ щитковидномъ соцвѣтѣ; обертка 12—15 мм. дл., голая или до распусканія иногда слегка опушенная; листочки ея ланцетные, заостренные, короче цвѣтовъ; послѣдніе ярко- или золотисто-желтые; сѣмянки 3 мм. дл., бурья, съ 3 гладкими или слабо-



Sonchus asper.

шероховатыми ребрышками съ каждой стороны, между ребрышекъ сѣмянки гладкія.

По огородамъ и близъ жилья, сорное. Цвѣтетъ съ начала іюня до поздней осени.

1025. *S. arvensis* L. Пет. Кр. II, стр. 45.—Бух. I, № 240.—F. O., № 6, p. 86.—Пет., стр. 282.—Кауф. II, № 447.—Цин., № 891.—Pinz. p. 13.—Кауф. I, стр. 292.—Дв., № 727.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 134.—St. II, p. 46.—St. I, № 515.—Pal., № 1742.

Корень многолѣтній, цилиндрическій ползучій; стебель прямостоящій, 30—150 см.; листья б. ч. струговидно-перисто-раздѣльные, то широкіе, то очень узкіе, вытянутые; верхніе—часто ланцетные или линейно-ланцетные, выемчато-зубчатые; стеблевые—сидячіе съ основаніемъ сердцевидно-стеблеобъемлющимъ, ушковатымъ; нижніе—сужены наподобіе крылатата черешка, тоже стеблеобъемлющаго, всѣ по краямъ мелко-неровно и колюче-зубчатые; соцвѣтіе развѣтвленное щитковидное; обертка 12—20 мм. дл.; листочки ея продолговато-ланцетные, туповатые; цвѣты ярко-желтые или золотисто-желтые; сѣмянки темно-бурья, 3—3,5 мм. дл., о 5 косо-морщинистыхъ ребрышкахъ съ каждой стороны.

По посевамъ, паровымъ полямъ, огородамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ конца юня до глубокой осени.

Распадается на слѣдующія формы:

α. **typicus** GB. Бух. II, № 251.

Обвертка и цвѣтоножки б. или м. густо покрыты стебельчатыми железками.

β. **laevipes** Koch.

Sonchus arvensis L. β. glaber. Schult. Пет. Кр. II, стр. 46. — Бух. II, № 251β. — F. O., № 6, p. 86. — Кауф. II, стр. 298. — Цин., стр. 277. — Pinz., p. 13. — Кауф. I, стр. 292.

Sonchus uliginosus MB. Макс., № 728.

Обвертка и цвѣтоножки совершенно голыя; листья съ округлыми зубчатыми ушками.

γ. **hastatus** Kauffm. Пет. Кр. II, стр. 45. — F. O., № 6, p. 86. — Кауф. II, стр. 298. — Pinz., p. 13. — Кауф. I, стр. 292.

Листья у основанія съ удлинненными острыми ушками; цвѣтоножки и обвертка голыя. По берегу пруда въ Царицынѣ (К.). — Въ Мож. у. (Ф. О.). — Мытищи (С.).



Sonchus arvensis.



Sonchus palustris.

1026. **S. palustris** L. Пет. Кр. II, стр. 45. — Дв., № 726. — Макс., № 727. — Mart., p. 134. — Hoff., № 3138. — St. II, p. 46. — St. I, № 514. — Pal., № 1741.

Корень многолѣтній, цилиндрическій, узловатый, косой, иногда слегка ползучій; стебель 1—2 м., прямостоящій, гранистый, слегка сѣроваточный и, какъ обвертка, съ желтыми железистыми волосками, рѣдко почти голый; листья по краямъ рѣсниччатые и равномерно колюче-зубчатые, струговидно-перисто-раздѣльные, съ крупной стрѣловидной, длинно-вытянутой конечной долей; боковыя лопасти длинно-ланцетныя или линейно-ланцетныя; основаніе листьевъ стеблеобъемлющее съ стрѣловидными, заостренными отстоящими ушками; верхушечные листья продолго-

вато-ланцетные или линейно-ланцетные: раскрыты корзинки до 3 см. въ поперечникѣ: обертка 12 — 13 мм. дл.: цвѣты желтые: сѣмянки 4—5 мм. дл. съ толстой каймой, призматическія, едва сплюснутыя, блѣдно-желтоватыя, съ 5 ребрышками съ каждой стороны, слегка косо-морщинистыя: среднее ребрышко много крупнѣе остальныхъ, отчего съ перваго взгляда сѣмянка кажется о 3 ребрышкахъ.

По болотистымъ кустарникамъ, очень рѣдко. Цвѣтеть съ начала іюля до сентября. Находится въ гербаріи Максимовича за № 318².

427. *Crépis* L.

Обертка цилиндрическая, колокольчатая или полушаровидная, изъ одного ряда равныхъ внутреннихъ листочковъ и наружныхъ болѣе короткихъ; цвѣты язычковые: цвѣтолюже яченое, голое или шероховато-волосистое: сѣмянки цилиндрическія, голыя, шероховатыя или гладкія, б. ч. съ явственными продольными ребрышками, къ верхушкѣ сужены, иногда съ ясно замѣтнымъ носикомъ: хохолокъ многорядный изъ простыхъ, бѣлыхъ, мягкихъ волосковъ, рѣдко волоски грязновато-желтые.

1. Стебель безлиственный; все листья корневые.

C. praemorsa Tausch.

Стебель покрытъ листьями. 2.

2. Листья очень крупныя, яйцевидныя или яйцевидно-ланцетныя, нижніе—25 см. дл. и 12 см. ш. или крупнѣе, быстро сужены въ крылатый черешокъ, края котораго струговидно-зубчатые, верхніе листья сидячіе: сѣмянки съ 30 тонкими ребрышками.

C. sibirica L.

Листья, даже нижніе, много мельче: сѣмянки о 10—15 ребрышкахъ. 3.

3. Стебель, особенно въ нижней части, покрытъ отстоящими, курчавыми волосками.

C. biennis L.

Стебель голый или покрытъ войлочными прижатыми волосками. 4.

4. Верхніе листья линейные; обертка опушенная, но безъ черныхъ стебельчатыхъ железокъ.

C. tectorum L.

Верхніе листья ланцетные или овально-ланцетные; обертка покрыта длинными, черными стебельчатыми железками.

C. paludosa (L.) Moench.

1027. *C. praemorsa* Tausch. Пер. Кр. II, стр. 46. — Ф. Б., № 49. — Пер., стр. 173. — Кауф. II, № 448. — Мил., № 22. — Гор., № 53. — Цин., № 886. — Кауф. I, стр. 293.

Hieracium praemorsum L. Дв., № 743. — Макс., № 720. — Hoff. II., № 6353. — Mart., p. 137. — St. II, p. 47. — St. I, № 526. — Pal., № 1758.

Многолѣтнее: корень цилиндрическій, какъ бы обрубленный; стебель прямостоящій, 30—65 см., покрытъ короткими курчавыми волосками, безлиственный, оканчивается метельчатымъ соцветіемъ: корневые

листья розеткой, продолговатые, эллиптические или обратно-яйцевидные, суженные к основанию, съ округлой или заостренной верхушкой, цѣльнокрайніе или зубчатые, иногда слегка выемчато-зубчатые, съ обѣихъ сторонъ б. или м. густо-опушенные, особенно вдоль жилокъ; верхушечныя корзинки распускаются раньше; обертка 8—11 мм. дл., цилиндрическо-колокольчатая; внутренніе ея листочки линейно-ланцетные, почти голые или съ немногими щетинистыми волосками; наружныя — ланцетные, вполнѣ короче внутреннихъ и гуще опушены; цвѣтоложе голое; цвѣты желтые; сѣмянки едва суженныя къ верхушкѣ, 4—5 мм. дл., о 6—10 тонкихъ ребрышкахъ съ каждой стороны; хохолокъ чисто бѣлый.

По кустарникамъ, опушкамъ и лѣсамъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ половины мая до конца іюня. Между Краснымъ Станомъ и Костинымъ. Руз. у. (Ч. и П.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.).—Между Подольскомъ и Дубровицами (Куль.).—Борисово, Срп. у. (М.).—Лужки, Срп. у. (С.).—Близъ Никифорова, Срп. у.; Бѣлые Колодези, Кіев. у. (П.).—Рождествено на р. Парѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).



Crepis praemorsa.



Crepis biennis.

1028. *C. biennis* L. Пет. Отч., стр. 13.—Пет. Кр. II, стр. 46.—Пет., стр. 173.—Кауф. II, № 449. — Цил., № 885. — Кауф. I, стр. 294. — Дв., № 747. — Маке., № 726.—Нoff. II., № 6382.—Mart., p. 138.—Нoff., № 1045.—St. II, p. 47.—St. I, № 532.

Корень двулѣтній, веретенообразный; стебель 60—100 см., прямо-стоящій, ребристый, покрытъ, особенно въ нижней части, курчавыми отстоящими волосками, въ верхней части вѣтвистый; листья съ обѣихъ сторонъ покрыты короткими щетинистыми волосками, отчего шершавые; нижніе—струговидно-перисто-надрѣзные, суженные въ черешокъ; средніе, какъ и нижніе, но сидячіе стеблеобъемлющимъ основаніемъ, б. ч. съ зубчатыми ушками; верхніе — линейно-ланцетные, зубчатые; корзинки въ полудлѣтничномъ соцѣтій; обертка 10—12 мм. дл.; внутренніе листочки ея ланцетные, б. ч. сѣро-войлочные и часто съ жесткими черноватыми

волосками; наружные — вполнину или на двѣ трети короче внутреннихъ и болѣе густо опушены; цвѣты желтые, вдвое длиннѣе обертки; цвѣтоложе густо-волосистое; сѣмянки 4 — 5 мм. дл., бурья, о 10—17 ребрышкахъ, тонко-косо-морщинистыхъ.

По холмамъ и кустарникамъ, очень рѣдко. Цвѣтеть съ начала іюня до половины августа; плоды съ половины іюня.

Распадается на слѣдующія формы:

α. *platyphylla* Wallr.

Доли листьевъ яйцевидныя, рѣже яйцевидно-ланцетныя.

β. *lácera* Wimm. et Grab.

Листья глубоко-строговидно-перисто-раздѣльныя съ узкими, часто у основанія надрѣзными долями; дольки почти линейныя. Обѣ формы вмѣстѣ. Близъ Серпухова (Цин.). — Рождествено на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

1029. *C. tectorum* L. F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 173. — Кауф. II, № 450. — Цин., № 884. — Pinz., p. 14. — Кауф. I, стр. 294. — Lind., p. 132. — Ann., C. V, № 35. — Дв., № 746. — Макс., № 725. — Hoff. II., № 6905 (вмѣсто 6405). — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 138. — St. II, p. 47. — St. I, № 531.

Однолѣтнее; корень веретенообразный; стебель примостоящій, 30—100 см., слегка войлочно-опушенный, рѣже почти голый, б. ч. сильно вѣтвистый; листья голые, или только вдоль жилокъ съ нижней стороны



Crepis tectorum.

опушенные; корневые — розеткой прилегаютъ къ землѣ; нижніе — ланцетные или линейно-ланцетные, выемчато-зубчатые или строговидно-выемчато-надрѣзные, сужены въ черешокъ; средніе походятъ на нижніе, но стрѣловиднымъ основаніемъ стеблеобъемлющіе; верхніе — б. ч. линейные, цѣлюкрайніе съ завернутыми краями; раскрытыя корзинки 15—20 мм. въ поперечникѣ, на нѣсколько утолщенныхъ цвѣтоножкахъ, тонко-войлочно-опушенныхъ, какъ и обертка; цвѣтоложе съ короткими волосками; обертка 7—9 мм. дл., иногда слегка железистая; внутренніе ея листочки линейные, заостренные, съ внутренней стороны прижато-опушенные; наружные листочки обертки неравной длины, вполнину короче внутреннихъ; цвѣты желтые; сѣмянки 2.5—3 мм. дл., бурья, о 10 ребрышкахъ, едва морщинистыхъ.

По открытымъ мѣстамъ, паровымъ полямъ, посявамъ и близъ жилья, очень часто. Цвѣтеть съ начала іюня до поздней осени; плоды съ конца іюня.

Распадается на слѣдующія формы:

- α. *typicum* Rupr. Бух. II, № 253. — Бух. I, № 242. — Кауф. II, стр. 301. — Кауф. I, стр. 294.

Нижніе листья струговидные, средніе—глубоко-зубчатые, верхніе—линейные съ явственно стрѣловидными ушками.

- β. *segetalis* Roth.

Нижніе листья слегка выемчато-зубчатые, средніе—почти цѣльнокрайніе, крайніе съ очень маленькими ушками; стебель б. или м. вѣтвистый.

- γ. *gracilis* Wallr.

Всѣ листья линейные, цѣльнокрайніе, часто безъ ушковъ; растение маленькое, часто съ простымъ стеблемъ обѣ одной корзинкѣ. *)

- δ. *microcéphala* Rupr. Кауф. II, стр. 301. — Цил., стр. 274. — Кауф. I, стр. 294.

Стебель почти голый, отъ самаго основанія метельчато-вѣтвистый; корзинки много мельче, часто вдвое. Между г. Дмитровымъ и д. Анастасино, на паровомъ полѣ (II. и X.).

1030. *C. paludosa* (L.) Moench. Бух. II, № 252. — Бух. I, № 241. — F. O., № 6, p. 86. — Нер., стр. 173. — Кауф. II, № 451. — Цил., № 888. — Кауф. I, стр. 295.

Hieracium paludosum L. Дн., № 742. — Макс., № 722. — Hoff. H., № 6346. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 136. — St. II, p. 47. — St. I, № 528. — Pal., № 1760.

Многолѣтнее: корень какъ бы обрубленный съ многочисленными толстыми корешками; стебель примостоящій, 50—120 см., съ не большимъ числомъ листьевъ, голый, какъ и все растение, или въ верхней части опушенный, простой или щитковидно-вѣтвистый; нижніе листья обратно-яйцевидные, суженные въ черешокъ, выемчато- или струговидно-зубчатые; стеблевые—яйцевидно-продолговатые, б. ч. съ заостренной верхушкой и съ стрѣловиднымъ стеблеобъемлющимъ основаніемъ, по краю длинно-зубчатымъ, рѣже основаніе листьевъ сердцевидно-стеблеобъемлющее; края стеблевыхъ листьевъ то почти цѣльные, то рѣдко-зубчатые; обвертка 8—12 мм. дл., колокольчатая, черно-зеленая, слегка паутинисто-опушенная и густо покрыта длинными черными стебельчатыми железками; внутренніе ея листочки линейно-ланцетные, наружные—вильчатые короче и прижаты къ внутреннимъ; цвѣты ярко-желтые, почти

*) Между α. *typicum* Rupr., β. *segetalis* Roth и γ. *gracilis* Wallr. наблюдаются переходы: попадаются экземпляры съ листьями на всемъ стеблѣ почти цѣльнокрайними, но съ замѣтными ушками, или же съ листьями въ нижней части стебля зубчатыми, въ верхней цѣльнокрайними, но безъ ушковъ; такіе экземпляры находятся въ гербаріи А. А. Хорошкова.

вдвое длиннѣе обертки; цвѣтоложе голое; сѣмянки 4—5 мм. дл. о 10 едва замѣтныхъ ребрышкахъ; хохолокъ желтоватый.

По болотамъ, болотистымъ кустарникамъ и лѣсамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ начала іюня до августа; плоды съ конца іюня.



Crepis paludosa.



Crepis sibirica.

1031. *C. sibirica* L. Пет. Отч., стр. 13.—Хор. I, стр. 19.—Пет. Кр. II, стр. 47.—Ф. Б., № 48.—Пет., стр. 173.—Кауф. II, № 452.—Гор., № 54.—I[ня., № 887.—Кауф. I, стр. 295.—Дв., № 748.—Макс., № 727.—Нoff., № 1055.—St. II, p. 47.—St. I, № 530.—Pal., № 1769.

Hieracium sibiricum Lam. Рупр., стр. 86.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 137.

Многолѣтнее; корень толстый, узловатый; стебель 50—150 см., прямостоящій, крупно-ребристый, б. или м. густо покрытъ курчавыми отстоящими волосками, болѣе густо на цвѣтоножкахъ; листья шершавые, по краямъ рѣсничатые, слегка опушенные, особенно съ нижней стороны по жилкамъ, неравно-выемчато-зубчатые; зубцы часто нѣсколько вытянутые; нижніе листья яйцевидные, яйцевидно-ланцетные или продолговато-эллиптическіе, очень крупныя, заостренныя, быстро сужены въ длинный крылатый, струговидно-зубчатый черешокъ; средніе стеблевые—сидячіе, стеблеобъемлющіе, постепенно становятся мельче къ верхушкѣ стебля; обертка 15—18 мм. дл. черновато-зеленая, слегка опушенная или почти голая; листочки ея ланцетные, внутренніе—вдвое или на одну треть длиннѣе наружныхъ; цвѣты ярко-желтые, вдвое длиннѣе обертки; сѣмянки 8—10 мм. дл. съ 30 тонкими, нѣсколько морщинистыми ребрышками; хохолокъ грязно-бѣлый.

По кустарникамъ, опушкамъ и лѣснымъ полянамъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ начала іюня весь июль. Серпуховъ (Стеф.).—Близъ Лужковъ, Срп. у. (М.).—Рождествено на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Бавыкино, Срп. у. (П.).—Бѣлые Колодези, Кзм. у. (Же. Бот. Лаб.).—По р. Мочи близъ Подольска (Куль.).—Ознобишино, Пдл. у. (Х.).

428. *Hierácium* L. *)

Обработалъ А. И. Петуниковъ.

Обертка яйцевидная или полушаровидная, черенчатая, иногда съ наружными листочками очень мелкими; цвѣты язычковые; цвѣтоложе ячеистое, голое, рѣдко рѣсниччатое; сѣмянки цилиндрическія, къ основанію слегка суженныя и на верхушкѣ усѣченныя, ребристыя; хохолокъ желтоватый. 1—2-рядный, иногда еще съ наружными короткими щетинками; волоски ломкіе, простые.

Для правильнаго и безошибочнаго опредѣленія разнообразныхъ формъ рода *Hierácium* необходимо располагать значительнымъ числомъ экземпляровъ каждой формы (не менѣе 8—10), вполнѣ хорошо развитыхъ; особенно важно при этомъ обращать вниманіе на нижніе листья, на подземные и надземные побѣги, и потому при собираніи этихъ растений слѣдуетъ осторожно выкапывать ихъ, но никакъ не вырывать. При опредѣленіи слѣдуетъ обращать вниманіе на характеръ опушенія всѣхъ частей растенія, которое у большинства формъ бываетъ трехъ родовъ: простые волоски, часто съ утолщеннымъ темнымъ основаниемъ, иногда очень тонкіе, мягкіе, иногда жесткіе щетинистые; они всего сильнѣе развиваются въ верхней части растенія, а также въ нижней части стебля у корневой розетки листьевъ и на нижней поверхности листа вдоль средней жилки; железистые волоски, покрывающіе обыкновенно верхнюю часть растенія и иногда верхній край листьевъ; наконецъ, звѣздчатые волоски или, правильнѣе, звѣздчатый пушокъ, при сильному развитіи придающій сѣрую или сѣдую окраску покрытымъ имъ частямъ растенія; особенно важенъ послѣдній родъ опушенія для распознаванія видовъ и близкихъ между собою формъ; всего лучше замѣтно такое опушеніе на нижней поверхности листьевъ и притомъ на верхнемъ стеблевомъ листѣ, а также на листьяхъ побѣговъ. Существеннымъ признакомъ для распознаванія видовъ служатъ также побѣги какъ подземные, такъ и надземные; послѣдніе ветвятся сравнительно рѣдко въ видѣ тонкихъ блѣдныхъ отраслей, очень ломкихъ, покрытыхъ мелкими чешуйчатыми листочками; по размѣщенію и размѣрамъ листьевъ на побѣгахъ тоже хорошо различаются формы *Hierácium*: у однихъ листья постепенно уменьшаются къ верхушкѣ побѣга, у другихъ замѣтно возрастаютъ, у третьихъ всѣ они почти одинаковой величины и часто скучены въ пучокъ. Форма соцвѣтія можетъ служить отличительнымъ признакомъ только группъ, но никакъ не видовъ или подвидовъ; кромѣ ниль-

*) Матеріалъ по части *Hierácium*, использованный для флоры Московской губерніи, былъ очень обширенъ; онъ содержалъ много сотенъ листовъ изъ гербаріевъ: А. И. Петуникова, А. А. Хорошкова, П. В. Сюзева, Б. М. Кузькова и моего, а также нѣсколько экземпляровъ вновь найденныхъ формъ, собранныхъ С. С. Ганешинимъ. Весь этотъ матеріалъ былъ опредѣленъ извѣстнымъ знатокомъ рода *Hierácium*—Герм. Цаномъ, въ Карлсруэ. Насколько трудно опредѣленіе видовъ этого рода, можно заключить изъ того, что даже Цанъ впадалъ въ ошибки, опредѣляя одинъ и тѣ же виды въ разное время различно. Изучивъ весь матеріалъ вышеупомянутыхъ пяти гербаріевъ, Цанъ написалъ статью, которую первоначально предполагалось помѣстить въ эту флору; но, къ сожалѣнію, Цанъ вдался въ такія подробности, что въ книгѣ, не предназначенной для специалистовъ, онъ не только затрудняетъ опредѣленіе, но иногда даже сбиваютъ въ тѣхъ случаяхъ, когда описаніе подвида или формы даннаго вида противорѣчитъ описанію самого вида. Послѣ совмѣстной съ А. И. Петуниковымъ тщательной провѣрки всего матеріала мы рѣшили, что включать статью Цана въ Московскую флору ни по объему, ни по характеру изложенія нельзя, и А. И. Петуниковъ взялъ на себя трудъ обработать виды *Hierácium* Московской флоры, опредѣленные Цаномъ; статья же послѣдняя полностью будетъ помѣщена въ одномъ изъ специальныхъ журналовъ.

чатого расположения корзинокъ особенно распространено цимозное соцветіе, которое принимаетъ видъ то ложнаго зонтика, то ложной метелки. Особенно выдвигаются, какъ отличительный признакъ, размѣры обертки корзинокъ въ длину, которые признаются постоянными; но форма листочковъ въ оберткѣ—узкіе или широкіе, тупые или острые, а также ширина свѣтлаго края листочковъ представляютъ далеко не стойкіе признаки для разграниченія не только видовъ, но и подвидовъ. При чрезвычайномъ разнообразіи формъ *Hieracium*, при отсутствіи стойкости и постоянства въ какихъ-либо опредѣленныхъ признакахъ, которые могли бы характеризовать ту или другую форму, всѣ попытки составить ключъ для опредѣленія полнаго ряда описанныхъ доселѣ формъ оказались неудачными даже у монографовъ: онѣ могли быть охарактеризованы лишь совокупностью многихъ мелкихъ признаковъ,—отсюда чрезвычайно подробныя и длинныя описанія каждаго отдѣльнаго вида. Еще труднѣе очертить различія между установленными подвидами и ихъ разновидностями. Поэтому въ данномъ случаѣ пришлось отказаться отъ описанія того длиннаго ряда подвидовъ и формъ, какой оказался въ Московской флорѣ. Да и въ отношеніи нѣкоторыхъ видовъ въ томъ объемѣ, какъ они очерчены монографами, пришлось отступить за невозможностью охарактеризовать ихъ съ достаточною легкостью и опредѣленностью.

Обзоръ рода.

Подродъ *Pilosella* Tausch.

Сѣмянки не свыше 2.5 мм. дл., съ ребрышками, выступающими на верхнемъ краѣ короткими зубчиками. Корневиче часто даетъ побѣги; листья образуютъ почти всегда корневую розетку; стебель безлистный или о немногихъ листьяхъ, рѣдко покрытъ большимъ числомъ листьевъ.

A). *Acaulia* N. P.

Цвѣтоносный стебель въ видѣ стрѣлки надъ корневой розеткой листьевъ, обѣ 1 корзинкѣ; листья снизу съ б. или м. бѣлымъ войлокомъ изъ звѣздчатаго пушка.

I. *Pilosellina* Fries.

Цвѣтоносный стебель изъ корневой розетки въ видѣ стрѣлки обѣ 1 корзинкѣ; изъ пазухъ листьевъ часто выходятъ побочныя стрѣлки обѣ 1 корзинкѣ, или же вильчато-развѣтвленный стебель; всегда развиваютъ побѣги.

H. *Pilosella*.

B). *Cauligera* N. P.

Цвѣточный стебель съ розеткою корневыхъ листьевъ или безъ розетки съ немногими листьями, рѣже съ большимъ числомъ ихъ; съ соцветіемъ о немногихъ или весьма многихъ корзинкахъ въ видѣ ложнаго зонтика или ложной метелки; съ побѣгами или безъ побѣговъ.

a.) *Cauligera humilia* N. P.

Стебель не высокій (не болѣе 15 см.), при основаніи б. или м. восходящій; соцветіе о немногихъ корзинкахъ (2—5).

II. *Auriculina* N. P.

Листочки обертки мелкіе, зеленые, голые или отъ звѣздчатаго пушка б. или м. сѣдые, рѣдко густоволосые, съ железистыми

волосками; листья лопатчатые или линейные, б. или м. сизые, б. ч. безъ звѣздчатого пушка или только снизу съ рѣдкимъ звѣздчатымъ пушкомъ, часто съ разбѣянными длинными волосками; съ побѣгами или безъ нихъ.

H. Auricula, *H. Schultesii*.

3.) *Cauligera elata* N. P.

Стебель б. ч. высокій (выше 20 см.), при основаніи прямой или приростоящій; соцветіе о многихъ или очень многихъ корзинкахъ.

1) *Chlorophylla* N. P.

Листья эллиптическіе, продолговатые или ланцетные, б. или м. мягкіе, чисто-зеленые или нѣсколько желтовато-зеленые; стеблевыхъ мало, къ верхушкѣ часто железистыхъ.

III. *Pratensina* Aschers.

Стебель б. или м. полый, легко сплющиваемый; побѣги всегда развиты, очень легко отламывающіеся, часто подземные съ блѣдными чешуйками или надземные съ зелеными возрастающими къ верхушкѣ листьями; б. ч. всюду съ жестковатыми волосками; стеблевыхъ листьевъ мало (1—2); соцветіе сжато-метельчатое, къ верхушкѣ б. или м. зонтичное; цвѣты темно-желтые.

H. pratense, *H. flagellare*, *H. flagellariforme*, *H. spatophyllum*.

IV. *Cymosina* N. P.

Соцветіе въ скученномъ или раскидномъ ложномъ зонтикѣ о многихъ корзинкахъ; стебель плотный или нѣсколько сплющиваемый; побѣговъ нѣтъ, рѣдко подземные, слабые; листья съ обѣихъ сторонъ съ звѣздчатымъ пушкомъ; все растеніе съ частыми короткими волосками.

H. cymigerum, *H. canum*, *H. sciadophorum*, *H. glomeratum*.

2) *Poliophylla* N. P.

Листья ланцетные или продолговатые, б. или м. жесткіе, сѣро-зеленые, стеблевыхъ много, къ верхушкѣ безъ железокъ.

V. *Echinina* N. P.

Стебель плотный, крѣпкій, б. ч. изгибистый, при основаніи часто безъ розетки корневыхъ листьевъ; все растеніе покрыто щетинками и густымъ звѣздчатымъ пушкомъ; побѣговъ нѣтъ.

H. echinoides, *H. fallax*.

3) *Glaucophylla* N. P.

Листья линейные или ланцетные, б. или м. жестковатые, сизые, стеблевыхъ мало (у основанія стебля) или нѣсколько; къ верхушкѣ листья всегда безъ железокъ.

VI. *Pracaltina* N. P.

Б. ч. съ разбѣянными длинными волосками; стебель б. ч. твердый и плотный; побѣговъ нѣтъ или они многочисленныя; листья безъ звѣздчатого пушка или снизу съ рѣдкимъ звѣздчатымъ пушкомъ;

соцветіе — ложная метелка или вверху ложный зонтикъ о многихъ или очень многихъ корзинкахъ, мелкихъ, съ не частымъ звѣздчатымъ пушкомъ.

H. praealtum, *H. brachiatum*, *H. arvicola*, *H. paragogum*, *H. floribundum*,
H. apatellum, *H. acrocomum*, *H. Zizianum*, *H. calodon*, *H. umbelliferum*,
H. auriculoides.

Подродъ *Euhieracium* Torr. et Gray.

Сѣмянки почти всегда болѣе 3 (—4,5) мм. дл., желтыя, свѣтло-бурыя, каштановыя или черныя, ребристыя; ребрышки сливаются вверху въ кольцевой валикъ; корневище никогда не даетъ побѣговъ, обновляется сидячими зимующими розетками или закрытыми почками; стебель б. ч. о многихъ листьяхъ.

A). *Phyllopoda* Godet.

Стебель при основаніи съ розеткой корневыхъ листьевъ; обновляется сидячими розетками.

I. *Vulgata* Fries.

Листья чисто- или сѣро-зеленыя, мягковолосые, съ сердцевиднымъ усѣченнымъ, округлымъ или суженнымъ основаніемъ.

H. silvaticum, *H. vulgatum*.

B). *Aphyllopoda* Godet.

Обновляется почками, развивающими стебель, а не розетку; стебель лишь иногда съ немногими листьями у основанія.

II. *Tridentata* Fries.

Листочки обертки прижатые съ очень рѣдкими простыми волосками, но съ железистыми и звѣздчатыми; стеблевыхъ листьевъ много, замѣтно уменьшающихся вверхъ по стеблю.

H. laevigatum, *H. Knafii*.

III. *Umbellata* Fries.

Листочки обертки почти всегда совершенно голые, наружные б. или м. оттопыренные или отвороченные, всегда тупые; стеблевыхъ листьевъ много одинаковой формы, къ основанію суженныхъ, сидячихъ.

H. umbellatum.

Опредѣлитель видовъ.

1. Корневые листья или нижніе стеблевые широкіе на б. или м. длинныхъ черешкахъ, или же корневой розетки листьевъ нѣтъ и всѣ стеблевые листья сидячіе, многочисленныя, голые; сѣмянки не короче 3 мм., ребрышки ихъ сливаются вверху въ кольцевой валикъ; хохолокъ почти двурядный изъ волосковъ разной длины. 2.

Черешковыхъ листьевъ никогда не бываетъ: всѣ они сужены къ основанію; если стеблевыхъ листьевъ много, то они покрыты жесткими щетинками; сѣмянки не выше 2,5 мм. дл. (чаще же только 1—2 мм.), съ ребрышками, выступающими на верхнемъ краѣ короткими зубцами; хохолокъ изъ однородныхъ и почти равныхъ волосковъ. 6.

2. Листочки обертки темные, голые или покрыты только очень разсыпнымъ звѣздчатымъ пушкомъ, наружные отогнутые; рыльца желтыя; самая верхушка соцветія б. ч. зонтичная.

H. umbellatum L.

Листочки обертки б. или м. густо опушены звѣздчатыми, простыми, вильчатыми или железистыми волосками, наружные не отогнутые—всѣ прижатые; рыльца буроватыя; соцветіе кистистое или метельчатое, верхушка его никогда не бываетъ зонтичная. 3.

3. Всѣ листья съ округлымъ, сердцевиднымъ или усѣченнымъ основаніемъ.

H. silvaticum L.

Всѣ листья съ клиновиднымъ основаніемъ, суженнымъ въ черешокъ. 4.

4. Стеблевыхъ листьевъ 3—4, въ корневой розеткѣ 1—3; обертки и ножки корзинокъ б. или м. железисто-волосистыя.

H. vulgatum Fries.

Стеблевыхъ листьевъ 6 — много, чаще безъ корневой розетки; обертка и ножки корзинокъ очень слабо-железистыя. 5.

5. Обертка съ простыми и вильчатыми волосками и съ очень рѣдкимъ звѣздчатымъ пушкомъ, болѣе густымъ къ основанію обертки.

H. laevigatum Willd.

Обертка съ очень рѣдкими простыми волосками и густымъ звѣздчатымъ пушкомъ.

H. Knafii Celak.

6. Цвѣтоносный стебель въ видѣ стрѣлки обѣ одной корзинкѣ или вильчатый съ 2—немногими крупными корзинками, съ оберткой отъ 8 до 12 мм. дл. 7.

Стебель несетъ обыкновенно много мелкихъ корзинокъ съ оберткой отъ 5 до 8 мм. дл., расположенныхъ ложнымъ зонтикомъ или ложной метелкой. 14.

7. Цвѣтоносный стебель безъ стеблевого листа, обѣ 1 крупной корзинкѣ, рѣдко вильчатый, но тогда обертка съ частыми железистыми волосками; листья въ корневой розеткѣ плотные, сверху зеленые съ длинными простыми волосками, снизу съ звѣздчатымъ пушкомъ, образующимъ густой бѣлой или тонкій сѣрой войлокъ.

H. Pilosella L.

Цвѣтоносный стебель внизу съ однимъ листомъ, рѣже съ двумя, вильчатый о 2 или немногихъ корзинкахъ, иногда только обѣ одной. 8.

8. Верхняя сторона листьевъ безъ звѣздчатого пушка. 9.

Верхняя сторона листьевъ, всегда плотныхъ, иногда только вдоль средней жилки съ звѣздчатымъ пушкомъ; стебель твердый, плотный. *H. canum* N. P.

9. Корзинки крупныя; обертка ихъ отъ 9 до 11 мм. дл. 10.

Корзинки средней величины; обертка 8—9 мм. дл. 12.

10. Стебель съ разсѣянными волосками, простыми и железистыми; обертка безъ простыхъ волосковъ или съ рѣдкими волосками; листья на побѣгахъ разставленные, къ верхушкѣ побѣга болѣе крупныя, снизу съ рѣдкимъ звѣздчатымъ пушкомъ.

H. Schultesii F. Schultz.

Стебель съ обильными железистыми волосками и обыкновенно съ частыми простыми; листья снизу съ частымъ звѣздчатымъ пушкомъ. 11.

11. Обертка корзинокъ, какъ и стебель, съ частымъ звѣздчатымъ пушкомъ; побѣги съ листьями крупными, уменьшающимися къ верхушкѣ побѣга; листья обыкновенно свѣтло-зеленыя, рѣже слегка сизоватыя.

H. flagellare Willd.

Обертка корзинокъ, какъ и стебель, съ слабымъ звѣздчатымъ пушкомъ, кромѣ пожекъ корзинокъ; побѣги съ листьями мелкими, къ верхушкѣ побѣга не уменьшающимися или возрастающими; листья нѣсколько сизоватыя.

H. apatellum N. P.

12. Обертка и ножки корзинокъ безъ простыхъ волосковъ; побѣги короткіе, толстоватыя съ сближенными листьями.

H. paragogum N. P.

Обертка слегка или довольно волосистая; побѣги удлиненыя, тонкіе, съ разставленными листьями. 13.

13. Обертка корзинокъ съ частыми железистыми волосками и густымъ звѣздчатымъ пушкомъ; листья снизу б. или м. войлочные отъ густого звѣздчатого пушка; побѣги съ листьями къ верхушкѣ побѣговъ болѣе мелкими.

H. brachiatum Bertol.

Обертка корзинокъ съ рѣдкими железистыми волосками и рѣдкимъ звѣздчатымъ пушкомъ, какъ и листья; послѣдніе къ верхушкѣ побѣга болѣе крупныя. *H. flagellariforme* G. Schneid.

14. Стебель съ длинными и тонкими побѣгами—надземными съ зелеными листьями или подземными, червеобразными съ чешуйчатыми бѣловатыми листочками. 15.

Стебель безъ побѣговъ или съ короткими побѣгами. 20.

15. Листья къ верхушкѣ побѣга возрастающіе, всѣ сизые, б. ч. или всѣ лопатчатые, тупые; стеблевыхъ листьевъ 1—2 у основанія стебля, съ рѣдкими волосками или голые; корзинокъ мало или немного; стебель не высокій. 16.

Листья на побѣгахъ разставленные, къ верхушкѣ его становятся мельче или сближенные и тогда равновеликіе; корзинокъ много. 17.

16. Листья совершенно безъ звѣздчатаго пушка, голые или съ рѣдкими простыми волосками; стебель низкій (5—40 см.), съ 1 стеблевымъ листомъ при основаніи. *H. Auricula Lam. et DC.*

Листья съ нижней стороны съ звѣздчатымъ пушкомъ; кромѣ наземныхъ побѣговъ, бываютъ и подземные, червеобразные съ чешуйчатыми листьями. *H. spathophyllum N. P.*

17. Листья чисто-зеленые, мягкіе съ частыми короткими волосками снизу съ звѣздчатымъ пушкомъ; побѣги обыкновенно подземные съ чешуйчатыми листьями или наземные съ сближенными крупными листьями; стебель снѣжизнаемый; цвѣты ярко-желтые; обертка съ очень обильными железистыми волосками.

H. pratense Tausch.

Листья б. или м. сизые; побѣги наземные съ разставленными уменьшающимися къ верхушкѣ побѣга листьями; послѣдніе въ корневой розеткѣ ланцетные, острые; обертка съ рѣдкими железистыми волосками. 18.

18. Листья снизу съ звѣздчатымъ пушкомъ, иногда и сверху; стебель съ довольно частымъ звѣздчатымъ пушкомъ и съ частыми простыми волосками. 19.

Листья вовсе безъ звѣздчатаго пушка или рѣдко съ разбѣаннымъ; стебель съ рѣдкимъ звѣздчатымъ пушкомъ и съ рѣдкими простыми волосками.

H. praealtum Vill. ssp. Bauhini Griseb.

19. Стеблевыхъ листьевъ 3 — 6, съ частыми длинными прижатыми, щетинками, какъ и на стеблѣ, особенно у его основанія.

H. auriculoides Lang.

Стеблевыхъ листьевъ 2 — 3, съ короткими рѣдкими и мягкими волосками.

H. umbelliferum N. P.

20. Стебель и листья покрыты щетинками, особенно густыми въ нижней части стебля. 21.

Стебель и листья покрыты б. или м. мягкими волосками. 23.

21. Стебель, особенно въ нижней части, съ приподнятыми или прижатыми щетинками. 22.

Стебель въ нижней части съ оттопыренными щетинками; листья сверху съ б. или м. частымъ звѣздчатымъ пушкомъ; корзинки въ ложномъ зонтикѣ; обертка 5,5—7 мм. дл.

H. fallax Willd.

22. Железистыхъ волосковъ на стеблѣ и на оберткѣ нѣтъ; розетки корневыхъ листьевъ во время цвѣтенія б. ч. нѣтъ; листьевъ на стеблѣ 5—20; цвѣты ярко-желтые. *H. echiioides Lumn.*

Железистые волоски на стеблѣ и на оберткѣ есть; розетка корневыхъ листьевъ б. ч. бываетъ; стеблевыхъ листьевъ 3—6.

H. calodon Tausch.

23. Листья зеленые или желтовато-зеленые, на обоихъ поверхностяхъ съ звѣздчатымъ пушкомъ; корзинки въ ложномъ зонтикѣ. 24.

Листья б. ч. сизые или сизоватые. 25.

24. Опушеніе въ верхней части стебля слабое; волоски всюду рѣдкіе и короткіе (0,5—1 мм.), на листьяхъ не свыше 1 мм., на оберткѣ корзинокъ ихъ нѣтъ или они разсыяны; железистые волоски частые; обертка корзинокъ 5—7 мм. дл.

H. cymigerum Rehb.

Опушеніе въ верхней части стебля или, по крайней мѣрѣ, на оберткѣ густое; волоски обыкновенно длинныя (до 3 мм.), какъ и на листьяхъ; обертка 6,5—8 (9,5) мм. дл.

H. glomeratum Fries.

25. Стеблевые листья, особенно верхніе, съ частымъ звѣздчатымъ пушкомъ снизу, иногда же и сверху, вдоль края и средней жилки. 26.

Стеблевые листья, даже верхніе, вовсе безъ звѣздчатого пушка или съ разсыяннымъ. 29.

26. Все листья въ корневой розеткѣ острые, ланцетные; стебель сплюсциваемый; опушеніе стебля разсыянное; обертка съ частыми железистыми волосками; побѣги, если есть, короткіе, б. ч. надземные.

H. arvicola N. P.

Наружные листья въ корневой розеткѣ тупые, б. ч. лопатчатые или язычковидные. 27.

27. Обертки корзинокъ съ частымъ звѣздчатымъ пушкомъ, какъ и стебель; корзинки въ ложномъ зонтикѣ или ложной метелкѣ. 28.

Обертки корзинокъ, какъ и стебель, съ звѣздчатымъ пушкомъ не частымъ; соцвѣтіе скученное; стебель нѣсколько плотный; железистые волоски по стеблю, на ножкахъ корзинокъ и на оберткѣ густые.

H. sciadophorum N. P.

28. Стебель б. ч. сплюсциваемый; листья рѣдко безъ звѣздчатого пушка сверху; обертки корзинокъ 5—7 мм. дл., нѣсколько волосистыя; соцвѣтіе—б. ч. ложная метелка.

H. Zizianum Tausch.

Стебель не сплюсциваемый, плотный; листья сверху всего чаще безъ звѣздчатого пушка; обертки корзинокъ крупнѣе (6—8 мм. дл.), почти безъ волосковъ; соцвѣтіе—ложный зонтикъ.

H. acrocomum N. P.

29. Стебель твердый и плотный, почти безъ звѣздчатого пушка и всегда безъ побѣговъ; обертка корзинокъ 5—7 мм. дл.

H. praecaltum Vill. ssp. *florentinum* Koch.

Стебель сплюсциваемый съ звѣздчатымъ пушкомъ только сверху стебля, съ короткими побѣгами, надземными или подземными; обертка корзинокъ 7—9 мм. дл.

H. floribundum Wimm. et Grab.


1032. **H. Pilosella L.** Sch. V, № 1282-b. — Пет. Кр. II, стр. 48 и 56. — Бух. II, № 254. — Бух. I, № 243. — F.O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 201. — Кауф. II, № 453. — Цин., № 894. — Кауф. I, стр. 297. — Lind., p. 134. — Дн., № 38. — Макс., № 716. — Hoff. II, № 6348. — Gold. C., p. 22. — Gold. Sp., p. 134. — Mart., p. 136. — Hoff., № 1633. — St. II, p. 47. — St. I, № 524. — Pal., № 1756.

Hieracium Pilosella L. α , farinaceum. Pinz., p. 14.

Hieracium Pilosella L. Fl. suec., ed. 2, (1775) p. 272.

Корневище удлиненное; побѣги длинные, тонкіе, съ листьями разставленными и къ верхушкѣ побѣга замѣтно уменьшающимися; листья только корневые въ розеткѣ, плотные, сверху зеленые или слегка сизоватые, снизу сѣровато-зеленые или чаще бѣло-войлочные отъ частаго звѣздчатаго пушка, б. или м. ланцетные, продолговатые или обратно-яйцевидные, тупые или острые, сверху съ прижатыми, довольно жесткими и длинными волосками; стрѣлка до 30 см. (рѣдко до 50), иногда нѣсколько вторичныхъ стрѣлокъ; обертки кориннокъ 8—12 мм. дл. очень разнообразно опушенные: то густо-волосистыя, съ частыми железистыми волосками и сѣдыя отъ звѣздчатаго пушка, то съ рѣдкими простыми и железистыми волосками и менѣе частыми звѣздчатыми; цвѣты свѣтло- или сѣрно-желтые, краевые часто снизу съ красными полосками.

По лугамъ, кустарникамъ и лѣсамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половины мая до осени.



Hieracium Pilosella.



Hieracium Auricula.

1033. **H. Auricula Lam. et DC.** Пет. Кр. II, стр. 49 и 57.

Hieracium Auricula L. Ф. Б., № 50. — F. O., № 6, p. 86. — Пет., стр. 201. — Кауф. II, № 456. — Гор., № 55. — Цин., № 898. — Кауф. I, стр. 299. — Gold. C., p. 22.

Hieracium dubium L. Mart., p. 137.

Hieracium Auricula Lam. et DC., Fl. fr. IV (1805), p. 24.

Корневище горизонтальное, довольно толстое; побѣги длинные, тонкіе, съ листьями къ верхушкѣ побѣга болѣе крупными; листья въ корневой

розеткѣ лопатчатые или линейно-ланцетные, сизые, б. или м. dospищаея, безъ звѣздчатого пушка и съ рѣдкими простыми волосками; стебель низкій, не выше 40 см., у основанія съ однимъ листомъ; соцветіе скученное о немногихъ корзинкахъ (2 — 5) на короткихъ ножкахъ, рѣже корзинка одна; обертка 6—8 мм. дл., безъ простыхъ волосковъ, но съ рѣдкимъ звѣздчатымъ пушкомъ и частыми железистыми волосками, какъ на ножкахъ, такъ и по всему стеблю; цвѣты желтые, иногда краевые снизу съ красными полосками.

По дугамъ и паровымъ полямъ, не часто. Цвѣтеть съ половины іюня весь іюль. На Поклонной горѣ близъ Москвы (Никитинъ).—Близъ Петровскаго, Клин. у. (Ч.).—Ваулино, Мож. у. (Ф. О.).—Стреево, Мож. у. (Ф. Б.).—Мытищи, Звягинио, Каргашинио, Рупосово, Пушкино на моховомъ болотѣ по берегу р. Серебрянки; Братовищина, Дмит. у. (С.).—Карамышево, Раменье, Дмит. у.; Бирево, Клин. у. (П. и С.).—Захарово, Клин. у.; Абушково, Лешково, Зви. у. (П.).—Волочаново, Влк. у. (П. и Х.).—Близъ платформы Влахернская—Савеловской ж. д., Дмит. у. (Х.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.).

× *H. Schultésii* F. Schultz. = *H. Auricula* × *Pilosella*. Archives de Flore de Fr. et d'Allem., I (1842), p. 35.—Fl. der Pfalz (1846), p. 276.

Корневище горизонтальное; побѣги удлиненные, довольно толстые, съ разставленными листьями, б. или м. крупными, возрастающими къ концу побѣга; листья въ розеткѣ продолговато-ланцетные, тупые или острые, б. ч. сизоватые, тонкіе, съ не частыми мягкими волосками, снизу съ звѣздчатымъ пушкомъ; стрѣлка до 35 см. обѣ 1—2 корзинкахъ, иногда съ маленькимъ листомъ, покрыта разсыянными простыми и железистыми волосками и звѣздчатымъ пушкомъ, отъ котораго верхъ стрѣлки сѣдоватый; обертка корзинокъ 9—10 мм. дл., безъ простыхъ волосковъ, рѣже съ разсыянными волосками, но съ частыми железистыми и сѣдоватая отъ звѣздчатого пушка; цвѣты желтые или свѣтло-желтые, часто краевые снаружи съ красными полосками.—Походитъ болѣе на *H. Pilosella*,



Hieracium Schultesii.

но отличается отъ нея болѣе тонкими листьями, слабымъ звѣздчатымъ опушеніемъ съ нижней стороны листьевъ и б. ч. маленькимъ стеблевымъ листомъ.

Бирево, Клин. у. (П.).—Братовищина, Дмит. у. (Ганешинъ).

1034. *H. pratense* Tausch. Sch. V, № 1289-d. — Пет. Кр. II, стр. 49 и 59. — F. O., № 6, p. 86. — Кауф. II, № 460. — Цин., № 903. — Кауф. I, стр. 300.—Lind., p. 134.—Ann., C. IV, № 21.

Hieracium collinum Gochnat. Нер., стр. 200.

Hieracium dubium L. Mart., p. 137.

Hieracium pratense Tausch *β. sylviculum* Fries. Кауф. II, стр. 308. — Кауф. I, стр. 301.

Hieracium pratense Tausch. Flora (1828) Erg.-Bl. I, p. 56. — *H. collinum* N. P., I, p. 298, nec Gochnat, Tent. Cichor., p. 17 (1808).

Корневище почти горизонтальное, толстоватое; побѣги двойного рода: одни подземные тонкіе, червеобразные, б. ч. розоватыя, съ блѣдными чешуйками, очень ломкіе; другіе надземные короткіе, съ листьями довольно крупными одинаковой величины и сближенными пучкомъ; листья въ корневой розеткѣ мягкіе, чисто-зеленые или желтовато-зеленые, продолговатые или ланцетные, или же лопатчато-ланцетные, съ частыми волосками и съ разбѣяннымъ звѣздчатымъ пушкомъ лишь на нижней поверхности; стебель до 80 см., сплюсциваемый, съ 2—3 стеблевыми листьями; соцвѣтіе б. или м. скученное, съ довольно большимъ числомъ корзинюкъ; обертка 6—8 мм. дл., съ частыми и длинными волосками (отъ 1,5 до 4 мм. дл.), какъ на ножкахъ и на стеблѣ, а также съ обильными железистыми волосками, которые постепенно убываютъ внизъ по стеблю; звѣздчатое опушеніе на оберткѣ рѣдкое, ножки б. или м. войлочные, стебель слегка опушенъ; цвѣты темно-желтые.



Hieracium pratense.

По сыроватымъ лугамъ, кустарникамъ и лѣсамъ, очень часто. Цвѣтетъ съ половиною іюня весь іюль.

× **H. flagellare** Willd. Нер. Кр. II, стр. 52.

Hieracium auriculaeforme Fries. F. O., № 6, p. 86. — Кауф. II, № 454. — Цин., № 896. — Кауф. I, стр. 298.

Hieracium furcatum Hoppe. F. O., № 6, p. 86. — Цин., № 897.

Hieracium piloselliflorum N. P. Sch. V, № 1286. H. Zahn исправилъ свое опредѣленіе въ *H. flagellare* Willd.

Hieracium flagellare Willd. Enum. hort. Berol., suppl. (1813), p. 54. = *H. pratense* × *Pilosella* P. M. E., Fl. Preuss. (1850) p. 339. — *H. collinum* × *Pilosella* N. P., I, p. 378.

Корневище почти горизонтальное, толстоватое; побѣги удлиненные, иногда вѣтвистые, съ листьями то сближенными, и тогда одинаковой величины, то болѣе мелкими къ верхушкѣ побѣга, или же болѣе крупными; листья въ розеткѣ ланцетные, продолговатые, иногда эллиптическіе или обратно-яйцевидные, свѣтло-зеленые или слегка сизоватые, б. ч. довольно крупные, сверху безъ звѣздчатого пушка, снизу съ обильнымъ пушкомъ, почти сѣдовато-зеленые; стебель до 40 см., б. ч. сплюсциваемый, вильчатый, о 2—6 корзинкахъ, рѣдко обѣ одной и съ однимъ стеблевымъ

листомъ ниже середины стебля, иногда почти у основанія; обертка 9—11 мм. дл. съ рѣдкими или частыми простыми и железистыми волосками, какъ на стеблѣ, и густымъ звѣздчатымъ пушкомъ; цвѣты желтые, краевые снизу часто съ красными полосками.

По мѣстамъ нѣсколько влажнымъ и на паровыхъ поляхъ, не рѣдко. Цвѣтеть съ половины іюня весь іюль.



Hieracium flagellare.



Hieracium flagellariforme.

× **H. flagellariforme G. Schneid.** Пет. Кр. II, стр. 57.

Hieracium furcatum Fries. Кауф. II, № 455.—Кауф. I, стр. 298.

Hieracium stoloniflorum W. K. Кауф. въ герб. за № 356.

Hieracium flagellariforme G. Schneid. *Hierac. Westsud.* (1889), p. 119. = *H. flagellare* × *Auricula* sensu lat. Zahn.

Корневище косое; побѣги удлинённые, тонкіе, нѣжные, съ разставленными листьями, къ верхушкѣ побѣга болѣе крупными; листья въ розеткѣ лопатчатые съ верхушкою слегка вдоль сложенною, сизоватые, разсѣинно-волосистые, снизу съ рѣдкимъ звѣздчатымъ пушкомъ (рѣже вовсе безъ пушка); стебель до 25 см., тонкій, слегка волосистый и железистый, вверху съ частымъ звѣздчатымъ пушкомъ, внизу съ рѣдкимъ, вильчатымъ, о 2—4 корзинкахъ и съ однимъ листомъ ниже середины; обертка 7—8 мм. дл., слегка волосистая и железистая, съ рѣдкимъ звѣздчатымъ пушкомъ; ножки сѣдоватия отъ звѣздчатаго пушка, разсѣинно-волосисты и железисты; цвѣты свѣтло-желтые. — Отличается отъ *H. flagellare* болѣе мелкими корзинками, сизыми б. или м. лопатчатыми листьями и менѣе густымъ звѣздчатымъ опушеніемъ; отъ *H. Auricula*: вильчатымъ стеблемъ и б. ч. присутствіемъ звѣздчатыхъ волосковъ на нижней сторонѣ листьевъ.

Цвѣтеть въ іюнѣ, іюлѣ. Иваньково (К.).—Волочаново, Влк. у. (Х.).

× **H. spathophyllum N. P.** Пет. Кр. II, стр. 53.

Hieracium spathophyllum N. P., I, p. 386 = *pratense* × *Auricula* (= *collinum* × *Auricula* N. P., l. c.).

Корневище почти горизонтальное; побѣги двойного рода: одни подземные, тонкіе съ бѣлыми чешуйками, какъ у *H. pratense*; другіе надземные, съ листьями сближенными, къ верхушкѣ побѣга болѣе крупными, какъ у *H. Auricula*; листья въ корневой розеткѣ б. или м. сизоватые, лопатчатые или ланцетные, или же продолговатые, съ рѣдкими волосками и съ слабымъ звѣздчатымъ пушкомъ снизу, б. ч. только по спинной жилкѣ и всего замѣтнѣе на стеблевыхъ листьяхъ; стебель до 40 см., сплюсчиваемый, ниже середины съ 1—2 листьями; соцвѣтіе о небольшомъ числѣ корзинокъ (2—15); обертка 6—8 мм. дл., съ волосками частыми или рѣдкими и съ очень обильными железками, какъ на ножкахъ, такъ и на стеблѣ, но съ рѣдкимъ звѣздчатымъ пушкомъ, тогда какъ ножки отъ пушка сѣдя и стебель вверхъ значительно опушены; цвѣты чисто желтые.—Считается промежуточной формой и даже помѣсью между *H. pratense* и *H. Auricula*. Отъ первого разнится сизоватою окраскою листьевъ, лопатчатыхъ и б. или м. тупыхъ, съ рѣдкими волосками; надземными побѣгами, какъ у *H. Auricula*, и небольшимъ числомъ корзинокъ; отъ второго вида — болѣе высокимъ ростомъ, большимъ числомъ корзинокъ, болѣе частыми волосками нежели у *H. Auricula*, и присутствіемъ звѣздчатаго пушка на нижней поверхности листьевъ.



Hieracium spathophyllum.

По лугамъ и паровымъ полямъ. Цвѣтетъ съ начала іюня до половины іюля. Близъ Каргашина (Х.). — Мытници (С.). — Раменье, Дмит. у. (П. и С.). — Поповка, Кн. у.; Раменское, Брн. у.; Повинки, Абуньково, Звн. у. (П.). — Красный Станъ, Руз. у. (Сюз.).

1035. *H. cymigerum* Rchb.

Hieracium cymosum L. Пет. Кр. II, стр. 50 и 59. — Пет., стр. 201. — Дв., № 740. — Макс., № 719. — Hoff. II., № 6320. — Gold. C., p. 22. — Mart., p. 137. — Hoff., № 1621. — St. II, p. 47. — St. I, № 525. — Pal., № 1757.

Hieracium Nestleri Vill. F. O., № 6, p. 86. — Кауф. II, № 458. — Цин., № 902. — Кауф. I, стр. 300.

Hieracium Nestleri Vill. α. *hirsutum* Koch. Кауф. II, стр. 307. — Кауф. I, стр. 300.

Hieracium Nestleri Vill. β. *Vaillantii* Koch. Кауф. II, стр. 307. — Pinz., p. 14. — Кауф. I, стр. 300.

Hieracium cymigerum Rchb., Fl. Germ. excurs (1830), p. 262.

Корневище короткое толстое; побѣговъ нѣтъ; листья въ корневой розеткѣ зеленые или желто-зеленые, продолговатые или ланцетные, мягкіе, съ очень короткими и частыми волосками и съ звѣздчатымъ пушкомъ на обѣихъ сторонахъ листа, на верхней разсыпнымъ, на нижней б. ч. густымъ; стебель до 80 см., несколько сплюсчиваемый, съ очень короткими и рѣдкими волосками, только внизу болѣе частыми, но съ ча-

стымъ звѣздчатымъ пушкомъ, о 2—3 листьяхъ ниже первой трети стебля; соцветіе скученное ложнымъ зонтикомъ о большомъ числѣ корзинокъ (до 30 и болѣе); обертка 5—7 мм. дл., безъ волосковъ или съ рѣдкими короткими волосками, какъ и на почкахъ, но съ обильными железистыми и съ довольно частымъ звѣздчатымъ пушкомъ, отъ котораго ножки кажутся сѣрыми; цвѣты ярко-желтые.

По паровымъ полямъ и опушкамъ, не рѣдко. Цвѣтетъ съ начала іюня весь іюль. Спасское, Ивановское (К.).—Мытници, Рупосово, Пушикино; Братовицина, Дмит. у.; Оедосыно, Звн. у. (С.).—Хорошово, Останкино; Софьино, Быково, Брн. у.; Хотѣичи, Бгр. у.; Клычево, Кзм. у.; Серпуховъ, Тураево, Никифорово, Сри. у.; Красный станъ, Руз. у. (Н.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.).—Измчиново (Х.).



Hieracium cymigerum.



Hieracium canum.

× *H. canum* N. P., I, p. 428. = *H. cymosum* × *Pilosella*, F. Schultz, Archives I (1854), p. 9.—Wimm., Fl. Schles., ed. 3 (1857), p. 319.—*Pilosella Laschii* Schultz frat., in Flora (1862) p. 424.

Корневище короткое, толстоватое; побѣги надземные толстоватые, со многими листьями, къ верхушкѣ побѣга болѣе мелкими, какъ у *H. Pilosella*, есть и боковыя розетки; листья въ розеткахъ ланцетные острые, зеленые или желтовато-зеленые, нѣсколько плотные, сѣдые отъ звѣздчататаго пушка, сверху болѣе рѣдкаго, и съ разбѣиными простыми волосками; стебель вильчатый о 2—6 корзинокъ, до 35 см., плотный, сѣдой отъ густаго звѣздчататаго пушка, съ рѣдкими и очень короткими простыми волосками и частыми железистыми, особенно вверху стебля; стеблевой листъ одинъ въ нижней части стебля; обертка 9—9,5 мм. дл., съ обильнымъ звѣздчатымъ пушкомъ и частыми железистыми волосками; цвѣты свѣтло- или темно-желтые, краевые иногда слегка красноватые.

По лугамъ и кустарникамъ на пескѣ, очень рѣдко. Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюль. Влизъ Хотѣичъ, Бгр. у. (Н.).

× **H. sciadophorum** N. P. = *H. cymosum* × *Auricula* N. P., I, p. 440. — Пет. Кр. II, стр. 54.

Корневище б. или м. косое, толстоватое; побѣговъ обыкновенно нѣтъ, рѣже короткіе побѣги; обновляется сидячими розетками; листья въ розеткѣ сизоватые, наружные лопатчатые, округло-тупые, прочіе продолговатые или лопатчатые, ланцетные островатые, б. ч. нѣсколько плотные, съ рѣдкими простыми волосками и звѣздчатымъ пушкомъ не только съ нижней стороны, но перѣдко и на верхней; стебель до 40 см., нѣсколько твердый, съ рѣдкими простыми волосками, болѣе частыми книзу, и съ частыми железистыми, особенно въ верхней части и на ножкахъ, но съ мало развитымъ звѣздчатымъ пушкомъ; стеблевыхъ листьевъ 1—3; соцветіе скученное, съ небольшимъ числомъ корзинокъ (3—12) на короткихъ ножкахъ; обертка 6,5—8 мм. дл., съ рѣдкими простыми волосками и обильными железистыми, но не частымъ звѣздчатымъ пушкомъ; цвѣты желтые или темно-желтые. — Походить на *H. Auricula*, но отличается звѣздчатымъ опушеніемъ листьевъ и б. ч. отсутствіемъ побѣговъ; отъ *H. cymosum* общимъ обликомъ и сизыми листьями.

По лугамъ и паровымъ полямъ, рѣдко. Цвѣтетъ въ іюнѣ. Хмѣтеево. Кн. у. (П.). — Нушкино (С.).



Hieracium sciadophorum.



Hieracium glomeratum.

× **H. glomerátum** Fries. Sch. V, № 1278a. — Пет. Кр. II, стр. 54.

Hieracium glomeratum Fries, Symb. (1848), p. 38 = *H. cymosum* × *collinum* N. P., I, p. 463. (*H. cymosum* × *pratense*).

Корневище короткое, толстоватое, обновляется сидячими розетками безъ побѣговъ, рѣже короткими подземными побѣгами; листья въ корневыхъ розеткахъ, свѣтло- или желто-зеленые, наружные б. или м. лопатчатые тупые, остальные продолговатые или узко-ланцетные, съ простыми волосками и съ звѣздчатымъ пушкомъ съ обѣихъ сторонъ, сверху рѣдкимъ, а снизу болѣе частымъ; стебель до 90 см., б. ч. сплюснутый, съ рѣдкими волосками или вверху почти безъ нихъ и болѣе частыми

внизу, съ частыми железистыми волосками и частымъ звѣздчатымъ пушкомъ; стеблевыхъ листьевъ 2—4; соцветіе ложно-зонтичное о многихъ корзинкахъ (иногда до 50—60); обертка 6,5—8 мм. дл., съ простыми волосками и обильными железками, опушеніе звѣздчатыми волосками довольно обильное; ножки войлочные и железисты; цвѣты желтые или темно-желтые.

По паровымъ полямъ, холмамъ и опушкамъ, не часто. Цвѣтеть въ іюнѣ и іюлѣ. Мытищи, Рупосово (С.).—Ромашково; Медвѣдское, Дмит. у.: Хмѣтьево, Клин. у.; Тураево, Серп. у. (П.).—Романцево, Мож. у. (В.).

1036. *H. echioides* Lumn. Пет. Кр. II, стр. 51.

Hieracium leucosephalum Rupr. Пет., стр. 199.—Кауф. II, № 461.—Гор., № 56.—Цин., № 900.

Hieracium echioides Lumn., Monn., essai (1829), p. 27.—Koch. Syn. ed. 2, II (1844), p. 541.—N. P., I, p. 481.

Стебель до 80 см., б. или м. изгибистый, твердый, плотный, съ толстыми щетинистыми волосками приподнято-прижатыми, особенно частыми въ нижней части стебля, и съ густымъ звѣздчатымъ пушкомъ, но безъ железистыхъ волосковъ; побѣговъ нѣтъ; стеблевыхъ листьевъ много (5—15), въ корневой розеткѣ листья обыкновенно скоро засыхающіе, всѣ ланцетные жесткіе, толстоватые, сѣро-зеленые отъ звѣздчатаго пушка и толсто-щетинистыхъ волосковъ, густо покрывающихъ обѣ поверхности; соцветіе б. ч. ложный зонтикъ о 10—35 корзинкахъ на сѣро- или бѣло-войлочныхъ ножкахъ, но безъ простыхъ волосковъ и вовсе безъ железистыхъ; обертки 7—9 мм. дл., сѣдые или бѣловатыя, съ простыми свѣтлыми волосками, но вовсе безъ железистыхъ волосковъ; цвѣты ярко-желтые; зубчики ячеекъ на цвѣтоложѣ по краю волосистые.



Hieracium echioides.

По песчанымъ и бесплоднымъ мѣстамъ. рѣдко. Цвѣтеть съ середины іюня весь іюль. Хотѣичи, Бир. у. (К.).—Комарево, Тарбушево, Калм. у. (П.).—Между Ильинскимъ и Харловымъ, Калм. у. (П. и С.).

× *H. fallax* Willd. Enum. hort. Berol. (1809), p. 822. = *H. echioides* × cymosum N. P., I, p. 514.

Стебель до 50 см., б. ч. слегка изгибистый, твердый, плотный, съ щетинистыми волосками, болѣе частыми книзу, прямо или почти горизонтально отклоненными, съ частымъ звѣздчатымъ пушкомъ и разстѣянными железистыми волосками; стеблевыхъ листьевъ 3—7, ланцетныхъ, островатыхъ, желтовато-зеленыхъ, довольно жесткихъ, съ очень частыми щетинистыми волосками и съ обѣихъ сторонъ съ не частымъ звѣздчатымъ пушкомъ; листья въ корневой розеткѣ есть, ко времени цвѣтенія

не засыхают; соцветіе ложнымъ зонтикомъ о 5—18 корзинкахъ на ножкахъ съ сѣдымъ или бѣлымъ войлокомъ изъ звѣздчатаго пушка; обертки 7—8 мм. дл., сѣдые отъ звѣздчатаго пушка, съ частыми простыми волосками и къ верхушкѣ листочковъ обертки съ рѣдкими железистыми волосками, какъ и на ножкахъ; цвѣты ярко-желтые.—Отъ *H. eschiioides* отличается присутствіемъ корневой розетки листьевъ, отстоящими щетинистыми волосками и присутствіемъ железистыхъ волосковъ на оберткѣ; отъ *H. cymosum* — болѣе обильными стеблевыми листьями, болѣе частымъ звѣздчатымъ пушкомъ и щетинистыми волосками.



Hieracium fallax.

По песчанымъ мѣстамъ, рѣдко. Цвѣтеть съ половины іюня весь іюль. Въ лѣсу отъ Белогородской слободы къ Крутынкамъ. Срп. у. (П. и Х.). — Близъ Лужковъ, Срп. у. (С.).—Комарево, Калм. у. (П.).

1037. *H. praealtum* Vill. F. O., № 6, p. 86. — Кауф. II, № 457. — Цип., № 899. — Pinz., p. 14.—Кауф. I, стр. 299.—Lind., p. 134.

Hieracium praealtum Koch α. *epipsilum* Kaulfm. Кауф. II, стр. 306. — Кауф. I, стр. 299.

Hieracium Auricula L. Макс., № 717.—Hoff. H., № 6310.

Hieracium dubium L. Дв., № 739. — Макс., № 718.—Hoff. H., № 6321.—Hoff., № 1622.

Стебель б. ч. твердый, плотный, до 80 см., съ разсыпными волосками или тонкими мягкими щетинками, рѣдкимъ звѣздчатымъ пушкомъ и не частыми железистыми волосками; стеблевые листья (1—3) б. ч. въ нижней половинѣ стебля; побѣговъ нѣтъ или они очень длинныя, тонкіе; листья въ розеткѣ б. или м. сизые, жесткіе ланцетные или линейноланцетные, съ рѣдкими волосками и белъ звѣздчатаго пушка (рѣдко съ очень разсыпнымъ на нижней сторонѣ); соцветіе ложной метелкой о многихъ корзинкахъ на тонкихъ ножкахъ; обертка 5—7 мм. дл., съ рѣдкими волосками, съ рѣдкимъ звѣздчатымъ пушкомъ и довольно частыми железками.

По лугамъ, опушкамъ, кустарникамъ и по паровымъ полямъ, часто. Цвѣтеть съ половины іюня весь іюль.

Встрѣчаются слѣдующіе подвиды:

ssp. *Bauhini* Griseb.

Hieracium praealtum Koch β. *fallax*. (DC.). Кауф. II, стр. 307.—Кауф. I, стр. 300.

Hieracium magyaticum N. P. Sch. V, № 1279. — Бух. II, № 257. — Пет. Кр. II, стр. 51.—Пет., стр. 200.

Hieracium piloselloides Vill. Бух. I, № 246.

Побѣги развитые, длинныя, тонкіе, съ мелкими разставленными листьями, къ верхушкѣ побѣга замѣтно уменьшающимися; развиты также сидячія розетки. Встрѣчается очень часто.



Hieracium praealtum α. *Bauhini*.



Hieracium praealtum β. *florentinum*.

ssp. florentinum Koch.

Hieracium florentinum All. Пет. Кр. II, стр. 51.—Пет., стр. 200.

Побѣговъ нѣтъ, одиѣ только сидячія розетки. Рѣже предыдущаго подвида.

× ***H. brachiátum* Bertol.** (ined.) in DC. Fl. fr. II (1815), p. 442 = *H. florentinum* vel *magyaricum* × *Pilosella* N. P., I, p. 610.—*H. acutifolium* Griseb., Comm. (1852), p. 6.—Пет. Кр., II, стр. 53.

Корневище почти горизонтальное; побѣговъ много, они вытянутые, тонкіе, нѣжныя съ разставленными листьями, болѣе мелкими къ верхушкѣ побѣга, какъ у *H. Pilosella*; листья въ корневой розеткѣ ланцетные или продолговатые, рѣже нѣсколько лопатчатые, б. или м. сизые, снизу б. или м. войлочныя отъ густаго звѣздчататаго пушка; стебли до 35 см., тонкіе, плотные, съ не частыми волосками, но съ частымъ звѣздчатымъ пушкомъ и железками, вильчатые, о 2—4 корзинкахъ и обѣ одномъ стеблевомъ листѣ въ самой нижней части стебля; обертка 8—9 мм. дл., съ густымъ звѣздчатымъ пушкомъ и съ довольно частыми простыми и железистыми волосками; цвѣты желтые разныхъ оттѣнковъ, снаружи иногда слегка съ красноватыми полосками.



Hieracium brachiatum.

Очень рѣдко. Цвѣтетъ въ іюнѣ. Останкино (II.).

× *H. arvicola* N. P. Пет. Кр. II, стр. 54.—Бух. II, № 255.

Hieracium pratense Tausch & *setosum* Kauffm. Бух. I, № 244.

Hieracium praealto × *Nestleri* Kauffm. Кауф. II, № 459. — Цин., стр. 280.—Кауф. I, стр. 303.

Hieracium fallax DC. герб. Гольдбаха.

Hieracium arvicola N. P., I, p. 666. = *H. florentinum* × *collinum* L. c. (*H. florentinum* × *pratense*).

Стебли до 60 см., сплюсциваемые, съ разбѣянными простыми волосками, железистыми и съ рѣдкимъ звѣздчатымъ пушкомъ, съ 1—3 стеблевыми листьями; обновляется розетками или короткими побѣгами б. ч. подземными, какъ у *H. pratense*; листья въ корневой розеткѣ б. или м. сизоватые, нѣсколько мягкіе, ланцетные или продолговато-ланцетные, не рѣдко съ обѣихъ сторонъ, но б. ч. только снизу, съ звѣздчатымъ пушкомъ; соцветіе въ ложной метелкѣ; корзинки на ножкахъ б. ч. войлочныхъ отъ звѣздчатого пушка, который также покрываетъ, но не такъ густо, обертки въ 6—8 мм. дл., съ частыми железистыми волосками и рѣдкими простыми; цвѣты желтые разныхъ оттѣнковъ, краевые иногда на верхушкѣ нѣсколько красноватые.—Отъ *florentinum* отличается сплюсциваемымъ стеблемъ, болѣе мягкими листьями съ звѣздчатымъ опушеніемъ и встрѣчающимися побѣгами; отъ *H. pratense* менѣе частыми простыми волосками и сизою окраскою листьевъ.

По лугамъ, паровымъ полямъ, часто. Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ.



Hieracium arvicola.



Hieracium paragógum.

H. paragógum N. P. I, p. 653. = *H. florentinum* × *Auricula* × *Pilosella* N. P., I. c.

Корневище б. или м. горизонтальное или косое; побѣги короткіе толстоватые съ довольно крупными сближенными листьями; стебель до 20 см., съ разбѣянными простыми волосками, до самаго основанія съ железистыми волосками и съ частымъ звѣздчатымъ пушкомъ, о 2—3 корзинкахъ, вильчато расположенныхъ, и съ 1 стеблевымъ листомъ; корневые листья въ розеткѣ ланцетные, ланцетные, тупые, сизые, толсто-

ватые, съ рѣдкими и жесткими волосками по краю, снизу сѣро-зеленые отъ звѣздчатого пушка; обертка 8 мм. дл., безъ простыхъ волосковъ, сѣдоватая отъ звѣздчатого пушка и съ очень частыми железистыми волосками; цвѣты желтые, краевые иногда на верхушкѣ нѣсколько красноватые.

Цвѣтеть въ июнѣ. Найдено только разъ въ Быковѣ, Брн. у. (Куль.).

✕ **H. floribundum Wimm. et Grab.** Sch. V, № 1276.—Her. Kr. II, стр. 55.

Hieracium Vaillantii Koch. Ann., C. IV, № 22. ex part.

Hieracium pratense Tausch γ. *glabriusculum* Kauffm. Кауф. II, стр. 303. — Кауф. I, стр. 301.

Hieracium floribundum Wimm. et Grab., Fl. Siles. II (1829), p. 204 = *H. florentinum* × *Auricula* × *collinum* N. P., I, p. 688.

Стебли до 50 см., сплюсчиваемые, объ 1—2 листьяхъ, б. ч. ниже срединны стебли; побѣги короткіе надземные, съ листьями скученными крупными или нѣсколько разставленными, или же побѣги удлин-



Hieracium floribundum.

ные переходить въ восходящіе цвѣтоносные стебли, рѣже подземные; листья въ корневой розеткѣ б. или м. сизые, тонкіе, ланцетные или лопатчато-ланцетные, тупые или только наружные тупые, а внутренніе ланцетные, островатые или острые, на обѣихъ сторонахъ безъ звѣздчатого пушка или только снизу съ не частымъ звѣздчатымъ пушкомъ; соцвѣтіе ложною метелкою о 3—20 корзинкахъ; обертка 7—8 мм. дл., съ короткими простыми волосками и частыми железистыми; цвѣты желтые.—По облику походить на *H. florentinum* или очень крупную *H. Auricula*, но съ болѣе обильнымъ опушеніемъ, нежели у обонхъ этихъ видовъ; корзинки какъ у *H. florentinum*, но крупнѣе.

По лугамъ и паровымъ полямъ. Цвѣтеть съ половины іюня весь іюль. Мытищи, Рупосово, Пушкино; Одинцово, Оедосьино, Зви. у. (С.).—Останкино, Куинцово; Семенкова, Зви. у.; Машино, Дмит. у. (П.).—Введенское, Зви. у.; близъ Вирева, Кли. у. (П. и С.).

✕ **H. apatélium N. P.** Sch. V, № 1252.

Hieracium apatelioides Zahn. Sch. VI, № 1804.—Zahn въ 1909 г. низведъ въ ssp.

Hieracium apatélium N. P., I, p. 706 = *H. floribundum* × *Pilosella* N. P., I, c.

Корневище косое, короткое б. или м. толстое; побѣги удлинненные, съ листьями довольно крупными, нѣсколько разставленными, рѣже обліженными; стебли до 50 см., б. или м. толстоватые, сплюсчиваемые, вильчатые, о 2—5 корзинкахъ и объ 1—2 стеблевыхъ листьяхъ, б. или м. низко сидящихъ; опушеніе стебля простыми волосками довольно длинными и тонкими обильное, какъ и железистыми въ верхней части стебля;

листья въ корневой розеткѣ продолговатые или ланцетные, тупые, нѣсколько снѣзые, снизу съ б. или м. густымъ звѣздчатымъ пушкомъ, сверху съ жесткими простыми волосками: обертка 11 мм. дл., съ нечастымъ звѣздчатымъ пушкомъ и частыми волосками, темными или у основанія черными: цвѣты желтые, иногда съ красными полосками снаружи.

По лугамъ и кустарникамъ, не часто. Цвѣтетъ съ половины іюня до половины іюля. Мытищи. Руновое. Ядреево. Пирогово. Братовицка. Дмт. у.: Одессино. Внуково. Звл. у. (С.).—Косино. Кожухово (П. и С.).

× **H. acrocótum** **N. P.** I, p. 709. = *H. floribundum* × *cymosum* N. P., l. c. — Sch. V, № 1251.

Стебель до 60 см., плотный, съ рѣдкими волосками, густо-железистый. б. ч. съ 2 стеблевыми листьями: побѣговъ нѣтъ: листья въ корневой розеткѣ б. или м. сизоватые, наружные продолговато-ланцетные, внутренніе ланцетные или узко-ланцетные, снизу съ звѣздчатымъ пушкомъ, сверху почти безъ пушка: соцветіе—ложный зонтикъ о 6—15 корзинкахъ; обертка 6—8 мм. дл., почти безъ волосковъ, съ очень частыми железистыми и съ частымъ звѣздчатымъ пушкомъ; цвѣты желтые.

По лугамъ, паровымъ полямъ, рѣдко. Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ. Пушкино (С.).—Измчиново (Х.).



Hieracium apatellum.



Hieracium acrocomum.

× **H. Ziziánium** **Tausch**, in Flora (1828), Erg.-Bl. I., p. 58. = *H. florentinum* × *cymosum* N. P., I, p. 714.—Нер. Кр. II, стр. 55.

Стебель до 80 см., жесткій, часто сплюснутый, о 2—5 листьяхъ: побѣговъ нѣтъ: листья въ корневой розеткѣ б. или м. слегка сизоватые, наружные иногда продолговатые, тупые, внутренніе—ланцетные, острые, сверху рѣдко безъ звѣздчатого пушка, снизу всегда съ звѣздчатымъ пушкомъ; соцветіе зонтичное или метельчатое, скученное или разставлен-

ное, о немногих или очень многих корзинкахъ на войлочныхъ ножкахъ; обертка 5—7 мм. дл., съ частымъ звѣздчатымъ пушкомъ, съ короткими и рѣдкими простыми волосками и болѣе частыми железистыми; цвѣты желтые.—Отъ *H. cymigerum* отличается сизоватыми листьями, отъ *H. florentinum*—присутствіемъ звѣздчатыхъ волосковъ, особенно на нижней сторонѣ листьевъ.



Hieracium Zizianum.



Hieracium calodon.

По лугамъ, полямъ и кустарникамъ, не часто. Цвѣтетъ въ іюнѣ и половинѣ іюля. Мытницы (С.).—Хорошово, Останкино; Софьино, Бри. у.; Клячево, Бѣлые Колодези, Кзм. у. (П.).—Клементьево, Красный Станъ, Руз. у. (Сюз.).

× *H. calodon* Tausch, apud N.P., I, p. 712 = *H. florentinum* × *echioides* N.P., I. c.—Пет. Кр. II, стр. 56.

Стебель до 65 см., торчащій, часто изгибистый, твердый, съ звѣздчатымъ пушкомъ и съ короткими щетинистыми волосками, вверху не частыми, внизу густыми; стеблевыхъ листьевъ 3—6; листья въ корневой розеткѣ, какъ и на стеблѣ, нѣсколько сизые, толстоватые, продолговатые или ланцетные, по обѣимъ сторонамъ съ довольно частыми жесткими щетинками и съ звѣздчатымъ пушкомъ; соцветіе зонтичное или метельчатое о 10—30 корзинкахъ; обертка 7—7.5 мм. дл., съ звѣздчатымъ пушкомъ, какъ и ножки, съ не частыми простыми волосками и разсѣянными железистыми; цвѣты ярко-желтые.—Отъ *H. echioides* отличается присутствіемъ железистыхъ волосковъ; отъ *H. florentinum*—болѣе густыми щетинистыми волосками и обильнымъ звѣздчатымъ пушкомъ.

По лугамъ и холмамъ, рѣдко. Цвѣтетъ съ средины іюня и въ іюлѣ. Между Ильинскимъ и Харловымъ, Бри. у. (П. и С.).—Быково, Бри. у.; Кунава, Хотьвичи, Бгр. у.; Клячево, Каропчеево, Кзм. у. (П.).

× *H. umbelliferum* N. P. Пет. Кр. II, стр. 55.

Hieracium Vaillantii Koch. Ann., C. IV, № 22, ex part.

Hieracium umbelliferum N. P., I, p. 735, = *H. magyaticum* × *cymosum* N. P., I. c.

Стебель до 75 см., о 2—3 листьяхъ,верху съ волосами простыми, железистыми и съ звѣздчатымъ пушкомъ; побѣги сильно удлинненные, тонкіе, съ разставленными листьями, болѣе мелкими къ верхушкѣ побѣга, какъ у *H. Bauhini*; листья въ корневой розеткѣ ланцетные или продолговатые, наружные часто лопатчатые, б. или м. сизые, мягкіе, съ разбѣянными и жесткими волосками, часто короткими, снизу съ разбѣяннымъ или частымъ звѣздчатымъ пушкомъ, какъ и сверху, хотя рѣдкимъ; соцветіе б. ч. въ разставленномъ ложномъ зонтикѣ о большомъ числѣ корзиночекъ (до 50); обертки 5—6 мм. дл., опушеніе ихъ очень разнообразно: б. ч. съ довольно частыми простыми волосками, железистыми и звѣздчатымъ пушкомъ; ножки корзиночекъ сѣды отъ звѣздчатаго пушка, съ простыми и железистыми волосками; цвѣты желтые.—Походить на *H. Bauhini*, но отличается отъ него б. или м. сильнымъ звѣздчатымъ опушеніемъ.

По лугамъ, кустарникамъ и полямъ, не часто. Цвѣтетъ въ іюнѣ и половинѣ іюля. Мытници (С.).—Пѣмчиново (Х.).—Хотѣвич. Бгр. у.; Введенское, Зви. у. (П.).



Hieracium umbelliferum.



Hieracium auriculoides.

× *H. auriculoides* Láng. Syll. pl. nov. I (1821), p. 183. — *H. pannonicum* N. P., I, p. 749 = *H. magyaticum* × *echioides* N. P., I. c.

Стебель до 60 см., преимущественно внизу щетинисто-волосистый, съ не частымъ звѣздчатымъ пушкомъ,верху съ разбѣянными железистыми волосками; побѣги подземные длинныя, тонкіе, съ разставленными мелкими листьями, какъ у *H. Bauhini*; стеблевыхъ листьевъ 3—6, б. или м. сизыхъ; въ розеткѣ наружные листья лопатчатые, тупые, внутренніе ланцетные острые съ щетинистыми волосками, преимущественно по краю и по спинной жилкѣ съ звѣздчатымъ пушкомъ, сверху рѣдкимъ, снизу довольно частымъ; обертка 6 мм. дл., съ звѣздчатымъ пушкомъ, съ простыми во-

досками и не частыми железистыми; ножки сѣдые отъ звѣздчатаго пушка. съ разбѣянными простыми и железистыми волосками; цвѣты желтые.

Найдено только разъ въ Хотѣичахъ, Бгр. у. (П.).

1038. *H. silvaticum* L. Spec. pl. ed. I, p. 803 (pro var.); ed. II, p. 1128.

Hieracium murorum L. Пет., стр. 200.—Кауф. II, стр. 311.—Цип., № 905.—Кауф. I, стр. 302.—Дв., № 741.—Макс., № 721.—Нoff. Н., № 6343.—Mart., p. 137.—Нoff., № 1630.—St. II, p. 47.—St. I, p. 527.

Стебель до 50 см., внизу нѣсколько волосистый; корневыхъ листьевъ много, они широко-яйцевидные, при основаніи сердцевидные или усѣченные, б. или м. длинно-черешковые, чисто-зеленые, мягкіе, снизу сѣро-зеленые, къ основанію обыкновенно зубчатые или надрѣзочно-зубчатые, по краю и по срединной жилкѣ, а также по черешку, съ частыми мягкими курчавыми волосками; стеблевыхъ листьевъ мало (1—2) ниже середины стебля; они черешковые, схожи съ корневыми, но мельче; корзинкохъ 3—15; обертка 9—11 мм. дл., безъ звѣздчатаго пушка, но съ длинными мягкими вильчатыми или двойко-вильчатыми волосками, какъ и на ножкахъ, и съ частыми стебельчатыми железками; цвѣты золотисто-желтые; столбикъ обыкновенно темные; сѣмянки черныя; хохолокъ бѣлоснѣжный.



Hieracium silvaticum.

По лѣсамъ, рѣдко. Цвѣтеть съ іюня до поздней осени. Чижово (Куль.).

1039. *H. vulgatum* Fries. Пет. Кр. II, стр. 60.—Пет., стр. 200.—Кауф. II, № 462.—Гор., № 57.—Цип., № 904.—Кауф. I, стр. 302.

Hieracium vulgatum Fries, Nov. Fl. Suec., ed I, p. 76.—Symb., p. 115.

Стебель до 70 см., съ розеткою остающихся листьевъ отъ 1 до 6, продолговато- или яйцевидно-ланцетныхъ или обратно-яйцевидныхъ, неравно- и крупно-зубчатыхъ, стянутыхъ въ б. или м. длинный черешокъ; сверху листья слегка волосистые, темно-зеленые, снизу блѣднѣе съ рѣдкимъ звѣздчатымъ пушкомъ; стеблевыхъ листьевъ 3—4 до 6, замѣтно уменьшающихся вверхъ по стеблю; самые нижніе б. ч. черешковые, схожіе съ корневыми, зубчатые, остальные ланцетные заостренные или острые, коротко-черешковые; самые верхніе сидячіе суженымъ или б. или м. широкимъ основаніемъ; ложная метелка раскидистая о 3—10 корзинкахъ; обертка до 10 мм. дл., преимущественно съ железистыми волосками, какъ и ножки; цвѣты золотисто-желтые; столбикъ темно-бурый; сѣмянки буро-черныя.

По лѣсамъ, рѣдко. Цвѣтеть въ іюлѣ и въ августѣ.

Встрѣчаются слѣдующіе подвиды:

ssp. Wischniakowii Pet. et Zahn. Hieraciothea Eur., 39, Sched. ad Cent. I, p. 13.

Обертка корзинокъ съ простыми волосками и не частыми железистыми, къ основанію слегка звѣздчато-опушенная; корневыхъ листьевъ мало (иногда ихъ вовсе нѣтъ), края ихъ б. или м. крупнозубчатые; стеблевые листья съ рѣдкимъ звѣздчатымъ пушкомъ.

Въ хвойномъ лѣсу близъ Витенева; Карачарово на р. Волгѣ, Кли. у.; Кочергино, Удино, Дмт. у. (Н.).—Раменье, Дмт. у.; между Хвостовымъ и Клещевымъ, Кли. у. (Н. и С.).—Братовицна, Дмт. у. (Танешинъ).—Чиждово (Куль.).



Hieracium vulgatum ssp. *Wischniakowii*.



Hieracium vulgatum ssp. *arcuatidens*.

ssp. arcuatidens Zahn.

Обертка корзинокъ съ одними железистыми волосками, какъ и ножки корзинокъ, иногда верхушка листочковъ обертки съ мягкими курчавыми волосками, какъ бы съ бородкой; корневыхъ листьевъ до 6, неравно-зубчатыхъ, съ длинными острыми зубцами, нерѣдко сильно согнутыми.

По дорогѣ изъ Сивистунова въ Покровское, Руз. у. (Ч.).—Между Клещевымъ и Хвостовымъ, Кли. у.; между Наповкой и Раменьемъ, Дмт. у. (Н. и С.).

1040. *H. laevigatum* Willd., Hort. Berol. I (1816).

Обновляется зимующими почками; корневые листья ко времени цвѣтенія засыхаютъ; стебель до 1 м., съ большимъ числомъ листьевъ, голый или покрытъ, особенно въ нижней части, слегка курчавыми волосками, вверху б. или м. густо звѣздчатымъ пушкомъ; листья продолговатые, ланцетные или линейно-ланцетные, заостренные, къ основанію

суженные, съ каждой стороны съ 2 — 4 крупными, иногда вытянутыми зубцами, верхняя треть листа пильнокрайняя, часто вытянутая; нижние — съ б. или м. длиннымъ черешкомъ, средние — съ короткимъ, верхние —



Hieracium laevigatum.



Hieracium Knafii.

сидячие, сверху темно-зеленые, б. ч. голые, снизу сѣро-зеленые, б. или м. густо покрыты курчавыми и звѣздчатыми волосками, гуще по жилкамъ; соцвѣтіе метельчатое о 5—многихъ корзинкахъ; обертка 8—10 мм. дл., съ разсыянными простыми и вильчатыми волосками, одиночными железистыми и очень разсыяннымъ звѣздчатымъ пушкомъ, но болѣе густымъ къ основанію обертки; ножки войлочныя; цвѣты золотисто-желтые; рыльца буроватые; сѣмянки 3—4 мм. дл., буро-черныя.

По тѣнистымъ мѣстамъ, очень рѣдко. Цвѣтетъ весь августъ. Горенки (Куль.).—Чиждово (П.).

× **H. Knáfii Čelak.** Prodr. Fl. Bohm. (1867—75) p. 203 = *H. laevigatum* × *vulgatum* Zahn, Hier. d. Schw. (1906), p. 516.

Стебель до 60 см., съ мягкими и рѣдкими волосками, почти безъ железистыхъ, въ верхней части съ звѣздчатымъ пушкомъ; листьевъ въ розеткѣ иногда до 3, они черешковые, яйцевидные или эллиптическіе, грязно-зеленые, слегка выемчато-и широко-зубчатые, къ основанію быстро сужены въ черешокъ; стеблевыхъ листьевъ 6—8, нижніе широко-ланцетные, постепенно суженные въ черешокъ, неправильно выемчато-зубчатые, сверху и снизу съ рѣдкимъ звѣздчатымъ пушкомъ; корзинки немногочисленныя или до 20; обертка 9—10 мм. дл., съ частымъ звѣздчатымъ пушкомъ, съ очень короткими не частыми простыми волосками и съ разсыянными короткими железистыми; цвѣты темно-желтые; столбикъ темнѣе.

По лѣсамъ, очень рѣдко. Цвѣтетъ во второй половинѣ августа. Чиждово (Куль.).

1041. *H. umbellatum* L. Пет. Кр. II, стр. 61.—Бух. II, № 256.—Бух. I, № 245.—F. O., № 6, p. 86.—Нер., стр. 199.—Кауф. II, № 463.—Цин., № 907.—Кауф. I, стр. 302.—Lind., p. 134.—Ann., C. III, № 231.—Др., № 745.—Макс., № 724.—Потт. II, № 6371.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 138.—Потт., № 1642.—St. II, p. 47.—St. I, № 529.—Pal., № 1763.

Hieracium subaudum L. Др., № 743.—Макс., № 723.—Gold. C., p. 22.—Mart., p. 138.

Стебель твердый безъ листьевъ у основанія; всѣ листья стеблевые, б. или м. сближенные, обыкновенно многочисленные, ланцетные, жесткіе, темно-зеленые, снизу блѣдные съ явственными жилками, б. ч. зубчатые; соцветіе къ верхушкѣ ложнымъ зонтикомъ съ различнымъ числомъ корзинокъ и нередко еще съ корзинками въ пазухахъ верхнихъ листьевъ на б. или м. длинныхъ цветоносахъ; обертка съ листочками тупыми



Hieracium umbellatum α. *genulium*.



Hieracium umbellatum β. *linariifolium*.

зелеными или темно-зелеными, наружными оттопыренными и съ отогнутой верхушкой; волосковъ на оберткѣ и ножкахъ нѣтъ; цвѣты золотисто-желтые; рыльца желтые; сѣмянки б. ч. черныя.

По лѣсамъ, опушкамъ, кустарникамъ и паровымъ полямъ, очень часто. Цвѣтетъ съ конца іюля весь августъ.

Встрѣчаются слѣдующія формы:

α. *genulium* Griseb.

Листья б. или м. ланцетные, острые, зубчатые; очень часто.

β. *linariifolium* Wallr.

Листья длинныя, линейныя, очень узкіе въ 1—2 мм. шир. Если мелко зубчатые, то это: var. *stenophyllum* Wimm. et Grab.; если—почти цѣльнокрайніе, то это: var. *filifolium* Fries. По пескамъ у Владычнаго монастыря близъ Серпухова (Пл.).—Борисово, Срп., у. обѣ формы вмѣстѣ (С.).

Конецъ третьей и послѣдней части.

Алфавитный указатель семейств и родов III части.

	<i>Смр.</i>		<i>Смр.</i>
Achillea L.	262	Caprifoliaceae Juss.	199
Adenophora Fisch.	229	Carduus L.	292
Adoxa L.	207	Carlina L.	287
Adoxaceae Engl.	207	Cassandra Don.	19
Ajuga L.	114	Centaurea L.	309
Alectorolophus All.	166	Centaurium Glib.	38
Andromeda L.	18	Centunculus L.	21
Androsace L.	25	Chaeturus Willd.	108
Antennaria Gaertn.	245	Chimophila Pursh.	9
Anthemis L.	259	Chrysanthemum L.	265
Aretium L.	289	Cichorium L.	318
Arctostaphylus Adans.	17	Cirsium Hall.	296
Artemisia L.	271	Compositae Vaill.	230
Apocynaceae R. Br.	40	Convolvulaceae Juss.	42
Asclepiadaceae R. Br.	41	Convolvulus L.	44
Asperugo L.	49	Cortusa L.	29
Asperula L.	186	Crepis L.	336
Aster L.	240	Cucumis L.	215
		Cucurbita L.	214
		Cucurbitaceae Juss.	213
Ballota L.	105	Cuscuta L.	45
Bellis Tourn.	239	Cynara Vaill.	306
Bidens L.	257	Cynoglossum L.	50
Borraginaceae Juss.	47		
Borrugo L.	52	Daruta L.	123
Brunella L.	112	Digitalis L.	140
Bryonia L.	215	Dipsacaceae Lindl.	210
Bupththalmum L.	253	Dracoecephalum L.	89
Calluna Salisb.	20	Echinops L.	286
Calystegia R. Br.	43	Echium L.	58
Campanula L.	219	Elsholzia Willd.	60
Campanulaceae Juss.	216		

	<i>Cmp.</i>		<i>Cmp.</i>
Ericaceae DC.	12	Matricaria L.	269
Erigeron L.	242	Melampyrum L.	171
Eupatorium L.	236	Mentha L.	70
Euphrasia L.	159	Menyanthes L.	33
		Mimulus L.	137
Filago L.	244	Moneses Salisb.	8
Fraxinus L.	31	Monotropa L.	11
		Monotropaceae A. Br.	11
Galeopsis L.	96	Myosotis L.	61
Galium L.	189		
Gentiana L.	35	Naumburgia Moench.	23
Gentianaceae Juss.	33	Nepeta L.	87
Glechoma L.	89	Nicandra Adans.	121
Gnaphalium L.	246	Nonnea Medic.	53
Gratiola L.	138		
		Odontites Pers.	158
Helianthus L.	255	Oleaceae Lindl.	30
Helichrysum Gaertn.	248	Omphalodes Moench.	51
Hieracium L.	341	Onopordon L.	305
Hottonia L.	28	Onosma L.	59
Hyoseyamus L.	122	Origanum L.	76
Hypochoeris L.	320	Orobanchaceae Lindl.	178
Hyssopus L.	80	Orobanche L.	178
Iasione L.	217	Pedicularis L.	168
Inula L.	249	Petasites Adans.	277
		Phlomis L.	109
Knautia Coult.	210	Phyteuma L.	218
		Pieris L.	323
Labiatae Juss.	66	Pirola L.	5
Lactuca L.	329	Pirolaceae Dumort.	5
Lamium L.	91	Plantaginaceae Juss.	179
Lampsana L.	319	Plantago L.	180
Lappula Moench.	50	Polemoniaceae Vent.	46
Lathraea L.	173	Polemonium L.	47
Ledum L.	13	Primula L.	27
Leontodon L.	321	Primulaceae Vent.	20
Leonurus L.	107	Pulicaria Gaertn.	252
Ligularia Cass.	379	Pulmonaria L.	56
Limnanthemum Gmel.	34		
Limosella L.	139	Ramischia Opiz.	10
Linaria Adans.	134	Rubiaceae Juss.	184
Linnaea Gronov.	206		
Lithospermum L.	60	Salvia L.	82
Lonicera L.	203	Sambucus L.	200
Lycium L.	117	Satureja L.	81
Lycopsis L.	53	Scabiosa L.	213
Lycopus L.	74	Scorzonera L.	326
Lysimachia L.	23	Scrophularia L.	132
		Scrophulariaceae R. Br.	123

	<i>Cmp.</i>		<i>Cmp.</i>
Scutellaria L.	110	Tragopogon L.	324
Senecio L.	279	Trientalis L.	22
Serratula L.	308	Tussilago L.	279
Sherardia Dill.	186		
Silybum (Vaill.) Adans.	307	Utricularia L.	174
Solanaceae Juss.	116	Utriculariaceae Endl.	174
Solanum L.	118		
Solidago L.	237	Vaccinium L.	14
Sonchus L.	332	Valeriana L.	208
Stachys L.	101	Valerianaceae DC.	208
Succisa Coult.	212	Verbascum L.	126
Symphoricarpus Juss.	205	Veronica L.	140
Symphytum L.	54	Viburnum L.	202
Syringa L.	30	Vinca L.	40
		Vincetoxicum Moench.	41
Taraxacum Juss.	328		
Thymus L.	77	Xanthium L.	254

Литературные источники.

- Areskin Rob.** Catalogus plantarum circa Moscuam crescentium. Anno 1709.
- Schober Th.** Vegetabilia circa metropolium Moscuam et in ejus territorio sponte nascentia, ordine alphabetico. 1736 (рукопись).
- Gerber Traugott.** Flora mosquensis. 1742 (рукопись).
- Pal. — **Pallas P. S.** Enumeratio plantarum quae in horto D-ni Procopii a Demidowi Moscuae vigent. Petropoli. 1781.
- St. I. — **Stephan Fr.** Enumeratio stirpium agri mosquensis. Mosquae. 1792.
- St. II. — **Stephan Fr.** Nomina plantarum, quas alit ager mosquensis et hortus privatus. Petropoli. 1804.
- Lon. G. — **Londes Dr.** Flora Gorinkensis. Note de quelques plantes aux environs de Gorenki et qui n'y sont point encore observées. — Mem. de la Soc. Im. des Nat. de Moscou. T. I. 1806, p. 113—115.
- Lon. — **Londes Dr.** Seconde note de quelques plantes qui croissent aux environs de Gorenki et qui n'y ont point encore été observées. Ib. p. 282—283.
- Hoff. — **Hoffman G. Fr.** Hortus Mosquensis. Mosquae. 1808.
- Lib. Tr. — **Liboschitz et Trinius.** Flore des environs de St.-Petersbourg et de Moscou. Tom I. St.-Petersbourg. 1811.
- Ad. — **Adams I. M.** Enumeratio stirpium agri Mosquensis et Petropolitani (1813).
- Mart. — **Martius Henr.** Prodrum Flora Mosquensis. Editio altera. Lipsiae. 1817.
- Gold. Sp. — **Goldbach C. L.** Spicilegium Florae Mosquensis. — Mem. de la Soc. Im. des Nat. de Moscou. T. V, 1817, p. 117—141.
- Любошиц и Траниусъ.** Флора С.-Петербургская и Московская. СПб. 1818.
- Gold. C. — **Goldbach Dr.** Catalog der Moskowischen Flora zunächst zum Tausch-verkehr für die Mitglieder des Gesellschaft correspondirender Botaniker. Regensb. Bot. Zeitung. 1820 II, zweite Beilage, p. 17—24.
- Goldbach C. L.** Correspondenz. Ib. IV Jahrg., Erster Band. 1821, p. 63—64.
- Hoff. II. — **Hoffmann G. Fr.** Herbarium vivum sive collectio plantarum siccarum caesariae Universitatis Mosquensis. Pars secunda. Mosqua. 1825.
- Маре. Пут. — **Максимовичъ М.** Отрывки изъ путешественныхъ записокъ по Московской губернии. — Новый магазинъ естеств. исторiи, физики, химii и пр., изд. П. Двигубскимъ, за 1825 г. Часть первая и вторая.

Макс. — **Максимовичъ М. А.** Списокъ растений Московской флоры. Тамъ же. 1826, часть II, стр. 203—224.

Макс. Приб. — **Максимовичъ М. А.** Прибавленіе къ списку растений Московской флоры. Тамъ же. 1826. Часть. III, стр. 215.

Дв. — **Двигубскій П. А.** Московская флора или описаніе растений дикорастущихъ въ Московской губерніи. Москва. 1828.

Толстой М. В. гр. Опытъ ботаническаго календаря или время цвѣтенія дикорастущихъ растений Московской губерніи. — Журналъ Садоводства 1838, №№ 2 и 3.

Borg. — **Borgmann Hannibal.** Plantes rares du gouvernement de Moscou. — Bull. de la Soc. Im. des Nat. de Moscou. 1842, T. XV, p. 699—700.

Ledebour C. Fr. Flora Rossica. Stuttgart. 1842—53. Vol. 1—IV.

Annenkoff N. Observations sur la floraison de quelques plantes cultivées, faites à Moscou, pendant les années 1844-48. — Bull. de la Soc. Im. des Nat. de Moscou. T. XXII, 1849. № III.

Ann. — **Annenkow N.** Flora mosquensis exsiccata. Nomina plantarum primae centuriae et secundae centuriae. — Bull. de la Soc. Im. des Nat. de Moscou. T. XXII, № IV, 1849.; tertia centuriae Ib. T. XXIII, № II, 1850; quartae centuriae et quintae Ib. T. XXIV, № I, 1851.

Анненковъ Н. Наблюденія надъ развитіемъ дикорастущихъ растений Московской губерніи. — Журн. Сельск. Хоз. и Овцеводства, изд. отъ Имп. Моск. Общ. Сельск. Хоз. Москва, 1850. №№ 6, 7, 8 и 9.

Annenkow N. Observations sur les plantes indigènes des environs de Moscou, faites pendant les années 1844-49. — Bull. de la Soc. Im. des Nat. de Moscou. 1851. T. XXIV, №№ 1 et 4.

Semenow N. M. Einige Bemerkungen über die Moskowschen Seerosen. — Bull. de la Soc. Im. des Nat. de Moscou. 1854. T. XXVII, № 1.

П. (Пикунъ П.) Русская флора. Русскіе ятрышники. — Журн. Садов., изд. Росс. Общ. Люб. Сад. 1856. Т. I, Москва.

Волокитинъ Н. Взглядъ на Московскую флору, I и II статьи. — Журн. Садов., изд. Росс. Общ. Люб. Сад. Москва. 1856. Т. I и II.

Lind. — **Lindemann Ed.** Index plantarum quas in variis Rossiae provinciis hucusque inventi et observavit. — Bull. de la Soc. Im. des Nat. de Moscou. 1860 T. XXXIII, № 3, p. 77—190.

Рупр. — **Рупрехтъ Ф.** Геоботаническія изслѣдованія о черноземѣ. — Приложеніе къ X тому Запис. Имп. Ак. Наукъ, № 6. 1866.

Petunnikoff A. Verzeichniss der in Gouvernement Tambow wildwachsenden Pflanzen. — Bull. de la Soc. Im. des Nat. de Moscou. 1865. T. XXXVIII, № 3.

Кауф. I. — **Кауфманъ Н.** Московская флора или описаніе высшихъ растений. Москва. 1866.

Кауф. — **Кауфманъ Н.** О трехъ новыхъ формахъ растений, найденныхъ въ окрестностяхъ Москвы. — Извѣстія Общ. Люб. Естествознанія. Протоколы засѣданій. Т. III, вып. I, стр. 89. Москва. 1866.

Рачинскій С. Московская флора. — „Русскій Вѣстникъ“. Москва. 1866, № 2, стр. 611—49.

- Kauf. An. — **Kaufmann N.** Annotationes botanicae. Index seminum e collectione anno 1868, quae hortus botanicus Universitatis caesareae Mosquensis mutuo committendo offert. — Моск. Унив. Известія за 1868 г., № 9. Приложение. Москва. 1868, стр. 1—10.
- Pinz. — **Pinzger P. Dr.** Kritischer Vergleich der im Gouvernement Moskau wildwachsenden Pflansen mit den gleichen Species der deutschen Flora. — Programm der Sahnner'schen Realschule zu Brandenburg. 1868.
- Kaufmann N. et. Clerc G. On.** Extrait de la Flore de Moscou. — Bull. de la Soc. Im. des Nat. de Moscou. 1870. № II, pp. 357—376.
- Чистяковъ П. Д.** Замѣтка по поводу южной границы сплошныхъ еловыхъ лѣсовъ въ западной части Московской губерніи. — Изв. Имп. Общ. Люб. естествозн. Т. X, вып. I, стр. 14—17. Протоколы засѣданій годъ 9. Москва. 1872.
- Clerc G. O.** Catalogus florum mosquensis. — Bull. de la Soc. Im. des Nat. de Moscou. № III, pp. 161—200. Moscou. 1878.
- Fischer von Waldheim A.** Beitrag zur Kenntniss der Phanerogamen-Flora des Moskauer Gouvernement. — Bull. de la Soc. Im. des Nat. de Moscou. T. LXI, № 2, pp. 421—431. Moscou. 1881.
- Цин. — **Цингеръ В. Я.** Сборникъ свѣдѣній о флорѣ средней Россіи. Москва. 1885.
- Гор. — **Горожанкинъ П. Н.** Матеріалы для флоры Московской губерніи. — Bull. de la Soc. Im. des Nat. de Moscou. 1888, № 2, pp. 349—372.
- Мил. — **Милютинъ С. Н.** Нѣкоторыя дополненія къ флорѣ Московской губерніи. — Bull. de la Soc. Im. des Nat. de Moscou. 1888. № 3, pp. 549—60.
- Кауф. II. — **Кауфманъ П.** Московская флора или описаніе высшихъ растений и ботанико-географическій обзоръ Московской губерніи. Изданіе 2-ое подъ редакціей П. Ф. Маевского. Москва. 1889.
- Пет. — **Петунниковъ А. И.** Растительность Московской губерніи. Иллюстрированное руководство къ опредѣленію растений дикорастущихъ и разводимыхъ въ предѣлахъ Московской губерніи. Москва. 1890.
- Милютинъ С. Н.** Матеріалы по флорѣ известняковъ р. Оки. Москва. 1890.
- F. O. — **Fedchenko Olga.** List of Plants of the District of Moschaisk, government of Moscow, Russia. — Boston Journal. Popular Science News, vol XXV, 1891, №№ 5, 6, 7, 8.
- Маевскій П. Ф.** Флора средней Россіи. Москва. 1892.
- Peter A.** Die Piloselloiden der Umgebungen von Moskau. — Beiträge zur Kenntniss der Hieracien Flora Ost-Europa's. — Nachrichten von der könig. Gesellsch. der Wiss. und der Georg. Aug. Univ. zu Göttingen. 1893, № 2.
- Маевскій П. Ф.** Флора средней Россіи. Изд. исправленное и дополненное подъ ред. С. Коржинскаго. Москва. 1895.
- Petunnikov A.** Die Potentillen Central-Russlands. — Acta Horti Petropolitani, vol XIV, вып. I. 1895.
- Федченко В. А.** Очеркъ растительности Можайскаго уѣзда Московской губерніи. — Bull. de la Soc. Im. des Nat. de Moscou. 1896, № 4.
- Шмалгаузенъ Ив.** Флора средней и южной Россіи, Крыма и сѣвернаго Кавказа. — Руководство для опредѣленія сѣмянныхъ и высшихъ споровыхъ растений. Томъ I. Двудольныя свободноплестные. Кіевъ. 1895, стр. V — XXX и 468 стр. — Томъ II. Двудольная сростноплестные и

безлепестный, однодольный, голосемянный и высший сосудистый. Киев. 1897, стр. V — XVI и 752 стр.

Гейденъ К. Н. Ботаническія экскурсіи. Списокъ растений Московской флоры собранныхъ на ботаническихъ экскурсіяхъ лѣтомъ 1896 г. Изд. Высочайше утв. Росс. Формац. Общ. Москва. 1897.

Флеровъ А. О. Списокъ растений, дикорастущихъ и разводимыхъ на Бутырскомъ Хуторѣ Имп. Моск. Общ. Сельск. Хоз.—Юбилейный сборникъ Моск. Земледѣльч. Школы Имп. Моск. Общ. Сельск. Хоз. въ память 75-лѣтіяго существованія. Москва. 1897.

Бух. I. — **Бухгольцъ Ф. В.** Списокъ сѣменныхъ и высшихъ споровыхъ растений. — „Естественно-историческія коллекціи гр. Е. П. Шереметевоу въ с. Михайловскомъ, Московской губерніи“. I Гербарій. Москва. 1897.

Федченко Б. А. Отчетъ о лѣтнихъ изслѣдованіяхъ. — Годичный отчетъ Имп. Моск. Общ. Исп. Пр. за 1898—1899 годы. Москва. 1899.

Литвиновъ Д. П. Объ Окской флорѣ въ Московской губерніи. — Матеріалы къ познанію фауны и флоры Росс. Имперіи. Отдѣлъ бот., вып. III. Москва. 1899.

Сюзевъ П. В. Наблюденія періодическихъ явленій въ жизни растений Московской флоры. — Матеріалы къ познанію флоры и фауны Росс. Имперіи. Отдѣлъ бот. вып. III, Москва. 1899.

Ф. Б. — **Федченко Б. А.** Новыя дополненія къ флорѣ Московской губерніи. — Матеріалы къ познанію фауны и флоры Росс. Имперіи. Отдѣлъ бот. вып. III. Москва. 1899.

Петушковъ А. Н. Новинки Московской флоры. — Садъ и огородъ. Москва 1899, № 18.

Петушковъ А. Н. По поводу статьи Б. А. Федченко „Новыя дополненія къ флорѣ Московской губерніи“. — Бот. зап., издав. при Бот. Садѣ Имп. СПб. Унив. Вып. XV. 1899.

Ф. ор. — **Федченко Б. А.** О нѣкоторыхъ орхидеяхъ Московской флоры. — Bull. de la Soc. Im. des Nat. de Moscou. 1899, № 4.

Федченко Б. А. Отчетъ о лѣтнихъ изслѣдованіяхъ. — Годичный отчетъ Имп. Моск. Общ. Исп. Пр. за 1899—1900 гг. Москва. 1900.

Бух. II. — **Бухгольцъ Ф. В.** Списокъ сѣменныхъ и высшихъ споровыхъ растений, съ планомъ ботаническаго сада. — „Естественно-историческія коллекціи гр. Е. П. Шереметевоу въ с. Михайловскомъ, Московской губ., Подольскаго уѣзда“. Гербарій. Изданіе 2-ое. Москва. 1900.

Мос. — **Мосоловъ Н. А.** Дополненія къ флорѣ Подольскаго уѣзда, Московской губерніи. — Труды Бот. Сада Имп. Юрьевск. Ун. Юрьевъ. 1900. Т. I, вып. III, стр. 121—24.

Ростовцевъ С. П. О цвѣтеніи ряски подь Москвой. — Изв. Моск. Сельско-хоз. Инст. Москва. 1901, годъ VII, кн. II, стр. 63.

Мосоловъ Н. (Н. М-въ) Новыя растения Московской флоры. — Естествозн. и Геогр. Москва. 1901. № 1, стр. 81.

Мейеръ Э. А. Водяное растеніе Elodea. — Садъ и Огородъ. Москва. 1901. № 2

Сюз. — **Сюзевъ П.** О нѣкоторыхъ новыхъ растеніяхъ Московской флоры. — Труды Бот. Сада Имп. Юрьевск. Ун. Юрьевъ. 1901. Томъ II, вып. I, стр. 5—11.

Пет. Кр. — **Петунишковъ А. Н.** Критическій обзоръ московской флоры. — I. *Dialypetalae*. — Бот. записки, издаваемые при Бот. Саду Имп. СПб. Ун. проф. А. Бекетовымъ и проф. Хр. Гоби., вып. XIII, томъ VI. 1896. — II. *Gamopetalae*. — Труды Имп. СПб. Общ. Естествоисп. Томъ XXX, вып. III. 1900. (отдѣлъ ботаники). — III. *Monochlamydeae*. — Труды СПб. Общ. Естествоисп. Томъ XXXI, вып. III, 1901 (отдѣлъ ботаники).

Петунишковъ А. Н. *Prunus spinosa* L. и *Prunus insititia* L. — Труды Бот. Сада Имп. Юрьевск. Ун. Юрьевъ. 1901. Томъ II, вып. 1, стр. 15—20.

Маевскій П. Ф. Флора Средней Россіи. Изд. 3-е, исправленное и дополненное Б. А. Федченко. Москва, 1902.

Ф. Оз. — **Федченко В. А.** Озера Московскаго уѣзда. — „Русскія Вѣдомости“, № 221. 1903 г.

Воронковъ Н. В. Природа Глубокаго озера и его окрестностей, съ картою. — Труды Студенч. Круга для изсл. русск. природы, сост. при Имп. Моск. Ун. Москва 1903, кн. I, стр. 61—70.

Воронковъ Н. В. Прибавленіе къ статьѣ „Природа Глубокаго Озера“. Труды Студенч. Круга для изсл. русс. прир., сост. при Имп. Моск. Ун. Москва. 1903, кн. I, стр. 175—98.

Воронковъ Н. В. Гербарій растений Московской губерніи, собранный Н. В. Воронковымъ. — Труды Студенч. Круга для изсл. русс. прир., сост. при Моск. Имп. Ун. Москва, 1903, кн. I.

Сюзевъ П. В. Ботаническая старина. — Bull. de la Soc. Im. des Nat. de Moscou. 1905, № 4.

Флеровъ А. Ф. Ботанико-географическія изслѣдованія въ Окскомъ бассейнѣ въ 1903 г. — Дневн. Зоол. Отд. Имп. Моск. Общ. Люб. Естеств. Т. III, № 6. — Изв. Имп. Общ. Люб. Естеств., Антр. и Этн., т. XXVIII, Москва, 1905.

Sch. — Schedae ad herbarium Florae Rossicae a Museo Botanico Academia Imperialis Scientiarum Petropolitanae editum. Вып. I, №№ 1—200. С.-Петербургъ 1898. — Вып. II, №№ 201—600. С.-Петербургъ 1900. — Вып. III, №№ 601—900. С.-Петербургъ 1901. — Вып. IV, №№ 901—1200. С.-Петербургъ 1902. — Вып. V, №№ 1201—1600. С.-Петербургъ. 1905. — Вып. VI, №№ 1601—2000. С.-Петербургъ. 1908.

Федченко В. А. Памяти Ч. В. Кларка. Бот. Журналъ, изд. отд. Бот. Имп. СПб. Общ. Естествоисп. Годъ I, № 6, 1906.

Хор. I. — **Хорошковъ А.** Дополненія къ флорѣ Московской губ. — Труды Бот. Сада Имп. Юрьевск. Ун. Юрьевъ. 1907. Томъ VIII, вып. I, стр. 16—19.

Хор. Отч. I. — **Хорошковъ А. А.** Отчетъ объ экскурсіяхъ въ Московскую губернію. — Годичный отчетъ Имп. Моск. Общ. Исн. Прир. за 1906 — 1907 гг. Москва. 1907.

Сыр. Отч. I. — **Сырейщиковъ Д. П.** Отчетъ о ботаническихъ изслѣдованіяхъ. — Годичный отчетъ Имп. Моск. Общ. Исн. Прир. за 1906 — 1907 гг. Москва. 1907 г.

Флеровъ А. Ф. Предварительный отчетъ о ботанико-географической командировкѣ въ 1907 г. — Изв. Имп. СПб. Бот. Сада, т. VII, вып. 4-й 1907.

Пет. Отч. — **Петушковъ А. П.** Отчетъ объ изслѣдованіяхъ въ Московской губернии.—Годичный отчетъ Имп. Моск. Общ. Исп. Прир. за 1906—1907 гг. Москва 1907.

Бузнецовъ Н. П. Предварительный отчетъ объ изслѣдованіи озеръ и болотъ въ Богородскомъ, Судогодскомъ и Суздальскомъ уѣздахъ. Годичный отчетъ Имп. Моск. Общ. Исп. Прир. за 1907—98 гг. Москва. 1908.

Сыр. Отч. П. — **Сырейчиковъ Д. П.** Отчетъ о ботаническихъ изслѣдованіяхъ въ 1908 г.—Годичный отчетъ Имп. Моск. Общ. Исп. Прир. за 1907—1908 гг. Москва. 1908.

Хор. II. — **Хорошковъ А. А.** Дополненія къ флорѣ Московской губернии (II).—Труды Ботанич. Сада Имп. Юрьевск. Унив. Юрьевъ. 1908. Томъ IX, вып. I, стр. 15—20.

Хор. III. — **Хорошковъ А.** Дополненія къ флорѣ Московской губ. III.—Труды Бот. Сада Имп. Юрьевск. Ун. Юрьевъ. Томъ X, 1909 г., стр. 90—93.

Списокъ оригинальныхъ рисунковъ, помѣщенныхъ во всѣхъ трехъ частяхъ.

Index iconum novarum in Flora provinciae mosquensis illustrata auctore D. P. Sireitschikov inseratarum.

- | | |
|---|---|
| <i>Abies balsamea</i> Mill. | <i>Euphrasia brevipila</i> Burnat et Gremli. |
| .. <i>sibirica</i> Ledeb. | .. <i>curta</i> Fries. |
| <i>Aconitum excelsum</i> Rehb. | .. <i>montana</i> Jord. |
| .. <i>lasiostomum</i> Rehb. | .. <i>Murbeckii</i> Wettst. |
| <i>Adenophora liliifolia</i> Ledeb. | .. <i>Reuteri</i> Wettst. |
| <i>Alectorolophus fallax</i> Sterneck. | .. <i>stricta</i> Host. |
| <i>Alisma arcuata</i> Michalet. | .. <i>tatarica</i> Fisch. |
| <i>Alnus incana</i> Willd. α . <i>acutiloba</i> Koch. | .. <i>tenuis</i> Brenner. |
| .. <i>pubescens</i> Tausch. | |
| <i>Artemisia paniculata</i> Lam. | <i>Fraxinus americana</i> L. |
| <i>Asperula humifusa</i> Bess. | <i>Fritillaria ruthenica</i> Wickstr. |
| <i>Atriplex laciniatum</i> L. | |
| | <i>Gagea erubescens</i> Schult. |
| <i>Betula verrucosa</i> Ehrh. α . <i>dalecarlica</i> L. | <i>Galeopsis bifida</i> Boenn. |
| | .. <i>Tetrahit</i> L. γ . <i>Reichenbachii</i> Rapin. |
| <i>Carduus polyacanthos</i> Schleich. | .. " " β . <i>silvestris</i> Schlecht. |
| <i>Carex canescens</i> L. α . <i>strictifolia</i> . | <i>Galium parisiense</i> L. |
| .. <i>globularis</i> L. | .. <i>Schultesii</i> Vest. |
| .. <i>pediformis</i> C. A. M. | .. <i>trifidum</i> L. |
| .. <i>tenella</i> Schkuhr. | .. <i>utiginosum</i> L. |
| <i>Centaurea austriacoides</i> Woloszcz. | <i>Geranium palustre</i> L. β . <i>trifidum</i> Litw. |
| .. <i>ruthenica</i> Lam. | .. <i>sanguineum</i> L. α . <i>latipartitum</i> Petunnikov. |
| .. <i>stenolepis</i> Kerner. | <i>Geum aleppicum</i> Jacq. |
| .. <i>stereophylla</i> Bess. | |
| <i>Chacrophylum Prescottii</i> DC. | <i>Heleocharis palustris</i> R. Br. β . <i>mamilatus</i> Lindb. |
| <i>Chorispora tenella</i> DC. | .. <i>fil.</i> |
| <i>Chrysanthemum vulgare</i> Bernh. β . <i>tenuifolium</i> Max. | <i>Heracleum sibiricum</i> L. β . <i>longifolium</i> Koch. |
| | .. " " " α . <i>typicum</i> Kauffm. |
| <i>Cirsium heterophyllum</i> \times <i>palustre</i> . | <i>Hieracium acrocomum</i> N. P. |
| .. <i>oleraceum</i> \times <i>palustre</i> . | .. <i>apatelium</i> N. P. |
| .. <i>palustre</i> (L.) Scop. α . <i>umbrosum</i> Kauffm. | .. <i>arvicola</i> N. P. |
| .. <i>Wankelii</i> Reichenb. | .. <i>Auricula</i> Lam. et DC. |
| <i>Cotoneaster acutifolia</i> Turcz. | .. <i>auriculoides</i> Lang. |
| .. <i>melanocarpa</i> Lodd. | .. <i>brachiatum</i> Bertol. |
| <i>Crataegus coccinea</i> L. | .. <i>calodon</i> Tausch. |
| <i>Cytisus ratishonensis</i> Schaeffer. | .. <i>canum</i> N. P. |
| | .. <i>cymigerum</i> Rehb. |
| <i>Delphinium elatum</i> L. β . <i>cuneatum</i> DC. | .. <i>echinodes</i> Lamm. |
| | .. <i>fallax</i> Willd. |
| <i>Elaeagnus argenteus</i> Pursh. | .. <i>flagellare</i> Willd. |
| <i>Elatine callitrichoides</i> Rupr. | .. <i>flagellariforme</i> G. Schneid. |
| <i>Epilobium palustre</i> L. α . <i>monticolum</i> Haussk. | .. <i>floribundum</i> Wimm. et Grab. |
| | .. <i>glomeratum</i> Fries. |

Hieracium laevigatum Willd.
 " *paragogum* N. P.
 " *praealtum* Vill. ssp. *Bauhini* Griseb.
 " " " *florentinum* Koch.
 " *pratense* Tausch.
 " *Schultesii* F. Schultz.
 " *sciadophorum* N. P.
 " *silvaticum* L.
 " *spathophyllum* N. P.
 " *umbellatum* L. β . *linariifolium* Wallr.
 " *umbelliferum* N. P.
 " *vulgatum* Fries ssp. *arcuatidens* Zahn.
 " " " " *Wischniakowii*
 " " " " Pet. et Zahn.
 " *Zizianum* Tausch.

Juglans cinerea L.

Juncus bufonius L. α . *ranarius* Song. et Perrier.

Libanotis montana Crantz β . *intermedia* Rupr.
 " " " α . *typica* Kauffm.

Linaria bipartita (Vent.) Willd.
 " *canadensis* (L.) Dumont.

Melampyrum pratense L. α . *integerrimum* Doell.
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.
Mulgedium macrophyllum DC.
Myosotis silvatica Hoffm.
 " *sparsiflora* Mik.

Nasturtium armoracioides Tausch.

Orchis incarnata L. β . *brevicalcarata* Rehb. fil.
 " " " γ . *strictifolia* Opiz.

Philadelphus inodorus L.
 " *latifolius* Schrad.

Phlomis tuberosa L. β . *longifolia*.

" " " α . *typica*.
Pimpinella Saxifraga L. γ . *dissectifolia* Wallr.
 " " " δ . *magna* L.
 " " " β . *nigra* Willd.

Polygala amarella Crantz.
Polygonum amphibium L. β . *terrestre* Leers.
Populus angulata Ait.

" *balsamifera* L.
 " *berolinensis* Dippel.
 " *canadensis* Moench.
 " *candicans* Ait.
 " *moskoviensis* Schroeder.

Potentilla arenaria \times *thyrsiflora*.
 " *argentea* L. β . *decumbens* Jord.
 " " " γ . *tenuiloba* Jord.

Potentilla Nestleriana Tratt.
 " *rubens* Zimm.
 " *supina* L.
Prunus virginiana L.

Ranunculus confervoides Fries.
 " *Flammula* L. α . *gracilis* G. Mey.
 " *pseudoflaccidus* Petunnikov.

Rosa rugosa Thunb.

Rubus caesio \times *idaeus*.

" *odoratus* L.

Rumex Acetosus L. α . *auriculatus* Wallr.

" *aquaticus* \times *confertus*.

" *confertus* Willd.

" *maritimus* L.

" *ucranicus* Fisch.

Salix alopecuroides Tausch.

" *dasyclados* Wimm.

" *Gmelinii* Pall.

" *hexandra* Ehrh.

" *latifolia* Forbes.

" *livescens* Doell.

" *multinervis* Doell.

" *puberula* Doell.

" *Reichardtii* Kern.

" *rugulosa* Anders.

" *versifolia* Wahlenb.

Salvia glutinosa L.

" *verticillata* L.

Scilla cernua Red.

Serratula coronata L.

Silene procumbens Murr.

Sisymbrium wolgensense MB.

Solidago virga aurea L. β . *foliosa* Fiori.

Sparganium affine Schnitzl.

" " " *Borderi* Weberbauer.

Stachys palustris L.

Thymus glaber Mill.

" *Marschallianus* Willd.

" *Serpyllum* L. α . *angustifolius* (Pers.)
 Wallr.

Tulipa Biebersteiniana R. et Sch.

Urtica cannabina L.

Veronica austriaca L.

" *gentianoides* Vahl.

" *incana* L.

" *spicata* L. α . *hybrida* (L.) GB.

" *spuria* L.

Viola palustris L.

Алфавитный списокъ латинскихъ названій растений всѣхъ
трехъ частей съ соотвѣтствующими русскими.

- Abies.**—Пихта.
 „ *balsamea.*—Пихта бальзамическая.
 „ *sibirica.*— „ сибирская.
Acer.—Кленъ.
 „ *Ginnala.*—Кленъ Гиннала.
 „ *Negundo.*— „ Негундо.
 „ *platanoides.*—Кленъ чинаролистный.
 „ *tatarica.*— „ татарский.
Achillea.—Тысячелистникъ.
 „ *cartilaginea.*—Тысячелистникъ хрящеватый.
 „ *Millefolium.*— „ обыкновенный.
 „ *nobilis.*— „ благородный.
 „ *Ptarmica.*— „ чихотная трава.
Aconitum.—Борецъ.
 „ *Anthora.*—Борецъ волкобойникъ.
 „ *excelsum.*— „ высокий.
 „ *lasiosomum.*— „ желтый.
Acorus Calamus.—Лиръ тростяной.
Actaea spicata.—Воронецъ колючистый.
Adenophora liliifolia.—Аденофора лилейная.
Aedoxa moschatellina.—Адокса мускусная.
Aegopodium Podagraria.—Сныть обыкновенная.
Aesculus.—Желудникъ.
 „ *Hippocastanum.*—Каштанъ конский.
 „ *lutea.*—Желудникъ желтый.
 „ *Pavia.*— „ Павия.
Aethusa Cynapium.—Кокорышъ, собачья петрушка.
Agrimonia.—Репейникъ.
 „ *Eupatoria.*—Репейникъ посконный.
 „ *pilosa.*— „ волосистый.
Agrostemma Githago.—Куколь.
Agrostis.—Полевница.
 „ *alba.*—Полевница бѣлая.
 „ *canina.*— „ собачья.
 „ *vulgaris.*— „ обыкновенная.
Ajuga.—Живучка.
 „ *gonevensis.*—Живучка мохнатая.
 „ *reptans.*— „ ползучая.
Albiersia Blitum.—Щирица.
Alchimilla vulgaris.—Майжетка обыкновенная.
Alectorolophus.—Погремокъ.
 „ *fallax.*—Погремокъ ложный.
 „ *major.*— „ большой.
Alectorolophus minor.—Погремокъ малый.
Alisma.—Частуха.
 „ *arculatum.*—Частуха дугообразная.
 „ *Michaletii.*— „ подорожникъ.
Allium.—Лукъ.
 „ *angulosum.*—Лукъ ребристый.
 „ *Sera.*— „ рѣпчатый.
 „ *oleraceum.*—Чеснокъ огородный.
 „ *Porrum.*—Лукъ Порей.
 „ *rotundum.*— „ круглый.
 „ *sativum.*— „ посевной.
 „ *Schoenoprasum.*—Цибуля.
Alnus.—Ольха.
 „ *glutinosa.*—Ольха липкая.
 „ *incana.*— „ сѣрая.
Alopecurus.—Багрячникъ.
 „ *agrestis.*—Багрячникъ полевой.
 „ *fulvus.*— „ оранжевый.
 „ *geniculatus.*— „ колючатый.
 „ *pratensis.*— „ луговой.
 „ *ventricosus.*— „ вздутый.
Alsine tenuifolia.—Мокричникъ узколистный.
Alyssum.—Бурчакъ.
 „ *calycinum.*—Бурчакъ чашечный.
 „ *minimum.*— „ мелкий.
 „ *montanum.*— „ горный.
Amaranthus retroflexus.—Подсвекольникъ.
Amelanchier.—Ирга.
 „ *ovalis.*—Ирга овальная.
 „ *vulgaris.*— „ обыкновенная.
Andromeda Polifolia.—Андромеда подбѣлъ.
Androsace.—Проломникъ.
 „ *elongata.*—Проломникъ вытянутый.
 „ *filiformis.*— „ нитевидный.
 „ *septentrionalis.*— „ сѣверный.
Anemone.—Вѣтренница.
 „ *memorosa.*—Вѣтренница тѣнистая.
 „ *ranunculoides.*— „ лютиковая.
 „ *silvestris.*— „ лѣсная.
Anethum graveolens.—Укропъ.
Angelica silvestris.—Дудникъ лѣсной.
Antennaria dioica.—Кочанья лавка.
Anthemis.—Пупавка.
 „ *arvensis.*—Пупавка полевая.
 „ *Cotula.*— „ вьючая.

Anthemis tinctoria.—Инушка красильная.
Anthoxanthum odoratum.—Зубровка, пахучий колосок.

Anthriscus.—Кушмер.
 " *Cerifolium*.—Кервель.
 " *silvestris*.—Кушмер лѣсной.
Anthyllus Vulneraria.—Язвеникъ.
Apera Spica venti.—Метлица полевая.
Apium graveolens.—Сельдерей.
Aquilegia vulgaris.—Водосборъ обыкновенный.
Arabis.—Рѣзуха.

" *Gerardii*.—Рѣзуха Герарда.
 " *hirsuta*.— шершавая.
 " *pendula*.— повислая.
Archangelica officinalis.—Дягиль лѣчебный.
Arctium.—Лопушникъ.
 " *majus*.—Лопушникъ большой.
 " *minus*.— малый.
 " *tomentosum*.— шерстистый.
Arctostaphylus uva ursi.—Толокнянка обыкновенная.

Arenaria.—Песчанка.
 " *graminifolia*.—Песчанка злаколистная.
 " *serpyllifolia*.— тимьянолистная.
Aristolochia.—Кирказонъ.
 " *Clematidis*.— Кирказонъ обыкновенный.

" *macrophylla*.— крупнолистный.
Arrhenatherum elatius.— Райграссъ французскій.
Artemisia.—Полынь.

" *Absinthium*.— Полынь лѣкарственная.
 " *austriaca*.— австрійская.
 " *campestris*.— полевая.
 " *Dracunculus*.—Эстрагонъ.
 " *paniculata*.—Божье-дерево.
 " *scoraria*.—Полынь метельчатая.
 " *vulgaris*.—Чернобыльникъ.

Arundo Phragmites.—Тростникъ обыкновенный.

Asarum europaeum.—Копытень европейскій.
Asparagus officinalis.—Спаржа лѣчебная.
Asperugo procumbens.—Острица лежачая.
Asperula.—Ясменникъ.
 " *galioides*.—Ясменникъ подмаренниково-ый.

" *humifusa*.— лежачій.
 " *odorata*.— душистый.
 " *rivalis*.— береговой.
 " *tinctoria*.— красильный.

Aspidium.—Щитникъ.
 " *Braunii*.—Щитникъ Брауновъ.
 " *cristatum*.— Многокучникъ гребенчатый.
 " *Dryopteris*.— Многопояка тройчатая.
 " *filix mas*.—Многокучникъ большой.
 " *montanum*.— горный.
 " *Phegopteris*.— Многопояка волосистая.
 " *spinulosum*.— Многокучникъ шишковатый.
 " *Thelypteris*.— цѣльнолистный.

Aster.—Астра.
 " *Amellus*.—Астра дикая.
 " *salicifolius*.— иволистная.
 " *sedifolius*.—Соловечникъ.
Astragalus.—Астрагалъ

Astragalus arenarius.—Астрагалъ песчаный.
 " *Cicer*.— хлопонецъ.
 " *danicus*.— датскій.
 " *glycyphyllus*.— солодковолистный.
Athyrium filix femina.—Кочедыжникъ.

Atriplex.—Лебеда.
 " *hastatum*.—Лебеда кобельчатая.
 " *hortense*.— садовая.
 " *laciniatum*.— разрѣзная.
 " *nitens*.— лоснящаяся.
 " *patulum*.— раскидистая.
Atropis distans.—Маникъ растопыранный.
Avena.—Овесь.
 " *pratensis*.—Овесь луговой.
 " *pubescens*.— заячій.
 " *sativa*.— посѣвный.

Ballota nigra.—Бѣлокудреникъ черный.
Barbarea.—Сурѣшница.
 " *stricta*.—Сурѣшница торчащая.
 " *vulgaris*.— обыкновенная.
Beckmannia eruciformis.—Бекманния зубров-никъ.

Bellis perennis.—Маггаритка многолѣтняя.
Berberis vulgaris.—Барбарисъ обыкновенный.
Berteroa incana.—Пикотникъ сѣдой.
Beta vulgaris.—Свекла обыкновенная.
Betula.—Береза.

" *humilis*.—Береза приземистая.
 " *nana*.— карликовая.
 " *pubescens*.— пушистая.
 " *verrucosa*.— бородавчатая.
Bidens.—Череха.
 " *cernuus*.—Череха поникшая.
 " *tripartitus*.— трехраздѣльная.

Blysmus compressus.—Близма сплюснутая.
Borrago officinalis.—Бурачникъ, огуречная трава.

Botrychium.—Гроздовникъ.
 " *Lunaria*.—Гроздовникъ ключъ-трава.
 " *Matricaria*.— рутовый.
 " *virginiana*.— виргинскій.

Brachypodium.—Коротконожка.
 " *pinnatum*.—Коротконожка перистая.
 " *silvaticum*.— лѣсная.

Brassica *Napus*.—Брюква.
 " *oleracea*.—Капуста.
 " *Rapa*.—Рѣпа.

Briza media.—Траеучка средняя.
Bromus.—Костеръ.

" *arvensis*.—Костеръ полевой.
 " *erectus*.— прямой.
 " *inermis*.— безостный.
 " *mollis*.— мягкій.
 " *patulus*.— развѣтветый.
 " *ramosus*.— вѣтвистый.
 " *secalinus*.— ржаной.
 " *tectorum*.— кровельный.

Brunella.—Черноголовка.
 " *grandiflora*.— Черноголовка крупно-цвѣтная.
 " *vulgaris*.— обыкновенная.

" *alba*.—Пеструшень бѣлый.
Bunias orientalis.—Свербига восточная.
Bupthalmum speciosum.—Крушельница.
Butomus umbellatus.—Сусака зонтичный.

Calamagrostis.—Вейник.
 " *arundinacea*.—Вейник лѣсной.
 " *Epigeios*.— " наземный.
 " *lanceolata*.— " ланцетный.
 " *neglecta*.— " прямой.
 " *purpurea*.— " пурпуровый.

Calla palustris.—Бѣлокрыльник болотный.

Callitriche.—Болотник.

" *autumnalis*.—Болотник осенний.
 " *vernalis*.— " весенний.

Calluna vulgaris.—Верескъ обыкновенный.

Caltha palustris.—Калужница болотная.

Calystegia sepium.—Вьюнок заборный.

Camelina.—Камелина.

" *dentata*.—Камелина зубчатая.

" *microcarpa*.— " мелкоплодная.

" *sativa*.—Рыжикъ.

Campanula.—Колокольчикъ.

" *bononiensis*.—Колокольчикъ болон-
 ский.

" *cervicaria*.— " жестковолосый.

" *glomerata*.— " примочная трава

" *latifolia*.— " широколистный.

" *patula*.— " развѣсистый.

" *persicifolia*.— " персикolistный.

" *rapunculoides*.— " рѣвчатovidный.

" *rotundifolia*.— " круглолистный.

" *sibirica*.— " сибирский.

" *trachelium*.— " крапивolistный

Cannabis sativa.—Конопля.

Capsella bursa pastoris.—Сумочникъ пастуший.

Caragana.—Акація.

" *arborescens*.—Акація древовидная.

" *frutex*.— " кустарная.

" *pygmaea*.— " карликовая.

Cardamine.—Сердечникъ.

" *amara*.—Сердечникъ горький.

" *impatiens*.— " недотрога.

" *pratensis*.— " луговой.

Carduus.—Чертополохъ.

" *acanthoides*.—Чертополохъ колючий.

" *crispus*.— " курчавый.

" *nutans*.— " поникшій.

Carex.—Осока.

" *acutiformis*.—Осока заостренная.

" *aristata*.— " остистая.

" *caespitosa*.— " дернистая.

" *canescens*.— " бѣловатая.

" *caryophylla*.— " гвоздичная.

" *chordorrhiza*.— " тонкокоричневая.

" *contigua*.— " сближенная.

" *digitata*.— " пальчатая.

" *dioica*.— " двудомная.

" *distans*.— " разставленная.

" *disticha*.— " двурядная.

" *echinata*.— " иглистая.

" *elongata*.— " вытянутая.

" *ericetorum*.— " пустоыная.

" *flava*.— " желтая.

" *globularis*.— " шарообразная.

" *Goodenoughii*.— " обыкновенная.

" *gracilis*.— " рѣзкая.

" *hirta*.— " опушенная.

" *lasiocarpa*.— " нитевидная.

" *Leersii*.— " Леерсова.

" *leporina*.— " заячья.

" *limosa*.— " илистая.

Carex loliacea.—

Осока плетельная.

" *montana*.—

" горная.

" *obtusata*.—

" притупленная.

" *Oederi*.—

" Эдерава.

" *pallescens*.—

" блѣдная.

" *panicca*.—

" просыная.

" *paniculata*.—

" метельчатая.

" *paradoxa*.—

" странная.

" *pauciflora*.—

" малоцвѣтковая.

" *pediformis*.—

" стоповидная.

" *pilosa*.—

" волосистая.

" *praecox*.—

" ранняя.

" *Pseudocyperus*.—

" сытевидная.

" *remota*.—

" раздвинутая.

" *riparia*.—

" береговая.

" *rostrata*.—

" клювовидная.

" *silvatica*.—

" лѣсная.

" *stellulata*.—

" звѣздчатая.

" *stricta*.—

" торчащая.

" *tenella*.—

" лѣжная.

" *teretiuscula*.—

" круглостебельная.

" *vaginata*.—

" влагалищная.

" *vesicaria*.—

" пузырчатая.

" *vitis*.—

" спутанная.

" *vulpina*.—

" лисья.

Carlina.—Колючникъ.

" *longifolia*.—Колючникъ длинolistный.

" *vulgaris*.— " обыкновенный.

Carum Carvi.—Тминъ.

Cassandra calyculata.—Кассандра крупноча-
 шечная.

Catabrosa aquatica.—Катаброза водная.

Cenolophium Fischeri.—Пусторебришникъ Фи-
 шерова.

Centauraea.—Василекъ.

" *austriacoides*.—Василекъ австрій-
 скойный.

" *Cyanus*.— " полевый.

" *Jacea*.— " луговой.

" *maculosa*.— " пятнистый.

" *phrygia*.— " фригійский.

" *ruthenica*.— " русскій.

" *Scabiosa*.— " чесоточный.

" *stenolepis*.— " узкочешуйчатый.

" *stereophylla*.— " выпуклolistный.

Centaurium.—Золототысячникъ

" *pulchellum*.—Золототысячникъ кра-
 сивый.

" *umbellatum*.— " зонтичный.

Centunculus minimus.—Низзянка маленькая.

Cephalanthera longifolia.—Пыльцеголовникъ
 длинolistный.

Cerastium.—Исколка.

" *arvense*.—Исколка полевая.

" *caespitosa*.— " дернистая.

" *semidecandrum*.— " пятицвѣтничная

" *glomerata*.— " скученная.

Ceratophyllum.—Роголистникъ.

" *demersum*.—Роголистникъ под-
 водный.

" *platyacanthum*.— " рѣдкий.

Chaerophyllum.—Душникъ.

" *aromaticum*.—Бутень душистый.

" *bulbosum*.— " клубненосный.

" *Prescottii*.— " Прескоттовъ.

" *temulum*.— " обсынаяющій.

Chaeturus marrubiastrum. — Щетинихвостник маррубиевидный.
Chelidonium majus. — Чистотелъ большой.
Chenopodium. — Марь.
 „ *album*. — Марь бѣлая.
 „ *bonus Henricus*. — „ цѣльнолистная.
 „ *foliosum*. — „ многолистная.
 „ *glaucum*. — „ сизая.
 „ *hybridum*. — „ Свинная лебеда.
 „ *polyspermum*. — „ мелкая лебеда.
 „ *rubrum*. — „ красная.
 „ *urbicum*. — „ городская.
Chimophila corymbosa. — Боровикъ щитковидный.
Chorispora tenella. — Раздѣльноосемянникъ пѣканий.
Chrysanthemum. — Поповникъ.
 „ *Balsamita*. — Калужеръ.
 „ *corymbosum*. — Поповникъ щитконосный.
 „ *Leucanthemum*. — Нивяникъ.
 „ *vulgare*. — Пижма, дикая рябина.
Chrysosplenium alternifolium. — Селезеночникъ очереднолистный.
Cichorium. — Цикорій.
 „ *Endivia*. — Цикорій Эндивій.
 „ *Intybus*. — „ обыкновенный.
Cicuta virosa. — Вехъ ядовитый.
Circaea alpina. — Колдуница алпійская.
 „ *lutetiana*. — Коддунова трава.
Cirsium. — Бодякъ, Маточникъ.
 „ *arvense*. — Бодякъ полевой.
 „ *eriphorum*. — „ шерстистый.
 „ *heterophyllum*. — „ разнолистный.
 „ *lanceolatum*. — „ ланцетлистный.
 „ *oleraceum*. — „ огородный.
 „ *palustre*. — „ болотный.
 „ *pannonicum*. — „ венгерскій.
 „ *Wankelii*. — „ Ванкеліевъ.
Clematis recta. — Ломоносъ прямой.
Cnidium venosum. — Жгучъ-корень
Coehlearia Armoracia. — Хрѣнь.
 „ *officinalis*. — Ложечникъ лѣчебный.
Coeloglossum viride. — Полозепестникъ зеленый.
Comarum palustre. — Сабельникъ болотный.
Conioselinum tataricum. — Гирчовникъ татарскій.
Conium maculatum. — Болгоголовъ крапчатый.
Convallaria majalis. — Ландышъ майскій.
Convulvulus arvensis. — Вьюнокъ полевой.
Coralliorrhiza innata. — Ладьянъ коралловидный.
Coriandrum sativum. — Кориандръ.
Cospernum. — Клопоосемянникъ.
 „ *intermedium*. — Клопоосемянникъ средний.
 „ *Marschallii*. — „ Маршалловъ
Cornus. — Деренъ.
 „ *alba*. — Деренъ бѣлый.
 „ *sanguinea*. — Деренъ кровавокрасный.
 „ *tatarica*. — „ татарскій.
Coronilla varia. — Вязель пестрый.
Cortusa Matthioli. — Заржица.
Corydalis. — Хохлатка

Corydalis cava. — Хохлатка полая.
 „ *Marschalliana*. — „ Маршалова.
 „ *solida*. — „ плотная.
Corylus Avellana. — Орѣшникъ обыкновенный.
Cotoneaster. — Кизильникъ.
 „ *acutifolia*. — Кизильникъ остролистный.
 „ *integerrima*. — „ цѣльнокрайный.
 „ *melanocarpa*. — „ черноплодный.
 „ *tomentosa*. — „ войлочный.
Crataegus. — Боярышникъ.
 „ *coccinea*. — Боярышникъ яркокрасный.
 „ *crus galli*. — „ пѣтушья шпора.
 „ *nigra*. — „ черный.
 „ *Oxyacantha*. — „ колючій.
 „ *sanguinea*. — „ кроваво-красный.
Crepis. — Скерда.
 „ *biennis*. — Скерда двулѣтняя.
 „ *paludosa*. — „ болотная.
 „ *praemorsa*. — „ тупокоренная.
 „ *sibirica*. — „ сибирская.
 „ *tectorum*. — „ кровельная.
Cucubalus baccifer. — Волдырьникъ ягодный.
Cucumis sativa. — Огурецъ.
Cucurbita Pepo. — Тыква.
Cuscuta. — Повилка.
 „ *europaea*. — Повилка европейская.
 „ *lupuliformis*. — „ хмѣлевидная.
Cynara Scolymus. — Артишокъ.
Cynoglossum officinale. — Чернокорень лѣкарственный.
Cynosurus cristatus. — Гребенникъ обыкновенный.
Cyperus fuscus. — Сыть бурая.
Cypripedium Calceolus. — Башмачокъ.
 „ *guttatum*. — „ куропатка.
Cystopteris fragilis. — Пузырышникъ домкій.
Cytisus. — Ракитникъ.
 „ *nigricans*. — Ракитникъ чернѣющій.
 „ *ratisbonensis*. — „ двудѣтковый.
Dactylis glomerata. — Ежа обыкновенная.
Daphne Mezereum. — Волчье лыко.
Datura Stramonium. — Дурманъ воиочій.
Daucus Carota. — Морковь.
Delphinium. — Живокость.
 „ *Consolida*. — Живокость полевая.
 „ *elatum*. — „ высокая.
Deschampsia. — Луговикъ.
 „ *caespitosa*. — Луговикъ щучка.
 „ *flexuosa*. — „ извилистый.
Dianthus. — Гвоздика.
 „ *arenarius*. — Гвоздика песчаная.
 „ *barbatus*. — „ бородатая.
 „ *Borbasii*. — „ Ворбаша.
 „ *collinus*. — „ холмовая.
 „ *deltoides*. — „ травяная.
 „ *superbus*. — „ пышная.
Digitalis ambigua. — Наперстянка.
Draba. — Крупка.
 „ *nemorosa*. — Крупка лѣсная.
 „ *repens*. — „ ползучая.
 „ *verna*. — „ весенняя.
Dracocephalum. — Змѣеголовникъ.
 „ *Ruyschiana*. — „ Рушиевъ.
 „ *thymiflorum*. — „ тимьянолистный.

Drosera.—Росняка.

- „ *anglica*.—Росняка английская.
- „ *obovata*.— „ яйцевидная.
- „ *rotundifolia*.— „ круглолистная.

Echinops sphaerosephalus.—Мордовник круглоголовый.

Echium vulgare.—Синяк обыкновенный.

Elaeagnus argentea.—Дож серебристый.

Elatine.—Повойничек.

- „ *Alsinastrum*.—Повойничек мокричный.
- „ *callitrichoides*. „ болотниковый.
- „ *Hydropiper*.— „ водяной перец.
- „ *triandra*.— „ трехтычиновый.

Elodea canadensis.—Водная зараза.

Elsholzia Patrinii.—Шандра.

Epilobium.—Кипрей.

- „ *angustifolium*.—Измучивый.
- „ *hirsutum*.—Кипрей мохнатый.
- „ *montanum*.— „ горный.
- „ *palustre*.— „ болотный.
- „ *parviflorum*.— „ мелкоцветный.
- „ *roseum*.— „ розовый.

Eriopactis.—Дремлик.

- „ *latifolia*.—Дремлик широколистный.
- „ *palustris*.— „ болотный.

Eriopogon aphyllus.—Надбородник.

Equisetum.—Хвощ.

- „ *arvense*.—Хвощ полевой.
- „ *heleocharis*.— „ пловатый.
- „ *hiemale*.— „ зимующий.
- „ *palustre*.— „ болотный.
- „ *pratense*.— „ луговой.
- „ *silvaticum*.— „ лесной.
- „ *variegatum*.— „ пестрый.

Erigeron.—Мелкоцветный.

- „ *acer*.— „ ёдкий.
- „ *canadensis*.— „ канадский.
- „ *heterophyllus*.— „ разнолистный.

Eriophorum.—Пушица.

- „ *angustifolium*.— Пушица узколистная.
- „ *gracile*.— „ тонкая.
- „ *latifolium*.— „ широколистная.
- „ *vaginatum*.— „ влагалищная.

Erodium cicutarium.—Аистик веховый.

Ervum.—Пашенница.

- „ *hirsutum*.—Пашенница волосистая.
- „ *tetraspermum*.— „ четырехсеменная.

Eryngium planum.—Синеголовник плосколистный.

Erysimum.—Желтушник.

- „ *cheiranthoides*.—Желтушник левкойный.
- „ *hieracifolium*.— „ ястребиновый.
- „ *odoratum*.— „ душистый.

Eupatorium cannabinum.—Поскольник конопляновидный.

Euphorbia.—Молочай.

- „ *cyparissias*.—Молочай кипарисовый.
- „ *Esula*.— „ обыкновенный.
- „ *helioscopia*.— „ солнцеглядь.
- „ *palustris*.— „ болотный.
- „ *Peplus*.— „ оттянувший.
- „ *villosa*.— „ опушенный.

Euphrasia.—Очанка.

- „ *brevipila*.—Очанка коротковолосая.

Euphrasia curta.—Очанка приземистая.

- „ *montana*.— „ горная.
- „ *Murbeckii*.— „ Мурбекова.
- „ *Reuteri*.— „ Рейтерова.
- „ *Rostkoviana*.— „ Ростковiana.
- „ *stricta*.— „ торчащая.
- „ *tatarica*.— „ татарская.
- „ *tenuis*.— „ тонкая.

Evonymus.—Бересклет.

- „ *europaeus*.—Бересклет европейский.
- „ *verticillatus*.— „ бородавчатый.

Fagopyrum esculentum.—Гречиха съедобная.

Festuca.—Овсяница.

- „ *gigantea*.—Овсяница высокая.
- „ *ovina*.— „ овечья.
- „ *pratensis*.— „ луговая.
- „ *rubra*.— „ красная.
- „ *silvatica*.— „ лесная.

Filago arvensis.—Жабник пашенный.

Filipendula hexapetala.—Землянка орехов.

- „ *Ulmaria*.—Таволга вязовая.

Fragaria moschata.—Земляника высокая.

- „ *vesca*.— „ обыкновенная.
- „ *viridis*.—Каубинка дикая.

Frangula Alnus.—Крушина ломкая.

Fraxinus.—Исень.

- „ *americana*.—Исень американский.
- „ *excelsior*.— „ высокий.

Fritillaria ruthenica.—Рябчик русский.

Fumaria officinalis.—Димница лекарственная.

Gagea.—Гусытник.

- „ *erubescens*.—Гусытник красноватый.
- „ *lutea*.— „ желтый.
- „ *minima*.— „ мелкий.

Galeopsis.—Пикудыльник.

- „ *bifida*.—Пикудыльник двунадрезный.
- „ *Ladanum*.— „ длинноцветный.
- „ *speciosa*.— „ зябра.
- „ *Tetrahit*.— „ колючий.

Galium.—Подмаренник.

- „ *boreale*.—Подмаренник северный.
- „ *Mollugo*.— „ мягкий.
- „ *palustre*.— „ болотный.
- „ *parisiense*.— „ парижский.
- „ *rubroides*.— „ мареновидный.
- „ *Schultesii*.— „ Шультесия.
- „ *spurium*.— „ пшени.
- „ *trifidum*.— „ трехнадрезный.
- „ *triflorum*.— „ трехцветковый.
- „ *uliginosum*.— „ топяный.
- „ *verum*.— „ настоящий.

Genista tinctoria.—Дрок красильный.

Geranium.—Гера́нь.

- „ *bohemicum*.—Гера́нь божественная.
- „ *molle*.— „ мягкая.
- „ *palustre*.— „ болотная.
- „ *pratense*.— „ луговая.
- „ *pusillum*.— „ низкая.
- „ *pyrenaicum*.— „ пиринейская.
- „ *Robertianum*.— „ Робертова.
- „ *rotundifolium*.— „ круглолистная.
- „ *sanguineum*.— „ кровавокрасная.
- „ *sibiricum*.— „ сибирская.
- „ *silvaticum*.— „ лесная.

Gentiana.—Горечавка.

- " *axillaris*.—Горечавка пазушная.
- " *cruciata*.—Соколий перелетъ.
- " *lingulata*.—Стародубка.
- " *Pneumonanthe*.—Горечавка синіе ко-
локольчики.

Geum.—Гравилатъ.

- " *aleppicum*.—Гравилатъ торчащій.
- " *intermedium*.— " средній.
- " *rivale*.— " ручейный.
- " *urbanum*.— " городской.

Gladiolus imbricatus.—Шпажникъ черепица-
тый.

Glechoma hederacea.—Будра плющевидная.

Glyceria.—Маяникъ.

- " *aquatica*.—Маяникъ водяной.
- " *fluitans*.— " обыкновенный.

Gnaphalium.—Сусеница.

- " *silvaticum*.—Сусеница лѣсная.
- " *uliginosum*.— " топяная.

Goodyera repens.—Гудьера ползучая.

Gratiola officinalis.—Асрапъ лѣкарственный.

Gymnadenia.—Кокушникъ.

- " *conopsea*.—Кокушникъ комаровый.
- " *cuculata*.— " клубучковый.

Gypsophila.—Качимъ.

- " *muralis*.—Качимъ стѣнной.
- " *paniculata*.— " метельчатый.

Heleocharis.—Водолюбъ.

- " *asicularis*.—Водолюбъ гнольчатый.
- " *ovata*.— " овальный.
- " *palustris*.— " болотный.

Helianthemum vulgare.—Солнцецвѣтъ обыкно-
венный.

Helianthus annuus.—Подсолнечникъ.

- " *tuberosus*.—Земляная груша.

Helichrysum arenarium.—Цминъ песчаный.

Hepatica triloba.—Перелѣска трехлопастная.

Hieracium sibiricum.—Ворщевникъ сибирскій.

Herninum Monorchis.—Бровникъ одноклубне-
вый.

Herniaria glabra.—Грыжникъ голый.

Hesperis matronalis.—Вечерница.

Hieracium.—Ястребинка.

- " *acrocomum*.—Ястребинка пучковая.
- " *apatelium*.— " измѣнчивая.
- " *arvicola*.— " пашенная.
- " *Auricula*.— " Скороспѣлка.
- " *auriculoides*.— " скороспѣловид-
ная.

- " *brachiatum*.— " вильчатая.
- " *calodon*.— " красновозубчатая.
- " *canum*.— " сѣдая.
- " *cymigerum*.— " полузонтная.
- " *echioides*.— " щетинистая.
- " *fallax*.— " ложная.
- " *flagellare*.— " длиннопопѣгая.
- " *flagellariforme*.— " плетевидная.
- " *floribundum*.— " многоцвѣтная.
- " *glomeratum*.— " скученная.
- " *Kuatii*.— " Кнафьева.
- " *laevigatum*.— " гладкая.
- " *patagocum*.— " паратогумъ.
- " *praealtum*.— " высокая.
- " *pratense*.— " луговая.
- " *Pilosella*.— " волосистая.

Hieracium Schultesii.—Ястребинка Шультезева.

- " *sciadophorum*.— " зонтикоцвѣтная.
- " *silvaticum*.— " лѣсная.
- " *spatophyllum*.— " лопатчатолистная.
- " *umbellatum*.— " зонтиковая.
- " *umbelliferum*.— " зонтиковидная.
- " *vulgatum*.— " обыкновенная.
- " *Zizianum*.— " Цинова.

Hierochloa odorata.—Лядникъ пахучій.

Hippophae rhamnoides.—Облѣшка крушиная.

Hippuris vulgaris.—Водяная сосенка.

Holcus lanatus.—Бухарникъ шерстистый.

Hordeum.—Ячмень.

- " *distichum*.—Ячмень двурядный.
- " *hexastichum*.— " шестирядный.
- " *vulgare*.— " обыкновенный.

Hottonia palustris.—Турча болотная.

Humulus Lupulus.—Хмель.

Hydrocharis morsus ranae.—Водокрасть лягу-
шечный.

Hyoscyamus niger.—Бѣлена черная.

Hypericum.—Звѣробой.

- " *hirsutum*.— Звѣробой волосистый.
- " *perforatum*.— " исколотый.
- " *quadrangulum*.— " четырехгранный.

Hypochoeris maculata.—Пазникъ крапчатый.

Hyssopus officinalis.—Песось лѣкарственный.

Iassione montana.—Букашникъ горный.

Impatiens.—Недотрога.

- " *noli-tangere*.—Недотрога-прыгунъ.
- " *parviflora*.— " мелкоцвѣтная.

Inula.—Девясиль.

- " *britannica*.—Девясиль британскій.
- " *Helenium*.— " высокий.
- " *hirta*.— " шершавый.
- " *salicina*.— " иволгистый.

Iris.—Касатикъ.

- " *Pseudacorus*.—Касатикъ желтый.
- " *sibirica*.— " сибирскій.

Isatis tinctoria.—Синиль крапильный.

Juglans cinerea.—Орѣшина сѣрая.

Juncus.—Ситникъ.

- " *acutiflorus*.— Ситникъ остроцвѣтный.
- " *alpinus*.— " альпійскій.
- " *bufonius*.— " жабный.
- " *compressus*.— " сплюснутый.
- " *conglomeratus*.— " скученный.
- " *effusus*.— " развѣсистый.
- " *filiformis*.— " нитевидный.
- " *glaucus*.— " сизый.
- " *lampocarpus*.— " членистый.
- " *squarrosus*.— " оттопыренный.

Juniperus.—Можжевельникъ.

- " *communis*.—Можжевельникъ обыкно-
венный.
- " *Sabina*.— " казацкій.

Knaulia arvensis.—Короставникъ полевой.

Koeleria.—Келерія.

- " *cristata*.—Келерія гребенчатая.
- " *glauca*.— " сизая.

Lactuca.—Латукъ.

- " *muralis*.—Латукъ стѣнной.
- " *sativa*.— " огородный.
- " *Serriola*.— " полевой.

Lamium.—Яснотка.
 „ *album*. — Яснотка бѣлая.
 „ *amplexicaule*. — „ стеблеобъемлющая.
 „ *Galeobdolon*. — Зеленчукъ.
 „ *hybridum*. — Яснотка гибридная.
 „ *maculatum*. — „ пестрая.
 „ *purpureum*. — „ пурпуровая.
Lampsana communis. — Вородавинокъ обыкновенный.

Lappula Myosotis. — Илпучка.
Larix. — Лиственница.
 „ *europaea*. — Лиственница европейская.
 „ *sibirica*. — „ сибирская.
Lasepium prutenicum. — Гладиолъ прусскій.
Lathraea squamaria. Петровъ крестъ.
Lathyrus. — Чина.
 „ *palustris*. — Чина болотная.
 „ *pisiformis*. — „ гороховидная.
 „ *pratensis*. — „ луговая.
 „ *silvestris*. — „ лѣсная.
 „ *tuberosus*. — „ клубненосная.

Lavatera thuringiaca. — Хатма тюрингская.
Ledum palustre. — Багульникъ болотный.
Lemma. — Ряска.

„ *minor*. — Ряска мелкая.
 „ *trisulca*. — „ трехлодная.
Lens esculenta. — Чечевица съѣдобная.
Leontodon. — Кулъбаба.
 „ *autumnalis*. — Кулъбаба осенняя.
 „ *hispida*. — „ щетинистая.
Leonurus. — Пустирыникъ.
 „ *Cardiaca*. — Пустирыникъ обыкновенный.
 „ *tatarica*. — „ татарскій.

Lepidium rudemale. — Клоповникъ.
 „ *sativum*. — Крессъ-салатъ.
Levisticum officinale. — Зоря лѣчебная.
Libanotis montana. — Порѣзникъ горный.
Ligularia sibirica. — Бузульникъ сибирскій.
Lilium Martagon. — Царскія кудри.
Limnanthemum pumphaeoides. — Павуикъ кукушниковый.

Limosella aquatica. — Тужайникъ водяной.
Linaria. — Линянка.
 „ *bipartita*. — Линянка двураздѣльная.
 „ *canadensis*. — „ канадская.
 „ *minor*. — „ малая.
 „ *vulgaris*. — „ дикій ленъ.

Linnaea borealis. — Линнея сѣверная.
Linum. — Ленъ.
 „ *catharticum*. — Ленъ слабительный.
 „ *flavum*. — „ желтый.
 „ *usitatissimum*. — „ обыкновенный.

Liparis Loeselii. — Лосинокъ Лозеліевый.
Listera. — Тайникъ.
 „ *cordata*. — Тайникъ сердцевидный.
 „ *ovata*. — „ овальный.
Lithospermum. — Воробейникъ.
 „ *arvense*. — Воробейникъ полевой.
 „ *officinale*. — „ лѣкарственный.

Lolium. — Плевель.
 „ *perenne*. — Англійскій райграссъ.
 „ *remotum*. — Плевель разставленный.
 „ *temulentum*. — „ опьяняющій.
Lonicera. — Жимолость.
 „ *coerulea*. — Жимолость сизая.
 „ *tatarica*. — „ татарская.
 „ *Xylosteum*. — „ обыкновенная.

Lotus corniculatus. — Лядвенецъ рогатый.
Lunaria rediviva. — Луникъ многолѣтний.
Luzula. — Олика.

„ *campestris*. — Олика полевая.
 „ *nemorosa*. — „ лѣсная.
 „ *pilosa*. — „ волосистая.
Lychnis flos cuculi. — Горчицѣвъ кукушникъ.

Lycium halimifolium. — Дереза, Лазуль.
Lycopodium. — Плаунокъ.
 „ *annotinum*. — Плаунокъ болотная мож-
 жуха.
 „ *clavatum*. — „ булавовидный.
 „ *complanatum*. — „ сплюснутый.
 „ *Selago*. — „ Баралець.

Lycopsis arvensis. — Кривоцѣвъ пашенный.
Lycopus. — Зюзникъ.
 „ *europaeus*. — Зюзникъ европейскій.
 „ *exaltatus*. — „ высокій.

Lysimachia. — Вербейникъ.
 „ *Nummularia*. — Вербейникъ луговой чай.
 „ *vulgaris*. — „ обыкновенный.
Lythrum Salicaria. — Дербенникъ плакучій.

Maianthemum bifolium. — Майникъ двулистный.
Malachium aquaticum. — Мягковолосникъ водя-
 ной.

Malaxis paludosa. — Стагачка болотистая.
Malva. — Просвиринокъ.
 „ *Alcea*. — Просвиринокъ алтеевскій.
 „ *borealis*. — „ сѣверный.
 „ *mauritanica*. — „ мавританскій.
 „ *neglecta*. — „ невидный.

Matricaria. — Ромашка.
 „ *Chamomilla*. — Ромашка обыкновенная.
 „ *inodora*. — „ непахучая.
 „ *suaveolens*. — „ благовоющая.

Medicago. — Медунка.
 „ *falcata*. — Медунка серповидная.
 „ *lupulina*. — „ хмелевая.
 „ *sativa*. — „ посѣвная.

Melampyrum. — Марьянникъ.
 „ *cristatum*. — Марьянникъ вѣтушій
 гребель.
 „ *nemorosum*. — „ Иванъ да Марья.
 „ *pratense*. — „ луговой.

Melandryum. — Щелкунець.
 „ *noctiflorum*. — Щелкунець ночевѣтный.
 „ *pratense*. — „ луговой.
 „ *silvestre*. — „ лѣсной.
 „ *viscosum*. — „ клейкій.

Melica. — Перловникъ.
 „ *altissima*. — Перловникъ рослый.
 „ *nutans*. — „ повислый.
Melilotus. — Донникъ.
 „ *alba*. — Донникъ бѣлый.
 „ *officinalis*. — „ лѣчебный.

Mentha. — Мята.
 „ *aquatica*. — Мята водяная.
 „ *arvensis*. — „ полевая.
 „ *austriaca*. — „ австрійская.
 „ *longifolia*. — „ длиннолистная.
 „ *piperita*. — „ перечная.
 „ *spicata*. — „ колосистая.

Mentha trifoliata. — Трифоль.
Mercurialis perennis. — Пролѣска многолѣтняя.
Microstylis monophyllos. — Стагачка однолистная.

Milium effusum.—Борь развѣсистый.
Mimulus luteus.—Губастикъ желтый.
Moehringia.—Мерингія.
 " *lateriflora*.—Мерингія бокоцвѣтная.
 " *trinervia*.— " трехнервная.
Molinia coerulea.—Молнія синяя.
Moneses grandiflora.—Келекейка крупноцвѣтная.
Monotropia.—Вертляница.
 " *Hypophega*.—Вертляница голая.
 " *Hypopitys*.— " подѣльничикъ.
Montia rivularis.—Монція ручейная.
Mulgedium macrophyllum.—Мульгедіумъ крупнолистный.
Myosotis.—Незабудка.
 " *caespitosa*.—Незабудка дернистая.
 " *micrantha*.— " мелкая.
 " *palustris*.— " болотная.
 " *scorpioides*.— " завитая.
 " *silvatica*.— " лѣсная.
 " *sparsiflora*.— " рѣдкоцвѣтковая.
Myosurus minimus.—Мышехвостникъ маленький.
Myriophyllum.—Уруть.
 " *spicatum*.—Уруть колосистый.
 " *verticillatum*.— " мутовчатый.
Najas minor.—Рѣзакъ маленький.
Nardus stricta.—Бѣлоусъ торчащій.
Nasturtium.—Жеруха.
 " *amphibium*.—Жеруха земноводная.
 " *anceps*.— " сомнительная.
 " *armoracioides*.— " хрѣновидная.
 " *austriacum*.— " австрійская.
 " *palustre*.— " болотная.
 " *silvestre*.— " лѣсная.
Naumburgia guttata.—Кизлякъ крапчатый.
Neottia nidus avis.—Гифъдовка безлистная.
Nepeta.—Котовникъ.
 " *Cataria*.—Котовникъ кошачій.
 " *nuda*.— " голый.
Neslea paniculata.—Неслея метельчатая.
Nicandra physaloides.—Никандра можжуховидная.
Nonnea pulla.—Монашка темноцвѣтная.
Nuphar.—Кубышка.
 " *luteum*.—Кубышка желтая.
 " *pumilum*.— " карликовая.
Nymphaea candida.—Кувшинка бѣлая.
Odontites rubra.—Зубчатка красная.
Oenanthae aquatica.—Омежникъ конскій укропъ.
Omphalodes scorpioides.—Пупочникъ завитой.
Onobrychis sativa.—Онарсеть полевный.
Onoclea Struthopteris.—Разнолистникъ черный.
Ononis hircina.—Стальникъ воиный.
Onopordon Acanthium.—Татарникъ колючій.
Onosma tinctoria.—Красный корень.
Oenothera biennis.—Ослинникъ двулѣтній.
Ophioglossum vulgatum.—Ужовникъ обыкновенный.
Orchis.—Ятрышникъ.
 " *coriophora*.—Ятрышникъ воиный.
 " *incarnata*.— " темно-красный.
 " *maculata*.— " кукушкины слезки.
 " *militaris*.— " шлемовидный.
 " *Russowii*.— " Руссовъ.
 " *tridentata*.— " трехзубчатый.

Origanum vulgare.—Душица обыкновенная.
Orobanchae.—Заразиха.
 " *Libanotidis*.—Заразиха порѣзничковая.
 " *purpurea*.— " пурпуровая.
Orobanchae.—Сочевичникъ.
 " *niger*.—Сочевичникъ черный.
 " *vernus*.— " весенний.
Oryza clandestina.—Дикій рисъ.
Ostericum palustre.—Маточникъ болотный.
Oxalis Acetosella.—Кислица заячья.
Panicum.—Просо.
 " *miliaceum*.—Просо настоящее.
 " *lineare*.— " линейное.
 " *Crus-galli*.— " колосистое.
Papaver.—Макъ.
 " *Rhoeas*.—Макъ самосѣйка.
 " *somniferum*.— " снотворный.
Paris quadrifolia.—Вороній глазъ.
Parnassia palustris.—Вѣлосоръ болотный.
Parthenocissus quadrifolius.—Виноградъ дикій.
Pastinaca sativa.—Пастернакъ полевный.
Pedicularis.—Мытникъ.
 " *comosa*.—Мытникъ хохлатый.
 " *palustris*.— " болотный.
 " *spectrum Carolinum*.—снѣдьстра Карла.
Peplis Portula.—Бутерлакъ обыкновенный.
Petasites.—Бѣлокопытникъ.
 " *officinalis*.—Бѣлокопытникъ лѣкарственный.
 " *tomentosus*.— " войлочный.
Petroselinum sativum.—Петрушка.
Peucedanum.—Горичникъ.
 " *Cervaria*.—Горичникъ оленій.
 " *Oreoselinum*.— " горная петрушка.
 " *palustre*.— " болотный.
Phalaris.—Капарейникъ.
 " *arundinacea*.—Капарейникъ тростниковый.
 " *canariensis*.— " канарейное сѣмя.
Phaseolus.—Фасоль.
 " *multiflorus*.—Фасоль многоцвѣтковая.
 " *vulgaris*.— " обыкновенная.
Philadelphus.—Чубушникъ.
 " *coronarius*.—Чубушникъ дикій жасминый.
 " *inodorus*.— " непахучій.
 " *latifolius*.— " широколистный.
Phleum.—Аржанецъ.
 " *Boehmeri*.—Аржанецъ Бемеровъ.
 " *pratense*.— " Тимофеева трава.
Phlomis tuberosa.—Зошникъ клубеносный.
Physocarpus opulifolia.—Пузырчатникъ каллинолистный.
Phyteuma spicatum.—Кольникъ колосистый.
Picea excelsa.—Ель обыкновенная.
Picris hieracioides.—Горчакъ ястребинковый.
Pimpinella Saxifraga.—Бехренецъ камнеломка.
Pinus.—Сосна.
 " *Cembra*.—Бѣдръ сибирскій.
 " *silvestris*.—Сосна обыкновенная.
 " *Strobus*.— " Веймутова.
Pirola.—Грушанка.
 " *chlorantha*.—Грушанка зеленоцвѣтная.
 " *media*.— " средняя.
 " *minor*.— " малая.
 " *rotundifolia*.— " круглолистная.

Pirus communis. — Груша.

" *Malus.* — Яблоня.

Pisum sativum. — Горох посевной.

Plantago. — Попутник.

" *lanceolata.* — Попутник ланцетолестный.

" *major.* — " большой.

" *media.* — " средний.

" *ramosa.* — " кистистый.

Platanthera. — Любка.

" *chlorantha.* — Любка зеленцветная.

" *solstitialis.* — " почная фиалка.

Poa. — Мятлик.

" *annua.* — Мятлик однолетний.

" *bulbosa.* — " луковичный.

" *compressa.* — " сплюснутый.

" *Chaixii.* — " сугутский.

" *nemoralis.* — " лесной.

" *palustris.* — " болотный.

" *pratensis.* — " луговой.

" *trivialis.* — " обыкновенный.

Polemonium coeruleum — Синюха.

Polygala. — Истодь.

" *amarella.* — Истодь горьковатый.

" *comosa.* — " хохлатый.

" *vulgaris.* — " обыкновенный.

Polygonatum. — Купена.

" *multiflorum.* — Купена многоцветковая.

" *officinalis.* — " лекарственная.

Polygonum. — Гречиха.

" *amphibium.* — Гречиха сямноводная.

" *aviculare.* — " спорный.

" *Bistorta.* — " Попово гумно.

" *Convulvulus.* — " повилочная.

" *dumetorum.* — " прикустарная.

" *Hydropiper.* — " собачий перец.

" *minus.* — " мелкая.

" *mite.* — " прѣсная.

" *nodosum.* — " узловатая.

" *Persicaria.* — " Почечуйная трава.

" *tomentosum.* — " войлочная.

Populus. — Тополь.

" *alba.* — Тополь серебристый.

" *angulatus.* — " ребристый.

" *balsamifera.* — " бальзамический.

" *berolinensis.* — " берлинский.

" *canadensis.* — " канадский.

" *candicans.* — " белесоватый.

" *laurifolia.* — " лавролиственный.

" *moskoviensis.* — " московский.

" *nigra.* — " Осокорь.

" *tremula.* — Осица.

Potamogeton. — Рдесть.

" *alpinus.* — Рдесть альпийский.

" *compressus.* — " сплюснутый.

" *crispus.* — " курчавый.

" *gramineus.* — " злачный.

" *lucens.* — " блестящий.

" *mucronatus.* — " остроконечный.

" *natans.* — " плавающий.

" *obtusifolius.* — " туполистный.

" *pectinatus.* — " гребчатый.

" *perfoliatus.* — " сквознолистный.

" *praelongus.* — " длинный.

" *pusillus.* — " маленький.

Potentilla. — Лапчатка.

" *alba.* — Лапчатка белая.

Potentilla anserina. — Лапчатка гусиная лапка

" *arenaria.* — " песчаная.

" *argentea.* — " серебристая.

" *argenteaeformis.* — " стелющаяся.

" *canescens.* — " седая.

" *fruticosa.* — " Курильский чай.

" *intermedia.* — " средняя.

" *Nestleriana.* — " Нестлерева.

" *norvegica.* — " норвежская.

" *okensis.* — " окская.

" *recta.* — " прямая.

" *reptans.* — " ползучая.

" *rubens.* — " красноватая.

" *silvestris.* — " лесная.

" *supina.* — " лежащая.

" *thuringiaca.* — " тюрингическая.

" *thyrsiflora.* — " разветвленная.

Poterium Sanguisorba. — Черноголовка кровя-

хлебовая.

Primula veris. — Скороспелка весенняя.

Prunus Cerasus. — Вишня.

" *domesticus.* — Слива обыкновенная.

" *fruticosa.* — Дикая вишня.

" *nana.* — Бобовник.

" *Padus.* — Черемуха.

" *spinosa.* — Терн.

" *virginiana.* — Черемуха виргинская.

Pteridium aquilinum. — Орляк обыкновенный.

Pulicaria prostrata. — Болотница.

Pulmonaria. — Медуница.

" *angustifolia.* — Медуница узколиственная.

" *officinalis.* — лекарственная.

Pulsatilla patens. — Прострѣль, сон-трава.

Quercus robur. — Дубь обыкновенный.

Ramischia secunda. — Заячья соль.

Ranunculus. — Лютик.

" *acris.* — Лютик едкий.

" *auricomus.* — " золотистый.

" *bulbosus.* — " луковичный.

" *cassubicus.* — " касубский.

" *circinatus.* — " жесткодожный.

" *confervoides.* — " нитчатый.

" *Ficaria.* — " чистяк.

" *Flammula.* — " прыщинец.

" *illiricus.* — " иллирийский.

" *Lingua.* — " язычковый.

" *memorosus.* — " лесной.

" *polyanthemos.* — " многоцветковый.

" *polyphyllus.* — " многолистный.

" *pseudoflaccidus.* — " мягколистный.

" *repens.* — " ползучий.

" *sceleratus.* — " ядовитый.

Raphanus Raphanistrum. — Рѣдка дикая.

" *sativus.* — " огородная.

Rhamnus cathartica. — Крушина слабительная.

Rhynchospora alba. — Очеретник белый.

Ribes. — Смородина.

" *alpinum.* — Смородина альпийская.

" *aureum.* — " золотистая.

" *Grossularia.* — Крыжовник.

" *nigrum.* — Смородина черная.

" *rubrum.* — " красная.

Rosa. — Шиповник.

" *canina.* — Шиповник дикий.

" *cinnaomoea.* — " обыкновенный.

- Rosa gallica.* — Шиповник французскій.
lutea. — „ желтый.
pendulua. — „ альпійскій.
pimpinellifolia. — „ безрепичный.
rubrifolia. — „ краснолиственный.
rugosa. — „ морщинистый.
Rubus arcticus. — Княженика.
caesius. — Ежевика.
chamaemorus. — Морощка.
idaeus. — Малина.
odoratus. — „ душистая.
saxatilis. — Костяника.
suberectus. — Куманика.
Rumex. — Щавель.
Acetosa. — Щавель кислый.
Acetosella. — „ кислотавый.
aquatica. — „ водяной.
confertus. — „ конекский.
crispus. — „ курчавый.
domesticus. — „ домашний.
Hydrolapathum — „ лошадинникъ.
limosus. — „ илистый.
maritimus. — „ морской.
maximus. — „ огромный.
uranicus. — „ украинскій.
Sagina. — Мшанка.
nodosa. — „ Мшанка узловатая.
procumbens. — „ лежащая.
Sagittaria sagittifolia. — Стрѣлолистъ обыкновенный.
Salix. — Ива.
acutifolia. — Верба.
alba. — Бетла.
aurita. — „ Ива ушастая.
caprea. — „ бредина.
cinerea. — „ пепельная.
dasyclados. — „ опушенная.
fragilis. — „ ломкая.
Gmelinii. — „ Лоза.
lapponum. — „ лапландская.
livida. — „ блѣдная.
myrtilloides. — „ черилчяная.
nigricans. — „ чернѣющая.
pentandra. — „ черноталъ.
phylicifolia. — „ двувѣтвистая.
purpurea. — „ желтолозинокъ.
repens. — „ ползучая.
triandra. — „ бѣлоталъ.
Salsola Kali. — Соляника калийная.
Salvia. — Шалфей.
glutinosa. — Шалфей клейкій.
nemorosa. — „ дубровый.
pratensis. — „ луговой.
silvestris. — „ лѣсной.
verticillata. — „ мутовчатый.
Sambucus. — Бузина.
Ebulus. — Бузина зеленникъ.
nigra. — „ черная.
racemosa. — „ кистеносная.
Sanguisorba officinalis. — Кровохлебка лѣчебная.
Sanicula europaea. — Подлѣсникъ европейскій.
Saponaria officinalis. — Мыльнянка лѣчебная.
Satureja Acinos. — Душеникъ.
Clinopodium. — Пахучка.
Saxifraga Hirculus. — Камеломка царскія очи.
Scabiosa ochroleuca. — Скабіоза желтая.
Scuehzeria palustris. — Шейхерія болотная.
Scilla cernua. — Подсѣзникъ. Пролѣска.
Scirpus. — Камышъ.
lacustris. — Камышъ озерный.
maritimus. — „ морской.
pauciflorus. — „ малоцвѣтковый.
radicans. — „ укореняющійся.
silvaticus. — „ лѣсной.
Scleranthus annuus. — Дивала однолѣтняя.
Scolochloa festuacea. — Трезубка овсяничная.
Scorzonera. — Козелецъ.
hispanica. — Сладкій корень.
humilis. — Козелецъ низкій.
purpurea. — „ пурпуровый.
Scrophularia. — Норичникъ.
alata. — Норичникъ крылатый.
nodosa. — „ шишковатый.
vernalis. — „ весенний.
Scutellaria. — Шлемникъ.
galericulata. — Шлемникъ обыкновенный.
hastifolia. — „ копьевидный.
Secale cereale. — Рожь обыкновенная.
Sedum. — Очитокъ.
acre. — Очитокъ ѣдкій.
sexangulare. — „ шестигранный.
Telephium. — „ заячья капуста.
Selium Carvifolia. — Гирча тминолистная.
Sempervivum soboliferum. — Молодиль.
Senecio. — Крестовникъ.
erucifolius. — Крестовникъ тонколистный.
fluviatilis. — „ рѣчной.
Jacobaea. — „ желтуха.
paludosus. — „ болотный.
palustris. — „ Пепельникъ.
silvaticus. — „ лѣсной.
vernalis. — „ весенний.
viscosus. — „ клейкій.
vulgaris. — „ обыкновенный.
Serratula. — Серпуха.
coronata. — Серпуха вѣщесносная.
tinctoria. — „ красильная.
Seseli coloratum. — Жабница покрашенная.
Setaria. — Щетинникъ.
glauc. — Щетинникъ сизый.
viridis. — „ зеленый.
Sherardia arvensis. — Шерардіа полевая.
Silene. — Смолевка.
dichotoma. — Смолевка двураздѣльная.
nutans. — „ поникшая.
Orites. — „ ушковая.
procumbens. — „ лежащая.
tatarica. — „ татарская.
venosa. — „ хлопущка.
Silybum Marianum. — Остро-пестро.
Sinapis. — Горчица.
alba. — Горчица бѣлая.
arvensis. — „ полевая.
Sisymbrium. — Гулявникъ.
Alliaria. — Гулявникъ чесночный.
juncum. — „ тростняковый.
Loeselii. — „ Лозелѣвъ.
officinalis. — „ лѣчебный.
sinapistrum. — „ горчичный.
Sophia. — „ стручатый.
strictissimum. — „ торчаній.

Sisymbrium Thalianum.—Гуливи́к Та́лиевъ.
wolgense.— волжскій.
Sium latifolium.—Поручейникъ широколиственный.
Solanum.—Насе́нь.
 „ *Dulcamara*.—Насе́нь горькій.
 „ *Lycopersicum*.—Томать, Помидоръ.
 „ *Melanogena*.—Баклажанъ.
 „ *nigrum*.—Насе́нь черны́й.
 „ *tuberosum*.—Картофель.
Solidago canadensis.—Золотарникъ канадскій.
 „ *virga aurea*.—Золотая розга.
Sonchus.—Осо́тъ.
 „ *arvensis*.—Осо́тъ полевой.
 „ *asper*.— „ жесткій.
 „ *oleraceus*.— „ огородный.
 „ *palustris*.— „ болотный.
Sorbaria sorbifolia.—Рыби́нникъ.
Sorbus aucuparia.—Ря́бина.
Sparganium.—Ежеголовка.
 „ *affine*.— Ежеголовка сходная.
 „ *minimum*.— „ маленькая.
 „ *neglectum*.— „ втвистая.
 „ *simplex*.— „ простая.
Spergula arvensis.—Торница полевая.
Spergularia rubra.—Торчникъ красный.
Spinacia oleracea.—Шпинатъ огородный.
Spiraea.—Таволга.
 „ *crenifolia*.— Таволга городковая.
 „ *hypericifolia*.— „ зѣвробелестная.
 „ *laevigata*.— „ гладкая.
 „ *media*.— „ средняя.
 „ *salicifolia*.— „ иволжистая.
 „ *ulmifolia*.— „ вязолистная.
Spirodela polyrrhiza.—Ряска многокорешковая.
Stachys.—Чистецъ.
 „ *annua*.—Чистецъ однолѣтний.
 „ *Betonica*.—Букови́ца.
 „ *palustris*.—Чистецъ болотный.
 „ *recta*.— „ прямой.
 „ *silvatica*.— „ лѣсной.
Stellaria.—Звѣздчатка.
 „ *crassifolia*.—Звѣздчатка толстолиственная.
 „ *graminea*.— „ злачная.
 „ *Holostea*.— „ жестколиственная.
 „ *media*.— „ мокрица.
 „ *mosquensis*.— „ московская.
 „ *nemorum*.— „ лѣсная.
 „ *palustris*.— „ болотная.
 „ *uliginosa*.— „ болотистая.
Stipa pennata.—Ковыль перистый.
Stratiotes Aloides.—Тѣлорѣзъ сабуровидный.
Succisa praemorsa.—Сивецъ.
Symphoricarpos racemosa.—Снѣжная ягода.
Symphytum.—Окопникъ.
 „ *asperum*.—Окопникъ острый.
 „ *officinale*.— „ лѣкарственный.
Syringa.—Сирень.
 „ *Josikaea*.—Сирень персикая.
 „ *vulgaris*.— „ обыкновенная.
Taraxacum vulgare.—Одуванчикъ.
Thalictrum.—Василистникъ.
 „ *angustifolium*.— Василистникъ узко-
 листный.
 „ *aquilegifolium*.— „ водосборолистный.
 „ *flavum*.— „ желтый.
 „ *minus*.— „ малый.

Thalictrum simplex.—Василистникъ простой.
Thesium ebracteatum.—Лѣняйка безприцѣтнич-
 ковая.
Thlaspi arvensis.—Ирутка полевая.
Thuja occidentalis.—Пегийю́чка западная.
Thymus.—Тимья́нъ.
 „ *glaber*.— Тимья́нъ голый.
 „ *Marschallianus*.— „ Маршаліевъ.
 „ *Sepryllum*.—Вогородская трава.
Tilia.—Липа.
 „ *cordata*.— Липа сердцевидная.
 „ *platyphyllos*.— „ широколиственная.
 „ *vulgaris*.— „ обыкновенная.
Tortilis Anthuseus.—Пуши́ринникъ.
Tragopogon.—Козлобородникъ.
 „ *orientalis*.—Козлобородникъ восточный.
 „ *porrifolius*.—Овесный корень.
 „ *pratensis*.— Козлобородникъ луговой.
Trientalis europaea.—Седмичникъ европейскій.
Trifolium.—Клеверъ.
 „ *agrarium*.— Клеверъ напашенный.
 „ *alpestre*.— „ альпійскій.
 „ *arvense*.— „ полевой.
 „ *campestre*.— „ лежачій.
 „ *hybridum*.— „ нечистотный.
 „ *medium*.— „ средній.
 „ *montanum*.— „ горный.
 „ *pratense*.— „ луговой.
 „ *repens*.— „ ползучій.
 „ *spadicum*.— „ каштановый.
Triglochin.—Триостренникъ.
 „ *maritima*.—Триостренникъ морской.
 „ *palustris*.— „ болотный.
Trisetum flavescens.—Овесь желтоватый.
Tritium.—Пшеница.
 „ *caninum*.—Пшеница дикая.
 „ *cristatum*.— „ гребенчатая.
 „ *intermedium*.— „ средняя.
 „ *repens*.— „ Пырей.
 „ *vulgaris*.— „ обыкновенная.
Trollius europaeus.—Кузальщца европейская.
Tulipa Biebersteiniana.—Тюльпанъ Биберштейна.
Turritis glabra.—Вяжечка голая.
Tussilago farfarus.—Мать и мачеха.
Typha.—Рогозъ.
 „ *angustifolia*.—Рогозъ узколиственный.
 „ *latifolia*.— „ широколиственный.
Ulmus.—Вязъ.
 „ *pedunculata*.—Вязъ черешчатый.
 „ *scabra*.— „ шершавый.
Urtica.—Крапива.
 „ *cannabina*.—Крапива коноплевидная.
 „ *dioica*.— „ двудомная.
 „ *urens*.— „ жгучая.
Utricularia.—Плывучка.
 „ *intermedia*.—Плывучка средняя.
 „ *major*.— „ большая.
 „ *minor*.— „ маленькая.
 „ *vulgaris*.— „ обыкновенная.

Vaccaria pyramidata.—Тысячеголовъ пирами-
 дальный.
Vaccinium microcarpum.—Клю́ква мелкоплод-
 ная.
 „ *Myrtillus*.—Черника.
 „ *Oxycoccus*.—Клю́ква.

Vaccinium uliginosum.—Голубика, пьяница.

" *Vitis idaea*.—Врушица.

Valeriana officinalis.—Мауль лекарственный.

Verbascum.—Коровякъ.

" *collinum*.—Коровякъ холмовой.

" *Lychnitis*.—" клинолистный.

" *nigrum*.—" черный.

" *phlomisoides*.—" мохнатый.

" *phoeniceum*.—" самоцветъ.

" *thapsiforme*.—" Царскій скипетръ.

" *Thapsus*.—" Медвѣжье ухо.

Veratrum.—Чемерица.

" *album*.—Чемерица бѣлая.

" *nigrum*.—" черная.

Veronica.—Вероника.

" *agrestis*.—Вероника пашенная.

" *Anagalis-aquatica*.—" ключевая.

" *arvensis*.—" полевая.

" *austriaca*.—" австрійская.

" *Beccabunga*.—" ручейная.

" *chamaedrys*.—" дубровая.

" *gentianoides*.—" горичавковая.

" *incana*.—" серебристая.

" *longifolia*.—" длиннолистная.

" *officinalis*.—" лекарственная.

" *opaca*.—" тусклая.

" *prostrata*.—" простертая.

" *scutellata*.—" щитковая.

" *serpyllifolia*.—" тимьянолистная.

" *spicata*.—" Андреевъ крестъ.

" *spuria*.—" ненастоящая.

" *Teucrium*.—" змѣиная головка.

" *triphyllos*.—" трехлистая.

" *verna*.—" весенняя.

Viburnum Lantana.—Гордовникъ.

Viburnum Opulus.—Калина.

Vicia.—Горошекъ.

" *angustifolia*.—Горошекъ узколистный.

" *cassubica*.—" касубскій.

" *Cracca*.—" мышинный.

" *Faba*.—Бобы русскіе.

" *pisiformis*.—Горошекъ гороховидный.

" *sativa*.—Вика.

" *sepium*.—Горошекъ заборный.

" *silvatica*.—" лѣсной.

" *tenuifolia*.—" узколистный.

Viola.—Фиалка.

" *arenaria*.—Фиалка песчаная.

" *canina*.—" дикая.

" *collina*.—" холмовая.

" *elatior*.—" высокая.

" *epipsila*.—" разнолистная.

" *hirta*.—" опушенная.

" *mirabilis*.—" разноцветная.

" *odorata*.—" душистая.

" *palustris*.—" болотная.

" *pumila*.—" низкая.

" *Riviniiana*.—" Ривиніева.

" *tricolor*.—" Анютинъ глазки.

" *uliginosa*.—" болотистая.

Vinca minor.—Барвинокъ малый.

Vincetoxicum officinale.—Ластовень лѣчебный.

Viscaria vulgaris.—Дрема обыкновенная.

Xanthium.—Дуришникъ.

" *spinosa*.—Дуришникъ колючій.

" *Strumarium*.—" обыкновенный.

Zannichellia palustris.—Занихелія болотная.

Zea Mays.—Кукуруза.

Алфавитный списокъ родовъ русскихъ названій растений всѣхъ трехъ частей и нѣкоторыхъ б. или м. установившихся видовыхъ названій съ соотвѣтствующими латинскими.

Аврапъ.—*Gratiola*.
Аденофора.—*Adenophora*.
Адокса.—*Adoxa*.
Аиръ.—*Acorus*.
Аистникъ.—*Erodium*.
Акадія.—*Caragana*.
Андреевъ крестъ.—*Veronica spicata*.
Андромеда.—*Andromeda*.
Анютины глазки.—*Viola tricolor*.
Аржанень.—*Phleum*.
Артишокъ.—*Cynara*.
Астра.—*Aster*.
Астрagalъ.—*Astragalus*.
Багульникъ.—*Ledum*.
Баклажанъ.—*Solanum Melanogena*.
Барбарисъ.—*Berberis*.
Барвинокъ.—*Vinca*.
Батрачникъ.—*Alopecurus*.
Башмачекъ.—*Cypripedium*.
Ведренецъ.—*Pimpinella*.
Бекманія.—*Beckmannia*.
Береза.—*Betula*.
Вересклетъ.—*Evonymus*.
Близна.—*Blysmus*.
Влошница.—*Pulicaria*.
Бобовникъ.—*Prunus nana*.
Бобы.—*Vicia Faba*.
Богородская трава.—*Thymus Serpyllum*.
Водякъ.—*Cirsium*.
Божье-дерево.—*Artemisia paniculata*.
Болитоголовъ.—*Conium*.
Болотникъ.—*Callitriche*.
Борецъ.—*Aconitum*.
Боровикъ.—*Chimophila*.
Бородавникъ.—*Lampsana*.
Борщевникъ.—*Heraclum*.
Боръ.—*Milium*.
Боярышникъ.—*Crataegus*.
Брусника.—*Vaccinium Vitis idaea*.
Брюква.—*Brassica Napus*.
Будра.—*Glechoma*.
Бузина.—*Sambucus*.
Бузульникъ.—*Ligularia*.
Буканикъ.—*Iasione*.
Буковица.—*Stachys Betonica*.
Бурачекъ.—*Alyssum*.
Бурячникъ.—*Borrago*.

Бутень.—*Chaerophyllum*.
Бутерлакъ.—*Peplis*.
Бухарникъ.—*Holcus*.
Валена.—*Hyoscyamus*.
Вязлооръ.—*Parnassia*.
Вязлокопытникъ.—*Petasites*.
Вязлокрыльникъ.—*Calla*.
Вязлокудренникъ.—*Ballota*.
Вязоуеъ.—*Nardus*.

Василекъ.—*Centaurea*.
Василежникъ.—*Thalietrum*.
Верба.—*Salix acutifolia*.
Вербейникъ.—*Lysimachia*.
Верескъ.—*Calluna*.
Вероника.—*Veronica*.
Вертялища.—*Monotropa*.
Ветла.—*Salix alba*.
Вехъ.—*Cicuta*.
Вечерница.—*Hesperis*.
Вика.—*Vicia sativa*.
Виноградъ дикій.—*Parthenocissus*.
Вишня.—*Prunus Cerasus*.
Водокрасъ.—*Hydrocharis*.
Водолюбъ.—*Heleocharis*.
Водосборъ.—*Aquilegia*.
Водяная зараза.—*Elodea canadensis*.
Волдырьникъ.—*Cucubalus*.
Водчье лико.—*Daphne*.
Воробейникъ.—*Lithospermum*.
Воронень.—*Actaea*.
Вороній глазъ.—*Pais*.
Вьюнокъ.—*Calystegia* и *Convolvulus*.
Вѣйникъ.—*Calamagrostis*.
Вѣтренница.—*Anemone*.
Вязечка.—*Turritis*.
Вязель.—*Coronilla*.
Вязъ.—*Ulmus*.

Гвоздика.—*Dianthus*.
Геранъ.—*Geranium*.
Гирча.—*Selinum*.
Гирчовникъ.—*Conioselinum*.
Гладышъ.—*Laserpicium*.
Гляздовка.—*Neottia*.
Голубика.—*Vaccinium uliginosum*.
Гордовникъ.—*Viburnum Lantana*.
Горечавка.—*Gentiana*.

Горишникъ. — *Lychnis*.
 Горичникъ. — *Peucedanum*.
 Горошекъ. — *Vicia*.
 Горохъ. — *Pisum*.
 Горчакъ. — *Picris*.
 Горчица. — *Sinapis*.
 Гравилатъ. — *Geum*.
 Гребникъ. — *Cynosurus*.
 Гречиха. — *Fagopyrum* и *Polygonum*.
 Гроздовникъ. — *Botrychium*.
 Груша. — *Pirus communis*.
 Грушанка. — *Pirola*.
 Грыжникъ. — *Herniaria*.
 Губастикъ. — *Mimulus*.
 Гудера. — *Goodyera*.
 Гулявикъ. — *Sisymbrium*.
 Гусятникъ. — *Gagea*.

Девясиль. — *Inula*.
 Дербеникъ. — *Lythrum*.
 Дереза. — *Lyceum*.
 Деренъ. — *Cornus*.
 Дивала. — *Scleranthus*.
 Доинникъ. — *Melilotus*.
 Дрема. — *Viscaria*.
 Дремликъ. — *Eriopactis*.
 Дрокъ. — *Genista*.
 Дубъ. — *Quercus*.
 Дудникъ. — *Angelica*.
 Дурианъ. — *Datura*.
 Дуришникъ. — *Xanthium*.
 Душеникъ. — *Satureja*.
 Душина. — *Origanum*.
 Дымница. — *Fumaria*.
 Дягиль. — *Archangelica*.

Ежа. — *Dactylis*.
 Ежевика. — *Rubus caesius*.
 Ежеголовка. — *Sparganium*.
 Ель. — *Picea*.

Жабникъ. — *Filago*.
 Жабница. — *Seseli*.
 Жасминъ. — *Philadelphus coronarius*.
 Жгучъ-корень. — *Cnidium*.
 Желтушникъ. — *Erysimum*.
 Желудникъ. — *Aesculus*.
 Жеруха. — *Nasturtium*.
 Живучка. — *Ajuga*.
 Живокость. — *Delphinium*.
 Жимолость. — *Lonicera*.

Занихелія. — *Zannichellia*.
 Зарзика. — *Orobancha*.
 Заряница. — *Cortusa*.
 Заячья капуста. — *Sedum Telephium*.
 Заячья соль. — *Ramischia*.
 Звѣздчатка. — *Stellaria*.
 Звѣрбой. — *Hypericum*.
 Зеденчукъ. — *Linum Galeobdolon*.
 Земляная груша. — *Helianthus tuberosa*.
 Земляника. — *Fragaria*.
 Зѣбегодовникъ. — *Dracocephalum*.
 Золотарникъ. — *Solidago*.
 Золотая розга. — *Solidago virga aurea*.
 Золотосеменикъ. — *Centaureum*.
 Золотыя. — *Phlomis*.

Зоря. — *Levisticum*.
 Зубровка. — *Anthoxanthum*.
 Зубчатка. — *Odontites*.
 Зюзникъ. — *Lycopus*.

Ива. — *Salix*.
 Иванъ-да-Марья. — *Melampyrum nemorosum*.
 Иванъ-чай. — *Epilobium angustifolium*.
 Икотникъ. — *Berteroa*.
 Ирга. — *Amelanchier*.
 Иссопъ. — *Hyssopus*.
 Истодъ. — *Polygala*.

Калина. — *Viburnum Opulus*.
 Калужница. — *Caltha*.
 Калудеръ. — *Chrysanthemum Balsamita*.
 Камелина. — *Camelina*.
 Камеломка. — *Saxifraga*.
 Камышь. — *Scirpus*.
 Капуста. — *Brassica oleracea*.
 Картофель. — *Solanum tuberosum*.
 Касатикъ. — *Iris*.
 Кассандра. — *Cassandra*.
 Катаброза. — *Catabrosa*.
 Качимъ. — *Gypsophila*.
 Каштанъ конскій. — *Aesculus Hippocastanum*.
 Кедръ. — *Pinus Cembra*.
 Келекейка. — *Moneses*.
 Келерія. — *Koeleria*.
 Кервель. — *Anthriscus Cerefolium*.
 Кизильникъ. — *Cotoneaster*.
 Кизлякъ. — *Naumburgia*.
 Кирей. — *Epilobium*.
 Кирказонъ. — *Aristolochia*.
 Кислица. — *Oxalis*.
 Кишинецъ. — *Coriandrum*.
 Клеверъ. — *Trifolium*.
 Кленъ. — *Acer*.
 Клоповникъ. — *Lepidium rudemale*.
 Клопосѣмникъ. — *Corispermum*.
 Клубника. — *Fragaria viridis*.
 Клюква. — *Vaccinium Oxycoccus*.
 Княженика. — *Rubus arcticus*.
 Ковиль. — *Stipa*.
 Козелецъ. — *Scorzonera*.
 Козлобродникъ. — *Tragopogon*.
 Кокорышъ. — *Aethusa*.
 Кокушникъ. — *Gymnadenia*.
 Колдуница. — *Circaea*.
 Колокольчикъ. — *Campanula*.
 Кольникъ. — *Phyteuma*.
 Колючникъ. — *Carlina*.
 Конопля. — *Cannabis*.
 Копытень. — *Asarum*.
 Коровякъ. — *Verbascum*.
 Коросталикъ. — *Knautia*.
 Коротконожка. — *Brachypodium*.
 Костерь. — *Bromus*.
 Костяника. — *Rubus saxatilis*.
 Котовикъ. — *Nepeta*.
 Кочедыжникъ. — *Athyrium*.
 Кощачья лапка. — *Antennaria dioica*.
 Крапива. — *Urtica*.
 Красный корень. — *Onosma tinctoria*.
 Крессъ-салатъ. — *Lepidium sativum*.
 Крестовникъ. — *Senecio*.
 Кривощетъ. — *Lycopsis*.

Кровохлебка. — *Sanguisorba*.
 Крушка. — *Draba*.
 Крушелица. — *Buphthalmum*.
 Крушина. — *Frangula* и *Rhamnus*.
 Крыжовник. — *Ribes Grossularia*.
 Кубышка. — *Nuphar*.
 Кувшинка. — *Nymphaea*.
 Куколь. — *Agrostemma*.
 Кукуруза. — *Zea Mays*.
 Кукушкины слезки. — *Orchis maculata*.
 Кульбаба. — *Leontodon*.
 Куманика. — *Rubus suberectus*.
 Купальница. — *Trollius*.
 Купена. — *Polygonatum*.
 Кушрь. — *Anthriscus*.
 Курильский чай. — *Potentilla fruticosa*.

Ладынь. — *Coralliorrhiza*.
 Лазуль. — *Lycium*.
 Ландыш. — *Convallaria*.
 Ланчатка. — *Potentilla*.
 Ластовень. — *Vincetoxicum*.
 Латука. — *Lactuca*.
 Лебеда. — *Atriplex*.
 Ленъ. — *Linum*.
 Линия. — *Linnaea*.
 Липа. — *Tilia*.
 Липучка. — *Lappula*.
 Листовница. — *Larix*.
 Ложечник. — *Cochlearia*.
 Лоза. — *Salix Gmelinii*.
 Ломоносъ. — *Clematis*.
 Лопушникъ. — *Aretium*.
 Лоснякъ. — *Liparis*.
 Лохъ. — *Elaeagnus*.
 Луговникъ. — *Deschampsia*.
 Лужайникъ. — *Limossella*.
 Лукъ. — *Allium*.
 Луникъ. — *Lunaria*.
 Льнянка. — *Linaria* и *Thesium*.
 Любка. — *Platanthera*.
 Лютикъ. — *Ranunculus*.
 Лядвенецъ. — *Lotus*.
 Лядникъ. — *Hierochloa*.

Майникъ. — *Maianthemum*.
 Макъ. — *Papaver*.
 Малина. — *Rubus idaeus*.
 Майжетка. — *Alchimilla*.
 Маликъ. — *Atopis* и *Glyceria*.
 Маргаритка. — *Bellis*.
 Марь. — *Chenopodium*.
 Марьянникъ. — *Melampyrum*.
 Маточникъ. — *Ostericum*.
 Мать и мачеха. — *Tussilago*.
 Маунъ. — *Valeriana*.
 Медвѣжье ухо. — *Verbascum Thapsus*.
 Медунца. — *Pulmonaria*.
 Медунка. — *Melicago*.
 Мелкозлестникъ. — *Erigeron*.
 Мериния. — *Mochringia*.
 Метлица. — *Apera*.
 Можжевельникъ. — *Juniperus*.
 Мокричникъ. — *Alsine*.
 Молиня. — *Molinia*.
 Молодиль. — *Sempervivum*.
 Молочай. — *Euphorbia*.

Монашка. — *Nonnea*.
 Монция. — *Montia*.
 Мордовникъ. — *Echinops*.
 Морковь. — *Daucus*.
 Морощка. — *Rubus chamaemorus*.
 Мульгедюмъ. — *Mulgedium*.
 Мшанка. — *Sagina*.
 Мыльнянка. — *Saponaria*.
 Мытникъ. — *Pedicularis*.
 Мышехвостникъ. — *Myosurus*.
 Мягковолостникъ. — *Malachium*.
 Мята. — *Mentha*.
 Мятликъ. — *Poa*.

Надбородникъ. — *Epipogon*.
 Паперстянка. — *Digitalis*.
 Неглячка. — *Thuja*.
 Нелотрога. — *Impatiens*.
 Незабудка. — *Myosotis*.
 Неселя. — *Neslea*.
 Низмянка. — *Centunculus*.
 Никандра. — *Nicandra*.
 Норичникъ. — *Scrophularia*.

Облѣпиха. — *Hippophaës*.
 Овесъ. — *Avena* и *Trisetum*.
 Овсяница. — *Festuca*.
 Овсяный корень. — *Tragopogon porrifolius*.
 Огурецъ. — *Cucumis sativa*.
 Огуречная трава. — *Borrago officinalis*.
 Одуванчикъ. — *Taraxacum*.
 Одушка. — *Luzula*.
 Окопникъ. — *Symphytum*.
 Оляха. — *Alnus*.
 Омежникъ. — *Oenanthe*.
 Орлякъ. — *Pteridium*.
 Орѣшина. — *Juglans*.
 Орѣшникъ. — *Corylus*.
 Осина. — *Populus tremula*.
 Осипникъ. — *Oenothera*.
 Осока. — *Carex*.
 Осокоръ. — *Populus nigra*.
 Осотъ. — *Sonchus*.
 Острица. — *Asperugo*.
 Остро-пестро. — *Silybum*.
 Очанка. — *Euphrasia*.
 Очеретникъ. — *Rhynchospora*.
 Очитокъ. — *Sedum*.

Павуль. — *Limnathemum*.
 Пазникъ. — *Hypochoeris*.
 Паслёнъ. — *Solanum*.
 Пастернакъ. — *Pastinaca*.
 Пахучка. — *Satureja Clinopodium*.
 Пашенница. — *Erym*.
 Пепельникъ. — *Senecio palustris*.
 Перельска. — *Hepatica*.
 Переступень. — *Bryonia*.
 Пердовникъ. — *Melica*.
 Песчанка. — *Arenaria*.
 Петровъ крестъ. — *Lathraea*.
 Петрушка. — *Petroselinum*.
 Пижама. — *Chrysanthemum vulgare*.
 Пикульникъ. — *Galeopsis*.
 Пихта. — *Abies*.
 Плаунъ. — *Lycopodium*.
 Плевель. — *Lotum*.

Повилика. — *Cuscuta*.
 Повойничекъ. — *Elatine*.
 Погребомъ. — *Alectorolophus*.
 Поддъльникъ. — *Sancula*.
 Подмаренникъ. — *Galium*.
 Подсекольникъ. — *Amarantus*.
 Поденъжникъ. — *Scilla*.
 Подсолпечникъ. — *Helianthus annuus*.
 Подсвѣдла. — *Agrostis*.
 Подолзпестникъ. — *Coeloglossum*.
 Полизнь. — *Artemisia*.
 Помидоръ. — *Solanum Lycopersicum*.
 Подолзпестъ. — *Chrysanthemum*.
 Поново гумно. — *Polygonum Bistorta*.
 Попутникъ. — *Plantago*.
 Порей. — *Allium Porrum*.
 Поручейникъ. — *Sium*.
 Поръзникъ. — *Libanotis*.
 Поскоиникъ. — *Eupatorium*.
 Почечуйная трава. — *Polygonum Persicaria*.
 Примочная трава. — *Campanula glomerata*.
 Проложникъ. — *Androsace*.
 Пролъска. — *Mercurialis*.
 Просвирякъ. — *Malva*.
 Просо. — *Panicum*.
 Пустрѣль. — *Pulsatilla*.
 Пузырникъ. — *Cystopteris*.
 Пузырчатка. — *Utricularia*.
 Пузырчистикъ. — *Physocarpus*.
 Пулавка. — *Anthemis*.
 Пупочникъ. — *Omphalodes*.
 Пузырникъ. — *Torilis*.
 Пусторебрышникъ. — *Cenolophium*.
 Пустырникъ. — *Leonurus*.
 Пушица. — *Eriophorum*.
 Пшеница. — *Triticum*.
 Пыльцеголовникъ. — *Cephalanthera*.
 Пыяница. — *Vaccinium uliginosum*.

Равильцестемянникъ. — *Chorispora*.
 Разнолистникъ. — *Onoclea*.
 Райграссъ английскій. — *Lolium perenne*.
 „ французскій. — *Arrhenatherum elatius*.
 Ракитникъ. — *Cytisus*.
 Рдестъ. — *Potamogeton*.
 Репейникъ. — *Agrimonia*.
 Рись дикій. — *Oryza*.
 Рогозь. — *Typha*.
 Роголистникъ. — *Ceratophyllum*.
 Рожь. — *Secale*.
 Ромашка. — *Matricaria*.
 Росзянка. — *Drosera*.
 Рыжикъ. — *Camelina sativa*.
 Рѣдка. — *Raphanus*.
 Рѣзакъ. — *Najas*.
 Рѣдуха. — *Arabis*.
 Рѣпа. — *Brassica Rapa*.
 Рябина. — *Sorbus*.
 Рябинникъ. — *Sorbaria*.
 Рябенка. — *Fritillaria*.
 Риска. — *Lemna* и *Spirodela*.

Сабельникъ. — *Comarum*.
 Свекла. — *Beta*.
 Свѣрбига. — *Bunias*.
 Селенникъ. — *Trientalis*.
 Селезеночникъ. — *Chrysosplenium*.

Сельдереѣ. — *Arium*.
 Сердечникъ. — *Cardamine*.
 Серпуха. — *Serratula*.
 Сивецъ. — *Succisa*.
 Синеголовникъ. — *Eryngium*.
 Сипиль. — *Isatis*.
 Сивюха. — *Polemonium*.
 Сивяклъ. — *Echium*.
 Сирень. — *Syringa*.
 Ситникъ. — *Juncus*.
 Скабіоза. — *Scabiosa*.
 Скерда. — *Crepis*.
 Скоросѣлка. — *Primula*.
 Сладкій корень. — *Scorzonera hispanica*.
 Слива. — *Prunus*.
 Смолевка. — *Silene*.
 Смородина. — *Ribes*.
 Снитъ. — *Aegopodium*.
 Сивяная ягода. — *Symphoricarpos*.
 Собачій перецъ. — *Polygonum Hydropiper*.
 Сокозій перелець. — *Gentiana cruciata*.
 Солнцелѣтъ. — *Helianthemum*.
 Солянка. — *Salsola*.
 Сосна. — *Pinus*.
 Сочевикъ. — *Orobus*.
 Спаржа. — *Asparagus*.
 Спорышъ. — *Polygonum aviculare*.
 Статячка. — *Malaxis* и *Microstylis*.
 Стальникъ. — *Ononis*.
 Стародубка. — *Gentiana lingulata*.
 Стрѣломость. — *Sagittaria*.
 Сумочникъ. — *Capsella*.
 Сурьина. — *Barbarea*.
 Сусякъ. — *Butomus*.
 Сушеница. — *Gnaphalium*.
 Сыть. — *Cyperus*.

Таволга. — *Filipendula* и *Spiraea*.
 Тайликъ. — *Listera*.
 Татарникъ. — *Onopordon*.
 Терть. — *Prunus spinosa*.
 Тимьянъ. — *Thymus*.
 Тминъ. — *Carum*.
 Толокнянка. — *Arctostaphylus*.
 Томать. — *Solanum Lycopersicum*.
 Тополь. — *Populus*.
 Торица. — *Spergula*.
 Торичникъ. — *Spergularia*.
 Трезубка. — *Scolochloa*.
 Трифоль. — *Menyanthes*.
 Триострѣвникъ. — *Triglochin*.
 Тростникъ. — *Arundo*.
 Трясучка. — *Briza*.
 Турча. — *Hottonia*.
 Тыква. — *Cucurbita*.
 Тысячеголовъ. — *Vaccaria*.
 Тысячелистникъ. — *Achillea*.
 Тѣлорѣзъ. — *Stratiotes*.
 Тюльпанъ. — *Tulipa*.

Ужовникъ. — *Ophioglossum*.
 Укропъ. — *Anethum*.
 Уруть. — *Myriophyllum*.

Фасоль. — *Phaseolus*.
 Фіалка. — *Viola*.

Хатьма.—*Lavatera*.
 Хвостникъ.—*Hippuris*.
 Хвощъ.—*Equisetum*.
 Хмѣль.—*Humulus*.
 Хохлатка.—*Corydalis*.
 Хрѣнь.—*Cochlearia*.

Царскій скипетръ.—*Verbascum thapsiforme*.
 Царскія кудри.—*Lilium Martagon*.
 Цикорий.—*Cichorium*.
 Цминъ.—*Helichrysum*.

Частуха.—*Alisma*.
 Чемерица.—*Veratrum*.
 Черёта.—*Bidens*.
 Черемуха.—*Prunus Padus*.
 Черника.—*Vaccinium Myrtillus*.
 Чернобыльникъ.—*Artemisia vulgaris*.
 Черноголовка.—*Brunella* и *Poterium*.
 Чернокорень.—*Cynoglossum*.
 Чертополохъ.—*Carduus*.
 Чеснокъ.—*Allium oleraceum*.
 Чечевица.—*Lens*.
 Чина.—*Lathyrus*.
 Чистецъ.—*Stachys*.
 Чистотѣль.—*Chelidonium*.
 Чихотная трава.—*Achillea Ptarmica*.
 Чубушникъ.—*Philadelphus*.

Шалфей.—*Salvia*.
 Шандра.—*Elssholzia*.
 Шейхлерія.—*Scheuchzeria*.
 Шерарда.—*Sherardia*.
 Шиповникъ.—*Rosa*.
 Шлемникъ.—*Scutellaria*.
 Шпажникъ.—*Gladiolus*.
 Шпинать.—*Spinacia*.

Шавель.—*Rumex*.
 Щелкунь.—*Melandryum*.
 Щетинникъ.—*Setaria*.
 Щитнохвостникъ.—*Chaeturus*.
 Щирица.—*Albersia*.
 Щитникъ.—*Aspidium*.

Эдинный.—*Cichorium Endivia*.
 Эпарсень.—*Onobrychis*.
 Эстрагонъ.—*Artemisia Dracunculus*.

Яблоня.—*Pirus Malus*.
 Язвенникъ.—*Anthyllis*.
 Ярутка.—*Thlaspi*.
 Ясень.—*Fraxinus*.
 Ясколка.—*Cerastium*.
 Ямешникъ.—*Asperula*.
 Яснотка.—*Lamium*.
 Ястребинка.—*Hieracium*.
 Ятрышникъ.—*Oreghus*.
 Ячмень.—*Hordeum*.

Цѣна на простой бумагѣ 3 р. 25 к., на веленовой 4 р. 50 к.

Кедровый лес
Синий лес
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ

ФЛОРА

МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ.

СОСТАВИЛЪ

Д. П. Сырейщиковъ.

Д. П. Сырейщиковъ

Подъ редакцией А. Н. Петуникова.

ЧАСТЬ IV.



МОСКВА.

—
1914.

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ

ФЛОРА

МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

СОСТАВИЛЪ

Д. П. Сырейщиковъ.

Подъ редакціей А. Н. Петунникова.

ЧАСТЬ IV.

Дополненія, поправки и критическія замѣтки.



МОСКВА.

Складъ изданія въ книжномъ магазинѣ Товарищества „Н. П. Карбасниковъ“.

Москва, Моховая, противъ Университета.

1914.

Я никакъ не ожидалъ, что выполненіе моего обѣщанія—выпустить прибавленіе къ „Илл. Флорѣ Моск. губ.“—потребуется столь продолжительнаго времени. Замедленіе въ изданіи этой части произошло отъ появленія въ свѣтъ за послѣднее время большого количества монографій и цѣлаго ряда флоръ, очень хорошо разработанныхъ, по которымъ пришлось переопредѣлить почти весь матеріалъ, а нѣкоторые роды даже переработать вновь. И несмотря на то, въ издаваемомъ прибавленіи родъ *Salix* остался совершенно не затронутъ, такъ какъ на его коренную переработку, въ соответствии съ вновь изданными флорами и монографіями, потребовалось бы не менѣе года, а новаго матеріала, хорошо собраннаго, за послѣднее время не было.

Сравнительно мало добавленій пришлось внести и въ сем. *Gramineae*, которое взялся переработать А. А. Хорошковъ, но, къ сожалѣнію, обстоятельства сложились такъ, что къ началу печатанія онъ могъ дать только обработку встрѣчающихся у насъ видовъ *Koeleria* и *Glyceria*, за что приношу ему глубокую благодарность. Все же остальное по части злаковъ, что приведено мною въ этомъ выпускѣ, было б. ч. уже опубликовано послѣ выхода I части, и только сравнительно не большое количество новыхъ видовъ и формъ я успѣлъ включить въ это добавленіе.

Пользуюсь случаемъ, чтобы выразить мою сердечную и глубокую благодарность А. Н. Петуникову за редактированіе всѣхъ 4 частей, за его переработку рода *Potentilla* и *Ranunculus*, sect. *Batrachium* и за его совѣты и указанія, къ которымъ я постоянно прибѣгалъ во время моей долготѣйшей работы по составленію „Илл. Фл. Моск. губ.“

Благодарю также всѣхъ лицъ, которые присылали мнѣ новые матеріалы, указывали на мои промахи или ошибки (по возможности, теперь устраненные и исправленные въ этомъ прибавленіи) и которые такъ или иначе способствовали выясненію подчасъ трудныхъ вопросовъ.

Если, съ окончаніемъ этого труда, все изданіе найдетъ себѣ достаточный сбытъ, то это позволитъ подготовить новое, которое можетъ быть отпечатано болѣе компактно и болѣе скромно, дабы, пользуясь большинствомъ имѣющихся уже клише, сдѣлать его болѣе дешевымъ, а слѣдовательно, и болѣе доступнымъ.

Д. Сырейчиковъ.

Москва.
Апрѣль 1914.

Съ изданіемъ четвертаго—дополнительнаго выпуска „Иллюстрированной Флоры Московской губернии“ законченъ большой трудъ, предпринятый лѣтъ 10 тому назадъ.

Такой большой промежутокъ времени, протекшій отъ выхода въ свѣтъ первой части (въ 1906 г.) до выпускаемой теперь дополнительной части объясняется, главнымъ образомъ, тѣмъ, что авторъ взялъ на себя огромную работу—составить и изготовить свыше 1100 рисунковъ, долженствовавшихъ иллюстрировать всеъ описанные въ Московской Флорѣ виды и многія разновидности; изъ числа этихъ рисунковъ едва ли не пятая часть—оригинальные, снятые съ натуры. Да и самый текстъ, для обработки котораго необходимо было пересмотрѣть всю текущую литературу по описательной ботаникѣ, разобраться въ Флорахъ средне-Европейскихъ странъ, ознакомиться съ специальными статьями и монографіями,—потребовалъ не мало времени, особенно, если принять во вниманіе, что въ большинство Флоръ стали заноситься во множествѣ мелкія формы, часто только мѣтнаго значенія, для которыхъ трудно было, а иногда и невозможно, установить близкое сходство или тождество съ соответственными формами, встрѣчающимися у насъ.

Особенно много такихъ мелкихъ формъ, представляющихъ очень мало научнаго интереса и ничтожное таксономическое значеніе, пришлось занести въ выпускаемую—дополнительную часть, которая содержитъ, помимо нѣсколькихъ новыхъ видовъ, много поправокъ и пополненій къ предыдущимъ тремъ частямъ и заканчивается очень подробнымъ алфавитнымъ указателемъ, облегчающимъ справки по всемъ четыремъ частямъ.

Такая подробная и всесторонняя обработка флоры Московской губернии, какъ она представлена теперь въ вполнѣ законченномъ для настоящаго времени видѣ, не имѣетъ себѣ подобной ни для какой другой губерніи; въ этомъ отношеніи Москва можетъ по справедливости гордиться, и надо только пожелать, чтобы примѣру Москвы послѣдовали другіе университетскіе города, располагающіе обширными коллекціями и не малыми научными силами.

А. Петуниковъ.

Москва.

Апрѣль 1914.

Дополненія, поправки и критическія замѣтки.


Athyrium filix femina Roth (I, стр. 38).

У насъ можно различить слѣдующія формы:

α. **dentata** (Döll) Milde.

β. **fissidens** (Döll) Milde. Берегъ р. Сѣтуши близъ Нѣмчинова; лѣсъ близъ д. Пехорка, Бри. у. (С.).— Воробьевы горы (П.).

γ. **multidentata** (Döll) Milde. Листья б. ч. крупныя до 1,5 м. дл., двояко- или тройко-перисто-надрѣзные; доли третьяго порядка очень разнообразныя, б. ч. по краямъ глубоко-надрѣзочно-зубчатыя, иногда нѣкоторыя зубчики на концѣ двузубчатыя¹⁾. По тѣнистымъ мѣстамъ. Владыкино, лѣсъ между 17-й верстой Брянск. ж. д. и Нѣмчиновымъ; лѣсъ между Оедосынымъ и Губкинымъ, Зви. у.; лѣсъ близъ Михлева, Бри. у. (С.).



Cystopteris fragilis Bernh. (I, стр. 39). Хор. III, стр. 93.

Athyrium filix femina.
1. *dentata*. 2. *fissidens*. 3. *multidentata*.

Ознобишино и Луковня, Пдл. у. (Х.).—Красково, Бри. у. (Ассъ).

Aspidium Dryopteris Baumg. (I, стр. 40). Хор. II, стр. 18.

Лѣсъ близъ Нѣмчинова (С.).—Близъ д. Луковня, Пдл. у. (Х.).— Владыкино, Останкино (Ассъ).

¹⁾ По замѣчанію Lueresen и по моимъ наблюденіямъ, очень измѣчивое растеніе; можно наблюдать переходы отъ одной формы въ другую, но почти всегда можно сказать къ какой формѣ ближе относится опредѣляемый экземпляръ.

Aspidium Thelypteris Sw. (I, стр. 41).

Кромѣ общераспространенной формы еще:

- α. **Rogaetziánum Bolle.** Доли второго порядка на спороносныхъ листьяхъ плоскія, съ краями не загнутыми или едва завернутыми. Тѣневая форма. Мытщи у р. Дузы; берегъ озера близъ Михнева въ ольшаникѣ, Бри. у. (С.).

Aspidium filix mas Sw. (I, стр. 42).

У насъ пока можно различить:

- α. **crenátum Milde.** По берегу р. Сѣтуни между Лукинскимъ и Иѣмчиновымъ (С.).

β. **subíntegrum Döll.**

- γ. **deórsi-lobatum Milde.** Листья б. ч. крупныя до 1,2 м. дл.; первая пара долей второго порядка по обѣимъ сторонамъ глубоко-надрѣзано-зубчатая; первый зубецъ съ наружной стороны б. ч. крупнѣе остальныхъ, нѣсколько вытянуть какъ бы въ ушко и съ 3—5 зубчиками по краю; нѣкоторые слѣдующіе зубцы двузубчатые; остальные доли второго порядка безъ ушковыхъ, но глубоко-зубчатые и часто каждый зубецъ, исключая верхушечнаго, двузубчатый.

ГЛГ.

Близъ 17-й версты Брянск. ж. д. (Х.). — Хомутово на р. Клязьмѣ, Бгр. у.; лѣсъ между Осодосынскимъ и Губкинымъ. Зви. у. (С.).

Aspidium cristátum Sw. (I, стр. 43).

Иногда попадаются особи съ листьями, верхушка которыхъ раздвояна или раздѣлена на три; такая форма была описана Мильде и названа имъ **monsr. bifurcatum** и **multifurcatum Milde.**

Aspidium spinulòsum Sw. (I, стр. 43).



Aspidium spinulosum.
1. genuinum, 2. dilatatum.

- α. **genuinum Milde.** Листья свѣтло-зеленые; черешокъ равенъ пластинкѣ, покрытъ рѣдкими блѣдно-бурыми чешуйками, на нижней сторонѣ листа по главной жилкѣ ихъ почти нѣтъ; доли первого порядка коротко-заостренныя; доли третьяго порядка шильчатые, плоскія; соріи маленькіе, расположены двурядно; щитокъ зазубренный безъ железокъ. — Соколово на р. Клязьмѣ; Каменка близъ Варавина, Дмит. у. (С.).

- β. **dilatátum Sw.** Листья темно-зеленые съ желтоватыми железистыми волосками на нижней поверхности; черешокъ значительно короче пластинки, густо покрытъ темно-бурыми чешуйками съ бе-

лѣе темной срединной полоской; чешуйки встрѣчаются б. или м. густо и на нижней сторонѣ листа по главнымъ жилкамъ; доли третьего порядка пальчато-надрѣзныя съ завернутыми краями; сорія болѣе крупныя; щитокъ, особенно по краямъ, железистый. Соколово, Лосинный островъ (К.).

Onoclea Struthopteris Hoffm. (I, стр. 45).

Кромѣ общераспространенной формы еще:

α. **serrata Baenitz.** Доли второго порядка по краямъ явственно зубчатые. Соколово на р. Клязьмѣ (С.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.).

Botrychium Lunaria Sw. (I, стр. 47).

Кромѣ обычной формы еще:

α. **subincisa Roeper.** Сегменты безплодной части листа слегка надрѣзаны, отчего слабо лопастныя. Близъ Разказовки, Звц. у. (С.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.).

Equisetum silvaticum L. (I, стр. 50).

Forma capillare (Hoffm.) Milde. Болотистый лѣсъ между 17-й верстой Брянск. ж. д. и Нѣмчиновымъ, въ густой тѣни (С.).—Черкизово на р. Клязьмѣ (И. Петровъ).

Equisetum arvense L. (I, стр. 51).

У насъ можно различить слѣдующія формы:

α. **agrestis Klinge.** Стебли около 30 см., толстые; вѣтви въ мутовкахъ простыя, 5—12 см. дл., б. или м. отклоненныя отъ стебля, чаще о 4 ребрышкахъ. Встрѣчается чаще другихъ формъ. Если же вѣтви почти прижаты къ стеблю, то это: **f. compacta Klinge.**—Быково, Пдл. у. (И. Петровъ).

β. **borealis Milde.** Стебель тонкій, очень высокій до 70 см.; вѣтви простыя, б. ч. отклоненныя, часто почти горизонтальныя, 8—25 см. дл., б. ч. о 3 ребрышкахъ. Черкизово на р. Клязьмѣ (И. Петровъ).

γ. **ramulosum Rupr.** Вѣтви мутовокъ несутъ въ свою очередь мутовки. Черкизово на р. Клязьмѣ (И. Петровъ).

На рисункѣ *Equisetum pratense* корневище съ клубнями относится къ рисунку *Equisetum arvense*.

Equisetum palustre L. (I, стр. 52).

У насъ можно различить слѣдующія формы:

1. Стебель покрытъ б. или м. длинными вѣтвями. 2.

Стебель совершенно безъ вѣтвей или съ очень короткими 1—2-членистыми вѣтвями; у насъ пока только форма: **nudum Duby**—стебель прямостоящій о 8—11 ребрышкахъ. Пушкино (С.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.).

2. Многія вѣтви или только 2—3 верхнихъ мутовки оканчиваются колосками—*f. polystachyum* Weigel. У насъ можно различить слѣдующія подформы: 1. *racemosum* Milde. Вѣтви, несущія колоски, б. или м. равной длины, образуютъ кисть. Пушкино, заливной лугъ р. Серебрянки (С.).—2. *corymbosum* Milde. Нижнія вѣтви съ колосками длиннѣе верхнихъ, такъ что достигаютъ одной высоты, образуя щитокъ. Купавна, Бгр. у. (П.).—Пушкино, по колеямъ дороги у переѣзда черезъ полотно ж. д. (С.). Вѣтви безъ колосковъ; колосъ одинъ верхушечный; у насъ пока только форма: *fallax* Milde. Первое влагалище у вѣтвей бурое съ свѣтлыми краями или только у основанія черное. Мытищи (С.).—У р. Икши, Савел. ж. д., Дмт. у. (Х.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.).—Спиридова, Дмт. у.; Быково въ долинѣ р. Нахры, Пдл. у. (Н. Петровъ).

***Lycorodium annotium* L.** (I, стр. 55).—Хор. II, стр. 18.

Близъ Лукова озера въ сыромъ смѣшанномъ лѣсу, Бгр. у. (Х.).

***Lycorodium complanatum* L.** (I, стр. 56).

Лѣсъ по долинѣ р. Яхромы, Дмт. у. (Н. Петровъ).

***Pinus silvestris* L. α . *nana* Pall.** (I, стр. 63).—Хор. II, стр. 19.

***Typha angustifolia* L.** (I, стр. 68).—Ф. Б. Дел., стр. 3.—Ф. Б. Нов. дан., стр. 172.

Близъ имѣнія Бодня въ ямахъ кирпичнаго завода, Мож. у. (Ф. Б.). Въ канавахъ возлѣ Николо-Пѣшинонскаго монастыря, Дмт. у. (сообщилъ Н. Петровъ, но у него въ гербаріи нѣтъ).

***Sparganium* L.** (I, стр. 69).

По выходѣ въ свѣтъ статьи Lr. W. Rothert, «Ueber die Sparganien des Russischen Reiches», въ «Труд. Бот. Сада Имп. Юрьев. Унив.» 1910, выш. 1, мнѣ приходилось не разъ бесѣдовать съ д-ромъ Ротертомъ о нашихъ *Sparganium* и объ обработкѣ этого рода у Aschers. et Gr. Оказывается, что въ Synopsis этихъ авторовъ вкралось много неточностей, я же при обработкѣ московскихъ *Sparganium* пользовался этимъ трудомъ. Желая точно установить, какіе виды и формы встрѣчаются въ Московской губ., я попросилъ д-ра Ротерта проверить весь гербарный матеріалъ А. Н. Петушикова, А. А. Хорошкова и мой, что онъ любезно исполнилъ и за что приношу ему мою глубокую благодарность, а равно и за разрѣшеніе воспользоваться его ключомъ.

1. Чешуйки околоцвѣтника плотныя, б. или м. темныя (отчего и головки темныя); плодники сидячіе или рѣдко на очень короткой ножкѣ; листья трехгранные съ 2 нижними сильно вогнутыми сторонами и съ острымъ, почти крылатымъ килемъ; вѣтви соцветія и головки пазушныя; мужскихъ головокъ не менѣе 8.

S. racemosum Huds.

Чешуйки околоцветника тонко-кожистыя, прозрачныя, безпигментныя (отчего головки свѣтлыя); плодики б. ч. на ножкахъ; мужскихъ головокъ не болѣе 6 (только у *S. simplex* иногда до 8). 2.

2. Листья съ большимъ острымъ килемъ; женскія головки (иногда исключая верхней или нижней) сидячія, сильно сближенныя, частью выйпазущія; мужскія въ числѣ 1—2, сближены съ женскими, часто соприкасаются съ ними; плодики на короткихъ ножкахъ, коническіе, въ нижней трети всего шире, отсюда постепенно сужены въ столбикъ; рыльце короткое шпатовидное.

S. glomeratum Laest.

Листья плоскіе, плоско-выпуклые или треугольныя, но безъ выдающагося кила. 3.

3. Столбикъ короткій, не длиннѣе 1 мм. (не считая рыльца), или же столбика нѣтъ; мужскихъ головокъ 1, очень рѣдко 2; плодики на короткихъ ножкахъ, не превышающихъ 1 мм.

S. minimum Fr.

Столбикъ большею частью длинный, не короче 2 мм.; мужскихъ головокъ болѣе двухъ; плодики на ножкахъ въ 2—3 мм. дл. 4.

4. Столбикъ на зрѣломъ плодикѣ согнутъ съ самаго основанія крючкомъ, короче самаго плодика; рыльце короткое и широкое, косо посаженное; плодики продолговатыя, б. или м. быстро сужены въ столбикъ, черноватыя или буро-красныя, тусклыя; соцветіе часто съ 1—2 длинными, тонкими вѣтвями; головки паузущія; стебель къ верхушкѣ нѣсколько утолщается; растеніе всегда съ плавающими длинными листьями и стеблемъ.

S. Friesii Beurl.

Столбикъ даже на зрѣлыхъ плодикахъ прямой или слабо согнутый; плодики веретенообразныя, постепенно переходятъ въ столбикъ, доспѣвающея, соломенно-желтыя или бурые, б. ч. съ поперечной перетяжкой; соцветіе не вѣтвистое; головки частью выйпазущія; стебель къ верхушкѣ не утолщается. 5.

5. Столбикъ длинный тонкій, вмѣстѣ съ рыльцемъ длиннѣе плодика (безъ ножки); рыльце длинное (1,5—2 мм. дл.) узкошпательное, прямое; мужскія головки разставленныя въ числѣ 4 и болѣе; пыльники длинные, 1,5—2 мм. дл., узкіе; нижній прицветный листъ у основанія съ узкимъ пленчатымъ краемъ.

S. simplex Huds.

Столбикъ вмѣстѣ съ рыльцемъ короткій или не длиннѣе плодика (безъ ножки); рыльце 1 мм. дл., очень рѣдко едва длиннѣе 1 мм.; мужскія головки мало разставлены, б. ч. въ числѣ 2—3; пыльники эллиптическіе не длиннѣе 1 мм.; прицветные листья у основанія съ широкимъ пленчатымъ краемъ, влагалшино охватываютъ стебель.

S. affine Schnizl.

Sparganium ramósum Huds, правильнѣе, чѣмъ **S. neglectum Beeby**, такъ какъ у *S. ramosum* Huds. теперь различаютъ три формы: *polyedrum* Aschers. et Gr., *neglectum* Beeby и *microcarpum* Čel.; у насъ, по сообщенію д-ра Ротерта, пока только форма *microcarpum* Čel. Она отличается отъ другихъ формъ только зрѣлыми плодиками, а потому я привожу тутъ описаніе только ихъ; описаніе же плодинокъ, помѣщенное у меня при описаніи *S. neglectum* Beeby (I. стр. 70), слѣдуетъ выкинуть.

α. microcarpum Čelak. Плодикъ туповато-веретенообразный, поперекъ перетянутый; нижняя его часть въ поперечномъ сѣченіи округлая, желто-бурая или красновато-бурая, тусклая, съ плоскими продольными бороздками и низкими ребрышками; верхняя часть шире нижней, полушаровидная, слегка лоснящаяся, гладкая или слегка продольно-морщинистая. Губчатая ткань выполняетъ только верхнюю часть плодика. Размѣры плодика 5—7 мм. дл., 2,5—3 мм. ш. Иногда на сухихъ мѣстахъ можно встрѣтить форму, которую В. Ротертъ предлагаетъ назвать **f. simplicior Rothert**. Общій обликъ этой формы походить на *S. simplex* Huds., такъ какъ у нея простое, не вѣтвистое соцвѣтіе, но ее легко можно отличить отъ *S. simplex* числомъ мужскихъ головокъ, далеко разставленныхъ, которыхъ обыкновенно больше 8, тогда какъ у *S. simplex* головокъ б. ч. меньше и онѣ болѣе сгущены.

Sparganium glomerátum Laest. (I, къ стр. 70).

Стебли 20—60 см., прямостоящіе, толстые; листья около 8 мм. ш., прямостоящіе, рѣже нижніе плавающіе, значительно превышаютъ длину стебель; киль ихъ, особенно у основанія, сильно выдающійся, почти крылатый; соцвѣтіе очень сгущенное, изъ 3—4 женскихъ головокъ и одной (2) мужской, такъ сильно придвинутой къ женскимъ, что по опаденіи тычинокъ, не видно мѣста ея прикрѣпленія; женскія головки сидячія или только одна нижняя, нѣсколько отодвинутая, на ножкѣ, б. ч. сильно сдвинутая, такъ что иногда, вслѣдствіе полного сдвига, кажутся сидящими противъ прицвѣтнаго листа; плодики на короткихъ ножкахъ, копьевидныя, наибольшая ширина ихъ въ нижней трети, постепенно сужены въ короткій столбикъ съ короткимъ шпоровиднымъ рыльцемъ. Найдено въ Моск. у. (Ф. Е.).



Sparganium glomeratum.

Sparganium simplex Huds. (I, стр. 70).

Къ описанію вида слѣдуетъ прибавить: одна изъ женскихъ головокъ (или болѣе) сдвинута по оси соцвѣтія, такъ что она выѣзающая; плодикъ б. ч. лоснящійся; пыльники длинные, 1,5—2 мм. дл., узкіе.

Sparganium Friésii Beurl. (I, къ стр. 72).

Sparganium affine Schnitzl. Слр. Нлт. Фл. I, № 35.—Пет. Кр. III, стр. 135.

Стебель длинный 1—1,5 м., тонкій, къ верхушкѣ утолщающійся, плавающій, какъ и листья; послѣдніе длиннѣ стебля, у основанія близъ влагалища очень тонкіе и узкіе, постепенно расширяются до 1—2 мм., очень рѣдко до 3 мм.; соцветіе удлиненное, б. ч. съ 1—2 вѣтвями у основанія; послѣднія длинныя, тонкія, извилистыя, обь 1—2 женскихъ и 1—2 (4) мужскихъ головкахъ; иногда встрѣчаются особи съ соцветіемъ обь (2) 3—4 (5) разставленныхъ женскихъ и 2—6 мужскихъ головкахъ; б. ч. нижняя женская головка на очень длинной и тонкой ножкѣ; всѣ головки всегда пазушныя; плодики черноватыя или буро-красныя, тускыя, гладкіе, продолговатыя, довольно быстро переходить въ столбикъ, отъ самаго основанія согнутый крючкомъ, короче самаго плодика; рыльце короткое, широкое, косо-посаженное. Растеніе всегда плавающее, встрѣчается въ чистыхъ озерахъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ берега, гдѣ образуетъ большія заросли. Долгое озеро близъ дер. Рыбаки, Мос. у. (П. и С.).



Sparganium Friésii.



Sparganium affine.

[Sparganium affine Schnitzl.] (I, къ стр. 72).

Растеніе чаще плавающее, рѣже наземное, со стеблемъ (10) 25—100 см. дл. и до 2 мм. въ діаметрѣ; листья 2,5—5 (7) мм. ш., плоскіе, у наземныхъ формъ округло-трегранные; прицветные листья съ широкой пленчатой каймой у влагалища; соцветіе не вѣтвистое, состоитъ изъ (1) 2—3 (4) женскихъ разставленныхъ головокъ, часто выйпазущихъ, обыкновенно на длинныхъ ножкахъ (исключая верхней), и изъ 2—3 (4) мужскихъ, б. ч. сильно сближенныхъ такъ, что во время цвѣтенія трудно установить границу между самыми верхними; нижнія мужскія головки часто соприкасаются съ верхними женскими, рѣже отставлены отъ нихъ; плодики на длинныхъ ножкахъ, лопещащіеся, соломенно-желтые или бурые, съ поне-

речной перетяжкой, постепенно переходя въ прямой, рѣже слегка согнутый столбикъ, который вмѣстѣ съ рыльцемъ не превышаетъ длины плодика (безъ ножки); рыльце очень измѣнчиво: то очень короткое, сходное съ рыльцемъ *S. Friesii*, то длинное, прямое, но не превышаетъ 1 мм., чаще 0.75 мм.; пыльники эллиптические, не длиннѣе 1 мм.; прицвѣтные листья у всѣхъ женскихъ головокъ, иногда и у нижнихъ мужскихъ, значительны превышаютъ соцветіе.

Привожу тутъ описаніе этого вида, хотя онъ еще не найденъ въ Московской губ., но встрѣчаются помѣси его съ *S. Friesii*; слѣдовательно, есть основаніе думать, что и онъ будетъ найденъ.

Sparganium Friesii × simplex Rothert (I, къ стр. 72).

Sparganium affine Schnitzl. Сыр. Илл. Фл. I, № 35 изъ Глубокаго озера, *Sparganium affine* Schnitzl. α. Borderi Weberbauer. Сыр. Илл. Фл. I, стр. 72.

Какъ всякая помѣсь, очень измѣнчива въ своемъ обликѣ, но если внимательно разобрать признаки, то все-таки можно опредѣлить и эту. Если помѣсь по общему облику походить на *Sp. simplex*, то признаки *Sp. Friesii* обнаруживаются въ наличности вѣтвей у соцветія или въ столбикахъ, загнутыхъ съ основанія. Если же помѣсь ближе къ *Sp. Friesii*, то признаки *Sp. simplex* выражаются или въ пазушныхъ головкахъ, или въ длинныхъ прямыхъ столбикахъ; вообще, если разсматриваемая особь не подходитъ по всѣмъ признакамъ къ чистымъ видамъ, то надо очень тщательно изучать ихъ, чтобы рѣшить, изъ какихъ видовъ сложилась разсматриваемая форма. Глубокое озеро, Руз. у. (П. и С.).

Sparganium affine × Friesii Rothert (I, къ стр. 72).

Самая трудная для распознаванія помѣсь, вслѣдствіе своей измѣнчивости и незначительности разграничивающихъ эти два вида признаковъ. Если форма близка къ *Sp. Friesii*, то можно уловить слѣдующія отклоненія отъ типа: то наличность нѣкоторыхъ виспазушныхъ головокъ, то присутствіе у мужскихъ головокъ прицвѣтныхъ листьевъ, хотя и короткихъ, то широкая пленчатая кайма у листовыхъ влагалищъ или эллиптические пыльники около 1 мм. дл. Если же помѣсь ближе къ *Sp. affine*, то признаки *Sp. Friesii* сказываются въ согнутыхъ отъ основанія столбикахъ или въ вѣтвистомъ соцветіи¹⁾. Глубокое озеро, Руз. у. (П. и С.).

Sparganium minimum Fr. (I, стр. 72).

Вблизи Николо-Пѣшношескаго монастыря, Дмит. у., въ осоковыхъ плавающихъ болотахъ (сообщ. Н. Петровымъ, въ герб. у него нѣтъ).

¹⁾ Часто у обѣихъ помѣсей женскія головки бываютъ обоопольны, т.-е. съ мужскими цвѣтками и, если мужскіе цвѣтки не преобладаютъ, то по зрѣлымъ плодикамъ иногда можно опредѣлить помѣсь; но, если мужскихъ цвѣтковъ болѣе чѣмъ женскихъ, то такіе экземпляры часто невозможно съ точностью отнести ни къ одной изъ этихъ двухъ помѣсей. У чистыхъ видовъ такая смѣсь цвѣтковъ, какъ кажется, не встрѣчается.

Potamogeton natans L. (I, стр. 74).

Можно различить слѣдующія формы:

- α. **vulgaris Koch et Ziz.** Основаніе плавающихъ листьевъ ланцетно-сердцевидное; длина листьевъ приблизительно въ два раза превышаетъ ширину.
- β. **ovalifolius Fieber.** Основаніе плавающихъ листьевъ округлое (иногда едва сердцевидное) или стянуто въ черешокъ; отношеніе длины къ ширинѣ листьевъ какъ у α.
- γ. **pygmaeus Gaud.** Стебель тонкій, не толще 1,5 мм., около 25 см. дл.; листья не шире 3,3 см. и не длиннѣе 6 см. (Aschers. et Gr. даютъ 2,5 см. ш. и 5 см. дл.); растетъ въ очень мелкой водѣ или въ плѣ.

Potamogeton alpinus Balbis (I, стр. 75).

Можно различить слѣдующія формы:

- α. **purpurascens Seidl.** Къ описанію надо прибавить: длина листьевъ до 20 см., ширина до 25 мм.
- β. **angustifolius Aschers. et Gr.** Плавающие листья кожистые, просвѣчивающіе, лопатчатые, постепенно сужены въ черешокъ; у насъ пока только **subf. gracilior Tisel.** — растеніе во всѣхъ частяхъ мельче всѣхъ остальныхъ формъ. Анофріево озеро, Руз. у. (П. и С.).
- γ. **obscurus (DC.) Aschers. et Gr.** Междоузлія не длиннѣе 2 см.; всѣ листья подводные, около 12 см. дл. и около 1 см. ш., съ слабо выдающимся жилками; колосъ обыкновенно одинъ, короткій на короткой ножкѣ; если есть переходные листья отъ подводныхъ къ плавающимъ, то это **subf. parvifolius Fischer.** Мытищи (П.).

Potamogeton praelongus Wulf. (I, стр. 76).

Въ р. Яхромѣ къ югу отъ Петракова, Дмит. у. (сообщ. И. Петровъ, по въ герб. у него нѣтъ).

Potamogeton lucens L. (I, стр. 77).

Можно различить слѣдующія формы:

- α. **vulgaris Cham.** Листья продолговато-ланцетные, б. или м. постепенно заостренные, б. ч. длиннѣе колосевъ.
- β. **acuminatus Fries.** Большая часть листьевъ оканчивается б. или м. длинной мягкой колѣчкой (продолженіемъ срединной жилки), края часто завернуты; иногда у нѣкоторыхъ листьевъ пластинки совсѣмъ нѣтъ, и листъ состоитъ изъ одной толстой срединной жилки.
- γ. **nitens (Willd.) Cham.** Листья овальные или эллиптическіе, туповатые, только съ очень короткимъ остроконечіемъ; колосъ б. ч. не короче листьевъ (рисунокъ на стр. 77 изображаетъ эту форму).

Potamogeton gramineus L. (I, стр. 77). Ф. Б. Доп., стр. 3.

β. heterophyllus Fr. Ф. Б. Нов. дан., стр. 172.

Въ болотиѣхъ близъ д. Николаевки, Мож. у., на крайнемъ югѣ у. (Ф. Б.).

Potamogeton mucronatus Schrad. (I, стр. 80).—Ф. Б. Доп., стр. 3.

Въ р. Ракиткѣ, Мож. у. (Ф. Б.).

Potamogeton pusillus L. (I, стр. 80).

α. vulgaris Fr. Къ этой формѣ слѣдуетъ отнести все мѣстонахожденія формы **β squarrosus Aschers. et Gr.** и прибавить еще: Клязьма близъ Карташина (С.).

δ. capitatus A. Bennett. Листья очень длинныя, до 6 см. дл., линейныя; срединная жилка толстая, очень сильно выдающаяся; колоски маленькіе шаровидные; связники длинные лепестковидные. Черемухи, въ пруду (П.).—Близъ Талицѣ, Дмт. у. (С.).

Ключъ для опредѣленія формъ:

1. Колоски головчатые, шаровидные; средняя жилка у листьевъ очень толстая, сильно выдающаяся. *capitatus A. Bennett.*
Колоски продолговатые, часто прерывчатые. 2.
2. Междоузлія не длиннѣе 5 мм. *squarrosus Aschers. et Gr.*
Междоузлія 2—5 см. дл. 3.
3. Листья 1—1,5 мм. ш., б. ч. съ 3 жилками. *vulgaris Fr.*
Листья нитевидные съ 1 жилкой. *tenuissimus Mert. et Koch.*

Potamogeton pectinatus L. (I, стр. 81).

У насъ пока можно различить:

α. scoparius Wallr.¹⁾

β. tenuifolius Mert. et Koch. Хор. II, стр. 17.

Листья съ одной жилкой, очень тонкіе, щетиновидные; отличаются отъ **α. scoparius** длинными междоузліями даже у верхушки стебля, тогда какъ у **α.** междоузлія въ верхней части стебля б. ч. не превышаютъ 2 см., чаще же короче; Д. Пиньри, въ р. Пахрѣ, Пдл. у. (X.).

γ. interruptus Kit.

Najas minor All. (I, стр. 83)—Sch. II, № 392.

Scheuchzeria palustris L. (I, стр. 84).—Хор. II, стр. 18.

Луково озеро, на сфагновомъ болотѣ, Бгр. у. (X.).—Торфяное болото у платформы Новарово, Инк. ж. д., Зви. у. (сообщ. Г. Ширясымы).

¹⁾ Иногда **α. scoparius Wallr.** принимаетъ болѣе крупныя размѣры, междоузлія удлинняются, и тогда эта форма походить на **γ. interruptus Kit.**, отъ которой все же легко отличима присутствіемъ одной только жилки на листьяхъ.

Triglôchin maritima L. (I, стр. 85).

Между Пуршевымъ и д. Петрово, Руз. у. (Сюз.).—На тонкомъ торфяномъ болотѣ близъ д. Татищево, Дмит. у., рѣдко (сообщ. П. Петровымъ).

Elodéa canadensis Rich. et Mchx. (I, стр. 90).

Въ ручьѣ близъ Одинцова, Зви. у.; озерки у устья р. Нерской, Брн. у. (С.).

Stratiôtes Aloides L. (I, стр. 91).

Серебряный боръ близъ Хорошова, женскій экземпляръ (П. и С.).

Oryza clandestina A. Br. (I, стр. 100). Ф. Б. Пр., стр. 72.—Хор. II, стр. 19.

Берегъ пруда близъ Измалкова, Зви. у., на границѣ Мос. у. (С.).—Ольшино по берегу р. Протвы, Моск. у. (Ф. Б.). Берегъ р. Нахры между Манькиной горой и Дерюбриховой, Пдл. у. (X.).

Anthoxanthum odoratum L. (I, стр. 102).

У насъ еще:

β. silvaticum Aschers. et Gr. Растеніе очень крупное, иногда до 60 см., многостебельное; листья длинные 20—30 см. и до 10 мм. ш.; большая часть влагалищъ опушенная; метелка длинная—до 12 см. дл., пирамидальная, прерывчатая ¹⁾. Рождествено на р. Нарѣ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).—По сухому торфяному болоту на вырубкѣ близъ Дергачева, Брн. у. (С.).

Panicum crus-galli L. (I, стр. 105).

Слѣдуетъ отмѣтить, что безостная форма называется:

α. brevisetum Döll.

У обѣихъ формъ можно наблюдать по двѣ подформы: **prostratum**—стебли распростертыя или только верхушка ихъ приподнимающаяся и **erectum**—стебли прямостоящіе, б. ч. высокие 40—70 см.



Anthoxanthum odoratum.
β. silvaticum.

β. longisetum Döll. Хор. II, стр. 18.

Дорога отъ Храпунова поста Нижегород. ж. д. къ Лукову озеру, Брн. у. (X.).—Большія заросли по берегу р. Москвы между Заозерьемъ и Заболотьемъ, Брн. у. (С.).

Beckmännia cruciformis Host. (I, стр. 108).—Sch. II, № 548.

У насъ можно различить:

α. minor Pacz. Стебель 20—40 см., тонкій; листья узкіе; соцветіе колоссообразное, не вѣтвистое.

¹⁾ Какъ характерный признакъ для этой формы Aschers. et Gr. даютъ опушеніе влагалищъ. У нашего растенія этотъ признакъ не совсѣмъ выдержанъ: нижнійя влагалища очень густо опушены, прочіи—частію голія, частію слабо опушенныя; остальные же признаки выражены очень рѣзко.

3. *ramosa* Pacz. Стебель высокий, 60—120 см., толстый; листья широкіе; соцветіе метельчатое, вѣтвистое ¹⁾).

Phléum Boehmeri Wib. (I, стр. 112).

Кромѣ обычной формы у насъ еще:

α. *angustifolium* Beck. Листья не шире 2 мм.; колосъ не толще 4 мм. ²⁾).

Въ сосновой рошѣ близъ с. Зеленаго, Брн. у. (С.).

Agróstis álba L. (I, стр. 116).

β. *gigantea* Mey. Сыр. Отч. II, стр. 18.

Надо замѣтить, что у насъ пока только подформа *silvatica* Aschers. et Gr., которая характеризуется тѣмъ, что у ней всѣ колоски безъ остей. Пушкино по берегу р. Учи и по берегу ручья между Денисьевымъ и Усовымъ, Звн. у. (С.).

γ. *prorepens* Koch. Хор. IV, стр. 17.

Д. Мбча, Пдл. у. на песчаномъ обрывѣ р. Мбчи (Х.).

Agróstis vulgáris With. (I, стр. 118).

У насъ еще:

δ. *stolonifera* Koch. Хор. IV, стр. 16.

Стебли лежачіе, въ узлахъ укореняющіеся, часто образуютъ боль-

¹⁾ Обѣ эти формы описаны I. Пачоскимъ въ «Флорографическія и фитогеографическія изслѣдованія Калмыцкихъ степей». Кіевъ 1892, стр. 134, при чемъ даны вышеприведенные диагнозы. У насъ встрѣчаются обѣ формы, но часто между особями формы β. растутъ особи съ соцветіемъ не вѣтвистымъ. Въ «Труд. Бюро по привл. ботаники», 1913, стр. 577—584 появилась работа В. Кузнецова—«Бекманія (Beckmania) erudiformis Host», въ которой этотъ авторъ, описывая новую форму изъ Сибири—var. *baicalensis* W. Kusnezow, прибавляетъ къ описанію Пачоскаго еще слѣдующіе признаки для β. *ramosa*: кроющія чешуйки на верхушкѣ безъ вытянутого носика или носика чрезвычайно малъ, чешуйки внутри съ рѣдкими волосками, за носикомъ изогнуты впадина или выемка, выпуклый край чешуйки вздутый съ ясно выраженными жилками по зеленоватой части чешуйки и съ яснымъ фиолетовымъ оттѣнкомъ. Описаніе это вполнѣ подходит къ нашимъ растеніямъ, исключая жилки, которыя не всегда ясно выражены. Что же касается до луковичкообразнаго вздутія у основанія стебля, которымъ по словамъ В. Кузнецова обладаетъ форма *ramosa* Pacz. В. Кузнецовъ приводитъ для растенія съ луковичкообразнымъ утолщеніемъ и Моск. губ.; но если въ той же губ. встрѣчаются растенія и безъ утолщеній, то связывать этотъ признакъ, какъ постоянный съ признаками нашихъ формъ нельзя. У насъ видѣлись такія растенія въ подформу *nodosa*, которая можетъ быть какъ у α. *minor*, такъ и у β. *ramosa*.

²⁾ Близъ Карапчеева, Ким. у., были найдены особи, у которыхъ въ колосѣ встрѣчаются только бы луковичкообразныя почки: такая форма была описана Aschers. et Gr. и названа *vivipara*, а Кауфманомъ въ Моск. Фл., I изд., названа *Beckmannia*; но Aschers. et Gr., Syn. объявили, что это патологическое разрастаніе, образовавшееся отъ червячка *Tylenchus phalaridis*.

нія не цвѣтущія дерновинки. У р. Пахры на сыромъ открытомъ мѣстѣ близъ д. Дровнино, Пдл. у. (X.).

***Agróstis canina* L.** (I, стр. 118).

У насъ пока можно различить:

α. *genuina* Godr. et Gren. Колоски темно-фіолетовые.

β. *varians* Aschers. et Gr.

γ. *arida* Schlecht.

δ. *mutica* Gaud. Хор. III, стр. 91.

Прицвѣтныя чешуйки безъ остей. Печищева, Пдл. у. (X.).

ε. *variiflora* Waisb. Хор. III, стр. 91.

Прицвѣтныя чешуйки то съ остью, то безъ остей въ одномъ и томъ же соцвѣтѣ. Д. Печищева, Пдл. у. (X.).

ζ. *stolonifera* Blytt. Хор. II, стр. 16.

Корневище ползучее съ побѣгами, на концѣ съ пучками листьевъ, въ остальномъ какъ α. Прилуки, Срп. у. (X.).

***Ápera Spica venti* P. B.** (I, стр. 119).—Sch. II, № 447.

***Calamagróstis purpúrea* Trin.** (I, стр. 121).

По разъясненію Д. П. Литвинова ¹⁾ правильнѣе называть:

***Calamagróstis Langsdórfii* (Link) Trin.**

У насъ пока найдено:

α. *Clausiana* (C. A. M.) Litw. *C. elata* Blytt.—*C. purpurea* Trin.

Описаніе этой формы соответствует описанію, приведенному въ I ч. Пдл. Фл. для *C. purpurea* Trin. Косино по берегу Святого озера. (II.).

β. *major* (Meinsh.) Litw. Хор. III, стр. 91 sub *Calamagrostis villosa* Mutel.

Отличается отъ α. остью болѣе шероховатой, выходящей ниже середины чешуйки, а равно и болѣею шероховатостью чешуекъ по жилкамъ. Чистое озеро, Пдл. у. (X.).

***Calamagróstis lanceoláta* Roth α. *canescens* Ascher. et Gr.** (I, стр. 121)—Сыр. Отч. II, стр. 18.

Окраина болота въ тѣсу между 17-й верстой Брянск. ж. д. и д. Нѣмчинова (С.).

***Calamagróstis neglecta* P. B.** (I, стр. 121).—Sch. V, № 1348a.

Село Куликово, Дмт. у. (II. Петровъ).



Calamagrostis Langsdorffii
β. *major*.

¹⁾ См. Труды Бот. Муз. Имп. Ак. Наукъ. Вып. VIII, стр. 50—77 (1911).

Calamagròstis epigéios Roth (I, стр. 123).

У насъ еще:

γ. **Reichenbachiana Grecescu.** Хор. IV, стр. 17.

Все растеніе сѣро-зеленое; колоски зеленые; ость явственно замѣтная. Храпуновъ постъ, Нижегород. ж. д., Бир. у. (X.).

Arrhenátherum elátius M. et K. (I, стр. 124).

Близъ ст. Влахернская, Савел. ж. д., Дмит. у. (Н. Слуцкій).

Avéna pubéscens Huds. (I, стр. 126).—Ф. Б. Ир., стр. 72.—Сыр. Отч. II, стр. 18.

Заливной лугъ близъ Старого села, Мож. у. (Ф. Б.).—Луговинки въ лѣсу близъ Оедосьина, Зви. у. (С.).

Avéna fátua L. (II, стр. 126).

Въ посевахъ у Бутырскаго хутора въ 1904 г. (сообщилъ М. П. Томинъ).

Trisétum flavéscens P. B. (I, стр. 128).

Avena flavescens L. Сыр. Отч. II, стр. 18.

Aschers. et Gr. раздѣляютъ этотъ видъ на:

α. **villosum Fiek.** Влагалище листьевъ б. или м. густо покрыто волосками. У насъ пока только на заливномъ лугу р. Сѣтуни близъ 17-й версты Брянск. ж. д. (С.).

β. **glabratum Aschers.** Влагалище листьевъ голое. На сыромъ лугу близъ с. Кончинина, Дмит. у. (Н. Петровъ).—Селевкино, Дмит. у. (Н. Слуцкій).

Первую разновидность они считаютъ наиболѣе распространенной и соподчиняютъ ей форму *lutescens* Aschers. и *variegatum* Aschers. У насъ наоборотъ, вторая разновидность встрѣчается часто, а первая найдена пока только разъ, при чемъ обѣ формы какъ *lutescens*, такъ и *variegatum*, найдены у *glabratum*, чего Aschers. et Gr. не приводятъ.

Deschámpsia flexuósa Trin. α. Legeï Richt. (I, стр. 129).—Сыр. Отч. III, стр. 12.

Раменское, паркъ, Бри. у. (П. и С.).

Deschámpsia caespitósa P. B. (I, стр. 129).

У насъ пока можно различить:

Колоски 4—5 мм. дл.

α. **genuina Rehb.** Растеніе 30—70 см.; колоски буроватые или буроватые съ слегка фіолетовымъ оттѣнкомъ. Часто.

β. **altissima Aschers.** Растеніе б. ч. очень высокое; метелка съ многочисленными колосками; послѣдніе зеленые или желто-зеленые. Часто.

γ. **aurea Wimm. et Grab.**

Aera caespitosa L. *aurea* Wimm. et Grab. Хор. III, стр. 91.

Колоски золотисто-желтые. Дарьино, Зви. у. (X.).

δ. *varia* Wimm. et Grab. Колоски темно-фиолетовые; метелка часто сжатая. Селевкино, Дмт. у. (Н. Случкій).

Колоски 2—3 мм. дл.

ε. *parviflora* Richt. Листья плоскіе шероховатые; метелка раскидистая; колоски блѣдые, б. ч. только съ однимъ развитымъ цвѣткомъ. Косино (Н.).—Малаховка близъ р. Македоновки (Куль.).

Arundo Tourn. По постановленію Конгресса въ Брюсселѣ, болѣе старое названіе *Arundo* уступаетъ болѣе новому, но общераспространенному названію *Phragmites*, слѣдовательно нашъ видъ долженъ называться:

Phragmites communis Trin. (I, стр. 130).

У насъ пока можно различить:

α. *typica* Aschers. et Gr. Колоски темно-бурые съ темно-фиолетовымъ оттѣнкомъ.

β. *flavescens* Aschers. Колоски свѣтло-желтовато-бурые.

Molinia coerúlea Moench (I, стр. 131).—Sch. II, № 446.

Лѣтъ между Вялками и Быковымъ, Врп. у. (С.).

α. *arundinacea* Aschers. На тонкомъ кустарничкѣ болѣе близъ с. Подмошье, Дмт. у. (Н. Петровъ).

Koeléria Pers.

Переработано А. А. Хорошковымъ и всѣ примѣчанія его же.

1. Кроющія и прицвѣтныя чешуйки туповатая. *K. glauca* DC.

Кроющія и прицвѣтныя чешуйки заостренныя. 2.

2. Плотныя дерновинки съ прямыми безплодными побѣгами; стебель 16—45 см., съ очень слабымъ опушеніемъ подъ метелкой на короткомъ протяженіи. *K. gracilis* Pers.

Рыхлыя дерновинки съ дугообразно восходящими безплодными побѣгами; стебель 35—100 см., съ опушеніемъ подъ метелкой обыкновенно на большемъ протяженіи. *K. grandis* (Bess.) Dom.

Koeléria glauca DC. (I, стр. 134).

Старыя отмершія влагалища при основаніи стебля б. ч. шнуровидно-расщепленныя (иногда расщепленія не наблюдаются); стебель подъ метелкой съ короткимъ опушеніемъ на б. или м. длинномъ протяженіи, иногда по всей длинѣ, высота 35—60 см.; листья безплодныхъ побѣговъ узкіе, б. ч. свернутые, съ влагалищами и пластинками, покрытыми короткимъ и частымъ пушкомъ; стеблевые листья также узкіе, б. ч. свернутые, съ пластинкой часто и коротко опушенной, но съ влагалищами почти голыми; колоски обыкновенно 3.75—5 мм. дл., 2-цвѣтковые; кроющія и прицвѣтныя чешуйки тупыя или туповатая (очень рѣдко кроющія чешуйки островатая, а прицвѣтныя съ короткимъ остріемъ на туповатой верхушкѣ, герб. Макемювича) коротко опушенныя или почти голыя.

У насъ пока найдены:

α. typica Dom. (Monogr., p. 55).

Стебель 18—57 см.; отмершія влагалища при основаніи стеблей не образуютъ луковицеобразнаго утолщенія или таковое выражено слабо; листья сизоватые; метелки б. или м. лопастныя, продолговатыя или продолговато-цилиндрическія ¹⁾. Хатъичи, Вгр. у., на пескахъ (II. и X.).

β. intermedia (Ahlq.) Dom. (Monogr., p. 60).

Отмершія влагалища при основаніи стеблей образуютъ луковицеобразное утолщеніе; листья сизы; метелка густая, не лопастная или слабо лопастная, цилиндрическая или узко-цилиндрическая. Герб. Максимовича (безъ указанія мѣста) подъ названіемъ *Aira glauca*.—Между Бѣлосесочкой слободой и Старой Камширой, Срп. у. (X.).

Кромѣ *typica* и *intermedia*, у насъ встрѣчаются формы среднія между приведенными разновидностями. Герб. Максимовича (безъ указанія мѣста). По пескамъ въ Срп. у., по берегамъ р. Оки (Мил.).

Koeleria gracilis Pers. (Dom. Monogr., p. 176).

Образуетъ плотныя дерновины; безплодные побѣги прямые или слабо восходящіе; стебель 16—45 см., тонкій, голый или лишь на короткомъ протяженіи подъ метелкой рѣдко и коротко-опушенный; пластинки листьевъ у безплодныхъ побѣговъ обыкновенно узкія, рѣдко плоскія, въ такомъ случаѣ не шире 1,25 мм.; весь листъ съ частыми и обыкновенно отстоящими волосками; пластинки стеблевыхъ листьевъ обычно свернутыя, рѣдко плоскія и въ такомъ случаѣ не шире 1,25 мм., съ частыми отстоящими или прижатыми волосками; влагалища стеблевыхъ листьевъ съ подобнымъ же опушеніемъ или голыя; колоски 2—3-цвѣтковые, 4—5,5 мм. дл.; кроющія и прицвѣтныя чешуйки заостренныя, почти голыя или съ очень короткимъ пушкомъ.

У насъ пока найдены:

α. typica Dom. (Monogr. p. 182).

Стебель до 30 см.; колоски бѣдные, палевые; метелки не густыя, б. или м. лопастныя, продолговато-цилиндрическія; влагалища

¹⁾ Domin, въ своей монографіи на стр. 49, характеризуетъ секцію *Bulbosae* такъ: «culmis basi vaginis vestustis confertis conspicue bulboso-incrassatis», между тѣмъ, какъ я имѣлъ гербарный экземпляръ Westberg'a, приведенный Доминомъ, на стр. 55: 1. var. *typica* m.... K. *cristata* var. *argentea* G. Westberg, *Dorpat. Delect. Plant. Exsicc.* I. 23 (1898), съ особыми безъ малѣйшаго луковицеобразнаго утолщенія при основаніи стебля. Найденныя въ Моск. губ., K. *glauca* DC. *typica* Dom. также безъ утолщеній, а равно, какъ и экземпляры, видѣнные мною изъ Нижегородск. губ. (Немоковъ) и Владимірской губ. (Назаровъ). Такимъ образомъ, ошибочной признавъ, выдвинутый Доминомъ для всей секціи, не всегда оправдывается для K. *glauca* DC. *typica*. *

стеблевыхъ листьевъ не вздутыя. Протопопово у кладбища, Кзм. у.; Иванова гора близъ Рождествена на р. Нарѣ, Срп. у. (П.).

β. *elatio* Vel. (Dom. Monogr., p. 194).

Стебель 60—70 см.; стеблевые листья обычно плоскіе; метелка крупная до 18 см., продолговато-пирамидальная, рѣдко-лопастная. Въ герб. А. Н. Петунинкова есть экземпляры, собранные между Вацмановымъ и Протопоповымъ, Кзм. у., и въ герб. Никитина, собранные подъ Протопоповымъ, Кзм. у., которые приближаются къ этой формѣ.

γ. *subinflata* Dom. (Monogr., p. 200).

Стебель 16—25 см.; влагалища стеблевыхъ листьевъ нѣсколько вздутыя; метелка 30—55 мм. дл., густая, не лопастная или лишь слегка лопастная, продолговато-цилиндрическая или продолговато-эллиптическая; колоски зеленоватые. Косино—близъ Святого озера (С.).

δ. *elongata* Choroschkov ¹⁾.

Стебель 25—45 см.; листья у безплодныхъ побѣговъ свернутые, нѣсколько мягкіе, до 30 см. дл.; метелки густыя, не лопастныя, узко-цилиндрическія, 6—8 см. дл. и 4—6 мм. ш.; колоски блѣдно-палевые. Малаховка у полотна Моск.-Каз. ж. д. (Куль.).

Koeléria grándis (Bess.) Dom. (Monogr., p. 243).

Образуетъ рыхлыя дерновинки, часто съ рѣзко выраженною ползучестью корневища; безплодные побѣги дугообразно-восходящіе; стебель 35—100 см., толще, чѣмъ у *K. gracilis*, подъ метелкой на длинномъ протяженіи (иногда по всей длинѣ) съ пушкомъ ²⁾, обыкновенно короткимъ; листья безплодныхъ побѣговъ длинныя, зеленые, плоскіе, до 2.5 мм. ш., или (рѣже) свернутые, узкіе; влагалища ихъ съ частымъ пушкомъ или съ частыми отстоящими довольно длинными волосками, рѣдко почти голыя; пластинки почти голыя, съ короткимъ пушкомъ или съ разсыянными волосками; стеблевые листья зеленые свернутые или плоскіе ³⁾; влагалища нижнихъ стеблевыхъ листьевъ съ такимъ же опушеніемъ, какъ и у влагалищъ безплодныхъ побѣговъ; влагалища у верхнихъ листьевъ почти голыя или съ частымъ короткимъ пушкомъ, иногда въ сопровожденіи болѣе длинныхъ отстоящихъ волосковъ; пластинки стеблевыхъ листьевъ

¹⁾ *Koeléria gracilis* Pers. δ. *elongata* Choroschkov. A var. typica Dom. differt: paniculis densis, haud lobatis, anguste-cylindricis, 6—8 cm. longis, 4—6 mm. latis; foliis innovationum submollibus ad 30 cm. longis. Varietas haec ad seriem VI. Densiflorae Dom. referenda.

²⁾ Domin на стр. 244, въ описаніи вида не прибавляетъ, что стебель бываетъ опушенъ по всей длинѣ.

³⁾ Свернутые листья на большинствѣ опредѣленныхъ Доминомъ особяхъ Петунинкова, какъ *K. roborica* = *K. grandis*, между тѣмъ, какъ въ монографіи онъ говоритъ о стеблевыхъ листьяхъ этого вида лишь какъ о «laminis mollibus sat latis instructis», стр. 244.

голая или съ короткимъ пушкомъ и иногда притомъ съ разсѣянными длинными волосами или съ рѣсничатыми волосами по краямъ; метелки продолговато-цилиндрическія или цилиндрическія, обыкновенно въ нижней и средней части не густыя, лопастныя (иногда рѣзко-прерывчатые), въ верхней части лопастныя, густыя, до 16 см. дл.; колоски обычно 2-цвѣтковые (рѣдко 3-цв.), длиною (при 2 цв.) 4,5—6,5 мм.; кроющія и прицвѣтныя чешуйки заостренныя; кроющія голыя, рѣдко съ короткимъ пушкомъ; прицвѣтныя точечно-шероховатыя или коротко-опушенныя.

У насъ пока найдены:

2. **typica** Dom. (Monogr., p. 244).

Koeleria cristata Pers. β . *pyramidata* Pers. Сыр. Илл. Фл. I, p. 134.

Стебли около 100 см.; всѣ листья плоскіе, стеблевые до 4,25 мм. ш.; метелки 16—17 см. дл. Прилуки, Срп. у. (С.).

3. **gracilescens** Dom. (Monogr., p. 244).

Стебли тоньше чѣмъ у *typica*, 35—81 см.; стеблевые листья б. ч. свернутые, если же плоскіе, то не шире 3 мм.; метелки 5,5—12,5 см. дл.¹⁾

Между Прилуками и Вѣлосецкой слободой, Срп. у. (герб. Кауфм.).—Близъ Борисова, Срп. у. (М.).—Между Кошелевымъ и Соколовымъ, Рождество на р. Нарѣ, Срп. у. и Владычный монастырь подъ Серпуховымъ (П.).—Село Лужники, Срп. у. (Х.).

Dactylis glomerata L. (I, стр. 134).

Кромѣ обычной формы еще:

α. **abbreviata** Drejer. Хор. Отч. I, стр. 10.—Хор. II, стр. 16.

Отличается отъ типичнаго ростомъ, не превышающимъ 30 см., и метелкой съ очень сжатыми вѣтвями; нижніе клубочки колосковъ почти сидячіе. Д. Булатова на открытомъ известковомъ склонѣ, Пдл. у. (Х.).

Eragrostis Host (I, къ стр. 135).

Колоски многоцвѣтковые сплюснутые съ боковъ; кроющія чешуйки не равныя, яйцеватыя, съ 1 жилкой на спинкѣ; прицвѣтныя чешуйки о

¹⁾ Разграниченіе разновидностей *typica* и *gracilescens*, какъ я его даю, единственное, допустимое на основаніи московскаго матеріала. Различіе въ величинѣ колосковъ, которое служитъ для цѣлей разграниченія у Доминна var. *typica* и *gracilescens* на стр. 244: *typica*... *spiculis 6 mm. et ultra longis* и у *gracilescens*... *spicula c. 4,5 usque 5,75 mm. longis* не выдержано у нашихъ формъ. Разница въ 0,25 мм. неуловима вообще, принципиальнаго же значенія длина колосковъ, при опредѣленіи разновидностей, не имѣетъ, въ виду замѣчанія Доминна Monogr., p. 246. «Das Originalexemplar der *K. cristata* var. *minor* Ledeb. (Livonia, H. Ledeb. in H. J. P.) stellt die *K. grandis* var. *typica* (aber mit kleineren Aehren) vor». Я вижу въ Моск. губ. для *K. grandis* лишь 2 «типа»: var. *typica* (герб. С.) и var. *gracilescens* всѣхъ остальныхъ мѣстонахожденій по имѣвшемуся у меня матеріалу Моск. губ. Переходныхъ формъ я, при моемъ пониманіи обѣихъ разновидностей, не вижу.

3 жилкахъ; внутренняя опадаетъ вмѣстѣ съ зерномъ; столбики длинны съ перистымъ рыльцемъ; зерно овальное или яйцевидное безъ бороздки; язычекъ у листьевъ въ видѣ ряда волосковъ.

Eragrostis pilosa P. B. Стебель 30—50 см., прямостоящій или ко-
лѣпчато приподнимающійся; листья б. ч. около 3 мм. ш., съ верхней стороны
и по краямъ шероховатые, съ гладкими голыми вла-
галищами; метелка многоколосковая, до 15 см. дл., съ
отклоненными, многочисленными тонкими вѣтвями; ко-
лоски 4—6 мм. дл., ланцетные, 5—9-цвѣтковые, б. ч.
черновато-фіолетовые; кроющія чешуйки острые, дости-
гаютъ половины или трети длины нижняго цвѣтка;
прицвѣтныя чешуйки заостренные или туповатые.

У насъ пока только культурная форма:

- α. abessinica Körnicke.** Очень крупное растеніе до
1 м.; съ очень густой многоколосковой метел-
кой, до 25 см. дл.; вѣтви метелки приподня-
тыя, тонкія; ножки у колосковъ очень длин-
ныя, тонкія; чешуйки болѣе острошершавыя.
Удѣльная, Моск.-Каз. ж. д., у забора близъ
дачи (Куль.).



Eragrostis pilosa.

Poa nemoralis L. (I, стр. 137).

- β. firmula Gaud.** Прибавить къ описанію: метелка раскидистая,
цвѣтки у основанія слабо шерстистые.

γ. coarctata Gaud. Хор. III, стр. 91.

Метелка сжатая; колоски 3—5-цвѣтковые; влагалища гладкія;
цвѣтки у основанія соединены шерстью. Данилово, Пдл. у. (X.).

Poa palustris (L.) Roth (I, стр. 138).—Хор. III, стр. 93.—Хор. IV,
стр. 17.

Д. Роднева, на известнякѣ по берегу р. Мѣши и (α. и β.) д. Печп-
щева на травянистомъ склонѣ къ ручью. д. Данилова. Пдл. у.; Хоть-
ково, Дмт. у.; Перерва (X.).—Быково беретъ пруда. Бри. у. (Куль.).—Во-
лото по р. Яхромѣ, Дмт. у. (И. Петровъ).

У насъ пока можно различить:

- α. glabrata Aschers.** Хор. II, стр. 17.

Колоски б. ч. (4) 5—7-цвѣтковые; метелка многоцвѣтковая, густая;
пластинки у верхнихъ листьевъ длиннѣе ихъ влагалищъ; стебли
и влагалища голые.

- β. depauperata Aschers. et Gr.** Хор. II, стр. 17.

Колоски 2—3 (4)-цвѣтковые; стебель не выше 30 см., часто вѣт-
вистый, лежачій, очень тонкій, какъ и листья; метелка съ малымъ
количествомъ колосковъ, нерѣдко метелка несетъ только 3—8
двучвѣтковыхъ колосковъ.

Poa compressa L. (I, стр. 138).

У насъ пока можно различить:

Стебель несетъ 2—3 листа; пластинка листа б. или м. длинная, плоская.
α. typica Aschers. et Gr. и **β. Langiana Koch.**

Стебель несетъ 4—7 листьевъ; пластинка листа короткая, б. ч. не длиннѣе 4 см., сложенная вдоль, щетиновидная.

γ. polynoda Aschers. et Gr. Хор. I, стр. 16.

Стебель сильно сплюснутый, часто колѣнчато-изогнутый; влагалище свободное, широкое, б. ч. глубоко открытое; пластинка листа очень узкая, острая; метелка узкая съ прижатыми вѣтвями, прерывчатая; вѣтви расположены нѣсколько двурядно.
 Д. Булатово, по известняку по берегу р. Пахры, Пдл. у. (X.).

Poa Chaixii Vill. (I, стр. 139).

Poa sudetica Haenke. Ф. Б. Доп., стр. 3.—Ф. Б. Нов. дан., стр. 172.

α. remota Fries. Сыр. Отч. II, стр. 18.—Сыр. Отч. III, стр. 12.

Въ словомъ лѣсу близъ с-да Корытцева, Мож. у. (Ф. Б.).—Тѣнистое и тонкое мѣсто въ оврагѣ къ р. Ликовкѣ противъ Мѣшково, Звн. у.; оврагъ къ берегу р. Пахры близъ с. Зеленаго, Брн. у. (С.).

Poa trivialis L. (I, стр. 140).

У насъ еще:

α. pallescens Stebl. et Volkh. Хор. IV, стр. 17.

Растеніе очень нѣжное; стебли тонкіе, гладкіе, какъ и верхнія влагалища. Юрьевское озеро, Пдл. у. (X.).

Poa pratensis L. (I, стр. 141).

У насъ еще:

γ. angustifolia Sm. 1. straminea Roth.

Poa pratensis L. straminea Roth. Сыр. Отч. II, стр. 18.

Колоски бѣлые или желтовато-бѣлые. Опушка лѣса по дорогѣ отъ 17-й версты Брянск. ж. д. къ Оедосыну, Звн. у. (С.).

α. setacea Döll. Отличается отъ *strigosa Hoffm.* зеленымъ цвѣтомъ листьевъ, тогда какъ у *strigosa* листья сѣро-зеленые и болѣе короткіе, и метелкой болѣе раскидистой, тогда какъ у *setacea* метелка стянутая. Татицево, Дмт. у. (И. Петровъ).

Glyceria R. Br. (I, стр. 143).

Переработалъ А. А. Хорошковъ.

1. Колоски сплюснутые съ боковъ; язычекъ очень короткій тупой.


G. aquatica Wahlb.

Колоски цилиндрическіе; язычекъ длинный, острый, часто расщепленный. 2.

2. Наружныя прицвѣтныя чешуйки островатыя; пыльники фиолетовые, 2—2,6 мм. дл. *G. fluitans* R. Br.
 Наружныя прицвѣтныя чешуйки тупыя; пыльники желтые, 0,6—1,25 мм. дл. *G. plicata* Fries.

Glycéria fluitans R. Br. (I, стр. 143).

Метелка узкая, б. ч. односторонняя; нижнія вѣтви метелки о (1) 2—4 (6) колоскахъ, съ 1—2 (3) вѣточками у основанія, каждая объ 1 (2) колоскѣ; колоски 14,5—34,5 мм. дл., 6—13-цвѣтковые; наружныя прицвѣтныя чешуйки 6—7,5 мм. дл., ланцетныя или продолговато-ланцетныя, на верхушкѣ островатыя объ 11 жилкахъ, изъ которыхъ 7 жилокъ длинныхъ, рѣзко выдающихся, равномерно укорачивающихся по обѣимъ сторонамъ отъ срединной жилки, и 4 очень короткихъ едва замѣтныхъ; пыльники фиолетовые (очень рѣдко желтые), длиною (въ сухомъ видѣ) отъ 2 до 2,6 мм. Встрѣчается очень часто.



1. *Glycéria fluitans*. 2. *Glycéria plicata*. 3. *Glycéria plicata*. α . *nemoralis*.

Glycéria plicata Fries. Метелка болѣе широкая, чѣмъ у *G. fluitans*, б. ч. разносторонняя; нижнія вѣтви метелки о 5—15 колоскахъ и съ 2—4 вѣточками у основанія, каждая объ 1—6 колоскахъ; колоски 10—24 мм. дл., 5—13-цвѣтковые; наружныя прицвѣтныя чешуйки 4—5 мм. дл., продолговатойцевидныя съ тупой или округлой верхушкой и съ 11 жилками, изъ коихъ 7 длинныхъ рѣзко выдающихся (за исключеніемъ α , у которой 3 рѣзко выдающихся жилки), по обѣимъ сторонамъ срединной жилки, неравномерно укорачивающихся (первая и вторая жилки могутъ быть одной длины или же вторая длиннѣе первой и т. д.), остальные короткія, едва замѣтныя; пыльники желтые, длиною (въ сухомъ видѣ) 1—1,4 мм.

Подушкисо, Зви. у. по берегу рѣчки въ полутѣни (Х.).—Гербарій Геншпага.—Гербарій Никитина.—В. Мытниц (С.).—Аппенковъ (Fl. Mosq. exs.).

Кромѣ типичной формы у насъ еще:

α . nemoralis Uechtr.

Glycéria nemoralis Uechtr. et Körnicke. Сыр. Отч. II, стр. *Glycéria plicata*. 18.—Сыр. Отч. III, стр. 12.

Менѣе крупное растеніе; колоски 6—13 мм. дл., о 5—7 (10) цвѣткахъ; наружныя прицвѣтныя чешуйки 2,5—3,5 мм. дл., о 3 длин-



ныхъ, рѣдко выдающихся, 4 менѣе длинныхъ и слабыхъ и 4 очень короткихъ, едва замѣтныхъ иголкахъ; пылинки (въ сухомъ видѣ) 0,6—1,2 мм. дл.; у особей, выросшихъ въ тѣни, пыльцевыя зерна б. ч. сморщенные. Воробьевы горы (П.).—Между Передѣлками и р. Стунью по ручью въ тѣни, Звн. у.; близъ с. Зеленаго въ топкомъ оврагѣ, Брн. у. (С.).

3. *versicolor* Hausskn. Чешуйки по краямъ фіолетовыя; пылинки желтыя и фіолетовыя. Открыто на голомъ пескѣ у пересохшаго ручья близъ Купріянихъ, Пдл. у. (Х.).

Glyceria fluitans × *plicata*. Съ признаками обоихъ видовъ въ различныхъ комбинаціяхъ и съ бесплодной пылью. Мытищи (С.).—Пушкино (Ч.).

Atropis distans Griseb. (I, стр. 145).—Ф. Б. Пр., стр. 72.—Хор. III, стр. 91.—Хор. IV, стр. 17.

На лугу близъ Ваулина, Моск. у. (Ф. Б.).—Д. Акишева у цементнаго завода, и по берегу р. Мочи близъ д. Бѣляева, Пдл. у. (Х.).—Петровское-Разумовское—выселки (сообщилъ М. П. Томпінъ).

Scolochloa festucacea Link (I, стр. 145).

Косино—Бѣлое озеро (Ф. Б.).—Близъ д. Татищево на берегу Татищевского озера, Дмт. у. (П. Петровъ).

Въ Серебряномъ бору близъ Хорошова (П.) между обычной формой встрѣчается еще, которую можно назвать:

α. *remota*¹⁾. Соцвѣтіе очень развѣсистое, съ очень длинными и тонкими вѣтвями, при чемъ колосковъ въ соцвѣтіи сравнительно мало, приблизительно около 60 (тогда какъ у типа 200—300); каждая вѣтвь соцвѣтія несетъ около 10 колосковъ.

Festuca ovina L. (I, стр. 147).

α. *genuina* Gren. et Godr. f. *mutica* Choroschkov. Хор. IV, стр. 18.

Прицвѣтныя чешуйки у плодоносныхъ цвѣтковъ безостныя. Рождественно на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

Cynosurus cristatus L. (I, стр. 151).—Sch. III, № 747.

Brómus ramósus Huds. (I, стр. 152).—Хор. II, стр. 18.

Татарское-Сатино, Пдл. у. (Х.).—Внуково по дорогѣ къ Изварину, Звн. у. (Ассъ).

Brómus inermis Leyss. (I, стр. 153).

У насъ еще:

γ. *pellitus* Beck. Хор. IV, стр. 17.

Листья и влагалища, особенно нижніе, б. или м. густо покрыты отстоящими волосками. Михнево у дороги, Брн. у.; на известнякѣ близъ д. Роднева, Пдл. у. (Х.).

¹⁾ *Scolochloa festucacea* Link α. *remota*. Inflorescentia effusa; ramis elongatis tenuibusque prope 10 spiculis suffultis; spiculae ad 60 (in forma typica 200—300).

Brómus tectórum L. (I, стр. 154).

У цементнаго завода по линіи ж. д. близъ Подольска (Куль).

Brómus arvensis L. (I, стр. 155).

Кромѣ обычной формы еще:

α. **violaceus Aschers. et Gr** Колоски фіолетовые. Известняки между Бачмановымъ и Протопоповымъ, Кзм. у.; Пушкино (С.).

Brómus móllis L., правильнѣе называть: **B. hordáceus L.** (I, стр. 156).

У насъ кромѣ обычной формы еще:

α. **nanus Aschers. et Gr.** Растеніе низкое; метелки объ 1—3 колосках¹⁾. Селевкино, Дмит. у. (Н. Слудкій).

Brachypódium pinnatum P. B. (I, стр. 157).—Хор. II, стр. 17.—Сыр. Отч. II, стр. 18.

Манькина гора, Татарское-Сатино, Булатова, Пдл. у. (X.).—Лѣсъ между Оедосынымъ и Губкинымъ, Звн. у. (С.).

Brachypódium silváticum Roem. et Schult. (I, стр. 158).—Хор. III, стр. 93.—Хор. II, стр. 18.—Сыр. Отч. II, стр. 18.

Дубовый лѣсъ между Останкинымъ и Владыкинымъ, Кунцово (Ассъ).—Манькина гора, Луковия, Пдл. у. (X.).—Лѣсъ между Измалковымъ и Губкинымъ, Звн. у. (С.).

Triticum répens L. (I, стр. 160).

У насъ еще:

collinum (Opiz) Aschers. et Gr. Хор. Отч. I, стр. 10.—Хор. II, стр. 17.

Прицвѣтныя чешуйки очень быстро сужены въ очень короткую ость; колоски нормальные, сильно лоснящіеся. Прилуки на открытомъ, голомъ и песчаномъ склонѣ, Сри. у. (X.).

Aégilops L. (I, къ стр. 162).

Колосъ короткій, яйцевидный или удлиненный цилиндрическій; конечный цвѣтокъ или 2—3—безплодные; колосокъ б. ч. 3-цвѣтковый (рѣже многоцвѣтковый); кроющія чешуйки хрящеватыя, о многихъ жилкахъ, окаймляются 2—4 остями, рѣже безъ нихъ или же объ одной ости; прицвѣтныя чешуйки перепончатая о 5 жилкахъ, съ округлой спинкой или съ слабымъ килемъ, на верхушкѣ объ 1—3 зубцахъ или остяхъ.

¹⁾ Эту форму (Hungerform) мнѣ приходилось наблюдать въ громадномъ количествѣ особей въ Лифляндской губ., на пескахъ, гдѣ мѣстами, кромѣ нея ничего не росло, но, переходя на болѣе тучную почву, постепенно прибавлялся ростъ и количество колосковъ въ метелкѣ и въ концѣ зонцовой она превращалась въ нормальную.

Aëgilops cylindrica Host. Стебель б. ч. прямостоящій; листья узкіе; колосъ тонкій цилиндрическій о 4—7 колоскахъ, съ осью легко разламывающагося на кусочки; колоски о (2) 4 цвѣткахъ, расположенныхъ на оси такъ, что верхушка нижняго колоска достигаетъ основанія слѣдующаго; кроющія чешуйки о 2 (3) длинныхъ зубцахъ и иногда обѣ 1 короткой ости; прицвѣтныя чешуйки у верхушечныхъ цвѣтковь обѣ 1—2 длинныхъ остяхъ.


Найдено разъ занесеннымъ по линіи Нижегородск. ж. д. близъ Москвы, въ концѣ іюня (И. Петровъ).

Hordeum jubatum L. (I, къ стр. 164).

Стебель высокій, тонкій, 20—50 см., б. ч. колѣнчато-приподнимающійся; листья слабо шероховатые съ мало вздутыми влагалищами; язычка



Aëgilops cylindrica.



Hordeum jubatum.

пѣтъ; колосъ не длиннѣе 6 см., узкій, часто поникающій; кроющая чешуйка состоитъ изъ длинной до 6,5 см. дл. ости; боковые колоски превращены въ двѣ пучкомъ сидящія ости съ зачаточнымъ цвѣткомъ; прицвѣтныя чешуйки срединнаго цвѣтка продолговато-яйцевидныя съ остью до 5 см. дл.

Занесено, вѣроятно, изъ Америки. Химки, около дачъ въ большомъ числѣ особей (Н. Слуцкій).

Lolium perenne L. (I, къ стр. 166).

Близъ с. Узкое-Богородское, близъ Никольскаго по Петербургскому шоссе около полотна Виндавск. ж. д. (Асень).—Морозово, Дмт. у. (Н. Слуцкій).

Кромѣ обычной формы еще:

α. *gamosum* (Sm.) Richt. Колосъ въ нижней половинѣ вѣтвистый; вѣточныя съ нѣсколькими колосками (до 5). Близъ Никольскаго, вмѣстѣ съ типомъ (Асень).

Lolium multiflorum Lam. (I, къ стр. 166).

Одно-двухлѣтнее растеніе, образуетъ дерновинки; стебли высокіе, 40—100 см., прямостоящіе или основаніемъ приподнимающіеся, въ нижней части гладкіе, къ верхушкѣ шершавые, особенно шершавая ось между колосковъ; листья не шире 4 мм., шероховатые; язычекъ очень короткій или его нѣтъ; колосъ очень длинный о многихъ колоскахъ; послѣдніе 2—3 см. дл., 10—20 цвѣтковые; кроющія чешуйки до 13 мм. дл., о 7 жилкахъ, узколанцетныя, б. ч. съ усѣченной двузубчатой верхушкой; прицвѣтныя чешуйки 7—8 мм. дл., о 5 жилкахъ, наружная съ остію. Хорошо отличается отъ *L. perenne* шершавою осью колоса и остіями. Воробьевы горы близъ дорожки, гдѣ недавно былъ посѣянъ газонъ (Ассь).

*Lolium multiflorum.***Rhynchospora álba Vahl.** (I, стр. 168).—Хор. II, стр. 18.

Луково озеро, на моховомъ болотѣ, Бгр. у. (X.).—Тонкое моховое болото близъ д. Татищево, Дмт. у. (II. Петровъ).

Heleocharis ováta R. Br. (I, стр. 170).

Между Каргашинимъ и Звягинимъ; по болотистой дорогѣ въ лѣсу между ст. Удѣльная Моск.-Каз. ж. д. и Вялками, Брн. у. (С.).—Д. Булгакова, по дорогѣ отъ Храпунова поста Ниж. ж. д. къ Лукову озеру, Бгр. у. (X.).—Владыкино (Ассь).—Долина р. Яхромы, Дмт. у. (II. Петровъ).

Heleocharis aciculáris R. Br. (I, стр. 170).

Кромѣ обычной формы еще:

α. *filiformis* Saut. Стебли очень тонкіе, нитевидные до 25 см. (у тина б. ч. не выше 10 см.); колоски очень мелкіе 2—4-цвѣтковые. Истоки р. Клязьмы близъ Кочергина, Кли. у. (II.).

Scirpus maritimus L. (I, стр. 172)¹⁾.

У насъ пока можно различить слѣдующія формы:

α. *typicum* Aschers. et Gr. Колоски 1,5—2 см. дл., сидятъ по 2—5 пучками. Эта форма встрѣчается много чаще слѣдующей формы.

¹⁾ Palla, въ Koch's Synopsis ed. III, расчленилъ Линнеевскій родъ *Scirpus* на нѣсколько родовъ, такъ что къ роду *Scirpus* онъ отнесъ только *Sc. radicans* и *Sc. silvaticus*. *Scirpus maritimus* L. переименованъ въ *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla, а *Scirpus lacustris* L. въ *Schoenoplectus lacustris* Palla.—Aschers. et Gr.

β. genuina Pospich. Колоски чаще 1 см. дл., рѣже 1,5 см., сидятъ на вѣтвяхъ соцвѣтія по одному или вперемѣшку отъ 1 до 3.—Лужники, Срп. у. (X.).

***Scirpus silvaticus* L.** (I, стр. 173).

У насъ пока только форма:

α. dissitiflorus Sonder. Sch. VI, № 1691a.

Соцвѣтіе очень раскидистое съ длинными неравными вѣтвями.

***Scirpus radicans* Schk.** (I, стр. 174).

Д. Бѣлутово, Пдл. у. (X.).

***Blýsmus compréssus* Pazn.** (I, стр. 174).

Scirpus compressus (L.) Pers. Хор. III, стр. 93.

Дарьино, Зви. у. (X.).—Пушкино по лугу у р. Серебрянки (С.).

Клементьево, Руз. у. (Сюз.).—Владыкино (Ассь).

***Eriophorum angustifolium* Roth** (I, стр. 176).

Н. А. Шиловъ нашелъ близъ Прусъ, Мос. у., большое количество особей, у которыхъ почти всѣ цвѣтки въ колоскахъ были мужскіе и только послѣ тщательнаго изслѣдованія, мнѣ удалось найти въ колоскѣ отъ 5—15 обоеполыхъ цвѣтковъ.

***Eriophorum latifolium* Hoppe** (I, стр. 177).

По берегу озера Нерскаго у с. Озередкаго (П. и С.).—Близъ Пушкина (С.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.).—Д. Быково, Пдл. у.; по р. Яхромѣ, Дмт. у. (П. Петровъ).

***Eriophorum grácle* Koch** (I, стр. 177).—Хор. II, стр. 19.

Луково озеро, Бгр. у. (X.).—Селевкино, Дмт. у. (Н. Слуцкій).

***Cárex dióica* L.** (I, стр. 185).—Сыр. Отч. II, стр. 19.

Болото по опушкѣ лѣса близъ Усова, Зви. у.; болото по р. Маке-доновкѣ близъ ст. Удѣльная, Моск.-Каз. ж. д., Брн. у. (С.).

***Cárex obtusáta* Liljebl.** (I, стр. 186)—Sch. VI, № 1944 b.

***Cárex chordorrhiza* Ehrh.** (I, стр. 187).

Поганое озеро близъ с. Кудинова, Бгр. у. (X.). Болото по р. Яхромѣ, Дмт. у. (П. Петровъ).

***Cárex disticha* Huds.** (I, стр. 187), правильнѣе называть:

***C. intermédia* Good.**

Въ Synopsis оставляютъ полностью Линнеевскій родъ *Scirpus*, но подраздѣляютъ его на подроды (или группы) съ тѣми же названіями подро-довъ, какія Раппа далъ своимъ родамъ.

Cárex praécox Scheb. α . pallida Lange (sp.) (I, стр. 189), правильно называть:

α . **pallida Peterm.**

Cárex vulpina L. α . nemorosa Rebert. (sp.) (I, стр. 189), правильно называть:

α . **nemorosa (Rebert.) Koch** и къ описанію прибавить: кроющія чешуйки бѣловатыя съ зеленой полоской на спинкѣ, края же ихъ свѣтло-буроватыя.

У насъ еще:

β . **interrupta Peterm.** Колосъ очень длинный, сильно прерывчатый; колоски мелкіе; прицвѣтныхъ листьевъ нѣтъ. Рождествено на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Расторгуево (Н. Ступцкій).

Cárex echináta Murr. (I, стр. 190).—Сыр. Отч. II, стр. 19.

Къ описанію прибавить: мѣшечки до 3,5 мм. дл. (рѣдко до 4 мм.). Тѣсь близъ Измалкова и кустарникъ по берегу р. Липовки противъ Мѣшкова, Звн. у. (С.).—Григорово, Вер. у. (X.).

Cárex paradóxa Willd. (I, стр. 191).

Кромѣ обычной формы еще:

α . **brachystachya Schatz.** Колосъ короткій (до 4 см.), сизый, плотный, не прерывчатый; вѣточки сильно прижатые. Болото по ручью близъ Вялокъ, Бри. у. (С.).—Татищево, Дмт. у. (И. Петровъ).

β . **sparsiflora Lange.** Стебель очень тонкій, почти нитевидный, острошершавый; колосъ удлинненный, очень тонкій, прерывчатый; листья очень узкіе, почти нитевидные, длинно-и тонко-заостренные. На тонкомъ моховомъ болотѣ близъ д. Татищево, Дмт. у. (И. Петровъ).

Cárex teretiúscula Good. (I, стр. 192), правильно называть: **C. diándra Schrank.**

Кромѣ обычной формы еще:

α . **tenella Beckmann.** Стебель очень тонкій, слабый, едва шероховатый; листья очень узкіе; колосъ короткій. Косино—Черное озеро (П.).

Cárex leporina L. (I, стр. 193).

α . **capitata Sonder (sp.)**. Д. Дровнино, Пдл. у. (X.).

β . **argyroglochin Hornem.** правильно β . **argyroglochin (Hornem.) Koch.**

Cárex stelluláta Good. (I, стр. 194).

По сырому кустарнику близъ Пушкина (С.).—Серебряный боръ близъ Хорошова; Вялки, Бри. у. (X.).

Carex elongata L. (I, стр. 194).

Лѣсъ близъ 17-й версты, Брянск. ж. д. (С.).—Звяжино; Булгаково, Бр. у. (X.).


α. *Gebhardi* Willd., правильнѣе: α. *Gebhardi* (Willd.) Aschers.

Carex canescens L. (I, стр. 195).

У насъ еще форма:

β. *congesta* K. Domin. Сосуды: верхняя до 70 мк., трубчатый; листовъ до 4 мм. ш.; колосъ изъ 4—11 крупныхъ продолговатыхъ колосковъ, въ нижней части колоса разставленныхъ, въ верхней—скупенныхъ. Раменское, Брн. у. (П.).—Кусково (Куль.).

Carex canescens L. отличается отъ *C. vitilis* Fr., кромѣ общаго облика, въ мѣстности, которая устроена тоже почти тоже, кромѣ 2 малень-



1. *Carex canescens*.
2. *Carex vitilis*.

кими зубчиками, а у второго вида мѣшечки переходятъ въ короткій двузубчатый носикъ, расщепленный только до основания носика; этотъ послѣдній признакъ особенно подчеркивается Кюкенталемъ и Ascherson'омъ. После тщательнаго изслѣдованія обширнаго матеріала, я пришелъ къ убѣжденію, что признакъ расщепленности явствен-но замѣтенъ только, когда плодъ совершенно созрѣлъ; когда же имѣешь дѣло съ плодомъ не созрѣвшимъ, то есть видна только линія, по которой носикъ расщепится; точно такую же линію можно замѣтить и у *C. canescens* L., но не столь

явно. Не разсуждая по первымъ признакамъ, лучше стараться по другимъ признакамъ—длину носика, и для облегченія опредѣленія я приношу тутъ рисунки хитинизованнаго носика (1. *C. canescens*, 2. *C. vitilis*).

Въ дополненіе къ списку въ I ч. на стр. 196, относящейся къ *C. canescens* L. α. *strictifolia* M., я могу добавить, что Кюкенталъ въ своей монографіи *Cyperaceae* (РПальмбергъ) приводитъ *C. canescens* L. var. *tenax* Long. и, нѣмъ сличивъ съ этой формѣ даже *C. canescens* L. var. *lanceolata* Aschers., относитъ ее преимущественно къ *C. canescens* L. var. *lanceolata* Aschers., считая ее старинный сортъ и, какъ и уже говорилъ раньше, совершенно не отличающійся отъ формы, на которой онъ находится въ настоящее время. Кюкенталемъ для распространенія многотычинковой формы вида *C. canescens* к этому я приношу тутъ латинскія различныя формы *strictifolia* M. β. *Carex canescens* L. *strictifolia* M. var. *strictifolia* (L. f.) болѣшими очень густыми соцветіями, имѣющими видъ почти шаровидный и эту форму, какъ на гербаріяхъ Болотыхъ, такъ и въ природѣ. Я собралъ и описалъ въ описаніи болѣе молодыхъ лугахъ; вслѣдъ эта форма болѣе или менѣе характерный видъ. Для насъ была найдена форма (А. Хорош-

β. *Carex canescens* L. var. *strictifolia*. Culmis strictis, foliis rigidis, scetosis; spicae 3—5 spiculis, plerumque sparsis, subglobularibus, paucifloris.

ковымъ и мною). общій обликъ которой ничѣмъ не отличался отъ *C. canescens* L. *strictifolia* m., но съ мѣшечками какъ у *C. vitilis* Fr. Эти экземпляры надо считать формой *C. vitilis* Fr., но параллельной *C. canescens* L. *strictifolia*.

Встрѣчаются иногда переходы или помѣси, какъ думаетъ Kükenthal, между *C. canescens* L. и *C. vitilis* Fr., которые очень трудно поддаются опредѣленію, но, если держаться приведенныхъ тутъ рисунковъ, счтя ихъ за типичные, то переходы или помѣси уловить можно.

***Cárex vitilis* Fr.** (I, стр. 196), правильно: ***C. brunnescens* (Pers.) Poir.**

var. β . *sphaerostachya* (Dew.) Kükenth. Типичная форма *Carex brunnescens* у насъ до сихъ поръ не найдена; она встрѣчается въ арктическихъ и альпійскихъ странахъ, да еще разъ показана Флеровымъ въ Владимѣрской губ.; послѣдній экземпляръ былъ опредѣленъ Kükenthal'емъ.

***Cárex tenella* Schkuhr** (I, стр. 197).—Sch. II, № 239b.—Сыр. Отч. III, стр. 12.—Сыр. Отч. I, стр. 14.

Лѣсъ близъ Братовицны, Дмт. у. (С.).

***Cárex remota* L.** (I, стр. 198).

Въ кустарникахъ по долинѣ р. Яхромы близъ с. Подмошье, Дмт. у. (сообщ. II. Петровымъ, въ гербаріи у него лѣтъ).

***Cárex stricta* Good.,** правильно называть: ***C. Hudsonii* A. Bennett.**

Первое названіе было дано Ламаркомъ одной американской осоки въ 1789 г., тогда какъ нашей осоки названіе *C. stricta* Good. было присвоено въ 1794 г.—Селевкино, берегъ пруда, Дмт. у. (Н. Слуцкий).

Во «Флорѣ европейской Россіи». Б. А. Федченко и А. Ф. Флерова, приводится за № 481, ***Carex moscowensis* C. B. Klarke.** Описаніе этой осоки помѣщено въ «Бот. журналѣ» «Труд. Имп. С.-Пб. Общ. Естествоисп.», томъ XXXV, вып. 3, стр. 191 (1906), которое заключаетъ слѣдующее: «Стебель 80 см. выш., болѣе крѣпкій; листья ўже; влагалища у основанія листьевъ толстыя, едва досняшіяся, вѣшено сѣтчатые; верхніе 2—3 колоска мужскіе, остальные 2—3 женскіе, мало разставленные, почти сидячіе; прицвѣтный листъ короче соцвѣтія; рылецъ 2; мѣшечки мелкіе, узко-продолговатые, безъ жилокъ, слегка пушстые (?) ¹⁾; въ остальномъ, какъ у *C. caespitosa* Palmstr. (?)—У *C. stricta* мѣшечки крупныя овальныя, съ самаго основанія съ явственными жилками, сѣро-спло-железистые» (?).

Изъ діагноза видно, что Klarke при описаніи *C. moscowensis*, какъ главный отличительный признакъ выдвигаетъ мѣшечки безъ жилокъ, тогда какъ у *C. stricta* мѣшечки съ явственными жилками. Но Kükenthal

¹⁾ ?? знаеніи мон.

въ своей монографіи (Cyperaceae (Pflanzenreich) p. 332 приводит **C. Hudsonii A. Bennett var. β . homolocarpa (Peterm.) Rchb.** (найдена П. Петровымъ въ Кунцовѣ), у которой мѣшечки тоже безъ жилокъ, а остальные признаки, б. ч. количественнаго характера, выражаются въ меньшей величинѣ всѣхъ частей растенія, тогда какъ у *C. moscowensis* С. В. Clarke болѣе крупный ростъ съ менѣ широкими листьями (безъ цифровыхъ величинъ), чѣмъ у типа. Вообще видъ Кларка очерченъ такъ неясно, что высказаться о немъ болѣе положительно можно будетъ только тогда, когда будетъ болѣе обширный матеріалъ, котораго въ настоящее время въ наличности нѣтъ.

Cárex caespitosa L. (I, стр. 199).—Sch. III, № 793.

У насъ пока, кромѣ обычной формы, можно различить еще слѣдующія:

α . **fuliginosa Doell.** Близъ Татарова на р. Москвѣ (С.).

β . **Waisbeckeri Kükenth.** Листья узкіе съ сильно завернутыми краями; влагалища у основанія листьевъ мало сѣтчато-волокнуистыя. Серебряный боръ близъ Хорошова (П. и С.).—Быково, Брн. у. (Цикендратъ).

γ . **retorta Fries.** Колоски длинные, рѣдкоцвѣтковые, нѣсколько склоняющіеся; кроющія чешуйки ланцетныя, острые, длиннѣе эллиптическихъ мѣшечковъ.

Указана у Kükenthal для Моск. губ. по экземплярамъ, доставленнымъ ему А. Н. Петунниковымъ, но въ гербаріи послѣдняго не находится; вѣроятно, не возвращена обратно Kükenthal'емъ.

Cárex grácilis Curt. (I, стр. 200).

Kükenthal, въ своей монографіи Cyperaceae (Pflanzenreich), очерчиваетъ нѣсколько иначе формы этой осоки, чѣмъ Aschers. et Gr. въ Synopsis, а потому, придерживаясь этой монографіи, у насъ, кромѣ типичной формы, можно различить еще слѣдующія:

α . **corynophora (Peterm.) Kükenth.** Женскіе колоски булавовидно-цилиндрическіе. Д. Дровнино, Пдл. у. (Х.).

β . **fluviatilis Hartm.**

Carex acuta L. *fluviatilis* Hartm. Ф. В. № 24.

Стебли мощные; женскіе колоски сидячіе или почти сидячіе, толстые, 7—8 мм. толщ.; кроющія чешуйки значительно длиннѣе мѣшечковъ. Часто.

γ . **tricostata (Fries) Aschers.** Стебель прямо-торчащій; листья узкіе; женскіе колоски короткіе, сидячіе; кроющія чешуйки туповатыя; мѣшечки равны кроющимъ чешуйкамъ или длиннѣе ихъ, съ наружной стороны выуклые, съ внутренней менѣе выпуклы. Лукички и подъ Симоновымъ монастыремъ (П.).

δ . **rudis (Wimm.) Kükenth.** Стебель тонкій, листья узкіе, 2—4 мм. ш.; кроющія чешуйки туповатыя, вмѣстѣ съ мѣшечками почти черныя. Дарыно, Зви. у. (Х.).—Селевкино, Дмт. у. (Н. Слуцкій).

- ε. *sphaerocarpa* Uechtr. Мешечки очень мелкіе, рѣдко достигаютъ 2 мм., б. ч. мельче; женскіе колоски б. ч. очень тонкіе. По мшистому тонкому болоту близъ д. Быкова, Пдл. у. (П. Петровъ).
- ζ. *zygostachya* Rchb. У основанія женскихъ колосковъ еще 1—3 маленькихъ, тоже женскихъ колоска, отъ 0,5 до 2 см. дл. По берегу р. Клязьмы у Тарасовской платформы (П.).

Carex Goodenoughii Gay (I, стр. 201).

По монографіи Kükenthal, α. *curvata* Aschers. et Gr. составляетъ типичную форму, а на остальные формы монографъ смотритъ нѣсколько иначе, такъ что у насъ, кроме общераспространенной формы, можно еще различить:

α. polyandra (Schkuhr) Kükenthal.

Carex Goodenoughii Gay γ. *polygama* Rchb. Сыр. Пдл. Фл., I, стр. 202. Какъ типъ, но женскіе колоски на концѣ съ мужскими цвѣтками. Лапково, Руз. у. (П.).

β. basigyna Rchb. Въ пазухѣ у одного изъ нижнихъ листьевъ одинъ женскій колосокъ на очень длинной тонкой ножкѣ, почти равной стеблю до нижняго колоска. Близъ Черкизова на р. Клязьмѣ (П. Петровъ).

γ. tornata Fries. Корневище дернистое; стебель 30—45 см., толстый, жесткій торчащій; листья плоскіе, 3—4 мм. ш., жесткіе; колоски цилиндрическіе, толстые, нѣсколько сближенные. Близъ Черкизова на р. Клязьмѣ (П. Петровъ).

δ. recta Fleischer.

Carex Goodenoughii Gay β. *elatior* Aschers. et Gr. Сыр. Пдл. Фл. I, стр. 202. *Carex vulgaris* Fries var. *elatior* Lang. Пет. Кр. III, стр. 39.

Корневище съ длинными побѣгами; стебель 30—70 см., тонкій; листья очень длинные, тонкіе, б. или м. мягкіе; колоски б. или м. разставленные, до 4 см. дл., нижній часто на ножкѣ; прицвѣтный листъ нижняго колоска иногда превышаетъ длину весь колосъ. Косино, Мытищи (П.).—Черкизово на р. Клязьмѣ (П. Петровъ).

ε. juncea Fries.

Carex vulgaris Fr. var. *juncella* Fr. Ф. Б. № 23.

Корневище сильно дернистое съ короткими побѣгами; стебель высокій, тонкій; листья очень длинные, очень тонкіе, торчащіе, часто съ свернутыми краями. Серебряный боръ близъ Хорошова; Вязки, Бри. у. (X.).

Carex Goodenoughii × gracilis Kükenth.

Даетъ побѣги; растеніе сѣро-зеленое или почти зеленое; стебли крѣпкіе, торчащіе, почти до основанія остро-шершавые; прикорневая влагалища свѣтло-бурая или красно-бурая; листья 4—8 мм. ш., плоскіе, особенно выдаются своей шириной въ не цвѣтущихъ пучкахъ; колосъ б. ч.

съ разставленными колосками, изъ коихъ 3—4 женскихъ и 2 или 1 мужскихъ; прицвѣтный листъ у нижняго колоска равенъ всему колосу или длиннѣе его; мѣшечки снаружки выпуклые, съ внутренней стороны б. ч. плоскіе, съ неясными жилками, почти всегда пустые безъ сѣмени. Какъ помѣсь приближается своими признаками то къ одному, то къ другому виду. Найдена пока только разъ близъ Черкизова на р. Клязьмѣ (И. Петровъ).

Carex caespitosa × **Goodenoughii** Appl.

Корневище сильно дернистое съ короткими побѣгами; стебли 30—70 см., тонкіе съ острыми углами, остро-шершавые; прикорневая влагалища бурья, рѣдко мѣстами слегка красноватая; листья б. ч. узкіе, очень длинныя; мужской колосокъ б. ч. одинъ—булавовидный; прицвѣтный листъ нижняго женскаго колоска короткій, иногда его почти нѣтъ; прицвѣтныя чешуйки туповатая; мѣшечки б. ч. пустые безъ сѣмени. Какъ помѣсь по своему облику очень измѣнчива.

Найдена пока только разъ А. Хорошковымъ въ Серебряномъ бору близъ Хорошова, гдѣ обильно встрѣчаются оба вида. А. Хорошковъ нашелъ еще на озерѣ Перескомъ близъ с. Озерецкаго осок, которая не отличается отъ выше описанной помѣси, но почти все ея мѣшечки содержатъ сѣмя.

Cárex montána L. (I, стр. 203).—Sch. I, № 39.

β. reflexa, правильнѣе называть **β. remotiflora** Waisb.

У насъ еще:

γ. bulboides Waisb. Основаніе стеблей такъ густо окружено остатками и влагалищами листьевъ, что образуетъ вздутіе наподобіе луковичекъ. Эта форма у насъ встрѣчается чаще другихъ.

Что же касается до **f. fimbriata** Waisb., отличіе которой состоитъ въ рѣсничкахъ, окаймляющихъ кроющія чешуйки, то все просмотрѣнные мною экземпляры имѣли мелкія рѣснички и даже экземпляры изъ герб. «*Carices exsiccatae* Kneucker'a за № 45, съ этикеткой *C. montana* L., имѣли тоже рѣснички, но нѣсколько болѣе длинныя, чѣмъ у нашихъ экземпляровъ.

Cárex ericetórum Poll. (I, стр. 203).

Между с. Успенскимъ и Борками, Зви. у.; Ново-Удѣльная, Бри. у.; Спиридово, Дмт. у. (X.).

Кромѣ обычной формы у насъ еще:

α. pallens Kneuck. Кроющія чешуйки блѣдныя, у мужскихъ цвѣтковъ желтоватая, у женскихъ съ очень широкимъ пленчатымъ краемъ. Коншинскій лѣсъ близъ Серпухова; Косино (П.).

Cárex caryóphyllea Latour. (I, стр. 204).

Carex praecox Jacq.—Sch. I, № 141.

Татарское-Сатино, Пдл. у. (X.).

Cárex umbósa Host (I, кз стр. 205).

По облику походить на крупную форму *C. caryophylla* Latour. но корневище у ней пучковатое, безъ побѣговъ; стебли 30—45 см., тонкіе, трегранные, слегка шероховатые; листья узкіе до 2 мм. ш., плоскіе, ярко-зеленые, шероховатые, превышаютъ стебли; влагалище прикорневыхъ листьевъ красно-бурое и у основанія съ волокнистыми остатками; мужской колосокъ одинъ, верхушечный, булавовидный, 1—1.5 см. дл.; женскихъ колосковъ 2—3, овальныхъ или продолговатыхъ, 6—12 мм. дл., верхніе сидячіе, нижній на короткой ножкѣ; прицвѣтный листь влагалищный съ маленькой пластинкой, не превышающей длину нижняго колоска; кроющія чешуйки у женскихъ колосковъ рыжія или каштановыя съ зеленой полоской на спинкѣ, овальныя или слегка яйцевидныя, на верхушкѣ округлыя, быстро переходятъ въ короткое остріе; мѣшечки превышаютъ чешуйки, овальныя или грушевидно-3-гранные, 2.5—3 мм. дл., блѣдно-зеленые или буроватые, пушистые, вытянуты въ короткій носикъ. Бычково, Сри. у. (указано у Маевского, изд. III, стр. 580).



Carex umbrosa.

Cárex panicea L. (I, стр. 206).

Рождествено на р. Нарѣ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Близъ д. Подосинки по Моск.-Каз. ж. д. (Ассъ).

Cárex vaginata Tausch (I, стр. 206).—Sch. I, № 38.—Смр. Отч. III, стр. 12. Правильнѣе: **C. sparsiflora (Wahlb.) Steud.**

Лѣсъ близъ Вялокъ, Бри. у. (С.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.).

А. А. Хорошковъ нашелъ близъ Ново-Удѣльной, Бри. у., форму, которая нѣсколько уклоняется отъ типа женскими колосками сравнительно рѣдкоцвѣтковыми и на очень короткой ножкѣ; нѣкоторые колоски почти сидячіе, рѣдко единичные на болѣе длинной ножкѣ.

Cárex capilláris L. (I, кз стр. 207).

Образуетъ густыя дерновники; корневые листья не шире 2.5 мм., по краямъ шероховатые, съ бурыми влагалищами у основанія; стебли гладкіе, до 20 см. (б. ч. 10 см.), превышаютъ листья; стеблевой листь б. ч. одинъ на срединѣ стебля или его нѣтъ; женскихъ колосковъ 2—3 на очень тонкихъ почти нитевидныхъ, шероховатыхъ, въ 2—4 см. дл., поникающихъ ножкахъ; мужской колосокъ одинъ верхушечный; прицвѣтный листь не превышаетъ соцвѣтія, съ б. или м. длиннымъ влагалищемъ; цвѣтковъ въ женскомъ колоскѣ мало, не болѣе 8, разставленныхъ; кроющія чешуйки короче мѣшечковъ, обратно-яйцевидныя, туповатыя или острыя, на спинкѣ

*Carex capillaris.*

болѣ темныя или зеленыя, по краямъ съ широкой свѣтлой пленчатой каймой; мѣшечки около 3 мм. дл., яйцевидно-ланцетные, постепенно заостренные какъ бы въ носикъ, у основанія суженные; мужской колосокъ около 1 см. дл., очень узкій, тоже 8-цвѣтковый; кроющія чешуйки его продолговато-обратно-яйцевидныя, тупыя, на концѣ зубчатыя, свѣтлобурья. Ваулино, Мож. у. (сообщено Ф. Б.).

***Cárex palléscens* L.** (I, стр. 207).—Sch. III, № 795.

Исправить описаніе: стебли 20—40 см.; листья плоскіе 2—3 мм. ш.

Кромѣ обычной формы у насъ еще:

α. *elatior* Aschers. Стебли въ 50 см. и выше; листья очень мягкіе, дряблые, до 4,5 мм. ш. Тѣневая форма на тучной почвѣ.

***Cárex pedifórmis* C. A. M.** (I, стр. 208).—Хор. III, стр. 91.—Sch. I, № 143.

У насъ только: **var. *rhizina* (Blytt) Kükenth.**

Типичное *C. pediformis* C. A. M. встрѣчается только въ Сибири, начиная съ Урала, въ Китаѣ и въ Туркестанѣ; описаніе, приведенное на стр. 208, вполне соответствуетъ нашей формѣ. Влѣзъ Нѣмчинова (С.).—Д. Булатова, Манькинъ гора, Пдл. у.; Порѣчье, Ряз. у. (X.).

***Cárex digitáta* L.** (I, стр. 208).

У насъ пока можно различить слѣдующія формы:

α. *robustior* Kükenth. Стебли до 30 см.; листья 4—5 мм. ш., у не цвѣтущихъ побѣговъ достигаютъ колосковъ или превышаютъ ихъ; женскіе колоски до 3 см. дл., многоцвѣтковые (до 12 цв.), на б. или м. длинныхъ ножкахъ. Встрѣчается очень часто.

β. *brevifolia* Aschers. Листья не цвѣтущихъ побѣговъ много короче стеблей, далеко не достигаютъ нижнихъ колосковъ.

***Cárex fláva* L.** (I, стр. 209).

Къ описанію прибавить: мѣшечки 5—6 мм. дл. Типичное *C. flava* L. обыкновенно 20—40 см. выш., съ листьями 3—4 мм. ш.

Кромѣ обычной формы у насъ еще:

α. *umbrosa* Kneuck. Стебель высокій, часто выше 60 см.; листья до 5 мм. ш., мягкіе, пѣжные. Тѣневая форма.

***Cárex Oedéri* Ehrh., правильно: *C. Oedéri* Retz.** (I, стр. 210).

Cárex silvática Huds. (I, стр. 211).

Близъ Ромашкова (С.).—Новый Иерусалимъ. Зви. у.; Сикирино, Пдл. у. (Х.).—Селевкино, Дмт. у. (Н. Слуцкий).

Cárex rostrata With., правильнѣ: **C. rostrata Stokes** (I, стр. 212).

Кромѣ обычной формы у насъ еще:

α. **elatioer Blytt.** Растеніе 90—100 см.; листья 6—8 мм. ш., часто плоскіе. Дарьино, Зви. у. (Х.).—Селевкино, Дмт. у. (Н. Слуцкий).

Cárex acutifórmis Ehrh. (I, стр. 213).

Черкизово на р. Клязьмѣ, на болотистомъ лугу около лѣса (Н. Петровъ).

Cárex ripária Curt. (I, стр. 213).—Ф. Б. Доп., стр. 3.

Имѣніе Бодня, Мож. у. (Ф. Б.).

Cárex hirta L. (I, стр. 215).

У насъ пока кромѣ обычной формы еще:

α. **humilior Peterm.** Растеніе 6—8 см., б. или м. слабо опушенное. На песчаномъ берегу р. Яхромы подъ Шустовымъ, Дмт. у. (П.).

β. **major Peterm.** Стебель очень высокій до 1 м.; листья на не цвѣтущихъ стебляхъ очень длинныя, мягкіе; женскіе колоски 4—5 см. дл. Подъ Березной, Срп. у. (П.).—Дер. Манькина гора, Пдл. у. (Х.).

γ. **paludosa A. Winkler.** Походить на β. но листья еще болѣе мягкіе, голые или почти голые, какъ и влагалища; водяная форма. Д. Капустина, въ водѣ по капавѣ, Брн. у. (Х.).

δ. **subhirtaefórmis Kneuck.** Листья покрыты очень разсѣянными волосками, почти голые; на влагалищахъ у пластинки листа волоски; мѣшечки б. ч. густо волосистые. Часто.

ε. **hirtaefórmis (Pers.) Kunth** (I, стр. 215).

Cárex aristáta R. Br. (I, стр. 215).

Рождествено на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

Lémna minor L. (I, стр. 219).—Sch. V, № 1386.

Въ прудахъ Петровскаго-Разумовскаго, цвѣты въ іюлѣ, плоды въ августѣ (С. П. Ростовцевъ). Въ то же время цвѣли *Lemna trisulca* L. и *Spirodela polyrrhiza* Schleid.

Júneus bufónius L. (I, стр. 221).

Кромѣ обычной формы у насъ еще:

α. **parvulus Hartm.** Растеніе очень маленькое, 2—3 см. На сухихъ мѣстахъ и по полямъ дорогъ. Селевкино, Дмт. у. (Н. Слуцкий).

Juncus ranarius Song. et Perrier (I, стр. 221).

Будетъ, пожалуй, правильнѣе эту форму выдѣлить въ самостоятельный видъ, какъ это дѣлаютъ Aschers. et Gr., которые указываютъ на то, что какъ *J. bufonius*, такъ и *J. ranarius* встрѣчаются вмѣстѣ, но легко различимы, а послѣдній видъ, выведенный въ саду, сохранилъ все свои признаки. Къ приведенному у меня описанію надо добавить: иногда нѣкоторые цвѣтки одиночные, но верхушечные всегда по 2—3.

Juncus compréssus Jacq. (I, стр. 222).

У насъ пока можно различить слѣдующія формы:

α. **typicus** Aschers. et Gr. Стебель покрытъ листьями, самое меньшее съ однимъ листомъ посрединѣ стебля.

Эта форма распадается на:

1. **condensatus** Aschers. et Gr. Соцвѣтіе густое, сжатое, почти безъ выступающихъ вѣтокъ; длина соцвѣтія не превышаетъ удвоенной ширины. Черкизово на р. Клязьмѣ; Быково, Пдл. у. (И. Петровъ).
2. **elongatus** Aschers. et Gr. Соцвѣтіе удлинненное съ длинными вѣтвями; длина соцвѣтія во много разъ превышаетъ ширину. Черкизово на р. Клязьмѣ (И. Петровъ).
3. **bracteosus** (Kit.) Aschers. et Gr. Прицвѣтный листъ очень длинный, нерѣдко въ нѣсколько разъ превышаетъ соцвѣтіе. Ст. Битца, Курск. ж. д., Пдл. у. (X.).

β. **dianthelus** K. Koch.

Juncus effusus L. (I, стр. 223).

У насъ пока можно различить слѣдующія формы:

- α. **typicus** Aschers. et Gr. Соцвѣтіе съ б. или м. длинными вѣтвями, раскидистое, съ большимъ числомъ цвѣтковъ. Обычная форма.
- β. **compactus** Lej. et Court. По берегу р. Учи близъ Витенева (П.).
- γ. **prolifer** Sonder. Соцвѣтіе сложное, т. е. вѣтви его въ свою очередь несутъ длинныя вторичныя вѣточки съ цѣлымъ соцвѣтіемъ. Близъ ст. Сходня, Ник. ж. д. (X.).
- δ. **pauciflorus** Michel.

Juncus conglomeratus L. (I, стр. 224).

По болотистому луку близъ Пушкина (И. Петровъ). — Евсейково, Дмт. у. (Куль.).

Juncus atratus Krock. (I, къ стр. 225).

Послѣ тщательнаго изученія имѣвшагося у меня матеріала по *J. acutiflorus* Ehrh. и *J. atratus* Krock., я пришелъ къ убѣжденію, что находящійся въ герб. Максимовича *J. silvaticus* изъ-подъ Верей есть *J. atratus* Krock. Экземпляръ Максимовича очень убогій, заключаетъ въ себѣ только соцвѣтіе безъ листьевъ, и при томъ довольно юный. Главное отли-

чіе между этими двумя видами по Aschers. et Gr. заключается въ длинѣ внутреннихъ листочковъ околоцвѣтника, которые у *J. acutiflorus* должны быть длиннѣ наружныхъ, тогда какъ у *J. atratus* все листочки околоцвѣтника равны или внутренніе даже короче. Однако на этотъ признакъ опираться нельзя, какъ указываетъ Виченца, замѣчая, что у *J. atratus* внутренніе листочки околоцвѣтника иногда бываютъ нѣсколько длиннѣе. Приводится еще другой признакъ—длина коробочки, которая у *J. acutiflorus* должна быть много длиннѣе околоцвѣтника, а у *J. atratus* равна ему или выставляется только несомно. Этотъ признакъ, кажется, стойкій, но экземпляръ Максимовича такъ еще юнъ, что нельзя судить, какая будетъ у него зрѣлая коробочка. Остается еще признакъ, это—продольная бороздчатость листьевъ и отчасти стебля у *J. atratus*, и отсутствіе продольной бороздчатости у *J. acutiflorus*. Насколько я могъ прослѣдить этотъ признакъ, онъ очень стоекъ; бороздчатость видна даже на довольно короткихъ прицвѣтныхъ листьяхъ. Очень ясны продольныя бороздки у прицвѣтнаго листа и на экземплярѣ Максимовича. За *J. atratus* говорятъ еще прямыя внутренніе листочки околоцвѣтника, тогда какъ у *J. acutiflorus* листочки околоцвѣтника б. ч. бываютъ отогнуты. Все вышеприведенное убѣждаетъ, что экземпляръ Максимовича есть *J. atratus* Krock., а потому я привожу тутъ и рисунокъ этого вида.



Juncus atratus.

***Juncus alpinus* Vill.** (I, стр. 226).

У насъ встрѣчается только:

α. fusco-ater Rchb. Хор. IV, стр. 17.

Къ этой формѣ вполне подходитъ, приведенное на стр. 226, описаніе. Ст. Битца, Курск. ж. д., Пдл. у., въ осоковомъ болотѣ (X.).

Другая форма (*macroniflorus* Aschers. et Gr.) встрѣчается на высокихъ горахъ.

***Juncus lampocarpus* Ehrh.** (I, стр. 226)¹⁾.

У насъ пока можно различить слѣдующія формы:

α. typicus Aschers. et Gr. Стебли 20—60 см.; соцветіе б. ч. раскидистое; листочки околоцвѣтника красновато-бурые или каштановые; коробочка бурая или черно-бурая. Очень часто.

subf. viridiflorus Aschers. et Gr. Листочки околоцвѣтника зеленые или блѣдно-зеленые съ нерепончатымъ краемъ. Останкино, Звягино на р. Клязьмѣ (С.).—Воробьевы горы (П.).

¹⁾ Интересно отмѣтить уродливость, найденную А. Ассье близъ д. Румянцево, у которой все цвѣтны въ соцветіи обратились въ укороченные листовые побѣги, сжатые густымъ пучкомъ.

- β. *alpicola* Aschers. et Gr. Стебли 0,5—20 см., твердые, торчащие, б. ч. густымъ пучкомъ; листья толстые, иногда превышаютъ стебель; соцветіе многоцвѣтковое. По береговому песку р. Оки близъ Каширы, Срп. у. (П. и Х.).
- γ. *nigritellus* Macreight. Стебли 4—25 см., жесткіе, торчащие; корневые листья короче стебля; соцветіе изъ 1—5 головокъ на торчащихъ вверхъ цвѣтоносахъ; цвѣтки почти черные; внутренніе листочки околоцвѣтника едва длиннѣ наружныхъ; коробочка линейно-продолговатая, черная, заостренная, длиннѣ околоцвѣтника. На торфянистой сырой почвѣ по берегу р. Лихоборки между Лихоборами и Владыкинымъ (С.).

***Juncus alpinus* Vill. α. *fusco-ater* Rehb × *lampocarpus* Ehrh.**

Общій обликъ и форма соцветія *J. alpinus fusco-ater*, строеніе же цвѣтка—*J. lampocarpus*. Такое растеніе найдено А. Н. Петушниковымъ въ Соколыкахъ въ Путяевомъ оврагѣ и определено Fr. Buchenau, какъ вышеприведенная помѣсь.

***Luzula nemorosa* E. Mey.** (I, стр. 228).—Сыр. Отч. III, стр. 12.

У насъ встрѣчается только:

- α. *leucanthema* (Wallr.) Aschers. et Gr. Отличается отъ остальныхъ формъ цвѣтками 2,5—3,5 мм. дл., б. или м. сжатымъ соцветіемъ и окраской цвѣтка, которая у нашей формы бѣлая или грязно-бѣлая, только во время плодоношенія слегка красноватая. Раменское въ паркѣ, Брн. у. (П. и С.).—Нескучный садъ (Герб. Студ. Кружк. для изсл. Русск. Фл.).—Кунцово—паркъ (П. и Ассы).

***Luzula campestris* Lam. et DC.** (I, стр. 229).

Для облегченія распознаванія встрѣчающихся у насъ формъ я при-
вожу слѣдующій ключъ:

1. Внутренніе листочки околоцвѣтника короче наружныхъ; цвѣтки до 2 мм. дл. (рѣже 2,5). *pallescens* Wahlb.
Всѣ листочки околоцвѣтника равные, рѣдко внутренніе длиннѣ наружныхъ; цвѣтки б. ч. 3 мм. дл. (рѣдко 2,5). 2.
2. Пыльники едва длиннѣ тычиночныхъ нитей, равны имъ или даже короче ихъ; рыльце равно завязи или короче ея.

multiflora Cel.

Пыльники отъ 2 до 6 разъ длиннѣ тычиночныхъ нитей (пыль-
ники видны и при плодахъ); рыльце длиннѣ завязи.

vulgaris Gaud.

***Luzula campestris* Lam. et DC. α. *vulgaris* Gaud.**

Пушкино, лугъ по р. Серебрянкѣ (С.).

***Luzula campestris* Lam. et DC. β. *multiflora* Cel.**

Luzula multiflora Lej.—Sch. III, № 691.

Luzula campéstris Lam. et DC. γ . palléscens Wahlb.

Luzula sudetica DC. γ . *palléscens* Wahlb. Хор. III, стр. 92.

Дарьино, Зви. у. (X.).

Verátrum álbum L. α . Lobeliánum Koch (I, стр. 231).

Близъ Жилшна на болотистомъ лугу, Бри. у. (II. и Ассь).

Gágea lútea Schult., правильнѣе: G. silvatica (Pers.) Loud.

(I, стр. 233).

Gágea erubéscens (Bess.) Schult. (I, стр. 233). — Sch. III, № 740a.

В. В. Алексинъ, въ «Труд. Бот. Сада Имп. Юрьев. Ун.» 1910, стр. 209, при описаніи пыльниковъ у этого вида говоритъ, что они продолговатые, а въ сноскѣ замѣчаетъ, что «во Фл. Моск. губ. пыльники неправильно названы округлыми, что, однако, вѣрно для гербарн. экз., но не для свѣжихъ». На свѣжихъ экземплярахъ мнѣ не приходилось наблюдать пыльники, но на сухихъ — пыльники округлые только на раскрытыхъ цвѣткахъ, когда же вскрыешь бутонъ, то пыльники въ немъ, еще не раскрывшіеся, продолговатые.

Gágea minima Schult., правильнѣе: G. minima (L.) Ker-Gawler. (I, стр. 234).

Оврагъ близъ Боровскаго кургана, Бри. у. (С.). — Близъ Новаго Иерусалима, Зви. у. (X.).

Allium Schoenoprásium L. (I, стр. 235).

У насъ пока только:

α . **riparium Cel.** Листочки околоцвѣтника продолговато-ланцетные или даже яйцевидно-ланцетные, острые или заостренные.

По долину р. Яхромы къ югу отъ дер. Давыдова, Дмт. у. (сообщено И. Петровымъ, но въ герб. у него нѣтъ).

Allium angulósum L. (I, стр. 236).

У насъ пока можно различить слѣдующія формы:

α . **typicum Regel.** Листья узко-линейные о 5 жилкахъ, остро-килеватые. Губино, Бри. у. (II.).

β . **latifolium Regel.** Листья линейные, 3—6 мм. ш. съ 7 и болѣе жилками, не столь остро-килеватые, значительно шире стрѣлки. Эта форма встрѣчается чаще, но у насъ мнѣ не приходилось наблюдать листья шире 3,5 мм., хотя жилковъ бывало до 9.

Allium rotúndum L. (I, стр. 237).

У насъ пока только форма:

α . **typicum Regel.** Луковицы яйцевидныя съ многочисленными маленькими пурпурово-бурыми луковичками на длинныхъ ножкахъ; влагалища листьевъ гладкія, не шероховатыя. Д. Быково. Пдл. у. (И. Петровъ).

Allium oleráceum L. (I, стр. 238).—Ф. Б. Пр., стр. 73.

Ольшаниникъ у рѣчки въ Стреевѣ, Мож. у. (Ф. Б.).—Ромашково (II. Петровъ).

Fritillária ruthénica Wickstr. (I, стр. 239).—Sch. I, № 83.

Tùlipa Biebersteiniana R. et Sch., правильнѣе: **T. Biebersteiniana Schult. fil.** (I, стр. 240).

Scilla cernua Red., правильнѣе: **S. sibirica Andrews** (I, стр. 240).

Majánthemum bifólium DC., правильнѣе: **M. bifolium (L.) F. W. Schmidt.** (I, стр. 242).—Sch. I, № 82.

Polygónatum officinále All. (I, стр. 243).

Кромѣ обычной формы у насъ еще:

α. ambiguum Link (sp.). Цвѣтки по 3 (рѣдко по 5). Петровское, на р. Москвѣ (II.).

Polygónatum multiflórum All. (I, стр. 244).—Хор. II, стр. 19.

Красный Станъ, Руз. у. (Сюз.).

Кромѣ обычной формы у насъ еще:

α. intermedium Baker. Цвѣтки по 2—3; околоцвѣтникъ широкій до 6 мм. въ поперечникѣ. Къ этой формѣ относятся мѣста: Ромашково; Григорово, Вер. у. (II.).—Дарьино, Звн. у.; Чирково, Пдл. у. (X.). и новое: Кунцово—Проклятое мѣсто (Асѣ).

Convallária majális L. (I, стр. 244).

Кромѣ обычной формы у насъ еще:

α. rosea Rchb. Цвѣтки снаружи блѣдно-розовые съ тонкими болѣе темными полосками посрединѣ зубчиковъ. Въ лѣсу поселка Александровское близъ Хлѣбникова, Савел. ж. д. (сообщ. Гей.).

Iris Pseudácorus L. (I, стр. 246).—Ф. Б. Пр., стр. 73.

Iris sibirica L. (I, стр. 247).—Sch. II, № 236.

Gladiolus imbricátus L. (I, стр. 247).

По сырмъ лугамъ близъ Николо-Пѣшиношскаго монастыря, Дмт. у. (сообщ. II. Петровымъ).

Cypripédium calcéolus L. (I, стр. 251).—Хор. IV, стр. 17.

На известковомъ склонѣ у опушки лѣса близъ дер. Данилова, Пдл. у. (X.).—Близъ Соколова на ст. Сходя, Ннк. ж. д. (Гей.).

Cypripédium guttátum Sw. (I, стр. 251).—Хор. I, стр. 17.—Рачинск. Вѣстн. Ест. Наукъ II, стр. 300.

На крутомъ известковомъ склонѣ берега р. Пахры близъ дер. Булатово, Пдл. у. (X.).—С. Н. Рачинскій въ ст. Орхидеи (Вѣстн. Ест. Наукъ

II 1855, стр. 300), указывая, что Н. О. Шиховский нашел этот вид на Воробьевых горах, гдѣ много раньше было указано Марциусомъ съ ссылкой на Фортунатова.

Ophrys L. (I, къ стр. 252).

Три наружныхъ листочка околоцвѣтника расходящіеся, приблизительно равной величины; два внутренніе меньше наружныхъ; губа вынѣ отогнута съ отогнутыми краями, цѣльная или 3-лопастная, безъ шиоры; столбецъ короткий; каждая пыльцевая масса на длинной ножкѣ съ железкой, заключенной въ кармашекъ.

Ophrys muscifera Huds. Пет. Ophr., стр. 189.

Клубень не большой, шаровидный или продолговатый; стебель до 30 см., торчащій, съ 2—5 листьями въ нижней его половинѣ; послѣдніе синеовато-зеленые, слегка лоснящіеся, продолговато-ланцетные или линейно-ланцетные, тупые или заостренные; колосъ удлиненный изъ 2—10 разставленныхъ цвѣтковъ; прицвѣтники длиннѣ завязи, нижніе длиннѣ цвѣтковъ; завязь не скрученная, 3-гранная; наружные листочки околоцвѣтника зеленые съ 3 жилками; два внутренніе красноватые или буро-пурпуровые, отъ завернутыхъ краевъ почти нитевидные; губа бархатистая, вдвое длиннѣ листочковъ околоцвѣтника, 3-лопастная; средняя лопасть глубоко двураздѣльная; цвѣтъ губы темно-пурпурово-бурый съ синеовато-сѣрымъ пятномъ у основанія.



Ophrys muscifera.

Найденные экземпляры относятся къ:

α. *genuinum* M. Schulze. Ширина губы равна половинѣ или двумъ третямъ ея длины, приблизительно 8—11 мм. дл.¹⁾ На трясинѣ тонкаго торфяного болота близъ д. Татищева, Дмт. у. (Н. Петровъ).

¹⁾ В. Я. Цингеръ приводитъ наблюденіе Г. М. Дѣвочкина, что костромскія растенія, растущія на болотахъ, отличаются отъ петербургскихъ растеній, произрастающихъ на известнякахъ, окраской пятна на губѣ: у первыхъ оно блѣдно-коричневое, а у вторыхъ оно синеоватое. По засушеннымъ экземплярамъ я не могъ судить, какое пятно у нашихъ растеній, но по сообщенію Н. П. Петрова оно голубое. Aschers. et Gr. и Max Schulze указываютъ на большое разнообразіе въ окраскѣ какъ губы, такъ и всего цвѣтка. Большой интересъ заслуживаетъ мѣстонахожденіе этого *Ophrys*. На Западѣ оно растетъ преимущественно на сухихъ известнякахъ и какъ исключеніе на болотахъ; у насъ же въ Моск. губ., Костр. и Влад. оно было найдено исключительно на моховыхъ болотахъ и только въ Петербургск. губ. на известнякахъ. См. еще статьи: А. И. Петуникова. Труд. Бот. Сада Им. Юрьев. Ун. 1912, стр. 189 и Д. И. Литвинова *Betula humilis* Schrank. Отт. изъ Труд. Бот. Муз. Им. Ак. Наукъ, вып. XI, 1913, стр. 18.

Órchis L. (I, стр. 252).

Привожу новый ключъ для *Órchis* изъ-за новыхъ видовъ; единственный признакъ, на который можно опираться, это форма листьевъ; труднѣе она улавливается у *O. incarnata*, у котораго листья въ сухомъ видѣ, вслѣдствіе пересыханія у влагалища, кажутся иной формы, чѣмъ они есть въ живомъ; лучше всего въ сомнительныхъ случаяхъ форму ихъ изучать на верхнихъ вполне развитыхъ листьяхъ.

1. Прицвѣтники обѣ 1 жилкѣ; клубни шаровидные или яйцевидные не раздѣльные. 2.

Прицвѣтники о 3 жилкахъ; клубни 2—4-раздѣльные. 5.

2. Средняя лопасть губы не раздѣльная; листочки околоцвѣтника собраны въ острый шлемъ, буро-пурпуровые съ зелеными жилками. *O. coriophora* L.

Средняя лопасть губы двураздѣльная; листочки околоцвѣтника собраны въ туповатый шлемъ или они острые, и тогда нѣсколько расходящіяся. 3.

3. Прицвѣтники во много разъ короче завязи; цвѣтки крупныя. *O. militaris* L.

Прицвѣтники почти равны завязи; цвѣтки мелкіе. 4.

4. Шпора очень короткая, короче половины завязи; шлемъ короткій, тупой. *O. ustulata* L.

Шпора цилиндрическая, длиннѣе половины завязи; шлемъ острый или заостренный. *O. tridentata* Scop.

5. Листья отъ основанія постепенно сужены къ верхушкѣ, наибольшая ширина ихъ у основанія (особенно это ясно видно у верхнихъ развитыхъ листьевъ). 6.

Листья съ наибольшей шириной нѣсколько выше основанія, близъ середины или выше середины. 7.

6. Листья широко-ланцетные; губа нѣсколько длиннѣе ширины или равна ей. *O. incarnata* L.

Листья узко-ланцетные, часто очень длинные; длина губы менѣе ширины, рѣже равна ей.

O. incarnata × *Traunsteineri* Saut. ssp. *Russowii* Aschers. et Gr.

7. Листья, особенно нижніе, продолговато-ланцетные, овальные или почти яйцевидные, б. ч. съ пятнами. 8.

Всѣ листья узко-ланцетные или линейные. 9.

8. Нижніе листья не шире 2 см. (длина ихъ до 7 см.); верхніе листья часто достигаютъ основанія колоса, всѣ безъ пятенъ, чаще только близъ верхушки листа съ мелкими пятнышками; верхушка листа часто стянута колначкомъ какъ у *O. incarnata*.

O. incarnata × *maculata*.

Нижніе листья шире 2 см., б. ч. съ округлой верхушкой; верхніе никогда не достигаютъ своей верхушкой колоса, всѣ б. ч. пятнистые. *O. maculata* L.

9. Листья плоскіе, прижаты къ стеблю или нѣсколько отклоненныя отъ него. 10.

Всѣ листья или только нижніе вдоль сложенные, линейные или линейно-ланцетные, отклоненные отъ стебля дугообразно.

O. Traunsteineri Saut. ssp. *Roussowii* (Klinge) Aschers. et Gr.

10. Прицвѣтники не превышаютъ цвѣтковь, часто они равны только половинѣ завязи.

O. Traunsteineri Saut. ssp. *Nylanderi* (Klinge) Aschers. et Gr.

Прицвѣтники очень большіе, нижніе значительно длиннѣе цвѣтковь, часто до 3 см. дл.

O. incarnata × *Traunsteineri* Saut. ssp. *Roussowii* Aschers. et Gr.

Órchis militáris L. (I, стр. 253).—Ф. Б. Пр., стр. 73.—Сыр. Отч. III, стр. 12.

Заливные дуга въ Ольгинѣ, Хорошилово, Мож. у. (Ф. Б.).—Заливные дуга р. Москвы близъ (Старого села (Вар.).—Между Успенскимъ и Борками, Зви. у.; между Вѣлюссонской слободой и Старой Кашпирой, Срп. у. (X.).—Известняки по берегу р. Москвы близъ устья р. Пахры, Брн. у. (С.).—Д. Новая близъ с. Рождествено на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

У насъ встрѣчаются формы только съ лопастями срединной доли губы, яйцевидными или продолговатыми:

α. *typica* GB. Лопастн средней доли губы довольно узкія, закругленные, цѣльнокрайнія, съ 2—3 жилками.

β. *interdens* GB. Лопастн средней доли губы широкія, часто какъ бы обрубленные, нѣсколько зубчатые, съ нѣсколькими жилками¹⁾.

Órchis ustuláta L. (I, къ стр. 254).—Пет.—стр. 232.—Кауф. II, стр. 485.—Lind. p. 166.

Клубни шаровидные; стебель 20—30 см., тонкій, у основанія съ заостренными влагалищами; нижніе листья сближенные, продолговато-ланцетные, слегка сине-зеленые, заостренные или туповатые, съ влагалищами; верхніе листья много мельче, влагалищно охватываютъ стебель; колосъ очень густой, многоцвѣтковый, сперва почти шаровидный, потомъ цилиндрическій и только у основанія рѣдкоцвѣтковый; прицвѣтники яйцевидно-ланцетные, рѣже линейно-ланцетные, б. ч. окрашенные; цвѣтки очень мелкіе, душистые; листочки околоцвѣтника черно-пурпуровые, собраны въ короткій почти шарообразный шлемъ; губа бѣлая или розовая съ крапинками, 3-лопастная; лопасти спереди б. ч. усѣченные, зазубрен-

¹⁾ Приведенные тутъ признаки далеко непостоянны, хотя на единичныхъ экземплярахъ иногда можно ихъ наблюдать; чаще признаки сливаются; такъ я видѣлъ экземпляры, у которыхъ лопасти были широкія, но жилкокъ было только 3; узкія лопасти имѣли зубчатость, а широкія—цѣльнокрайнія, и, наконецъ, довольно узкія лопасти были съ 4 жилками; приходилось даже наблюдать разныя лопасти въ одномъ и томъ же соцвѣткѣ.



Orchis ustulata.

ная; средняя двудлопастная, съ лопастями усѣченными или тупыми, зазубренными; шпора булавовидная, тупая, короткая, въ 4 раза короче завязи. Цвѣтеть въ июнѣ. Упоминается Линдеманомъ и, по сообщенію Ф. С. Ненюкова, найдено Поляковымъ на лугу у рѣки Баньки близъ ст. Павшино, Видавск. ж. д.

Orchis incarnata L.¹⁾ (I, стр. 255).

У насъ пока можно различить:

ssp. lanceata Rchb. Стебель до 50 см.; соцвѣтіе многоцвѣтковое; длина губы равна ея ширинѣ или немного длиннѣе ширины.

Можно различить слѣдующія формы:
α. typica Aschers. et Gr. Шпора длиннѣе половины завязи, б. ч. равна $\frac{3}{4}$ ея; нижніе прицвѣтники длиннѣе цвѣтковъ, остальные равны имъ или всѣ нѣсколько длиннѣе. Самая распространенная у насъ форма.

Какъ subforma Aschers. et Gr. приводить:

1. **macrophylla (Schur) Aschers. et Gr.**

Orchis incarnata L. γ. strictifolia Opiz. Сыр. Плл. Фл. I, стр. 256.

Всѣ прицвѣтники въ 2 раза длиннѣе цвѣтковъ.

2. **stenophylla Aschers. et Gr.** Нижніе прицвѣтники равны цвѣткамъ или нѣсколько короче ихъ, какъ и всѣ остальные: Мытищи; болото у Воровскаго кургана, Бри. у. (С.).

3. **haematodes M. Schulze.** Какъ typica, но листья съ пятнами, иногда только въ верхней ихъ трети. Опушка болотистаго лѣса близъ ст. Ока, Сри. у. (С.).—Валки, Бри. у. (X.).

4. **albiflora Lec. et Lamott.** Какъ typica, но цвѣтки бѣлые. Близъ Пушкина (С.).

β. **brevicalcarata (Rchb. fil.) Aschers. et Gr.** Шпора короткая, не длиннѣе половины завязи, чаще короче половины; растеніе б. ч. крупное. Останкино (С.).—Дарьино, Зви. у. (X.).—Остальные мѣстопоимокенія, приведенныя у меня для этой формы, относятся къ α. typica.

Что касается другихъ формъ, приведенныхъ въ Synopsis и устано-

¹⁾ При обработкѣ видовъ Orchis, я пользовался трудомъ Max Schulze, Die Orchidaceen Deutschlands, томъ же Synopsis Aschers. et Gr., содержащій Orchidaceae, тогда еще не появился; пользоваться же Klinge, который выдвигаетъ форму губы, какъ главный отличительный признакъ, далеко ненастоянную, я не нашелъ возможнымъ. Въ настоящее время, когда томъ Synopsis, содержащій Orchidaceae, законченъ, я, насколько это возможно, слѣдую ему, вслѣдствіе чего привожу тутъ формы O. incarnata нѣсколько иначе понимаемая, чѣмъ въ описаніи M. Schulze.

вленихъ на формѣ губы, то, по моимъ наблюденіямъ, губа бываетъ тѣмъ измѣнчива, что иногда нижнюю часть колоса можно отнести къ одной формѣ, а верхнюю къ другой; формы же, приведенныя Aschers. et Gr., слѣдующія: rhombilabia M. Schulze, — губа ромбическая, часто цѣльная или едва 3-лопастная; retusa Rehb. — губа изъ клиновиднаго основанія 3-лопастная, на концѣ слегка усѣченная; trifurca Rehb. — губа 3-лопастная съ боковыми лопастями четырехъугольными, по краямъ зубчатыми; средняя лопасть вытянутая, языковидная, острая; выемки между лопастями большія.

Órchis incarnata L × Traunsteineri Saut. ssp. Roussowii (Klinge) Aschers. et Gr.

Стебель б. или м. полый, до 45 см.; листья (4—5) узко-ланцетные, 1—2 см. ш., постепенно суживаются къ верхушкѣ, заостренныя, съ наибольшею шириною обыкновенно у основанія или близъ него; нижній листъ иногда тупой, верхній б. ч. своей верхушкой достигаетъ половины колоса; послѣдній густой; прицвѣтники большіе, нижніе иногда до 3 см. дл., всегда длиннѣе цвѣтковъ; листочки околоцвѣтника туповатые; ширина губы нѣсколько превышаетъ ея длину или равна ей, неясно 3-лопастная или цѣльная. Описаніе относится къ средней формѣ, такъ какъ помѣсь можетъ по своимъ признакамъ приближаться то къ тому, то къ другому виду. По берегу Анофріева озера, Ряз. у., гдѣ растутъ оба вида (П.).

Órchis Traunsteineri Saut.

Aschers. et Gr., въ Synopsis дѣлятъ *Orchis Traunsteineri* Saut. на три subsp: eu-Traunsteineri Aschers. et Gr., subsp. Nylanderi (Klinge) Aschers. et Gr. и subsp. Russowii (Klinge) Aschers. et Gr.; послѣдній subsp. въ I ч. Пл. Фл. приведенъ какъ видъ, но, пожалуй, правильнѣе считать его за subsp.; привожу описаніе встрѣчающагося у насъ ssp. Nylanderi.

subsp. Nylanderi (Klinge) Aschers. et Gr. Клубни б. ч. 3-рѣже 4-лопастные; стебель 20—40 см., б. или м. толстый, полый или плотный; листья пятнистые, широкіе (10—15 мм. ш.), б. ч. плоскіе, синевато-зеленые, наибольшая ширина ихъ нѣсколько выше основанія, иногда близъ середины; колосъ многоцвѣтковый, густой, часто цилиндрическій; прицвѣтники б. ч. короче цвѣтковъ; послѣдніе крупныя; губа очень разнообразной формы; шпора цилиндрическая или булавовидная.

У насъ пока только форма:

α. genuina (Klinge) Aschers. et Gr. Листья безъ пятен¹⁾. Опушка лѣса на Красниковокомъ болотѣ за Б. Мытищами (С.).—По берегу озера близъ Вертлинскаго, Клин. у. (П.).

subsp. Russowii (Klinge) Aschers. et Gr.

¹⁾ По словамъ Klinge, эта форма распространена начиная съ Финляндіи по средней Россіи и въ Азіи до Тянь-Шаня и Алтай.

Orchis maculata L. (I, стр. 256).

Aschers. et Gr. въ Synopsis приводятъ очень много формъ, при чемъ наша обычная должна именоваться:

α. **genuina** Rehb. Стебель 15—50 см., б. или м. твердый, плотный; листьевъ много; колосъ почти цилиндрическій, б. или м. густой; прицвѣтники б. ч. короче цвѣтковь; лопасти губы не превышаютъ трети ея.

Эта форма у Aschers. et Gr. распадается на цѣлый рядъ мелкихъ формъ, очерченныхъ на первый взглядъ очень хорошо, но при желаніи подвести подъ какую-либо форму, собранныя у насъ растенія, мнѣ не удалось изъ-за смѣшенія признаковъ, присылаемыхъ Aschers. et Gr. разнымъ формамъ. Привожу тутъ тѣ формы, къ которымъ отчасти подходили наши растенія.

1. **obtusifolia** Schur. Нижніе листья очень широкіе, до обратно-яйцевидной формы съ округлой верхушкой.

2. **typica** Aschers. et Gr. Нижніе листья продолговатые или продолговато-ланцетные съ тупой верхушкой; прицвѣтники короче цвѣтковь или равны имъ.

3. **comosa** Schur. Листья какъ у typica, но прицвѣтники длиннѣе цвѣтковь, нижніе иногда много длиннѣе ¹⁾.

Приведенная у меня форма albiflora разбивается Aschers. et Gr. на двѣ:

4. **Biermanni** (Ortm.) Aschers. et Gr. Цвѣтки бѣлые; губа съ розовыми или пурпуровыми пятнами и полосками.

5. **candidissima** M. Schulze. Цвѣтки совершенно бѣлые безъ росшен.

А. А. Хорошковъ нашелъ близъ Дарына, Зви. у., экземпляръ *O. maculata* L., который очень близокъ къ формѣ *macrostachys* Aschers. et Gr., приводимой этими авторами только для юга: Босніи, Герцеговины, Далмаціи, и только разъ будто бы найденной въ Богеміи, но въ послѣднемъ мѣстѣ форма была не типична. Привожу описаніе ея:

β. **macrostachys** Aschers. et Gr. Растеніе низкое или крупное (у насъ крупное), отъ 30 до 70 см.; стебель часто полый; листьевъ 5—9 (у насъ 5—6); форма нижнихъ широко-обратно-яйцевидная или яйцевидно-ланцетная, безъ пятенъ; соцвѣтіе около 10 см. дл. или длиннѣе (до 30 см.), сперва густое, потомъ рѣдкое; прицвѣтники длиннѣе цвѣтковь (у насъ нижніе длиннѣе, верхніе равны), линейно-ланцетные, сперва вверхъ торчащіе, потомъ внизъ отогнутые; цвѣтки крупныя; окраска какъ у типъ; губа широкая, шире своей длины, почти до половины трехлопастная; лопасти почти одинаковой ширины, края ихъ неравно-зубчатые

¹⁾ Всѣ формы листьевъ можно встрѣтить у экземпляровъ, растущихъ рядомъ; то же касается comosa Schur., то какъ длинныя, такъ и короткіе прицвѣтники встрѣчаются у особей съ листьями всевозможной формы, мною же были наблюдаемы особи съ 2—3 нижними прицвѣтниками значительно длиннѣе цвѣтковь, остальные же прицвѣтники были короче цвѣтковь.

(у насъ средняя лопасть нѣсколько уже); шпора толстая, цилиндрическая, почти мышкомъ вздутая ¹⁾).

γ. *Meyeri* Rchb. fil.

Orchis incarnata × *maculata*.

Клубни 2—3-раздѣльные, сплюснутые, б. или м. удлинённые; стбель 25—40 см., б. ч. плотный, у основаніи съ 2—3 закругленными влагалищами; нижніе листья около 7 см. дл. и около 2 см. ш., съ наибольшей шириной близъ середины или нѣсколько выше середины, тупые или слегка заостренные, остальные ланцетные, острые, всё безъ пятенъ или съ слабыми пятнами, чаще близъ верхушки листьевъ; влагалища листьевъ б. или м. длинныя; соцветіе густое, сперва почти булавовидное, потомъ цилиндрическое; цвѣтки по окраскѣ то ближе къ одному, то къ другому виду; губа нѣсколько шире длины, округло-ромбическая, трехлопастная, съ росписью и съ лопастями б. или м. равными, по краямъ зубчатыми; шпора цилиндрическая, б. или м. равна завязи. Признаки измѣняются то въ пользу одного, то другого вида. Близъ Измакова, Зви. у., вмѣстѣ съ обоими видами (С.).—Воробьевы горы, опредѣлять Klinge (П.).

Gymnadènia conopèa R. Br. (I, стр. 257).

У насъ пока можно различить слѣдующія формы:

α. *typica* G B. Нижняя губа съ широкимъ клиновиднымъ основаніемъ; цвѣтки лилово-розовые; листья линейно-ланцетные, 3—15 мм. ш. Очень часто.

β. *angustifolia* (Ilse) Aschers. et Gr. Листья линейные, очень узкіе, не шире 2—5 мм., б. ч. уже; колосъ рѣдкоцвѣтковый; цвѣтки какъ у α., но мельче; общій обликъ сильно напоминаетъ *G. odoratissima* Rich. Найдено пока только разъ на торфяномъ лугу въ тѣни близъ Горенокъ (П.).

γ. *ornithis* Spr. Цвѣтки бѣлые, въ остальномъ какъ α.

Въ гербаріи А. А. Хорошкова между типичными растеніями находится одинъ экземпляръ, изъ-подъ Денисьева, Зви. у., у котораго нѣкоторая часть цвѣтковъ въ соцветіи съ боковыми лопастями губы, по краямъ зубчатыми; такая форма приближается къ *f. crenulata* G B., отличіе которой отъ типа состоитъ въ зубчатости боковыхъ лопастей губы у всѣхъ цвѣтковъ въ соцветіи.

Plathanthèra solstitiális Boennig., правильнѣе: *P. bifolia* (L.) Rchb. (I, стр. 259).

Всѣ наши растенія относятся къ:

ssp. *genuina* Aschers. et Gr. Боковые внутренніе листочки околоцвѣтника и срединный наружный собраны въ шлемъ.

¹⁾ Въ гербаріи А. А. Хорошкова нѣкоторые экземпляры очень характерны своей шпорою; но есть экземпляръ, у котораго въ одномъ и томъ же соцветіи встрѣчаются всѣ переходы отъ вздутой шпору до нормальной.

У насъ можно различить слѣдующія формы:

- α. *laxiflora* (Drej.) Aschers. et Gr. Соцвѣтіе рѣдкоцвѣтковое; шпора длинная, б. ч. на концѣ заостренная; боковые внутренніе листочки околоцвѣтника пригнуты къ срединному наружному только верхушкой. Обычная форма.
- β. *densiflora* (Drej.) Aschers. et Gr. Растеніе крупное съ очень длиннымъ и густымъ соцвѣтіемъ (до 23 см. дл.); шпора иногда на концѣ слегка утолщена; боковые внутренніе листочки околоцвѣтника пригнуты съ основанія къ срединному наружному. Матренки, Дмт. у. (П.).—Близъ д. Лужки на р. Пахрѣ, Пдл. у. (Х.).
- γ. *pervia* (Rchb.) Aschers. et Gr. Шпора къ концу булавовидно утолщенная; растеніе очень крупное съ густымъ соцвѣтіемъ и крупными цвѣтками. Быково, Пдл. у. (Н. Петровъ).
- δ. *aceras* Goldb.

***Platanthéra chlorántha* Rchb.** (I, стр. 259).

Мѣстонахожденія: Купцово и Матренки, Дмт. у. (П.) относятся къ *P. bifolia*.

***Coeloglossum viride* Hartm.** (I, стр. 260).

Красный Стань, Руз. у. (Сюз.).—Оврагъ близъ Боровскаго кургана, Бри. у. (С.).—Опушка лѣса близъ Черкизова на р. Клязьмѣ (Н. Слущкій).

α. *bracteatum* Richter, а не Rchb. fil.

***Herminium Monórchis* R. Br.** (I, стр. 264).

Луга р. Яхромы, Дмт. у. (Н. Петровъ).—Близъ с. Дубровка, Дмт. у. (Н. Слущкій).

***Epipactis latifolia* All.** (I, стр. 264).

Слѣдую Synopsis Aschers. et Gr., объ приведенныя для Моск. губ. разновидности должны носить другія названія: *viridans* Crantz должно именоваться *platyphylla* Irm., а *varians* Crantz—*viridiflora* Irm. Названіе же *Ep. latifolia* All. *varians* Fleischm. et Reching. (*Ep. varians* Crantz) присуще совсѣмъ другой формѣ или даже, пожалуй, виду, какъ это разъяснилъ Max Schulze въ *Die Orchidaceen Deutschlands*, именуя его *Ep. sessilifolia* Peterm. и иллюстрируя его прекраснымъ рисункомъ.

Для распознаванія этихъ двухъ, трудно различимыхъ формъ, привожу ихъ болѣе подробное описаніе:

α. *platyphylla* Irm.

Epipactis latifolia All. β. *viridans* Crantz. Сыр. Илл. Фл. I, стр. 264.—

Пет. Кр. III, стр. 55.—

Кауф. II, стр. 491.—Кауф.

I, стр. 476.

Передняя доля губы съ 2 явственными возвышеніями; стебель 25—75 см.; листья яйцевидные, широкіе, б. ч. заостренные, слегка лоснящіеся; срединные нѣсколько длиннѣе междуузлій; средніе

прицвѣтные листья б. ч. короче цвѣтковь, рѣже едва длиннѣе ихъ; соцвѣтіе б. ч. густое.

У насъ можно различить слѣдующія подформы:

1. *typica* Aschers et Gr. Въ соцвѣтѣи каждый прицвѣтный листъ несетъ цвѣтокъ. Сюда все мѣстопахожденія, относящіяся къ *β. viridans* Crantz, и еще близъ ст. Сходня, Моск.-Никол. ж. д.
2. *interrupta* Aschers. et Gr. Въ нижней части соцвѣтія прицвѣтные листья безъ цвѣтковь. В. Мытищи (И.).

β. viridiflora Irm.

Eriopactis latifolia All. *α. varians* Crantz. Сыр. Илл. Фл. I, стр. 264.—
Пет. Кр. III, стр. 55.—Бух.
II, № 395.—Бух. I, № 366.—
Кауф. II, стр. 491.—Кауф. I,
стр. 476.

Передняя доля губы безъ возвышеній или съ неясными возвышеніями; стебель тонкій, 18—30 см.; листья узкіе, складчатые, тусклые, съ частыми выдающимся продольными жилками на нижней сторонѣ, средіе—яйцевидно-ланцетные, въ 4—5 разъ длиннѣе междуузлій; соцвѣтіе рѣдкоцвѣтковое; средіе прицвѣтные листья б. ч. значительно длиннѣе цвѣтковь. Къ этой формѣ относятся все приведенныя у меня мѣстопахожденія для *α. varians* Crantz.

1. *interrupta* Aschers. et Gr. Въ нижней части соцвѣтія часть прицвѣтныхъ листьевъ безъ цвѣтковь. Невѣрово, Кзм. у. (И.).

Eriopactis palustris Cranz (I, стр. 256).

Наши растенія, къ которымъ вполнѣ соотвѣтствуетъ приведенное у меня описаніе и рисунокъ, относятся къ формѣ:

α. silvatica Aschers. et Gr.

Деревня Татищево, Дмт. у. (И. Петровъ).—Вялки, Бри. у. (Х.).—Косино—Черное озеро; по берегу р. Македоновки близъ ст. Удѣльная, М.-Каз. ж. д. (С.).—По берегу ручья близъ с. Дубровка, Дмт. у. (Н. Слуцкій).

Neottia nidus avis Rich. (I, стр. 266).

Старое село, Моск. у. (Куль.).—Лѣсистый берегъ р. Пахры между с. Зеленымъ и Жуковымъ, Бри. у. (С.).—Селевкино, Дмт. у. (Н. Слуцкій).

Listera ovata R. Br. (I, стр. 266).

По Synopsis Aschers. et Gr. можно различить у насъ слѣдующія двѣ формы: *stenoglossa* Peterm. и *multinerve* Peterm.; первая характеризуется яйцевидными листьями съ 11 продольными жилками (или около 11); у второй листья округлые или почти округлые съ 17—18 продольными жилками, при чемъ говорится, что вторая форма встрѣчается вмѣстѣ съ первой. Мнѣ приходилось наблюдать листья почти округлые съ 11 жилками и

листья яйцевидные съ 16—17 жилками, а равно количество жилокъ во всевозможныхъ листьяхъ отъ 11 до 17 и всѣ переходы.

Coralliorrhiza innáta R. Br. (I, стр. 269).

Пушкино, лѣсъ между Яр. ж. д. и Степанковымъ, Дмт. у. (С.).—Близъ Салтыковки, Нижегород. ж. д. (Куль).—Между ст. Нара, Брянск. ж. д. и ст. Кухинка, Брест. ж. д. (Н. Сырейщиковъ).—По дорогѣ отъ ст. Домодедово въ с. Константиновское, Пдл. у. (Х.).—Селевкино, Дмт. у. (Н. Слудскій).—Въ лѣсу поселка Александровское близъ ст. Хлѣбниково, Савел. ж. д. (Гей.).

Microstylis monophyllos Lindl. (I, стр. 270).

Вилки, Михнево, Бри. у.; опушка лѣса близъ Усова, Зви. у. (С.).—Морозово и ст. Влахернская, Савел. ж. д., на сухомъ песчаномъ склонѣ, Дмт. у. (Н. Слудскій).

Maláxis paludósa Sw. (I, стр. 271).

Косино (Сюз.).

— —

Sálìx frágilis L. (II, стр. 14).—Sch. IV, № 1187.

Sálìx myrtilloides L. (II, стр. 20).—Sch. IV, № 989a.—Сыр. Отч. III, стр. 12.

По берегу р. Македоновки близъ ст. Удѣльная, Моск.-Каз. ж. д., Бри. у. (II. и С.).

Sálìx livéscens Döll. (II, стр. 26).

Рождествено на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Солмогубъ).

Sálìx Gmelinii Pall. (II, стр. 33).

Salix viminalis L. Ф. Б. Пр., стр. 73.

По р. Протвѣ близъ Ольгино, Мож. у. (Ф. Б.).

Bétula pubéscens Ehrh. (II, стр. 48).

Долина р. Яхромы, Дмт. у., часто (сообщено Н. Петровымъ).—Селевкино, Дмт. у. (Н. Слудскій).

Álnus incana (L.) Willd. (II, стр. 50).—Sch. IV, № 1040a.

Úlmus pedunculáta Foug. (II, стр. 54).—Sch. III, № 839.

Thésium ebracteátum Hayne. (II, стр. 58).—Sch. I, № 184.

Между Серпуховымъ и Лужками (Ассъ).

Rúmex marítimus L. (II, стр. 63).

Rumex himosus Thuill. Сыр. Отч. III, стр. 12.

Новое Владыкино; дер. Разказовка, Зви. у. (Ассъ).—Берегъ р. Москвы близъ Заозерья, Бри. у. (С.).

Rumex limosus Thuill. (II, стр. 63).

Въ прошломъ году появилась небольшая, но очень обстоятельная статья Murbeck «Zur Kenntnis der Gattung Rumex» (Botaniska Notiser, 1913), въ которой этотъ авторъ, послѣ изученія обширнаго матеріала, включая и русскій, отрицаетъ возможность нахождения *R. palustris* Sm. (syn. *R. limosus* Thuill.) въ Россіи и вмѣсто послѣдняго вида описываетъ новый, называя его *R. rossicus* Murb. По его разъясненію, *R. rossicus* отличается отъ *R. palustris* пыльниками, которые въ два раза мельче у перваго, и болѣе тонкими плодоножками, при чемъ сѣмянки у *R. rossicus* мельче чѣмъ у *R. palustris*, и наибольшая ширина ихъ посреднихъ, тогда какъ сѣмянки послѣдняго 1,8—2,2 мм. дл. и наибольшая ширина ихъ ниже середины; наконецъ, внутреннія доли околоцвѣтника у *R. rossicus* заостренныя, а у *R. palustris* слегка языковидныя; послѣдній признакъ особенно явственно выраженъ на нашихъ экземплярахъ, которые я принималъ за *R. limosus* Thuill.—

1. *Rumex maritimus*. 2. *Rumex rossicus*.

R. rossicus Murb. отличается отъ *R. maritimus* слѣдующими признаками: у перваго всѣ или б. ч. плодоножки короче долей околоцвѣтника при зрѣлыхъ плодахъ; внутреннія доли околоцвѣтника яйцевидно-продолговатыя, едва въ два раза шире желвачковъ; между краемъ и желвачкомъ доли гладкія безъ сѣтчатыхъ жилокъ, съ каждой стороны съ двумя неравными зубцами, которые короче долей околоцвѣтника или равны имъ; желвачки крупныя продолговато-ланцетныя, заполняютъ большую часть доли околоцвѣтника.—У *R. maritimus* плодоножки б. ч. длиннѣе околоцвѣтника; внутреннія доли его широко-яйцевидно-треугольныя въ 3—5 разъ шире желвачковъ; между краемъ и желвачкомъ явственно съ сѣтчатыми жилками; по краю съ 2 (рѣдко съ 4) длинными тонкими пестиковидными зубцами, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одинъ длиннѣе долей; желвачки довольно узкіе, линейно-ланцетныя, заполняютъ меньшую часть доли. Слѣдовательно, всѣ тѣ особи, которые въ Пл. Фл. Моск. губ. именовались *R. limosus* Thuill., слѣдуетъ называть:

Rumex rossicus Murb.**Rumex obtusifolius L.** (II, стр. 64).

Всѣ видѣнные мною растенія этого вида относятся къ:

- α. *silvestris* Fries. Внутреннія доли околоцвѣтника продолговато-треугольныя, по краямъ и особенно у основанія съ небольшими зубчиками, нижніе зубцы крупнѣе остальныхъ; тогда какъ у дру-

той формы, еще не найденной въ Моск. губ. (*agrestis* Fries), краевые зубцы очень длинныя, нѣкоторые почти щетинковидныя.

Rumex Hydrolapathum Huds. (II, стр. 65).

Найденныя у насъ растенія, можно отнести къ формѣ:

- α. **bugensis Zapal.** Внутреннія доли околоцвѣтника широко-треугольно-яйцевидныя, длина ихъ почти равна ширинѣ, основаніе почти прямое, а края у б. ч. съ зубчиками.

Rumex crispus L. (II, стр. 65).

Распадается на слѣдующія формы:

- α. **trigranulatus Bosv.** Всѣ внутреннія доли околоцвѣтника во время плодоношенія съ желвачками, но иногда въ соцвѣтѣ встрѣчается небольшое число цвѣтковъ съ 1 или 2 желвачками. Если внутреннія доли околоцвѣтника во время плодоношенія совершенно ровныя по краямъ, то это: **integerrimus Schur**; очень рѣдко. Если же края мелко- и неровно-зубчатые, то это: **subcordatus Warren**; очень часто.

β. **unicallosus Peterm.**

γ. **nudivalvis Meisn.**

Rumex aquaticus L. (II, стр. 67).

Пока у насъ только:

- α. **heleolapathum Rouy.** Корневые и нижніе стеблевые листья острые или заостренные; внутреннія доли околоцвѣтника широко-овальныя или яйцевидныя. У другой формы, пока еще не найденной въ Моск. губ., корневые и нижніе стеблевые листья тупые=**hippolarapathum Rouy.**

Rumex confertus Willd. (II, стр. 68).

Татарское-Сатино, Пдл. у. (X.).—Луга р. Яхромы, Дмт. у. (сообщено И. Петровымъ, въ гербаріи его пѣть).

Кромѣ обычной формы у насъ еще:

- α. **denudatus Zapal.** Всѣ внутреннія доли околоцвѣтника во время плодоношенія безъ желвачковъ, б. ч. у одной или у двухъ изъ нихъ средняя жилка у основанія сильно утолщена ¹⁾. Д. Кудинова, Пдл. у., на прав. берегу р. Мѣчи (X.).

¹⁾ У найденнаго А. А. Хорошковымъ растенія, корневые и нижніе стеблевые листья нѣсколько сильнѣе заострены, чѣмъ это слѣдовало бы у *R. confertus*; такая форма листьевъ напоминаетъ *R. aquaticus*, но у послѣдняго вида листья еще болѣе заострены и снизу всегда голые. У меня было большое искушеніе признать это растеніе за *R. aquaticus* × *confertus*; но по сообщенію А. А. Хорошкова, найденный имъ *Rumex* росъ въ огромномъ количествѣ, что лишаетъ возможности признать его за помѣсь; скорѣе же слѣдуетъ его отнести къ вышеприведенной формѣ, прибавивъ къ описанію вида, что листья у ней бываютъ какъ съ тупой, такъ и съ заостренной верхушкой.

Rumex Acetosa α L. (II, стр. 69).

Наши растенія принадлежатъ къ:

ssp. pratensis Wallr. Растеніе голое; нижніе листья продолговато-эллиптические или продолговато-копьевидные, или стрѣловидные; стрѣловидныя лопасти заостренныя или съ 1—2 зубцами (но не разсѣченныя).

Распадается на слѣдующія формы:

- a. **ovalifolius (Wimm. et Grab.) Aschers. et Gr.** Нижніе листья яйцевидные съ копьевиднымъ основаніемъ.
- b. **oblongifolius (Wimm. et Grab.) Aschers. et Gr.** Нижніе листья продолговато-эллиптические съ стрѣловиднымъ основаніемъ. Обычная форма.
- c. **angustifolius (Beck) Aschers. et Gr.**
- d. **crispus (Roth) Aschers. et Gr.** Эта форма приведена во II части подъ α . **auriculatus Wallr.** ¹⁾ Описаніе вполнѣ соответствуетъ d. **crispus**. Химки, Кусково (П.).

Rumex Acetosella L. (II, стр. 70).

По Aschers. et Gr. у насъ можно различить слѣдующія формы:
 α . **vulgaris Koch.** Листья продолговатые, ланцетные или яйцевидно-ланцетные съ нераздѣльными лопастями.

Распадается на слѣдующія подформы:

- a. **latifolius (Wallr.) Aschers. et Gr.** Нижніе листья яйцевидные или продолговато-эллиптические; верхніе широко-ланцетные; довольно часто. Тѣневая форма — **umbrosa (Beck) Aschers. et Gr.** Растеніе высокое съ тонкими удлинненными рѣдкоцвѣтковыми вѣтвями; листья тонкіе съ длинными отстоящими стрѣловидными лопастями. Филиппо; Денисьево, Звп. у. (X.).
- b. **lanceolatus (Wallr.) Aschers. et Gr.** Нижніе листья ланцетные, верхніе узко-ланцетные. Не рѣдко.
- c. **integrifolius (Wallr.) Aschers. et Gr.** Листья б. ч. узко-продолговатые или ланцетные, рѣдко узко-ланцетные, къ основанію постепенно суженные безъ стрѣловидныхъ лопастей или нѣкоторые листья съ одной стороны съ лопастью, рѣже одинъ или два листа съ лопастями, все же остальные безъ лопастей. Воробьевы горы (П.).—Мытищи (С.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Дарьино, Звп. у. (X.). Если листья продолговато-лопат-

¹⁾ *Rumex Acetosa* L. *auriculatus* Wallr. есть самостоятельный видъ = *R. thrysiflorus* Fingerh., какъ это разъяснили Aschers. et Gr.; по словамъ этихъ авторовъ, очень часто ссмѣшиваютъ этотъ послѣдній видъ съ формой *crispus* Roth, очень близкой по обшкѣ, но отличающейся отъ *R. thrysiflorus* строеніемъ соцветія, менѣ крупными плодами и быстро суженными зубцами на стрѣловидныхъ лопастяхъ листьевъ, тогда какъ послѣдній у *R. thrysiflorus* очень длинный, постепенно суженный и часто извилистый.

чатые, то это: *subspathulatus* (Trautv.) Aschers. et Gr. Дарьино, Звн. у. (X.).

d. *rubripunctatus* (Beck) Aschers. et Gr. Внутреннія доли околоцветника густо покрыты красными железками. Пушкино (С.).—Успенское, Дарьино, Звн. у. (X.).

β. *multidentatus* DC. Лопастей у основанія листьевъ по 2—4 съ каждой стороны. Влнзъ Лужковъ, Срп. у. (С.).

Polygonum Bistorta L. (II, стр. 72).

Всѣ видѣнные мною растенія слѣдуетъ отнести къ:

ssp. *latifolium* Hayne. Корневые листья широкіе овальные или продолговато-овальные, съ б. или м. сердцевиднымъ основаніемъ или усѣченнымъ, быстро переходящимъ въ черешокъ.

Распадается на слѣдующія формы:

α. *nitens* (Fisch. et Mey.) Aschers. et Gr. Листья съ нижней стороны совершенно голые. Очень часто.

β. *griseum* (Beck) Aschers. et Gr. Листья съ нижней стороны, б. или м. сѣрые отъ довольно густыхъ короткихъ волосковъ¹⁾. Останкино (П.).—Вялки, Бри. у. (X.).

Polygonum amphibium L. (II, стр. 72).

α. *natans* Moench, правильнѣе называть *aquaticum* Leyss., такъ какъ послѣдній авторъ описалъ эту форму въ Fl. Hal. въ 1761 году, названіе же *natans* появилось въ 1777 г., въ Enum. pl. Hass.²⁾.

β. *terrestre* Leyss., а не Leers., какъ было ошибочно напечатано.

Polygonum tomentosum Schrank (II, стр. 73).

Во второй части III. Фл. при описаніи *P. tomentosum* я сдѣлалъ замѣтку, что этотъ видъ можно отличить отъ *P. nodosum* только въ плодахъ, и все отличіе ихъ состоитъ лишь въ томъ, что у перваго околоцветникъ съ рѣзко выступающими жилками, а у втораго жилки мало за-

¹⁾ Aschers. et Gr. приводятъ еще форму *puberulum* (Beck) Aschers. et Gr., говоря, что эта форма самая обычная; она отличается отъ вышеприведенныхъ опушеніемъ нижней стороны листьевъ только по жилкамъ; такой формы у насъ я пока не видѣлъ, но, вѣроятно, она у насъ есть. Zapalowicz, въ Consp. Fl. Galic. crit. II, p. 140, описалъ еще форму—*macrophyllum*, охарактеризовавъ ее очень крупными корневыми листьями, пластинка конхъ достигаетъ 20 см. дл. и до 8 см. ш., при чемъ само растеніе 80—100 см. Aschers. et Gr. соподчинили эту форму формѣ *puberulum*, исходя изъ того, что Запаловичъ описывалъ типъ съ листьями опушенными снизу. У насъ встрѣчается такая крупная форма, но листья у ней снизу совершенно голые, такъ что она будетъ формою параллельной *macrophyllum* Zapal., но соподчиненной *f. nitens*.

²⁾ А. Н. Петунниковымъ и мною была найдена въ р. Клязьмѣ близъ дер. Тарасовки въ большомъ количествѣ эта форма, но колоски были не одиночные, а парные, при чемъ второй колосокъ на болѣе короткой ножкѣ и нѣсколько мельче. О такомъ уклоненіи говорятъ Aschers. et Gr., не выделяя его въ особую форму.

мѣтны. Теперь, изслѣдовавъ болѣе обширный матеріалъ, мнѣ пришлось убѣдиться, что и этотъ признакъ не столь стойкій, ибо встрѣчаются экземпляры, которые нельзя съ увѣренностью отнести ни къ первому, ни ко второму виду. Несмотря на шаткость признаковъ, Aschers. et Gr. въ Syn. описываютъ самостоятельно оба вида съ оговоркой, что встрѣчаются особи съ полнымъ комплексомъ признаковъ, хотя не отрицаютъ и переходовъ одного вида въ другой. Просмотрѣвъ много флоръ многихъ авторовъ, которые б. ч. указываютъ на трудность или невозможность различить эти два вида изъ-за переходовъ, я пришелъ къ тому, что цѣлесообразнѣе всего признать за видъ *P. lapathifolium* L., какъ поступилъ Günther Beck., въ Reichenbachs Deutsch. Flora B. XXVI. p. 108. соединивъ ему *tomentosum* и *nodosum*.

Тогда у насъ будетъ:

***Polygonum lapathifolium* L.**

***α. typicum* G. Beck.**

Polygonum tomentosum Schrank *β. viride* Litw. Сыр. Илл. Фл. II, стр. 74. Стебель прямостоящій, простой или вѣтвистый; листья съ обѣихъ сторонъ зеленые, голые, съ нижней стороны б. или м. густо покрыты точечными желтыми железками; околоцвѣтникъ у плодовъ б. ч. по краямъ съ сильно выдающимися жилками и б. или м. густо покрытъ железками, иногда железки почти отсутствуют. Самая распространенная форма. Иногда встрѣчаются по берегамъ рѣкъ на пескѣ экземпляры съ распростертымъ стеблемъ—это *subf. prostratum* Aschers. et Gr. Воробьевы горы (II.).

***β. tomentosum* Schrank (sp.).**

Polygonum tomentosum Schrank *α. incanum* Schmidt. Сыр. Илл. Фл. II, стр. 74.

Стебель прямостоящій, простой или вѣтвистый; нижняя сторона листьевъ покрыта б. или м. густо сѣроватымъ пушкомъ или даже войлокомъ; околоцвѣтникъ какъ у *α*. Мѣста нахождения: приведенныя въ Илл. Фл. и Лужки, Сри. у. (II.). По берегамъ рѣкъ на пескѣ встрѣчаются экземпляры съ распростертымъ стеблемъ—это *subf. prostratum* Wimm. Лужки по берегу р. Оки, Сри. у. (II.).

***γ. nodosum* Pers. (sp.).**

Polygonum nodosum Pers. Сыр. Илл. Фл. II, стр. 75.

Растеніе б. ч. очень крупное, до 1,5 м.; стебель б. ч. вѣтвистый, съ сильно вздутыми узлами; околоцвѣтникъ у плодовъ б. ч. безъ железокъ и съ слабо выдающимися жилками по краямъ. Очень часто встрѣчаются переходы къ формѣ *α*; типичное же *P. nodosum* должно быть у насъ очень рѣдко и его слѣдуетъ искать по берегамъ рѣкъ, прудовъ и по сырымъ мѣстамъ.

***Polygonum Persicaria* L. (II, стр. 75).**

Въ Сокольникахъ на огородахъ по берегу р. Яузы близъ Богородскаго и Ботаническій Садъ въ Москвѣ, какъ сорное (II.).

Polýgonum Hydró Piper L. (II, стр. 76).

Растение очень измѣняемое по своему облику, и можно найти всё переходы отъ одной формы къ другой; всё видѣнные мною растенія слѣдуетъ отнести къ:

α. *vulgaris* Meisn. Стебель прямостоящій, приподнимающійся или лежащій; листья б. ч. равномерно-суженные къ обоимъ концамъ.

Какъ подформы можно различить:

1. *simplex* Zapal. Стебель простой, не вѣтвистый съ однимъ колосомъ.
2. *ramosissimum* Zapal. Стебель до 40 см. и выше, почти отъ самаго основанія сильно-вѣтвистый.
3. *radicans* Schur. Стебель распростертый, длинный, укореняющійся; листья продолговатые или продолговато-ланцетные на очень короткихъ черешкахъ или почти сидячіе. На пескѣ по берегамъ рѣкъ.
4. *eciliatum* Saelon. Раструбы совершенно безъ рѣсничекъ или съ единичными рѣсничками.
5. *remotum* Zapal. Растение высокое, въ 0,5 м. и выше, очень пѣж-ное, быстро завядающее, б. ч. почти отъ основанія вѣтвистое, съ длинными тонкими вѣтвями; листья крупные, очень пѣжные; соцвѣтіе очень длинное; цвѣтки сидятъ по 2—5 пучками, сильно разставленными, такъ что промежутки въ нижней части соцвѣтія достигаютъ 3 см. Эта subf. растетъ въ высокихъ заросляхъ по берегамъ рѣкъ и прудовъ въ самой водѣ.

Мѣста нахожденія subf. не привожу, такъ какъ часто можно встрѣтить 2—3 subf. въ одномъ мѣстѣ.

Polýgonum mite Schrank и **P. minus Huds.** (II, стр. 76 и 77).

Критически разбирая вторично московскія *P. mite* и *P. minus*, я не могъ найти ни одного экземпляра, который по всѣмъ признакамъ соотвѣтствовалъ бы *P. mite*, хотя общій обликъ очень часто и напоминалъ его. Тогда я обратился къ изученію богатыхъ коллекцій С.-Пб. Бот. Сада и Имп. Ак. Наукъ; тамъ оказалось много растений съ этикетками *P. mite* и съ его обликомъ, но они не представляли совокупности всѣхъ признаковъ, приписываемыхъ этому виду. У насъ встрѣчаются довольно часто особи, детально подходящія къ *P. minus* Huds., но еще чаще попадаются растенія, у которыхъ листья ланцетные, съ наибольшей шириной посрединѣ и съ основаніемъ быстро-суженнымъ; такіе листья присущи *P. mite*. Соцвѣтіе тоже бываетъ очень разнообразно: то болѣе сжатое, то прерывчатое и даже поникающее. Признакъ тусклости сѣмянъ новѣйшими авторами отвергается, что могу подтвердить и я; мною были изслѣдованы типичное *P. mite* изъ Fl. Ex. Austr.-Hung., № 1833 и изъ другихъ мѣстъ Европы, и вездѣ я находилъ сѣмянки лоснящіяся. Остается еще признакъ—это величина околоцвѣтника и сѣмени: у *P. mite*—3—3,5 мм., а у *P. minus*—2, рѣже 2,5 мм. Этотъ признакъ былъ выдержанъ вездѣ очень стойко и только изъ него можно опираться при распознаваніи этихъ двухъ видовъ. У насъ

всѣ видѣнные мною растенія, да вообще и всѣ видѣнные мною особи изъ Средней Россіи, имѣли околоцвѣтныя и сѣмянки не крупнѣе 2 мм., рѣдко 2.5 мм.; слѣдовательно всѣ они должны быть отнесены къ *P. minus* Huds.; другой же видъ—*P. mite* Schrank, въ Моск. губ. пока не найденъ. Тѣ же особи, которыя обладаютъ обликомъ *P. mite*, слѣдуетъ признать за форму *Niemiroviense* Zapal., описанную въ *Consp. Fl. Galic. crit.* II, p. 131.

У насъ пока можно различить слѣдующія формы вида:

P. minus Huds.

а. *commune* A. Br. Листья б. ч. линейные, съ округлымъ или почти округлымъ основаніемъ; наибольшая ширина ихъ почти у основанія.

б. *Niemiroviense* Zapal. Листья узко- или продолговато-ланцетные, до 9 см. дл., частью или всѣ съ наибольшей шириной близъ середины листа, у основанія округлые ¹⁾ или быстро суженные.

У обѣихъ формъ можно различить подформы:

1. *subcontinuum* Meisn. Цвѣтки въ болѣе густомъ соцвѣтіи, не прерванномъ.
2. *interruptum* Meisn. Соцвѣтіе прерывчатое, нерѣдко слегка поникающее ²⁾.

Polygonum aviculare L. (II, стр. 77).

За последнее время вышли двѣ монографическія обработки этого въ высшей степени измѣнчиваго вида; первая это: Alfred Lehmann, *Formen des Vogelknöterichs aus Umgegend Zwickau*, въ *Jahrb. d. Ver. für Natur. zu Zwickau* 1906—1909, и вторая Lindemann, *Swensk. Bot. Tidskr.* VI, 1912. Первая работа, въ видѣ предварительнаго сообщенія, содержатъ ключъ и описаніе многочисленныхъ формъ, на первый взглядъ хорошо очерченныхъ, но, къ сожалѣнію, когда я собралъ большое количество растеній съ одного мѣста для изданія *Fl. Ross. ex.*, то оказалось, что чуть ли не каждое растеніе слѣдуетъ отнести къ особой формѣ; то же случилось при опредѣленіи гербарнаго матеріала: растенія, собранныя вмѣстѣ и по облику не разняшіяся, но Lehmann слѣдовало признать за разныя формы. Вообще признаки, на которыхъ Lehmann строитъ свой ключъ, до того измѣнчивы, что опираться на нихъ нельзя. То же и у Lindemann: этотъ авторъ, описывая виды, допускаетъ такіе полные переходы, что границы между ними провести нельзя. Разбирая наши формы, я пользовался Aschers. et Gr.—*Syn.*, у которыхъ, хотя подраздѣленіе формъ тоже

¹⁾ Этотъ признакъ не всегда наблюдается, но иногда его можно просмотрѣть, когда края у основанія листьевъ завернуты.

²⁾ Meisn. описалъ обѣ эти subf., какъ формы къ *P. minus* въ DC. *Prodr.* XIV, p. 111; но Aschers. et Gr. въ *Syn.* почему-то первую subf. относятъ только къ *commune*, а вторую только къ *latifolium*, съ чѣмъ согласиться нельзя, такъ какъ форма соцвѣтія до того измѣнчива, что, вѣроятно, эти subf. встрѣчаются у всѣхъ описанныхъ формъ.

довольно шатко, но все же по нимъ можно скорѣе придти къ желаемымъ результатамъ. Въ содѣлѣнію, слѣдуетъ замѣтить, что всѣ авторы дѣлятъ свои формы на группы съ лежащимъ и прямостоящимъ стеблемъ, что пришлось сдѣлать и мнѣ, и что въ гербаріи часто распознать нельзя, а потому при сборѣ надо отмѣчать, какой стебель у растенія. Въ системѣ Aschers. et Gr. есть еще большой недочетъ въ томъ, что они главныя группы своихъ формъ распознаютъ по тусклымъ или едва лоснящимся сѣменамъ и по сѣменамъ сильно лоснящимся; сколько я ни старался уяснить себѣ эти границы, я не могъ, такъ какъ у всѣхъ растеній, даже и у западно-европейскихъ, которыхъ у меня имѣется много, всѣ сѣмена были б. или м. лоснящіеся; но, къ счастью, формъ, у которыхъ сѣмена по Aschers. et Gr. сильно-лоснящіеся, у насъ нѣтъ: ихъ приведено всего три, такъ что рѣшеніе вопроса о тусклыхъ и лоснящихся сѣменахъ можетъ быть пока отброшено.

У насъ я пока могъ различить слѣдующія формы:

1. Листья широкіе или продолговатые, тупые, съ округлой верхушкой или едва заостренные (у насъ пока только съ лежащими стеблями). 2.

Листья широко- или узко-ланцетные, иногда линейные, явственно заостренные. 3.

2. Стебли распростертые; листья округло-овальные или почти округлые, особенно это явственно видно на концѣ стеблей; по дорогамъ.

rotundifolium Schur.

Стебли распростертые, иногда съ приподнимающимися верхушками; листья продолговато-овальные или овальные.

triviale Rchb.

У *triviale* подформы:

subf. arenastrum (Gentil) Aschers. et Gr. Стебли длинные плетевидные; листья мелкіе продолговато-овальные, на концѣ вѣтвей сближенные клубочками.

subf. ovalifolium (Alfr. Lehm.) Aschers. et Gr. Стебель и вѣтви очень длинные плетевидные, расходящіеся отъ корня во всѣ стороны; листья вдвое длиннѣе своей ширины, не сближены на концѣ вѣтвей и б. ч. равной величины по всей длинѣ вѣтвей.

3. Растеніе очень маленькое, въ 1—3 см.; стебель простой съ очень мелкими листьями; цвѣтковь 1—4—конечныхъ. *parvulum* Zapal. Растеніе б. или м. высокое. 4.

4. Листья узко-линейные или линейно-ланцетные, постепенно и сильно заостренные. *neglectum* (Bess.) Rchb.

Листья широко-ланцетные или узко-ланцетные, быстро-заостренные. 5.

5. Стебли прямостоящіе. *erectum* Hayne.

У насъ пока только:

subf. diversifolium (Schur) Aschers. et Gr. Растеніе отъ основанія

вѣтвистое, съ удлинненными вѣтвями; листья обратно-ланцетные, нижніе крупнѣе и тупѣе верхнихъ.

Стебли распростерты или верхушками приподнимающіеся.

procumbens Hayne.

subf. *vulgare* (Kittel) Aschers. et Gr. Листья нѣсколько разставлены, б. ч. явственно двурядные, эллиптическо-ланцетные.

Если листья на черешкахъ, то это:

petiolatum (O. Kuntze) Aschers. et Gr.

subf. *virgatum* (Peters.) Aschers. et Gr. Стебли очень длинныя плетевидные, какъ и вѣтви, съ удлинненными междоузліями; листья б. ч. продолговато-ланцетные.

Chenopodium polyspermum L. (II, стр. 83).

Aschers. et Gr., Beck. и б. часть новыхъ флористовъ сохранили раздѣленіе этого вида на двѣ формы по строенію соцветія на: *cymosum* и *acutifolium*, и только Koch., въ Syn. ed. III, приводя тѣ же формы, оговаривается, что часто встрѣчаются между ними переходы; то же могу подтвердить и я: бывають случаи, когда затрудняешься, къ какой формѣ слѣдуетъ отнести опредѣляемый экземпляръ; тѣмъ не менѣе ихъ слѣдуетъ удерживать. Aschers. et Gr. приписываютъ формѣ *cymosum* листья тупые, а *acutifolium*—острые, что не совсѣмъ выдержано, ибо у обѣихъ формъ листья бывають очень разнообразны, такъ что какъ для первой, такъ и для второй, можно привести слѣдующія subf., различимыя по листьямъ:

1. *eu-acutifolium* Aschers. et Gr.¹⁾ Листья заостренные.

2. *obtusifolium* Gaud. Листья тупые или съ округлой верхушкой.

3. *obcordatum* Schur. Листья на верхушкѣ съ б. или м. глубокой выемкой. Только разъ: Студенецъ (II.).

β. *acutifolium* Becker, а не Sm.

Chenopodium hybridum L. (II, стр. 84).

У насъ пока можно различить слѣдующія формы:

α. *typicum* Beck. Листья у основанія слегка сердцевидные.

β. *cuneatum* Beck. Листья б. ч. не крупныя, изъ округлаго основанія слегка клиновидно-суженныя. Богородскъ, огороды (II.).

γ. *diversifolium* Ludwig. Нижніе и средніе листья глубоко-и крупно-выемчато-зубчатые, верхніе яйцевидные, обратно-яйцевидные или удлинненно-яйцевидные, длинно-заостренные, цѣлюкрайніе, съ округлымъ основаніемъ. Луизиана на р. Москвѣ (II.).

Chenopodium album L. (II, стр. 85).

Съ этимъ въ высшей степени измѣнчивымъ видомъ можно было разбраться по тремъ работамъ; первая—I. Murr. Versuch einer natürlichen

¹⁾ Для формы *cymosum* Chev. можно subf. съ острыми листьями именовать *acutifolium* Aschers. et Gr. а разваніе *eu-acutifolium* Aschers. et Gr. оставить у subf. *acutifolium* Becker.

Gliederung der mitteleuropäischen Formen des *C. album* L. (Festschrift zur Feier des 70. Geburtstages des Herrn. Prof. Dr. P. Ascherson, 1904); вторая Aschers. et Gr. Synopsis; и третья G. Beck., Reichenbachs Deutschlands Flora. Первые двѣ работы очень обширны, но дѣленіе ихъ формъ не столь ясно, какъ у G. Beck., и я при разработкѣ нашихъ формъ придерживался работы этого послѣдняго автора. Къ сожалѣнію, нашъ гербарный матеріалъ былъ такъ скуденъ, что я съ трудомъ могъ распознать слѣдующія формы:

α. typicum Beck. Все растение б. или м. густо покрыто бѣлымъ налетомъ; стебель простой или вѣтвистый съ прямо-торчащими вѣтвями; черешки короче пластинки; листья яйцевидно-ромбическіе, ромбическіе, рѣже продолговато-ланцетные, по краямъ выемчато-зубчатые, рѣже почти цѣльнокрайніе; клубочки въ ложномъ колосѣ или въ пирамидальной метелкѣ, б. ч. съ густымъ налетомъ. Какъ подформы можно различить:

1. **Linneanum Beck.** Все растение б. ч. густо покрыто налетомъ; стебель прямостоящій съ прямоторчащими вѣтвями; черешокъ явственно короче пластинки; листья 2—3,5 см. ш., яйцевидно-ромбическіе съ длинно-клиновиднымъ основаніемъ и по краямъ неровно-выемчато-зубчатые, у основанія почти лопастные; верхніе листья почти ланцетные, зубчатые. Обычная форма.
2. **viridescens St. Am.** Листья ромбическо-яйцевидные, зеленые, съ слабымъ налетомъ, походятъ на subf. 1, но мельче.
3. **oblongum Neigr.** Нижніе и средніе листья яйцевидно-ланцетные, зубчатые; верхніе ланцетные, цѣльнокрайніе, всѣ б. или м. съ налетомъ.
4. **lanceolatum Mühlenb.** Всѣ листья ланцетные, нижніе широко-ланцетные, цѣльнокрайніе или почти цѣльнокрайніе, съ слабымъ налетомъ.

β. striatum Kras. Стебель чаще красноватый или съ красными продольными полосками; листья зеленые (или желто-зеленые), часто съ красной каймой, яйцевидно-ромбическіе, б. ч. тупые, съ нижней стороны съ слабымъ налетомъ; верхніе листья ланцетные; соцветіе какъ у *typicum*.

У насъ пока только:

1. **interjectum Murr.** Листья съ слабымъ налетомъ и иногда съ узкой красной каймой, яйцевидные или треугольные, почти 3-лопастные; средняя лопасть почти цѣльнокрайняя, боковыя простыя или слегка зубчатая по краямъ. На пескѣ по берегу р. Оки близъ Бѣлопесоцкой слободы, Срп. у. (X.).
- γ. **viride L.** Стебель прямостоящій или лежачій, зеленый или красноватый; черешки длинныя; листья яйцевидно-ромбическіе, ромбическіе, яйцевидно-ланцетные или ланцетные, цѣльнокрайніе или зубчатые, б. ч. зеленые, безъ налета или съ легкимъ налетомъ.

томъ, скоро пропадающимъ; соцвѣтіе—развѣсистая почти щитковидная метелка.

1. *genuinum* Beck. Нижніе листья почти цѣльнокрайніе, ромбическіе, рѣдко слегка зубчатые; верхніе ланцетные, цѣльнокрайніе; соцвѣтіе почти безъ листьевъ¹⁾.

Chenopodium glaucum L. (II, стр. 86).

У насъ пока можно различить слѣдующія формы:

- α. *typicum* Beck. Стебель и вѣтви прямостоящіе или слегка приподнимающіеся; листья продолговатые или продолговато-ромбическіе, выемчато-зубчатые.

Какъ *subf.* различны:

1. *robustum* (Zapal.) Aschers. et Gr. Стебель очень высокій, до 50 см., торчащій; листья до 6,5 см. дл.
 2. *angustifolium* (Zapal.) Aschers. et Gr. Какъ *subf.* 1, но нѣсколько ниже, а листья очень узкіе, 7—10 мм. ш. Каменоломни близъ д. Добрытино, Пдл. у. (Куль).
 3. *humifusum* (Zapal.) Aschers. et Gr. Растеніе не высокое—5—20 см., отъ основанія сильно вѣтвистое, съ короткими вѣтвями.
- β. *prostratum* Beck. Стебли распростерты и прижатые къ землѣ; листья мелкіе, выемчато-зубчатые или иногда цѣльнокрайніе. На пескѣ по берегамъ рѣкъ.

Chenopodium rubrum L. (II, стр. 86).

У насъ пока можно различить слѣдующія формы:

- α. *vulgare* Wallr. Стебель прямостоящій, простой или вѣтвистый; листья изъ клиновиднаго основанія яйцевидно-ромбическіе или треугольные, б. ч. выемчато-и неровно-зубчатые.

Какъ *subf.*—*foliolosum* Wallr.

- β. *blifoides* Wallr. Какъ α. но листья съ длинной вытянутой верхушкой. Моск. Бот. Садъ, Студенецъ (II.).
- γ. *botryoides* Sonder. Стебель лежачій или распростертый, простой или вѣтвистый; листья мясистые, яйцевидно-ромбическіе, иногда почти ланцетные, лопатчатые или яйцевидные, рѣже концевидные, цѣльнокрайніе или рѣдко-выемчато-зубчатые. На пескахъ по берегамъ рѣкъ. Между Заозерьемъ и д. Коломеецъ на р. Москвѣ. Брн. у. (С.).

¹⁾ Относительно *Ch. album* L. Goldbachii Kauffm.—Murr. въ письмѣ къ Ф. С. Немокову высказалъ предположеніе, что описаніе этой формы почти не отличимо отъ описанія *Ch. Berlandieri* Moq., но притомъ замѣчаетъ, что въ 1817 году, когда форма Goldbachii была найдена въ Москвѣ, едва ли этотъ американскій видъ лебеды могъ быть занесенъ въ Москву, такъ что выясненіе этого вопроса остается открытымъ.

Chenopodium foliosum (Moench) Aschers. (II, стр. 87).—Сар.

Отч. III, стр. 12.

Каменоломни у устья р. Пахры, Бри. у. (С.).

Atriplex hortense L. (II, стр. 90).

У насъ пока:

- α. *typicum* Beck. Все растение зеленое. Моск. Бот. Садъ, сорное (II.).
- β. *rubrum* Roth. Стебель, иногда края листьевъ и края предлистьевъ красные. Разводится. Моск. Бот. Садъ (II.).

Atriplex nitens Schkuhr. (II, стр. 90).

У насъ пока:

- α. *typicum* Aschers. et Gr. Растение очень высокое, вѣтвистое; листья съ нижней стороны съ б. или м. густымъ бѣлымъ налетомъ.
- β. *virens* Zapal. Листья снизу почти безъ налета, зеленые или слабо сѣроватые.
- γ. *subsimplex* Aschers. et Gr. Растение не высокое; стебель простой не вѣтвистый; всѣ части растения мелкія. На прибрежныхъ пескахъ, Протопоново, Кзм. у. (II.).

Atriplex patulum L. (II, стр. 91).

Растение очень измѣнчивое во всѣхъ своихъ частяхъ. Къ сожалѣнію, гербарный матеріалъ былъ очень малъ и б. ч. очень плохо собранъ, отчего разобрать въ мелкихъ формахъ было нельзя. Привожу тѣ формы, которые могъ различить:

- α. *angustifolium* Lange. Соцвѣтіе рѣдкоцвѣтковое, прерывчатое. б. ч. безъ вѣтвей; предлистья крупныя, 4—6 мм. дл., съ длинно-вытянутой верхушкой, много длиннѣе плода.
- β. *erectum* Lange. Соцвѣтіе б. или м. частое, метельчато-вѣтвистое; предлистья 2—5 мм. дл., ромбическія или треугольныя съ мало вытянутой верхушкой, немного длиннѣе плода.
- γ. *permixtum* Beck. Представляетъ переходъ между α и β; предлистья такія же, какъ у α, но мелкія, часть же предлистьевъ какъ у β.

Atriplex hastatum L. (II, стр. 91).

Весь нашъ очень скудный матеріалъ слѣдуетъ отнести къ:

- α. *microtheca* Schum. Соцвѣтіе б. ч. густое, часто метельчатое; предлистья равны плоду или нѣсколько длиннѣе его, б. ч. не крупнѣе 4 мм., съ округлымъ или слегка суженнымъ основаніемъ.
- subf. *ruderale* Westerl. Листья треугольно-копьевидныя или треугольныя, по краямъ не часто зубчатые; предлистья треугольно-яйцевидныя, пѣлынокрайнія, рѣдко едва зубчатые или съ мясистыми шипиками.

Atriplex laciniatum L. (II, стр. 92).—Сыр. Отч. III, стр. 12.
правильнѣе называть: **Atriplex tatáricum L.**¹⁾

У насъ пока:

- α. **incisum Gürke.** Средніе листья неравно-выемчато-зубчатые, зубцы острые или островатые. Быково, Бри. у. (С.).
- β. **obtusilobum Beck.** Средніе листья неравно-и глубоко-выемчато-зубчатые, часто почти надрѣзные; зубцы тупые или округлые. Раменское, у фабричной свалки, Бри. у. (С.).

Corispérnum intermédiu Schwegg. (II, стр. 93).

Нельзя не согласиться съ G. Beck., соединившимъ въ Deutsch. Fl. этотъ видъ виду *C. hyssopifolium L.* при чемъ и само названіе *intermedium*, по новымъ правиламъ номенклатуры, должно уступить названію *C. hyssopifolium L.* β. *macropterum Fenzl.* Вся разница между этими видами сводится къ различію ободка у плода, который у *C. hyssopifolium* очень узкій, часто настолько узкій, что кажется только острымъ ребромъ; ободокъ же у *C. intermedium* явственно замѣтенъ, бѣлый, почти прозрачный наподобіе узкаго крыла. У всѣхъ видѣнныхъ мною экземпляровъ, плоды были почти безъ крыла или съ едва замѣтнымъ крыломъ, слѣдовательно б. ч. нашихъ растений будетъ:

Corispérnum hyssopifolium L.

Распадается на:

- α. **typicum Beck.** Плодики очень узко-крылатые или только по краю килеватые. Обычно.
- β. **macropterum Fenzl** (*C. intermedium Schwegg.*).

Плодики по краю съ узкимъ бѣлымъ крыломъ, иногда слегка прозрачнымъ. Лукинки, Сри. у. (II. и X.).

Corispérnum Marschállii Stev. (II, стр. 93).

II этотъ видъ, по словамъ того же G. Beck, не можетъ считаться самостоятельнымъ; онъ настолько мало отличается отъ *C. canescens Kit.*, что G. Beck сомнѣвается, можно ли его считать даже за форму, хотя все же оставляетъ его какъ форму.—*C. canescens Kit.* описанъ въ 1814 г., а *C. Marschállii Stev.* въ 1817 г.; слѣдовательно, первенство за *C. canescens*; все же различіе между этими видами заключается только въ томъ, что у перваго околоцвѣтныхъ пленокъ 0—3 (рѣдко 5), а плодики 3—5 мм. дл.; у втораго вида околоцвѣтныхъ пленокъ 0—1, а плодики 4—5 мм. дл. Если различать ихъ, то наше растеніе будетъ:

Corispérnum canescens Kit. β. Marschállii (Stev.) Beck.

¹⁾ См.: A. Kerner, Oest. Bot. Zeitschr. (1875) p. 251 и G. Beck., Reichenb. Deutsch. Fl. B. XXIV, p. 206.

Sálsola Káli L. (II, стр. 94).

У насъ найдена форма:

pseudotragus Beck. Все растеніе совершенно голое; листья узкіе, почти нитевидные, заостренные, нижніе до 6 см. дл.; цвѣтки б. ч. одиночныя.

Móntia rivuláris Gmel. (II, стр. 96).—Сыр. Отч. III, стр. 12.

У ручья, впадающаго въ р. Пахру, близъ с. Зеленаго, Бри. у. (С.).—На тонкомъ моховомъ болотѣ близъ д. Татищева, Дмитр. у. (Н. Петровъ).

Cucúbalus báccifer L. (II, стр. 99).—Ф. Б. Пр., стр. 73.—Хор. II, стр. 18.

Прибрежныя пеньки близъ Семенкова, Мож. у. (Ф. Б.).—Манькина гора, Пдл. у. (Х.).

Silène procumbens Murr. (II, стр. 100).—Сыр. Отч. III, стр. 12.

По берегу р. Нижняя Хрипань между Заболотьемъ и сел. Новымъ, Бри. у. (С.).

Silène venósa (Gilib.) Aschers. (II, стр. 101), правильноѣ называть:

Silène Cucúbalus Wib., такъ какъ Wibel въ Prim. Fl. Werth., p. 241 (1799), первый сталъ называть этотъ видъ *Silene Cucubalus*.

У насъ можно различить слѣдующія формы, хотя наблюдаются и переходы ихъ:

α. **typica Beck** (*S. inflata* Sm. var. *vulgaris* Otth. in DC. Prodr.).

Стебель примостоящій съ б. или м. многоцвѣтковымъ соцвѣтіемъ; листья яйцевидно-ланцетные, заостренные, средніе не уже 1 см., всѣ по краямъ очень коротко-хрящевато-рѣсничатые, отчего края шероховатые.

β. **latifolia Rouy et Fouc.** Листья очень широкіе, овальные или овально-ланцетные, коротко-заостренные, по краямъ гладкіе—безъ рѣсничекъ; средніе листья 2,5—3 см. ш. Мытищи (С.).

γ. **Tenoreana Colla.** Стебель 30—40 см., б. ч. простой; листья узкіе, 4—8 мм. ш., ланцетные или линейно-ланцетные, длинно-заостренные, по краямъ гладкіе безъ рѣсничекъ; соцвѣтіе довольно многоцвѣтковое. Красково на р. Пехоркѣ, Бри. у. (П.).

δ. **carneiflora Le Gr.** Сыр. Отч. III, стр. 12.

Вѣничикъ розовый. Близъ ст. Удѣльная, М.-Каз. ж. д., Бри. у. (С.).

Silène nútans L. (II, стр. 101).

Всѣ видѣнныя мною растенія можно отнести къ:

α. **typica Beck.** Нижніе листья слегка лопатчатые, а средніе про-

долговатые или широко-ланцетные, при чемъ вѣичникъ съ обѣихъ сторонъ бѣлый ¹⁾).

Silène tatárica (L.) Pers. (II, стр. 102).—Ф. Б. Пр., стр. 73.

Луга у Старого села, Мож. у. (Ф. Б.).

Silène Otites (L.) Sm. (II, стр. 103).

У полотно Брянской ж. д. на 18 верстѣ, мужскія и женскія особи. (Ассъ).

Silène dichótoma Ehrh. (II, стр. 103).

Леосово близъ ст. Салтыковка, Нижегород. ж. д.; близъ погоста Борна и Глѣба, Пдл. у. (Куль.).

Melándryum álbum (Mill.) Garcke (II, стр. 105).

Кромѣ обычной формы у насъ еще:

α. **coloratum Rostr.** Вѣичникъ розовый. По р. Колочи близъ д. Новое, Мож. у. (Куль.).

Melándryum noctiflórum (L.) Fries (II, стр. 106).—Ф. Б. Пр., стр. 73.

На южномъ склонѣ противъ д. Алексѣвки, на заросшемъ кустарникомъ обрывѣ, Мож. у. (Ф. Б.).

Lýchnis flos cucúli L. (II, стр. 107).—Sch. V, № 1559a.

Кромѣ обычной формы у насъ еще:

α. **latifolia Bolle.** Растеніе высокое, зеленое безъ красноватой окраски верхушки стебля и чашечки; листья на средней части стебля очень крупные—10—14 см. дл. и 14—19 мм. ш. Вишняково, Мос. у., на открытомъ мѣстѣ (X.) ²⁾).

β. **albiflora Tin.** Вѣичникъ чисто-бѣлый. Б. Мытищи (С.).

Agrostemma Githágo L. (II, стр. 108).—Sch. V, 1516a.

Gypsóphila paniculáta L. (II, стр. 108).

Ж.-д. насыпь Никол. ж. д. близъ полуст. Петровское-Разумовское (Ассъ).

¹⁾ А. А. Хорошковъ собралъ на известняковыхъ склонахъ по берегу р. Мѣчи близъ Татарское-Сатино, Пдл. у., особи, у которыхъ, влѣдствіе нѣсколько укороченныхъ вѣтокъ въ соцветіи и болѣе короткихъ торчащихъ цветоножекъ, весь обликъ нѣсколько отличается отъ обычной формы—съ длинными вѣтвями соцветія и понижающимися цветоножками.

²⁾ С. Bolle, Verh. d. bot. Ver. für d. Prov. Brand. VII (1865), p. 19, приводя эту форму, говоритъ, что она растетъ въ густой тѣнѣ; но экземпляръ А. Хорошкова, у котораго всѣ признаки, присущіе этой формѣ, очень рѣзко выражены, росъ на открытомъ мѣстѣ.

Gypsophila muralis L. (II, стр. 109).

Кромѣ обычной формы, съ узкими листьями не шире 1.5 мм. и лепестками почти безъ выемки, у насъ еще:

α. serotina Hayne. На главномъ стеблѣ листья 2—2,5 мм. ш., длиннѣе междоузлій; цвѣтки крупнѣе; лепестки съ довольно глубокой выемкой. Успенское, по берегу р. Москвы на пескѣ, Звн. у. (X.).

Dianthus collinus W. K. (II, стр. 111).

Этотъ видъ въ высшей степени измѣчивъ, и часто на одномъ и томъ же мѣстѣ можно встрѣтить очень разнообразныя формы. Описывая тако-

*Gypsophila muralis α. serotina.**Dianthus Seguieri β. asper.**Dianthus Seguieri γ. Fischeri.*

выя во II части Илл. Фл. Моск. губ., я, къ сожалѣнiю, слѣдовалъ монографiи Williams, The pinks of central Europe, въ которой этотъ авторъ невѣрно ихъ понялъ и, приводя двѣ разновидности: *subpaniculatus* Schur и *silvaticus* Hoppe, упустилъ изъ вида, что Schur въ Enum. Fl. Transs., p. 96, при описанiи var. *subpaniculatus*, ссылается на рис. Rehb. Icon., № 5023, гдѣ изображено *D. Seguieri* = *silvaticus* Hoppe. Тотъ же Williams, а вмѣстѣ съ нимъ и Hayek, въ Fl. von Steierm., и нѣкоторые другiе флористы приводятъ для *D. collinus* W. K. какъ главный отличительный признакъ, кромѣ частаго пучковатаго соцветiя, еще сравнительно густое опушенiе стебля и широкiе о 5—7 жилкахъ листья, въ противоположность *D. Seguieri* Vill., у котораго стебель голый и листья узкiе о 3 жилкахъ, остро-шершавые только по краямъ. Приводимые признаки далеко не стойки; у насъ встрѣчаются всѣ переходы какъ въ опушенiи стебля—отъ голаго до б. или м. густо опушеннаго, такъ и въ числѣ жилокъ, которыхъ нередко бываетъ 3—5—7. Что же касается иныхъ признаковъ, какъ-то:

величины цвѣтка, зазубренности лепестковъ и рисунка на нихъ, а равно и длины наружныхъ чашечныхъ чешуекъ по отношенію къ длинѣ чашечки, то эти признаки въ высшей степени непостоянны, о чемъ свидѣлствуютъ Mertens et Koch, въ *Röhlings Deutsch. Fl.* III, p. 198, говоря, что выѣянные ими сѣмена отъ одного растенія дали особи съ очень разнообразными цвѣтками какъ по величинѣ, такъ и по рисунку на лепесткахъ; совершенно то же было и съ чешуйками чашечки: появились особи какъ съ длинными, такъ и съ короткими чешуйками. Странно, что Berbas, въ *Verh. d. bot. Ver. d. Prov. Brand.* XIX (1877) p. 18, хотя и ссылается при разборѣ *D. Seguierei* на Mertens et Koch, однако совершенно игнорируетъ любопытные опыты упомянутыхъ авторовъ съ культурой этого вида, и приводитъ длину чешуекъ какъ стойкій отличительный признакъ. Видѣнное мною типичное *D. collinus* W. K. изъ-подъ Будапешта, нѣсколько отличалось отъ нашего, но все отличие сводилось къ тому, что всѣ признаки, присущіе этому виду, были очень рѣзко выражены, тогда какъ у нашихъ растеній они смягчены и постепенно переходить къ признакамъ *D. Seguierei*. Исходя изъ этого, будетъ, пожалуй, правильнѣе поступить такъ, какъ это сдѣлалъ Д. И. Литвиновъ въ «Флорѣ Средней Россіи» Маевского, т.-е. подчинить видъ *D. collinus* виду *D. Seguierei* Vill. Какъ я уже упомянулъ, между обоими видами существуютъ безчисленные переходы, и ихъ признаки встрѣчаются во всевозможныхъ комбинаціяхъ; но нѣкоторые особи можно довольно точно подвести подъ ниже помѣщенные формы, хотя и между формами тоже есть переходы, что замѣчаютъ Mertens et Koch, говоря на стр. 201 о невозможности рѣзкаго разграниченія этихъ формъ. Мѣста нахожденія формъ я не привожу, такъ какъ часто въ одномъ и томъ же мѣстѣ можно встрѣтить чуть ли не всѣ нижеприведенныя формы.

- α. **silvaticus Hoppe.** Цвѣтки б. ч. по 2, сидятъ или на очень короткихъ ножкахъ, или же цвѣтки одиночные; наружныя чашечныя чешуйки б. ч. короткія (не длиннѣе трети чашечки) съ короткимъ острокопечіемъ.
- β. **asper Schleich.** Цвѣтки б. ч. по 2, рѣже по 1 или по 3, сидятъ, такъ что послѣдняя пара листьевъ вплотную придвинута къ чашечкѣ; стебель б. ч. вѣтвистый; наружныя чашечныя чешуйки б. ч. равны половинѣ чашечки или едва длиннѣе половины, съ б. или м. длиннымъ острокопечіемъ.
- γ. **Fischeri Spr.** Цвѣтки одиночные, на б. или м. длинныхъ цвѣтоножкахъ, образуютъ рѣдкій вильчато-вѣтвистый щитокъ; наружныя чашечныя чешуйки то почти какъ у β, то ближе къ α; жилокъ на листьяхъ 3—5.
- δ. **collinus W. K. (sp.).** Цвѣтки собраны пучками, образуютъ густой щитокъ; наружныя чашечныя чешуйки то длиннѣе половины чашечки, то короче половины; жилокъ на листьяхъ б. ч. 5.

***Diáanthus deltoides* L.** (II стр. 112).

А. А. Хорошковъ нашелъ экземпляръ этой гвоздики очень своеобразнаго облика; правда, онъ росъ на воздѣланной почвѣ—въ полѣ между Впшпяковымъ и Коснымъ.—но уклоненіе отъ обычной формы выражено въ такомъ большомъ числѣ признаковъ, что едва ли они вызваны были только воздѣланной почвой. Все растеніе образуетъ густую дерновинку съ очень большимъ числомъ цвѣтущихъ стеблей, а равно и не цвѣтущихъ побѣговъ, то укороченныхъ, то довольно длинныхъ; всѣ листья по краямъ сильно шероховатые отъ густыхъ рѣсничекъ, болѣе густыхъ чѣмъ у типа; цвѣтущіе стебли вѣтвистые, многоцвѣтковые, до 18 цвѣтковъ на стеблѣ; цвѣтки крупные, пластинка лепестка до 7.5 мм. ш. Такая форма приближается къ описанной Borbas. въ Oest. Bot. Zeitschr. (1888), p. 51, **var. serpyllifolius Borb.**, но только приближается, а не тождественна съ ней. Н. Zaralowiez. въ Consp. Fl. Galic. crit. III, p. 144, приводитъ для этого вида гвоздики 12 формъ, каждая форма очерчена двумя-тремя признаками, но, къ сожалѣнію, б. ч. комбинацій признаковъ у описанныхъ Zaralowiez формъ надѣ признавать случайными, такъ какъ мнѣ приходилось видѣть экземпляры, у которыхъ одинъ признакъ соответствовалъ одной формѣ, а остальные другой, и я не могъ подвести ни къ одной изъ его формъ наши особи, нѣсколько уклоняющіяся отъ типа.

***Diáanthus supérbus* L.** (II, стр. 113)

Б. Мытищи (С.).—На лугу близъ д. Спирдова, Дмт. у. (II. п. X.).

Про описанныя у Н. Zaralowiez (l. c.) 7 формъ этой гвоздики можно повторить то же, что я сказалъ про *D. deltoides*, т.-е., что онѣ установлены по случайнымъ комбинаціямъ признаковъ. У меня гербарій крупнаго формата, а у А. Н. Петуникова—маленькаго, и вотъ растенія, собранныя нами подъ Гаврилковымъ, можно по Zaralowiez отнести къ двумъ формамъ.

***Saponária officinális* L.** (II, стр. 114).

Simmler, въ Monogr. der Gattung Saponaria, замѣчаетъ, что въ формѣ *typica* Beck соединены двѣ формы: ***genuina Rouy et Fouc.*** и ***puberula (Syme, in herb.) Rouy et Fouc.*** У первой опушено все растеніе, кромѣ чашечки, а у второй опушена и чашечка; тогда б. часть нашихъ растеній надо отнести къ ***puberula (Syme, in herb.) Rouy et Fouc.*** Но почему Simmler заключаетъ, что обѣ формы Rouy et Fouc. соответствуютъ одной формѣ *typica* Beck, мнѣ не ясно, такъ какъ у послѣдняго автора въ его Fl. v. N. Oesterr. I, p. 376, въ описаніи *typica* стоитъ: «Kelch, Stengel, Blattränder reichlich kurz behaart». Въ Бри. у. по берегу Москвы р. между Кулаковымъ и д. Коломенъ мною найдены экземпляры съ голою чашечкою; слѣдовательно, они относятся къ ***genuina Rouy et Fouc.***

***Vaccária pyramidáta* Medik. α. *grandiflóra* Fisch.** (II, стр. 115).

Лихоборы въ овсѣ (Ассѣ).—Около Алешкова за Химками (II.).

Sagina procumbens L. (II, стр. 115).

Распадается на слѣдующія формы:

- α. **glaberrima** Neilr. Растеніе совершенно голое. Обычная форма.
- β. **bryoides** (Fröhl.) Hausm. Всѣ листья или только нѣкоторые б. или м. густо усажены по краямъ очень короткими рѣсничками. Косино по берегу Черного озера (II.).
- γ. **intermixta** Beck. Между четверными нѣвѣтками встрѣчаются единичные пятерные.

Sagina nodosa (L.) Fenzl (II, стр. 116).

- α. **pubescens** Koch, правильнѣе: **glandulosa** (Bess.) Aschers.

У насъ пока только эта форма, другую же форму, совершенно голую, *typica* Beck, я еще изъ Моск. губ. не видалъ. Къ формѣ *glandulosa* слѣдуетъ относить и тѣ экземпляры, у которыхъ волоски покрываютъ только чашечку и слегка цвѣтоножку, въ остальномъ же растеніе голое.

Arenaria serpyllifolia L. (II, стр. 118).

- α. **viscida** Loisel., правильнѣе: **viscida** (Loisel.) Aschers.

Надо прибавить, что у насъ пока найдена только эта форма; растенія же безъ железистыхъ волосковъ не были наблюдаемы.

Arenaria graminifolia Schrad. (II, стр. 119).—Пет. Отч., стр. 13.

Рождественно на р. Нарѣ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Подольскъ, близъ цементнаго завода (Куль.).

Stellaria nemorum L. (II, стр. 120).

У насъ пока только:

- α. **bracteata** Ledeb. Всѣ прицвѣтники травянистые, походятъ на листья; у основанія соцвѣтія не отличимы отъ стеблевыхъ листьевъ, къ верхушкѣ же соцвѣтія нѣсколько уменьшаются¹⁾.

Stellaria media (L.) Cyrill. (II, стр. 121).

У насъ пока можно различить слѣдующія формы:

- α. **genuina** Rouy et Fouc.

Stellaria media Vill. var. *oligandia* Fenzl.—Sch. VI, № 1654.

Листья не крупныя—до 18 мм. дл. и 15 мм. ш.; цвѣтоножки въ 1—4 раза длиннѣе чашечки; лепестки немного длиннѣе или едва короче чашечки; тычинокъ 3—5. Если листья слегка по краямъ курчавые, то это **subf. undulata** Breb.

¹⁾ Вѣроятно, у насъ найдется и вторая форма *subbracteata* Ledeb., у которой только первые прицвѣтники походятъ на листья, остальные же быстро переходятъ въ чешуевидные прицвѣтники. Въ гербаріи А. Н. Петуникова хранятся 2 экземпляра, одинъ съ Воробьевыхъ горъ, другой изъ Кунцова, занимающіе средину между этими обѣими формами: часть прицвѣтниковъ у нихъ походятъ на листья, а часть чешуевидные.

β. maxima (Schur) Gürcke. Все растение во всех частях очень крупное и мясистое; пластинка листа до 3,5 см. дл. и до 2,5 см. ш., заостренная; тычинокъ 3—5. По огородамъ на тучной почвѣ и по сырмь мѣстамъ въ травѣ, но изрѣдка встрѣчается и вмѣстѣ съ формой *α*.

γ. neglecta (Weihe) Mert. et Koch. Тычинокъ 10.

Stellária Holóstea L. (II, стр. 122).

У насъ только форма:

α. genuina Rouy et Fouc. Листья 5—10 мм. ш.; цвѣтки крупные.

Stellária palústris Ehrh., а не *Retz.* (II, стр. 122).

У насъ пока можно различить слѣдующія формы:

α. communis Fenzl. Сизо-зеленое; лепестки въ $1\frac{1}{2}$ —2 раза длиннѣ чашечки. Часто.

β. viridis Fries. Какъ *α*, но растение зеленое.

γ. parviflora Richt. Сизо-зеленое; лепестки равны чашечкѣ или даже едва короче ея. Храпуновъ постъ на 41-й верстѣ Нижег. ж. д., Бр. у. (X.).

δ. Dilleniana Moench (sp.). Какъ *γ*, но растение зеленое¹⁾.

Stellária graminea L. *β. lanceolata* Fenzl, а не *β. lanceata* Fenzl. (II, стр. 123).

Stellária mosquénsis M.B. (II, стр. 124).—Сыр. Отч. I, стр. 14.

Лѣсъ между полотною Яр. ж. д. и Братовщиной, Дмт. у. (С.).

Stellária crassifolia Ehrh. (II, стр. 125).—Ф. Б. Пр., стр. 73.

Золотая отока близъ Алексѣевки, Мож. у. (Ф. Б.).—Куликово, Дмт. у. (II. Петровъ).

Кромѣ обычной формы у насъ еще:

α. brevifolia Rafin. Стебли низкіе, 5—15 см., лежащіе, очень сильно вѣтвистые съ очень короткими междоузліями; растение образуетъ очень густыя низкія дерновники; листья продолговатые или продолговато-ланцетные, очень мелкіе; цвѣтки одиночные, верхушечные или пазушные. Мытщицы—торфяное болото близъ Шарапова (С.).

β. paludosa (Laest.) Fries. Растеніе высокое, до 30 см., б. ч. сильно вѣтвистое, но съ длинными междоузліями, значительно превышающими листья; послѣдніе овально-продолговатые или широко-ланцетные, заостренные, съ слѣтка сердцевиднымъ основаніемъ,

¹⁾ Вѣроятно, у насъ встрѣчаются часто все эти формы; я привелъ обѣ зеленія формы, какъ съ крупными, такъ и съ мелкими цвѣтками потому, что не знаю съ какими цвѣтками растеніе, найденное О. В. Бухгольцемъ, но, вѣроятно, у насъ встрѣчается какъ та, такъ и другая форма.

крупные, 10—22 мм. дл. и 4—6 мм. ш. Денпеево, Звн. у. (X.).— Пушкино по р. Серебрянкѣ (С.)¹⁾.

Cerástium caespitosum Gilib. (II, стр. 126).

У насъ кромѣ обычной формы съ опушеніемъ простыми волосками средней густоты еще:

- α. **hirsutum Fries.** Все растеніе густо опушено простыми волосками, особенно густо опушены цвѣтоножки. Подъ Серпуховымъ (II.).
- β. **murale Desp.** Опушеніе какъ у α., но растеніе очень мелкое, отъ 4 до 10 см., обь одномъ стеблѣ и только съ 1—2 цвѣтками; основаніе стебля и нижніе листья часто красноватые. Люблино (II.).
- γ. **glandulosum (Boenningh.) Wirtg.** Все растеніе или только его верхняя часть б. или м. густо покрыто железистыми волосками. Карабеево на р. Окѣ, Кзм. у. (II.).
- δ. **nemorale Uecht.** Съ ползучащими стеблями и съ многочисленными не цвѣтущими длинными побѣгами; соцвѣтіе малецвѣтковое; листья на цвѣтоносныхъ стебляхъ крупные, овальные или продолговато-овальные, листья же на побѣгахъ лопатчатые на б. или м. длинныхъ черешкахъ. Наше растеніе отличается отъ описаннаго Uechtriz, въ Oest. bot. Zeitschr. 1868, p. 73, только отсутствіемъ железистыхъ волосковъ, хотя единичные чрезвычайно рѣдкіе волоски и наблюдаются. Новлинское, Пдл. у. (X.).

Cerástium arvense L. (II, стр. 127).

Для этого вида, въ Plantae Europaeae Güreke, приводится Richter'омъ 20 формъ, да Zaralowiez прибавляетъ цѣлый рядъ формъ и подформъ, но, къ сожалѣнію, это растеніе такъ измѣнчиво, что ни одна форма, приводимая этими авторами, въ точности не подходитъ къ экземплярамъ изъ Моск. губ., хотя нѣкоторыя особи близки къ ниже приведеннымъ формамъ:

- α. **angustifolium Fenzl.** Все растеніе б. или м. густо опушено; листья продолговато-линейные или ланцетные. Обычная форма.
- β. **strictum (Haenke) Gaud., non L.** Цвѣтоносные стебли слабо опушены; цвѣтоножки и чашечки железистыя; листья голые или только у основанія слегка рѣсничатые; не цвѣтущіе побѣги довольно длинные, вмѣстѣ съ листьями совершенно голые. У полотна ж. д. близъ ст. Перловка, Ярослав. ж. д. (С.).—Подушкино, Звн. у. (X.).
- γ. **condensatum Cel.** Листья эллиптическіе или эллипческо-ланцетные, короткіе; растеніе опушенное; чашелистики овальные съ округлой верхушкой и широкимъ пленчатымъ краемъ²⁾. Противъ Вѣлаго Колодца подъ Серпуховымъ (II.).

¹⁾ Надо замѣтить, что у этой формы наблюдаются переходы къ обычной, тогда какъ у *brevifolia* мыъ таковыхъ не приходилось видѣть.

²⁾ Форма α. и γ. у насъ съ железистыми волосками на цвѣтоножкахъ и чашечкахъ, чего авторами этихъ формъ не упоминается; у γ. изъ-подъ Серпухова, хотя

Maláchium aquáticum (L.) Fr. (II, стр. 127).—Sch. VI, № 1656.

Кромѣ обычной формы у насъ еще:

α. arenarium Godr. Стебли распростертыя, короткіе, 10—30 см.; самые нижніе стеблевые листья на черешкахъ; основаніе листа округлое. По песку на берегу р. Оки противъ Лужниковъ, Срп. у. (П.).

Herniária glábra L. (II, стр. 130).

У насъ пока можно различить слѣдующія формы:

α. typica Beck. Растеніе голое, только стебель покрытъ очень короткими волосками.

β. ciliata (Bab.) Wirtg. Стебель какъ у α; все листья или только нѣкоторые по краю или только у основанія и у верхушки очень коротко-рѣсничатые, иногда и чашечка слегка опушена.

Núphar púmилum (Timm.) Sm. (II, стр. 132).—Хор. II, стр. 19.

Луково озеро, Вгр. у. (X.).—Въ пруду у Озорова близъ платформы Катуаръ, Брянск. ж. д., Зви. у. (Ассъ).

Núphar advénium Soland. (II, къ стр. 132).

Надводные листья частью плавающіе, частью торчащіе надъ водой, округло-овальные или яйцевидные, кожистые, темно-зеленые, съ выемкою нѣсколько расходящеюся; подводные листья почти округлые, тонкіе, перепончатые; черешки и нижняя поверхность надводныхъ листьевъ часто опушены; цвѣтки сжато-сфероидальные, желтые или даже съ красноватымъ оттѣнкомъ; чашелистиковъ 6, продолговатыхъ; лепестки продолговатые, усѣченные; тычинокъ 5—7 рядовъ; пыльники приблизительно равны нитямъ; дискъ рыльца волнистый, желтый или блѣдно-красный о 12—24 лучахъ; плодъ яйцеобразный, не глубоко перетянутый у шейки. Одичало въ рѣчкѣ близъ Саввинскаго монастыря, Зви. у. Проверено какъ мѣстонахожденіе, такъ и опредѣленіе Н. Θ. Золотницкимъ.

Nuphar advenum.

Cáltha palústris L. (II, стр. 136).

Вѣроятно, у насъ найдется нѣсколько формъ, но, къ сожалѣнію, этотъ видъ раздѣляется на subsp. по не зрѣлымъ листовкамъ, которыхъ

листья и короткіе, но по формѣ очень измѣнчивы, и, наконецъ, у формы β. стебель не высокій, чего не замѣтно на московскихъ экземплярахъ.

въ гербаріяхъ обычно не находится; формы же подвидовъ часто параллельны. Слѣдуетъ обратить вниманіе на этотъ измѣчивый видъ, но при сборѣ надо помнить, что это растеніе требуетъ для своего точнаго опредѣленія какъ цвѣтки, такъ и полувзрѣлые плоды. Въ герб. А. А. Хорошкова имѣется полный экземпляръ, который можно опредѣлить какъ:

ssp. laeta Schott, Nym. et Kotsch. Листовки со спинки прямыя или почти прямыя, съ брюшной стороны сильно выпуклыя, съ короткимъ носикомъ въ 1—1,5 мм. дл. (рѣдко до 2 мм.).

var. typica Beck. Листовки 9—12 мм. дл. вмѣстѣ съ носикомъ; листья кругомъ б. или м. зубчатые, съ тупыми зубцами.

Вѣроятно у насъ тоже будетъ:

ssp. genuina Hegi. Листовки какъ со спинки, такъ и съ брюшной стороны б. или м. выпуклыя (отчего почти эллиптическія), 7—10 мм. дл., съ носикомъ въ 1,5 мм. дл.

Tróllius europaëus L. (II, стр. 137).—Sch. IV, № 902.

Delphinium Consólida L. (II, стр. 138).—Sch. IV, № 1102.

Различаются разными флористами четыре формы, но каждая форма охарактеризована такими нестойкими признаками, что къ нашимъ растеніямъ ни одна форма вполнѣ не подходитъ; б. ч. у нашихъ особей признаки перемѣшаны или не все признаки выдержаны, но все же можно различить слѣдующія формы, хотя у major цвѣтки должны быть нѣсколько крупнѣе.

α. minor Beck. Чашелистики 8—11 мм. дл.; шпора 15—17 мм. дл.

β. major Beck. Чашелистики до 20 мм. дл. (у насъ 15—17 мм.); шпора 20—23 мм. дл.¹⁾.

γ. fl. pleno. Съ махровыми цвѣтками. Добрятино, Пдл. у. (Куль.).

Delphinium elátum L. (II, стр. 139).—Ф. Б. Пр., стр. 73.

De Candolle, въ Prodrómus I. p. 55, описываетъ *D. intermedium* и *D. cuneatum* какъ самостоятельные виды, характеризуя первый листьями съ сердцевиднымъ основаніемъ и голою завязью, а второй видъ листьями съ основаніемъ клиновидно-суженнымъ и опушенной завязью. Тамъ же приводится *D. villosum* Stev. (in litt. h. Dorpat.), которое отличается отъ *D. cuneatum* только черешками листьевъ, едва расширенными у основанія и не только съ густо-опушенной завязью, но и съ опушенными цвѣтоножками и прицвѣтниками. Почти все русскіе флористы, при описаніи формъ *D. elatum* L., указываютъ только на форму листьевъ, совершенно

¹⁾ Встрѣчаются все переходы отъ одной формы къ другой. Форму *minor* я видѣлъ довольно типичную, но у второй формы чашелистики не достигали 20 мм., за то шпора доходила до 23 мм., тогда какъ у Beck она показана не длиннѣе 22 мм. Пожалуй, промежуточную форму можно считать за *var. typicum* Erdner, у которой рыльце на молодыхъ листовкахъ загнуто крючкомъ, но что, кажется, бываетъ и у другихъ формъ.

опуская такой крупный признакъ, какъ опушеніе завязи и плода. E. Huth, въ Monogr. der Gattung Delphinium (Engler's Bot. Jahrb., XX Band), считаетъ *D. villosum* Stev. за самостоятельный видъ, соподчиняя ему какъ форму *D. cuneatum*, при чемъ даетъ полное описаніе *D. villosum* Stev., оговариваясь въ сноскѣ, что у Декандоля въ герб. лежитъ очень не полный экземпляръ, по которому нельзя судить объ этомъ видѣ; самъ же Huth располагалъ очень большимъ матеріаломъ. Хотя монографія Huth страдала очень многими погрѣшностями и даже у него неправильно отнесена къ *D. villosum* Stev. форма *tirolyense* Dalla Torre (последняя есть самостоятельный видъ, какъ это показалъ Kerner, въ Sched. ad Fl. Ex. Austro-Hung. № 2906), но въ нашихъ формахъ онъ, на мой взглядъ, разобрался вѣрно и наше *Delphinium* правильно понимать слѣд. образомъ:

Delphinium elatum L.

У насъ пока только форма:

- α. **intermedium DC.** Листья въ очертаніи округлые съ сердцевиднымъ основаніемъ, голые или покрыты рѣдкими волосками; завязь и зрѣлыя листовки голыя.

Delphinium villósum Stev. (II, къ стр. 139).

Стебель весь или только въ соцвѣтіи опушенный; листья пальчато-3—7-раздѣльные, съ основаніемъ то клиновиднымъ, то сердцевиднымъ; доли листьевъ глубоко надрѣзныя и зубчатыя, зубы острые; черешки листьевъ у основанія едва расширенныя; вѣнчикъ съ внутренней стороны голый, съ наружной б. или м. густо-опушенный; завязь и зрѣлыя листовки б. или м. густо-опушенные.

У насъ пока:

- α. **typicum Huth.** Листья у основанія сердцевидныя; все растеніе б. или м. густо-опушенное. Найдено пока только разъ въ Серебряномъ бору близъ Хорошова (II.).
- β. **cuneatum Stev. (sp.).**

Delphinium elatum. L. β. *cuneatum* DC. Сыр. Пл. Фл. II, стр. 140.—
Кауф. II, стр. 21.—Рупр.
стр. 86.—Кауф. I, стр. 34.

Листья у основанія клиновидно-суженныя; все растеніе б. ч. голое, исключая соцвѣтія, наружной стороны вѣнчика и листовокъ.

Aconitum Anthora L. (II, стр. 140).

Типичной формѣ этого вида присущъ стебель и цвѣтки съ прижатыми волосками. У насъ б. ч. попадаются особи съ волосками курчавыми и отстоящими. Такую форму можно отнести къ *f. collinum* Schur; но перѣдко можно найти особи, у которыхъ волоски слабо отстоятъ, и такія особи занимаютъ средину между типичной формой и *f. collinum*, при чемъ обѣ формы и всѣ переходы встрѣчаются только по береговой полосѣ р. Окп, Срп. у.

Aconitum excelsum Rchb. (II, стр. 140).

А. А. Хорошковъ нашелъ этотъ видъ въ большомъ количествѣ особей по крутому известняковому склону по опушкѣ кустарниковъ близъ д. Малое Саврасово, Пдл. у., между которыми попался одинъ экземпляръ съ бѣлыми цвѣтками (при сушкѣ нѣсколько пожелтѣвшими) и съ листовками въ различной степени опушенными (б. ч. слабо). Всѣ растенія какъ съ лиловыми цвѣтками, такъ и съ бѣлыми, отличались сравнительно малымъ ростомъ—не выше 80 см. Reichenbach, въ III. sp. *Aconitum generis* etc., приводитъ у довольно большого числа видовъ цвѣтки лиловые и желтые или бѣлые, и въ замѣткѣ при А. *Lycostonium* говоритъ, что при высеиваніи семени отъ особей съ лиловыми цвѣтками не рѣдко получалось у него нѣсколько особей съ цвѣтками желтыми; а относительно опушенія завязи и плодовъ замѣчаетъ, что у нѣкоторыхъ видовъ они бываютъ то голые, то опушенные. Новѣйшіе флористы смотрятъ на послѣдній признакъ нѣсколько иначе: они описываютъ у вида плоды голые, а съ опушенными плодами выделяютъ въ форму, называя таковую—*pubicarpum*, какъ это сдѣлалъ, напр., Gayet для вида *A. paniculatum* Lam.—*A. excelsum* Rchb. съ желтыми цвѣтками упоминался только разъ, оно было найдено С. П. Коржинскимъ въ Казанск. губ. и неправильно опредѣлено какъ *A. Lycostonium*, на что указалъ А. П. Петунниковъ въ Крпт. Обз. Моск. Фл. Второе нахожденіе этого уклоненія, но уже съ бѣлыми цвѣтками и въ Моск. губ., заставляетъ предполагать, что оно можетъ возникнуть во всей области его распространенія и, подобно *Seringe* и *Reichenbach*, которые отмѣтили такія уклоненія, выделяя ихъ въ особую форму, какъ, напр., *A. variegatum* L. *pallidiflorum* Ser. и *A. gracile* Rchb. f. *albiflora* Rchb., можно нашу форму назвать:

Aconitum excelsum Rchb. f. *albiflora*, характеризуя ее: бѣлыми цвѣтками и б. или м. опушенными завязью и плодами ¹⁾.

Aconitum lasiostomum Rchb. (II, стр. 141).—Хор. II, стр. 18.

Татарское-Сатино, Пдл. у. (X.).

Thalictrum minus L. (II, стр. 144).—Ф. Б. Пр., стр. 73.

На южномъ склонѣ обрыва близъ Стреева и на заливныхъ лугахъ близъ Старого села, Мож. у. (Ф. Б.).

У этого вида почти всѣ формы установлены на очертаніи листочковъ, но форма ихъ такъ измѣчива даже на одномъ и томъ же растеніи, что б. ч. бываетъ невозможно отнести опредѣляемое растеніе къ какой-либо формѣ. О чрезвычайной измѣчивости этого вида говорить Н. А. Бушъ,

¹⁾ *Aconitum excelsum* Rchb. f. *albiflora*. Floribus albis; carpellis et fructibus plus minus pubescentibus.

въ Фл. Кавказа, но все-таки, основываясь лишь на формѣ листочковъ, онъ находитъ возможнымъ описать двѣ новыхъ разновидности, а именно: *var. pratensis* Busch—*foliolis majusculis basi rotundatis, obtusiusculo crenato dentatis*, и *var. collina* Busch—*foliolis parvis, basi rotundatis v. late-cuneatis, acute dentatis*. Надо замѣтить, что вторая разновидность была описана много ранѣе съ тѣмъ же самымъ диагнозомъ и подъ тѣмъ же названіемъ—*var. collinum* Wallr. Какъ я уже упомянулъ, у насъ встрѣчаются особи съ смѣшанными признаками обѣихъ разновидностей, но, вѣроятно, можно найти и типичныя. Пока нѣтъ новыхъ монографій этого рода, я оставляю тѣ формы, которыя приведены у меня ранѣе, но къ нимъ слѣдуетъ прибавить еще форму, которая, однако, отличается очень характернымъ очертаніемъ листочковъ. Эта форма была пока найдена только развѣ и, по словамъ Н. А. Бушъ, встрѣчается спорадически.

♂. *Ledebouriana* (С. А. М.) Busch. Листочки мелкіе, узкіе, вытянутые въ длинное клиновидное основаніе и съ однимъ или двумя длинными острыми зубцами съ каждой стороны. На границѣ Брн. и Кіам. уу.—каменоломни въ пмѣнн. кн. Ливенъ «Спаскомъ» на р. Москвѣ (С.).

Thalictrum flavum L. (II, стр. 146).—Сыр. Отч. II, стр. 19.

α. *genuinum* Regel. Кустарники близъ Передѣлокъ, Зви. у. (С.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.).

β. *rufinerve* Regel. Д. Наумова, по берегу р. Мѣчи, Пдл. у. (Х.).

Thalictrum angustifolium Jacq. α. *stenophyllum* Wimm. et Gr. (II, стр. 146).—Sch. V, № 1352b.

Anemone nemorosa L. (II, стр. 149).

Близъ Богородскаго въ сыромъ словомъ лѣсу по берегу Сенежскаго озера, Клн. у. (Асѣ).

Anemone ranunculoides L. (II, стр. 150).

У насъ можно различить слѣдующія формы:

α. *genuina* Ulbrich. Листочки продолговато-яйцевидные или ланцетные, до узко-ланцетныхъ, зубчатые или надрѣзано-зубчатые; зубцы острые. Обычная форма.

β. *latifolia* Ulbrich. Листочки яйцевидные или нѣсколько узко-яйцевидные, края ихъ слегка покрываютъ одинъ другого, зубчатые или надрѣзные; зубцы тупые. Серебряный боръ близъ Хорошова (П.).

γ. *latisecta* Schur (var. *subintegra* Wiesbauer; var. *subintegerrima* Grun.). Листочки продолговато-яйцевидные или широко-линейные, цѣльнокрайніе, безъ зубцовъ или только у верхушки глубоко-надрѣзные. Близъ сл. Павловской, по кустарнику, Зви. у. (сообщено В. М. Козо-Полянскимъ).

Ranúnculus L.

Sect. Batrachium DC., переработано А. И. Петушниковым.

Ranúnculus pseudofláccidus Petunn. (II, стр. 153).

Ranunculus flaccidus Pers.—Sch. II, № 203.

Приведенный во II ч. Илл. Фл. Моск. губ. видъ, какъ указалъ О. С. Нешковъ, былъ описанъ много ранѣе (въ 1878 г.) О. Е. Клеромъ подъ именемъ *R. Kauffmannii* Clerc. по экземпляру, найденному въ Пермской губ. и у. Однако приведенное авторомъ описаніе¹⁾, въ которомъ не были отмѣчены особенности этой формы, не давало возможности установить тождество ея съ *R. pseudoflaccidus*, и только по сличеніи подлиннаго экземпляра, любезно доставленнаго О. Е. Клеромъ, вмѣстѣ съ другимъ матеріаломъ по части водяныхъ лютиковъ изъ Пермской губ., можно было подтвердить правильность указанія О. С. Нешкова. Оказалось, что эта форма, кромѣ первоначальнаго мѣстонахожденія, найдена была во многихъ другихъ пунктахъ Пермской губ. и въ очень многихъ мѣстностяхъ Средней Россіи.

Предстояло выяснитъ вопросъ, насколько этотъ видъ самостоятеленъ и какое мѣсто занимаетъ онъ среди другихъ видовъ водяныхъ лютиковъ. Уже изъ прежняго анализа этого вида, въ Крит. Обзорѣ Моск. Фл. (I, стр. 39—41) явствовало, что нашъ видъ ошибочно былъ названъ Кауфманомъ первоначально *R. fluitans* Lam., затѣмъ, слѣдуя Мейеру, переименованъ въ *R. flaccidus* Pers., который ошибочно былъ отождествленъ Коржинскимъ съ *R. paucistamineus* Tausch. какъ въ его Флорѣ Востока Евр. Россіи (стр. 77), такъ и въ Schedae ad Herb. Fl. Rossicae (№ 203). Ошибочность такого отождествленія подтвердилъ въ свое время Фрейнгъ (in litt.) и указалъ, что, по его мнѣнію, нашъ видъ ближе всего стоитъ къ *Batrachium carinatum* Schur (1876), которое Фрейнгъ такъ обстоятельно очертилъ, по сравненію съ *R. paucistamineus*, въ Schedae ad Herb. Fl. Austro-Hung. (№ 96), переименовавъ его въ *R. carinatus*; при этомъ, однако, на основаніи сообщеннаго ему матеріала изъ Россіи готовъ былъ признать въ нашей формѣ особую восточную расу этого вида. По описанію Фрейна, *R. carinatus* отличается отъ близко стоящаго *R. paucistamineus* слѣдующими признаками: зеленовато-бѣлый стебель покрытъ листьями сидячими и оттопыренными, между ними только нижніе коротко-черешковые; всѣ части растенія голыя, кромѣ листовокъ, влагалищъ и концовъ листовыхъ долей, усаженныхъ нѣсколькими щетинками, какъ иногда и силіи плодовъ; цвѣтки средней величины—1,5—2 см. въ поперечникѣ; лепестки

¹⁾ Въ Запискахъ Уральск. Общ. Люб. Ест., т. IV, стр. 107, «Списокъ растеній, собранныхъ въ 1872 г. дѣйств. чл. Общ. Н. Н. Ощепковымъ въ окрест. Архангело-Памійскаго завода, Пермскаго уѣзда».

обратно-яйцевидные, соприкасающіеся, 5—7 мм. дл.; тычинокъ 14—18; плодоложе яйцевидное до коническаго; плодопожки длинныя и сильно согнутыя, въ 3—4 раза длиннѣе противолежащихъ имъ листьевъ. Къ этому слѣдуетъ прибавить, что средній сегментъ листа мало развитъ по длинѣ отъ боковыхъ сегментовъ, хотя и отличается меньшимъ развитіемъ долей, въ противоположность листьямъ *R. paucistamineus*, у которыхъ средній сегментъ значительно короче остальныхъ и доли его сильно укорочены. Сверхъ того, чашечка при раскрытіи цвѣтка отгибается и не такъ быстро опадаетъ, какъ у *R. paucistamineus*. Общими признаками обоихъ сравниваемыхъ видовъ служатъ длина тычинокъ, не превышающая плодниковой головки, и отогнутыя рыльца, усаженные цилиндрическими соеочками. Такая форма *R. carinatus*, очень близкая къ описанной Фрейномъ и къ изданной въ гербаріи австро-венгерской флоры подъ № 96, встрѣчается, хотя сравнительно рѣдко, и у насъ. Первоначально (въ 1907 г.) найдена была она въ р. Серебрянкѣ за Пушкинымъ, Моск. у. (С.) и недавно въ р. Сѣтунѣ, Моск. у., близъ д. Нѣмчинова (П). Тѣмъ не менѣе наша форма разнится отъ описанной Фрейномъ числомъ тычинокъ, которое б. ч. не превышаетъ 11 и рѣдко доходитъ до 15. Другая же наиболѣе распространенная у насъ форма значительно разнится отъ типичной съ перваго взгляда уже тѣмъ, что листья у нея мягкіе, съ долями вѣтви стягивающимися въ кисть, а тычинки превышаютъ плодниковую головку. Эта форма и составляетъ *R. pseudoflaccidus* или правильнѣе *R. Kauffmannii* (Clerc), въ описаніи которой, приведенномъ на стр. 153. II т. Илл. Фл. Моск. губ., слѣдуетъ сдѣлать существенную поправку въ томъ отношеніи, что листья у нея черешковые только на боковыхъ вѣткахъ, на главномъ же стеблѣ такіе же сидячіе, какъ и у типичной формы *R. carinatus*. Во вниманіе къ этимъ отличіямъ отъ типичной формы, *R. Kauffmannii* слѣдуетъ считать разновидностью первой и удерживать за нею названіе: *Ranunculus carinatus* Freyn var. *Kauffmannii* (Clerc) Petunn.

Такимъ образомъ, въ «Московскую флору» слѣдуетъ внести ниже-слѣдующія дополненія и измѣненія:

***Ranunculus confervoides* Fr. forma terrestris**, описанная въ II ч. Илл. Фл. Моск. губ. какъ наземная форма этого вида, врядъ ли можетъ быть отнесена къ этому виду по той причинѣ, что въ указанномъ мѣстѣ не было найдено типичнаго вида *R. confervoides*, а по одиѣмъ наземнымъ формамъ нельзя рѣшить, къ какому виду она относится. Посему правильнѣе было бы удерживать за нею названіе *R. caespitosus* Thuill., какъ и за другой такой же формой, найденной А. А. Хорошковымъ на берегу Юрьевского озера, Пдл. у.

***Ranunculus carinatus* (Schur) Freyn.** Стебель зеленовато-бѣлый, довольно толстый (до 4 мм.), съ листьями сидячими и только нижними на боковыхъ вѣтвяхъ черешковыми, голыми, какъ и все растеніе; листья 2—4-кратно 3-вильчатые и къ концамъ 2—3-кратно 2-вильчатые; доли

листа оттопыренные и вѣѣ воды расходящіеся, оканчивающіеся 2—3 щетинками; цвѣтоножки въ полтора-два раза длиннѣе соответствующихъ листьевъ; плодоножки еще больше превышаютъ листья; цвѣтки среднихъ размѣровъ (1,2—1,5 см.); лепестки обратно-яйцевидные, соприкасающіеся краями (6—7 мм. дл. и 3—3,5 мм. ш.), бѣлые, о 7—8 излкахъ, съ желтымъ погонкомъ и желтымъ пятномъ при основаніи; тычинокъ 10—12, рѣдко до 15, не превышаютъ плодниковой головки или едва превышаютъ ее; рыльце яйцевидное, отогнутое, съ цилиндрическими сосочками; плоды на спинкѣ голые или съ рѣдкими щетинками; плодоложе яйцевидное до коническаго, густо усажено щетинками. Цвѣтетъ съ мая по августъ.



Ranunculus carinatus.

var. *Kauffmannii* (Clerc) Petunn.

Ranunculus pseudoflaccidus Petunn. Сыр. Псл. Фл. II, стр. 153.

Листья мягкіе, доли ихъ вѣѣ воды стягиваются въ кисть; тычинокъ 9—11, длиннѣе плодниковой головки. Въ ручьѣ, впадающемъ въ р. Серебрянку близъ Пушкина и въ р. Чачинѣ близъ Ромашкова (Ассѣ).

***Ranunculus circinatus* Sibth. (II, стр. 155).**

Какъ одно изъ отличій этого вида отъ остальныхъ, слѣдуетъ отмѣтить длину средняго сегмента листьевъ, равную боковымъ сегментамъ, хотя и съ меньшимъ вѣтвленіемъ долей, но на болѣе длинномъ вторичномъ черешкѣ.

Въ рѣкѣ Македоновкѣ—притокѣ Пехорки, Брн. у., а также въ р. Нахрѣ близъ Михайловскаго, Пдл. у., найдена была форма съ тонкими нитевидными стеблями и съ очень короткими и притомъ мягкими черешковыми листьями. Такая форма была описана Заналовичемъ какъ разновидность:

***Ranunculus circinatus* Sibth. var. *petiolatus* Zapal. ¹⁾.**

***Ranunculus Flammula* L. (II, стр. 156).**

У насъ можно различить слѣдующія формы:

α. *erectus* Neir. (typicus Beck).

Стебель прямой или восходящій, но не изгибающійся, голый извѣтъ и все растеніе или только цвѣтоножки и чашечки слабо опу-

¹⁾ H. Zapalowicz, Consp. Fl. Galic. crit. II, p. 253 (1908).

шены; всѣ листья цѣльнокрайніе или корневые зубчатые, а стеблевые цѣльнокрайніе или съ рѣдкими зубцами ¹⁾).

β. *serratus* DC. Какъ α., но всѣ листья явственно- и остро-зубчатые.

γ. *pilifer* Beck. Стебель б. ч. слабый, б. или м. густо покрытъ щетинистыми волосками, болѣе густо на верхушкѣ, цвѣтоножкахъ и на чашечкѣ.

δ. *gracilis* G. Mey.

ε. *repens* L. (sp.)

Ranunculus Lingua L. (II, стр. 158).—Sch. II, № 352a.

Какъется типичной формы *R. Lingua* или какъ ее называютъ *typica* Beck—совершенно голой, у насъ нѣтъ; всѣ экземпляры, видѣнные мною, были б. или м. густо покрыты волосками, т.-е. *hirsutus* Wallr.

Ranunculus auricomus L. (II, стр. 159).

Ranunculus auricomus L. α. *typicus* Kauffm.—Sch. № 1551.

Для этого вида разными авторами приводится много разныхъ формъ; всѣ онѣ различаются по формѣ листьевъ б. ч. корневыхъ; но сколько ни старался, я не могъ подвести наши растенія ни подъ одну изъ формъ; у б. ч. нашихъ лютиковъ признаки смѣшанные: корневые листья одной формы, а стеблевые—другой. Для формы *incisifolius* Rehb. есть у этого автора рисунокъ безъ корневыхъ листьевъ. Beck и Hegi почему-то относятъ эту форму къ *var. reniformis* Kittel съ корневыми листьями не раздѣльными, тогда какъ у насъ встрѣчается *f. incisifolius* Rehb. съ глубоко-раздѣльными корневыми листьями. Оставляя форму *incisifolius* съ описаніемъ какъ у Rehb., я долженъ прибавить къ этому виду еще форму: *fallax* Wimm. et Grab., которая была соподчинена этому виду, а не *R. cassubicus*, какъ это ошибочно приведено у меня; описаніе этой формы слѣдующее:

β. *fallax* Wimm. et Grab. Корневые листья 5—7-лопастные; лопасти обратно-яйцевидныя, зубчатая, съ нижней стороны слегка опушенная; растеніе крупное. Эта форма образуетъ какъ бы переходъ къ *R. cassubicus* L.

Ranunculus cassubicus L. (II, стр. 160).—Sch. III, № 851.

α. *fallax* Wimm. et Grab. Въмѣсто этого названія слѣдуетъ:

α. *elatio* Rupr. Описаніе, данное у меня для *fallax*, относится къ этой формѣ, только слѣдуетъ прибавить: корневые листья 3 (6)-лопастные. Эта форма параллельна формѣ *R. auricomus* L. β. *fallax*; она была найдена близъ Сукова (С.).

Ranunculus ácer L. α. hortensis Mart. (II, стр. 161).

Близъ Пушкина по дорогѣ въ Листвяны (Ассь).

¹⁾ Glück описалъ еще *f. natans* и *f. submersus*, которыя всецѣло связаны съ мѣстомъ обитанія и которыя переходятъ одна въ другую, если условія измѣняются. Обѣ формы можно соподчинить *erectus* Neilr., и онѣ у насъ встрѣчаются.

Ranunculus nemorósus DC. (II, стр. 162).—Хор. II, стр. 18.

Послѣ тщательнаго изученія всѣхъ собранныхъ въ Моск. губ. экземпляровъ, я пришелъ къ заключенію, что у насъ настоящаго *R. nemorosus* DC., или какъ его теперь называютъ *R. Breynius* Crantz, нѣтъ. Нашу форму описалъ еще въ 1869 году Ruprecht въ *Fl. Caucasica*, p. 16 и назвалъ: *R. polyanthemus* L. β . *latifolius*; отличается она отъ *R. nemorosus* DC. только носкомъ плода, который у послѣдняго вида длинный и только на концѣ загнутый, тогда какъ у нашей формы онъ короткій и загнутъ почти отъ основанія. Слѣдовательно у насъ будетъ:

Ranunculus polyanthemus L. (II, стр. 161).

Кромѣ обычной формы еще:

α . *glaber* Wimm. et Grab.

β . *latifolius* Rupr. (пои Neilr.).

Долы листьевъ широкія, часто 3-лопастныя, зубчатая, основаніе ихъ длинно-клиновидно-суженное; все растеніе б. или м. густоволосистое, особенно густо покрыты отстоящими волосками черешки листьевъ. Кромѣ приведенныхъ мѣстъ для *R. nemorosus* еще: въ осиново-березовомъ лѣсу близъ Татарскаго-Сатина, Пдл. у. (X.).

γ . *fl. pleno*.

Ranunculus répens L. (II, стр. 162).

Различаютъ слѣд. формы: *typicus* Beck,—листья тройчатые, листочки 3-лопастные, всѣ или только срединный на черешкѣ; *myrrhiphyllus* Wallr.,—листья двояко-тройчатые, листочки 3-надрѣзные, надрѣзы зубчатые. Обѣ эти формы могутъ быть: голыя—*glaberrimus* Koch, или густо опушенныя—*hirsutus* Koch; кромѣ всего, то съ лежащими стеблями, то прямостояція—*procumbens* Gaud. и *erectus* DC.,—и еще съ мелкими цвѣтками, лепестки которыхъ не крупнѣе 8 мм. дл.—*parviflorus* Busch. Всѣ эти формы у насъ есть, но различить ихъ почти невозможно, такъ какъ наблюдаются всѣ постепенные переходы и даже на одномъ и томъ же растеніи листья бывають обѣихъ формъ. Конечно, можно встрѣтить какую-либо типично выраженную форму, но б. ч. признаки бывають смѣшаны.

Chelidónium május L. (II, стр. 166).

У насъ еще:

γ . *fl. pleno* Beissn. ¹⁾. Съ махровыми цвѣтками. Горенки—въ паркѣ у запруды (Куль.).

¹⁾ См. Beissner, Regel's Gartenflora. 1879, p. 292.

Corydalis fabacea Pers. ¹⁾ (II, кь стр. 168).*Corydalis fabacea.*

Клубень маленький, шаровидный, плотный; стебель 10—25 см., очень пёжкий, б. ч. простой, рёже слабо-вѣтвистый, съ чешуевиднымъ овальнымъ листомъ у нижняго листа; листья въ 2—3, они двояко-тройчато-раздѣльные, съ глубоко надрѣзными и туповатыми долями; кисть (1) 2—8-цвѣтковая; прицвѣтники овальные, цѣльнокрайніе; цвѣтки лиловато-розовые; столбикъ прямой, какъ и тычиночныя нити; плодоножки въ 3 раза короче плода. Одинъ экземпляръ обь одномъ плодѣ находится въ гербаріи (П.) изъ-подъ Игнатьева, Кзм. у.,—указанъ также во Фл. Средн. Россіи Маевского, 4 изд., въ Дмт. у., по р. Пкшѣ (найдено Мос.²⁾).

Corydalis sólida (L.) Sm. (II, стр. 168).

У насъ иногда встрѣчаются растенія, у которыхъ прицвѣтники только у нижнихъ цвѣтковъ крупно-зубчатые, остальные—цѣльнокрайніе; у типа же всѣ прицвѣтники должны быть глубоко-надрѣзные.

Nasturtium austriacum Crantz (II, стр. 174).—Сыр. Отч. III, стр. 12.

Въ канавѣ у насъши Савеловск. ж. д. близъ Владыкина; дорога по заливному лугу р. Пахры близъ с. Зеленаго, Брн. у. (С.).

Nasturtium amphibium (L.) R. Br. α. riparium Tausch (II, стр. 176).

Между Прилуками и Кошелевкой, Срн. у. (X.).

Barbarea vulgaris R. Br. α. arcuata Wahlenb. (II, стр. 180).

Barbarea arcuata Rehb.—Sch. V, № 1505a.

У насъ, какъ кажется, встрѣчается только эта форма. В. Я. Цингеръ, въ *Verz. der bis jetzt in Gouv. Tula beob. Phaner. u. Gefässcrypt.* (Bull. d. l. Soc. Imp. d. Nat. d. Moscou 1881), приводя перечень растеній Тульской губ., упоминаетъ подъ № 46 *Barbarea vulgaris* R. Br. α. *typica* и

¹⁾ Правильнѣе называть этимъ именемъ, такъ какъ Persoon описалъ его въ Syn. 1807 г., а не *C. intermedia* Merat, котораго *Nouv. Fl. de Paris* появилась 1812 г., и тѣмъ болѣе приписывать этому виду названіе *C. intermedia* Р. М. Е. (такъ это дѣлаютъ Aschers. et Gr. и нѣкоторые другіе флористы) тремъ авторамъ: Patze, Meyer et Elkau, работа которыхъ: *Flora der Prov. Preussen, Königsberg, Borntrager*, вышла въ 1850 г.

²⁾ Н. А. Мосоловъ въ письмѣ къ А. Н. Петуниному сообщилъ слѣдующее: собрано это растеніе близъ ст. Пына, саженьхъ въ 200 ближе къ Москвѣ, по опушкѣ березоваго лѣса; опредѣлялъ это растеніе Б. А. Федченко, которому оно и было передано.

β. arcuata Koch и прибавляет: «*Caeterum variat glabra et hirsuta*». У насъ встрѣчаются какъ голыя, такъ и б. или м. покрытыя волосками; слѣдовательно у насъ какъ *subf.* можно различить:

a. *glabra* W. Zinger. Все растеніе голое.

b. *hirsuta* W. Zinger. Стебель, листья и черешки б. или м. густо покрыты волосками.

***Barbarea stricta* Andrzej.** (II, стр. 180).—Хор. II, стр. 18.

Пищирь, Пдл. у. (X.).

А. А. Хорошковъ нашелъ въ Михайловскомъ, Пдл. у., довольно своеобразную тѣсную форму этого вида; она расла по сырой низинѣ спущеннаго пруда въ довольно большомъ числѣ особей; ее можно назвать:

α. *foliosa*¹⁾. Все соцветіе покрыто маленькими, но вполне развитыми листьями, не отличающимися по формѣ отъ верхнихъ стеблевыхъ.

***Arabis Gerárdii* Bess.** (II, стр. 181).—Сыр. Отч. III, стр. 12.—Хор. IV, стр. 17

и ***Arabis hirsuta* (L.) Scop.** (II, стр. 182).—Хор. II, стр. 17.

Въ Московской губ. эти два вида очень плохо различимы; б. часть экземпляровъ приближается къ *A. Gerárdii*, но типичное *Gerárdii* встрѣчается сравнительно рѣдко; чаще находишь особи съ смѣшанными признаками: сѣмена съ пленчатымъ краемъ, отгибающимся половину сѣмени, и съ краемъ, отгибающимся все сѣмя вокругъ, иногда можно встрѣтить у одного и того же растенія; не выдержаны также у нашихъ растеній признаки, приведенные Н. А. Бушъ въ Мат. Фл. Кавк., а именно: стебель внизу съ одними вѣтвистыми волосками и сѣмена явственно-пунктированные у *A. Gerárdii*, и стебель внизу несетъ также и простые волоски, а сѣмена не ясно пунктированные у *A. hirsuta*. Я видѣлъ особи со всеми признаками *A. Gerárdii*, но у основанія стебля были и простые волоски. Повторю, въ нашей области эти два вида какъ бы не совсѣмъ обособились и въ нѣкоторыхъ случаяхъ нельзя опредѣленно сказать, къ какому виду ближе данный экземпляръ.

Новыя мѣста для *A. Gerárdii* Bess.: дер. Луковня по прав. берегу р. Пахры и по той же рѣкѣ близъ Манькиной горы, Пдл. у. (X.).—Известныя по берегу Москвы р. близъ устья р. Пахры, Брп. у. (С.).—Ляпково, Руз. у. (П.) ошибочно приведено было для *A. hirsuta* Scop., оно относится къ этому виду.

***Arabis péndula* L.** (II, стр. 182).—Хор. IV, стр. 17.

По береговому откосу къ р. Москвѣ близъ Перервы (П. и X.).

¹⁾ *Barbarea stricta* Andrzej. α. *foliosa*. Inflorescentia tota foliis parvis bene evolutis tecta, a foliis caulinis superioribus non distinctis.

Cardamine pratensis L. (II, стр. 184).

У насъ кромѣ типичнаго: *α. typica Beck*, характеризующагося сидячими или почти сидячими листочками у стеблевыхъ листьевъ, еще:

- β. dentata (Schultes) Neilr.* Всѣ листочки или только у нижнихъ стеблевыхъ листьевъ на б. или м. длинныхъ черешкахъ; форма листочковъ довольно разнообразная, б. ч. они по краямъ съ однимъ или нѣсколькими зубчиками, рѣже широко-яйцевидно-эллиптические, цѣльнокрайніе; растеніе б. ч. голое, но встрѣчаются и густо опушенные—это *subf. pilosa Beck*, эту последнюю я видѣлъ изъ-подъ Лужниковъ (II.).

*γ. vivipara Goldb.***Cardamine amara L.** (II, стр. 185).—Sch. IV, № 1156.

- α. hirta Wimm. et Grab.*, правильнѣе называть: *umbrosa (Lejeune) O. F. Schulz*, такъ какъ второе названіе было дано въ 1811 г., а первое въ 1829 г. Эта форма, кажется, встрѣчается чаще голой.
- β. macrophylla Wenderoth.* Листья очень крупныя: корневые 8,5—12 см. дл., конечный листочекъ 22—25 мм. въ поперечникѣ; стеблевые листья 9—12,5 см. дл., конечный ихъ листочекъ часто глубоко 2—3-разѣченный, 3,5—8,5 см. дл. и 18—48 мм. ш. Найдено между другими особями въ Дарынѣ, Зви. у. (X.).—По сырому лугу р. Исканы близъ Клементьева, Руз. у. (Сюз.).

Sisymbrium Loesélia L. (II, стр. 188).

Кромѣ обычной формы съ не густымъ опушеніемъ у насъ еще:

- α. dense-hirta N. Busch.* Все растеніе очень густо покрыто отстоящими щетинистыми волосками. Симоновъ монастырь (II.).

Sisymbrium Sophia L. (II, стр. 189).

Кромѣ обычной формы у насъ еще:

- α. glabrata N. Busch.* Почти голое; стебель иногда волосистый. Косино (II.).—Мытщи (С.).

Sisymbrium strictissimum L. (II, стр. 189).—Хор. III, стр. 92.—Ф. Б. Пр., стр. 73.

Въ ольховыхъ кустарникахъ по берегу р. Пахры близъ д. Луковня, Пдл. у. (X.).—Въ ольшаникѣхъ близъ Стресса, Ольгина и Телятьева, Мож. у. (Ф. Б.).

Sisymbrium Alliaria (L.) Scop. (II, стр. 190).

Alliaria officinalis Andrzej. Ф. Б. Пр., стр. 73.

По берегу р. Пахры близъ Канакова, Пдл. у. (X.).—Имѣіе Колчуга (Зубалова) близъ Усова по сырому кустарнику у р. Медвенки, Зви. у. (Ассы).

Erysimum cheiranthoides L. (II, стр. 192).

α. nanum W. Zinger. Сыр. Отч. III, стр. 12.—Хор. II, стр. 18.

Д. Манькина гора на известняковомъ склонѣ, Пдл. у. (X.).
Старыя каменоломни на р. Москвѣ близъ Каменной Тяжны,
Бри. у. (С.).

Эта форма была найдена мною въ громадномъ количествѣ особей близъ Каменной Тяжны безъ переходовъ къ тину и нѣсколько иного облика, чѣмъ растенія, изданныя въ Herb. Fl. Ross. за № 1458, но это объясняется мѣстомъ находженія; изданныя въ академическомъ гербаріи были собраны на опушкѣ лѣса, слѣдовательно въ полутѣни, и они обладаютъ всеми признаками тѣневыхъ формъ; собранныя же мною росли на открытомъ мѣстѣ, отчего они очень жесткія, сѣдя отъ сильнаго опушенія прижатými волосками, и листья у нихъ мельче; одинъ признакъ у найденныхъ мною растеній уклоняется отъ тина, а именно: цвѣтоножки б. ч. равны чашечкѣ и только нѣкоторыя длиннѣе ея, отклоненныя же отъ цвѣтоноса плодоножки и стручки заставляютъ причислить ихъ къ этому виду, а не къ *E. hieraciifolium*, на который найденное растеніе походитъ.

β. umbrosum Choroschkov. Подъ этимъ именемъ, хотя и не такъ полно, была описана та же разновидность у Rouy et Foucaud, Fl. de France, II, p. 28; слѣдовательно наша форма будетъ именоваться **β. umbrosa Rouy et Fouc.**

Erysimum hieraciifolium L. (II, стр. 192).

Каменоломни близъ Каменной Тяжны на р. Москвѣ, Бри. у.; по лѣсной дорогѣ между Барвихой и Усовымъ, Зви. у. (С.).—По известнякамъ близъ д. Навлинской, Пдл. у. (X.).—Лопасня у ж.-д. моста, Сри. у. (II.).

Erysimum odoratum Ehrh. (II, стр. 193).—Ф. Б. Пр., стр. 73.

Conringia (Heist.) Link (II, въ стр. 193).

Стручки линейные, 4-гранные, во много разъ длиннѣе плодоножки; перегородка толстая, губчатая съ углублениями для сѣмянъ (у *Erysimum* тонкая, пленчатая).

Conringia orientalis (L.) Andrzej. Растеніе однолѣтнее; стебель 10—50 см., прямостоящій, простой, рѣже слегка вѣтвистый, голый, какъ и все растеніе; нижніе листья обратно-яйцевидные, переходятъ въ короткій черешокъ; остальные овальные съ округлой верхушкой или тупые и съ основаніемъ глубоко-сердцевидно-стрѣловидно-стеблеобъемлющимъ; всѣ листья цѣльнокрайніе, нѣсколько мясистые, сизоватые; соцвѣтіе—колючая кисть, по мѣрѣ отцвѣтанія удлиняющаяся; чашечка равна цвѣто-

пожкѣ; лепестки свѣтло-желтые, узкіе; столбикъ съ выемчатымъ рыльцемъ; стручки 6—10 см. дл. на короткой отстоящей плодоножкѣ; створки объ одной жилкѣ; сѣмена точечныя. Найдено разъ занесеннымъ подъ мостомъ черезъ р. Ходынку въ плодахъ и цвѣткахъ въ іюнѣ (Гей.).



Conringia orientalis.

***Sinápis álba* L.** (II, стр. 196).

Измайловскій Звѣринецъ, сѣянный лугъ; стручки густо покрыты отстоящими жесткими волосками (Ассъ).—Раменское, на свалкахъ, Брн. у., тоже съ волосками на стручкахъ (С.).

***Alýssum minimum* Willd.** (II, стр. 198).

Между Серпуховымъ и Прилуками, Спрн. у. (Ассъ).

***Bertéroa incana* (L.) DC.** (II, стр. 199).

Кромѣ обычной формы у насъ еще:

- α. ***viridis* Tausch (sp.)**. Растеніе почти зеленое; стручечки болѣе вытянутые, съ болѣе заостренной верхушкой; тѣневая форма. Онушка Серебряного бора близъ Хорошова (П.).
β. **fl. pleno**. Съ густо-махровыми цвѣтками. Найдено только разъ на заливному лугу р. Учи за Пушкинымъ (С.).

***Drába répens* M. B.** (II, стр. 200).—Сыр. Отч. III, стр. 13.

Заливной лугъ р. Москвы между д. Коломеецъ и Заозерье, Брн. у. (С.).

***Cochleária Armorácia* L.** (II, стр. 202).

Клементьево по берегу озера. Руз. у. (Сюз.).—У канавы на заливному лугу р. Москвы близъ Заозерья, Брн. у. (С.).

***Camelina sativa* Crantz и *C. dentata* Pers.** (II, стр. 203—204).

Благодаря прекрасной работѣ Н. В. Цингеръ «О засоряющихъ посѣвы льна видовъ *Camelina* и *Spergula*» и изданнымъ имъ же экземплярамъ *Camelina* въ Herb. Fl. Ross., за №№ 1952 по 1955 вкл., можно было разобраться въ нашемъ матеріалѣ, хотя и очень скудномъ. Приведенные мною два вида *C. sativa* и *dentata*, Н. В. Цингеръ соединяетъ въ одинъ видъ, отличая ихъ какъ разновидности.

***Camelina sativa* Crantz.**

ssp. glabrata (DC.) N. Zinger. Все растеніе почти голое или только въ нижней части стебель покрытъ довольно густо отстоящими волосками, а въ остальной части стебель рѣдко-волосистый; листья ланцетные, многочисленные, но не столь частые, какъ у *C. microsagra*; стручечки до 8 мм. дл. на длинныхъ отклоненныхъ плодоножкахъ,

но не отогнутых вниз; столбикъ на стручечкахъ 2—2,5 мм. дл. Часто.

ssp. linicola (Sch. et Sp.) N. Zinger. Все растение б. ч. голое, съ немногими, рѣдко расположенными узкими листьями; стручечки до 11 мм. дл., на длинныхъ плодonoжкахъ, въ нижней части соцвѣтія отогнутыхъ нѣскольکو книзу; столбикъ на стручечкахъ не длиннѣе 2 мм.

var. dentata Wallr. Корневые и нижніе стеблевые листья перисто-надрѣзные или ланцетные; остальные выемчато-зубчатые. Показано только разъ Черныевымъ; Н. В. Цингеръ выражаетъ сомнѣніе о пахожденіи этой формы въ Средней Россіи.

var. integrifolia Wallr. Всѣ листья цельнокрайніе. Близъ д. Рыбаки, Моск. у., въ посѣвѣ овса (С.), хотя эта форма чаще растетъ во льнѣ, но въ этой мѣстности очень часто разводятъ ленъ¹⁾.

Lepidium Draba L. (II, къ стр. 205).

Стебель прямостоящій, 30—50 см., опушенный, простой или вѣтвистый; стеблевые листья сидячіе, овальные или продолговато-овальные, по краямъ выемчато-зубчатые, основаніе ихъ сердцевидно-стрѣловидно-стеблеобъемлющее; чашечка съ бѣлой каймой; вѣнчикъ бѣлый, въ два раза длиннѣе чашечки; стручечки сердцевидные, съ вздутыми створками, на плодonoжкахъ почти горизонтально отклоненныхъ; столбикъ до 1,5 мм. дл. Александровскій садъ въ Москвѣ (В. Я. Цингеръ), запесено, теперь исчезло. Подъ Серпуховымъ близъ станціи, 6 іюня въ цвѣту (гр. Е. Соллогубъ).

Capsella bursa pastóris (L.) Moench (II, стр. 206).

А. Н. Петушиковъ и А. А. Хорошковъ нашли въ очень большомъ числѣ особей близъ д. Навлинское на р. Пахрѣ, Пдл. у., уродливую форму, у которой ось соцвѣтія была сильно укорочена, такъ что цвѣтки сидѣли совершенно сближенно, при чемъ ось и цвѣтoножки довольно густо опушены; стручечки частью нормальные, а частью съ длинно-вытянутымъ основаніемъ, отчего кажутся какъ бы на ножкѣ; края чашечки и частью сама чашечка розовые.



Lepidium Draba.

¹⁾ Н. В. Цингеръ говоритъ, что между этой формой и *ssp. glabrata* встрѣчаются переходы; эти промежуточные формы онъ предлагаетъ называть: *sublinicola* N. Zinger; онѣ, вѣроятно, встрѣчаются и у насъ.

Eúclidium R. Br. (II, къ стр. 208).

Стручечки округло-овальные съ двумя, рядомъ расположенными одноосѣнными гнѣздами, не раскрывающіеся; столбикъ косою, на плодахъ коническо-шиловидный.

Eúclidium syriacum R. Br. Растеніе однолѣтнее, въ 10—30 см.;



Euclidium syriacum.

стебель растопыренно-вѣтвистый, покрытъ короткими 3-раздѣльными волосками; листья продолговатые, къ основанію суженные, по краямъ зубчатые; соцветіе удлинняющееся по мѣрѣ цвѣтенія, съ цвѣтками только на верхушкѣ; цвѣтки сидячіе; лепестки желтые, не длиннѣе 1 мм.; стручечки косые, шершавые отъ 3-раздѣльныхъ волосковъ.

Найдено только разъ въ большомъ числѣ особей близъ полотно М.-Курск. ж. д. подъ Серпуховымъ, занесено (гр. Е. Соллогубъ).

Búnias orientális L. (II, стр. 208).

У насъ еще:

α. fol. variegatis ¹⁾. Листья по краямъ съ широкой бѣлой или слегка желтоватой росписью, верхушечные почти сплошь желтоватобѣлые. Известняки у устья р. Пахры, Брн. у. (С.).

Droséra obovāta Mert. et Koch (II, стр. 212).—Хор. II, стр. 19.
Луково озеро, Бгр. у. (X.).

Sempervivum soboliferum Sims. (II, стр. 216).—Ф. Б. Пр., стр. 73.

На южномъ песчаномъ склонѣ близъ с. Борисова, Мож. у. (Ф. Б.).
Лѣсъ по долині р. Яхромы, Дмт. у. (сообщ. II. Петровымъ; въ герб. у него нѣтъ).

Ribes rúbrum L. (II, стр. 223).—Хор. II, стр. 18.

На порослѣхъ ольхой известняковомъ склонѣ между д. Булатовой и Шигашиной, Пдл. у. (X.).—Свиблово, Владыкино (Ассы).—Тимоново близъ границъ Владимірска. губ., Дмт. у. (сообщено Е. Коняевой).

¹⁾ *Bunias orientalis* L. *α. fol. variegatis*. Foliis ad marginem albo vel albo-stramineo late pictis, superioribus fere toto stramineo-albis.

Мнѣ было сдѣлано замѣчаніе, что наше растеніе слѣдуетъ называть *R. pubescens* Hedl., а не *R. rubrum* L.; это невярно; встрѣчающееся у насъ растеніе есть именно *R. rubrum* L., которое вездѣ разводится и которое разносится человѣкомъ и птицами; дикорастущая же красная смородина, которая именуется *R. pubescens* Hedl. или *R. rubrum* L. var. *pubescens* Schwarz, у насъ нѣтъ; она отличается отъ нашей густымъ опушеніемъ молодыхъ вѣтвей и отчасти листьевъ; такую смородину мнѣ приводилось видѣть въ большомъ количествѣ по берегамъ р. Тифлидской Аа и ее смѣшивать съ нашей нельзя.

Ribes nigrum L. (II, стр. 223).—Sch. III, № 877.

На топкомъ кустарниковомъ болотѣ въ долинѣ р. Ихромы близъ с. Подмошья. Дмт. у. (II. Петровъ).—По болоту близъ Бирева. Дмт. у., въ огромномъ количествѣ (II. и Асѣв).

Alchimilla L. (II, къ стр. 237).

Вѣѣ *Alchimilla* моего гербарія и частью гербарія А. Н. Петунникова были опредѣлены Harald Lindberg'омъ, который въ своей монографіи «Die nordischen Alchemilla - Formen» ссылается на этотъ матеріалъ. За послѣднее время Линнеевскій видъ *A. vulgaris*, влѣдствіе всесторонняго изученія, разбитъ Buser'омъ и Lindberg'омъ на большое число мелкихъ видовъ, различающихся, хотя и очень мелкими признаками, но довольно хорошо, въ противоположность *Hieracium*, признаки которыхъ доведены въ нѣкоторыхъ случаяхъ почти до неуловимости. Для Моск. губ. пока извѣстны 8 мелкихъ видовъ, изъ которыхъ одинъ *A. gibberulosa* Lindb. описанъ по моимъ экземплярамъ.

1. Цвѣтоножки сплошь до самой чашечки покрыты густыми волосками. 2.

Цвѣтоножки голыя или только у нижнихъ цвѣтковъ покрыты разсѣянными волосками, а у верхнихъ голыя; рѣже цвѣтоножки въ нижней своей половинѣ покрыты длинными волосками, а близъ чашечки голыя, но тогда волоски сидятъ на маленькихъ буторкахъ. 3.

2. Листья съ нижней стороны сплошь серебристо-опушенные, а равно и цвѣтоножки, отчего клубочки цвѣтковъ серебристые; какъ внутренніе, такъ и наружные чашелистики густо войлочнопутышенные.

A. pubescens (Lam.) Buser.

Листья съ нижней стороны серебристо опушены только по жилкамъ, сплошь серебристое опушеніе только на молодыхъ листьяхъ; клубочки цвѣтковъ тускые, не серебристые; наружные листочки чашечки только по краямъ рѣсничатые, внутренніе густо опушенные.

A. hirsuticaulis Lindb. fil.

3. Стебель въ нижней части и черешки листьевъ покрыты прижатыми волосками. *A. acutidens Buser.*

Стебель и черешки листьевъ покрыты отстоящими или отогнутыми внизъ волосками. 4.

4. Съ нижней стороны листья по жилкамъ густо опушены волосками, отклоненными внизъ, особенно близъ основанія листа; цвѣтолке крупное, густо опушенное; волоски на маленькихъ бугоркахъ; цвѣтоножки близъ чашечки голыя, только въ нижней ихъ половинѣ покрыты длинными волосками.

A. gibberulosa Lindb. fil.

Листья съ нижней стороны по жилкамъ б. или м. густо опушены, но волоски либо отстоящіе, либо направлены вверхъ; цвѣтолке голое или б. или м. опушенное, но волоски не на бугоркахъ; цвѣтоножки голыя, рѣже только у нижнихъ цвѣтковъ опушенныя. 5.

5. Стебель въ нижней половинѣ опушенъ жесткими волосками, направленными внизъ. *A. strigosula Buser.*

Стебель опушенъ разнообразно, но волоски въ нижней части стебля никогда не направлены внизъ. 6.

6. Листья съ верхней стороны преимущественно въ складкахъ покрыты рѣдкими волосками; внутренніе чашелистики съ наружной стороны голые. *A. subcrenata Buser.*

Листья съ верхней стороны по всей поверхности или только по складкамъ покрыты густыми волосками; внутренніе чашелистики снаружи съ рѣдкими или частыми волосками, рѣдко голые, но тогда цвѣтолке у основанія длинное и узкое. 7.

7. Цвѣтолке покрыто рѣдкими волосками, очень рѣдко голое, съ округлымъ основаніемъ, поздиѣ кубарчатое; листья съ обѣихъ сторонъ бархатистые. *A. pastoralis Buser.*

Цвѣтолке всегда голое, длинное, у основанія узкое; листья густо опушены б. или м. прижатыми волосками. *A. micans Buser.*

Alchimilla hirsuticaulis Lindb. fil. Растеніе густо опушенное; стебли 6—30 (15—25) см., по всей длинѣ густо опушенные горизонтальными волосками въ 1 мм. дл., нѣсколько жесткими; черешки 1.5—15 см. дл. съ густыми отстоящими волосками; листья сѣро-зеленые, съ обѣихъ сторонъ бархатисто-опушенные, только въ молодости шелковистые, поздиѣ только по жилкамъ серебристые, въ очертаніи почковидные или почти круглые, б. ч. 4.5—6 см. ш. и 3—5 см. дл., съ 7—9 довольно короткими лопастями, б. или м. округлыми; съ каждой стороны лопасти 4—5—6 зубцовъ, туповатыхъ или тупыхъ; вырѣзъ листа на 2—8 мм. отъ основанія цвѣтлокрайній безъ зубцовъ; цвѣтоножки 1—3 мм. дл. густо опушенныя; цвѣтки 3.5—4.5 мм. въ поперечникѣ; цвѣтолке колокольчатое, густо-опушенное отстоящими или почти отстоящими волосками, иногда едва

шелковистое, въ живомъ видѣ 3 5—4 мм. дл.; въ сухомъ 3 мм. дл.; чашелистики снизу б. или м. густо опушенные, наружные меньше внутреннихъ и б. ч. только по краю рѣсничатые. В. Мытищи. Пушкино (С.).—Между Сходней и Химками (Х.).—Звенигородъ (Г. С.).—Крюково (П. П.).—Воробьева гора. Симоньевъ монастырь. Малаховка (П.).



Alchimilla hirsuticaulis.




Alchimilla pubescens.


***Alchimilla pubescens* (Lam.) Buser.** Растеніе густо опушенное; стебли тонкіе, 6—25 (10—20) см., опушены по всей длинѣ густыми мягкими отстоящими, слегка направленными вверхъ и едва курчавыми волосками въ 1 мм. дл.; черешки 4—12 см. дл., опушены какъ и стебель; листья сѣро-зеленые, б. или м. складчатые, съ обѣихъ сторонъ опушены мягкими волосками, съ нижней стороны серебристыми (въ тѣни слабо, но замѣтно серебристыми); оцѣтание ихъ округлое, 3,5—5 см. въ поперечникѣ, съ 7—9 короткими почти полукруглыми лопастями; послѣднія о 4—5 (6) зубцахъ съ каждой стороны; зубцы тупые, широкіе; цветоножки 1—2 мм. дл., густо покрыты отстоящими волосками, почти войлочномъ; цвѣтки 3—3,5 мм. въ поперечникѣ; цвѣтоложе почти полушаровидное, очень густо шелковисто-опушенное; въ сухомъ видѣ цвѣтоложе 2,5—3 мм. дл.; чашелистики короткіе, тупые, съ наружной стороны густо войлочно-опушенные. В. Мытищи (С.).—Клементьево, Ряз. у. (Сюз.).

***Alchimilla gibberulosa* Lindb. fil.** Стебель 10—25 см., сплошь, довольно густо-опушенный горизонтальными или близъ основанія слегка обращенными внизъ волосками, какъ и черешки листьевъ; листья почковидные или округлые, 3—7 см. ш. и 2,5—6 см. дл., съ верхней стороны опушеніе не густое или опушеніе только по складкамъ, съ нижней стороны б. или м. густое, особенно густо по жилкамъ, гдѣ волоски отклонены внизъ и слабо шелковисты; лопастей б. ч. 9, округлыхъ или нѣсколько вытянутыхъ о 6 (4—8) зубцахъ съ каждой стороны; зубцы часто нерав-

ные, слегка пригнуты къ верхушкѣ листа; вырѣзь листа на 3—12 мм. отъ основанія пальнокрайний безъ зубцовъ; цвѣтоножки опушенныя только въ нижней ихъ половинѣ длинными отстоящими волосками или голыя; цвѣтоложе крупное, почти шаровидное, густо опушенное отстоящими волосками, сидящими на маленькихъ бугоркахъ; наружные чашелистники много короче внутреннихъ, все слабо опушены длинными волосками или только по краю рѣсничатые¹⁾. Мытищи (С.).



Alchimilla gibberulosa.




Alchimilla pastoralis.

***Alchimilla pastorális* Buser.** Растеніе сѣро-зеленое, густо опушенное; стебли 10—35 см., по всей длинѣ опушены густыми горизонтальными волосками въ 1 мм. дл., равно какъ и черешки, въ 2—20 см. дл.; листья сѣро-зеленыя, съ обѣихъ сторонъ бархатисто-опушенные, только въ молодости съ нижней стороны по жилкамъ слабо-серебристыя, въ очертаніи почковидные, рѣже округлыя, 3,5—10 см. ш. и 2,5—9 см. дл., б. ч. на 1 см. шире длины; лопастей 9, полуяйцевидныхъ или округлыхъ; зубцовъ съ каждой стороны 7—9, ровныхъ, мелкихъ, туповатыхъ; срединный зубецъ мельче остальныхъ; цвѣтоножки 1—2,5 мм. дл., голыя; цвѣтки 3—4 мм. въ поперечникѣ; цвѣтоложе обратно-яйцевидное, основаніе его обыкновенно слегка округлое, поздиѣ кубарчатое, 3—3,5 мм. дл., въ сухомъ видѣ 2,5—3 мм. дл., покрыто б. или м. рѣдкими отстоящими волосками, рѣдко густо опушено или голое съ одиночными волосками; чашелистники съ наружной стороны покрыты б. или м. рѣдкими волосками, рѣже густо опушены; наружные опушены только по краймъ или на концѣ съ одиночными волосками. Мытищи (С.).

¹⁾ Главное отличіе этого вида заключается въ маленькихъ бугоркахъ подъ волосками, которые не всегда явственно замѣтны; замѣтиѣ всего они на отцвѣтшихъ цвѣтоложѣхъ, но иногда встрѣчаются особи, у которыхъ только часть цвѣтковыхъ бугорками.

Alchimilla micans Buser. Растение темно-зеленое, густо опушенное, исключая верхней части; стебли тонкие, 5—30 (в тѣни до 50) см., въ нижней части покрыты мягкими горизонтальными волосками, въ средней—густыми отстоящими, въ верхней—разсыянными отстоящими, рѣже почти голые; на осеннихъ экземплярахъ стебли покрыты въ разной степени отстоящими волосками; черешки 4—20 (30) см. дл., б. или м. густо опушены отстоящими волосками; листья съ обѣихъ сторонъ густо опушены б. или м. прижатыми волосками, съ нижней стороны по жилкамъ серебристые, въ очертаніи почковидные или рѣже округлые, 3.5—12 см. ш. и 3—10 см. дл., о 9 (11) довольно длинныхъ закругленныхъ или слегка заостренныхъ лопастяхъ; зубцовъ съ каждой стороны 7—9 (11), узкихъ, острыхъ или тупыхъ; цветоножки 2—5 мм. дл., голыя или у самыхъ нижнихъ цвѣтковъ съ отстоящими волосками; цвѣтки 4—4.5 мм. въ поперечникѣ; цветоножке длинное, у основанія узкое, всегда голое, въ живомъ видѣ 3.5—4 мм. дл., въ сухомъ 3—3.5 мм. дл.; всѣ чашелистики довольно длинные и узкіе, на концѣ съ немногими волосками или голые. Б. Мытищи (С.).—Воробьевы горы (П.).—Серпуховъ (Сюз.).—Царицыно; между Муталовымъ и Чашниковымъ (Х.).



Alchimilla micans.



Alchimilla strigosula.

Alchimilla strigosula Buser. Растение синеовато-зеленое или желто-зеленое, б. или м. опушенное; стебли 10—30 (45) см., нижняя ихъ половина покрыта жесткими, б. или м. явственно внизъ отогнутыми волосками, верхняя часть опушена б. или м. густо отстоящими волосками, рѣдко почти голая; самые верхніе развѣтвленія покрыты рѣдкими волосками или голыя; черешки 4—24 см. дл., густо опушены слегка внизъ направленными волосками; листья съ обѣихъ сторонъ густо опушены отстоящими волосками, отчето бархатистые, рѣже только съ нижней стороны по жилкамъ съ отстоящими волосками или еще рѣже съ верхней

стороны только по складкам; очертаніе листьевъ совершенно круглос, 3,8—7 (9) см. въ поперечникѣ, съ 9—11 короткими закругленными рѣдко (на крупныхъ экземплярахъ) слегка вытянутыми лопастями; зубцовъ съ каждой стороны (6) 7—9 (10) ровныхъ, туповатыхъ или заостренныхъ; цвѣтоножки 1,5—5 мм. дл., голыя, рѣдко только у нижнихъ цвѣткѣ съ разсѣянными отстоящими волосками; цвѣтки 4—5 мм. въ поперечникѣ; цвѣтоложе при созрѣваніи у основанія округлое, кубарчатое или полушаровидное, 3—4 мм. дл., чаще голос, рѣже только у нижнихъ цвѣткѣ съ одиночными или рѣдкими волосками; чашелистики у нижнихъ цвѣткѣ на концѣ б. или м. опушены, у верхнихъ голые или почти голые; наружные чашелистики по краю б. или м. рѣсничатые. Б. Мытищи (С.).—Царицыно, Вишняки, М.-Каз. ж. д. (X.).

Alchimilla subcrenata Buser. Растеніе зеленое или желто-зеленое, густо опушенное только по стеблямъ и черешкамъ; стебли тонкіе, въ сухомъ видѣ слабо лоснящіеся, 8—65 (20—50) см., въ верхнихъ развѣтвленіяхъ голые или почти голые, въ остальной части коротко и мягко-опушенные отстоящими волосками; черешки 2—50 см., густо опушены отстоящими волосками; листья съ верхней стороны б. ч. голые или слабо опушенные отстоящими волосками, болѣе густо по складкамъ; нижняя ихъ сторона опушена очень равномерно, но не густо, по жилкамъ отстоящими волосками, отчего они не серебристые; очертаніе листьевъ довольно округлое, 2,8—17 см. ш. и 2,5—16 см. дл., съ 9 (рѣдко съ 11) глубокими и широкими лопастями; зубчиковъ съ каждой стороны 6—8, крупныхъ и неравныхъ; цвѣтоножки 1—2 (3) мм. дл., совершенно голыя; цвѣтки мелкіе, 2,7—3 мм. въ поперечникѣ; цвѣтоложе колокольчатое, голос, 2,5—3 мм. дл.; чашелистики голые, иногда только у нижнихъ цвѣткѣ съ немногими короткими волосками. Б. Мытищи (С.).—Вратовщина, Дмт. у. (II.).



Alchimilla subcrenata.

Alchimilla acutidens Buser, Lindb. fil. ampl.¹⁾ Растеніе зеленое, слабо опушенное; стебли б. ч. лежачіе, 4—4,5 см., тонкіе, до вторыхъ вѣтвей (рѣже до 1-хъ или до 3-хъ) разсѣянно-прикато-волосистые, равно какъ и черешки листьевъ, но болѣе густо; листья съ верхней стороны голые или съ немногими волосками въ складкахъ, съ нижней стороны опушены только по жилкамъ, б. или м. серебристыми волосками, рѣже слабое опушеніе на нижнихъ лопастяхъ; въ очертаніи листья почковидные, округлые или круглые, 2,5—12 см. ш. и 2—10 см. дл., съ 9 (11) б. ч. короткими, широкими и округлыми лопастями, рѣдко слегка вытянутыми; зубцовъ съ каждой стороны (6) 7—9, довольно мелкихъ; цвѣтоножки всегда голыя

1—2 (3) мм. дл.; цвѣтки 3.5—4 мм. въ поперечникѣ; цвѣтоножка колокольчатое съ узкимъ основаніемъ, всегда голое, въ живомъ видѣ чаще 3 5—4 мм. дл., въ сухомъ 3—3,5 мм. дл.; всѣ чашелистики узкіе, длинныя, почти всегда голыя, рѣдко съ единичными волосками ¹⁾. Б. Мытницы (С.).—Между Муталовымъ и Чапниковымъ (Х.).

Agrimonia Eupatoria L. (II, стр. 238).

Въ описаніи листьевъ слова «покрыты густымъ звѣздчатымъ пушкомъ» замѣнить: покрыты сѣрымъ пушкомъ, почти войлокомъ съ железками.

Кромѣ обычной формы у насъ еще:

α. **grandis** (Andrzej.) Aschers. et Gr. Во всѣхъ частяхъ растеніе очень крупное, густо опушенное, съ болѣе густымъ соцветіемъ, болѣе крупными и болѣе широкими плодами. Калчуга, Успенское, Пиславское, Зви. у. (Х.).—Между Бачмановымъ и Протопоповымъ, Кзм. у.; Каменоломни по берегу р. Москвы въ имѣніи кн. Ливень «Спасекомъ», на границѣ Бри. и Кзм. уу. (С.).—Воробьевы горы (II).

β. **fallax** Fiek. Листья съ нижней стороны мало опушены, почти зеленые—тѣневая форма.

γ. **minor** Koch. Растеніе маленькое; почти всѣ листья собраны близъ основанія стебля, образуютъ какъ бы розетку; стеблевыхъ листьевъ очень мало; соцветіе сравнительно рѣдкоцвѣтковое. Красный Станъ на известнякахъ по берегу р. Москвы, Руз. у. (Сюз.).

Agrimonia pilosa Ledb. (II, стр. 239).

Въ описаніи листьевъ вмѣсто словъ «нижняя сторона листьевъ безъ звѣздчатого пушка» поставить: нижняя сторона листьевъ голая, только по жилкамъ покрыта волосками ²⁾. Кунцово, Остапкинское (Ассы).



Alchimilla acutidens.

¹⁾ Въ Тамбовской и Тульской губерніяхъ показано еще *A. glabriuscula* Lindb. fil., которое, вѣроятно, будетъ найдено и въ Московской. Отличія его слѣдующія: стебель и черешки листьевъ совершенно голыя; листья довольно волосистые или волоски только по складкамъ и на краяхъ; снизу листья у верхушекъ являюкъ прижато-волосистые, въ остальныхъ частяхъ голыя; цвѣтки мелкіе, совершенно голыя.

²⁾ А. А. Ассъ сообщилъ мнѣ, что ему приходилось видѣть *A. Eupatoria*, у которой цвѣтки были желтые и *A. pilosa* съ цвѣтками оранжевыми. По гербарнымъ экземплярамъ трудно различить окраску, а въ живомъ видѣ она хорошо замѣтна только у распускающихся цвѣтковъ, когда же цвѣтокъ отцвѣтаетъ, то окраска его у *A. Eupatoria* сильно блѣднѣетъ; б. часть нѣмецкихъ флористовъ для *A. Eupatoria* приводятъ золотисто-желтый цвѣтъ, а Шмальгаузенъ—оранжевый. На Западѣ было найдено *A. Eupatoria* съ бѣлыми цвѣтками—*albiflora* Caspary. Вѣроятно, окраска цвѣтковъ у этихъ видовъ измѣнчива.

Agrimonia Eupatoria × pilosa Abromeit.

А. И. Петушиниковъ нашелъ въ Руз. у. по берегу р. Москвы противъ Краснаго Стана экземпляръ *Agrimonia*, у котораго соединены признаки обоихъ видовъ; растеніе по стеблю опушено отстоящими, горизонтальными волосками; нижняя сторона листьевъ почти голая; листочки у листьевъ частью какъ у *A. Eupatoria*, частью какъ у *A. pilosa*; прилистники же какъ у *A. pilosa*, а равно и цвѣтки мелкіе, какъ у послѣдняго вида; отъ формы *fallax* отличается какъ разнообразными листочками, такъ и мелкими цвѣтками. Изъ-за такого смѣшенія признаковъ, я рѣшился отнести найденное растеніе къ помѣси этихъ видовъ.

Sanguisorba officinális L. (II, стр. 240).

¹ Кромѣ обычной формы у насъ еще:

- α. **auriculata (Scop.) Focke.** Листочки съ прилистничками, тогда какъ у типа листочки безъ нихъ. Эта форма очень не стойкая, не говоря уже о томъ, что обѣ формы часто растутъ вмѣстѣ; но есть растенія, на которыхъ часть листьевъ съ прилистничками и часть безъ нихъ.

Filipéndula Ulmária Maxim. (II, стр. 241).

У насъ пока можно различить слѣдующія формы:

α. **denudata Beck.**

Filipendula Ulmaria Max. var. *denudata* Hayne.—Sch. III, № 871.

- β. **pubescens Beck.** Корневые листья съ нижней стороны голые, только по жилкамъ слабо опушенные; стеблевые же слабо опушены съ нижней стороны и между жилокъ. Косино (X.).

- γ. **subdenudata Fritsch.** Корневые листья какъ у β., стеблевые же съ нижней стороны по жилкамъ густо опушены, а между жилокъ покрыты б. или м. густо сѣрыми волосками, почти войлокомъ, но всегда мѣстами просвѣчивають зелень листа. Воробьевы горы (II.).

- δ. **glauca (Schultz) Aschers. et Gr.** (= *tomentosa* Max.¹).

Filipéndula hexapetála Gilib. (II, стр. 242).—Sch. II, № 512.—Хор. III, стр. 93.**Rûbus chamaémorus L.** (II, стр. 243).—Ф. Б. Доп., стр. 3.—Ф. Б. Нов. дан., стр. 172.

Болото близъ д. Игнатково, Мож. у., Осташевской вол. (Ф. Б.). Торфяное болото близъ ст. Поварово, Ник. ж. д., Зви. у. (сообщ. Г. Ширяевымъ).—Селевкино, торфяное болото къ Карповкѣ, Дмит. у. (Н. Слущкинъ).

¹) Эта форма описана Schultz'емъ въ Fl. Starg. Suppl. 26, 1819, какъ особый видъ, а Максимовичемъ отмѣчена, какъ разновидность, въ 1879 г.

Rúbus árticus L. (II, стр. 244).

Кустарниковое тонкое болото близъ с. Подмошье, Дмт. у. (Н. Петровъ).

Rúbus idaéus L. (II, стр. 245).

У насъ пока кромѣ обычной формы еще:

- α. **angustifolius Schmidely.** Листочки узкіе, явственно-ланцетные, продолговато-ланцетные или даже ланцетные, просто-зубчатые или иногда на цвѣтушихъ побѣгахъ двояко-и почти надрѣзочно-зубчатые. Успенское, Зви. у. (X.).
- β. **inciso-serratus Utsch** ¹⁾. Листья какъ у тина, но двояко-зубчатые, частью глубоко надрѣзочно-зубчатые, особенно на цвѣтушихъ побѣгахъ. Въ лѣсу близъ поселка Ново-Удѣльное по М.-Каз. ж. д., Бри. у. (С.).

Rubus caésius L. (II, стр. 247).

У насъ пока можно различить слѣдующія формы:

- α **aquaticus Wh. et N.** Стебли у отпрысковъ голые; листочки плоскіе, тонкіе, глубоко-надрѣзочно-зубчатые, часто лопастные, съ нижней стороны слабо опушенные; цвѣтоножки длинныя, тонкія. По берегамъ рѣкъ и по сырымъ мѣстамъ. Усово, Зви. у.; Коломна, Невѣрово, Кзм. у. (II.).
- β. **dunensis Noeldeke.** Стебли у отпрысковъ слегка войлочко-опушенные, б. ч. со многими шипами; листочки не крупныя, морщинистые, жесткіе, съ нижней стороны густо опушены; цвѣтоножки короткія. Близъ Серпухова (II.).
- γ. **arvalis Richb.** Походить на форму β., но стебли у отпрысковъ голые, покрыты не частыми шипами. Часто.

Fragária L. (II, стр. 248).

1. Волоски ²⁾ на цвѣтоножкахъ горизонтально-отстоящіе или даже нѣсколько отогнутые внизъ. 2.
Волоски на цвѣтоножкахъ прижатые или отстоящіе подъ угломъ, но не горизонтально и не отогнуты внизъ. 3.
2. Лепестки не покрываютъ краями одинъ другаго; листья снизу б. ч. только по жилкамъ серебристо-опушенные, между жилокъ голые или слабо опушенные; чашечка при плодахъ оттопыренная или отвороченная; ягода обратно-яйцевидная.

F. moschata Duch.

¹⁾ См. Hybr. im Gen. Rubus., Jahrb. d. Westfál. Prov. Ver. für Wiss. u. Kennt. Münster 1894.

²⁾ При опредѣленіи видовъ *Fragaria*, слѣдуетъ обращать вниманіе на опушеніе цвѣтоножекъ, а не цвѣтоносовъ, какъ это часто дѣлають.

Лепестки обыкновенно покрывают одинъ другого краями; листья снизу сплошь серебристо-опушенные; чашечка прижата къ плоду; ягода шаровидная. *F. viridis* Duch. *α. neglecta* Lindm. (sp.).

3. Лепестки покрывают краями одинъ другого; листья б. ч. съ обѣихъ сторонъ серебристо-волосистые; чашечка прижата къ плоду; послѣдній у основанія не покрытъ сѣменами. *F. viridis* Duch.

Лепестки не покрывают краями одинъ другого; листья б. ч. только снизу серебристо-волосистые; чашечка оттопырена отъ плода или отогнутая; плодъ покрытъ сѣмечками до основанія.

F. vesca L.

Fragária vesca L. (II, стр. 248).

У насъ еще форма:

- β. *eflagellis* Ser. Растеніе крупное, до 30 см.; листья на очень длинныхъ черешкахъ. б. ч. равныхъ стеблямъ или превышающихъ ихъ; послѣдніе многоцвѣтковые; побѣговъ б. ч. нѣтъ; плоды б. ч. удлинненно-конические. Въ Удѣльномъ лѣсу близъ Мытищъ (С.).

Fragária viridis Duch. (II, стр. 250).

У насъ кромѣ обычной формы еще:

- α. *neglecta* Lindm. (sp.). Цвѣтоножки густо покрыты горизонтально-отстоящими волосками или только часть волосковъ отстоящая подъ угломъ, а остальные горизонтальные¹⁾. Бѣлые Колодези и близъ с. Озеры, Калм. у. (II. и С.).

Potentilla L.²⁾ (II, стр. 251).

Переработалъ А. Н. Петунниковъ и сноски его же.

Potentilla álba L. (II, стр. 254).—Пет. Отч., стр. 13.

Potentilla argentea L. (II, стр. 255).

Слѣдуетъ отмѣтить два весьма характерные признака для отличія этого вида отъ нѣкоторыхъ близкихъ къ нему формъ изъ группы *Collinae*,

¹⁾ Aschers. et Gr., Beck и др. флористы приводятъ помѣси всѣхъ видовъ; у этихъ помѣсей признаки перемѣшаны, опушеніе же цвѣтоножекъ б. ч. бываетъ двухъ родовъ на одномъ и томъ же растеніи. Вышеприведенные авторы форму *neglecta* Lindm. считаютъ за помѣсь *F. viridis* × *moschata*.

²⁾ Описаніе, встрѣчающихся въ Моск. губ. видовъ, во II ч. Илл. Фл. Моск. губ., появилось годомъ ранѣе изданія монографіи этого рода, въ обработкѣ д-ра Вольфа. Такъ какъ монографія располагалъ очень обширнымъ матеріаломъ и изъ Россіи, въ частности съ меня по Моск. губ., то онъ имѣлъ полную возможность разобраться въ восточно-европейскихъ формахъ съ достаточною основательностью и подтвердить многое изъ ранѣе опубликованнаго мною по этой части. Опираясь на обширную монографію Вольфа и на его отзывъ послѣ вторичнаго просмотра имъ нашего матеріала и нашихъ данныхъ, предостояло пересмотрѣть какъ прежде со-

а именно: исключительно войлочное опушение нижней стороны листочковъ, т.-е. изъ однихъ курчавыхъ волосковъ, безъ примѣси жесткихъ щетинокъ вдоль жилокъ, и сравнительно короткія, толстыя цвѣтоножки, торчащія во время плодоношенія.

По поводу разграниченія многочисленныхъ разновидностей этого вида Вольфъ замѣчаетъ, что онъ выдвигаетъ на первый планъ форму листочковъ, а не ихъ опушеніе, и рекомендуетъ для изученія разновидностей брать не корневые листья, которые обыкновенно очень сходны у всѣхъ разновидностей, и не осенніе побѣги, а нормальные стеблевые листья во время цвѣтенія, по веснѣ и лѣтомъ. На этомъ основаніи встрѣчающіяся у насъ разновидности могутъ быть распределены слѣдующимъ образомъ ¹⁾:

1. Листочки въ очертаніи продолговатые, продолговато-обратно-яйцевидные или широко-обратно-яйцевидные, рѣже линейно-продолговатые, по краю зубчатые или перисто-надрѣзные, съ зубцами обыкновенно цѣльными. 2.

Листочки въ очертаніи широко-обратно-яйцевидные, раздѣленные на длинныя и расходящіяся лопасти, въ свою очередь зубчатые.

var. dissecta Wallr.

У этой разновидности двѣ формы:

1. **viridescens Th. Wolf.** Листья съ верхней стороны зеленые, голые или слабо опушенные, съ нижней стороны сѣро- или бѣло-войлочные.

2. **cinerascens Th. Wolf.** Листья съ обѣихъ сторонъ б. или м. густо сѣро-войлочные.

2. Средниная жилка въ нижней цѣльной части листочковъ окружена замѣтною пластинкою листочка. 3.

Листочки разсѣченные на линейные или продолговато-линейные сегменты почти до срединной жилки, которая не окаймлена пластинкой листочка въ нижней цѣльной ихъ части.

var. tenuiloba Schwarz.

3. Стебли лежащіе или слабо приподнимающіеся; листья крупныя, особенно корневые; листочки б. ч. плоскіе безъ завернутаго края и съ нижней стороны покрыты не густымъ войлокомъ; соцвѣтіе раскидистое, рѣдкоцвѣтковое. Найдено только разъ по холмамъ близъ Серпухова (П.).

var. decumbens (Jord.) Focke ²⁾.

бранимый матеріалъ, такъ и накопившійся за послѣднее время, дабы согласовать описаніе и номенклатуру съ установленными въ монографіи.

¹⁾ Aschers. et Gr. въ Syn. признаютъ за главный признакъ опушеніе, а потому нѣкоторыя формы, приведенныя у этихъ авторовъ, хотя и одноименныя, описаны иначе.

²⁾ Th. Wolf. указываетъ, что эта разновидность по очертанію листьевъ можетъ приближаться то къ var. typica, то къ dissecta, а по опушенію даже къ incanescens (Opiz) Focke, но со стеблемъ всегда лежащимъ, прибавляя, что var. decumbens, показавшій, нельзя считать за разновидность, а скорее за форму typica, dissecta и in-

Стебли прямостоящіе или только у основанія приподнимающіеся; листочки б. ч. съ завернутыми краями и съ нижней стороны покрыты густымъ войлокомъ. 4.

4. Листья сверху слегка волосистые или почти голые, зеленые.

var. typica Beck.

Листья сверху густо волосистые, сѣрые или сѣдые.

var. incanescens (Opiz) Focke.

Объ послѣднія разповидности имѣютъ по двѣ формы:

1. **latisecta Th. Wolf.** Листочки съ широкой пластинкой, окружающей срединную жилку въ нижней цѣльной ихъ части и съ широкими зубцами—отъ 3-угольной до ланцетной формы.

2. **angustisecta (Sauter) Th. Wolf.** Листочки съ узкой пластинкой, окружающей срединную жилку въ нижней цѣльной ихъ части очень узкой полоской и съ узкими длинными зубчиками ланцетной, продолговатой или линейно-ланцетной формы.

Наибольшія трудности представляютъ теперь, какъ и прежде, разграниченіе и установленіе видовъ группы *Collinae*, которые, по словамъ Вольфа, будучи резко очерчены на Западѣ, у насъ представляютъ не мало переходныхъ формъ, быть можетъ, помѣсей. Тѣмъ не менѣе наши формы можно разграничить и выдѣлить три типичныхъ представителя этой группы, которые были извѣстны и описаны ранѣе, а именно: *P. collina* Wibel—теперь *P. Wibeliana* Th. Wolf., *P. thyrsoflora* Hülsen—теперь *P. thyrsoflora* (Hüls.) Zimm. и *P. leucopolitanoides* Blocki теперь *P. leucopolitana* P. I. Müller.

Potentilla Wibelina Th. Wolf (=P. collina Wibel).

Potentilla argentea × *thyrsoflora*. Сыр. Илл. Фл. II, стр. 256.

Переименована Вольфомъ на томъ основаніи, что въ прежнее время къ *P. collina* относили, если не все, то большинство формъ группы *Collinae*. Особой надобности въ этомъ переименованіи, пожалуй, и не чувствовалось, но отступать отъ установленной монографомъ номенклатуры неудобно. Этотъ видъ, описанный въ Илл. Моск. Фл. какъ помѣсь *P. argentea* × *thyrsoflora*, дѣйствительно ближе другихъ *Collinae* подходит къ *P. argentea* L. тѣмъ, что во время цвѣтенія не несетъ пучковъ или розетокъ корневыхъ листьевъ, которые, если и появляются, то только осенью, когда развиваются не цвѣтущіе осенніе побѣги; листочки стеблевыхъ листьевъ у основанія широко-клиновидные, къ верхушкѣ съ немногими, 2—3 зубцами, а опушеніе ихъ снизу такое же войлочное, только скорѣе сѣрое.

canescens. Экземпляръ, упомянутый въ Илл. Фл. Моск. губ. подъ *β. decumbens* Jord., относится къ *P. argentea* L. var. *typica* Beck. f. *latisecta* Th. Wolf., тогда какъ var. *decumbens* характеризуется главнымъ образомъ лежачимъ стеблемъ, какъ уже сказано выше.

а не блрое, какъ у *P. argentea*, безъ жесткихъ шетинистыхъ волосковъ вдоль жилковъ и по краямъ или лишь съ рѣдкими волосками; но присутствіе полузвѣздчатыхъ или, правильнѣе, пучковатыхъ волосковъ на верхней поверхности и особенно по краямъ листочковъ свидѣтельствуетъ о принадлежности этого вида къ группѣ *Collinae*. Отклоненныя или отогнутыя плодоножки—признакъ, свойственный всемъ *Collinae*, не признается, однако, Вольфомъ для этого вида, а между тѣмъ имъ отличается главнымъ образомъ *P. Wibeliana* отъ *P. argentea*, у котораго плодоножки торчашія. Другой же признакъ, выдвигаемый Вольфомъ—плоскіе края листочковъ у *P. Wibeliana* и отогнутые у *P. argentea*—вовсе не стойкій, и на немъ отличіе этихъ видовъ основать нельзя. Равнымъ образомъ и другой признакъ—слабо выступающій верхушечный зубецъ на листочкахъ—ничего стойкаго не представляетъ. Заслуживаетъ вниманія и еще одинъ признакъ: вѣтвление стебля чуть ли не съ самаго основанія, чего у *P. argentea* никогда не замѣчается.

Potentilla thyrsoflora (Hüls.) Zimm.

Potentilla thyrsoflora Hülsen. Сир. Илл. Фл. II, стр. 257.

Обозначенное первоначально Hülsen'омъ какъ разновидность *P. collina*, было возведено Циммеромъ въ самостоятельный видъ, а потому Вольфъ совершенно правильно обозначаетъ этотъ видъ, какъ приведено выше. Какъ описаніе, такъ и рисунокъ во II части Илл. Фл. Моск. губ. вѣрно передаютъ признаки этого вида, къ чему остается лишь прибавить, что типичное *P. thyrsoflora* характеризуется листочками съ широко-клиновиднымъ основаніемъ, глубоко-надрѣзочно-зубчатыми, съ 4—6 зубцами по сторонамъ, сверху съ слабымъ опушеніемъ и замѣтною зеленою окраскою, снизу съ рѣдкимъ войлокомъ, а по краямъ и по жилкамъ съ частыми прижатými жесткими волосками; очень тонкія и длинныя плодоножки, отогнутыя или у ихъ основанія, или у основанія чашечки, тогда какъ Вольфъ описываетъ ихъ едва наклоненными; 6—7-ные листочки у корневыхъ листьевъ, которые особенно выдвигаетъ Циммеръ какъ существенный признакъ, на нашихъ экземплярахъ не наблюдаются.

Potentilla argenteiformis Kauffm. (II, стр. 258).

Выдѣленное въ Моск. Фл. въ самостоятельный видъ, отнесено Вольфомъ не безъ основанія къ числу разновидностей *P. thyrsoflora Hülsen var. argenteiformis (Kauffm.) Th. Wolf.*, ибо все коренное различіе этой формы отъ типичной сводится къ слѣдующимъ признакамъ: сравнительно узкіе продолговатые или продолговато-обратно-ййцевидные листочки, къ верхушкѣ слабо расширенныя, съ болѣе чѣмъ числомъ (5—8) узкихъ зубцовъ съ каждой стороны, снизу съ частыми жесткими волосками вдоль жилокъ и по краямъ; въ отношеніи же опушенія верхней поверхности замѣчается большое разнообразіе: отъ сравнительно слабаго, какъ обыкновенно бываетъ у типичной формы, до очень частаго и густаго, придающаго поверхности листьевъ сѣрый оттѣнокъ.

Potentilla leucopolitana P. I. Müller.

Этот вид въ типичныхъ своихъ представителяхъ, какъ онъ былъ описанъ въ 1858 г. и изданъ Шульцемъ, въ его *Herb. pom.*, отличается густымъ опушеніемъ верхней поверхности листочковъ, коротко-или не глубоко-зубчатыхъ, съ тупыми или туповатыми зубцами въ верхней части, по 2—3 съ каждой стороны. Такой типичной формы пока у насъ не найдено, но встрѣчаются двѣ другія, а именно:

var. Schultzii (P. I. Müller) Th. Wolf. Стебли слабые, лежаціе или слегка приподнимающіеся, не выше 20 см.; корневые листья 5-ные; листочки продолговато-обратно-яйцевидные или продолговато-обратно-ланцетные, съ нижней стороны густо сѣро-войлочные, а съ верхней сѣро-зеленые; зубцы длинные продолговато-ланцетные, иногда почти линейно-ланцетные, острые; соцвѣтіе не густое; цвѣтки крупныя. Найдено только разъ между ж.-д. сторожкой и кладбищемъ близъ ст. Ока за Серпуховымъ (II.).

var. pliodonta Th. Wolf (P. leucopolitanoides Blocki).

Potentilla arenaria × *thyrsiflora*. Сыр. Илл. Фл. II, стр. 258.

По Вольфу характерную особенность составляетъ, какъ показываетъ само названіе, сравнительно большое число (4—6) зубцовъ съ каждой стороны листочковъ, обратно-яйцевидной или продолговато-обратно-яйцевидной формы; зубцы эти ланцетные или продолговато-ланцетные, острые или слегка туповатые. По замѣчанію Вольфа, эта разновидность находится въ такомъ же отношеніи къ типичному *P. leucopolitana*, какъ *var. argenteiformis* къ типичному *P. thyrsiflora*.

Var. pliodonta Th. Wolf. была изображена вполне вѣрно въ Илл. Фл. Моск. губ., но подъ назв. *P. arenaria* × *thyrsiflora*¹⁾.

Var. pliodonta Th. Wolf сильно распространена у насъ по долигѣ р. Оки и представляетъ весьма часто среднія или промежуточныя формы, а быть можетъ и помѣсь, какъ между этимъ видомъ и другими *Collinae*, такъ и съ *P. argentea*. Такъ, можно считать за помѣсь или промежуточную форму *P. leucopolitana* × *thyrsiflora* встрѣчающіеся у насъ экземпляры, по формѣ листочковъ и зубчатости схожіе съ *P. thyrsiflora*, а по опушенію (съ верхней стороны частыми короткими волосками, придающими всей поверхности тусклый оттѣнокъ, снизу же густымъ войлокомъ и частыми щетинистыми волосками вдоль жилокъ)—напоминающіе *P. leucopolitana*.

Комбинація, въ которой выражается одинъ изъ характерныхъ признаковъ *Collinae*—или пучекъ корневыхъ листьевъ или отклоненныя плодоножки, рядомъ съ формою и зубчатостію листочковъ или густымъ вой-

¹⁾ Эта помѣсь у насъ пока еще не найдена, но очень хорошо представлена въ Курск. губ. подъ Бѣлгородомъ, гдѣ она растетъ вмѣстѣ съ коренными видами, и отличается частымъ почти звѣздчатымъ опушеніемъ верхней поверхности листочковъ и почти войлочнымъ опушеніемъ нижней поверхности, состоящимъ изъ длинныхъ извилистыхъ пучковатыхъ волосковъ.

лочнымъ опушеніемъ ихъ снизу, какъ у *P. argentea*—отвѣчать промежуточной формѣ или помѣси *P. argentea* × *leucopolitana*.

Potentilla supina L. (II, стр. 259).

По берегу р. Москвы между Заозерьемъ и д. Коломцево, Бри. у. (С.).

Встрѣчающіеся у насъ представители этого вида относятся къ разновидности, которая первоначально была описана какъ самостоятельный видъ, вслѣдствіе уклонной или уродливой формы плодовъ съ боковымъ выростомъ или изъувачкомъ, и названа *P. paradoxa* Nutt. Академикъ Максимовичъ впервые показалъ, что, кромѣ формы плодовъ, *P. paradoxa* ничѣмъ не отличается отъ типичнаго вида и не составляетъ даже географической расы, такъ какъ встрѣчается не только въ Америкѣ, но по всей Сибири и захватываетъ всю восточную Европу. Вольфъ назвалъ этотъ видъ на степень разновидности — *P. supina* L. var. *paradoxa* (Nutt.) Th. Wolf. Растущая у насъ форма съ прямымъ стеблемъ, сильно вѣтвистымъ лишь въ верхней его части, должна быть отнесена къ *f. elatior* Lehm.

Слѣдуетъ еще замѣтить, что *P. supina*, какъ это принималъ Леманъ и Циммереръ, нельзя считать однолѣтнимъ растеніемъ, хотя оно часто цвѣтеть въ первый же годъ, но Вольфъ наблюдалъ 3- и 4-лѣтнія растенія, такъ что въ этомъ отношеніи *P. supina* совершенно сходно съ *P. norvegica*.

Potentilla norvegica L. (II, стр. 259).

Отличается сверхъ приведенныхъ въ описаніи признаковъ еще блѣдно-желтою окраскою очень маленькихъ лепестковъ и разрастаніемъ чашечки при плодоношеніи, а также и тѣмъ, что жесткіе волоски, покрывающіе все растеніе, сидятъ на бугоркахъ. Встрѣчающіеся на тучной почвѣ и на торфѣ пышные экземпляры *P. norvegica* отличаются расщепленіемъ листочковъ ихъ тройчатыхъ листьевъ и притомъ такъ, что либо боковые листочки расщепляются, и тогда получается пальчато-пятерной листъ, либо верхушечный листокъ расщепляется на три доли, и тогда получается перисто-пятерной листъ. Такая форма была описана впервые какъ самостоятельный видъ—*P. varians* Moench, а затѣмъ подъ именемъ *P. ruthenica* Willd.; но Леманъ отнесъ ее какъ разновидность *P. norvegica* L.

var. degenerata Lehm., а потому этому наименованію должно быть отдано предпочтеніе передъ *var. varians* Aschers. et Gr. Вольфъ, однако, низводитъ эту разновидность на степень простой формы, что едва ли правильно.

Potentilla intermedia L. γ. *canescens* Rupr. (II, стр. 261).—Sch. V, № 1570.

Potentilla recta L. (II, стр. 262).

Въ долині р. Яхромы, къ югу отъ Петракова, Дмит. у. (сообщилъ Н. Петровъ, но въ гербаріи у него нѣтъ).

Найденное у нас растение, всего два раза, должно быть отнесено къ той разновидности, которая характеризуется крупными блѣдно-желтыми цвѣтками, значительно превышающими чашечку, съ свѣтло-зеленой окраской листьевъ. Эта разновидность, установленная еще Ламаркомъ и Декандолемъ, подъ именемъ *var. pallida* Lam. et DC., описана въ Пл. Фл. Моск. губ.: синонимомъ этой формы не можетъ служить *P. obscura* Willd. или *P. recta* L. var. *obscura* Koch., отличающаяся золотистыми цвѣтками, не превышающими чашечки, и темно-зеленой окраской листьевъ. Не можетъ быть отнесенъ вообще къ *P. recta* L. экземпляръ, хранящійся въ гербаріи Максимовича подъ № 475, такъ какъ онъ, судя по сильному развитію наружныхъ чашелистниковъ, долженъ быть отнесенъ къ *P. taurica* Willd.,—виду, встречающемуся только на югѣ и совершенно несвойственному средней полосѣ Россіи.

Potentilla opaca L.

Описанное въ Пл. Фл. Моск. губ. подъ именемъ *P. rubens* Zimm. (II, стр. 264) было до сихъ поръ найдено только разъ близъ Серпухова, и, какъ показать подробный анализъ имѣющагося экземпляра, относится именно къ этому виду, а не къ другому близкому, выдѣленному Вольфомъ подъ именемъ *P. oraciformis*, и по его заключенію свойственному восточной Россіи и Сибири. Признаки, на основаніи которыхъ Вольфъ установилъ этотъ новый видъ, сводятся къ двумъ существеннымъ: къ формѣ столбиковъ, усѣянныхъ на поверхности сосочками (*styli papillosi*) и сидячими желтыми железками (если таковыя есть) на стеблѣ, листьяхъ и чашечкѣ. Исслѣдованный мною въ этомъ направленіи матеріалъ изъ разныхъ мѣстностей—отъ Москвы до Красноярска на востокъ и до Одессы на югъ—показалъ, что во многихъ областяхъ, губерніяхъ или уѣздахъ встречаются какъ тотъ, такъ и другой видъ, и не только въ Средней Россіи, но даже и далеко на востокъ (Челябинскъ, Тюмень, Минусинскъ), и слѣдовательно *P. oraciformis* вовсе не составляетъ даже географической расы; во-вторыхъ, сидячія железки не только не составляютъ признака, ибо иногда ихъ совсѣмъ не бываетъ, но даже тамъ, гдѣ онѣ есть, можно замѣтить стебельчатая железки, какими Вольфъ думалъ отличить *P. opaca* отъ сроднаго съ нимъ вида, окраску же ихъ, разумѣется, на гербарныхъ экземплярахъ различить нельзя; въ третьихъ, бугорчатый столбикъ вовсе не составляетъ исключительной особенности *P. oraciformis*, такая же бугорчатость замѣчается и на другомъ близкомъ къ *P. opaca* видѣ—*P. patula* W. K., особенно же рѣзко она видна на болѣе широко распространенной въ Россіи разновидности его *var. tenella* Tratt. (*P. pratensis* Schur); въ меньшей степени бугорчатость столбиковъ замѣтна и у другихъ видовъ: *P. argentea*—очень часто и сильно у основанія столбиковъ, у *P. thuringiaca* Bernh. var. *elongata*, *P. thyrsiflora*, *P. leucopolitana*, *P. canescens* и *P. supina*.

Такимъ образомъ едва ли есть основаніе сохранить за *P. oraciformis* Th. Wolf самостоятельное значеніе, особенно послѣ того, какъ я сооб-

нить Вольфу результаты моих наблюдений, съ чѣмъ онъ не могъ не согласиться.

Можно еще прибавить, что московское *P.* ораса относится къ формѣ съ железистыми волосками: *f. glandulosa* Th. Wolf.

***Potentilla okénsis* Petunn.** (II, стр. 265).

Описанная и изображенная мною форма представляетъ очень хорошо выраженную помѣсь *P. arenaria* съ *P. thuringiaca*, и Вольфъ вполнѣ правильно обозначаетъ эту форму какъ $\times P. arenaria \times thuringiaca$ var. *elongata*.

***Potentilla arenaria* Borkh.** (II, стр. 265).

Среди многихъ формъ, установленныхъ Вольфомъ въ его монографіи и различныхъ по опушенію листьевъ, по формѣ и числу листочковъ, размѣрамъ цвѣтковъ и размѣрамъ всего растенія, не упоминается прежде обозначенная имъ разновидность *sinuifolia* Th. Wolf, которая теперь отнесена имъ къ формѣ *longifolia* Th. Wolf, на томъ основаніи, что длинно-клиновидная форма листочковъ не рѣдко появляется лѣтомъ и осенью на смѣну весеннихъ, обратно-яйцевидныхъ ¹⁾.

Вольфомъ различаются:

- f. glandulosa* Th. Wolf. Съ железистыми волосками.
- f. eglandulosa* Th. Wolf. Безъ железистыхъ волосковъ.
- f. concolor* Th. Wolf. Верхняя и нижняя сторона листьевъ одинаково сѣро-зеленой или сѣдой окраски изъ-за густого опушенія.
- f. discolor* Th. Wolf. Верхняя сторона листьевъ зеленоватая отъ болѣе рѣдкаго опушенія звѣздчатыми волосками.

Всѣ эти формы встрѣчаются у насъ.

***Potentilla silvéstris* Neck.** (II, стр. 266).

Переименовано Вольфомъ въ *P. Tormentilla* Neck., несмотря на то, что первое установлено тѣмъ же авторомъ двумя годами ранѣе второго.

Изъ трехъ приведенныхъ въ Илл. Фл. Моск. губ. разновидностей: *typica*, *strictissima* и *latiloba*, послѣдняя является соединенной типичной формѣ, представляя лишь ничтожное видоизмѣненіе въ размѣрахъ листочковъ. Вольфъ причисляетъ это видоизмѣненіе къ формѣ *macrophylla* Raiche, у которой листочки въ 3 см. дл. и больше, и замѣчаетъ, что колебаніе въ размѣрахъ листочковъ не представляетъ никакого таксономическаго значенія.

***Potentilla reptans* L.** (II, стр. 267).—Хор. II, стр. 19.—Sch. III, № 765.

Татарское-Сатнино и между Пиширами и Дерюбриховой, Пдл. у. (X.).

¹⁾ Несмотря на заявленіе Вольфа, что длинно-клиновидные листочки появляются лѣтомъ и осенью, А. Н. Петуниновымъ и мною эта форма была найдена 4 мая въ полномъ цвѣту между типичными экземплярами. Д. Сырейчиковъ.

Potentilla anserina L. (II, стр. 268).

Описание этого вида въ П.л. Фл. Моск. губ. относится къ типичной формѣ—**var. vulgaris Hayne**, съ густо опушенной только нижней поверхностью листочковъ. Тогда какъ верхняя зеленая или сѣровато-зеленая цвѣта отъ рѣдкихъ волосковъ,—въ противоположность другой описанной тамъ же разновидности—**var. sericea Hayne**, съ листочками серебристо-шелковистыми съ обѣихъ сторонъ. Въ первой разновидности слѣдуетъ отмѣтить **f. incisa Th. Wolf**, съ глубоко-надрѣзными почти гребенчатыми краями листочковъ. Такая форма имѣется въ изданномъ Анненковымъ гербаріи Московской Флоры. Очень рѣдко встрѣчается разновидность съ листьями почти совершенно голыми на обѣихъ поверхностяхъ—**var. nuda Gaud.**; экземпляръ ея имѣется въ университетскомъ гербаріи и найденъ проф. П. Н. Горюжанкинымъ.

Измѣненіе ключа для опредѣленія видовъ *Potentilla* съ параграфа 14.

14. Стебли прямостоящіе или восходящіе, безъ пучка или розетки корневыхъ листьевъ во время цвѣтенія. 15.

Стебли лежачіе или приподнимающіеся, съ пучкомъ или розеткой корневыхъ листьевъ во время цвѣтенія. 18.

15. Цвѣтоножки длинными, тонкія; плодоножки отстоящія или отогнутыя; волоски на верхней поверхности листочковъ пучковатые, т.-е. съ боковыми отростками при ихъ основаніи.

P. Wibeliana Th. Wolf.

Цвѣтоножки короткія, толстыя; плодоножки прямоторчащія; волоски на верхней поверхности листочковъ прямые, простые, короткіе. 16.

16. Листочки съ нижней стороны съ густымъ бѣлымъ войлокомъ, безъ прямыхъ жесткихъ волосковъ или съ рѣдкими волосками вдоль жилокъ; зубчиковъ 2—3 съ каждой стороны листочка въ верхней его части.

P. argentea L.

Листочки съ нижней стороны съ сѣрымъ войлокомъ или вовсе безъ войлока, но всегда съ частыми жесткими волосками вдоль жилокъ. 17.

17. Листочки обратно-яйцевидные, къ основанію клиновидные, съ небольшимъ числомъ широкихъ зубцовъ (2—4) съ каждой стороны, снизу зеленые или сѣро-зеленые; цвѣтки желтые.

P. intermedia L.

Листочки ланцетные или яйцевидно-ланцетные со многими узкими зубцами (5—8) съ каждой стороны, снизу съ густымъ сѣрымъ войлокомъ; цвѣтки золотисто-желтые.

P. canescens Bess.

18. Листочки сверху какъ и снизу сѣрые или непельно-сѣрые отъ частыхъ звѣздчатыхъ волосковъ, со множествомъ лучей при

основаніи каждаго изъ нихъ; цвѣточный стебель тонкій и короткій о немногихъ цвѣткахъ. *P. arenaria* Borkh.

Листочки сверху зеленые или сѣроватые отъ пучковатыхъ волосковъ, съ немногими отростками при основаніи каждаго изъ нихъ; съ нижней стороны войлочные, перекрытые жесткими волосками вдоль жилокъ; цвѣточный стебель толстый и б. ч. высокій съ цвѣтками въ развѣснотомъ полузонтикѣ. 19.

19. Верхняя поверхность листочковъ зеленая, голая или слегка опушенная, снизу съ тонкимъ войлокомъ, по краямъ листочки съ длинными и не широкими зубцами, въ числѣ 4—8 съ каждой стороны. *P. thyrsiflora* (Hülsl.) Zimm.

Верхняя поверхность листочковъ сѣрая или тусклая отъ короткаго опушенія, снизу съ густымъ сѣрымъ войлокомъ; края листочковъ съ небольшимъ числомъ (2—6) короткихъ широкихъ зубцовъ съ каждой стороны.

P. leucopolitana P. I. Müller.

Comarum palustre L. (II, стр. 250).

Выдѣленное въ самостоятельный родъ *Comarum* L. вълѣдствіе сильно выпуклаго плодоложа, которое при плодосозрѣваніи разрастается и становится губчато-мяснатымъ, причислено Вольфомъ къ роду *Potentilla*, какъ это было уже сдѣлано Скополи (въ 1772 г.) и названо *Potentilla palustris* Scop. Вольфъ оспариваетъ другое отличіе родового признака *Comarum*—остающіеся при плодѣ лепестки, которые, по его наблюденіямъ, опадаютъ, какъ и у всѣхъ остальныхъ видовъ *Potentilla*, только поздно. Тотъ же Вольфъ указываетъ еще, что лепестки не рѣдко бываютъ опушены съ тыльной стороны.—особенность, которая замѣчена еще только у южнаго вида *P. speciosa* Willd., у котораго лепестки также поздно опадаютъ, какъ и у *P. palustris*.

Géum rivale L. (II, стр. 269).

В. Н. Хитрово различаетъ двѣ формы, на которыя распадается видъ:

α. **minus** DC. Стебель не высокій, съ 1—2 цвѣтками; листья мелкіе. Растетъ на открытыхъ мѣстахъ.

β. **lividum** Chitrowo. Стебли до 70 см.; междоузлія вытянуты; прикорневые листья крупныя, съ длинными черешками, верхушкою достигаютъ средины стебля; цвѣтки блѣдныя, равно какъ и чашечка, окрашенная только у основанія. Растетъ по тѣнистымъ мѣстамъ ¹⁾.

¹⁾ Обѣ эти формы встрѣчаются у насъ часто, но повсемѣстно попадаются у насъ растенія, которыя всѣми признаками походятъ на β. *lividum*, исключая окраски чашечки, которая у нашихъ растеній ярко окрашена, тогда какъ про форму *lividum* В. Н. Хитрово говорить: «прежде всего бросается въ глаза особенная окраска чашечки: въ малиновый цвѣтъ окрашено только кольцо у основанія чашечки, цвѣтъ

Géum intermédiaire Ehrh. (II, стр. 270).—Хор. IV, стр. 17.

Соколышки и близъ ст. Икша, Савел. ж. д. (II. Слуцкий).

А. А. Хорошковъ нашелъ двѣ противоположныя крайнія формы этой номфеи; одна была найдена близъ д. Подушкино. Зви. у., съ обликомъ близкимъ къ *G. rivale*, но во всѣхъ частяхъ очень крупная, отличалась отъ этого вида раскрытымъ желтымъ цвѣткомъ и раскрытой чашечкой; лепестки равнялись чашечкѣ. Другая номфея изъ-подъ д. Страданн. Пдл. у., съ обликомъ *G. urbanum*, съ большимъ числомъ цвѣтковъ на вытянутыхъ цветоножкахъ, но цвѣтки съ крупной раскрытой окрашенной чашечкой, превышающей лепестки; чашелистики узкіе, длинно-заостренные. Надо замѣтить, что иногда у *G. intermedium* бываетъ вѣтчикъ розовато-желтый съ розовыми жилками.

Crataegus sanguinea Pall. (II, стр. 275).—Хор. III, стр. 93.—Хор. II, стр. 18.

У дороги въ березово-осиновомъ лѣсу близъ д. Булатово и на высокомъ известняковомъ берегу р. Мѣчи близъ д. Ярково, Пдл. у. (X.).

Amelanchier vulgaris Moench (II, стр. 277).

По р. Бичѣ близъ ст. Расторгусово, Павелецкой ж. д., недалеко отъ парка (II. Слуцкий).

Pirus communis L. (II, стр. 277).

По оврагамъ близъ Селевкина, Дмт. у. (сообщено II. Слуцкимъ).

Pirus Málus L. (II, стр. 278).

Pirus silvestris S. F. Gray. Хор. II, стр. 19.

Татарское-Сатино и Булатово, Пдл. у. (X.).—По оврагамъ близъ Шульгина и Романькова (С.).—Долина р. Яхромы. Дмт. у. (II. Петровъ).

Встрѣчающіяся у насъ деревца можно отнести къ подроду:

ssp. silvestris L. Молодые побѣги голые или почти голые; листья съ нижней стороны слабо опушенные или опушены только вдоль жилокъ или же голые; чашечка съ наружной стороны голая, только основаніе ея б. или м. опушено; цветоножки голыя или слабо опушенные ¹⁾.

этотъ смѣшивается съ блѣсовато-зеленымъ оттѣнкомъ периферической части чашечки и, просвѣчивая сквозь сѣть волосковъ, даетъ общій блѣклый тонъ чашечкѣ». Надо замѣтить, что В. Н. Хитрово говоритъ и про переходы отъ одной формы въ другую; воть эти-то среднія формы встрѣчаются у насъ въ огромномъ количествѣ и ближе подходятъ къ *lividum*, къ которой я ихъ и отношу; необходимо прибавить, что всѣ эти среднія формы, почти не отличимыя отъ *lividum*, исключая окраски чашечки, б. ч. растутъ на солнцѣ, даже встрѣчаются на известнякѣ.

¹⁾ Мнѣ приходилось находить экземпляры съ цветоножками довольно густо опушенными и съ основаніемъ чашечки почти войлочнымъ, тогда какъ самая чашечка была голая и нижняя сторона листьевъ, даже молодыхъ, совершенно голая.

Sórbus Aucupária L. (II, стр. 279).

Pirus Aucuparia (L.) Gärtn.—Sch. VI, № 1613.

У насъ пока только:

- α. **typica C. K. Schneid.** Листья въ молодости опушенные, позднѣе голые или почти голые.

Prúnus spinósa L. (II, стр. 280).—Пет. Отч., стр. 13.

У насъ пока можно различить:

- α. **typica C. K. Schneid.** Цвѣтоножки и чашечки голыя; листья даже молодые голые или почти голые. Найденная у насъ форма=**coetanea** (Wimm. et Grab.) **Aschers. et Gr.**, у которой цвѣтки и листья распускаются одновременно. Рождественно на р. Нарѣ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).
- β. **dasyphylla Schur.** Цвѣтоножки и б. ч. чашечки б. или м. густо опушены; молодые листья опушенные, позднѣе опушеніе слабѣетъ, а осенью остается только по жилкамъ.

Prúnus fruticósa Pall. (II, стр. 281).

Beck. Aschers. et Gr. и C. Schneider признають слѣдующія формы:

- α. **typica Beck.** Листья на короткихъ побѣгахъ изъ клиновиднаго основанія продолговато-обратно-йцевидные или почти округлые, часто 2 см. дл. и 1 см. ш.; на длинныхъ побѣгахъ—б. ч. эллиптическіе.
- β. **dispar Beck.** Листья на короткихъ побѣгахъ изъ длиннаго клиновиднаго основанія продолговато-обратно-йцевидные, въ 3 см. дл. и 1 см. ш.; на длинныхъ побѣгахъ листья почти ланцетные ¹⁾.

Prúnus Pádus L. (II, стр. 282).—Sch. VI, № 1663a.

Пока у насъ только:

- α. **typica Koehne.** Молодые побѣги голые, равно какъ и листья съ нижней стороны, только въ углахъ жилокъ съ бородачками.
1. **genuina Aschers. et Gr.** Плоды черные.

Genista tinctória L. (II, стр. 287).

У Aschers. et Gr. приводится цѣлый рядъ формъ, изъ которыхъ б. или м. подходятъ къ нашимъ слѣдующія:

- α. **vulgaris Spach.** Кустарникъ не выше 60 см., съ приподнимающимися, мало развѣтвленными вѣтвями; кисти цвѣтковъ 3—6 см. дл.
1. **genuina (Pokorny) Aschers. et Gr.** Одеревягѣлыя вѣточки, короткія, толстыя, съ небольшимъ числомъ вѣтвей, близъ верхушки развѣтвленныхъ; листья до 3 см. дл. и 4 мм. ш., свѣтло-зеленые, тусклые.

¹⁾ У насъ можно встрѣтить какъ первую, такъ и вторую форму, но б. ч. попадаютъ либо среднія формы, либо такіе кусты, гдѣ можно найти обѣ формы листьевъ.

2. *latifolia* (auct. pl.) **Aschers. et Gr.** Листья широкіе, эллиптическіе или эллиптическо-ланцетные, часто опушенные.

β. *elata* **Aschers. et Gr.** Кустарникъ до 1 м. и выше; вѣтви сильно развѣтвленные, особенно близъ верхушки; листья ланцетные, заостренные; каждая вѣтка, вслѣдствіе сильнаго вѣтвленія близъ верхушки, образуетъ большое пирамидальное, метельчатое соцветіе; чашечка по краямъ и иногда по жилкамъ покрыта рѣдкими волосками.

У насъ пока только:

1. *typica* **Aschers. et Gr.** Листья до 4,5 см. дл. и до 1 см. ш., на мелкихъ вѣтвяхъ значительно мельче, чѣмъ на главныхъ¹⁾.

Cytisus ratisbonensis Schaeffer (II, стр. 287).—

Ф. Б. Доп., стр. 4.

Правильнѣе называть:

Cytisus ratisbonensis Schaeffer ssp. ruthenicus (Wolosz.)²⁾.

Близъ Бодни, Мож. у. (Ф. Б.).

Anthyllis Vulneraria L. (II, стр. 289).—Хор. II, стр. 17.

Все видѣнные мною экземпляры изъ Моск. губ. относятся къ:

α. *polyphylla* **Kit.** (sec. Bess., ap. Ser. in DC. Prodr).

Стебель въ нижней трети покрытъ б. или м. густо отстоящими волосками, какъ и черешки корневыхъ листьевъ; остальная часть стебля покрыта прижатыми волосками; корневые листья съ копечной очень крупной долей и б. ч. съ 1—3 парами очень маленькихъ листочковъ; стеблевые листья равномерно распределены по стеблю до самаго верха, въ числѣ 3—6, о (2) 3—4 (6) паряхъ листочковъ; чашечка (10) 11—12 мм. дл., не сильно вздутая, густо покрыта отстоящими волосками.

Типичное *A. Vulneraria* **L.** характеризуется, кромѣ другихъ при-

¹⁾ Вышеприведенныя формы, хотя и можно отличить, но очень часто наблюдаются переходы отъ одной формы къ другой, да вообще установленныя **Aschers. et Gr.** подраздѣленія мало примѣнимы къ растеніямъ нашей области. **Camillo Schneider**, въ III. Handb. der Laubholzkunde, говоритъ, что въ формахъ *Genista tinctoria* существуютъ полная путаница и что различные авторы, приводя одні и тѣ же формы, приписываютъ имъ различные признаки, а **Aschers. et Gr.**, при формѣ β. *elata* **Aschers. et Gr.** I *typica*, указываютъ, что она очень близка къ α. *vulgaris* **Spach.** b. *latifolia* **auct. pl.** и часто почти не отличима отъ нея. Изъ этого можно заключить, что даже **Aschers. et Gr.**, располагая большимъ матеріаломъ, не могли установить болѣе ясныхъ границъ между формами этого очень измѣнчиваго въ своихъ мелкихъ признакахъ кустарника.

²⁾ См. мою замѣтку въ Труд. Бот. Сада Имп. Юрьев. Унив. 1912, стр. 12.



Genista tinctoria β. *elata*.

знаковъ, всегда прижатыми волосками на всемъ стеблѣ. Опредѣляя наним растений, я пользовался Aschers. et Gr. и двумя монографіями: Sagorski, Ueber den Formenkreis der *A. Vulneraria* L., въ Allg. Bot. Zeitschr. 1908—9 и Willh. Becker, Bearbeitung der Anthyllis-Sektion *Vulneraria* DC., въ Beihefte z. Bot. Zentrbl., B. XXVII, 1910. Во всехъ трехъ работахъ родъ *Anthyllis* Сekt. *Vulneraria* разсматривается различно. Прежде появилась работа Aschers. et Gr. и почти одновременно работа Sagorski, въ которой этотъ авторъ обрушивается на Aschers. et Gr., заявляя, что послѣдніе совершенно не разобрались въ формахъ и что они описываютъ, какъ культурныя формы, такъ и дикорастущія, считая ихъ равноцѣнными. Sagorski, по его словамъ, наблюдалъ *Anthyllis* двадцать лѣтъ, но, несмотря на это, Becker указываетъ на многія неправильности и даже ошибки въ опредѣленіи Загорекаго. Монографія Загорекаго, хотя и представляетъ изъ себя капитальный трудъ, но описанія его не даютъ той картины, которую приходится видѣть, изучая матеріалъ. Becker же, несмотря на сравнительно короткое время, употребленное имъ на его работу, даетъ болѣе полную картину какъ самнхъ формъ, такъ и отклоненій отъ нихъ, а равно и случайныхъ переходовъ одной формы въ другую. По всемъ тремъ работамъ наша форма относится къ *polyphylla* Kit. и только у Becker'a я нашелъ указаніе на нѣкоторые отклоненія, встрѣчающіяся у насъ, а именно: меньшее количество паръ листочковъ на стеблевыхъ листьяхъ и окраска верхушки чашечки, на которую не слѣдуетъ, однако, смотрѣть какъ на рѣшающій признакъ при опредѣленіи. Всѣ эти отклоненія и иногда менѣе отстоящее опушеніе стебля указываютъ на промежуточную форму между *polyphylla* Kit. и *Vulneraria* L.; такая форма, по заявленію Becker, издана въ Herb. Fl. Ross. № 208, собранная близъ Петербурга.

Medicāgo lupulina L. (II, стр. 291).

До сихъ поръ всѣ видѣныя мною особи изъ Моск. губ. отнеслись къ *α. Willdenowii* (Boenn.) Aschers. et Gr.; типичное *M. lupulina* L.,—безъ железистыхъ волосковъ, пока не найдено.

Medicāgo falcāta L. (II, стр. 291).

У насъ пока можно различить слѣдующія формы:

- α. typica* Pospich. Стручки голые или покрыты короткими не частыми прижатыми волосками. Очень часто.
- β. pubescens* Rouy et Fouc. Стручки густо покрыты нѣсколько отстоящими волосками. Воробьевы горы (II.).

Medicāgo sativa L. (II, стр. 292).

По откосу Савеловской ж. д. близъ Владыкина; по склону къ р. Москвѣ въ имѣніи кн. Ливень «Спасекомъ», на границѣ Бри. и Кзм. уу. (С.).—Между Черемушками и с. Коломенскимъ (Ассы).

Melilótus officinális Desr. (II, стр. 292).

Нѣкоторыя, встрѣчающіяся у насъ особи, на первый взглядъ по бобамъ можно отнести къ *M. macrorrhizus* Pers., хотя бобы у такихъ экземпляровъ довольно явственно сѣтчато-морщинистые, а не поперекъ складчато-морщинистые, какъ должны быть у *M. officinális*; но остальные признаки соответствуютъ послѣднему виду, а именно: бобы голые и сѣмечекъ въ завязи 5—7, тогда какъ у *M. macrorrhizus*—бобы покрыты волосками и сѣмечекъ въ завязи должно быть 2—4. Надо замѣтить, что всѣ видѣнные мною особи изъ Моск. губ. относятся къ формѣ **typicus** Pospich.

Trifólium praténse L. (II, стр. 294).

По Aschers. et Gr. у насъ пока можно различить слѣдующія формы:

α. spontaneum Willk. Б. ч. довольно густо опушенное; стебель довольно тонкій, около 20—40 см. выш., б. ч. лежачій, плотный или слегка полый, особенно близъ головокъ покрытъ прикатыми бѣловатыми волосками; листья средней величины, верхніе гораздо мельче, мало или едва окутываютъ головку; цвѣтки средней величины ¹⁾).

1. **genuinum Rouy et Fouc.** Всѣ листочки обратно-яйцевидные или продолговатые; стебель 30—40 см. Клементьево, Руз. у. (Сюз.).

2. **rotundifolium Lej. et Court.** Листочки почти круглые; стебли 10—30 см., прямостоящіе, съ приподнимающимся основаниемъ, въ верхней части сильно опушенные; листочки средней величины, нижніе широко-округло-обратно-яйцевидные; головки маленькія; цвѣтки у нашего растенія розовые. Карапчеево на р. Окѣ, Кал. у. (П.).

β. sativum Schreb. Растеніе крупное; стебли 40—70 см., слабо опушенные, толстые, полые; листочки на черешечкахъ очень разнообразной формы, чаще съ рисункомъ на верхней сторонѣ; цвѣтки крупные, б. ч. малиновые; зубцы чашечки на концѣ б. ч. покращены.

1. **albiflora Sanio.** Цвѣтки бѣлые. Красково у полотна ж. д., Бри. у. (Ассь).—Морозово, Дмит. у. (Н. Слуцкій).

¹⁾ Иногда можно различить *spontaneum* отъ *sativum*, но б. ч. встрѣчаются переходныя формы или чистыя *sativum*. Вчитываясь въ описаніе этихъ двухъ формъ, очень трудно уловить стойкіе признаки; наталкиваясь на выраженія: «б. ч.» или «б. или м.» Единственный признакъ, на который можно опираться, если онъ рѣзко выраженъ, это густое опушеніе у *spontaneum*; наличность этого признака даетъ право опредѣляемое растеніе отнести къ этой формѣ.

Trifolium alpestre L. (II, стр. 295).

Наши растенія относятся къ формѣ:

α. **eu-alpestre Aschers. et Gr.** Листья ланцетные, узко-эллиптические или линейно-ланцетные; чашечка о 20 жилкахъ; зубцы ея равны трубкѣ или едва длиннѣе ея.

Aschers. et Gr. приводятъ еще двѣ формы: **distachyum (Ser.) Aschers. et Gr.** — съ двумя головками, и **monostachyum (Ser.) Aschers. et Gr.** — съ одной головкой; та и другая форма встрѣчаются у насъ и растутъ вмѣстѣ.

Trifolium médium L. (II, стр. 296).

У насъ пока можно различить слѣдующія формы:

α. **typicum Aschers. et Gr.** Зубцы чашечки, исключая нижняго, равны трубкѣ; стебель 20—45 см., б. или м. развѣтвленный; листья 2—4 см. дл.; вѣнчикъ б. ч. въ два раза длиннѣе чашечки; грубка чашечки голая¹⁾.

subf. pedunculatum Ser. Ножка головки до распусканія цвѣтковь 1,5—3 см. дл., во время цвѣтенія до 7,5 см. дл.²⁾ Мытищи (С.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.).

β. **ericalycinum Hausskn.** Трубка чашечки б. или м. покрыта волосами. Поселокъ Ново-Удѣльная по М.-Каз. ж. д., Брн. у. (X.).



Trifolium medium subsp. *pedunculatum*.

Trifolium arvense L. (II, стр. 296).

Наши растенія относятся къ формѣ:

α. **typicum Beck.** Чашечка 5—6 мм. дл.; зубцы ея въ 1—3 раза длиннѣе трубки.

¹⁾ По сообщенію И. И. Петрова, листья этого растенія имѣютъ нѣсколько игушій вкусъ, напоминающій вкусъ перца, отъ чего никогда не поѣдаются скотомъ; по его словамъ, даже въ засуху, когда вся трава выжжена и оглодана скотомъ, цѣлыя заросли *T. médium* остаются не тронутыми.

²⁾ Про эту форму Aschers. et Gr. одного мнѣнія съ Gibelli et Belli, которые замѣчаютъ, что описанная Seringe форма есть типичное *T. médium* L., у котораго ножка почти не замѣтна до зацвѣтанія, а потомъ удлиняется. Я съ этимъ не могу согласиться. Совершенно вѣрно, что у *T. médium* L. сперва ножки почти не замѣтны, и головки какъ бы окружены листьями, но потомъ ножка удлиняется у нѣкоторыхъ экземпляровъ до 3 см., чаще же она короче, и листья все же кажутся какъ бы оберточной. У var. *pedunculatum* ножка явственно замѣтна даже и тогда, когда головка еще далеко не развита, и въ то время листья уже не кажутся обер-

1. *agrestis* Rouy et Fouc. Стебель б. ч. вѣтвистый съ отстоящими вѣтвями; все растеніе опушено б. или м. прижатыми волосами. Обычная форма.
2. *Brittingeri* Beck. Стебель прямоторчащій, простой или слабо-вѣтвистый съ прямоторчащими вѣтвями; все растеніе густо покрыто нѣсколькими курчавыми, почти горизонтально-отстоящими волосами. Хотѣли по р. Нерской, Брян. у. (П.).

***Trifolium montanum* L.** (II, стр. 297).

Кромѣ обычной формы у насъ еще:

- α. *glabrescens* Beck. Листочки съ нижней стороны совершенно голые или молодые едва опушенные, а старые голые. Мытищи (С.).

***Trifolium repens* L.** (II, стр. 297).

У насъ б. ч. встрѣчается типичная форма.—Aschers. et Gr. приводятъ форму *giganteum* Lagr.-Foss., которую мнѣ приходилось встрѣчать въ высокой травѣ по сырымъ мѣстамъ; все отличіе этой формы заключается въ очень крупномъ ростѣ, достигающемъ до 60 см., и въ величинѣ листьевъ въ 4—5 разъ крупнѣе нормальныхъ; но такая форма становится менѣе крупной, когда трава не столь высока или почва не столь тучна, и она постепенно переходитъ въ нормальную, о чемъ говорятъ и Aschers. et Gr. Другая форма отличается только свѣтло-розовыми цвѣтками—*roseum* Peterm., у которой головки болѣе 2 см. въ поперечникѣ, тогда какъ у типичнаго не болѣе 2 см. Эта форма тоже не стойка, такъ какъ мнѣ приходилось встрѣчать растенія съ головками не крупнѣе 2 см. и даже мельче 2 см. въ поперечникѣ, но съ цвѣтками то розовыми, то бѣлыми.

***Trifolium hybridum* L.** (II, стр. 298).

Распадается на:

- α. *fistulosum* (Gilib.) Rouy et Fouc. Стебель полый; у листочковъ съ каждой стороны приблизительно по 20 параллельныхъ жилокъ.
- β. *elegans* (Savi) Garcke.

***Trifolium agrarium* L.** (II, стр. 300), правильнѣе: ***T. strépens* Crantz** (Stirp. Austr. ed. 2. 411. 1769).

Этимъ послѣднимъ названіемъ по праву первенства слѣдуетъ замѣнить названіе *T. agrarium*; подъ этимъ именемъ Линней, въ Sp. pl. (1753), разумѣлъ нѣсколько видовъ, не различая ихъ, и только въ изданіи 1772 г. описалъ *T. agrarium* въ томъ смыслѣ, какъ оно теперь понимается; Crantz же сдѣлалъ это уже въ 1769 году.

кой; когда же головки въ полномъ цвѣту, то ножка удлиняется до 7,5 см.; листья далеко отстоятъ отъ головки и растеніе принимаетъ своеобразный видъ. Вотъ такое-то растеніе, я думаю, имѣлъ передъ собою Seringe, когда описывалъ свою форму.

Trifolium campéstre Schreb. (II, стр. 300).—Хор. III, стр. 93.

Наше растеніе принадлежать къ формѣ:

- α. **genuinum Rouy et Fouc.** Съ прямостоящимъ б. ч. сильно вѣтвистымъ стеблемъ. По обрывистому берегу р. Пахры близъ д. Пищиря. Пдл. у. (X.).

Lótus corniculátus L. (II, стр. 301).

Можно различить, кромѣ обычной, слѣдующія формы:

- α. **arvensis Ser.** Стебель голый или слабо опушенный, равно какъ и листья б. ч. голые или едва опушенные. Эту форму мнѣ еще не удавалось видѣть, но соподчиненную ей я находилъ:

1. **silvaticus (Baumg.) Aschers. et Gr.** Растеніе очень крупное. 30—50 см., всѣ его части очень крупныя; цвѣтки до 1 см. Мышцы (С.).

- β. **ciliatus Koch.**

Надо замѣтить, что форма *ciliatus* Koch встрѣчается вездѣ, тогда какъ *arvensis* Ser. я видѣлъ только разъ, да и то только *subf. silvaticus*.

Astrágalus Cicer L. (II, стр. 303).

А. И. Петуниковъ нашелъ между Тарбушевымъ и Болотовымъ близъ Камарева на р. Окѣ. Кзм. у., форму, которая очень близка къ **angustifolius Cel.**, у этой формы листочки продолговато-ланцетные, очень маленькіе, не длиннѣе 15 мм. и не шире 3 мм. и оканчиваются жесткимъ остриемъ, тогда какъ у типичной формы длина листочковъ доходитъ до 38 мм., а ширина до 10 мм.; остріе хотя и бываетъ, но оно мягкое. Другой признакъ, приводимый Челаховскимъ, у нашего растенія не ясенъ, это соцвѣтіе, которое должно быть короче листа; у насъ оно равно листу или нѣсколько длиннѣе его.

Astrágalus glycyphýllus L. (II, стр. 304).—Sch. I, № 168.

Берегъ р. Пахры близъ с. Зеленаго, Брн. у. (С.).

Astrágalus dānicus Retz. (II, стр. 305).—Хор. III, стр. 91.

Троицкая, Пдл. у. (X.).

Coronilla vária L. (II, стр. 306).—Сыр. Отч. III, стр. 13.

Каменоломни близъ с. Зеленаго на р. Пахрѣ, Брн. у. (С.).—По откосу ж. д. близъ ст. Царицына (сообщ. Л. М. Кречетовичъ).

У насъ можно различить слѣдующія формы:

- α. **hirsuta Maxim.**

- β. **hirta Boiss.**¹⁾ Стебель и цвѣтоносы б. или м. густо покрыты от-

¹⁾ Интересенъ фактъ нахожденія этой формы у насъ, тогда какъ до сихъ поръ, по словамъ Aschers. et Gr., типичная форма *hirta* Boiss. была находима въ Персін и изрѣдка въ южной части Босніи и Герцеговины.

стоящими щетинками, отчего на ощупь они шершавые; цвѣтки на болѣе короткихъ ножкахъ. Бачманово на р. Окѣ, Кзм. у. (П.).— Вѣроятно, еще болѣе опушенная форма и есть *α. hirsuta* Maxim.

γ. *violacea* Briquet. Цвѣтки сплошь лиловые.

δ. *alba* Pluskal. Цвѣтки совершенно бѣлые. Форму съ бѣлыми цвѣтками я нашелъ близъ Бачманова, Кзм. у., на старыхъ каменоломняхъ; растеніе представляло изъ себя кустъ до 1,5 м. выс., почти шаровидный, покрытый сплошь бѣлыми цвѣтками, но при сушкѣ цвѣтки нѣсколько подлиловѣли; стебли же и цвѣтоносы мѣстами были покрыты щетинками, отчего эта форма является промежуточной между типомъ и *β. hirta* Boiss.

***Onobrychis viciaefolia* Scop. (II, стр. 307).**

У насъ встрѣчается типичная форма и, вѣроятно, одичалая, слабо опушенная или почти голая; такая форма описана какъ:

α. culta Rouy. За д. Дракино, Сри. у. (П.).

***Ervum hirsutum* L. (II, стр. 308).**

У нашихъ растеній часто можно наблюдать какъ бы промежуточные формы между типомъ и *α. fissum* G. Fröl.; у этихъ растеній чаще всего бываютъ нижніе прилистники какъ у *fissum*, а верхніе какъ у типа.

***Ervum tetraspermum* L. (II, стр. 308).**

Пищиря, Пдл. у. (X.).—Во рки близъ 17-й версты, Брянск. ж. д. (С.).

***Vicia silvatica* L. (II, стр. 310).—Sch. IV, № 1063.**

***Vicia cassubica* L. (II, стр. 311).**

Наши растенія принадлежать къ типичной формѣ; что же касается до болѣе мелкихъ формъ, приводимыхъ Aschers. et Gr. и основанныхъ на опушеніи стебля и листьевъ, а именно: *pubescens* Cel.—съ стеблемъ и листьями явственно опушенными,—и *subglabra* Domin—съ стеблемъ и листьями почти голыми, то онѣ у насъ не различимы, ибо встрѣчаются растенія съ опушеннымъ стеблемъ и голыми листьями, хотя есть и *subf. pubescens* Cel.

Приводится еще форма *pauciflora* Domin, отличающаяся отъ типичной небольшимъ числомъ цвѣтковъ въ кисти (2—6); эта форма не только встрѣчается между типичной, у которой 8—14 цвѣтковъ въ кисти, но на одномъ и томъ же экземплярѣ мнѣ приходилось наблюдать пять кистей по 4—6 цвѣтковъ и одну кисть съ 9 цвѣтками. Надо замѣтить, что всѣ наши формы встрѣчаются въ одной мѣстности между Быковымъ, Михневымъ, Вялками и Малаховкой, Бри. у.

***Vicia Cracca* L. (II, стр. 311).**

Aschers. et Gr. въ Synopsis приводятъ для этого вида много формъ и между прочими *latifolia* Neir., которая была описана въ 1859 г. Мною же

приведена форма *β. pseudocassubica* Klett et Richt., описанная въ 1830 г., слѣдовательно, *latifolia* Neilr. является синонимомъ приведенной мною формы, что подтверждаетъ Wohlfratt, въ Koch's Synopsis, 3 Aufl. Страшно, что Aschers. et Gr. совершенно не приводятъ даже въ синонимахъ форму *pseudocassubica*, а равно и форму *leptophylla* Fr., описанную въ 1818 г., хотя эта форма расчленена ими, но какъ синонимъ должна была быть упомянута.

У насъ пока можно различить слѣдующія формы:

1. Мощное растеніе съ толстымъ стеблемъ (до 3 мм.), б. ч. покрыто прижатыми волосками; листья линейно-ланцетные или ланцетные, заостренные; цвѣточная кисть значительно превышаетъ листъ.
***linearis* Peterm.**

Растеніе, хотя иногда и бываетъ высокимъ, но со стеблемъ тонкимъ, не толще 2 мм., гибкимъ, часто очень ломкимъ. 2.

2. Листочки овально-эллиптическіе, на верхушкѣ округлые, голые или рѣже покрыты не густыми волосками; растеніе зеленое.
***pseudocassubica* Klett et Richt.**

Листья узкіе, линейные или линейно-ланцетные, б. ч. заостренные; растеніе б. или м. густо опушено.
***vulgaris* Neilr.**

α. vulgaris Neilr. Очень часто.

β. pseudocassubica Klett et Richt. Въ чистой формѣ пока только въ лѣсу близъ Дракина, Сри. у. (С.).

γ. linearis Peterm. Въ чистой формѣ пока только близъ Бачманова, Клм. у. (П.).

Часто встрѣчаются промежуточныя формы между *pseudocassubica* и *linearis*, у которыхъ либо признаки перемѣшаны въ равной степени, либо признаки одной изъ этихъ формъ преобладаютъ; что же касается другихъ формъ, приведенныхъ Aschers. et Gr. и основанныхъ главнымъ образомъ на опушеніи отстоящими или прижатыми волосками, то онѣ въ нашихъ растеніяхъ не различимы потому, что опушеніе бываетъ различно въ нижней и верхней части одного и того же растенія.

***Vicia villōsa* Roth** (II, къ стр. 313).—Хор.
IV, стр. 16.

Стебель до 1,5 м., лежащій или лазящій, крупно-бороздчатый, часто отъ основанія вѣвистый, покрытъ б. или м. густо, какъ и все растеніе, отстоящими курчавыми волосками; листья о 6—10 парахъ, съ полустрѣловидными прилистниками; листочки узко-эллиптическіе, продолговатые или почти линейные, 1—2 см. дл. и 2—7 мм. ш., б. ч. съ округлой верхушкой и короткимъ остриемъ.



Vicia villosa.

на пей; кисти многоцвѣтковые, б. ч. длиннѣе листьевъ. передъ цвѣт-
нiемъ очень густыя; чашечка коротко-косо-колокольчатая съ сильно
вздутымъ въ одну сторону основанiемъ; цвѣтки крупные, до 17 мм. дл.,
сине-лиловые; отгибъ паруса въ два раза короче ноготка; бобъ до
3 см. дл. и до 1 см. ш., продолговатый или почти эллиптическiй, на
ножкѣ, едва превышающей чашечку или равной ей, голый, зрѣлый
свѣтло-красновато-бурый. о 4—5 сѣменахъ, послѣднiя черныя; рубчикъ
равенъ $\frac{1}{7}$ или $\frac{1}{8}$ окружности (около 2 мм.). Въ посѣвахъ ржи близъ
Борисова, Сри. у., въ цвѣту и плодахъ 26 iюня (II. и X.).—Медвѣдково
на р. Лузѣ (II.).—Ж.-д. насыпь Савеловской ж. д. близъ Лихоборъ (С.).

Всѣ найденныя растенiя относятся къ формѣ:

- α. *culta* Aschers. et Gr.** Кисти цвѣтковь длиннѣе листьевъ; цвѣтки
распускаются почти одновременно во всей кисти; нижнiй зубецъ
чашечки равенъ трубкѣ.

***Vicia sepium* L.** (II, стр. 313).

Хотя, по Aschers. et Gr., формы остаются тѣ же, но названiе одной
и авторъ другой нныя, и описанiе нѣсколько расширено.

- α. *vulgaris* Gaud.** Листочки у листьевъ лiцевидные или лiцевидно-
продолговатые, на нижнихъ листьяхъ много шире, чѣмъ на верх-
нихъ, на верхушкѣ б. ч. съ выемкой. Обычная форма.

β. *montana* Koch.

Vicia sepium L. β. *angustifolia* Koch. Сыр. Илл. Фл., стр. 313.—Sch. VI,
№ 1658.

Листочки изъ лiцевиднаго основанiя продолговатые или про-
долговато-ланцетные, всѣ заостренные, безъ выемки на верхушкѣ.
Вялки, Бри. у., по торфяному дугу (X.).

***Vicia sativa* L.** (II, стр. 313).

У насъ распадается на слѣдующiя формы:

1. Цвѣтки до 3 см. дл.; зубцы чашечки равны трубкѣ или едва длин-
нѣе ея; вѣнчикъ очень ярко окрашенъ. ***grandiflora* Willk.**

Цвѣтки мельче, не крупнѣе 2,5 см. 2.

2. Листочки эллипческо-ланцетные или почти эллиптическiе, на
концѣ закругленные, рѣже едва усѣченные; верхушечные б. ч.
много ѳже остальныхъ; общiй обликъ растенiя очень походитъ
на *V. sepium*, но легко отличимъ по чашечкѣ и по количеству
цвѣтковь. ***nemoralis* Pers.**

Листочки обратно-лiцевидные съ усѣченной верхушкой или выем-
чатой, отчего листочки почти обратно-сердцевидные. 3.

3. Бобы съ поверхности ровные; сѣмена почти не замѣтны.

***obovata* Ser.**

Бобы съ поверхности отъ сѣмянъ бугорчатые. ***torulosa* Rouy.**

α. obovata Ser. Обычная форма.

β. torulosa Rouy ¹⁾. Воробьевы горы (П.).

γ. nemoralis Pers. На обрывистомъ берегу р. Мочи по известняковой галькѣ близъ с. Ознобишина, Пдл. у. (X.).

δ. grandiflora Willk. В. Алексеевское на р. Северкѣ. Кдм. у. (П.).

Aschers. et Gr. приводятъ еще форму *cordifolia* Beck, параллельную формѣ *obovata* Ser., но у которой листочки обратно-сердцевидные съ глубокой выемкой; даже подчеркнуто, что листочки на верхушкѣ явственно двулопастные. Такой формы я еще не видалъ (она хорошо изображена у Rehb. Icon. T. 22. tab. 249), но, вѣроятно, встрѣчается и въ Моск. губ.

Vicia angustifolia Reichard, а не All. (II, стр. 314).

Lathyrus tuberósus L. (II, стр. 317).

Близъ д. Добрынино, Пдл. у. (Куль.).

Lathyrus silvéster L. (II, стр. 317).

Наша узколистная форма неправильно названа мною *ensifolius* Buck.; у этой формы листья должны быть не шире 3 мм., тогда какъ у нашей листья около 8 мм. ш.; признакъ количества жиллокъ не совсѣмъ стойкій: мнѣ часто приходилось наблюдать листья о 4 жилкахъ, а потому ниже я даю новыя описанія для нашихъ формъ. Наша первая форма должна называться *oblongus* Ser.; имя же другой должно уступить названію *platyphyllus* (Retz.) Aschers. Эта послѣдняя была описана въ 1795 году Retzius въ Fl. Scand. Ed. II, какъ самостоятельный видъ, а Ascherson въ Fl. Prov. Brand. (1864) помѣстилъ ее какъ форму. Название же *latifolius* неправильно приписывается Ruprecht, такъ какъ въ 1838 году Peterman въ Fl. Lips. приводитъ *L. silvestris* L. *α. latifolius* Peterm.

α. oblongus Ser. Листья ланцетные, отъ 7 до 20 мм. ш., б. или м. тонко-заостренные, рѣже туповатые, съ маленькимъ остріемъ; жиллокъ чаще 3 (но мнѣ приходилось видѣть 4 и 5 жиллокъ даже на узколинейныхъ листочкахъ); прилистники б. ч. очень узкіе, полустрѣловидные, иногда даже безъ стрѣловиднаго придатка.

β. platyphyllus (Retz.) Aschers. Листочки продолговато-ланцетные, продолговатые или почти овальные, 2,5—5 см. ш., б. ч. съ закругленной верхушкой и маленькимъ остріемъ на ней; жиллокъ 5—7; прилистники широкіе, иногда у основанія до 5 мм. ш., съ хорошо развитымъ стрѣловиднымъ придаткомъ. Близъ с. Исупова на р. Пахрѣ. Бри. у., мною найдена форма крайняя по ширинѣ листоч-

¹⁾ Надо замѣтить, что форма *torulosa* Rouy характеризуется еще болѣе узкими, почти линейно-ланцетными верхушечными листочками съ усѣченной верхушкой и сѣменами, б. ч. желтоватыми съ бурыми крапинками. Наше растеніе имѣетъ верхушечные листья, хотя и менѣе крупныя, но не столь узкія, и сѣмена темно-бурыя, почти черныя съ черными крапинками. Исходя изъ того, что оба вышеприведенные признака даются какъ «б. ч.», я опредѣлилъ наше растеніе какъ *torulosa* Rouy, у котораго главный признакъ—бугорчатость стручковъ налицо.

ковъ, доходящихъ до 5 см. ш. Можно наблюдать часто всѣ переходы одной формы въ другую.

Láthyrus pratensis L. (II, стр. 318).

Наши растенія относятся къ типичной формѣ:

α. typicus Pospich. Съ одинаковыми листьями и прилистниками какъ на стеблѣ, такъ и на вѣтвяхъ. первые всегда обь одной парѣ:

Всѣ видѣнные мною экземпляры можно отнести къ:

subf. glaberrimus (Schur) Aschers. et Gr. Растеніе голое или слабо опушенное и тогда съ возрастомъ б. или м. теряющее свое опушеніе. Навѣрно у насъ найдется и *pubescens Aschers. et Gr.* б. или м. густо опушенное.

Láthyrus palúster L. (II, стр. 319).

Болото по р. Яхромѣ, Дмит. у. (II. Петровъ).

По свидѣтельству Aschers. et Gr., растеніе мало измѣнчиво; измѣняется только очертаніе листьевъ, на чемъ и основаны нѣсколько формъ, но онѣ до того непостоянны, что въ одной и той же мѣстности можно найти всѣ переходы отъ одной формы въ другую, и, повидимому, это зависить отъ отъенія, такъ какъ широколистная форма развивается въ тѣни.

У насъ я могъ различить слѣдующія формы:

α. genuinus Gren. et Godr. Листья продолговатые, продолговато-ланцетные или ланцетные, 5—10 мм. ш.

β. latifolius Lambertye. Листья овальные или широко-продолговатые, ширина ихъ до 22 мм., при длинѣ 4—4,5 см. По берегу р. Македешовки близъ ст. Удѣльная. М.-Каз. ж. д. Бри. у. (Куль.).

Oróbus vérnus L. (II, стр. 320).

Наши растенія относятся къ типичнымъ.

У А. А. Хорошкова въ гербаріи находится экземпляръ, найденный на Воробьевыхъ горахъ, у котораго нѣсколько листьевъ кажутся непарно-перистыми съ конечнымъ листочкомъ; въ послѣдней парѣ одинъ листокъ не развился, другой же занялъ осевое положеніе то на длинномъ черешкѣ, то почти сидячій между парными листочками, отодвинувъ въ сторону конечное мягкое остріе.

Geránum palústre L. β. trifidum Litw. (II, стр. 326).—Сыр. Отч. II, стр. 19.—Хор. II, стр. 18.

Татарское-Сатино и Манькина гора, Пдл. у. (X.).—Подольскъ, дача Вишнякова (Куль.).—Лѣсъ между 17-й верстой Брянск. ж. д. и Нѣмчиновымъ (С.).

Geránum sanguineum L. (II, стр. 326).

Окрестности Николо-Пѣшиношскаго монастыря, Дмит. у. (сообщено II. П. Петровымъ, но въ гербаріи у него нѣтъ).

α. latipartitum Petunn.

R. Knuth. приводя эту форму, въ «Das Pflanzenreich-Geraniaceae» на стр. 519. говоритъ: «A varietate prostratum, vix diversum», а на стр. 139 при описаніи var. prostratum (Cav.) Pers. даетъ такое описаніе: «Humilius, ceterum a typo non diversus», что неправильно. Persoon. Syn. plant. II, p. 234, описываетъ форму β. prostratum такъ: «caule prostrato nodoso, nodis inflatis, fol. oppositis profunde quinquelobatis lobis trifidis, cor. roseis, variegatis»; какъ синонимъ приводитъ G. lancastriense With. Ямось изслѣдовать форму prostratum изъ-подъ Биаррица, у которой листья нѣсколько сходны съ листьями формы latipartitum, но много мельче; въ остальномъ же эти двѣ формы такъ различны, что смѣшать ихъ нельзя. У var. prostratum (Cav.) Pers. стебель длинный, распростертый, съ удлиненными междоузліями, густо покрытъ отстоящими бѣлыми щетинистыми волосками, равно какъ и листья, которые на верхней сторонѣ покрыты тоже длинными щетинками, но прижатými; очертаніе листьевъ угловатое; цвѣтки свѣтлой окраски. У var. latipartitum Petunn. стебель б. ч. прямостоящій, рѣже основаніемъ приподнимающійся, покрытъ рѣдкими щетинистыми волосками, у основанія почти голый; лопасти листьевъ б. или м. равной длины, отчего очертаніе листа округлое, опушеніе слабое съ очень короткими прижатыми щетинистыми волосками, мѣстами верхняя сторона листьевъ почти голая; цвѣтки ярко кроваво-красные, какъ у типа. Надо замѣтить, что R. Knuth при описаніи var. prostratum ссылается на таблицы у Dillenius. Hortus Elthamensis (1732), p. 163. t. 136. f. 163 (подъ названіемъ G. lancastriense) и у Cavanilles. Monadelphiae classis Dissertationes (1792), p. 196. t. 76. f. 3. Обѣ таблицы прекрасно передаютъ все признаки var. prostratum и рѣзко отличаются отъ рисунка, приведеннаго у меня для var. latipartitum Petunn.

Geranium sibiricum L. (II, стр. 327).

Добрятино близъ Подольска (Куль.).

Geranium pusillum L. (II, стр. 328).—Сыр. Огч. III, стр. 13.—Хор. II, стр. 18.

У дѣсовой сторожки близъ Лукова озера, Бгр. у. (X.).—Владыкино близъ дачи бывш. Руперти (Асѣъ).—Село Раменское у церкви. Бри. у. (II. и С.).—Близъ д. Пехорки, Бри. у. (С.).

Oxalis stricta L. (II, къ стр. 332).—Хор. III, стр. 93.—Пет. Кр. I, стр. 113.

Стебель 10—30 см., прямостоящій, простой, съ ползучими подземными побѣгами; листочки обратно-сердцевидные, цѣльнокрайніе, вдоль складывающіеся; цвѣтки по 1—5, чаще по два, надушные на длинномъ цвѣтостѣбѣ, приблизительно равномъ черешку листьевъ или нѣсколько длиннѣе его; вѣничикъ желтый, вдвое длиннѣе чашечки; рыльца шаровидныя; коробочка пятигранная, длинная; сѣмена многочисленныя, продольно-

ребристыя и слабо поперекъ морщинистыя. Заносное. Вблизи Дѣвичьего монастыря (П.).—Подъ Серпуховымъ на огородахъ (Вар.).—На огородахъ близъ д. Капустина, Брн. у. (Х.).



Oxalis stricta.

***Polygala vulgaris* L.** (П, стр. 334).

Лука по р. Яхромѣ, Дмт. у. (сообщено П. Петровымъ).

Въ высшей степени измѣнчивое растеніе. Разными авторами описано очень много подвидовъ и формъ; очень часто описывали одніѣ и тѣ же формы нѣсколько разъ и нерѣдко приводили синонимы къ вновь описаннымъ формамъ совершенно имъ не отвѣчающіе. Rouy et Foucaud, въ Fl. de France, приводятъ 18 подвидовъ, изъ которыхъ нѣкоторые съ 2—4 формами. а Chodat (Monogr. Polyg.) разбиваетъ этотъ видъ на subsp., var., subvar. и formae, хотя и не столь многочисленныя, но довольно запутанныя. Встрѣчающіяся у насъ растенія довольно разнообразны, ихъ можно б. или м. точно отнести къ слѣдующимъ формамъ:

α. ***genuina* Cel.** Кисти многоцвѣтковые; крыловидные чашелистики равны ширинѣ б. или м. зрѣлой коробочки или шире ея. Вблизи ст. Братовишна, М.-Яр. ж. д., Дмт. у. (С.).—Семкино (Н. Слуцкий).

У всѣхъ остальныхъ формъ коробочка шире крыловидныхъ чашелистниковъ.

β. ***rosulata* Fr.** Корневые и нижніе стеблевые листья крупнѣе и шире остальныхъ, нѣсколько сближены наподобіе розетки, но не столь густо и не такъ явственно, какъ у *P. amarella*. Анофріево, Руз. у. (П.).

γ. ***oxyptera* Rchb. (sp.)**. Прикорневые листья такіе же, какъ и стеблевые или крупнѣе стеблевыхъ, но не сближены.

1. ***collinum* Rchb.** Стебли простые (рѣдко, когда верхушка сломана, вѣтвистые); цвѣтки мелкіе, 3,5—4,5 мм. дл.; крыловидные чашелистики немного длиннѣе коробочки. Клычово, Кзм. у. (П. и С.).

2. ***pratense* Rchb.** Стебли б. ч. вѣтвистые¹⁾. иногда нѣкоторые вѣтви длиннѣе стебля; цвѣтки 5—6 мм. дл.; крыловидные чашелистики много длиннѣе коробочки, иногда почти вдвое. Чаше другихъ формъ.

¹⁾ Въ первый годъ стебли часто простые, но такія растенія легко отличимы цвѣтками и крыловидными чашелистиками.

- δ. *Lejeunei* Bor. (sp.)¹⁾. Обликъ какъ у типа, но цвѣтки мелкіе; прицвѣтники нѣсколько крупнѣе, хотя не образуютъ хохолка, но замѣтны; крыловидные чашелистики равны зрѣлой коробочкѣ или короче ея. Петровское на р. Москвѣ. Серебряный боръ близъ Хорошова, Свиблово, Раменки; заливной лугъ у Владычнаго монастыря близъ Серпухова; Быково.
Брн. у. (П.).

***Polýgala comósa* Schkuhr** (II, стр. 335).

Borbas называетъ форму съ бѣлыми цвѣтками: *var. leucostachys* Borb.

***Polýgala amarélla* Crantz** (II, стр. 336).

- Кромѣ обычной формы у насъ еще:
α. *uliginosa* Rchb. Стебли б. или м. вѣтвистые съ длинными тонкими вѣтвями; соцвѣтіе удлинненное съ цвѣтками нѣсколько разставленными; коробочка обратно-сердцевидная, иногда основаніе ея клиновидное²⁾. Пушкино; Братовщина, Дмт. у.; близъ с. Зеленаго, Брн. у.; близъ ст. Мухино, Бр. ж. д., Вер. у. (С.).—Богородское, Кусково, Мытищи (П.).—Влахернская, Дмт. у. (Н. Слудскій).



Polygala amarélla α uliginosa.

¹⁾ Переходная форма отъ *P. vulgaris* къ *P. comosa*. Boreau описалъ ее какъ видъ, а позднѣйшіе изслѣдователи соподчиняли ее по своему вкусу, такъ: Chodat приводитъ ее какъ var. къ *P. comosa*, Bennet какъ форму *P. amarélla* Cr. изъ-за короткихъ крыловидныхъ чашелистиковъ, а Koch, ed. III, какъ форму къ *P. colina* Rchb., которое онъ считаетъ самостоятельнымъ видомъ. Форма *Lejeunei* довольно измѣнчива, особенно измѣнчивы крыловидные чашелистики; они то тупые, то заостренные, но не длиннѣе коробочки; измѣнчива также длина прицвѣтниковъ, но настоящаго хохолка на верхушкѣ кисти никогда не бываетъ и сама кисть содержитъ менѣе цвѣтковъ, чѣмъ у *P. comosa*. Есть еще признакъ, который не всегда виденъ на гербарныхъ экземплярахъ, это—вѣтвистое корневище, какъ у *P. vulgaris*; у *P. comosa* обыкновенно стебли отходятъ отъ середины пучкомъ и корневище не вѣтвистое.

²⁾ Въ Западныхъ флорахъ (за исключеніемъ монографіи Chodat) эта форма называется var. *austriaca* Gr., но А. Kerner, издавая ее изъ-подъ Вѣны (loc. clas.) въ Herb. Fl. Ex. Austr.-Hung. № 513, говорить, что подъ *P. austriaca* Crantz слѣдуетъ понимать вѣтвистую крупноцвѣтковую форму, въ противоположность не вѣтвистой, за которой должно удерживать названіе *P. amara* L. и соподчинить этому виду *P. austriaca*, какъ разновидность (надо замѣтить, что у var. *austriaca* Gr. цвѣтки б. ч. бѣлые); этимъ двумъ формамъ можно противопоставить встрѣчающіеся у насъ растенія съ мелкими цвѣтками и съ простыми стеблями—*P. amarélla* Crantz, а съ вѣтвистыми стеблями—*P. amarélla* Crantz var. *uliginosa* Rchb. Доводы Rouy et Foucaud, въ Fl. de France, T. III, p. 78, въ пользу того, что мелкоцвѣтковая форма есть на-

Euphórbia helioscópia L. (II, стр. 340).

Петровское-Разумовское (А. Виноградовъ), герб. Студ. Круж. для изсл. Русс. Фл.

Impatiens noli tângere L. (II, стр. 351).—Sch. II, № 257.

Impatiens parviflora DC. (II, стр. 351).

Поклонная гора, Нескучный садъ (Ассь).

Impatiens Roylei Walp. (II, въ стр. 352).

Однолѣтнее растеніе; стебель до 2 м., прямостоящій, голый, какъ и все растеніе; листья мутовчатые—по три, рѣже супротивные, овально-ланцетные, заостренные, остро-пильчато-зубчатые, у основанія каждаго зубчика по железкѣ; при основаніи черешковъ листьевъ стебельчато-железистые прилистники; цвѣтки лилово-розовые, по 3 на длинномъ цвѣтоносѣ въ пазухахъ верхнихъ листьевъ, образуютъ какъ бы верхушечное соцвѣтіе, болѣе рѣдкіе въ пазухахъ остальныхъ листьевъ. Запесено и растетъ въ большомъ количествѣ особей близъ Сенежскаго озера, Клм. у., захватывая все болѣе болѣе районъ. Найдено Золотаревымъ; опредѣлено и сообщено Н. О. Золотницкимъ.



Impatiens Roylei.

Lavatera thuringiaca L. (II, стр. 359).

У насъ можно различить слѣдующія формы:

- α. **typica Beck.** Лопастн нижнихъ листьевъ округлыя или нѣсколько заостренныя, что виднѣе на среднихъ и верхнихъ листьяхъ; средняя лопасть нѣсколько крупнѣе остальныхъ; листья съ обѣихъ сторонъ густо опушены, съ верхней стороны слабѣе. Если верхняя сторона листьевъ голая или почти голая, то это: **glabrescens Beck.**
- β. **protensa Beck.** Средняя лопасть у верхнихъ листьевъ удлинненная, заостренная, замѣтно крупнѣе остальныхъ. Воробьевы горы; Бѣлые Колодези, Клм. у. (П.).—Тропецкое (С.).

Hypericum perforatum L. (II, стр. 360).

Луга р. Яхромы, Дмт. у. (Н. Петровъ).

У насъ пока можно различить слѣдующія формы ¹⁾:

стоящее *P. amara L.*, а крупноцвѣтковая *P. amarella Crantz*, на мой взглядъ, болѣе туманны и не столь вѣски, какъ доводы Kerner (loc. cit.), по разъясненію котораго твердо установилось понятіе объ этихъ двухъ видахъ.

¹⁾ При обработкѣ нашихъ формъ я пользовался монографіей Fröhlich, Der Formenkreis der Arten *Hypericum perforatum L. etc.*, помѣщенной въ Sitzungsber.

ssp. vulgare Neilr. Листья крупные, б. или м. широко-яйцевидные, рѣже эллиптическіе; чашелистики 1—1,5 мм. ш. и до 7 мм. дл., б. ч. съ черными точками и линіями; вѣничикъ 25—35 мм. въ поперечникѣ.
α. lucidum Fröhlich. Лестники безъ черныхъ линій, только съ черными точками по краю. Воробьевы горы (П.).

β. lineolatum (Jord.) Fröhlich. Лестники съ черными линіями и точками. Обычная форма.

ssp. angustifolium DC. Листья узкіе, б. ч. съ основаніемъ клиновидно-суженнымъ; чашелистики 0,7 (1) мм. ш. и 4—6 мм. дл., б. ч. безъ черныхъ точекъ и линій; вѣничикъ 15—20 мм. въ поперечникѣ. Успенское, Зви. у. (X.).

Hypericum quadrangulum L. (II, стр. 361).

Вѣдъ видѣнные мною экземпляры принадлежать къ типичнымъ = **ssp. typicum Fröhlich**; послѣдній авторъ въ своей монографіи (l. c.), слѣдуя Fritsch и Hayek, называетъ этотъ видъ *H. maculatum Crantz*, мотивируя это тѣмъ, что у Линнея очень не ясно описать *H. quadrangulum*. У Линнея б. часть видовъ описана не достаточно подробно, послѣдній же видъ, несмотря на краткость описанія, никакимъ инымъ видомъ, кромѣ *H. quadrangulum*, быть не можетъ, а потому мѣнять названіе нѣтъ повода.

Hypericum hirsutum L. (II, стр. 361).—Хор. II, стр. 19.

Машькина гора. Пинцири. Булатово. Пдл. у. (X.). Лѣвый берегъ р. Десны близъ Дубровицъ. Пдл. у. (Куль.).—Ямщина, Зви. у. (Ассъ).

Viola palustris L. (II, стр. 367).

Озера. Кзм. у. (П.).—Покровское на Филяхъ противъ Шелепихи, Новая Деревня близъ Пушкина. Подосинки по М.-Каз. ж. д.; Быково, Брн. у. (Ассъ).

Viola epipsila × palustris (II, стр. 369).

Близъ Владыкина (Ассъ).—Раменское, Брн. у. (II. и X.).

Viola hirta L. ¹⁾ (II, стр. 369).—Sch. III, № 804.

Можно различить слѣдующія формы:

d. k. Ak. d. Wiss. in Wien 1911. По замѣчанію этого автора и по моимъ наблюденіямъ, можно встрѣтить вѣдъ переходы между подвидами, но часто встрѣчаются какъ подвиды, такъ и формы, очень явственно выраженные; характерное отличіе между вышеприведенными подвидами это величина чашечки и вѣничика; у *ssp. vulgaris* чашелистики б. ч. 1,5 мм. ш. и 7 мм. дл., тогда какъ у *ssp. angustifolium* они чаще 0,7 мм. ш. и 4 мм. дл.; промежуточныя же формы не рѣдко опредѣлить нельзя.

¹⁾ W. Becker, въ *Viola Europaea*, говоритъ, что у *V. hirta* L. было описано такъ много формъ и съ этими описаніями такъ много напутано, что разобраться въ нихъ почти нѣтъ возможности; для избѣжанія всей этой путаницы онъ отбросилъ

α. vulgaris Rchb.

β. glabrifolia W. Becker. Обликъ какъ у *α. vulgaris*. но почти всѣ листья голые или нѣкоторые слабо опушены только по жилкамъ и иногда по краямъ; молодые листья то почти голые, то слабо опушенные, а равно и черешки листьевъ то голые, то опушенные. Боровскій курганъ, Брн. у. (С.).—По склону высокаго берега р. Мѣчи близъ Наумова, Пдл. у. (Х.).

Въ гербаріи А. Н. Петуникова хранится экземпляръ, найденный Н. П. Кауфманомъ въ Серебряномъ бору близъ Хорошова, съ краткимъ діагнозомъ слѣдующаго содержанія: «var. foliis junior pubescentibus vel glabriusculis» и далѣе «черешки тоже или голые или волосистые». Этотъ экземпляръ опушенъ гуще моего. Гофманъ въ гербаріи за № 1851 и Cler., Cat., p. 185, упоминаютъ о такихъ же экземплярахъ, а равно Максимовичъ и Двигубскій; послѣдній приводитъ ихъ подъ именемъ *V. campestris*. Вѣроятно, подобные экземпляры встрѣчаются не рѣдко, но только просматриваются; такіе экземпляры съ сомнительнымъ опушеніемъ Беккеръ называетъ var. *pubescentifolia* W. Becker, въ отличіе отъ экземпляровъ съ густымъ опушеніемъ, отмѣченныхъ имъ подъ var. *hirtifolia* W. Becker.

γ. fraterna Rchb.

Viola collina Bess. (II, стр. 370).

Крылатское, склонъ оврага у села (Ассы).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.).—Бѣлые Колодези, Невѣрово. Калм. у. (П.).—Дубровицы, Пдл. у., высокій берегъ рѣки (Н. Слуцкій).

Кромѣ обычной формы у насъ еще:

α. violacea Wiesb. Цвѣтки темно-фіолетовые. Серебряный боръ близъ Хорошова (П. и С.). По окраскѣ цвѣтковъ издали можно принять за *V. hirta* L., но они душистые; противъ того, что это могла быть помѣсь съ *V. hirta*, говоритъ вполнѣ нормально развитая пыльца.

всѣ ранѣе описанныя формы и предлагаетъ свои, на мой взглядъ, хотя, какъ кажется, и хорошо разграниченныя, но на дѣлѣ, какъ и прежнія формы, переходящія одна въ другую и подчасъ одна отъ другой не отличимыя. Онъ предлагаетъ слѣдующее дѣленіе: ssp. *brevifimbriata*—съ короткими бахромками на прилистникахъ или почти безъ нихъ, и ssp. *longifimbriata*—съ длинными бахромками на прилистникахъ; оба подвида распадаются на var. *hirtifolia*, *pubescentifolia* и *glabrifolia*; var. распадаются на subvar. *profundecordata*, *planecordata* и *subtruncata* и, наконецъ, subvar. распадаются на: *longifoliata* (= *vulgaris* Rchb.) и *brevifolia* (= *fraterna* Rchb.). Про прежнее дѣленіе на *vulgaris*, и *fraterna* Беккеръ говоритъ, что первая—форма лѣсовъ, вторая—открытыхъ мѣстъ, и что между ними наблюдаются всѣ переходы; я же, съ своей стороны, наблюдать всѣ переходы между var. *hirtifolia*, *pubescentifolia* и *glabrifolia*, изъ чего можно заключить, что и новое разграниченіе формъ не лучше стараго; я привожу тутъ *glabrifolia* Becker потому, что безъ этой формы можно стать втупикъ, имѣя въ рукахъ *V. hirta* L., но голую или почти голую.

Viola collina × **hirta** Val de Lièvre ¹⁾ (II, стр. 371).

Цвѣтки безъ запаха; но листьямъ болѣе подходитъ къ *V. hirta*; присутствіе длинныхъ, по краямъ опушенныхъ, бахромокъ на прилистникахъ указываетъ на *V. collina* Bess.; рѣже нѣкоторые бахромки безъ рѣсничекъ.

Такая помѣсь была найдена А. Н. Петунниковымъ и мною въ Серебряномъ бору близъ Хорошова, между обоими чистыми видами; тамъ же была нами найдена тоже помѣсь, но нѣсколько въ другой комбинаціи, а именно: нѣсколько экземпляровъ совершенно не отличалась отъ *V. hirta*, но цвѣтки были съ сильнымъ запахомъ, и, наконецъ, два экземпляра, общій обликъ которыхъ не отличался отъ *V. collina*, но съ двумя нижними цвѣтками какъ у *V. collina*, а остальные цвѣтки были какъ у *V. hirta*, при чемъ всѣ цвѣтки пахучіе.

Viola canina (L. p. p.) Rechb., а не L. (II, стр. 372).

α. **sabulosa** Rechb. Къ описанію прибавить: стебель 3—8 см. Между Нѣмчиновымъ и Вырубовымъ (Ассъ).

β. **ericetorum** (Schröd. p. sp.) Rechb., а не Rechb. Къ описанію прибавить: стебель 5—15 см. съ основаніемъ лежащимъ.

γ. **lucorum** Rechb.—Sch. III, № 755.

Къ описанію прибавить: стебель до 30 см., прямостоящій съ приподнимающимся основаніемъ.

δ. **montana** (Fr.) Rechb. Хор. III, стр. 92.

Стебель прямостоящій, до 45 см.; листья яйцевидно-сердцевидные или удлинено-сердцевидные съ б. или м. выгнутыми (но не прямыми) краями; прилистники очень различной величины, отъ 5 мм. до 21 мм., достигая послѣдней величины у верхнихъ листьевъ; цвѣтки крупныя; нижній лепестокъ до 21 мм. дл. На высокомъ берегу р. Пахры близъ д. Луковин и близъ Данилова, Пдл. у. (X.).

При обработкѣ *V. canina* L., я надѣялся между ея крупными формами найти и настоящій. Линнеевскій видъ *V. montana*; но, при тщательномъ изученіи послѣдняго вида по литературнымъ даннымъ, мнѣ такъ и осталось не совсѣмъ яснымъ, что надо разумѣть подъ этимъ Линнеевскимъ видомъ. Два монографа W. Becker и K. Kupffer даютъ приблизительно одни и тѣ же признаки для различія *V. canina* L. отъ *V. montana* L., это—крупный ростъ и болѣе крупныя размѣры отдѣльныхъ частей у послѣдняго вида. Къ сожалѣнію, числовыя данныя одного заходятъ за числовыя данныя другого, такъ что есть граница, гдѣ оба эти вида почти нельзя различить, примѣромъ чему является установленная К. Купфферомъ разновидность *V. montana* L. var. *alpina*, про которую этотъ авторъ гово-

¹⁾ In Oest. Bot. Zeit. 1858.

рить, что она можетъ быть отнесена къ *V. canina* L., но такъ какъ она была найдена въ сообществѣ съ типичной *V. montana* L., то онъ соподчинилъ ее послѣднему виду. Въ Röhling's Deutschl. Fl. II, p. 265, говорится, что *V. montana* есть безъ сомнѣнія *V. persicifolia* (*V. elatior* Fr.), на что указываетъ форма листьевъ удлинено-яйцевидная, съ прямыми или даже слегка вогнутыми краями, тогда какъ у *V. canina* L. листья не столь узкіе и съ краями б. или м. выгнутыми.—W. Becker, въ Die Veilchen der Bayerischen Flora и въ *Viola Europaeae*, указываетъ для *V. montana* L. рисунокъ Ic. Rehb. Deutsch. Fl. 4505, гдѣ изображено *V. Ruppii* All. и *V. Ruppii* All. nemorosa Kütz.; изображеніе послѣдняго представляетъ растение своимъ обликомъ очень напоминающее *V. canina*, листья и прилистники котораго, однако, очень близки къ *V. elatior* Fr.; такую фіалку я склоненъ считать за *V. montana* L.; но подобной у насъ мнѣ пока не приходилось встрѣчать. Какъ отличный признакъ приводится величина прилистниковъ. Neuman, въ Svet. Fl., придаетъ имъ 10—15 мм. дл. и 5 мм. ш., а W. Becker для среднихъ прилистниковъ 10—15 мм. дл., для верхнихъ же 2 см. дл.; у нашихъ *V. canina* L. съ листьями совершенно не подходящими къ *V. montana* L. прилистники очень разнообразны по размѣрамъ, начиная отъ 5 мм. и кончая 21 мм. Величина придатковъ у чашелистниковъ тоже непостоянна: они увеличиваются съ ростомъ растенія, но бываетъ и обратное,—у растеній съ довольно крупными прилистниками и у растеній, обладающихъ крупнымъ ростомъ, придатки чашелистниковъ маленькіе. Величина цвѣтка тоже очень измѣнчива. Относительно мѣстообитанія Becker говоритъ, что въ Скандинавіи *V. montana* L. встрѣчается на горахъ, а *V. canina* L. растетъ по низменностямъ; въ остальной Европѣ оба вида часто растутъ вмѣстѣ, что подтверждаетъ и К. Купфферъ. Въ Ic. Rehb., Deutsch. Fl. № 4501, подъ названіемъ *V. canina* L. var. *montana* Fr., приведенъ рисунокъ, вполне подходящий къ нашимъ крупнымъ растеніямъ; въ текстѣ же говорится, что это и есть *V. montana* L. и прибавлено, что оно определено Фрисомъ. Если же слѣдовать W. Becker и признавать за *V. montana* L. рисунокъ Ic. Rehb. № 4505 подъ названіемъ *V. Ruppii* All. nemorosa Kütz., то встрѣчающейся у насъ крупной формѣ слѣдуетъ присвоить наименование *V. canina* L. *montana* (Fr.) Rehb. (Ic.), какъ у меня и приведено. Въ поясненіе того, что разумѣетъ К. Купфферъ подъ *V. montana* L., онъ ссылается на два рисунка Rehb., въ Pl. crit. I, f. 154, гдѣ изображено *V. canina* L. var. *lucorum* Rehb., и въ Rehb., Ic. Fl. Germ. III, f. 4501, гдѣ изображена *V. canina* L. var. *montana* Fr. Относительно второго рисунка разногласіе понятно; что же касается перваго, то, признавъ его за *V. montana* L., провести границу между *V. canina* L. и *V. montana* L., на мой взглядъ, совсѣмъ нельзя.

***Viola pumila* Chaix (II, стр. 374).**

W. Becker и К. Kupffer признаютъ два вида: *V. stagnina* Kit. и *V. pumila* Chaix, считая синонимъ послѣдняго *V. pratensis* M. et K. У перваго вида прилистники не превышаютъ черешка листа, а у нижнихъ ли-

ствѣтъ прилистники короче его; у второго вида всѣ прилистники или только верхніе явственно длиннѣе черешка листьевъ. У нашихъ растений прилистники не длиннѣе черешковъ, а потому ихъ слѣдуетъ отнести къ:

***Viola stagnina* Kit.**

Кузнечики близъ Подольска (Гей.).

***Viola Riviniána* Rechb.** (II, стр. 375).

Близъ Рождествена на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

***Viola arenária* DC.** (II, стр. 375).—Ф. Б. Пр., стр. 74.

Наверху песчаната обрыва въ «Бору» близъ Тренарева, Мож. у. (Ф. Б.).

Несмотря на то, что W. Becker, въ *Viola Europaeae*, приводитъ для этого вида названіе *V. rupestris* Schmidt, какъ болѣе старое (1791 г.), я склоняюсь болѣе къ мнѣнію К. Kupffer, высказанному имъ въ Fl. sauc. crit., что за этой фіалкой правильнѣе оставить твердо укоренившееся названіе *V. arenaria* DC., въ виду того, что Шмидтомъ описана только голая форма, тогда какъ голую форму нельзя признать за типичную. Если считать за видовое названіе *V. arenaria* DC., то голую ея форму можно соподчинить ей какъ *var. rupestris* (Schmidt) Neum., какъ это сдѣлалъ Нейманъ, а за нимъ Купфферъ. Такой формы пока въ Моск. губ. не найдено, она встрѣчается только на югѣ.

У насъ пока можно различить слѣдующія формы:

α. ***typica* (Neum., Wahlst., Murb.) Kupffer.** Все растеніе густо покрыто очень короткими волосками; завязъ и коробочка тоже опушены.

β. ***glabrescens* Neum.** Все растеніе покрыто разсѣянными волосками, иногда нѣкоторые листья почти голые; завязъ почти голая.

Эти двѣ формы въ своихъ крайнихъ проявленіяхъ хорошо различимы, но между ними замѣчаются всѣ переходы.

Встрѣчаются какъ бы промежуточныя формы между *V. arenaria* DC. и *V. canina* L., но у всѣхъ видѣнныхъ мною такихъ промежуточныхъ формъ пыльца была б. ч. недоразвита (стерильная), что, по словамъ К. Kupffer и W. Becker, заставляетъ предполагать, что это—помѣсь между вышеприведенными видами. Такая помѣсь была описана въ Koch's Syn. d. Deutsch. Fl., 3 Aufl. I, p. 202: *V. arenaria* × *ericetorum* Borb. (= *V. Braunii* Borb.). Растеніе безъ осевой розетки; стебли лежащіе или восходящіе, въ нижней части синеватые; листья широко-яйцевидные или нѣсколько яйц., туповато-заостренные, у основанія б. или м. сердцевидные; прилистники продолговатые, заостренные, съ бахромками; цвѣтки свѣтлосиніе съ фіолетовымъ оттѣнкомъ; шноръ грязно-голубовато-бѣлая, рѣдко бѣлая, въ 3—4 раза длиннѣе придатковъ чашелистиковъ; завязъ голая; все растеніе, особенно черешки листьевъ и цвѣтоножки, б. или м. густо опушено; стеблей часто очень много отъ одного корневца. Такое же описаніе приведено и у W. Becker для *V. canina* × *arenaria*, и оно очень близко

подходить къ тѣмъ фіалкамъ, въ которыхъ я склоненъ видѣть *V. arenaria* × *canina* L. β. *ericetorum* Rehb.; конечно, эти формы, какъ всякія помѣси, могутъ уклоняться то въ ту, то въ другую сторону, но въ среднихъ формахъ признаки обоихъ видовъ выражены довольно равномерно. Совсѣмъ иное представляетъ растеніе, которое по своему облику не отличимо отъ *V. canina* L. δ. *montana* (Fr.) Rehb., но черешки, цвѣтоножки и часть листьевъ котораго б. или м. густо опушены; мнѣ кажется, такое растеніе можно тоже считать помѣсью между *V. arenaria* DC. и *V. canina* L. δ. *montana* Rehb.,—тѣмъ болѣе, что пыльца у него стерильная, т.-е. съ ничтожнымъ количествомъ нормальныхъ зеренъ. Такимъ образомъ у насъ найдено:

***Viola arenaria* DC. × *canina* (L.) Rehb. β. *ericetorum* Rehb.**

Между Дарьинскимъ и Успенскимъ, Зви. у.; Лужки, Срп. у.; на лугу по берегу р. Мочи близъ Оздобичина, Пдл. у. (X.).—Серебряный боръ близъ Хорошова (Асесъ).

***Viola arénaria* DC. × *canina* (L.) Rehb. δ. *montana* (Fr.) Rehb.**

Косино (X.).

***Viola tricolor* L. (II, стр. 376).**

Хотя встрѣчаются почти не замѣтные переходы между α. *vulgaris* Koch и β. *arvensis* Murr., все же монографы считаютъ ихъ за самостоятельные виды, а потому, раздѣляя ихъ, привожу болѣе полное описаніе.

***Viola arvensis* Murr.** Однолѣтнее или двулѣтнее растеніе, б. или м. густо покрытое короткими волосками; цвѣтки не крупнѣе 15 мм., считая длину со шнорой; вѣнчикъ б. ч. бѣловато-желтоватый; нижній лепестокъ снабженъ у основанія бородкой волосковъ, окружающихъ голое пятно (магazine), спереди открытое; пыльца б. ч. пятигранная, единичныя пылинки 4—3-гранныя; губа рыльца очень маленькая, отверстіе рыльца обращено книзу¹⁾.

У насъ пока можно различить слѣдующія формы:

var. communis (With.) Neum. Одно-двулѣтнее растеніе; стебель прямо-стоящій, маловѣтвистый или простой; конечная доля прилистниковъ линейвиднo-ланцетная или ланцетная, мало-зубчатая или цѣльно-

¹⁾ Привожу эти двѣ формы потому, что у насъ встрѣчаются особи очень близкія къ нимъ, но есть всѣ переходы отъ одной формы къ другой; есть особи, у которыхъ налицо только часть признаковъ. Встрѣчаются растенія очень мелкія, которыя я отношу къ var. *communis* (With.) Neum., но которыя близки къ *V. Kitaebliana* R. et S.,—виду, отличительный признакъ котораго по ключу K. Kupffer, въ Fl. cauc. crit., заключается въ величинѣ вѣнчика, не превышающаго 7 мм. дл.; особи, видѣнныя мною, очень мелкія съ маленькими цвѣтками, не превышающими 7 мм. и довольно густо опушенные; это все признаки *V. Kitaebliana* R. et S., но верхніе листья овально-ланцетные, тогда какъ у *V. Kitaebliana* они должны быть ланцетные; шнора же замѣтно превышаетъ придатки чашелистниковъ, а у *V. Kitaebliana* она должна быть очень мала.

крайняя; цветоножки длиннее листьевъ, б. ч. примоторная; чашелистики б. ч. нѣсколько короче вѣничка, рѣже равны ему или слегка длиннее его; вѣничекъ б. ч. бѣловато-желтый, рѣдко по концамъ съ фиолетовыми пятнами; шпора слегка длиннее придатковъ чашелистиковъ.

var. patens (With.) Neum. Одно-двулѣтнее растеніе съ сильно развѣтвленнымъ у основанія стеблемъ; конечныя доли прилистниковъ линейно-ланцетныя или ланцетныя, походятъ на листья, по краямъ зубчатые; цветоножки отстоящія, во время цвѣтенія равны листьямъ; цвѣтки б. или м. крупныя; чашелистики крупныя, длиннее бѣловато-желтаго вѣничка; лепестки направлены впередъ, почему цвѣтокъ полураскрытый; шпора нѣсколько короче придатковъ чашелистиковъ.

Viola tricolor L. Одно-двулѣтнее растеніе; стебель прямостоящій или приподнимающійся, до 30 см., простой или вѣтвистый, вѣтвь съ листьями б. или м. опушенный; нижніе листья сердцевидные, къ верхушкѣ становятся продолговато-эллиптическими или ланцетными; прилистники линейно-перисто-раздѣльные; конечная ихъ доля крупная, часто зубчатая и стянута какъ бы въ черешокъ; вѣничекъ длиннее чашечки, очень разнообразной окраски въ сочетаніи фиолетоваго съ желтымъ; шпора не длиннее придатковъ чашелистиковъ; нижній лепестокъ у основанія съ бородкой волосковъ, окружающихъ голое пятнышко (магазинъ); нылца б. ч. четырехугольная, рѣдко 3—5-угольная; губа на рыльцѣ большая, отверстие на немъ обращено впередъ.

У насъ пока только:

ssp. genuina Witt. Въ остальные ssp., описанныя Виттерингомъ, встрѣчаются б. ч. по берегу Балтійскаго моря и преимущественно на дюнахъ. Что же касается многочисленныхъ формъ, приведенныхъ Виттерингомъ для ssp. genuina, то въ онѣ основаны на различной окраскѣ вѣничка въ сочетаніи цвѣтовъ фиолетоваго, желтаго и почти бѣлаго. Окраска вѣничка въ гербарныхъ экземплярахъ почти неуловима, а потому приводить какія-либо формы по сухому матеріалу нельзя.

Epilóbium angustifolium L. (II, стр. 382). — S. h. II. № 260.

Epilóbium hirsutum L. (II, стр. 382).

У насъ можно пока различить слѣдующія формы¹⁾:

α. vulgaris Hausskn. Стебель густо покрытъ короткими железистыми волосками и б. или м. разбѣянными длинными бѣлыми мягкими волосками; листья опушены слабо или только по жилкамъ.

¹⁾ Въ приведенные Haussknecht признаки довольно не стойки, — встрѣчаются въ переходы между формами. Haussknecht приводитъ еще форму: adnoscaulon, у которой стебли покрыты исключительно только короткими железистыми волосками; такой формы мнѣ еще не приходилось видѣть, но, вѣроятно, она будетъ найдена въ Моск. губ.

1. *grandiflora* Hausskn. Цвѣтки крупныя, 15—20 мм. Останкино (П.). Если коробочка толстая, очень длинная, 6—9 см. дл., то это: *dolichocarpa* Hausskn. Сокольники (С.).
2. *parviflora* Hausskn. Цвѣтки мельче 15 мм. дл. Часто.
3. *albiflora*. Цвѣтки бѣлыя. Барвиха, Зви. у. (Е. В. Вульфъ).
- β. *villosum* Hausskn. Стебли густо покрыты длинными бѣлыми мягкими волосками, железистые волоски тоже есть; листья съ обѣихъ сторонъ б. или м. густо опушены, отчего на ощупь мягко-бархатистые.
 1. *grandiflora* Hausskn. Цвѣтки крупныя, 15—20 мм. дл. Если завязь и коробочки густо покрыты только железистыми волосками, то это: *adenocarpa* Hausskn.—Трутнево, Вер. у. (Х.).
 2. *parviflora* Hausskn.—Цвѣтки мельче 15 мм.—Роднево, Пдл. у. (Х.). Воробьевы горы (П.).—Если завязи и коробочки густо покрыты только железистыми волосками, то это: *adenocarpa* Hausskn. Ивановское, Зви. у. (Х.).—Островцы, Брн. у. (Нитупскій).

Epilóbium parviflorum Schreb. (II, стр. 383).—Хор. II, стр. 18.

По правому берегу р. Пахры между Манькиной горой и д. Пишири. Пдл. у. (Х.).

Epilóbium montanum L. (II, стр. 384).

У насъ пока можно различить слѣдующія формы:

α. *minus* Hausskn. Хор. III, стр. 92.

Растеніе во всѣхъ частяхъ, исключая цвѣтковь, очень мелкое; стебель не выше 40 см., б. ч. простой, рѣже отъ самаго основанія вѣтвистый; листья мелкіе, 1—2 см. дл. (рѣдко стеблевые до 3 см. дл.) и 4—10 мм. ш., по краямъ часто и мелко-зубчатые. На высокомъ берегу р. Пахры по известнякамъ, близъ д. Данилова и д. Пишири, Пдл. у. (Х.).

β. *ramosum* Hausskn. Стебли б. или м. высокіе, съ середины или отъ основанія вѣтвистые, часто отъ одного корневика цѣлый пучекъ стеблей. Сикирино, по лѣсоосѣлкѣ и близъ д. Пишири, Пдл. у. (Х.).

γ. *apricum* Hausskn. Стебель простой, прямо-торчащій, рѣже только къ верхушкѣ слегка вѣтвистый, толстый, густо-опушенный, какъ и все растеніе; листья жесткіе, сидячіе или почти сидячіе, 3—5 см. дл. и 1—2 см. ш., мелко-зубчатые. Подъ Звенигородомъ (П.).

δ. *umbrosum* Hausskn. Стебель б. или м. высокій, простой или слегка вѣтвистый, слабо опушенный; листья крупныя, мягкіе, тонкіе, снизу свѣтлѣе окрашены, съ округлымъ основаніемъ и черешками до 5 мм. дл.; цвѣтки блѣдной окраски. По тѣнистымъ мѣстамъ. По лѣсному берегу р. Учи близъ Жареновки у ст. Мамонтовка, М.-Яр. ж. д. и Лосинный Островъ (П. и С.).

Изслѣдуя наши мелкія *Epilobium montanum* L., я пришелъ къ тому же убѣжденію, какъ и А. Н. Петуникоу, что ихъ слѣдуетъ отнести къ *E. montanum* L. α . minus Hausskn., хотя они очень походятъ на *E. collinum* Gmel.—Послѣдній видъ характеризуется у Haussknecht и у др. флористовъ слѣдующими признаками: растеніе не высокое; стебли простые или отъ основанія сильно вѣтвистые; листья б. ч. въѣ очередные, мелкіе, очень частые, съ рѣдкими зубчиками; цвѣтки 4—6 мм. дл.; цвѣточные почки шаровидно-яйцевидныя съ тупой верхушкой; сѣмена 0.5—1 мм. дл., съ не частыми бородавочками, тогда какъ у *E. montanum* L. α . minus листья чаще супротивныя съ частыми зубчиками; цвѣтки 7—10 мм. дл.; цвѣточные почки обратно-яйцевидныя, коротко-заостренныя; сѣмена 1—1.5 мм. дл., часто-бородавчатыя. Казалось бы, признаковъ слишкомъ достаточно, чтобы различить эти два вида; на дѣлѣ же выходитъ иначе, и ни одинъ признакъ не оказывается стойкимъ. Я изслѣдовалъ экземпляры типичнаго *E. collinum* Gmel. изъ Германіи, Франціи и Скандинавіи, и ни у одного изъ нихъ не было всѣхъ тѣхъ признаковъ, которые приписываются этому виду; правда, у всѣхъ листья были б. или м. очередные, но зубчики то частые, то рѣдкіе; цвѣтки б. ч. мелкіе, но цвѣточные почки у всѣхъ экземпляровъ б. или м. явственно заостренныя; послѣдній признакъ, хотя приводится многими флористами, включая и монографа Haussknecht, но не упоминается у Gmelin'a, Fl. Bad. IV, p. 265, гдѣ этотъ видъ былъ впервые описанъ; что же касается сѣмянъ, то бородавчатость ихъ б. ч. была такая же, какъ у *E. montanum*. Есть еще признакъ, отличающій *E. collinum* отъ *E. montanum*, это—нѣкоторая ясность листьевъ у перваго вида и сучковатые листья у втораго,—и еще характерная вѣтвистость перваго, нижніе вѣтви котораго часто достигаютъ верхушки стебля и даже иногда перерастаютъ ее, что у *E. montanum* никогда не бываетъ; но этотъ послѣдній признакъ годенъ, конечно, только для вѣтвистыхъ особей. Многие изслѣдователи, какъ-то: Haussknecht, Crepin, Ruprecht и др., говорятъ, что при культурѣ, даже многолѣтней, стойко сохраняются всѣ признаки у *E. collinum* Gmel. А. Н. Петуникоу посѣять сѣмена отъ особей *E. montanum* L. α . minus, собранныхъ близъ Ланкова, Руз. у., и получилъ растенія во всѣхъ частяхъ мелкія, слѣдовательно, сохранившія свои отличительныя признаки, но они стали сильно вѣтвистыми отъ самаго основанія, хотя нижнія вѣтви далеко не доходили до верхушки стебля. Слѣдовательно, какъ мелкая форма *E. montanum*, такъ и *E. collinum* Gmel. сохраняютъ при культурѣ свои признаки; признаки *E. collinum*, какъ я уже сказалъ выше, далеко не постоянны и, если они въ совокупности выражены не явственно, то для послѣдняго вида можно признать болѣе стойкими только слѣдующіе: слегка яснѣе листья, очень частые, б. ч. очередные, а у вѣтвистой формы нижнія вѣтви чаще достигающія верхушки стебля; тупыя же цвѣточные почки никакъ нельзя признать главнымъ отличительнымъ признакомъ, несмотря на то, что онъ приводится большинствомъ флористовъ какъ таковой.—Вообще часто очень трудно сказать, относится ли опредѣляемое растеніе къ *E. collinum* или къ *E. montanum* L. α . minus; только парал-

лесными культурами обоих видовъ можно окончательно выяснитъ, слѣдуетъ ли *E. collinum* считать за самостоятельный видъ, или соподчинить его *E. montanum*; такихъ культуръ, однако, еще ни разу не производилось.

***Epilobium Hornemánni* Rehb.** (II, къ стр. 386).—Хор. IV, стр. 16.

Корневиче безъ побѣговъ, по отцвѣтаніи развивается изъ почекъ у основанія стебля маленькія розетки листьевъ; стебель 5—40 см., про-



Epilobium Hornemánni.

стой (рѣже у крупныхъ экземпляровъ къ верхушкѣ слегка вѣтвистый), голый или слабо опушенный, съ тонкими продольными линиями отъ изгибающихся черешковъ; листья голые или только по краю слабо опушенные, свѣтло-зеленые, тонкіе, нижніе супротивные, остальные очередные или всею очередь, на б. или м. короткихъ черешкахъ (до 5 мм. дл.), овально-эллиптическіе или овально-продолговатые, туповатые или слабо-заостренные, 2—4 см. дл. и 1—1,5 см. ш., по краямъ б. или м. зубчатые; цвѣтки до распусканія поникшіе; цвѣточныя почки яйцевидныя, голыя; вѣнчикъ 5—6 мм. дл., свѣтло-лиловый; чашелистики ланцетные, заостренные, голые; рыльце булабовидное; коробочка до 5 см. дл., сперва слабо железисто-опушенная, по-

томъ голая, часто красноватая; сѣмена продолговато-веретенообразныя съ прозрачнымъ придаткомъ на верхушкѣ, усеяны очень мелкими бороздочками.

Найдено пока только разъ близъ дер. Подушкино. Звя. у., въ сырой придорожной канавѣ въ большомъ числѣ особей. 6 августа, въ цвѣту и плодахъ (X.).

Привожу новый ключъ для видовъ *Epilobium*.

1. Вѣнчикъ колесовидный, слегка неправильный; всею листья очередные. *E. angustifolium* L.

Вѣнчикъ ворончатый, правильный; нижніе листья супротивные или мутчатые; только верхушечные очередные; если же всею листья очередные, то цвѣтки очень мелкіе. 2.

2. Рыльце булабовидное. 3.

Рыльце 4-раздѣльное. 5.

3. Стебель съ 2—4 выступающими продольными ребрышками или линиями отъ изгибающихся листовыхъ черешковъ; листья яйце-видно-ланцетные, овально-ланцетные или овально-продолговатые, на черешкахъ, по краямъ зубчатые. 4.

Стебель цилиндрическій безъ продольныхъ линий; листья сидячіе, ланцетные или линейно-ланцетные, цѣлюкрайніе, рѣдко съ немногими неясными зубчиками. *E. palustre* L.

4. Чашелистики опушенные; сѣмена на верхушкѣ безъ придатка.
E. roseum Schreb.
- Чашелистики голые; сѣмена на верхушкѣ съ прозрачнымъ придаткомъ.
E. Hornemannii Rehb.
5. Стебель, особенно въ нижней части, мохнатый отъ отстоящихъ шиловидныхъ волосковъ; рѣдко стебель покрытъ только железистыми волосками. 6.
Стебель пушистый, особенно вверху, отъ короткихъ прижатыхъ, серповидныхъ волосковъ, поверхность которыхъ усеяна частыми бугорками.
E. montanum L.
6. Цвѣтки крупные, до 20 мм., темно-малиновые; поверхность волосковъ гладкая.
E. hirsutum L.
- Цвѣтки мелкіе, не крупнѣе 10 мм., розовые; поверхность волосковъ покрыта мелкими бугорками.
E. parviflorum Schreb.

Onothéra biennis L. (II, стр. 387).

Въ имѣніи Быковъ у р. Пахры, Пдл. у. (Н. Н. Бландовъ).

Circaea lutetiána L. (II, стр. 387).—Sch. III, № 817.

Circaea alpina L. (II, стр. 388).—Sch. II, № 515.

Вирево, Кн. у. (Н. и Асѣ).

Myriophýllum verticillátum L. (II, стр. 389).—Ф. Б. Пр., стр. 73.

Въ заводяхъ р. Протвы, близъ д. Кубекова, Мож. у. (Ф. Б.).

Sanícula europaea L. (II, стр. 396).

По сообщенію В. М. Козо-Полянскаго у насъ только:

var. genuina Wolf¹⁾. Стебель одиночный, прямой, обыкновенно ниже соцвѣтія простой, голый, рѣже съ 1—2 вѣтвями; листья 4—6 см. дл., 5—10 см. ш., глубоко (но не до основанія) пальчато 5-раздѣльные; лопасти на концѣ туповаты и слегка 3-лопастныя. Лѣсъ между Одесскими и Впучковымъ, Зви. у. (С.).

Aegopódium Podagraria L. (II, стр. 400).—Sch. IV, № 1021.

Falcária Rivin. (II, къ стр. 401).

Цвѣтки обоеполые и мужскіе; плодъ продолговатый; настичный дискъ коническій; сѣмянки съ нитевидными ребрышками, между которыми по одному каналцу; бѣлокъ съ внутренней стороны плоскій; чашечные зубчики явственно замѣтны, но у мужскихъ и обоеполыхъ цвѣтковъ разной величины.

¹⁾ См. Pflanzenreich IV, 228 (Heft. 61), p. 62. 1913.

Falcária Rivini Host. Корень очень длинный, грязно-желтый; сте-



Falcaria Rivini.

бель 30—70 см., б. ч. очень вѣтвистый, слабо продольно-бороздчатый; корневые листья 3-раздѣльные или двояко-3-раздѣльные, на черешкахъ; стеблевые тоже 3-раздѣльные; каждая доля или только срединная 3-раздѣльная, а боковыя часто 2-раздѣльные; верхушечные просто 3-раздѣльные; всѣ доли линейныя или узколанцетныя, около 5 мм. ш. и 4—15 см. дл., по краямъ мелко-пильчатая; зонтики 12—20-лучевые съ отогнутой кинзу общей обверткой изъ узкихъ листочковъ; зонтики о 8—12 лучахъ съ частными обверточками; цвѣтки бѣлые съ равными лепестками; плодики не длиннѣе 4 мм., буро-желтые.

Найдено у шоссе близъ Рождествена на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

Pimpinella Saxifraga L. α . integrifolia Wallr. (II, стр. 402).—Sch. V, № 1473a.

Séseli ánnuum L. (II, стр. 406).—Сыр. Отч. III, стр. 13.

Старыя каменоломни близъ Исаупова, Брн. у. (С.).

Cnidium venósum (Hoffm.) Koch (II, стр. 408).

По берегу озерковъ на заливныхъ лугахъ р. Москвы близъ устья р. Нерской, Брн. у. (С.).

Angélica silvéstris L. (II, стр. 413).—Sch. III, № 618.

Archangélica officinális Hoffm. (II, стр. 414).

По кустарникову болоту близъ с. Подмошье. Дмт. у. (сообщилъ И. Петровъ, но въ гербаріи у него нѣтъ).

Dáucus Caróta L. (II, стр. 421).—Хор. II, стр. 18.

Роднево, Татарское-Сатнио, Чегодаево, Пдл. у. (X.).

Anthriscus silvéstris Hoffm. (II, стр. 422).—Sch. IV, № 1164.

Chaerophýllum bulbósum L. (II, стр. 425).—Sch. IV, № 1113.

Chaerophýllum aromáticum L. (II, стр. 426).—Хор. II, стр. 18.

Татарское-Сатнио, Пдл. у. (X.).—Владыкино; Внуково, Зви. у. (Ассы).

Córnus sanguinea L. (II, стр. 429).—Пет. Отч., стр. 13.

Близъ д. Березна, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

Córnus álba Wangenh., non L. (II стр. 429).

Одичалое близъ д. Вилково по Брянск. ж. д., Зви. у. (Кречетовичъ и Ассъ).

Pirola chlorántha Sw. (III, стр. 6).

Раменское, по направлению къ Заболотью, Бри. у. (Ассъ).—Рождество на р. Нарѣ, Срн. у. (гр. Е. Солотубъ).

Pirola média Sw. (III, стр. 7).

Свиболово въ березовомъ лѣсу; Жилино, Бри. у. (Ассъ).

Monótropa Hypópitys (L.) Wallr. (III, стр. 11).

А. А. Ассъ нашелъ въ Свибловѣ экземпляръ этого вида, который по всѣмъ признакамъ подходитъ къ нему, но тычинки длиннѣе столбика.

Monótropa Hypóphegea Wallr. (III, стр. 11.).—Сыр. Отч. III. стр. 13.**Vaccinium Myrtillus L. α . turfosum Choroschkov** (III, стр. 15).—Сыр. Отч. III, стр. 13.**Vaccinium Myrtillus L. β . epruinusum Aschers. et Magn.** (III, стр. 15).—Хор. III. стр. 91.**Callúna vulgaris (L.) Hull α . albiflora Michot** (III, стр. 20).

Быково, Бри. у. (Куль.).

Centúnculus minimus L. (III, стр. 21).—Ф. Б. Ир., стр. 74.

Около Воронова оврага, близъ границы съ д. Мордвиновой, Мож. у. (Ф. Б.).

Lysimáchia punctáta L. (III, къ стр. 24).

Корневище цилиндрическое, ползучее, вѣтвистое; стебель прямостоящій, до 1 м., б. ч. простой, опушенный; листья ланцетные или яйцевидно-продолговатые, заостренные, цѣльнокрайніе, съ обѣихъ сторонъ опушенные; цвѣтки въ пазушныхъ (1—) малоцвѣтковыхъ полузонтикахъ; чашелистики линейно-ланцетные, железисто-опушенные; вѣничекъ почти до основанія 5-раздѣльный, въ поперечникѣ 15—20 мм., свѣтло-желтый, въ зѣвѣ крапчатый; доли вѣничка яйцевидныя, острые, по краю и по поверхности железисто-опушенные; тычиночныя нити до половины срѣсшіяся. Найдено близъ Барыбина по Павелецкой ж. д. одичалымъ въ паркѣ, потомъ въ паркѣ.



Lysimachia punctata.

Lysimáchia Nummulária L. α . longepedunculata Weinm. (III, стр. 25).—Сыр. III, стр. 13.

Andrósace septentrionalis L. (III, стр. 26).—Ф. Б. Пр., стр. 74.

Близъ Кривякина, Кзм. у., вторымъ пѣтениемъ 7 августа (С.).

Gentiana Pneumonánthe L. (III, стр. 36).

Лугъ по Шейкѣ близъ Рождествена на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

Gentiana linguláta C. A. Agardh (III, стр. 37).

Бирево, Кзм. у.; близъ д. Пехорка, Бри. у. (Асѣ).—Рождествено на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Луга по долигѣ р. Яхромы, Дмт. у. (Н. Петровъ).—Селевкино по р. Хотешкѣ, Дмт. у. (Н. Слуцкій).

Gentiana axilláris F. W. Schmidt (III, стр. 38).

Лугъ по р. Вяземы, между Вяземами и Ямщиной, Зви. у. (Асѣ).

Centáurium Gilib. (III, стр. 38).

Опираясь на изысканія М. Janchen, который періодически издавалъ списки названій растений, какъ они должны именоваться по правиламъ номенклатуры Вьенскаго конгресса ботаниковъ, я измѣнилъ общераспространенное названіе *Erythraea* на *Centaurium*; но конгрессъ ботаниковъ въ Брюсселѣ въ 1910 г. отнесся къ перемѣнѣ нѣкоторыхъ названій иначе, и, соглашаясь въ большинствѣ съ Яншеномъ, постановилъ, что нѣкоторыя названія, вопреки правиламъ, должны за давностью удерживать свои общераспространенныя названія; къ нимъ между прочимъ отнесли: *Erythraea*, *Phragmites*, *Epipactis*, *Goodyera*, *Sturmia*, *Alsine*, *Nuphar*, *Anthriscus*, *Limnanthemum*, *Alectorolophus* и еще нѣсколько другихъ. (См. Actes du III Congrès International de Botanique, Bruxelles 1910, vol. I, p. 80—83).

Cuscuta epithymum (L.) Murr (III, стр. 45).

Стебель красный, очень тонкій, нитевидный, вѣтвистый; цвѣточныя клубочки приблизительно о 10 цвѣткахъ; послѣдніе почти сидячіе, розовые, рѣдко бѣлые; доли чашечки равны трубкѣ; вѣничекъ 2 мм. дл., трубка его колокольчато-трубчатая, равна лопастямъ вѣничка; столбиковъ два, длиннѣе завязи.

У насъ пока только:

α . Trifolii (Bab.) Neilr. Клубочки б. ч. 12—15-цвѣтковые; цвѣтки лѣстовидно на ножкахъ, которыхъ почти равны



Cuscuta epithymum α . *Trifolii*.

чашечекъ; доли послѣдней короче трубки; съ 5 маленькими бу-
горками у основанія, чередующимися съ долями чашечки; рын-
чикъ 4 мм. дл.—Мож. у., въ Канаевской и Порѣцкой вол., въ
крестьянскихъ посѣвахъ клевера, и близъ д. Михайловской.
Борисовской вол. (Ф. Б.).—Въ посѣвахъ клевера близъ Селев-
кина, Дмт. у. (сообщ. Н. Слуцкій).

1. Столбикъ одинъ; рыльце двулопастное.

C. lupuliformis Krocke.

Столбикъ два свободныхъ; рыльца нитевидныя. 2.

2. Столбики длиннѣе завязи.

C. epithymum (L.) Murr.

Столбики короче завязи или равны ей.

C. europaea L.

Asperugo procumbens L. (III, стр. 49).—Хор. III, стр. 91.

Lycopsis arvensis L. (III, стр. 53).

У насъ только:

ssp. occidentalis Kusnez. Листья по краямъ волнисто-зубчатые;
поверхность петлистыхъ волосковъ гладкая; орѣшки съчато-мор-
щинистые.

Nónnea púlla (L.) DC. (III, стр. 53).

18-я верста Брянск. ж. д., у полотна (Асѣ).

Lithospermum officinale L. (III, стр. 60).—Ф. Б. Пр., стр. 74.

По южному песчаному склону, близъ Трепарева, противъ д. Хоро-
шкова, Мож. у. (Ф. Б.).

Myosótis palústris (L.) Hill β . *strigulosa* (Rchb.) Mert. et Koch
f. *gracilis* Boenn. (III, стр. 62).—Хор. IV, стр. 17.

По берегу Юрьевского озера, Пдл. у. (X.).—По р. Хотешкѣ, близъ
д. Черная, Дмт. у. (Н. Слуцкій).

Myosótis caespitosa C. F. Schultz (III, стр. 63).—Сыр. III, стр.
13.—Хор. IV, стр. 17.

Болото между Казеевымъ и Свѣловымъ; болото между Томлинымъ
и Красковымъ. Бри. у. (Асѣ).—Туга р. Яхромы. Дмт. у. (Н. Петровъ).
Селевкино, Дмт. у. (Н. Слуцкій).

Myosotis caespitosa C. F. Schultz α . *minima* Selm. Хор. IV, стр.
17.—Сыр. Отч. III, стр. 13.

Myosotis caespitosa C. F. Schultz α . *pumila* Choreschkov. Сыр. Пдл. Фл.,
стр. 63.

Юрьевское озеро, Пдл. у. (X.).

Myosótis scorpioides L. exl. var. β . (III, стр. 65).

Въ III части Пдл. Фл. *Myosotis intermedia* Link было замѣнено
болѣе старымъ названіемъ *M. scorpioides* L. Всего сообразнѣе было бы

сохранить названія *M. palustris* и *M. intermedia*, но Janchen заявляеть, что *M. palustris* слѣдуетъ именовать *M. scorpioides* L.—Linn., въ Sp. pl., приводя *M. scorpioides*, разбиваеть этотъ видъ на α . *arvensis* и β . *palustris*, при чемъ описаніе обѣихъ формъ очень не совершенно. Ужъ если признавать Линнеевское названіе *M. scorpioides*, то его слѣдуетъ относить къ его первой формѣ, которая выдѣлена въ самостоятельный видъ—*M. intermedia* Link. а не къ *palustris*. Janchen и Hayek опираются на Hill, Veg. Syst. VII. 55 (1761), гдѣ послѣдній впервые выдѣлилъ въ самостоятельные виды эти незабудки, при чемъ *M. palustris* называлъ *M. scorpioides*, а *M. intermedia*—*M. arvensis*. Последнее названіе впоследствии разными авторами принималось многими другимъ видамъ, какъ напр., *M. hispida* Schlecht., *M. versicolor* Pers. и *M. stricta* Link; было бы лучше во избѣжаніе путаницы совсѣмъ откинуть названіе *arvensis*, оставивъ за *M. intermedia* Link наименованіе *M. scorpioides* L. excl. var. β ., а за второй Линнеевской разновидности закрѣпить названіе *M. palustris* (L.) Hill, по цитировать Hill, Herb. Britan. Vol. I. p. 170 (1769), гдѣ этому виду дано названіе *M. palustris* и приведено довольно обстоятельное его описаніе, а равно помѣщенъ рисунокъ на табл. 113.

У насъ кромѣ приведенныхъ формъ еще:

- γ . *pumila* ¹⁾. Растеніе одностебельное, 8—15 см.; стебель очень тонкій, простой, рѣдко слабо-вѣтвистый, у основанія съ розеткой прикорневыхъ листьевъ ²⁾. Въ цвѣту 2 іюня; въ плодахъ 15 іюня. Известняки у устья р. Пахры, Брн. у., въ огромномъ числѣ особей (С.).

***Elsshölzia Patrinii* (Lep.) Garcke** (III, стр. 69).

Кузьминки, паркъ по каменной стѣнѣ грота (Н. Слуцкій).

***Méntha longifolia* (L.) Huds.** (III, стр. 70).

Близъ Архангельскаго, Звн. у. (сообщ. Гей.).

***Méntha austriaca* Jacq. γ . *parietariaefolia* (Becker).** (III, стр. 74).

Новый Іерусалимъ, Звн. у. (П.).

***Méntha austriaca* Jacq. δ . *multiflora* Host** (III, стр. 74).

Между Волконскимъ и Садовниками близъ ст. Коломенское. Павлодск. ж. д. (Асень).—Близъ платф. Щербинка. Моск.-Курск. ж. д. Пдл. у. (Н. Слуцкій).

¹⁾ *Myosotis scorpioides* L. excl. var. β ., var. *pumila*. Caulis simplex, 8—15 cm., frugus, tenuis, raro pauciramosus, a basi foliis radicalibus in rosulam congestis.

²⁾ Hayek, въ Fl. von Steierm. II, p. 95, описалъ f. *annua*, характеризую ее такъ: однолетнее; корневыхъ листьевъ нѣтъ или ихъ очень мало; листья съмодольны во времени цвѣтенія часто сохраняются; эта форма не тождественна съ выше описанной.

Thýmus Marschalliánuš Willd. (III, стр. 79).—Сыр. III, стр. 17.
Ст. Витца, Курск. ж. д., Пдл. у. (X.).

Thýmus gláber Mill. (III, стр. 79).

Село Вяземы на лугу передъ церковью, Зви. у.; Раменское — въ паркѣ. Бри. у. (Асст.). Вблизи платф. Цѣрѣбинка. М.-Кур. ж. д., Пдл. у. (II. Слудкій).

Saturéja horténsis L. (III, къ стр. 81).

Однолѣтнее; стебель прямостоящій, до 30 см., вѣтвистый, коротко опушенный; листья ланцетные или почти линейные, заостренные, почти сидячіе, цѣльнокрайніе, часто съ слегка завернутыми краями, голые или слабо рѣсничатые и съ крупными точечными железками; цвѣтки въ ложныхъ мутовкахъ въ пазухахъ листьевъ; чашечка 3—4 мм. дл., о 5 равныхъ линейно-ланцетныхъ зубцахъ, коротко рѣсничатыхъ; вѣшчикъ 5—6 мм. дл., свѣтло-лиловый, трубка его равна чашечкѣ; орѣшки бурые, 1 мм. дл. Растеніе обладаетъ пріятнымъ запахомъ, изъ-за котораго разводится.



Saturéja horténsis.

Sálvia nemórosa L. (III, стр. 85).—
Сыр. III, стр. 13.

Népeta Catária L. (III, стр. 87).—Хор. III, стр. 92.

Stáchys Betónica Benth. (III, стр. 105).

У насъ еще форма:

γ. **stricta** (Ait.) **Aschers.** Растеніе очень высокое, иногда вѣтвистое; листья крупные; стебель болѣе опушенъ; соцвѣтіе разставленное; нижнія мутовки значительно удалены отъ остальныхъ. Не рѣдко.

δ. **alba** (Mart. sp.).

Brunélla vulgáris L. (III, стр. 112).

У насъ пока можно различить слѣдующія формы:

α. **typica** Beck. Стебли до 25 см., б. ч. пучками, прямостоящіе съ приподнимающимися основаниями; вѣшчикъ б. ч. въ два раза длиннѣе чашечки; соцвѣтіе 1—3 см. дл. Обычная форма.



Stachys Betonica γ. stricta.

β. uliginosa Beg. (Fl. It. Exsicc. № 1743).

Стебли лежачіе, ползучіе, укореняющіеся, въ остальномъ какъ α. По болотистымъ мѣстамъ, часто.

γ. nemoralis Beg. (Fl. It. Exsicc. № 1744).

Растеніе очень высокое, до 45 см.; стебли прямостоящіе, часто вѣтвистые; листья крупные, пластинка ихъ до 6 см. дл. и 3 см. ш.; соцветіе до 5 см. дл.¹⁾ По сырýmъ и тѣнистымъ мѣстамъ, близъ Владыкина (С.).

δ. albiflora Tin.

Село Вязема, Зви. у., по скошенному лугу (Ассъ).—Близъ Пнягина по р. Банькѣ (П.).

Ājuga genevėnsis L. (III, стр. 114).

А. А. Ассъ нашелъ между Пехоркой и Змїевымъ, Мос. у., и за Лужками, Сри. у., форму съ очень слабымъ опушеніемъ стебля, б. ч. густо опушеннаго только на двухъ противоположныхъ граняхъ; нижніе листья почти голые, только по краямъ рѣзничатые, верхніе слабо опушены; такую форму можно назвать: **glabrescens**.

Solānum Dulcamāra L. α. indivisum Boiss. (III, стр. 121).—Сыр. Отч. III, стр. 13.

Hyoscyāmus niger L. α. pallidus (Kit.) Koch (III, стр. 123).—Хор. III, стр. 92.

Verbāscum thapsifōrme Schrad. (III, стр. 127).—Сыр. Отч. III, стр. 13).

Verbāscum collinum Schrad. (III, стр. 129).—Сыр. Отч. III, стр. 13.

Verbāscum phoeniceum L. (III, стр. 131).

У платформы 17-й версты М.-Брянск. ж. д. (Ассъ).

Lināria minor (L.) Desf. (III, стр. 135).—Сыр. Отч. III, стр. 13.

Кузминки около главнаго дома (Н. Слуцкий).

Mimulus luteus L. (III, стр. 137).—Сыр. Отч. III, стр. 13.

Gratiola officinālis L.

По очень сырýmъ лугамъ къ югу отъ с. Петракова, Дмт. у. (сообщено П. Петровымъ, по въ гербаріи у него нѣтъ).

Veronica prostrāta L. (III, стр. 147).

У полотно М.-Брянск. ж. д., занесено (Ассъ).

¹⁾ А. Beguinot описалъ эту форму, собранную въ лѣсу, но такая же форма издана имъ за № 1744 bis культурная, пожалуй, съ признаками еще рѣзче выраженными. Я нашелъ эту форму два раза и оба раза на открытомъ, но сыроватомъ мѣстѣ; слѣдовательно, ея обликъ зависитъ не только отъ тѣненія; не далеко отъ этой формы были мною найдены и α. typica.

Veronica Teucrium L. ssp. pseudochamaedrys (Jacq. Nym.
(III, стр. 148).

У насъ еще форма:

- c. incisa Watzl.** Листья б. или м. надрѣзочно-зубчатые; зубцы у нижнихъ листьевъ округлые, у верхнихъ островатые и частые. Известняки близъ Каменной Тишины на р. Москвѣ, Ври. у. (С.).

Эту форму, по словамъ Watzl, иногда бываетъ очень трудно отличить отъ *V. austriaca* ssp. *dentata* (Schmidt) Watzl, настолько они сходны по облику; единственный признакъ, на который можно положиться для ихъ разграниченія, это—верхушечные листья, не цвѣтущихъ стеблей, которые у *f. incisa* удлиненно, яйцевидные съ болѣе широкимъ основанием и частыми зубцами, тогда какъ у *V. austriaca* ssp. *dentata* верхушечные листья не цвѣтущихъ стеблей удлиненные, почти ланцетные, цѣльнокрайніе или неровно- и сравнительно рѣдко-зубчатые.



Veronica Teucrium c. incisa.

Veronica arvënsis L. (III, стр. 155).

Близъ Пушкина на сухой дужайкѣ около дороги въ Акулово (Асѣъ).—Торфяное болото близъ Барвихи, Зви. у. (Е. В. Вульфъ).

Euphrasia stricta Host (III, стр. 161).

Кромѣ обычной формы у насъ еще:

- α. pilifera Kihlm.** Листья и прилистники покрыты не частыми щетинистыми волосками.

Euphrasia Reuteri Wettst. (III, стр. 162).

Между Волконскимъ и Садовниками, близъ ст. Коломенское, Навесен. ж. д.; Лукино—имѣніе гр. Соллогубъ близъ Сукова, Зви. у. (Асѣъ).—Близъ Лихоборъ (С.).

Wettstein въ своей монографіи, на стр. 284, при описаніи *E. Reuteri*, выражаетъ сомнѣніе, слѣдуетъ ли считать эту форму за помѣсь или за самостоятельный промежуточный видъ между *E. stricta* и *E. curta*. Въ этомъ году мною была найдена близъ Лихоборъ эта *Euphrasia* и, хотя въ этой мѣстности растутъ какъ *E. stricta*, такъ и *E. curta*, но найденная мною *E. Reuteri* расла въ такомъ большомъ числѣ экземпляровъ сплошной зарослью, что скорѣе ее слѣдуетъ считать самостоятельнымъ видомъ.

Euphrasia brevipila Burnat et Gremli \times stricta Host (III, къ стр. 162).

Въ Пдл. у., близъ села Островъ, найдена была А. А. Асёвъ *Euphrasia*, которая ближе всего походитъ на *E. brevipila*, но сравнительно не густымъ опушеніемъ железистыми волосками и длинно-остистыми прицвѣтниками уклоняется отъ этого вида; послѣдній признакъ наводитъ на предположеніе, что тутъ замѣшана *E. stricta*, которая не рѣдко встрѣчается въ Пдл. у. Что помѣсь *E. brevipila \times *stricta* встрѣчается въ природѣ, о томъ говоритъ Wettstein въ своей монографіи, хотя описанія этой помѣси не приводитъ; за то Neuman приводитъ ее въ *Sveriges Flora* на стр. 141, но тоже безъ описанія. Собраны только два экземпляра и притомъ засушены очень плохо, но все же можно было различить признаки обоихъ видовъ.*

Euphrasia fennica Kihlm.¹⁾. (III, къ стр. 165).

Стебель прямостоящій, тонкій, 10—20 см., рѣдко до 40 см., простой или съ нѣсколькими вѣтвями въ нижней части стебля или въ срединѣ,



Euphrasia fennica.



Euphrasia hirtella.

бѣловато-опушенный курчавыми и частью многоклеточными железистыми волосками; листья зеленые, почти супротивные, чаще далеко разставленные, верхніе яйцевидные, съ 4—5 острыми равными зубцами; прицвѣтные листья широко-яйцевидные, почти круглые, съ 5—8 короткозаостренными зубцами; все листья покрыты короткими щетинками и многоклеточными железистыми волосками; соцвѣтіе почти всегда сильно вытянутое, только у верхушки сжатое; чашечка не разрастается, б. ч. мало превышаетъ сѣдную коробочку; вѣнчикъ б. ч. 7—8 (5—9) мм. дл., бѣлый съ лиловыми жилками на нижней губѣ. Близъ Ольгина, Моск. у. (сообщ. Ф. В.).

¹⁾ См. Meddel. af soc. pro Fauna et Fl. fenn. 1900, p. 92.

Близко къ *E. Rostkoviana*, но отличается менѣе крупнымъ вѣтви-
комъ и не разрастающеюся трубкой его по опыленіи.

***Euphrasia hirtella* Jord. (III, къ стр. 165).**

Стебель прямостоящій, 5—25 см., простой, рѣже въ нижней части слабо вѣтвистый, покрытъ густыми курчавыми волосками, иногда съ при-
мѣсью многокѣточныхъ железистыхъ волосковъ; послѣдними густо по-
крыты листья и прицвѣтники; нижніе листья тупые съ тупыми зубцами;
прицвѣтные почти круглые или округло-треугольные, о 5—8 острыхъ зуб-
цахъ; соцвѣтіе густое, сжатое, такъ что прицвѣтные листья прикрываютъ
одинъ другого; цвѣтки мелкіе, 5—7 мм. дл., съ трубкою не разрастающеюся;
коробочка яйцевидная или яйцевидно-линейная, длинно-рѣсничатая. Цвѣ-
тетъ въ августѣ. Одинъ экземпляръ этой *Euphrasia*, опредѣленный Wett-
stein'омъ, найденъ былъ Гольдбахомъ подь Москвой въ 1823 г. и находится
въ герб. Петербургскаго Бот. Сада, и еще Мосоловъ нашелъ близъ Михай-
ловскаго, Цдл. у.

Отличается отъ *E. Rostkoviana* менѣе крупными цвѣтками съ не
разрастающеюся трубкой у вѣтчика, а отъ *E. fennica* тоже болѣе мелкими
цвѣтками и сжатымъ соцвѣтіемъ, прицвѣтные листья котораго прикры-
ваютъ одинъ другого, тогда какъ у *E. fennica* соцвѣтіе съ сильно разста-
вленными цвѣтками.

***Alectorolophus mājor* (Ehrh.) Rehb. ssp. *eumajor* Sterneek (III,
стр. 167).**

Н. В. Цингеръ, въ своемъ предварительномъ сообщеніи по поводу
подвидовъ *A. mājor*, помѣщенномъ въ «Труд. Тифл. Бот. Сада», вып. XII,
кн. 2, говоритъ, что ssp. *eumajor* Stern. можно раздѣлить по времени
цвѣтенія на: ***vernalis* N. Zinger** и ***aestivalis* N. Zinger**, при чемъ время за-
цвѣтанія второго приблизительно на мѣсяць позднее перваго; кромѣ
этого биологическаго признака, у ssp. *vernalis* стебель б. ч. простой
или слабо вѣтвистый и листья шире, чѣмъ у ssp. *aestivalis*, у котораго
стебель вѣтвистый. Вѣроятно и у насъ встрѣчаются оба ssp., но, за скуд-
ностью наблюдений и матеріала, я воздержусь утверждать о наличности
у насъ обоихъ подвидовъ.

***Alectorolophus mājor* (Ehrh.) Rehb. ssp. *apterum* Fries (III, стр. 167).**

Н. В. Цингеръ выразилъ сомнѣніе, чтобы ssp. *apterum* было собрано
между кустарниками, по этимъ дѣтомъ гр. Е. Сологубъ подтвердила,
что видѣнные мною экземпляры были найдены ею именно тамъ, гдѣ по-
казано у меня, а относительно опредѣленія ошибки быть не могло, такъ
какъ растеніе было въ плодахъ.

***Alectorolophus montanus* Fritsch (A. *serotinus* Schönk.) (III, къ
стр. 167).**

Стебель 30—50 см., съ черными черточками, почти гладкій, съ боль-
шимъ числомъ междоузлій и б. ч. сильно вѣтвистый; междоузлія короче

листья (редко равны им); послѣдніе линейно-ланцетные или почти линейные, длинно-заостренные, часто- и мелко-зубчатые, острошершавые; прицѣтники голые, узко-треугольные, вытянуты въ длинный кончикъ, превышающій длиною чашечку; зубцы узкіе, почти остистые, по краямъ остро-рѣсничатые; чашечка голая, только по верхнему краю остро-рѣсничатая; вѣнчикъ 18 мм. дл., трубка его слетка согнута; носикъ фіолетовый, до 2 мм. дл.; нижняя губа прижата къ верхней; сѣмена съ узкимъ крылатымъ ободкомъ въ 1 мм. ш. По кустарникамъ и опушкамъ; цвѣтетъ съ начала августа. Пока найдено только близъ Токарева, Мос. у., на границѣ Бри. у. (С. Ганешинъ).



Alectorolophus montanus.



Alectorolophus minor.

***Alectorolophus minor* (Ehrh.) Wimm. et Grab. (III, стр. 167).**

Изъ описанія выкинуть: «или вѣтвистый; вѣтви отходятъ подь острымъ угломъ» и «листья линейно-ланцетные».

Къ сожалѣнію, рисунокъ у меня данъ неправильный, это не *A. minor*, а *A. stenophyllus* Schur, рисунокъ же *A. minor* приводится.

***Alectorolophus stenophyllus* Schur (I, изъ стр. 167).**

Rhinanthus obscurus Steph.

Стебель 20—50 см., слабо-волосистый, вѣтвистый, съ дугообразно отходящими вѣтвями; междоузлій много и они короче листьевъ; послѣдніе линейно-ланцетные или почти линейные. Въ остальномъ какъ у *A. minor*; цвѣтетъ въ августѣ. Этотъ видъ былъ упомянутъ для Моск. губ. Стефаномъ; очень вѣроятно, что онъ просматривается.

***Alectorolophus fallax* (Wimm. et Grab.) Sterneck (III, стр. 168).**

За Пинагшинымъ по р. Банькѣ; лугъ за Ивановой горой на р. Нарѣ. Свѣтъ Рождествена. Сри. у. (П.); растения изъ обоихъ мѣстъ опредѣляетъ Н. В. Цингеръ.

1. Трубка вѣнчика нѣсколько согнута; нижняя губа прижата къ верхней. 2.

Трубка вѣнчика прямая; нижняя губа нѣсколько отогнута. 3.

2. Листья у цвѣтущихъ растений линейно-ланцетные, б. ч. не шире 4 мм., длиннѣе междоузлій или рѣдко равны имъ; растеніе почти всегда вѣтвистое. *A. montanus Fritsch.*

Листья широко-или продолговато-ланцетные, до 10 мм. ш., короче междоузлій; растеніе то съ простымъ, то съ вѣтвистымъ стеблемъ. *A. major (Ehrh.) Rehb.*

3. Трубка вѣнчика послѣ опыленія удлинняется; темно-фіолетовые зубчики на верхней губѣ до 1 мм. дл. *A. fallax Sterneck.*

Трубка вѣнчика не удлинняется; зубчики на верхней губѣ очень мелкіе, фіолетовые или бѣлые. 4.

4. Листья ланцетные или продолговато-ланцетные, короче междоузлій; стебель простой или съ немногими косо вверхъ направленными вѣтвями. *A. minor (Ehrh.) Wimm. et Grab.*

Листья узкіе, линейно-ланцетные, длиннѣе междоузлій; стебель съ большимъ числомъ междоузлій и нѣсколькими дугообразно-отходящими вѣтвями. *A. stenophyllus Schur.*

Pedicularis comosa L. (III, стр. 169).—Ф. Б. Пр., стр. 74.

Заливной лугъ близъ Старого села, у лѣсной дороги изъ Старого села черезъ Поньгово въ Аксентьево, и заливные луга р. Москвы близъ с. Тесова, Мож. у. (Ф. Б.).

Pedicularis sceptrum¹ Carolinum L. (III, стр. 170).—Хор. III, стр. 93.

Около Татищевского озера, близъ д. Татищево, Дмит. у. (Н. Петровъ).

Melampyrum cristatum L. (III, стр. 171).

Въ окрестностяхъ села Синькова, въ долинѣ р. Яхромы по кустарникамъ; Дмит. у. (сообщилъ Н. Петровъ, но въ гербаріи у него нѣтъ).

Melampyrum pratense L. (III, стр. 172).

У насъ пока можно различить слѣдующія формы:

α. **typicum Beck.** Растеніе съ простымъ или мало вѣтвистымъ стеблемъ; листья ланцетные, б. ч. около 5 мм. ш.; прицвѣтные листья съ небольшимъ числомъ короткихъ зубцовъ у основанія. Давыдово (Ассы).

На сырыхъ мѣстахъ и болотахъ встрѣчаются растенія съ очень тонкимъ стеблемъ и очень узкими листьями, это: f. **paludosa Gaud.**

β. **integerrimum Döll.**

γ. **commutatum (Tausch) Beck** (*M. laciniatum Kosh. et Zinger*).

Растеніе крупное съ сильно-и длинно-вѣтвистымъ стеблемъ; листья яйцевидно-ланцетные или широко-ланцетные, иногда до 20 мм. ш.;

прицветные листья длинно-и много-зубчатые (отъ 5 до 9); верхушечные имѣютъ почти звѣздчатую форму ¹⁾. По старой лѣсосѣкѣ между Разказовкой и Внуковымъ, Звн. у. (С.).



Melampyrum pratense γ. *commutatum*.

***Lathraea squamaria* L.** (III, стр. 174). —
Ф. Б. Пр., стр. 74.

Въ ольшаникѣ въ Ольгинѣ и по склону у Золотой отокп, близъ д. Алексѣвки, Мож. у. (Ф. Б.).

***Orobanche Libanotidis* Rupr.** (III, стр. 178).

Рождествено на р. Нарѣ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).

***Plantago major* L. α *intermedia* (Gilib.) Wildem. et Durand** (III, стр. 181).

На торфяной сырой почвѣ по берегу р. Лп-хоборки, между Лпхоборами и Савеловск. ж. д. (С.).

Близъ Сергіевскаго посада А. П. Мининъ нашелъ очень своеобразную форму *Plantago major*, которую еще Wallroth назвалъ var. *phyllostachium*. А. П. Мининъ описалъ эту форму и издалъ отдѣльной брошюрой съ 3 таблицами. Penzig, въ *Pflanzen-Teratologie* II, p. 251, приводитъ длинный списокъ всевозможныхъ измѣненій у этого подорожника, а равно и большой списокъ авторовъ, которые отмѣчали и описывали эти измѣненія. Нашу форму можно отнести къ формѣ, описанной Вальротомъ:

***Plantago major* L. γ. *phyllostachya* Wallr.**

Почти всѣ прицветники превратились въ листья, похожіе на корневые, но много мельче, при чемъ нижніе прицветники самые крупныя и на черешкахъ, къ верхушкѣ колоса прицветники



Plantago major γ. *phyllostachya*.

¹⁾ Эту форму, типично выраженную, мнѣ еще не приходилось встрѣчать; уклоненіе было только въ формѣ прицветныхъ листьевъ, у которыхъ срединный верхушечный зубецъ былъ б. или м. сильно вытянутъ и крупнѣе остальныхъ, даже у верхушечныхъ; боковыя же зубцы очень длинныя, много длиннѣе, чѣмъ у *typicum*. Beck и Zinger говорятъ, что верхушечные прицветные листья почти звѣздчатые. Мнѣ приходилось наблюдать всѣ переходы отъ *commutatum* съ рѣзко выраженнымъ обилиемъ къ формѣ *integerrimum*; но *commutatum* росло по лѣсосѣкѣ на солнцѣ, постепенно переходя въ *integerrimum* по мѣрѣ большаго отѣненія, въ лѣсу же росла типичная форма *integerrimum* Döll.

становятся мельче и съ половины б. ч. сидячіе и уже нижнихъ, такъ что весь колосъ принимаетъ пирамидальную форму. Сергіевскій посадъ, Дмт. у. (А. П. Мшинъ). Эта форма разводится въ Моск. Бот. Саду и очень стойко передаетъ все свои особенности потомству уже нѣскольکو дѣтъ, давая очень не большой процентъ типичнаго Р. мајор. Мною была найдена въ прошломъ году эта форма въ первомъ ея проявленіи, т. е. въ листьяхъ обратились только 2—3 нижнихъ прицвѣтника и съ 2—3 листьями на стрѣлкѣ; найдена она въ паркѣ у дороги въ имѣніи ин. Ливень, «Спасское», на р. Москвѣ, въ Бри. у., на границѣ съ Кзм. у.

Aspérula odoráta L. (III, стр. 187).

Между Вилковымъ и Разсказовкой. Зин. у. (Асст.).—Между Мал. Шахловымъ и Игнатьевымъ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).

Gálium rubioides L. (III, стр. 197).

Обѣ описанныя А. А. Хорошковымъ формы были уже ранѣе отмѣчены Ed. Lindemann, въ Fl. Chersonensis, и форма съ пятнистыми плодами была названа α . *lasiocarpum* Lindm., а съ голыми— β . *leiocarpum* Lindm.

Sambucus Ébulus L. (III, стр. 200).—Сыр. Отч. III, стр. 13.

Valeriana officinalis L. δ . *alternifolia* Ledeb. (III, стр. 240).—Сыр. Отч. III, стр. 13.

Iasióne montána L. (III, стр. 217).—Ф. Б. Пр., стр. 74.

Наверху песчаного обрыва праваго берега р. Протвы, противъ д. Кубяково, Мож. у. (Ф. Б.).

Campánula bononiensis L. (III, стр. 221).

Кромѣ обычной формы у насъ еще:

α . *albiflora*. Цвѣтки чисто бѣлые; растеніе очень крупное, до 1 м., при чемъ нижняя часть соцвѣтія очень густо вѣтвистая. Каменно-ломни близъ Бачманова, Кзм. у. (С.).

Campánula trachelium L. β . *paniculata* Peterm. (III, стр. 224).—Сыр. Отч. III, стр. 13.

Campánula persicifolia L. (III, стр. 226).

У насъ еще форма:

β . *minor* Beck. Цвѣтки мелкіе, 18—24 мм. дл. Ромашково (П.). Селевкино, Дмт. у. (Н. Слуцкій).

Solidágo virga aurea L. β . *foliosa* Fiori (III, стр. 238).

Въ лѣсу близъ Евсейкова, Дмт. у. (Куль.).

Béllis perennis L. (III, стр. 239).—Хор. III, стр. 91.

Селевкино, Дмт. у. (Н. Слуцкій).

Erigeron heterophyllus Mühlenb. (III, стр. 242).

Очень обильно по парку въ сырыхъ мѣстахъ въ имѣніи кн. Ливенъ, «Спасскомъ», на р. Москвѣ. Брян. у., на границѣ Калм. у. (С.).—Ст. Расторгуево, Павелецк. ж. д., у дорожки заброшеннаго парка Салазкина (Н. Слудскій).

Helichrysum arenarium (L.) Moench (III, стр. 248).

Близъ Серпухова по откосу полотна ж. д. (С. II. Ростовцевъ).—На песчаныхъ голыхъ холмахъ между г. Дмитровымъ и д. Куниншиковой, Дмит. у. (сообщ. II. Петровъ, но въ гербаріи у него нѣтъ).

Inula Helénium L. (III, стр. 249).

Селевкино, Дмит. у., въ селѣ (Н. Слудскій).

Inula britannica L. β . ramosissima Ledeb. (III, стр. 252).

Каменный берегъ р. Москвы, близъ границы Брян. и Калм. уу. (С.).

Rudbeckia L. (III, къ стр. 255).

Красныя цвѣтки безпалые, женскіе—длинно-язычковые; остальные трубчатые, б. ч. пурпуровые, съ короткой трубкой; цвѣтоложе сильно выпуклое; хохолокъ короткій въ видѣ коронки или его нѣтъ.



Rudbeckia hirta.

Rudbeckia hirta L. Двухлѣтнее или иногда однолѣтнее растеніе, сильно шершавое отъ щетинистыхъ волосковъ; стебель простой или слабо вѣтвистый, 30—70 см.; листья ланцетные или продолговато-ланцетные, по краямъ не часто и мелко-зубчатые, нижніе сужены въ черешокъ, верхніе сидячіе; цвѣточныхъ корзиночекъ мало; обертка густо покрыта щетинистыми волосками, часто отогнутыми; язычковые цвѣтки оранжевые, иногда болѣе темныя къ основанію; трубчатые—лиловато-коричневыя; хохолка нѣтъ. Паровое поле близъ Ромашкова (II. и Рютель) и въ Мож. у. (А. В. Яковскій); наблюдалось также въ Псковской, Новгородской и Костром-

ской губ., въ послѣдней найдено К. К. Косинскимъ въ Буйск. у. на клеверномъ полѣ.

Anthemis arvensis L. (III, стр. 260).—Сыр. Отч. III, стр. 13.**Achillea nobilis L.** (III, стр. 264).—Сыр. Отч. III, стр. 13.

Matricária inodóra L. α . ambiguum (Rehb.) (III, стр. 271.)
Chrysanthemum inodorum L. β . ambiguum Rehb.—Хор. III, стр. 91.

Artemisia austriaca Jacq. (III, стр. 272).

Влиъ ст. Фаустово у полотна М.-Каз. ж. д., Бри. у. (С.).

Artemisia scopária W. K. (III, стр. 274).—Сыр. Отч. III, стр. 13.

Artemisia paniculáta Lam. (III, стр. 275).—Сыр. Отч. III, стр. 13.
 У устья р. Нерской, Бри. у. (С.).

Senécio silváticus L. (III, стр. 282).—Сыр. Отч. III, стр. 13.

Senecio Jacobáea L. (III, стр. 284).

Кромѣ обычной формы у насъ еще:

- α . **abbreviatus Peterm.** Язычковые цвѣтки очень узкіе и маленькіе, длина отогнутого язычка не превышаетъ длину трубчатыхъ цвѣтковъ. На лугу между Заозерьемъ и д. Коломеецъ, Бри. у. (С.).

Árctium tomentosum Mill. α . glaberrima Fries (III, стр. 292).
 Кунцово (Ассь).

Cárduus acanthoides L. (III, стр. 293).—Сыр. Отч. III, стр. 13.

Centaurea stereóphylla Bess. (III, стр. 316).—Сыр. Отч. III, стр. 14.

Centaurea maculósa Lam. (III, стр. 317).—Сыр. Отч. III, стр. 14.

Tragopògon orientális L. (III, стр. 326).—Ф. Б. Пр., стр. 74.

Между Телятьевымъ и Старымъ селомъ, Мож. у. (Ф. Б.).

Sónchus áasper (L.) Hill (III, стр. 334).

У насъ можно различить слѣдующія формы:

- α . **inermis Bisch.** Зубчики на листьяхъ мягкіе.

- β . **pungens Bisch.** Зубчики на листьяхъ жесткіе, слегка волнисте.

Hierácium silváticum L. (III, стр. 364).

Нескучный Садъ, Кунцово (Ассь).—Павшино въ смѣшанномъ лѣсу; въ хвойномъ лѣсу влиъ р. Пехорки между Сусановымъ и Блошинымъ (П.).—Паркъ въ санаторіи д-ра Унгери въ влиъ Владыкина; паркъ въ имѣнии кн. Дивель «Спаскомъ» на р. Москвѣ, Бри. у., на границѣ Кал. у., въ очень большомъ числѣ особей (С.).

Hierácium vulgátum Fries ssp. Wischniakowii Pet. et Zahn.
 (III, стр. 365).

Кунцово (Ассь).

Hierácium laevigátum Willd. (III, стр. 365).

Кунцово (Ассь).

ПРИБАВЛЕНІЕ

къ литературнымъ источникамъ.

- Рачинскій С. А.** Ятрышники (орхидеи).—Вѣстникъ Естественныхъ Наукъ. 1855, стр. 289—301.
- Федченко Б. А.** Отчетъ о ботаническихъ изслѣдованіяхъ.—Годи́чный отчетъ Имп. Моск. Общ. Исп. Прир. за 1899—1900, стр. 20—21. Москва. 1900.
- Кропачевъ Л.** О нахожденіи *Najas minor* All. въ окрестностяхъ Петербурга.—Изв. Имп. С.-Пб. Бот. Сада. Т. I, (1901), стр. 155—156.
- Ростовцевъ С. И.** Біолого-морфологическій очеркъ рисокъ. Москва. 1905, стр. 108.
- Петушиковъ А. Н.** Труды Бот. Сада Имп. Юр. Унив. Томъ VII, 1907, стр. 129.—«Ботаническія путешествія».
- Флеровъ А. О.** О ботанико-географическихъ изслѣдованіяхъ въ Окскомъ бассейнѣ.—Извѣстія Имп. С.-Пб. Бот. Сада. Томъ VII, 1906, стр. 21—26.
- Мосоловъ П. А.** Заливные луга Средней Россіи въ хозяйственномъ отношеніи.—Русскій Бот. Журналь. 1908, стр. 152—157 и 194—198.
- Новости Можайской флоры.** Русскій Бот. Журналь. 1908, стр. 243.—«Ботаническая хроника».
- Флеровъ А. О.** Растительность Окской долины.—Русскій Бот. Журналь. 1908, стр. 146—152 и 198—203.
- Сыр. Отч. III.—**Сырейчиковъ Д. П.** Отчетъ о ботаническихъ изслѣдованіяхъ въ 1909 г.—Годи́чный отчетъ Имп. Моск. Общ. Исп. Прир. за 1908—1909. Москва. 1909.
- Алехинъ В.** Нѣкоторые данныя относительно *Gagea erubescens* (Bess.) Schult., *G. reflexa* Czern. и *G. pusilla* Schult.—Труды Бот. Сада Имп. Юр. Унив. Томъ XI. (1910), стр. 207—220.
- Rotherf W. Dr.** Uebersicht der Sparganien des Russischen Reiches (zugleich Europa's).—Труды Бот. Сада Имп. Юр. Унив. Томъ XI (1910), стр. 11—32.
- Мальцевъ А.** Пахучій ясмешникъ (*Asperula odorata* L.) и его примѣненіе.—Труды Бюро по прикл. ботаникѣ. Томъ II, 1909, стр. 585—593. «Замѣтки».
- Мишинъ А. П.** Къ вопросу о возникновеніи въ природѣ растений, уклоняющихся отъ нормальнаго вида. Москва. 1910, 2 стр.
- Степаннскій Л.** Исторія распространенія *Elodea canadensis* Michx. въ Россіи.—Труды Бот. Сада Имп. Юр. Унив. Томъ X, 1910, стр. 214—229.
- Ф. Б. Пр.—**Федченко Б. А.** Растительность верховьевъ р. Протвы.—Изв. Имп. С.-Пб. Бот. Сада. Томъ X, 1910, стр. 71—77.

- Федченко Б. А. и Флеровъ А. О. Флора Европейской Россіи.—
Иллюстрированный опредѣлитель дикорастущихъ растеній
Европейской Россіи и Крыма. С.-Петербургъ. 1910, VIII,
120½ стр.
- Флеровъ А. Окская флора.—Труды Имп. С.-Пб. Бот. Сада. Томъ
XXVII. 1910, XVI и 788 стр.
- Хор. IV.—Хорошковъ А. А. Дополненія къ флорѣ Московской губ. IV.—
Труды Бот. Сада Имп. Юр. Унив. Томъ XII, 1911, стр. 16—18.
- Ф. Б. Доп.—Федченко Б. А. Предварительный отчетъ о ботаническихъ изслѣ-
дованіяхъ въ Можайскомъ уѣздѣ, лѣтомъ 1911 г.—Докладъ
Мож. уѣзд. земск. управы по эконо. части за 1911 г. Мо-
жайскъ. 1911. Приложение 3-е, 6 стр.
- Ф. Б. Нов. дан.—Федченко Б. А. Новыя данныя по флорѣ Можайскаго уѣзда.—
Извѣстія Имп. С.-Пб. Бот. Сада. Томъ XI. 1911, стр. 171—173.
- Литвиновъ Д. П. О *Calamagrostis Langsdorffii* (Link) Trin.,
S. rigurea Trin. и нѣкоторыхъ близкихъ къ нимъ формахъ.—
Труды Бот. Муз. Имп. Ак. Наукъ. Вып. VIII, 1911, стр. 50—77.
- Голицынъ В. М., кн. Нашествіе шюппеи.—Труды Бот. Сад.
Имп. Юр. Унив. Томъ XIII, 1912, стр. 185—188.
- Кузнецовъ Н. П., проф. *Symphytum asperum* Lerech. въ Европей-
ской Россіи.—Извѣстія Имп. Ак. Наукъ. 1912, стр. 957—969.
- Маевскій П. Флора Средней Россіи.—Изданіе 4-е, исправленное и
дополненное Д. П. Литвиновымъ. Москва. 1912, XXXVI,
стр. 731.
- Петровъ И. П. Болота долины Яхромы.—Ботаническое изслѣдо-
ваніе болотъ долины Яхромы въ Дмитровскомъ уѣздѣ, Мо-
сковской губерніи, въ 1909 и 1911 годахъ.—Изд. Дмитр.
Уѣзди. Земства. Москва. 1912, XXXII и 319 стр.
- Петушиковъ А. П. *Ophrys myodes* Jacq. въ Московской губ.—
Труды Бот. Сад. Имп. Юр. Унив. Томъ XIII, 1912, стр. 189—190.
- Сырейниковъ Д. П. Замѣтка о *Cytisus ratisbonensis* Schaeffer и
Cytisus ruthenicus Fischer.—Труды Бот. Сад. Имп. Юр. Унив.
Томъ XIII, 1912, стр. 207—209.
- Петушиковъ А. П. *Potentilla opaca* L. и *P. opaciformis* Th. W.—
Труды Бот. Сад. Имп. Юр. Унив. Томъ XIV (1913), стр. 136—138.
- Кузнецовъ В. Бекманія (*Beckmannia eruciformis* Host).—Труды
Бюро по прикладн. бот. Годъ 6-й (1913), стр. 577—584.

Полный алфавитный указатель семействъ, родовъ, видовъ, формъ и синонимовъ.

Abies DC.	I. 58
— <i>balsamea</i> Mill.	I. —
— <i>Pichta</i> Forbes.	I. —
— <i>sibirica</i> Ledb.	I. —
Abietineae Rich.	I. —
Acer L.	II. 347
— <i>Ginnala</i> Maxim.	II. 348
— <i>Negundo</i> L.	II. —
— <i>platanoides</i> L.	II. —
— <i>tatarica</i> L.	II. 347
Aceraceae DC.	II. 346
Achillea L.	III. 262
— <i>cartilaginea</i> Ledb.	III. 263
— <i>magna</i> L.	III. 264
— <i>Millefolium</i> L.	III. 263
— <i>α. purpureum</i> Mart.	III. 264
— <i>β. tanacetifolia purpurea</i> Pall.	III. —
— <i>nobilis</i> L.	III. 264 и IV. 150
— <i>Parmica</i> L.	III. 262 и 263
Achyrophorus maculatus Scop.	III. 320
Acinos vulgaris Pers.	III. 81
Aconitum L.	II. 140
— <i>Anthora</i> L.	II. 140 и IV. 74
— <i>f. collinum</i> Schur.	IV. —
— <i>excelsum</i> Rchb.	II. 140 и IV. 75
— <i>f. albeflora</i>	IV. —
— <i>lasiosotomum</i> Rchb.	II. 141 и IV. —
— <i>Lycostomum</i> Jacq.	II. 141
— — L.	II. —
— — L. <i>α.</i>	II. 140
— — <i>β. flor.coerul.</i>	II. —
— <i>pallidum</i> Rchb.	II. 141
— <i>septentrionale</i> Kölle.	II. 140
— — Mart.	II. —
Acorus L.	I. 216
— <i>Calamus</i> L.	I. —
Actaea L.	II. 142
— <i>spicata</i> L.	II. —
— <i>nigra</i> Stev.	II. —
Adenophora Fisch.	III. 229
— <i>communis</i> Fisch.	III. —
— <i>lilifolia</i> Ledb.	III. —
Adoxa L.	III. 207
— <i>moschatellina</i> L.	III. —

Adoxaceae Engl.	III. —
Aegilops L.	IV. 23
— <i>cylindrica</i> Host.	IV. 24
Aegopodium L.	II. 400
— <i>Podagraria</i> L.	II. 400 и IV. 135
Aera caespitosa Aschers. et Gr.	I. 129
— <i>flexuosa</i> Aschers. et Gr.	I. —
Aesculus L.	II. 349
— <i>flava</i> DC.	II. 350
— <i>Hippocastanum</i> L.	II. 349
— <i>lutea</i> Wang.	II. 350
— <i>Pavia</i> L.	II. —
Aethusa L.	II. 405
— <i>Cynapium</i> L.	II. —
Agrimonia L.	II. 238
— <i>Eupatoria</i> L.	II. 238 и IV. 95
— — <i>albiflora</i> Caspary.	IV. —
— — <i>β. fallax</i> Fiek.	IV. —
— — <i>α. grandis</i> (Andrzej.) Aschers. et Gr.	IV. —
— — <i>γ. minor</i> Koch.	IV. —
— <i>Eupatoria</i> × <i>pilosa</i> Abromeit.	IV. 96
— <i>pilosa</i> Ledb.	II. 239 и IV. 95
Agropyrum caninum PB.	I. 159
Agrostemma L.	II. 108
— <i>Githago</i> L.	II. 108 и IV. 65
Agrostis L.	I. 116
— <i>alba</i> L.	I. 116 и IV. 12
— — <i>δ. coarctata</i> Hoffm.	I. 118
— — <i>α. genuina</i> Aschers. et Gr.	I. 117
— — <i>β. gigantea</i> Mey.	I. 117 и IV. 12
— — — <i>silvatica</i> Aschers. et Gr.	IV. —
— — <i>γ. prorepens</i> Koch.	I. 117 и IV. —
— <i>arundinacea</i> L.	I. 122
— <i>canina</i> L.	I. 118 и IV. 13
— — <i>β. arida</i> Schlecht.	I. 119 и IV. —
— — <i>α. genuina</i> Godr. et Gr.	IV. —
— — <i>δ. mutica</i> Gaud.	IV. —
— — <i>ζ. stolonifera</i> Blytt.	IV. —
— — <i>β. varians</i> Aschers. et Gr. I. 119 и IV. —	IV. —
— — <i>α. variiflora</i> Waisb.	IV. —
— <i>capillaris</i> Leers.	I. 118
— — Pall.	I. 116
— <i>diffusa</i> Host.	I. —
— <i>gigantea</i> Roth.	I. 117

<i>Agrestis hispida</i> Willd.	I. 118	<i>Alectorolophus montanus</i> Fritsch.	IV. 145
— <i>Spica venti</i> L.	I. 119	— <i>serotinus</i> Schönh.	IV. —
— <i>stolonifera</i> L. <i>alba</i> (L.)	I. 116	— <i>stenophyllus</i> Schur.	IV. 146
— — <i>gigantea</i> Roth.	I. 117	<i>Alisma</i> L.	I. 86
— — <i>patula</i> Gaud.	I. —	— <i>arcuatum</i> Michalet.	I. 87
— — <i>vulgaris</i> With.	I. 118	— <i>Michaletii</i> Aschers. et Gr.	I. 86
— <i>tenella</i> Hoffm.	I. —	— — α . <i>latifolium</i> Kunth.	I. 87
— <i>varia</i> Host.	I. 117	— — β . <i>stenophyllum</i> Aschers. et Gr.	I. —
— <i>vulgaris</i> With. I. 118 n	IV. 12	— <i>Plantago</i> L.	I. 86
— — β . <i>arenicola</i> Aschers. et Gr.	I. 118	— — <i>lanceolatum</i> Hoppe.	I. 87
— — α . <i>genuina</i> Schur.	I. —	— — <i>angustifolium</i> Ledeb.	I. —
— — δ . <i>stolonifera</i> Koch.	IV. 12	<i>Alismataceae</i> Lam.	I. 86
— — γ . <i>umbrosa</i> Schur.	I. 118	<i>Alliaria officinalis</i> Andrzej. II. 190 n	IV. 84
<i>Aira aquatica</i> L.	I. 143	<i>Allium</i> L.	I. 234
— <i>caespitosa</i> L.	I. 129	— <i>acutangulum</i> Schrad.	I. 236
— — <i>pallida</i> Koch.	I. 130	— — <i>angulosum</i> L. I. 236 n	IV. 39
— <i>cristata</i> L.	I. 133	— — β . <i>latifolium</i> Regel.	IV. —
— <i>flexuosa</i> L.	I. 129	— — α . <i>typicum</i> Regel.	IV. —
<i>Ajuga</i> L.	III. 114	— — <i>carinatum</i> Poll.	I. 238
— <i>alpina</i> Vill.	III. —	— <i>Cepa</i> L.	I. 235
— <i>carnea</i> Mart.	III. 115	— <i>oleraceum</i> L. I. 238 n	IV. 40
— <i>genevensis</i> L. III. 115 n	IV. 142	— <i>Porrum</i> L.	I. 237
— — γ . <i>albiflora</i>	III. 116	— <i>rotundum</i> L. I. 237 n	IV. 39
— — α . <i>elatior</i> Fries.	III. 115	— — <i>typicum</i> Regel.	IV. —
— — β . <i>foliosa</i> Tratt.	III. 116	— <i>sativum</i> L.	I. 236
— — <i>f. glabrescens</i>	IV. 142	— <i>Schoenoprasum</i> L. I. 235 n	IV. 39
— — <i>f. roseiflora</i>	III. 116	— — <i>riparium</i> Cel.	IV. —
— <i>genevensis</i> \times <i>reptans</i>	III. —	— <i>senescens</i> L.	I. 236
— <i>lanata</i> Mart.	III. 115	— <i>vineale</i> L.	I. 237
— <i>pyramidalis</i> L.	III. —	<i>Alnus</i> Gaertn.	II. 50
— — Willd.	III. —	— <i>glutinosa</i> (L.) Gaertn.	II. —
— <i>reptans</i> L.	III. 114	— — (L.) Willd.	II. —
— — <i>albiflora</i> Tin.	III. 115	— <i>glutinosa</i> \times <i>incana</i>	II. 51
— — <i>roseiflora</i> Wildm. et Du-	III. —	— <i>incana</i> DC.	II. 50
— — <i>simplex</i> Kauffm.	III. 114	— — (L.) Willd. II. 50 n	IV. 50
<i>Albersia</i> Kunth.	II. 95	— — α . <i>acutiloba</i> Koch.	II. 51
— <i>Blitum</i> Kunth.	II. —	— <i>incana</i> L. <i>pinnatifida</i> , d. <i>acuminata</i> Regel.	II. —
<i>Alchimilla</i> L. II. 237 n	IV. 89	— <i>pubescens</i> Tausch.	II. —
— <i>acutidens</i> Buser, Lindb. fil.	IV. 94	<i>Alopecurus</i> L.	I. 112
— — <i>ampl.</i>	IV. 91	— <i>agrestis</i> L.	I. 113
— — <i>gibberulosa</i> Lindb. fil.	IV. 91	— <i>arundinaceus</i> Poir.	I. 114
— — <i>glabriuscula</i> Lindb. fil.	IV. 95	— <i>bulbosa</i> Hoffm.	I. 115
— — <i>hirsuticaulis</i> Lindb. fil.	IV. 90	— <i>fulvus</i> Sm.	I. 116
— — <i>hybrida</i> DC.	II. 238	— <i>geniculatus</i> L.	I. 115
— — <i>micans</i> Buser.	IV. 93	— — <i>bulbosus</i> Sonder.	I. —
— — <i>pastoralis</i> Buser.	IV. 92	— — <i>paludosus</i> Beauv.	I. 116
— — <i>pubeescens</i> Lam.	II. 238	— — <i>mysuroides</i> Huds.	I. 113
— — — (Lam.) Buser.	IV. 91	— <i>nigricans</i> Hornm.	I. 114
— — <i>subcrenata</i> Buser.	IV. 94	— — <i>pl. auct.</i> , non Hornm.	I. —
— — <i>strigcsula</i> Buser.	IV. 93	— <i>pratensis</i> L.	I. —
— <i>vulgaris</i> L.	II. 237	— — γ . <i>glaucus</i> Sonder.	I. —
— — α . <i>hybrida</i> L.	II. 238	— — β . <i>obscurus</i> Griseb.	I. —
— — — β . <i>pubescens</i> Mart.	II. —	— — <i>ruthenicus</i> Weinem.	I. —
— — — β . <i>subsericea</i> Koch.	II. —	— — α . <i>typicus</i> Aschers. et Gr.	I. —
<i>Alectorolophus</i> All.	III. 166	— — <i>ruthenicus</i> Weinem.	I. —
— <i>Crista Galli</i> MB.	III. —	— <i>ventricosus</i> Pers.	I. —
— <i>fallax</i> (Wimm. et Grab.) Sterneck	III. 168 n	— — α . <i>exserpens</i> Marsson.	I. 115
— — <i>major</i> (Ehrh.) Rchb.	III. 166	<i>Alsine</i> Wahlenb.	II. 117
— — — <i>ssp. apterum</i> Fries	III. 167 n	— — <i>media</i> L.	II. 121
— — — — —	IV. 145	— — <i>tenuifolia</i> (L.) Wahlenb.	II. 117
— — — <i>ssp. eumajor</i> Sterneck.	III. 167 n	<i>Alyssum</i> L.	II. 197
— — — — —	IV. —	— <i>calycinum</i> L.	II. 198
— — — <i>major</i> \times <i>minor</i>	III. 168	— <i>incanum</i> L.	II. 199
— — — <i>minor</i> (Ehrh.) Wimm. et Grab.	III. 167 n	— <i>minimum</i> Willd. II. 198 n	IV. 86
— — — — —	IV. 146	— <i>montanum</i> L.	II. 197

<i>Alyssum paniculatum</i> Willd.	II. 207	<i>Antirrhinum Linaria</i> L.	III. 1
— <i>sativum</i> Sw.	II. 203	— <i>minor</i> L.	III. 1
Amarantaceae Juss.	II. 94	<i>Apargia autumnalis</i> Scop.	III. 322
<i>Amarantus</i> L.	II. —	— <i>hastilis</i> Willd.	III. 322
— <i>Blitum</i> L.	II. 95	— <i>hispida</i> Willd.	III. —
— <i>retroflexus</i> L.	II. —	— <i>incana</i> Mart.	III. —
<i>Amelanchier</i> Medik.	II. 276	<i>Apera</i> Adans.	I. 419
— <i>canadensis</i> Medik. β . <i>rotundi-</i>		— <i>Spica venti</i> PB.	I. 119 II. IV. 43
<i>folia</i> Torr.	II. 277	<i>Apium</i> L.	II. 399
— <i>ovalis</i> Borkh.	II. —	— <i>graveolens</i> L.	II. —
— — Medik.	II. —	Apocynaceae R. Br.	III. 40
— <i>spicata</i> Deesne.	II. —	<i>Aquilegia</i> L.	II. 137
— <i>vulgaris</i> Moench. II. 277 II. IV. 108		— <i>vulgaris</i> L.	II. 138
<i>Ampelopsis hederacea</i> DC.	II. 354	<i>Arabis</i> L.	II. 181
— <i>quinquefolia</i> R. et Sch.	II. —	— <i>Gerardii</i> Bess.	II. 181 II. IV. 83
<i>Amygdalus nana</i> L.	II. 281	— <i>hirsuta</i> (L.) Scop.	II. 182 II. IV. —
<i>Anacharis Alsinastrum</i> Bab.	I. 90	— <i>pendula</i> L.	II. 182 II. IV. —
<i>Andromeda</i> L.	III. 18	— <i>Thaliana</i> L.	II. 190
— <i>calyculata</i> L.	III. 19	Araceae Neck.	I. 246
— <i>Polifolia</i> L.	III. 18	<i>Archangelica</i> Hoffm.	II. 413
— — fl. albo.	III. 19	— <i>officinalis</i> Hoffm. II. 414 II. IV. 136	
Androsace L.	III. 25	<i>Aretium</i> L.	III. 289
— <i>elongata</i> L.	III. —	— <i>Bardana</i> Willd.	III. 291
— <i>filiformis</i> Retz.	III. 27	— <i>Lappa</i> L. α . <i>majus</i> Goldb.	III. 289
— <i>septentrionalis</i> L.	III. 26 II. IV. 138	— — β . <i>minus</i> Goldb.	III. 290
— — α . <i>gigantea</i> Goldb.	III. 27	— <i>majus</i> (Gaertn.) Bernh.	III. 289
<i>Anemone</i> L.	II. 149	— — Schkuhr.	III. —
— <i>Hepatica</i> L.	II. 147	— <i>minus</i> (Hill) Bernh.	III. 290
— <i>nemorosa</i> L.	II. 149 II. IV. 76	— — α . <i>pubescens</i> Boreau	III. 291
— — α . <i>violacea</i> Mart.	II. 150	— <i>tomentosum</i> Mill.	III. —
— <i>patens</i> L.	II. 148	— — α . <i>glaberrimus</i> Fries. III. 292 II. IV. 151	
— <i>pratensis</i> L.	II. —	<i>Arctostaphylos</i> Adams.	III. 17
— <i>Pulsatilla</i> L.	II. —	— <i>uva ursi</i> (L.) Spreng.	III. 18
— <i>ranunculoides</i> L.	II. 150 II. IV. 76	<i>Arenaria</i> L.	II. 118
— — α . <i>genuina</i> Ulbrich.	IV. —	— <i>campestris</i> All.	II. 129
— — γ . <i>latisecta</i> Schur.	IV. —	— — <i>urbana</i> Mart.	II. —
— — β . <i>latifolia</i> Ulbrich.	IV. —	— <i>graminifolia</i> Schrad. II. 419 II. IV. 69	
— — var. <i>subintegra</i> Wiesbauer	IV. —	— <i>lateriflora</i> L.	II. 118
— — var. <i>subintegerrima</i> Grun.	IV. —	— <i>rubra</i> L.	II. 120
— <i>silvestris</i> L.	II. 149	— <i>serpyllifolia</i> L.	II. 118 II. IV. 69
<i>Anethum</i> L.	II. 417	— — α . <i>viscida</i> (Loisel.) Aschers.	IV. —
— <i>graveolens</i> L.	II. —	— — Loisel.	II. 419 II. IV. —
<i>Angelica</i> L.	II. 413	— <i>tenuifolia</i> L.	II. 117
— <i>Archangelica</i> L.	II. 414	— <i>trinervia</i> L.	II. —
— <i>montana</i> Schleich.	II. 413	<i>Aristolochia</i> L.	II. 59
— <i>silvestris</i> L.	II. 413 II. IV. 136	— <i>Clematidis</i> L.	II. —
— — α . <i>decurrens</i> Rupr.	II. 413	— <i>macrophylla</i> Lam.	II. —
<i>Antennaria</i> Gaertn.	III. 245	Aristolochiaceae Juss.	II. —
— <i>dioica</i> (L.) Gaertn.	III. —	<i>Arrhenatherum</i> P.B.	I. 124
— — β . <i>borealis</i> Camus.	III. 246	— <i>Avenaceum</i> P.B.	I. —
— — α . <i>gallica</i> Camus.	III. —	— <i>elatus</i> M. et K.	I. 124 II. IV. 14
<i>Anthemis</i> L.	III. 259	<i>Artemisia</i> L.	III. 271
— <i>arvensis</i> L.	III. 261 II. IV. 150	— <i>Abrotanum</i> L.	III. 278
— <i>Cotula</i> L.	III. 261	— <i>Absinthium</i> L.	III. 272
— <i>tinctoria</i> L.	III. 260	— <i>austriaca</i> Jacq.	III. 272 II. IV. 151
— — α . <i>discoidea</i> Vahl.	III. —	— <i>campestris</i> L.	III. 274
<i>Anthoxanthum</i> L.	I. 102	— — β . <i>sericea</i> Fries.	III. —
— <i>odoratum</i> L.	I. 102 II. IV. 41	— — α . <i>vulgaris</i> Marss.	III. —
— — β . <i>silvaticum</i> Aschers. et Gr.	IV. 41	— — — <i>f. purpurascens</i> G.B.	III. —
— — α . <i>villosum</i> Loisel.	I. 102	— — — <i>f. stramenticia</i> G.B.	III. —
<i>Anthriscus</i> Hoffm.	II. 422	— <i>Dracunculus</i> L.	III. 276
— <i>Cerofolium</i> Hoffm.	II. 423	— <i>paniculata</i> Lam.	III. 275 II. IV. 151
— <i>silvestris</i> Hoffm.	II. 422 II. IV. 136	— <i>procera</i> Willd.	III. 275
— — α . <i>nitida</i> Kauffm.	II. 423	— <i>scoparia</i> W.K.	III. 274
<i>Anthyllus</i> L.	II. 289	— <i>vulgaris</i> L.	III. 273
— <i>Vulneraria</i> L.	II. 289 II. IV. 110		
— — α . <i>polyphylla</i> Kit.	IV. —		

Arundo Tourn.	I. 130	IV. 15	Astragalus Cicer L.	II. 303	IV. 115
— borealis Hoffm.	I. 145	—	— — f. angustifolius Cel.	IV. —	—
— Calamagrostis L.	I. 120	—	— danicus Retz.	II. 305	IV. —
— Epigeios L.	I. 123	—	— glaux Stev.	—	II. 305
— — breviseta Goldb.	I. 120	—	— glycyphyllos L.	—	II. 304
— festuacea W.	I. 145	—	— glycyphyllus L.	II. 304	IV. 115
— Phragmites L.	I. 130	—	— Hypoglottis L.	—	II. 305
— silvatica Schrad.	I. 122	—	Athamanta Cervaria L.	—	II. 415
— stricta Timm.	I. 121	—	— Libanotis L.	—	II. 407
Asarum L.	II. 60	—	— — β. sibirica L.	—	II. 408
— europaeum L.	II. —	—	— Oreoselinum L.	—	II. 415
Asclepiadaceae R.Br.	III. 41	—	— sibirica L.	—	II. 408
Asclepias Vincetoxicum L.	III. —	—	Athyrium Roth.	I. 38	—
Asparagaceae Juss.	I. 241	—	— filix femina Roth.	I. —	—
Asparagus L.	I. —	—	— — α. dentata (Doell) Milde.	I. 38	IV. 1
— officinalis L.	I. 242	—	— — β. fissidens (Doell) Milde.	I. 38	IV. —
Asperugo L.	III. 49	—	— — γ. multidentata (Doell) Milde.	IV. —	—
— procumbens L.	III. 49	IV. 139	— fragilis Mart.	I. 39	—
Asperula L.	III. 186	—	— molle Roth.	I. 38	—
— Aparine Schott.	III. 188	—	Atriplex L.	II. 89	—
— galioides M.B.	III. 186	—	— acuminata W. K.	II. 90	—
— — α. glabra Wallr.	III. 187	—	— hastata L.	II. 91	—
— humifusa Bess.	III. 188	—	— hastatum L.	II. 91	IV. 62
— odorata L.	III. 187	IV. 149	— — α. microtheca Schum.	IV. —	—
— — β. latifolia Marss.	III. 187	—	— — subf. ruderales Westerl.	IV. —	—
— palustris Goldb.	III. 188	—	— hortensis L.	II. 90	IV. —
— rivalis Sibth. et Sm.	III. —	—	— — β. rubrum Beck.	IV. —	—
— tinctoria L.	III. 186	—	— — α. typicum Beck.	IV. —	—
Asplenium Filix femina Bernh.	I. 38	—	— laciniata L.	II. 92	—
Aspidium Sw.	I. 39	—	— laciniatum L.	II. 92	IV. 63
— aculeatum Sw.	I. 44	—	— latifolium Wahlenb.	II. 91	—
— — v. Braunii Doell.	I. —	—	— nitens Rebert.	II. 90	—
— Swartzianum Koch.	I. —	—	— — Schkuhr.	II. 90	IV. 62
— Braunii Spenner	I. —	—	— — γ. subsimplex Aschers. et Gr.	IV. —	—
— cristatum Sw.	I. 43	IV. 2	— — α. typicum Aschers. et Gr.	IV. —	—
— — monstr. bifurcatum Milde.	IV. —	—	— — β. virens Zapal.	IV. —	—
— — multifurcatum Milde.	IV. —	—	— patula L.	II. 91	—
— dilatatum Willd.	I. 43	—	— patulum L.	II. 91	IV. 62
— Dryopteris Baumg.	I. 40	IV. 1	— — α. angustifolium Lange	IV. —	—
— filix mas Sw.	I. 42	IV. 2	— — β. erectum Lange.	IV. —	—
— — α. crenatum Milde.	I. 43	IV. —	— — γ. permixtum Beck.	IV. —	—
— — γ. deorsi-lobatum Milde.	IV. —	—	— tataricum L.	IV. 63	—
— — β. subintegrum Doell.	I. 43	IV. —	— — α. incisum Gürke.	IV. —	—
— — typicum Luerssen	I. 43	—	— — β. obtusilobum Beck.	IV. —	—
— Filix femina Goldb.	I. 38	—	Atropa physaloides Jacq.	III. 122	—
— fragilis Sw.	I. 39	—	Atropis Griseb.	I. 145	—
— montanum (Vogel) Aschers.	I. 42	—	— distans Griseb.	I. 145	IV. 22
— Oreopteris (Sw.) Hoffm.	I. —	—	Avena L.	I. 125	—
— Pheopteris Baumg.	I. 40	—	— elatior L.	I. 124	—
— spinulosum Sw.	I. 43	IV. 2	— fatua L.	I. 126	IV. 14
— — β. dilatatum Sw.	I. 44	IV. —	— pratensis L.	I. 127	—
— — α. genuinum Milde.	I. 44	IV. —	— pubescens Huds.	I. 126	IV. 14
— Thelypteris Sw.	I. 41	IV. —	— — β. amethystina Clarion (sp.).	I. 127	—
— — α. Rogaezianum Bolle.	IV. —	—	— — α. glabrescens Rchb.	I. —	—
Aster L.	III. 240	—	— sativa L.	I. 126	—
— acer L.	III. —	—	— — α. orientalis Schreb.	I. —	—
— Amellus L.	III. 241	—	— strigosa Schreb.	I. —	—
— — α. laticeps GB.	III. —	—			
— novi Belgii Nees. α. ampliflorus Nees.	III. —	—			
— salicifolius Lam.	III. —	—			
— — Scholl.	III. —	—			
— sedifolius L.	III. 240	—			
Astragalus L.	II. 303	—			
— — arearius L.	II. 305	—			
— — α. glabrescens Rchb.	II. 306	—			
— — forma glabra Petunn.	II. —	—			

Baldingera arundinacea Dumor.	I. 101
— colorata Fl. Wett.	I. —
— Ballota L.	III. 105
— foetida Lam.	III. 106

<i>Ballota nigra</i> L.	III. —	<i>Bidens</i> — β . <i>radiatus</i> Ledb.	III. —
— α . <i>foetida</i> Koch.	III. —	— α . <i>typicus</i> GB.	III. —
— α . <i>ruderalis</i> Sw.	III. —	— γ . <i>Coreopsis</i> <i>Bidens</i> L.	III. —
Balsaminaceae Rich.	II. 350	— <i>minima</i> L.	III. 238
<i>Balsamita vulgaris</i> Willd.	III. 266	— <i>nana</i> Goldb.	III. —
<i>Barbarea</i> R. Br.	II. 179	— <i>pumila</i> L.	III. 259
— <i>stricta</i> Andrzej.	II. 180 II. 83	— <i>tripartita</i> L.	III. 257
— α . <i>foliosa</i>	IV. —	— <i>tripartitus</i> L.	III. —
— <i>vulgaris</i> R. Br. β . <i>arcuata</i> Koch.	II. 180	— β . <i>integer</i> C. Koch.	III. 258
— α . <i>arcuata</i> Wahlenb.	II. 180 II. 82	— β . <i>minimus</i> Kauffm.	III. —
— — — α . <i>glabra</i> W. Zinger.	IV. 83	— γ . <i>pumilus</i> Roth.	III. —
— — — β . <i>hirsuta</i> W. Zinger.	IV. —	— var. <i>tenuis</i> Turcz.	III. —
<i>Batrachium admixtum</i> W. Nyland.	II. 155	— α . <i>typicus</i> GB.	III. —
<i>Beckmannia</i> Host.	I. 108	<i>Blitum Bonus Henricus</i> C. A. Mey.	II. 88
— <i>cruciformis</i> Host.	I. 108 II. 41	— <i>chenopodioides</i> Ad.	II. 86
— α . <i>minor</i> Pacz.	IV. —	— <i>glaucum</i> Koch.	II. —
— <i>forma nodosa</i>	IV. 12	— <i>polymorphum</i> C.A. Mey.	II. —
— β . <i>ramosa</i> Pacz.	IV. —	— <i>rubrum</i> L.	II. —
<i>Bellis</i> Tourn.	III. 239	— <i>virgatum</i> L.	II. 87
— <i>perennis</i> L.	III. 239 II. 149	<i>Blysmus</i> Panz.	I. 174
Berberidaceae Vent.	II. 164	— <i>compressus</i> Panz.	I. 174 II. 26
<i>Berberis</i> L.	II. —	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla.	IV. 25
— <i>vulgaris</i> L.	II. —	Borraginaceae Juss.	III. 47
<i>Berteroa</i> DC.	II. 198	<i>Borrago</i> L.	III. 52
— <i>incana</i> (L.) DC.	II. 199 II. 86	— <i>officinalis</i> L.	III. —
— fl. pleno.	IV. —	<i>Botrychium</i> Sw.	I. 47
— α . <i>viridis</i> Tausch (sp.).	IV. —	— <i>Lunaria</i> Sw.	I. 47 II. 3
<i>Beta</i> L.	II. 82	— α . <i>subincisa</i> Roeper.	IV. —
— <i>vulgaris</i> L. α . <i>Cicla</i> Koch.	II. —	— <i>Matricaria</i> Spr.	I. 48
— α . <i>esculenta</i> Salisb.	II. —	— <i>rutaceum</i> Mart.	I. —
<i>Betonica officinalis</i> L.	III. 105	— <i>rutaefolium</i> A. Br.	I. —
— β . <i>glabrata</i> Koch.	III. —	— <i>virginianum</i> Sw.	I. 49
— γ . <i>stricta</i> Koch.	III. —	<i>Brachypodium</i> P.B.	I. 157
— <i>officinalis</i> Pall.	III. —	— <i>pinnatum</i> P.B.	I. 157 II. 23
— <i>stricta</i> Ait.	III. —	— <i>silvaticum</i> Roem. et Sch. I. 158 II. 14	IV. —
<i>Betula</i> L.	II. 46	Brassica L.	II. 194
— <i>alba</i> L.	II. 47	— <i>campestris</i> L.	II. 195
— <i>pendula</i> Hoffm.	II. —	— <i>Napus</i> L.	II. —
— β . <i>pubescens</i> Spach.	II. 48	— <i>oleracea</i> L.	II. 194
<i>Alnus</i> L.	II. 50	— <i>Rapa</i> L.	II. —
— <i>fruticans</i> St.	II. 48	— α . <i>campestris</i> L.	II. 195
— <i>fruticosa</i> L.	II. —	— α . — Kauffm.	II. —
— — Pall.	II. —	— β . <i>rapifera</i> Metzg.	II. —
— — Rehb.	II. 49	<i>Briza</i> L.	I. 142
— — Willd.	II. —	— <i>media</i> L.	I. —
— <i>humilis</i> Schrank.	II. 48	— β . <i>albida</i> Lejeune.	I. —
— β . <i>commutata</i> Regel.	II. 49	— α . <i>typica</i> Aschers. et Gr.	I. —
— α . <i>genuina</i> Regel.	II. —	<i>Bromus</i> L.	I. 151
— <i>nana</i> L.	II. —	— <i>arvensis</i> L.	I. 155 II. 23
— <i>oycowensis</i> Rehb.	II. —	— <i>multiflorus</i>	I. 155
— <i>pendula</i> Roth.	II. 47	— α . <i>violaceus</i> Aschers. et Gr.	IV. —
— <i>pubescens</i> Ehrh.	II. 48 II. 50	— <i>asper</i> Murr.	I. 152
— <i>verrucosa</i> Ehrh.	II. 47	— <i>erectus</i> Huds.	I. —
— β . <i>atropurpurea</i> Hort.	II. 48	— <i>giganteus</i> L.	I. 149
— α . <i>dalecarlica</i> L.	II. —	— <i>gracilis</i> Weig.	I. 158
Betulaceae Rich.	II. 45	— <i>hordaceus</i> L.	I. 156 II. 23
<i>Bidens</i> L.	III. 257	— α . <i>nanus</i> Aschers. et Gr.	IV. —
— <i>cernua</i> L.	III. 258	— <i>inermis</i> Leyss.	I. 153 II. 22
— β . <i>minima</i> (L.).	III. 259	— α . <i>aristatus</i> Kauffm.	I. 153
— <i>cernuus</i> L.	III. 258	— γ . <i>pellitus</i> Beck.	IV. 22
— β . <i>coreopsidis</i> Dumort.	III. 259	— β . <i>pubescens</i> Kauffm.	I. 154
— β . <i>minimus</i> Kauffm.	III. —	— <i>japonicus</i> Thunb.	I. 156
— γ . — Ledb.	III. —	— <i>mollis</i> L.	I. 156 II. 23
— — — Lej.	III. —	— <i>multiflorus</i> Host.	I. 156
— γ . <i>radiatus</i> Kauffm.	III. —	— — Weig.	I. 155
		— <i>patulus</i> M. et K.	I. 156
		— α . <i>velutinus</i> Parl.	I. 157

<i>Bromus pinnatus</i> L.	I. —	<i>Callitriche caespitosa</i> Schultz.	II. 344
— <i>ramosus</i> Huds. I. 152 n	IV. 22	— <i>intermedia</i> Hoppe.	II. —
— <i>secalinus</i> L.	I. 154	— <i>minima</i> Hoppe.	II. —
— — <i>muticus</i> Hoffm.	I. 155	— <i>pallens</i> Goldb.	II. 342
— — <i>α. submuticus</i> Hagenbach.	I. —	— <i>palustris</i> L.	II. —
— <i>silvaticus</i> Host.	I. 158	— — <i>β. caespitosa</i> Rupr.	II. 344
— <i>sterilis</i> L.	I. 154	— — <i>ε. dubia</i> Rupr.	II. 343
— <i>tectorum</i> L. I. 154 n	IV. 23	— — <i>γ. fontana</i> Rupr.	II. —
<i>Brunella</i> L.	III. 112	— — <i>c. intermedia</i> Hoppe.	II. 344
— <i>grandiflora</i> (L.) Jacq.	III. 113	— — <i>γ. minima</i> Rupr.	II. —
— <i>vulgaris</i> L. III. 112 n	IV. 141	— — <i>δ. stellata</i> Rupr.	II. 343
— — <i>albiflora</i> Tin. III. 113 n	IV. 142	— <i>stagnalis</i> Scop. <i>β. intermedia</i>	
— — <i>γ. nemoralis</i> Beg.	IV. —	— <i>Hoppe.</i>	II. 344
— — <i>α. typica</i> Beck.	IV. —	— <i>verna</i> L.	II. 342
— — <i>β. uliginosa</i> Beg.	IV. —	— — <i>ε. angustata</i> Hoppe.	II. 344
<i>Bryonia</i> L.	III. 215	— — <i>μ. caespitosa</i> Schultz.	II. —
— <i>alba</i> L.	III. 216	— — <i>δ. dubia</i> Hoffm.	II. 343
<i>Bunias</i> L.	II. 208	— — <i>β. fontana</i> Kütz.	II. —
— — <i>orientalis</i> L. II. 208 n	IV. 88	— — <i>α. latifolia</i> Kütz.	II. —
— — <i>α. fol. variegatis.</i>	IV. —	— — <i>γ. minima</i> Hoppe.	II. 344
<i>Bunium</i> Carvi MB.	II. 401	— — <i>γ. stellata</i> Hoppe.	II. 343
— — <i>Rchb.</i>	II. —	— <i>vernalis</i> Kütz.	II. 342
<i>Bupththalmum</i> L.	III. 253	— — <i>β. caespitosa</i> Schultz.	II. 344
— <i>spicinum</i> Mart.	III. 250	— — <i>ε. dubia</i> Hoffm.	II. 343
— <i>speciosum</i> Schreb.	III. 253	— — <i>δ. fontana</i> Kütz.	II. —
<i>Butomaceae</i> Gray.	I. 89	— — <i>b. latifolia</i> Kütz.	II. —
<i>Butomus</i> L.	I. —	— — <i>α. minima</i> Hoppe.	II. 344
— <i>umbellatus</i> L.	I. —	— — <i>γ. stellata</i> Hoppe.	II. 343
		— — <i>α. stagnalis</i> Kauffm.	II. —
		— <i>virens</i> Goldb.	II. 345
Calamagrostis Roth.	I. 120	<i>Calluna</i> Salisb.	III. 20
— <i>arundinacea</i> Roth.	I. 122	— <i>vulgaris</i> (L.) Hull.	III. —
— <i>brevisetia</i> Goldb. herb.	I. 120	— — <i>α. albiflora</i> Michot. III. 20 n	IV. 137
— <i>Calamagrostis</i> Karst.	I. —	— <i>vulgaris</i> Salisb.	III. 20
— <i>elata</i> Blitt.	IV. 13	<i>Caltha</i> L.	II. 136
— <i>epigeios</i> Roth. I. 123 n	IV. 14	— <i>palustris</i> L. II. 136 n	IV. 72
— — <i>α. Huebneriana</i> Rchb. (sp.)	I. 123	— — <i>ssp. laeta</i> Schott, Nym. et	
— — <i>β. paralia</i> Fries.	I. —	— <i>Klotsch.</i>	IV. 73
— — <i>γ. Reichenbachiana</i> Gre-		— — <i>var. typica</i> Beck.	IV. —
— <i>cescu</i>	IV. 14	— — <i>ssp. genuina</i> Hegi.	IV. —
— <i>Gaudiniana</i> Rchb.	I. 121	<i>Calystegia</i> R. Br.	III. 43
— <i>lanceolata</i> Roth.	I. 120	— <i>sepium</i> (L.) R. Br.	III. —
— — <i>α. canescens</i> Aschers. et Gr.		— — <i>β. silvestris</i> Roem. et Sch.	III. 44
— — <i>I. 121 n</i>	IV. 13	— — <i>α. typica</i> GB.	III. —
— <i>Langsdorffii</i> (Link) Trin.	IV. —	<i>Camelina</i> Crantz.	II. 203
— — <i>α. Clausiana</i> (C.A.M.) Litw.	IV. —	— <i>dentata</i> Pers. II. 204 n	IV. 86
— — <i>β. major</i> (Meinsh.) Litw.	IV. —	— <i>microcarpa</i> Andrzej.	II. 203
— <i>neglecta</i> P.B. I. 121 n	IV. —	— <i>sativa</i> Crantz. II. 203 n	IV. 86
— — <i>α. interrupta</i> Wahlb.	I. 122	— — <i>ssp. glabrata</i> (DC.) N. Zin-	
— <i>phragmitoides</i> Hartm.	I. 121	— <i>ger.</i>	IV. —
— <i>purpurea</i> Trin. I. 121 n	IV. 13	— — <i>ssp. linicola</i> (Sch. et Sp.)	
— <i>silvatica</i> DC.	I. 122	— <i>N. Zinger.</i>	IV. 87
— <i>stricta</i> Spr.	I. 121	— — <i>var. dentata</i> Wallr.	IV. —
— — <i>interrupta</i> Wahlb.	I. 122	— — <i>integrifolia</i> Wallr.	IV. —
— <i>villosa</i> Mutel.	IV. 13	— — <i>sublinicola</i> N. Zinger.	IV. —
<i>Calamintha</i> Acinos Clairv.	III. 81	<i>Campanula</i> L.	III. 219
— — <i>L.</i>	III. —	— <i>bononiensis</i> L. III. 221 n	IV. 149
— <i>arvensis</i> Lam.	III. —	— — <i>α. albiflora.</i>	IV. —
— <i>Clinopodium</i> Benth.	III. 82	— <i>Cervicaria</i> L.	III. 226
<i>Calla</i> L.	I. 217	— — <i>α. albiflora.</i>	III. 227
— <i>palustris</i> L.	I. —	— <i>diffusa</i> Mart.	III. 228
Callitrichaceae Link.	II. 341	— <i>glomerata</i> L.	III. 227
<i>Callitriche</i> L.	II. 342	— — <i>γ. aggregata</i> Vill.	III. 228
— <i>aquatica</i> Willd.	II. —	— — <i>δ. elliptica</i> DC.	III. —
— — <i>autumnalis</i> L.	II. 345	— — <i>farinosa</i> DC.	III. —
— <i>autumnalis</i> L.	II. —	— — <i>α. glabra</i> Bluff.	III. —
		— — <i>f. subcordata</i> GB.	III. —

<i>Campanula glomerata glabra</i> f. sub- cuneata GB.	III. 228	<i>Carduus crispus</i> β . sinuato-dentatus Schatz.	III. 294
— <i>γ</i> . pusilla DC.	III. —	— <i>α</i> . subintegrefolius Schatz.	III. —
— <i>β</i> . vulgata GB.	III. —	— <i>crispus</i> \times nutans.	III. 295
— — f. elliptica Kit.	III. —	— <i>eriphorus</i> L.	III. 298
— — f. viridis Rchb.	III. —	— <i>helenioides</i> L.	III. 301
— <i>hirsuta</i> Mart.	III. —	— <i>heterophyllus</i> L.	III. —
— <i>latifolia</i> L.	III. 224	— <i>lanceolatus</i> Hill.	III. 297
— <i>patula</i> L.	III. 225	— <i>marianus</i> L.	III. 307
— <i>β</i> . albiflora.	III. —	— <i>nutans</i> L.	III. 294
— <i>α</i> . flaccida Wallr.	III. —	— <i>γ</i> . crispo-nutans Koch.	III. 295
— <i>persicifolia</i> L. III. 226 II	IV. 149	— <i>α</i> . longepedunculatus Kauffm.	III. 294
— <i>f. dasycarpa</i> Kit.	III. 226	— <i>α</i> . longipes Kauffm.	III. —
— <i>α</i> . eriocarpa Koch.	III. —	— <i>β</i> . strictus Kauffm.	III. —
— <i>β</i> . minor Beck.	IV. 149	— <i>palustris</i> L.	III. 303
— <i>rapunculoides</i> L.	III. 222	— <i>polyacanthos</i> Schleich.	III. 295
— <i>α</i> . macrophylla DC.	III. 223	— <i>serratuloides</i> Auct. Fl. ross.	III. 302
— <i>rotundifolia</i> L.	III. 220	<i>Carex</i> L.	I. 178
— var. ovata Peterm.	III. —	— <i>acuta</i> L.	I. 200
— var. parviflora Lange.	III. —	— <i>fluviatilis</i> Hartm.	I. 201
— <i>α</i> . reflexa Hausm.	III. 221	— <i>α</i> . nigra L.	I. —
— var. stricta Schumach.	III. 220	— <i>β</i> . rufa L.	I. 200
— <i>salviaefolia</i> Wallr.	III. 228	— <i>acutiformis</i> Ehrh. I. 203 II	IV. 35
— <i>sibirica</i> L.	III. —	— <i>ampullacea</i> Good.	I. 212
— <i>tenuifolia</i> All.	III. 220	— <i>arenaria</i> L.	I. 188
— — Hoffm.	III. —	— <i>aristata</i> R. Br. I. 215 II	IV. 35
— <i>trachelium</i> L.	III. 223	— <i>α</i> . glabra Uechtr.	I. 216
— <i>β</i> . dasycarpa Koch.	III. —	— <i>brizoides</i> L.	I. 188
— <i>β</i> . paniculata Peterm.	III. 224 II	— <i>brunescens</i> (Pers.) Poir.	IV. 29
— <i>γ</i> . parviflora Cel.	III. 224	— var. <i>β</i> . sphaerostachya (Dew.) Kükenth.	IV. —
— <i>α</i> . urticifolia Lej. et Court.	III. 223	— <i>caespitosa</i> L. I. 199 II	IV. 30
— var. — Schmidt.	III. —	— <i>α</i> . fuliginosa Doell. I. 200 II	IV. —
— <i>urticifolia</i> Schmidt.	III. —	— <i>γ</i> . retorta Fries.	IV. —
<i>Campanulaceae</i> Juss.	III. 246	— <i>β</i> . Waisbeckeri Kükenth.	IV. —
<i>Cannabis</i> L.	II. 55	— <i>caespitosa</i> Palmstr.	IV. 29
— <i>sativa</i> L.	II. 56	— <i>caespitosa</i> \times Goodenoughii Appl.	IV. 32
<i>Caprifoliaceae</i> Juss.	III. 199	— <i>canescens</i> L. I. 195 II	IV. 28
<i>Capsella</i> Medik.	II. 206	— — <i>brunescens</i> Koch.	I. 196
— <i>bursa pastoris</i> (L.) Moench.	II. 206 II	— <i>β</i> . congesta K. Dom.	IV. 28
— — <i>γ</i> . coronopifolia DC.	II. 207	— var. <i>laetevirens</i> Aschers.	IV. —
— <i>α</i> . integrifolia Schleichtd.	II. —	— <i>α</i> . strictifolia. I. 196 II	IV. —
— <i>β</i> . sinuata Koch.	II. —	— <i>sublobiacea</i> Laest.	I. 196
<i>Caragana</i> Royen.	II. 301	— var. <i>tenuis</i> Lange.	IV. 28
— <i>arborescens</i> Lam.	II. 302	— <i>capillaris</i> L.	IV. 33
— <i>frutescens</i> DC.	II. —	— <i>caryophyllea</i> Latour. I. 204 II	IV. —
— <i>frutex</i> (L.) K. Koch.	II. —	— <i>chordorrhiza</i> Ehrh. I. 187 II	IV. 26
— <i>pygmaea</i> DC.	II. 303	— <i>ciliata</i> Willd.	I. 203
<i>Cardamine</i> L.	II. 183	— <i>collina</i> Willd.	I. —
— <i>amara</i> L.	II. 185	— <i>contigua</i> Hoppe.	I. 189
— <i>α</i> . hirta Wimm. et Grab.	II. 185 II	— <i>curta</i> Good.	I. 195
— — <i>β</i> . macrophylla Wenderoth.	IV. —	— <i>diandra</i> Schr. I. 192 II	IV. 27
— <i>α</i> . umbrosa (Lejeune) O. F.	IV. —	— — <i>tenella</i> Beckmann.	IV. —
— Schulz.	IV. —	— <i>digitata</i> L. I. 208 II	IV. 34
— <i>impatiens</i> L.	II. 183	— <i>β</i> . brevifolia Aschers.	IV. —
— <i>pratensis</i> L. II. 184 II	IV. 84	— <i>α</i> . robustior Kükenth.	IV. —
— <i>β</i> . dentata (Schultes) Rchb.	IV. —	— <i>dioica</i> L. I. 185 II	IV. 26
— subf. pilosa Beck.	IV. —	— <i>disjuncta</i> Kauffm.	I. 203
— <i>α</i> . vivipara Goldb. II. 83 II	IV. —	— <i>distans</i> L.	I. 209
— <i>silvatica</i> Hartm.	II. 185	— <i>disticha</i> Huds. I. 187 II	IV. 26
<i>Carduus</i> L.	III. 292	— <i>Drymeia</i> Ehrh.	I. 240
— <i>acanthoides</i> L. III. 293 II	IV. 151	— <i>echinata</i> Ehrh.	I. 194
— <i>arvensis</i> Kalm.	III. 304	— — Murr. I. 190, 194 II	IV. 27
— <i>crispus</i> L.	III. 293	— <i>elongata</i> L. I. 194 II	IV. 28
— <i>γ</i> . pinnatifidus Schatz.	III. 294	— <i>α</i> . Gebhardi (Willd.) Aschers.	IV. —
		— — Willd. I. 195 II	IV. —

<i>Carex ericetorum</i> Poll.	I. 203 II	IV. 32	<i>Carex panicea</i> L.	I. 206 II	IV. 33
— <i>α. pallens</i> Kneuck.		IV. —	— <i>paniculata</i> L.		I. 192
— <i>filiformis</i> L.		I. 214	— <i>paradoxa</i> Willd.	I. 191 II	IV. 27
— <i>flava</i> L.	I. 209 II	IV. 34	— <i>α. brachystachya</i> Schatz.		IV. —
— <i>α. umbrosa</i> Kneuck.		IV. —	— <i>β. sparsiflora</i> Lange.		IV. —
— <i>globularis</i> L.		I. 202	— <i>pauciflora</i> Lightf.		I. 186
— <i>Goodenoughii</i> Gay.	I. 201 II	IV. 31	— <i>pediformis</i> C.A.M.	I. 208 II	IV. 34
— <i>β. basigyna</i> Rehb.		IV. —	— <i>var. rhizina</i> (Blytt) Kükenth.		IV. —
— <i>α. curvata</i> Aschers. et Gr.	I. 202 II	IV. —	— <i>Persoonii</i> Sieb.		I. 196
— <i>β. elatior</i> Aschers. et Gr.	I. 202 II	IV. —	— <i>pilosa</i> Scop.		I. 205
— <i>ε. juncea</i> Fries.		IV. —	— <i>praecox</i> Jacq.	I. 204 II	IV. 32
— <i>α. polyandra</i> (Schkuhr.) Kükenth.		IV. —	— <i>Schreb.</i>		I. 188
— <i>γ. polygama</i> Rehb. I. 202 II		IV. —	— <i>α. pallida</i> Lange (sp.)	I. 189 II	IV. 27
— <i>δ. recta</i> Fleischer.		IV. —	— <i>Peterm.</i>		IV. —
— <i>γ. tornata</i> Fries.		IV. —	— <i>Pseudocyperus</i> L.		I. 211
— <i>Goodenoughii</i> × <i>gracilis</i> Kükenth.		IV. —	— <i>remota</i> Hoffm. herb.		I. 191
— <i>gracilis</i> Curt.	I. 200 II	IV. 30	— <i>L.</i>	I. 198 II	IV. 29
— <i>α. corynophora</i> (Peterm.) Kükenth.	I. 200 II	IV. —	— <i>riparia</i> Curt.	I. 213 II	IV. 35
— <i>β. fluviatilis</i> Harm.		IV. —	— <i>rostrata</i> Stokes.		IV. —
— <i>δ. rudis</i> (Wimm.) Kükenth.		IV. —	— <i>α. elatior</i> Blytt.		IV. —
— <i>ε. sphaerocarpa</i> Uechtr.		IV. 31	— <i>rostrata</i> With.	I. 212 II	IV. —
— <i>β. tricostata</i> Fries.	I. 201		— <i>Schreberi</i> Schrank.		I. 188
— <i>(Fries)</i> Aschers.	IV. 30		— <i>sylvatica</i> Huds.	I. 210 II	IV. 35
— <i>ε. zygostachya</i> Rehb.	IV. 31		— <i>spadicea</i> Roth.		I. 213
— <i>hirta</i> L.	I. 215 II	IV. 35	— <i>sparsiflora</i> Steud.	I. 206 II	IV. 33
— <i>ε. hirtaeformis</i> (Pers.) Kunth.	I. 215 II	IV. —	— <i>spicata</i> Schk.		I. 186
— <i>α. humilior</i> Peterm.		IV. —	— <i>stellulata</i> Good.	I. 194 II	IV. 27
— <i>β. major</i> Peterm.		IV. —	— <i>stricta</i> Good.	I. 198 II	IV. 29
— <i>γ. paludosa</i> A. Winkler.		IV. —	— <i>tenella</i> Schkuhr.	I. 197 II	IV. —
— <i>δ. subhirtaeformis</i> Kneuck.		IV. —	— <i>teretiuscula</i> Good.	I. 192 II	IV. 27
— <i>Hudsonii</i> A. Bennett.		IV. 29	— <i>tomentosa</i> Tausch.		I. 202
— <i>β. homolocarpa</i> (Peterm.) Rehb.		IV. 30	— <i>vaginata</i> Tausch.	I. 206 II	IV. 33
— <i>intermedia</i> Good.	187 II	IV. 26	— <i>verna</i> Vill.		I. 204
— <i>lasiocarpa</i> Ehrh.		I. 214	— <i>vesicaria</i> L.		I. 212
— <i>Leersii</i> F. Schultz.		I. 191	— <i>L. β.</i>		I. —
— <i>leporina</i> L.	I. 193 II	IV. 27	— <i>vitis</i> Fries.	I. 196 II	IV. 28, 29
— <i>β. argyroglochin</i> Hornem.	I. 193 II	IV. —	— <i>vulgaris</i> Fries.		I. 201
— <i>(Hornem.) Koch.</i>		IV. —	— <i>β. Dreyeri</i> Lange.		I. 199
— <i>α. capitata</i> Sonder (sp.)	I. 193 II	IV. —	— <i>var. elatior</i> Lange.		I. 202
— <i>limosa</i> L.		I. 205	— <i>genuina</i> Schmalh.		I. —
— <i>loliacea</i> L.	I. 194 II	IV. 197	— <i>var. juncella</i> Fries. I. 202 II		IV. 31
— <i>montana</i> L.	I. 203 II	IV. 32	— <i>typica</i> Meinsh.		I. 202
— <i>γ. bulboides</i> Waisb.		IV. —	— <i>vulpina</i> L.		I. 189
— <i>f. fimbriata</i> Waisb.		IV. —	— <i>β. interrupta</i> Peterm.		IV. 27
— <i>α. pallescens</i> Doell.		I. 203	— <i>α. nemorosa</i> (Rebent.) Koch.		IV. —
— <i>β. reflexa</i>	I. 203 II	IV. 32	— <i>Rebent. (sp.)</i> I. 189 II		IV. —
— <i>β. remotiflora</i> Waisb.		IV. —	— <i>uliginosa</i> L.		I. 174
— <i>moscowensis</i> C. B. Clarke.		IV. 29	— <i>umbrosa</i> Host.		IV. 33
— <i>muricata</i> L.	I. 189		— <i>Carlina</i> L.		III. 287
— <i>obtusangula</i> Ehrh.	I. 212		— <i>longifolia</i> Rehb.		III. 288
— <i>obtusata</i> Liljeb.	I. 186 II	IV. 26	— <i>vulgaris</i> L.		III. 287
— <i>Oederi</i> Ehrh.	I. 210 II	IV. 34	— <i>β. intermedia</i> Schur.		III. 288
— <i>Retz.</i>		IV. —	— <i>γ. nigrescens</i> Forman.		III. —
— <i>orthostachys</i> C.A.M.		I. 215	— <i>α. typica</i> GB.		III. —
— <i>ovalis</i> Good.		I. 193	— <i>Carum</i> L.		II. 401
— <i>Pairaei</i> F. Schultz.		I. 190	— <i>Carvi</i> L.		II. —
— <i>pallescens</i> L.	I. 207 II	IV. 34	Caryophyllaceae Rehb.		II. 96
— <i>α. elatior</i> Aschers.		IV. —	— <i>Cassandra</i> Don.		III. 19
— <i>paludosa</i> Good.		I. 213	— <i>calyculata</i> Don.		III. —
			— <i>Castalia speciosa</i> Salisb.		II. 133
			— <i>Catabrosa</i> P.B.		I. 142
			— <i>aquatica</i> P.B.		I. 143
			— <i>cristata</i> Dwigub.		I. 133
			— <i>Caucalis Anthriscus</i> Scop.		II. 422
			— <i>Caulinia fragilis</i> Willd.		I. 83

Celastraceae R. Br.	II. 345	Chaerophyllum neglectum Zinger. . .	II. 421
Cenolophium Koch.	II. 409	— Prescotii DC.	II. 421
— Fischeri Koch.	II. —	— sativum Lam.	II. 421
Centaurea L.	III. 309	— silvestre L.	II. 422
— austriacoides Woloszew.	III. 312	— temulum L.	II. 424
— Biebersteinii DC.	III. 317	Chaeturus Willd.	III. 108
— conglomerata C. A. Mey.	III. 314	— marrubiastrum (L.) Rehb.	III. —
— Cyanus L.	III. 315	Chaiturus Marrubiastrum Ehrh.	III. —
— Jacea L.	III. 311	Chelidonium L.	II. 166
— — α . bicolor Petern.	III. 312	— laciniatum Mill.	II. —
— — α . genuina Koch.	III. —	— majus L.	II. 166 n IV. 81
— — γ . lacera Koch.	III. —	— — β . laciniatum Koch.	II. 166
— — δ . pratensis Koch.	III. —	— — fl. pleno Beissn.	IV. 81
— — β . vulgaris Koch.	III. —	— — α . vulgaris Kauffm.	II. 166
— Jacea phrygia.	III. —	— quercifolium Willemt.	II. —
— maculosa Lam.	III. 317 n IV. 151	Chenopodiaceae Vent.	II. 80
— paniculata L.	III. 317	Chenopodium L.	II. 82
— Phrygia L.	III. 313	— album L.	II. 85 n IV. 59
— — β . fusca Koch.	III. 314	— — γ . Goldbachii Kauffm. II. 86 n IV. 61	
— phrygia L. fl. succ.	III. 313	— — β . striatum Kras.	IV. 60
— — α . pallida Koch.	III. 314	— — — 1. interjectum Murr.	IV. —
— ruthenica Lam.	III. 311	— — α . typicum Beck.	IV. —
— Scabiosa L.	III. 315	— — — 4. lanceolatum Mühlenb.	IV. —
— — α . heterophylla GB.	III. 316	— — — 1. Linneanum Beck.	IV. —
— — β . melanocephala Rupr.	III. —	— — — 3. oblongum Neilr.	IV. —
— — γ . Raczynskii Kauffm.	III. —	— — — 2. viridescens St. Am.	IV. —
— — var. vulgaris Koch.	III. 315	— — α . typicum Kauffm.	II. 85
— stenolepis Kerner.	III. 314	— — γ . viride L.	II. 85 n IV. 60
— stereophylla Bess.	III. 316 n IV. 151	— — — 1. genuinum Beck.	IV. 61
Centaureum Gilib.	III. 38 n IV. 138	— — β . viride Kauffm.	II. 83
— pulchellum (Sw.) Druce.	III. 39	— Berlandieri Moq.	IV. 61
— umbellatum Gilib.	III. —	— bonus Henricus L.	II. 88
Centunculus L.	III. 21	— foliosum (Moench) Aschers.	II. 87 n IV. 62
— minimus L.	III. 21 n IV. 137	— glaucum L.	II. 86 n IV. 61
Cephalanthera Rich.	I. 263	— — β . prostratum Beck. II. 86 n IV. —	
— ensifolia Rich.	I. —	— — α . typicum Beck.	IV. —
— longifolia Fritsch.	I. —	— — — 2. angustifolium (Zapal.)	
— Niphophyllum Rehb. fil.	I. —	— — — 3. humifusum (Zapal.)	
Cerastium L.	II. 125	— — — Aschers. et Gr.	IV. 61
— aquaticum L.	II. 127	— — — 1. robustum (Zapal.)	
— arvense L.	II. 127 n IV. 71	— — — Aschers. et Gr.	IV. —
— — α . angustifolium Fenzl.	IV. —	— — — hybridum L.	II. 84 n IV. 59
— — γ . condensatum Cel.	IV. —	— — β . cuneatum Beck.	IV. —
— — β . strictum (Haenke) Gaud.	IV. —	— — γ . diversifolium Ludwig.	IV. —
— non L.	IV. —	— — α . typicum Beck.	IV. —
— caespitosum Gilib. II. 126 n IV. 71		— polyspermum L.	II. 83 n IV. —
— — γ . glandulosum (Boenng.)		— — β . acutifolium Becker.	IV. —
— Wirtg.	IV. —	— — — Sm. II. 83 n IV. —	
— — α . hirsutum Fries.	IV. —	— — α . cymosum Chev. II. 83 n IV. —	
— — β . murale Desp.	IV. —	— — — 1. eu-acutifolium	
— — δ . nemorale Uechtr.	IV. —	— — — Aschers. et Gr.	IV. —
— glomeratum Thuill.	II. 125	— — — 3. obcordatum Schur.	IV. —
— semidecandrum L.	II. 126	— — — 2. obtusifolium Gaud.	IV. —
— triviale Link.	II. —	— — α . cymoso-racemosum Koch.	II. 83
— viscosum Curt.	II. 125	— — β . spicato-racemosum Koch.	II. —
— — L.	II. 126	— — rubrum L.	II. 86 n IV. 61
— vulgatum L.	II. 126	— — β . blitoides Wallr.	IV. —
Ceratophyllaceae S. F. Gray.	II. 133	— — γ . botryoides Sonder.	IV. —
Ceratophyllum L.	II. 134	— — α . foliolosum Wallr.	II. 87
— demersum L.	II. —	— — α . vulgare Wallr.	IV. 61
— platyacanthum Chamiss.	II. —	— — — subf. foliolosum Wallr.	IV. —
— submersum L.	II. —	— — urticum L.	II. 84
Chaerophyllum L.	II. 424	— — α . vulgare Ledeb.	II. 85
— aromaticum L.	II. 426 n IV. 136	— — viride L.	II. —
— bulbosum L.	II. 425 n IV. —	— Chimophila Pursh.	III. 9
— — var. neglectum Zinger.	II. 425		
— cerefolium Crantz.	II. 423		

<i>Chimophila corymbosa</i> Pursh.	III. 9	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	III. 303
— <i>umbellata</i> Nutt.	III. —	— <i>α. umbrosum</i> Kauffm.	III. 304
<i>Chironia Centaurium</i> Schmidt.	III. 39	— <i>palustre</i> × <i>oleraceum</i> Naeg.	III. 300
<i>Chorisposia</i> DC.	II. 209	— <i>pannonicum</i> Gaud.	III. 302
— <i>tenella</i> (Pall.) DC.	II. —	— <i>serrulatum</i> MB.	III. 298
<i>Chrysanthemum</i> L.	III. 265	— <i>setosum</i> DC.	III. 304
— <i>Balsamita</i> L.	III. 266	— <i>spathulatum</i> Gaud.	III. 298
— <i>corymbosum</i> L.	III. 268	— <i>Wankelii</i> Reichardt.	III. 302
— <i>inodorum</i> L.	III. 270	<i>Cistaceae</i> Dunal.	II. 365
— — <i>ambiguum</i> Aschers. et Gr.	III. 271	<i>Clematis</i> L.	II. 143
— — — <i>Rchb.</i> III. 271 n	IV. 151	— <i>recta</i> L.	II. —
— <i>Leucanthemum</i> L.	III. 265	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	III. 82
— — <i>γ. atratum</i> Koch.	III. 266	<i>Cnicus eriophorum</i> Scop.	III. 298
— — <i>α. auriculatum</i> Peterm.	III. —	— <i>heterophyllum</i> Willd.	III. 301
— — <i>β. hispidum</i> Boenagh.	III. —	— <i>lanceolatus</i> L.	III. 297
— <i>montanum</i> L.	III. 265	— <i>oleraceum</i> L.	III. 299
— <i>silvestre</i> Mart.	III. 266	— <i>palustris</i> Willd.	III. 303
— <i>vulgare</i> Bernh.	III. 267	— <i>ruthenicus</i> Henn.	III. 304
— — <i>α. crispa</i> (Mart.)	III. 268	— <i>serruloides</i> Mart.	III. 302
— — <i>β. tenuifolia</i> [Maxim.]	III. —	<i>Cnidium</i> Cuss.	II. 408
<i>Chrysosplenium</i> L.	II. 218	— <i>Silaus</i> Spreng.	II. 409
— <i>alternifolium</i> L.	II. 219	— <i>venosum</i> (Hoffm.) Koch. II. 408 n	IV. 136
<i>Cicer Lens</i> Willd.	III. 315	<i>Cochlearia</i> L.	II. 202
<i>Cichorium</i> L.	III. 318	— <i>Armoracia</i> L. II. 202 n	IV. 86
— <i>Endivia</i> L.	III. 319	— <i>officinalis</i> L.	II. 202
— <i>Intybus</i> L.	III. 318	<i>Coeloglossum</i> Hartm.	I. 260
<i>Cicuta</i> L.	II. 398	— <i>viride</i> Hartm. I. 260 n	IV. 48
— <i>tenuifolia</i> Froel.	II. 399	— — <i>α. bracteata</i> Rchb. fil.	II. 261
— <i>virosa</i> L.	II. 398	— — <i>α. bracteatum</i> Richter.	IV. 48
— — <i>α. angustifolia</i> Kit.	II. 399	<i>Colchicaceae</i> DC.	I. 230
— — <i>β. tenuifolia</i> Koch.	II. —	<i>Comarum</i> L.	II. 250
<i>Cineraria palustris</i> L.	III. 280	— <i>palustre</i> L. II. 250 n	IV. 107
<i>Circaea</i> L.	II. 387	<i>Compositae</i> Vail.	III. 230
— <i>alpina</i> L. II. 388 n	IV. 135	<i>Conioselinum</i> Fisch.	II. 410
— <i>lutetiana</i> L. II. 387 n	IV. —	— <i>Fischeri</i> Wimm. et Grab.	II. —
— <i>pubescens</i> Mart.	II. 387	— <i>ingricum</i> Fisch.	II. —
<i>Cirsium</i> Hall.	III. 296	— <i>tataricum</i> Fisch.	II. —
— <i>arvense</i> (L.) Scop.	III. 304	<i>Conium</i> L.	II. 427
— — <i>α. commune</i> GB.	III. 305	— <i>maculatum</i> L.	II. —
— — — <i>b. ruderale</i> GB.	III. —	<i>Conringia</i> (Heist.) Link.	IV. 85
— — — <i>sf. horridum</i> W.	III. —	— <i>orientalis</i> (L.) Andrzej.	IV. —
— — — — <i>et Gr.</i>	III. —	<i>Convallaria</i> L.	I. 244
— — — — <i>sf. mite</i> W. et Gr.	III. —	— <i>bifolia</i> L.	I. 242
— — — — <i>a. setosum</i> GB.	III. —	— <i>majalis</i> L. I. 244 n	IV. 40
— — — <i>α. mite</i> Wimm. et Grab.	III. 304	— — <i>α. rosea</i> Rchb.	IV. —
— — — <i>β. obtusifolium</i> GB.	III. 305	— <i>multiflora</i> L.	I. 244
— — — — <i>b. subhorridum</i> GB.	III. —	— <i>Polygonatum</i> L.	I. 243
— — — — <i>a. subruderale</i> GB.	III. —	<i>Convolvulaceae</i> Juss.	III. 42
— — — <i>β. setosum</i> Ledb.	III. 304	<i>Convolvulus</i> L.	III. 44
— <i>ciliatum</i> MB.	III. 298	— <i>arvensis</i> L.	III. —
— <i>eriophorum</i> Scop.	III. —	— — <i>β. carneus</i> Mart.	III. —
— — <i>α. platyonichium</i> Wallr.	III. —	— — <i>α. cordifolius</i> Lasch.	III. 45
— <i>helenioides</i> All.	III. 301	— — <i>β. hastifolius</i> Lasch.	III. —
— — <i>β. heterophyllum</i> All.	III. —	— — <i>γ. vulgaris</i> Lindl.	III. 44
— — — <i>γ. pinnatipartitum</i> Kauffm.	III. —	— <i>sepium</i> L.	III. 43
— — — <i>α. typ.</i>	III. —	<i>Conyza squarrosa</i> L.	III. 251
— <i>heterophyllum</i> All.	III. —	<i>Coralliorrhiza</i> Hall.	I. 268
— — (L.) Hill.	III. —	— <i>innata</i> R. Br. I. 269 n	IV. 50
— — <i>β. incisum</i> DC.	III. —	<i>Coriandrum</i> L.	II. 428
— — <i>α. indivisum</i> DC.	III. —	— <i>sativum</i> L.	II. —
— <i>heterophyllum</i> × <i>palustre</i>	III. 302	<i>Corispermum</i> L.	II. 92
— <i>hybridum</i> Koch.	III. 300	— <i>canescens</i> Kit.	IV. 63
— <i>laeteum</i> Schleich.	III. —	— — <i>β. Marschallii</i> (Stev.) Beck.	IV. —
— <i>lanceolatum</i> (L.) Hill.	III. 297	— <i>hyssopifolium</i> Juss.	II. 93
— — Scop.	III. —	— — L.	IV. 63
— <i>oleraceum</i> (L.) Scop.	III. 299	— — <i>β. macropterum</i> Fenzl.	IV. —
— <i>oleraceum</i> × <i>palustre</i>	III. 300		

<i>Corispermum hyssopifolium</i> L. α .	IV.	63
— <i>intermedium</i> Schweigg. II. 93 n	IV.	—
— <i>Marschallii</i> Stev. II. 93 n	IV.	—
Cornaceae DC. II.	428	
<i>Cornus</i> L. II.	429	
— <i>alba</i> L. II. 429 n	IV.	137
— — <i>Wangenh.</i> , non L. II. 429 n	IV.	137
— β . fol. <i>argenteo-marginata</i>		
Hort. II.	430	
— α . fol. <i>aureo-marginata</i> Hort.	II.	—
— γ . fol. <i>tricoloribus</i> Hort. .	II.	—
— <i>sanguinea</i> L. II. 429 n	IV.	130
— <i>sibirica</i> Lodd. II.	436	
— <i>stolonifera</i> Michx. II.	429	
— <i>tatarica</i> Mill. II.	430	
<i>Coronilla</i> L. II.	306	
— <i>varia</i> L. II. 306 n	IV.	115
— δ . <i>alba</i> Pluskal. II.	416	
— α . <i>hirsuta</i> [Maxim.] II. 307 n	IV.	115
— β . <i>hirta</i> Boiss. II.	416	
— γ . <i>violacea</i> Briquet. . . .	IV.	—
<i>Cortusa</i> L. III.	29	
— <i>Matthioli</i> L. III.	30	
<i>Corydalis</i> Medik. II.	167	
— <i>Bulbosa</i> DC. II.	168	
— <i>bulbosa</i> Pers. II.	167	
— <i>cava</i> Schw. et Koert. . . .	II.	—
— <i>fabacea</i> Pers. IV.	82	
— <i>Halleri</i> Mart. II.	168	
— <i>intermedia</i> Merat. IV.	82	
— — <i>P. M. E.</i> IV.	—	
— <i>Marschalliana</i> Pers. . . .	II.	168
— <i>solida</i> (L.) Sm. II. 168 n	IV.	82
— <i>Tuberosa</i> DC. II.	167	
<i>Corylus</i> L. II.	45	
— <i>Avellana</i> L. II.	46	
<i>Cotoneaster</i> Medik. II.	271	
— <i>acutifolia</i> Turcz. II.	272	
— <i>Cotoneaster</i> Karst. II.	273	
— <i>integerrima</i> Medik. II.	—	
— <i>lucida</i> Schlecht. II.	272	
— <i>melanocarpa</i> Lodd. II.	—	
— <i>nigra</i> Wahlenb. II.	—	
— <i>tomentosa</i> Lindl. II.	—	
— <i>vulgaris</i> Lindl. II. 272 n	273	
Crassulaceae DC. II.	243	
<i>Crataegus</i> L. II.	273	
— <i>coccinea</i> L. II.	274	
— <i>crus galli</i> L. II.	—	
— <i>nigra</i> W. K. II.	276	
— <i>Oxyacantha</i> L. II.	275	
— <i>sanguinea</i> Pall. II. 275 n	IV.	108
— — α . <i>xanthocarpa</i> Regel. . .	II.	275
<i>Crepis</i> L. III.	336	
— <i>biennis</i> L. III.	337	
— — β . <i>lacera</i> Wimm. et Grab.	III.	338
— — α . <i>platyphylla</i> Wallr. . .	III.	—
— <i>paludosa</i> (L.) Moench. . .	III.	339
— <i>praemorsa</i> Tausch. III.	336	
— <i>sibirica</i> L. III.	340	
— <i>tectorum</i> L. III.	338	
— — γ . <i>gracilis</i> Wallr. . . .	III.	339
— — δ . <i>microcephala</i> Rupr. .	III.	—
— — β . <i>segetalis</i> Roth. . . .	III.	—
— — α . <i>typicum</i> Rupr. . . .	III.	—
Cruciferae Juss. I.	100	
<i>Cucubalus</i> L. II.	—	
— <i>baccifer</i> L. II. 99 n	IV.	—
— <i>Behen</i> L. II.	101	
— <i>Otites</i> Pall. II.	103	
— <i>pallidus</i> Mart. II.	101	
— <i>tataricus</i> L. II.	102	
— <i>viscosus</i> L. II.	107	
<i>Cucumis</i> L. III.	215	
— <i>sativa</i> L. III.	—	
<i>Cucurbita</i> L. III.	214	
— <i>Pepo</i> L. III.	—	
Cucurbitaceae Juss. III.	213	
Cupressineae Rich. I.	63	
<i>Cuscuta</i> L. III.	45	
— <i>epithymum</i> (L.) Murr. . .	IV.	138
— — α . <i>Trifolii</i> (Bab.) Neir. .	IV.	—
— <i>europaea</i> L. III. 45 n	IV.	139
— <i>lupuliformis</i> Krock. III. 45 n	IV.	—
— <i>major</i> Bauh. III.	45	
— <i>vulgaris</i> Pers. III.	—	
<i>Cymbidium cordatum</i> Lon. .	I.	267
— <i>Corallorhizon</i> Sw. I.	269	
<i>Cynanchum Vincetoxicum</i> L. .	III.	41
— — <i>R. Br. β. angustifolium</i>		
Kauffm. III.	42	
<i>Cynara</i> Vaill. III.	306	
— <i>Scolymus</i> L. III.	—	
<i>Cynoglossum</i> L. III.	50	
— <i>officinale</i> L. III.	51	
<i>Cynosurus</i> L. I.	150	
— <i>cristatus</i> L. I. 151 n	IV.	22
— <i>eruciformis</i> (Georgi). . . .	I.	108
Cyperaceae Juss. I.	166	
<i>Cyperus</i> L. I.	167	
— <i>fuscus</i> L. I.	—	
<i>Cypripedium</i> L. I.	250	
— <i>calceolus</i> L. I. 251 n	IV.	40
— <i>guttatum</i> Sw. I. 251 n	IV.	—
<i>Cystopteris</i> Bernh. I.	38	
— <i>fragilis</i> Bernh. I. 39 n	IV.	1
— — α . <i>dentata</i> Hook. . . .	I.	39
— — β . <i>pinnatipartita</i> Koch. .	I.	—
<i>Cytisus</i> L. II.	287	
— <i>biflorus</i> L'Herit. II.	—	
— <i>nigricans</i> L. II.	288	
— <i>ratisbonensis</i> Schaeffer. II. 287 n	IV.	110
— — <i>ssp. ruthenicus</i> (Wolosz.)	IV.	—
— <i>supinus</i> L. II.	287	
Dactylis L. I.	134	
— <i>glomerata</i> L. I. 134 n	IV.	18
— — α . <i>abbreviata</i> Drejer. . .	IV.	—
<i>Daphne</i> L. II.	377	
— <i>Mezerium</i> L. II.	—	
<i>Datura</i> L. III.	123	
— <i>Stramonium</i> L. III.	—	
<i>Daucus</i> L. II.	421	
— <i>Carota</i> L. II. 421 n	IV.	136
<i>Delphinium</i> L. II.	138	
— <i>Consolida</i> L. II. 138 n	IV.	73
— — β . <i>major</i> Beck. IV.	—	
— — α . <i>minor</i> Beck. IV.	—	
— — <i>var. typicum</i> Erdner. . .	IV.	—
— <i>elatum</i> L. II. 139 n	IV. 73, 74	

<i>Delphinium elatum</i> L. β . <i>cuneatum</i> . DC. II. 140 n IV. 74	<i>Drosera longifolia</i> α . <i>vulgaris</i> Koch. II. 212
— — α . <i>intermedium</i> DC. II. 139 n IV. —	— <i>obovata</i> Mert. et Koch. II. 212 n IV. 88
— <i>intermedium</i> Soland. II. 139	— <i>rotundifolia</i> L. II. 211
— <i>villsoum</i> Stev. IV. —	<i>Droseraceae</i> DC. II. —
— — β . <i>cuneatum</i> Stev. (sp.). . IV. —	
— α . <i>typicum</i> Huth. IV. —	
<i>Deschampsia</i> P.B. I. 129	<i>Echinochloa</i> Crus-galli P.B. . . . I. 105
— <i>caespitosa</i> P.B. I. 129 n IV. 14	— — <i>aristata</i> Rchb. I. 106
— — β . <i>altissima</i> Aschers. I. 130 n IV. —	<i>Echinops</i> L. III. 286
— — γ . <i>aurea</i> Wimm. et Grab. IV. —	— <i>sphaerocephalus</i> L. III. —
— — α . <i>genuina</i> Rchb. IV. —	<i>Echinosperrum</i> Lappula Lehm. . III. 50
— — ϵ . <i>parviflora</i> Richt. IV. 15	— — Swartz. III. —
— — δ . <i>varia</i> Wimm. et Grab. . IV. —	<i>Echium</i> L. III. 58
— <i>flexuosa</i> Trin. I. 129	— <i>vulgare</i> L. III. —
— — α . <i>Legeri</i> Richt. . I. 129 n IV. 14	<i>Elaeagnaceae</i> R. Br. II. 377
<i>Dianthus</i> L. II. 109	<i>Elaeagnus</i> L. II. 378
— <i>arenarius</i> L. II. 113	— <i>argenteus</i> Pursh. II. —
— <i>barbatus</i> L. II. 110	<i>Elatinaceae</i> Camb. II. 362
— <i>Borbasi</i> Vandas. II. 112	<i>Elatine</i> L. II. —
— <i>Carthusianorum</i> L. II. —	— <i>Alsinastrum</i> L. II. 365
— <i>collinus</i> W. K. II. 111 n IV. 66	— <i>callitrichoides</i> Rupr. II. 363
— — α . <i>silvaticus</i> Hoppe. II. 111	— <i>Hydropiper</i> L. II. 364
— — β . <i>subpaniculatus</i> Schur. . II. —	— — β . <i>intermedia</i> Seubert. II. —
— <i>deltoides</i> L. II. 112 n IV. 68	— — γ . <i>submersa</i> Seubert. II. —
— — α . <i>reptans</i> Mart. II. 113	— — α . <i>terrestris</i> Seubert. II. —
— — var. <i>serpyllifolius</i> Borb. . IV. 68	— <i>Schkuhriana</i> Hayne. II. —
— <i>polymorphus</i> MB. II. 112	— — 2. forma <i>intermedia</i> Seubert. II. —
— — β . <i>diutinus</i> Kit. II. —	— — 3. forma <i>submersa</i> Seubert. II. —
— <i>ruthenicus</i> Stev. II. 111	— — 1. forma <i>terrestris</i> Seubert. II. —
— <i>Segueri</i> Vill. II. 111 n IV. 67	— — <i>triandra</i> Schkuhr. II. 363
— — β . <i>asper</i> Schleich. IV. —	— — β . <i>intermedia</i> Seubert. II. —
— — var. <i>campestris</i> Pinz. II. 111	— — α . <i>terrestris</i> Seubert. II. —
— — δ . <i>collinus</i> W. K. (sp.) II. 111 n IV. 67	<i>Elaeocharis acicularis</i> R.Br. . . . I. 170
— — γ . <i>Fischeri</i> Spr. IV. —	— <i>ovata</i> R.Br. I. —
— — α . <i>silvaticus</i> Hoppe. IV. —	— <i>palustris</i> R.Br. I. 169
— — α . — Koch. II. 111	<i>Elodea</i> Rich. et Mchx. I. 90
— — <i>superbus</i> L. II. 113 n IV. 68	— <i>canadensis</i> Rich. et Mchx. . . . I. 90 n IV. 11
<i>Digitalis</i> L. III. 140	— — α . <i>latifolia</i> Aschers. et Gr. . I. 90
— <i>ambigua</i> Murr. III. —	<i>Elsholtzia</i> Willd. III. 69
— <i>ochroleuca</i> Jacq. III. —	— <i>cristata</i> Willd. III. —
<i>Digitaria</i> filiformis Koeler. . . . I. 105	— <i>Patrinii</i> (Lep.) Garcke. III. 69 n IV. 140
— <i>glabra</i> Roem. et Sch. I. —	<i>Elymus caninus</i> L. I. 159
<i>Digraphis arundinacea</i> Trin. . . . I. 101	<i>Epilobium</i> L. II. 381
<i>Dipsacaceae</i> Lindl. III. 210	— <i>angustifolium</i> L. II. 382 n IV. 131
<i>Donax borealis</i> Trin. I. 145	— — β . <i>albiflorum</i> Hausskn. II. 382
<i>Draba</i> L. II. 200	— — <i>latifolium</i> Hoffm. herb. II. —
— <i>lutea</i> DC. II. 201	— — α . <i>macrophyllum</i> Hausskn. . II. —
— — Gilib. II. —	— <i>collinum</i> Gmel. IV. 133
— — Mart. II. —	— <i>grandiflorum</i> Roth. II. 382
— <i>memoralis</i> Ehrh. II. —	— <i>hirsutum</i> L. II. 382 n IV. 131
— <i>nemorosa</i> L. II. —	— — <i>f. adenocaulon</i> Hausskn. . . . IV. —
— — α . <i>leiocarpa</i> Lindl. II. —	— — <i>g. grandiflorum</i> Stev. II. 382
— <i>repens</i> MB. II. 200 n IV. 86	— — β . <i>parviflorum</i> Stev. II. 383
— <i>verna</i> L. II. 201	— — β . <i>villosum</i> Hausskn. IV. 132
<i>Draceocephalum</i> L. III. 89	— — 1. <i>grandiflora</i> Hausskn. . . . IV. —
— <i>hyssopifolium</i> Mart. III. 90	— — — <i>adenocarpa</i> Hausskn. . . . IV. —
— <i>nutans</i> L. III. —	— — — 2. <i>parviflora</i> Hausskn. . . . IV. —
— <i>Ruyschiana</i> L. III. —	— — — <i>adenocarpa</i> Hausskn. . . . IV. —
— <i>thymiflora</i> L. III. —	— — α . <i>vulgaris</i> Hausskn. . . . IV. 131
<i>Drosera</i> L. II. 211	— — — 3. <i>albiflora</i> Hausskn. . . . IV. 132
— <i>anglica</i> Huds. II. 212	— — — 1. <i>grandiflora</i> Hausskn. . . . IV. —
— — β . <i>obovata</i> Koch. II. —	— — — <i>dolichocarpa</i> Hausskn. . . . IV. —
— — α . <i>vulgaris</i> Koch. II. —	— — — 2. <i>parviflora</i> Hausskn. . . . IV. —
— <i>longifolia</i> L. II. —	— <i>Hornemanni</i> Rchb. IV. 134
— — β . <i>obovata</i> Koch. II. —	

<i>Epilobium montanum</i> L.	II. 384, 385 n	IV. 132
— — <i>γ. apricum</i> Hausskn.		IV. —
— — <i>α. minor</i> Hausskn. II. 384 n		IV. —
— — <i>β. ramosum</i> Hausskn.		IV. —
— — <i>δ. umbrosum</i> Hausskn.		IV. —
— <i>palustre</i> L.	II. 385 n	IV. 134
— — <i>β. adenophorum</i> Hausskn. II. 386		
— — <i>α. monticolum</i> Hausskn.	II. —	
— <i>parviflorum</i> Schreb. II. 383 n		IV. 132
— — <i>α. umbrosum</i> Hausskn.	II. 384	
— <i>pubescens</i> Roth.	II. 382	
— <i>roseum</i> Schreb. II. 384, 385 n		IV. 135
— <i>spicatum</i> Lam.	II. 382	
— — Pers.	II. —	
— <i>strictum</i> Zinger.	II. 384	
— <i>tetragonum</i> L.	II. 385	
<i>Epipactis</i> Rich.	I. 264	
— <i>cordata</i> Schrank.	I. 267	
— <i>grandiflora</i> Gaud.	I. 263	
— <i>latifolia</i> All.	I. 264 n	IV. 48
— — <i>α. platyphylla</i> Irm.		IV. —
— — 2. <i>interrupta</i> Aschers.		
— et Gr.		IV. 49
— — 1. <i>typica</i> Aschers. et Gr.		IV. —
— — <i>varians</i> Crantz.	I. 264 n	IV. 48
— — Fleischm. et Reching.		IV. —
— — <i>β. viridans</i> Crantz. I. 264 n		IV. —
— — <i>β. viridiflora</i> Irm.		IV. —
— — 1. <i>interrupta</i> Aschers.		
— et Gr.		IV. 49
— <i>longifolia</i> Wettst.	I. 263	
— <i>Nidus avis</i> Crantz.	I. 266	
— <i>ovata</i> Crantz.	I. —	
— <i>pallens</i> Willd.	I. 263	
— <i>palustris</i> Crantz.	I. 265 n	IV. 49
— — <i>α. silvatica</i> Aschers. et Gr.		IV. —
— <i>sessilifolia</i> Peterm.		IV. 48
— <i>varians</i> Crantz.		IV. —
<i>Epipogon</i> Gmel.	I. 262	
— <i>aphyllus</i> Sw.	I. —	
— <i>Gmelini</i> Rich.	I. —	
<i>Equisetaceae</i> DC.	I. 49	
<i>Equisetum</i> L.	I. —	
— <i>arvense</i> L.	I. 51 n	IV. 3
— — <i>α. agrestis</i> Klinge.		IV. —
— — 1. <i>compacta</i> Klinge.		IV. —
— — <i>β. borealis</i> Milde.		IV. —
— — <i>γ. ramulosum</i> Rupr.		IV. —
— <i>helecharis</i> Ehrh.	I. 52	
— — <i>β. fluviatilis</i> L.	I. 53	
— — <i>brachycladon</i> Doell.	I. —	
— — <i>leptocladon</i> Doell.	I. —	
— — <i>polystachyum</i> Lejeune.	I. —	
— — <i>α. limosum</i> L.	I. —	
— <i>hiemale</i> L.	I. —	
— <i>limosum</i> L. <i>fluviatile</i> L.	I. —	
— — <i>Linnaeanum</i> Doell.	I. —	
— <i>Linnaeanum</i> Doell.	I. —	
— <i>palustre</i> L.	I. 52 n	IV. 3
— — 1. <i>fallax</i> Milde.		IV. 4
— — 1. <i>polystachyum</i> Weigel.		
— — — I. 52 n		IV. —
— — — 2. <i>corymbosum</i> Milde.		IV. —
— — — 1. <i>ramosum</i> Milde.		IV. —
— — — 1. <i>nudum</i> Duby.		IV. 3
— <i>pratense</i> Ehrh.	I. 51	
— <i>silvaticum</i> L.	I. 50	

<i>Equisetum silvaticum</i> L. forma		
— <i>capillare</i> Hoffm.	I. 50	
— <i>umbrosum</i> Mey.	I. 54	
— <i>variegatum</i> Schleich.	I. 54	
<i>Eragrostis</i> Host.	IV. 18	
— <i>pilosa</i> PB.	IV. 19	
— — <i>α. abessinica</i> Körnicke.		IV. —
<i>Erica vulgaris</i> L.	III. 20	
<i>Ericaceae</i> DC.	III. 12	
<i>Erigeron</i> L.	III. 242	
— <i>acer</i> L.	III. 243	
— — <i>γ. brachyglossus</i> DC.		III. 244
— — <i>β. droebachiensis</i> O.F.		
— — Müller.	III. —	
— — <i>α. typicus</i> GB.		III. 243
— <i>acre</i> L.	III. —	
— <i>acris</i> L.	III. —	
— <i>canadense</i> L.	III. 244	
— <i>canadensis</i> L.	III. —	
— <i>heterophyllus</i> Mühlenb.		
— — III. 242 n		IV. 150
<i>Eriophorum</i> L.	I. 175	
— <i>angustifolium</i> Roth.	I. 176 n	IV. 26
— <i>gracile</i> Koch.	I. 177 n	IV. 26
— <i>latifolium</i> Hoppe.	I. 177 n	IV. —
— <i>polystachyon</i> <i>α. L.</i>		I. 176
— — <i>β. L.</i>		I. 177
— <i>triquetrum</i> Hoppe.	I. —	
— <i>vaginatum</i> L.	I. 175	
<i>Erodium</i> L'Herit.	II. 331	
— <i>cicutarium</i> (L.) L'Herit.	II. —	
<i>Erym L.</i>	II. 308	
— <i>hirsutum</i> L.	II. 308 n	IV. 116
— — <i>α. fissum</i> G. Froel. II. 308 n		IV. —
— <i>lens</i> L.	II. 315	
— <i>tetraspermum</i> L.	II. 308 n	IV. 116
<i>Eryngium</i> L.	II. 397	
— <i>planum</i> L.	II. —	
<i>Erysimum</i> L.	II. 191	
— <i>Alliaria</i> L.	II. —	
— <i>Barbarea</i> L.	II. 179	
— <i>cheiranthoides</i> L.	II. 192 n	IV. 85
— — <i>α. nana</i> W. Zinger. II. 192 n		IV. —
— — <i>β. umbrosum</i> Choroschkov.		
— — II. 192 n		IV. —
— — Rouy et Fouc.		IV. —
— <i>hieraciifolium</i> L.	II. 192 n	IV. —
— — <i>β. Marshallianum</i> (Andrzej.)		
— — Kauffm.	II. 192	
— — <i>α. strictum</i> Fl. Wett.		II. 193
— — <i>β. virgatum</i> Roth.		II. —
— <i>odoratum</i> Ehrh.	II. 193 n	IV. 85
— <i>officinale</i> L.	II. 187	
— <i>strictum</i> Gaertn.	II. 192	
<i>Erythraea Centaurium</i> Pers.		
— — III. 39 n		IV. 138
— <i>pulchella</i> Fries.	III. 39	
<i>Euclidium</i> R.Br.	IV. 88	
— <i>syriacum</i> R.Br.	IV. —	
<i>Eupatorium</i> L.	III. 236	
— <i>cannabinum</i> L.	III. 237	
<i>Euphorbia</i> L.	II. 337	
— <i>cyparissias</i> L.	II. 340	
— <i>Esula</i> L.	II. 339	
— — <i>γ. Cyparissias</i> L.		II. 340
— — <i>b. latifolia</i> Mart.		II. 339
— — <i>α. typica</i> Petunn.		II. —
— — <i>β. virgata</i> W. K. (sp.).		II. 340

<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	II. 340 n IV. 124	<i>Festuca rubra</i> L.	I. 147
— <i>palustris</i> L.	II. 338 n 339	— <i>arenaria</i> Osbeck.	I. 148
— <i>Peplus</i> L.	II. 341	— <i>β. barbata</i> Hackel.	I. —
— <i>procera</i> MB.	II. 338	— <i>γ. planifolia</i> Trautv.	I. —
— <i>α. leiocarpa</i> Ledeb.	II. —	— <i>α. vulgaris</i> Gaud.	I. —
— <i>villosa</i> W. K.	II. —	— <i>silvatica</i> Vill.	I. 150
— <i>virgata</i> W. K.	II. 339 n 340	<i>Ficaria ranunculoides</i> Roth.	II. 163
— <i>β. latifolia</i> Kauffm.	II. 339	— <i>verna</i> Huds.	II. —
Euphorbiaceae Klotzsch et Garcke.	II. 336	<i>Filago</i> L.	III. 244
<i>Euphrasia</i> L.	III. 495	— <i>arvensis</i> L.	III. 245
— <i>brevipila</i> Burnat et Gremli.	III. 162	<i>Filipendula</i> L.	II. 241
— <i>brevipila</i> Burn. et Gr. × <i>stricta</i>		— <i>hexapetala</i> Gilib.	II. 242 n IV. 96
<i>Host.</i>	IV. 144	— <i>Ulmaria</i> Maxim.	II. 241 n IV. 96
— <i>curta</i> Fries.	III. 163	— <i>α. denudata</i> Beck.	II. 242 n IV. —
— <i>α. glabrescens</i> Wettst.	III. 164	— <i>var.</i> — Hayne.	IV. —
— <i>curta</i> × <i>brevipila</i>	III. —	— <i>α.</i> — Koch.	II. 242
— <i>fennica</i> Kihlm.	IV. 144	— <i>β. discolor</i> Koch.	II. —
— <i>hirtella</i> Jord.	IV. 145	— <i>δ. glauca</i> (Schultz) Aschers.	
— <i>montana</i> Jord.	III. 165	<i>et Gr.</i>	IV. 96
— <i>Murbeckii</i> Wettst.	III. 164	— <i>β. pubescens</i> Beck.	IV. —
— <i>memorosa</i> Pers.	III. 161	— <i>γ. subdenudata</i> Fritsch.	IV. —
— <i>Odontites</i> L.	III. 158	— <i>β. tomentosa</i> Maxim.	II. 242 n IV. —
— <i>α. serotina</i> Kauffm.	III. 159	<i>Fragaria</i> L.	II. 248 n IV. 97
— <i>officinalis</i> L.	III. 164	— <i>collina</i> Ehrh.	II. 250
— <i>β. memorosa</i> Pers.	III. 161	— <i>elatio</i> Ehrh.	II. 249
— <i>α. pratensis</i> Koch.	III. 164	— <i>moschata</i> Duchesne.	II. —
— <i>praebrevipila</i> Chitrowo.	III. 165	— <i>vesca</i> L.	II. 248 n IV. 98
— <i>praecurta</i> Chitrowo.	III. —	— <i>α. crenata</i> Schur.	II. 249
— <i>praerostkoviana</i> Chitrowo.	III. —	— <i>β. eflagellis</i> Ser.	IV. 98
— <i>Reuteri</i> Wettst.	III. 162 n IV. 143	— <i>silvestris</i> Mart.	II. 248
— <i>Rostkoviana</i> Hayne.	III. 164	— <i>viridis</i> Duchesne.	II. 250 n IV. 98
— <i>stricta</i> Host.	III. 161 n IV. 143	— <i>α. neglecta</i> Lindm. (sp.).	IV. —
— <i>α. pilifera</i> Kihlm.	IV. —	— <i>viridis</i> × <i>moschata</i>	IV. —
— <i>stricta</i> × <i>curta</i>	III. 162	<i>Frangula</i> Tourn.	II. 353
— <i>tatarica</i> Fisch.	III. 160	— <i>Alnus</i> Mill.	II. —
— <i>tenuis</i> Bremer.	III. 163	— <i>vulgaris</i> Rchb.	II. —
Evonymus L.	II. 345	<i>Fraxinus</i> L.	III. 31
— <i>europaeus</i> L.	II. —	— <i>americana</i> L.	III. 32
— <i>verrucosus</i> L.	II. 346	— <i>excelsior</i> L.	III. 31
— — Scop.	II. —	— <i>α. monophylla</i> Desf.	III. 32
		— <i>β. simplicifolia</i> Mart.	III. —
Falcaria Rivin.	IV. 135	<i>Fritillaria</i> L.	I. 239
— <i>Rivini</i> Host.	IV. 136	— <i>ruthenica</i> Wickstr.	I. 239 n IV. 40
Fagaceae Doell.	II. 52	<i>Fumaria</i> L.	II. 169
<i>Fagopyrum</i> Gaertn.	II. 80	— <i>bulbosa</i> α. L.	II. 167
— <i>esculentum</i> Moench.	II. —	— <i>γ. L.</i>	II. 168
<i>Farsetia incana</i> R. Br.	II. 199	— <i>Halleri</i> Willd.	II. —
<i>Festuca</i> L.	I. 146	— <i>officinalis</i> L.	II. 169
— <i>borealis</i> M. et K.	I. 145	— <i>solida</i> Hoffm.	II. 168
— <i>duriuscula</i> L.	I. 147	Fumariaceae DC.	II. 167
— <i>elatio</i> L.	I. 148		
— <i>fluitans</i> L.	I. 143	Gagea Salisb.	I. 232
— <i>gigantea</i> Vill.	I. 149	— <i>erubescens</i> (Bess.) Schult.	I. 233 n IV. 39
— <i>inermis</i> DC.	I. 153	— <i>lutea</i> Schult.	I. 233 n IV. —
— <i>ovina</i> L.	I. 147	— <i>minima</i> (L.) Ker Gawler.	IV. —
— <i>α. genuina</i> Hackel.	I. —	— — Schult.	I. 234 n IV. —
— — Gren. et Godr. f. <i>mutica</i>		— <i>pusilla</i> Schult.	I. 233
<i>Choroschkov.</i>	IV. 22	— <i>silvatica</i> (Pers.) Loud.	IV. 39
— <i>β. duriuscula</i> (L.) Koch.	I. 147	<i>Galatella punctata</i> Lindl.	III. 240
— <i>pinnata</i> Moench.	I. 157	<i>Galeobdolon luteum</i> Huds.	III. 95
— — Schrad.	I. —	— — Smith.	III. —
— <i>pratensis</i> Huds.	I. 148	— <i>vulgaris</i> Pers.	III. —
— <i>β. subspicata</i> Aschers. et Gr.	I. 149	<i>Galeopsis</i> L.	III. 96
— <i>α. typica</i> Hackel.	I. —		
— <i>pseudololiacea</i> Fries.	I. —		

<i>Galeopsis bifida</i> Boenng.	III. 100	<i>Galium spurium</i> L. β . <i>Vaillantii</i>	
— <i>cannabina</i> Roth.	III. 99	(DC.) Gren. et Godr.	III. 191
— <i>Galeobdolon</i> L.	III. 95	— <i>trifidum</i> L.	III. 193
— <i>Ladanium</i> L.	III. 96	— <i>triflorum</i> Michx.	III. 195
— γ . <i>canescens</i> Koch.	III. 97	— <i>uliginosum</i> L.	III. 191
— α . <i>intermedia</i> (Vill.) Briq.	III. —	— <i>verum</i> L.	III. 196
— <i>latifolia</i> Hoffm.	III. —	— β . <i>lasiocarpum</i> Ledeb.	III. —
— <i>Pernhofferi</i> Wettst.	III. 100	— β . <i>leiocarpum</i> Ledeb.	III. 197
— <i>speciosa</i> Mill.	III. 99	— <i>b. luteum</i> Mart.	III. 196
— α . <i>laeta</i> Porsch.	III. 100	— α . <i>trachycarpum</i> DC.	III. —
— β . <i>obscura</i> Porsch.	III. —	<i>Genista</i> L.	II. 286
— <i>Tetrahit</i> L.	III. 97	— <i>tinctoria</i> L.	II. 287 n IV. 109
— α . <i>arvensis</i> Schlecht.	III. 98	— β . <i>elata</i> Aschers. et Gr.	IV. 110
— γ . <i>Reichenbachii</i> Rapin.	III. 99	— — <i>typica</i> Aschers. et Gr.	IV. —
— β . <i>silvestris</i> Schlecht.	III. 98	— α . <i>vulgaris</i> Spach.	IV. 109
— <i>versicolor</i> Curt.	III. 99	— — 1. <i>genuina</i> (Pocorny)	
<i>Galium</i> L.	III. 189	Aschers. et Gr.	IV. —
— <i>Aparine</i> L.	III. 190	— — 2. <i>latifolia</i> (auct. pl.)	
— α . <i>echinospermon</i> Wallr.	III. 191	Aschers. et Gr.	IV. 110
— β . <i>leiospermon</i> Wallr.	III. 190	<i>Gentiana</i> L.	III. 35
— α . <i>typicum</i> Kauffm.	III. —	— <i>Amarella</i> L.	III. 37
— β . <i>Vaillantii</i> Koch.	III. 191	— α . <i>axillaris</i> Rehb.	III. 38
— <i>articulatum</i> Lam.	III. 199	— γ . <i>livonica</i> Esch.	III. 37
— <i>boreale</i> L.	III. 198	— γ . <i>pratensis</i> Froel.	III. 38
— β . <i>hyssopifolium</i> (Hoffm.)		— <i>axillaris</i> F. W. Schmidt. III. 38 n	IV. 138
DC., non Kauffm.	III. 199	— <i>campestris</i> L.	III. 37
— — Hoffm.	III. 198	— <i>Centaurium</i> L.	III. 39
— — Kauffm.	III. —	— <i>cruciata</i> L.	III. 35
— β . <i>Pseudo-rubioides</i> Schur.	III. —	— <i>lingulata</i> C. A. Agardh. III. 37 n	IV. 138
— α . <i>scabrum</i> DC.	III. 199	— <i>Pneumonanthe</i> L.	III. 36 n IV. —
— α . <i>typicum</i> Kauffm.	III. 198	— <i>spatulata</i> Pinz.	III. 37
— <i>boreale</i> \times <i>rubioides</i> Pinz.	III. 197	<i>Gentianaceae</i> Juss.	III. 33
— <i>geniculatum</i> Roem. et Sch.	III. 199	<i>Geraniaceae</i> DC.	II. 322
— <i>glaucum</i> Jacq.	III. 186	<i>Geranium</i> L.	II. —
— — Mart.	III. —	— <i>bohemicum</i> L.	II. 328
— — L.	III. —	— <i>cicutarium</i> L.	II. 331
— <i>humifusum</i> MB.	III. 188	— <i>molle</i> L.	II. 329
— <i>hyssopifolium</i> Hoffm.	III. 198	— <i>palustre</i> L.	II. 325
— <i>infestum</i> W. K.	III. 190	— α . <i>memorosum</i> Brügg.	II. —
— <i>Mollugo</i> L.	III. 195	— β . <i>trifidum</i> Litw. II. 326 n	IV. 120
— β . <i>angustifolium</i> Leyss.	III. —	— <i>pratense</i> L.	II. 323
— γ . <i>insubricum</i> Rehb.	III. 195	— <i>pusillum</i> L.	II. 328 n IV. 121
— α . <i>latifolium</i> Leyss.	III. —	— <i>pyrenaicum</i> L.	II. 327
— β . <i>ochroleucum</i> Fries.	III. —	— <i>Robertianum</i> L.	II. 330
— — Kauffm.	III. —	— α . <i>mosquense</i> Ledeb.	II. —
— <i>b. pubescens</i> Mart.	III. —	— <i>nostrum</i> Goldb.	II. —
— <i>Mollugo</i> \times <i>verum</i>	III. 197	— <i>rotundifolium</i> L.	II. 329
— <i>palustre</i> L.	III. 192	— <i>sanguineum</i> L.	II. 326 n IV. 120
— β . <i>maximum</i> (Moris) H. Br.	III. —	— α . <i>latipartitum</i> Petunn.	II. 327 n IV. 121
— — var. <i>tenerifrons</i> Cho-		— β . <i>majus</i> [Maxim.]	II. 326
roschkov.	III. 193	— <i>sibiricum</i> L.	II. 327 n IV. 121
— — var. <i>umbrosum</i> Aschers.	III. —	— <i>silvaticum</i> L.	II. 324
— α . <i>typicum</i> GB.	III. 192	— — var. <i>fl. minor pallid.</i> Gold.	II. —
— — var. <i>latifolium</i> Lange.	III. —	— α . <i>parviflorum</i> Knaf.	II. —
— <i>parisiense</i> L.	III. 191	<i>Geum</i> L.	II. 268
— β . <i>leiocarpum</i> Tausch.	III. —	— <i>aleppicum</i> Jacq.	II. 271
— α . <i>trichocarpum</i> Tausch.	III. —	— <i>hybridum</i> Wulf.	II. 269
— <i>rubioides</i> L.	III. 197 n IV. 149	— <i>intermedium</i> Ehrh.	II. 270 n IV. 108
— α . <i>lasiocarpum</i> Lindm.	IV. —	— <i>rivale</i> L.	II. 269 n IV. 107
— β . <i>leiocarpum</i> Choroschkov.	III. 198	— β . <i>lividum</i> Chitrowo.	IV. —
— — Lindm.	IV. 149	— α . <i>minus</i> DC.	IV. —
— α . <i>trichocarpum</i> Choroschk.	III. 198	— <i>rivale</i> \times <i>urbanum</i>	II. 270
— <i>ruthenicum</i> Willd.	III. 196	— <i>strictum</i> Ait.	II. 271
— <i>Schultesii</i> Vest.	III. 194	— <i>urbanum</i> L.	II. 269
— <i>silvaticum</i> L.	III. —	<i>Githago segetum</i> Desf.	II. 108
— <i>spurium</i> L.	III. 190	<i>Gladiolus</i> L.	I. 247
— α . <i>typicum</i> GB.	III. —		

<i>Gladiolus communis</i> L.	I. 248	<i>Helicoharis palustris</i> α . <i>cupalustris</i> Lindb. fil.(sp.).	I. 169
— <i>imbricatus</i> L.	I. 247 n IV. 40	— — — — — forma <i>arenaria</i> Sonder.	I. —
— <i>tenuis</i> MB.	I. 248	— — — — — forma <i>nullisecta</i>	I. —
<i>Glechoma</i> L.	III. 89	— — — — — forma <i>typica</i>	I. —
— <i>grandiflora</i> Mart.	III. —	— — — — — β . <i>mamillatus</i> Lindb. fil. (sp.).	I. 175
— <i>hederacea</i> L.	III. —	<i>Helianthemum</i> Mill.	II. 360
— — α . <i>glabriuscula</i> Neilr.	III. —	— <i>Chamaecistus</i> Mill.	II. —
— — β . <i>major</i> Gaud.	III. —	— <i>Helianthemum</i> (L.) Karst.	II. —
<i>Glyceria</i> R. Br.	I. 143 n IV. 20	— <i>vulgare</i> Gaertn.	II. —
— <i>aquatica</i> Presl.	I. 143	<i>Helianthus</i> L.	III. 255
— — — — — Wahlb.	I. 144	— <i>annuus</i> L.	III. 256
— — α . <i>arundinacea</i> (MB.) Aschers.	I. —	— <i>tuberosus</i> L.	III. —
— <i>distans</i> Wahlb.	I. 145	<i>Helichrysum</i> Gaertn.	III. 248
— <i>fluitans</i> R. Br.	I. 143 n IV. 21	— <i>arenarium</i> DC.	III. 248 n IV. 150
— <i>fluitans</i> \times <i>plicata</i>	IV. 22	— — — — — (L.) Moench.	III. 248
— <i>nemoralis</i> Uechtr. et Körnicke.	IV. 21	<i>Helodea Canadensis</i> Aschers. et Gr.	I. 90
— <i>plicata</i> Fries.	IV. —	<i>Hepatica</i> Gilib.	II. 147
— — α . <i>nemoralis</i> Uechtr.	IV. —	— <i>triloba</i> Chaix.	II. —
— — β . <i>versicolor</i> Hausskn.	IV. 22	— — — — — Gilib.	II. —
— <i>spectabilis</i> M. et K.	I. 144	<i>Heracleum</i> L.	II. 418
— — — — — gracilis Kauffm.	I. —	— <i>angustifolium</i> L.	II. 419
<i>Gnaphalium</i> L.	III. 246	— <i>flavescens</i> Bess.	II. —
— <i>arenarium</i> L.	III. 248	— <i>longifolium</i> Mart.	II. —
— <i>arvense</i> Willd.	III. 245	— <i>Panaces</i> L.	II. —
— <i>dioicum</i> L.	III. —	— <i>sibiricum</i> L.	II. 418 n
— <i>femineum</i> Mart.	III. —	— — — — — angustifolium Ledb.	II. —
— <i>masculum</i> Mart.	III. —	— — — — — β . <i>longifolium</i> Koch.	II. —
— <i>silvaticum</i> L.	III. 246	— — — — — α . <i>typicum</i> Kauffm.	II. —
— — — — — β . <i>abbreviatum</i> Kauffm.	III. 247	— <i>Sphondylium</i> L.	II. —
— — — — — γ . <i>stramenticum</i> GB.	III. —	— — — — — β . <i>flavescens</i> Mart.	II. —
— — — — — α . <i>virgatum</i> Kit.	III. —	<i>Hernium</i> R. Br.	I. 260
— — — — — <i>f. umbrosa</i> Kit.	III. —	— <i>Monorchis</i> R. Br.	I. 261 n IV. 48
— <i>uliginosum</i> L.	III. —	<i>Herniaria</i> L.	II. 130
— — — — — β . <i>nudum</i> Hoffm.	III. —	— <i>glabra</i> L.	II. 130 n IV. 72
— — — — — α . <i>pseudopilulare</i> Scholz.	III. 248	— — — — — β . <i>ciliata</i> (Bab.) Wirtg.	IV. —
<i>Goodyera</i> R. Br.	I. 268	— — — — — α . <i>typica</i> Beck.	IV. —
— <i>repens</i> R. Br.	I. —	<i>Hesperis</i> L.	II. 185
<i>Gramineae</i> Juss.	I. 92	— <i>matronalis</i> L.	II. —
<i>Graphephorum arundinaceum</i> Aschers.	I. 145	<i>Hieracium</i>	III. 341
<i>Gratiola</i> L.	III. 138	— <i>acrocormum</i> N. P.	III. 361
— <i>officinalis</i> L.	III. 138 n IV. 142	— <i>acutifolium</i> Griseb.	III. 358
<i>Guttiferae</i> Endl.	II. 360	— <i>apatelium</i> N. P.	III. 360
<i>Gymnadenia</i> R. Br.	I. 257	— <i>apateloides</i> Zahn.	III. —
— <i>conopea</i> R. Br.	I. 257 n IV. 47	— <i>arvicola</i> N. P.	III. 359
— — — — — β . <i>angustifolia</i> (Ilse) Aschers. et Gr.	IV. —	— <i>Auricula</i> L.	III. 349 n 357
— — — — — <i>f. crenulata</i> GB.	IV. —	— — — — — Lam. et DC.	III. 349
— — — — — γ . <i>ornithis</i> Spr.	IV. —	— <i>Auricula</i> \times <i>Pilosella</i>	III. 350
— — — — — α . <i>typica</i> GB.	IV. —	— <i>auriculaeformis</i> Fries.	III. 351
— <i>cucullata</i> Rich.	I. 258	— <i>auriculaeformis</i> Lange.	III. 363
— <i>odoratissima</i> Rich.	I. 257 n IV. 47	— <i>brachiatum</i> Bertol.	III. 358
<i>Gypsophila</i> L.	II. 108	— <i>calodon</i> Tausch.	III. 362
— <i> muralis</i> L.	II. 109 n IV. 66	— <i>canum</i> N. P.	III. 354
— — — — — α . <i>serotina</i> Hayne.	IV. —	— <i>collinum</i> Gochnat.	III. 351
— <i>paniculata</i> L.	II. 108 n IV. 65	— <i>collinum</i> \times <i>Pilosella</i>	III. —
<i>Habenaria viridis</i> R. Br.	I. 260	— <i>cymigerum</i> Rehb.	III. 353
<i>Halorrhagidaceae</i> R. Br.	II. 389	— <i>cymosum</i> L.	III. —
<i>Hedera quinquefolia</i> L.	II. 354	— <i>cymosum</i> \times <i>Auricula</i> N. P.	III. 355
<i>Hedysarum Onobrychis</i> L.	II. 307	— <i>cymosum</i> \times <i>collinum</i> N. P.	III. —
<i>Helicoharis</i> R. Br.	I. 168	— <i>cymosum</i> \times <i>Pilosella</i> F. Schultz.	III. 354
— <i>acicularis</i> R. Br.	I. 170 n IV. 25	— <i>cymosum</i> \times <i>pratense</i>	III. 355
— — — — — α . <i>filiformis</i> Sant.	IV. —	— <i>dubium</i> L.	III. 349, 351 n 357
— <i>ovata</i> R. Br.	I. 170 n IV. —	— <i>echioides</i> Lumn.	III. 356
— <i>palustris</i> R. Br.	I. 169	— <i>echioides</i> \times <i>cymosum</i> N. P.	III. —
		— <i>fallax</i> Willd.	III. 356 n 359
		— <i>flagellare</i> Willd.	III. 351
		— <i>flagellare</i> \times <i>Auricula</i>	III. 352
		— <i>flagellariforme</i> G. Schneid.	III. —

- Hieracium florentinum* All. III. 358
 — *florentinum* × *Auricula* × *collinum* N. P. III. 360
 — *florentinum* × *Auricula* × *Pilosella* N. P. III. 359
 — *florentinum* × *collinum* N. P. III. —
 — *florentinum* × *cymosum* N. P. III. 361
 — *florentinum* × *echioides* N. P. III. 362
 — *florentinum* × *pratense* III. 359
 — *florent. vel magyricum* × *Pilosella* N. P. III. 358
 — *floribundum* Wimm. et Grab. III. 360
 — *floribundum* × *cymosum* N. P. III. 361
 — *floribundum* × *Pilosella* N. P. III. 360
 — *furcatum* Hoppe. III. 351 n 352
 — *glomeratum* Fries. III. 355
 — *incanum* Poll. III. 323
 — *Knafii* Cel. III. 366
 — *laevigatum* Willd. III. 365 n IV. 151
 — *laevigatum* × *vulgatum* Zahn. III. 366
 — *leucocephalum* Rupr. III. 356
 — *magyricum* N. P. III. 357
 — *magyricum* × *cymosum* N. P. III. 363
 — *magyricum* × *echioides* N. P. III. —
 — *murorum* L. III. 364
 — *Nestleri* Vill. III. 353
 — — *α. hirsutum* Koch. III. —
 — — *β. Vaillantii* Koch. III. —
 — *paludosum* L. III. 339
 — *pannonicum* N. P. III. 363
 — *paragolum* N. P. III. 359
 — *Pilosella* L. III. 349
 — — *α. farinaceum* Pinz. III. —
 — *piloselliflorum* N. P. III. 351
 — *piloselloides* Vill. III. 357
 — *praealtum* Vill. III. —
 — — *ssp. Bauhini* Griseb. III. —
 — — *ssp. florentinum* Koch. III. 358
 — *praealtum* Koch *α. epipsilum* Kauffm. III. 357
 — — *β. fallax* DC. III. —
 — *praealto* × *Nestleri* Kauffm. III. 359
 — *praemorsum* L. III. 336
 — *pratense* Tausch. III. 350
 — — *γ. glabriusculum* Kauffm. III. 360
 — — *δ. setosum* Kauffm. III. 359
 — — *β. sylvicolium* Fries. III. 351
 — *pratense* × *Auricula*. III. 352
 — *pratense* × *Pilosella*. III. 351
 — *Schultesii* F. Schultz. III. 350
 — *sciadophorum* N. P. III. 355
 — *sibiricum* Lam. III. 340
 — *silvaticum* L. III. 364 n IV. 151
 — *spathophyllum* N. P. III. 352
 — *stoloniflorum* W. K. III. —
 — *subaudum* L. III. 367
 — *umbellatum* L. III. —
 — — *α. genuinum* Griseb. III. —
 — — *β. linariifolium* Wallr. III. —
 — — *γ. filifolium* Fries. III. —
 — — *stenophyllum* Wimm. et Grab. III. —
 — *umbelliferum* N. P. III. 363
 — *Vaillantii* Koch. III. 360 n —
 — *vulgatum* Fries. III. 364
 — — *ssp. arcuatidens* Zahn. III. 365
- Hieracium vulgatum* ssp. *Wischniakowii* Petunn. et Zahn. III. 365 n IV. 151
 — *Zizianum* Tausch. III. 361
Hierochloa Gmel. I. 102
 — *borealis* Roem. et Sch. I. 103
 — *odorata* Wahlb. I. —
Hippion axillaris Schmidt. III. 38
Hippocastanaceae DC. II. 349
Hippophae rhamnoides L. II. 378
Hippophaes L. II. —
 — *rhamnoides* L. II. —
Hippuris L. II. 390
 — *minor* Mart. II. 391
 — *vulgaris* L. II. —
 — — *var. gracilior* Goldb. II. —
 — — *α. minor* Mart. II. —
Holcus L. I. 123
 — *avenaceus* Scop. I. 124
 — *borealis* Schrad. I. 103
 — *lanatus* L. I. 124
 — *mollis* L. I. —
 — *odoratus* L. I. 103
Hordeum L. I. 163
 — *jubatum* L. IV. 24
 — *sativum* Jessen. I. 163
 — — *γ. distichon* L. I. 164
 — — *β. hexastichon* L. I. —
 — — *α. vulgare* L. I. —
Hottonia L. III. 28
 — *palustris* L. III. —
Humulus L. II. 55
 — *Lupulus* L. II. —
Hydrocharis L. I. 91
 — *morsus ranae* L. I. 92
Hydrocharitaceae Aschers. I. 89
Hyoscyamus L. III. 122
 — *niger* L. III. —
 — — *α. pallidus* (Kit.) Koch. III. 123 n IV. 142
 — — — *Walds. et Kit.* III. 123
Hypericum L. II. 360
 — *dubium* Leers. II. 361
 — *hirsutum* L. II. 361 n IV. 125
 — *maculatum* Crantz. IV. —
 — *montanum* L. II. 362
 — *perforatum* L. II. 360 n IV. 124
 — — *ssp. angustifolium* DC. IV. 125
 — — *ssp. vulgare* Neill. IV. —
 — — *β. lineolatum* (Jord.) Fröhlich. IV. —
 — — *α. lucidum* Fröhlich. IV. —
 — *quadrangulare* Sm. II. 361
 — *quadrangulum* L. II. 360 n IV. 125
 — — *ssp. typicum* Fröhlich. IV. —
Hypochoeris L. III. 320
 — *maculata* L. III. —
Hypopitys multiflora Scop. III. 41
Hyssopus L. III. 80
 — *officinalis* L. III. —
- lasione* L. III. 217
 — *montana* L. III. —
Impatiens Rivin. II. 351
 — *Nolitangere* L. II. —
 — *noli tangere* L. II. 351 n IV. 124

<i>Impatiens noli me tangere</i> L.	II. 351
— <i>parviflora</i> DC.	II. 351 n IV. 124
— <i>Roylei</i> Walp.	IV. —
<i>Inula</i> L.	III. 249
— <i>britannica</i> L.	III. 251
— — <i>α. elliptica</i> Petunn.	III. 252
— — <i>β. ramosissima</i> Ledb.	III. 252 n IV. 150
— <i>dysenterica</i> L.	III. 251
— <i>Helenium</i> L.	III. 249
— <i>hirta</i> L.	III. 251
— <i>Pulicaria</i> L.	III. 252
— <i>salicina</i> L.	III. 250
— — <i>var. genuina</i> GB.	III. —
— — <i>f. glabra</i> GB.	III. —
— — <i>var. glabra</i> GB. <i>f. subhirta</i> C. A. M.	III. —
<i>Iridaceae</i> Juss.	I. 246
<i>Iris</i> L.	I. —
— <i>paludosa</i> Mart.	I. —
— <i>pratensis</i> Lam.	I. 247
— <i>Pseudacorus</i> L.	I. 246 n IV. 40
— <i>sibirica</i> L.	I. 247 n IV. —
<i>Isatis</i> L.	II. 208
— <i>tinctoria</i> L.	II. —

Juglandaceae DC.	II. 44
<i>Juglans</i> L.	II. —
— <i>cinerea</i> L.	II. —
Juncaceae Vent.	I. 219
Juncaginaceae Lindl.	I. 84
<i>Juncus</i> L.	I. 220
— <i>acutiflorus</i> Ehrh.	I. 225 n IV. 36
— <i>albidus</i> Hoffm.	I. 228
— <i>alpinus</i> Vill.	I. 226 n IV. 37
— — <i>α. fusco-ater</i> Rchb.	IV. —
— <i>alpinus</i> Vill. <i>α. fusco-ater</i> Rchb. <i>×</i> <i>lampocarpus</i> Ehrh.	IV. 38
— <i>articulatus</i> L.	I. 226
— <i>atratus</i> Krock.	IV. 36
— <i>bufonius</i> L.	I. 221 n IV. 35
— <i>α. parvulus</i> Hartm.	IV. —
— <i>α. ranarius</i> Song. et Perrier.	I. 221
— <i>campestris</i> L.	I. 229
— <i>communis</i> E. Mey. <i>α. conglomeratus</i> L.	I. 224
— — <i>β. effusus</i> E. Mey.	I. 223
— — <i>β. —</i> Ehrh.	I. —
— — <i>compressus</i> Jacq.	I. 222 n IV. 36
— — <i>β. dianthelus</i> K. Koch	I. 223 n IV. —
— — <i>α. typicus</i> Aschers. et Gr.	IV. —
— — — <i>3. bracteosus</i> (Kit.) Aschers. et Gr.	IV. —
— — — <i>1. condensatus</i> Aschers. et Gr.	IV. —
— — — <i>2. elongatus</i> Aschers. et Gr.	IV. —
— <i>conglomeratus</i> L.	I. 224 n IV. —
— <i>effusus</i> L.	I. 223 n IV. —
— — <i>β. compactus</i> Lej. et Court. I. 224 n IV.	IV. —
— — <i>δ. pauciflorus</i> Michel	I. 224 n IV. —

<i>Juncus effusus</i> L. <i>γ. prolifer</i> Sonder.	IV. 36
— — <i>α. typicus</i> Aschers. et Gr.	IV. —
— — <i>filiformis</i> L.	I. 223
— — <i>glaucus</i> Ehrh.	I. 225
— — <i>lampocarpus</i> Ehrh.	I. 226 n IV. 37
— — — <i>β. alpica</i> Aschers. et Gr.	IV. 38
— — — <i>γ. nigritellus</i> Macreight.	IV. —
— — — <i>α. typicus</i> Aschers. et Gg.	IV. 37
— — — <i>subf. viridiflorus</i> Aschers. et Gr.	IV. —
— <i>lampocarpus</i> Ehrh. <i>γ. alpinus</i> Kauffm.	I. 226
— — <i>β. acuminatus</i> Kauffm.	I. —
— — <i>Leersii</i> Marsson.	I. 224
— <i>multiflorus</i> Hoffm.	I. 230
— <i>nemorosus</i> Poll.	I. 228
— <i>obtusiflorus</i> Ehrh.	I. 226
— <i>pilosus</i> L.	I. 228
— <i>ranarius</i> Song. et Perrier.	IV. 36
— <i>silvaticus</i> Rchb.	I. 225 n IV. —
— <i>squarrosus</i> L.	I. 222
<i>Juniperus</i> L.	I. 64
— <i>communis</i> L.	I. —
— <i>Sabina</i> L.	I. 65

Knautia Coult.	III. 210
— <i>arvensis</i> (L.) Coult.	III. 211
— — <i>α. typica</i>	III. —
— — <i>γ. bipinnata</i> GB.	III. 212
— — <i>α. campestris</i> Bess.	III. 211
— — <i>β. integrifolia</i> Coult.	III. —
— — — G. Mey.	III. —
— <i>silvatica</i> Duby.	III. —
<i>Koeleria</i> Pers.	I. 133 n IV. 15
— <i>caespitosa</i> Dwig.	I. 129
— <i>cristata</i> Pers.	I. 133
— — <i>var. argentea</i> G. Westberg.	IV. 16
— — <i>α. genuina</i> Aschers. et Gr.	I. 133
— — <i>var. minor</i> Ledb.	IV. 18
— — <i>β. pyramidata</i> Pers.	I. 134
— — <i>glaucia</i> DC.	I. 134 n IV. 15
— — — <i>α. intermedia</i> Almq.	I. 134
— — — <i>β. —</i> (Almq.) Dom.	IV. 16
— — <i>α. typica</i> Dom.	IV. —
— <i>gracilis</i> Pers.	IV. —
— — <i>β. elatior</i> Vel.	IV. 17
— — <i>δ. elongata</i> Choroschkov.	IV. —
— — <i>γ. subinflata</i> Dom.	IV. —
— — <i>α. typica</i> Dom.	IV. 16
— <i>grandis</i> (Bess.) Dom.	IV. 17
— — <i>β. gracilescens</i> Dom.	IV. 18
— — <i>α. typica</i> Dom.	IV. —
— <i>polonica</i> Dom.	IV. 17

Labiatae Juss.	III. 66
<i>Lactuca</i> L.	III. 329
— <i>muralis</i> (L.) E. Mey.	III. 331
— — Gaertn.	III. —
— <i>sativa</i> L.	III. 330
— <i>Scariola</i> L.	III. —
— <i>Serriola</i> L.	III. —
<i>Lamium</i> L.	III. 91
— <i>album</i> L.	III. 94

<i>Lamium album</i> L. var. <i>roseum</i>			
— Dumort.	III.	91	
— amplexicaule L.	III.	95	
— amplexicaule × <i>purpureum</i>	III.	93	
— Galeobdolon (L.) Crantz.	III.	95	
— hybridum Vill.	III.	93	
— maculatum L.	III.	—	
— — α . <i>crenatum</i> Peterm.	III.	94	
— — γ . fl. <i>roseo</i>	III.	—	
— — δ . <i>immaculatum</i>	III.	—	
— — β . <i>truncatum</i> GB.	III.	—	
— <i>purpureum</i> L.	III.	92	
— — β . <i>subincisum</i> Kauffm.	III.	93	
<i>Lampsana</i> L.	III.	319	
— <i>communis</i> L.	III.	320	
— — α . <i>glandulosa</i> Freyn.	III.	—	
<i>Lappa major</i> Gaertn.	III.	289	
— <i>minor</i> DC.	III.	290	
— <i>officinalis</i> All.	III.	—	
— <i>tomentosa</i> Lam.	III.	291	
<i>Lappula</i> Moench.	III.	50	
— <i>Myosotis</i> Moench.	III.	—	
<i>Lapsana communis</i> L.	III.	320	
<i>Larix</i> DC.	I.	60	
— <i>decidua</i> Mill.	I.	—	
— <i>europaea</i> DC.	I.	—	
— <i>Larix</i> Karst.	I.	—	
— <i>sibirica</i> Ledeb.	I.	—	
<i>Laserpitium</i> L.	II.	420	
— <i>pruthenicum</i> L.	II.	—	
<i>Lathraea</i> L.	III.	173	
— <i>squamaria</i> L.	III. 174 n	IV. 148	
<i>Lathyrus</i> L.	II.	316	
— <i>latifolius</i> L.	II.	318	
— <i>palustris</i> L.	II.	319	
— <i>paluster</i> L.	II. 319 n	IV. 120	
— — α . <i>genuinus</i> Gren. et Godr.	IV.	—	
— — β . <i>latifolius</i> Lambertye.	IV.	—	
— <i>pisiformis</i> L.	II.	319	
— <i>pratensis</i> L.	II. 318 n	IV. 120	
— — α . <i>typicus</i> Pospich.	IV.	—	
— — sf. <i>glaberrimus</i> (Schur.)			
Aschers. et Gr.	IV.	—	
— — sf. <i>pubescens</i> Aschers.			
et Gr.	IV.	—	
— <i>silvester</i> L.	II. 317 n	IV. 119	
— — α . <i>ensifolius</i> Beck.	II. 318 n	IV. —	
— — α . <i>latifolius</i> Peterm.	IV.	—	
— — β . — Rupr.	II. 318 n	IV. —	
— — α . <i>oblongus</i> Ser.	IV.	—	
— — β . <i>platyphyllus</i> (Retz.) Aschers.			
— — — — —	IV.	—	
— <i>silvestris</i> L.	II.	317	
— — α . <i>typicus</i> Kauffm.	II.	318	
— <i>tuberosus</i> L.	II. 317 n	IV. 119	
<i>Lavatera</i> L.	II.	359	
— <i>olbia</i> Steph.	II.	—	
— <i>thuringiaca</i> L.	II. 359 n	IV. 124	
— — β . <i>protensa</i> Beck.	IV.	—	
— — α . <i>typica</i> Beck.	IV.	—	
— — — — —	IV.	—	
— <i>vulgaris</i> Mart.	II.	359	
<i>Ledum</i> L.	III.	13	
— <i>palustre</i> L.	III.	—	
<i>Leersia oryzoides</i> Sw.	I.	100	
<i>Leguminosae</i> Endl.	II.	283	
<i>Lemna</i> L.	I.	218	
— <i>minor</i> L.	I. 219 n	IV. 35	
<i>Lemna trisulca</i> L.	I. 218 n	IV. 35	
<i>Lemnaceae</i> Dumort.	I.	218	
<i>Leonurus</i> L.	III.	107	
— <i>Cardiaca</i> L.	III.	—	
— — var. <i>tatarica</i> L. (sp.).	III.	—	
— <i>Galeobdolon</i> Scop.	III.	95	
— <i>Marrubiastrum</i> L.	III.	108	
— <i>tataricus</i> L.	III.	107	
— <i>villosus</i> Desf.	III.	—	
<i>Leontodon</i> L.	II.	315	
— <i>esculentus</i> Moench.	II.	—	
<i>Leontodon</i> L.	III.	321	
— <i>autumnalis</i> L.	III.	—	
— — β . <i>integrifolius</i> Kauffm.	III.	322	
— — β . <i>pratensis</i> Koch.	III.	—	
— — α . <i>typicus</i> GB.	III.	—	
— — — f. <i>integrifolia</i> Kauffm.	III.	—	
— — — f. <i>runcinata</i> Kit.	III.	—	
— <i>hastilis</i> Koch.	III.	—	
— — β . <i>glabratus</i> Koch.	III.	323	
— — α . <i>vulgaris</i> Koch.	III.	322	
— <i>hispidus</i> L.	III.	—	
— — α . <i>danubialis</i> Jacq.	III.	323	
— <i>incanum</i> Schrank.	III.	—	
— <i>Taraxacum</i> L.	III.	329	
<i>Lepidium</i> L.	II.	205	
— <i>campestre</i> R. Br.	II.	—	
— <i>Draba</i> L.	II. 205 n	IV. 87	
— <i>rudérale</i> L.	II.	206	
— <i>sativum</i> L.	II.	205	
<i>Lepigonum rubrum</i> Wahlenb.	II.	429	
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	III.	265	
<i>Levisticum</i> Koch.	II.	410	
— <i>ligusticum</i> Dwig.	II.	411	
— <i>officinale</i> Koch.	II.	—	
<i>Libanotis</i> Crantz.	II.	407	
— <i>montana</i> All.	II.	—	
— — Crantz.	II.	—	
— — β . <i>intermedia</i> Rupr.	II.	408	
— — α . <i>typica</i> Kauffm.	II.	—	
— <i>montana</i> L. β . <i>gracilis</i> Kauffm.	II.	—	
— <i>sibirica</i> C. A. M.	II.	—	
— — Koch.	II.	—	
<i>Ligularia</i> Cass.	III.	279	
— <i>sibirica</i> Cass.	III.	—	
<i>Ligusticum Levisticum</i> L.	II.	411	
<i>Lilium</i> L.	I.	238	
— <i>Martagon</i> L.	I.	—	
<i>Limnanthemum Gmel.</i>	III.	34	
— <i>nymphaeoides</i> (L.) Link.	III.	—	
<i>Limodorum Epipogon</i> Sw.	I.	262	
<i>Limosella</i> L.	III.	139	
— <i>aquatica</i> L.	III.	—	
— — β . <i>diandra</i> (Krock.) Mart.	III.	—	
— — <i>tenuifolia</i> Hoffm.	III.	—	
— — — — —	III.	—	
— — — — —	III.	—	
<i>Linaceae</i> DC.	I.	231	
<i>Linaria</i> Adans.	III.	134	
— <i>bipartita</i> (Vent.) Willd.	III.	137	
— <i>canadensis</i> (L.) Dumort.	III.	136	
— <i>minor</i> (L.) Desf.	III. 135 n	IV. 142	
— <i>vulgaris</i> Mill.	III.	135	
<i>Linnaea Gronov.</i>	III.	206	
— <i>borealis</i> L.	III.	—	
— — α . <i>micrantha</i> Kauffm.	III.	207	
<i>Linum</i> L.	II.	332	
— <i>catharticum</i> L.	II.	333	

<i>Linum flavum</i> L.	II. 333	<i>Lycopodiaceae</i> DC.	I. 54
— <i>monopetalum</i> Willd.	II. —	<i>Lycopodium</i> L.	I. —
— <i>usitatissimum</i> L.	II. —	— <i>annotinum</i> L.	I. 55 II. IV. 4
<i>Liparis</i> Rich.	I. 269	— <i>clavatum</i> L.	I. 55
— <i>Loeselii</i> Rich.	I. —	— <i>complanatum</i> L.	I. 56 II. IV. 4
<i>Listera</i> R. Br.	I. 266	— <i>Selago</i> L.	I. 54
— <i>cordata</i> R. Br.	I. 267	<i>Lycopsis</i> L.	III. 53
— <i>ovata</i> R. Br.	I. 266 II. IV. 49	— <i>arvensis</i> L.	III. 53 II. IV. 139
— — <i>multinervis</i> Peterm.	IV. —	— — <i>ssp. occidentalis</i> Kusnez.	IV. —
— — <i>stenoglossa</i> Peterm.	IV. —	<i>Lycopus</i> L.	III. 74
<i>Lithospermum</i> L.	III. 60	— <i>europaeus</i> L.	III. 75
— <i>arvense</i> L.	III. —	— — <i>α. glabrescens</i> Schmedely.	III. —
— <i>officinale</i> L.	III. 60 II. IV. 139	— <i>exaltatus</i> L. fil.	III. 76
<i>Lolium</i> L.	I. 164	— — <i>α. glabratus</i>	III. —
— <i>arvense</i> Schrad.	I. 165	— <i>vulgaris</i> Mart.	III. 75
— <i>linicola</i> Sond.	I. —	<i>Lysimachia</i> L.	III. 23
— <i>linicolum</i> A. Br.	I. —	— <i>Nummularia</i> L.	III. 24
— <i>multiflorum</i> Lam.	IV. 25	— — <i>α. longepedunculata</i> Weinm.	III. 25 II. IV. 138
— <i>perenne</i> L.	I. 166 II. IV. 24	— <i>punctata</i> L.	IV. 137
— — <i>α. ramosum</i> (Sm.) Richt.	IV. —	— <i>thyrsiflora</i> L.	III. 23
— <i>remotum</i> Schrank.	I. 165	— <i>vulgaris</i> L.	III. 24
— — <i>α. complanatum</i> Schrad.	I. —	<i>Lythraceae</i> Juss.	II. 379
— — <i>β. laeve</i> Aschers.	I. —	<i>Lythrum</i> L.	II. —
— <i>tomentum</i> L.	I. —	— <i>quadrifolia</i> Mart.	II. —
<i>Loniceria</i> L.	III. 203	— <i>Salicaria</i> L.	II. —
— <i>coerulea</i> L.	III. 205		
— <i>tatarica</i> L.	III. 204	<i>Majanthemum</i> Wigg.	I. 242
— <i>Xylosteum</i> L.	III. 203	— <i>bifolium</i> DC.	I. 242 II. IV. 40
— — <i>α. syringifolia</i> GB.	III. 204	— — (L.) F. W. Schmidt.	IV. —
<i>Lotus</i> L.	II. 300	<i>Malachium</i> Fries.	II. 127
— <i>corniculatus</i> L.	II. 301 II. IV. 115	— <i>aquaticum</i> (L.) Fries. II. 127 II. IV. 72	
— — <i>α. arvensis</i> Ser.	IV. —	— — <i>α. arenarium</i> Godr.	IV. —
— — — <i>silvaticus</i> (Baumg.)	IV. —	<i>Malaxis</i> Rich.	I. 271
— — — <i>Aschers. et Gr.</i>	IV. —	— <i>monophyllos</i> Sw.	I. 270
— — <i>β. ciliatus</i> Koch. II. 301 II. IV. —		— <i>paludosa</i> Sw.	I. 271 II. IV. 50
<i>Lunaria</i> L.	II. 199	<i>Malva</i> L.	II. 356
— <i>rediviva</i> L.	II. —	— <i>Alcea</i> L.	II. —
<i>Luzula</i> DC.	I. 227	— <i>borealis</i> Wallm.	II. 358
— <i>albida</i> DC.	I. 228	— — <i>glabrior</i> Kauffm.	II. 359
— <i>campestris</i> DC.	I. 229 II. IV. 38	— — <i>hirsuta</i> Kauffm.	II. —
— — <i>β. multiflora</i> Cel. I. 230 II. IV. —		— <i>Henningii</i> Goldb.	II. 358
— — <i>γ. pallescens</i> Wahlb. I. 230 II. IV. 39		— <i>humifusa</i> Henning.	II. —
— — <i>α. vulgaris</i> Gaud. I. 2 29 II. IV. 38		— <i>mauritanica</i> L.	II. 357
— <i>erecta</i> Desv.	I. 230	— <i>neglecta</i> Wallr.	II. 358
— <i>multiflora</i> Lej.	IV. 38	— <i>rotundifolia</i> auct. pl.	II. —
— <i>nemorosa</i> E. Mey.	I. 228 II. IV. —	— — L.	II. —
— — <i>α. leucanthema</i> (Wallr.)	IV. —	— — <i>β. glabrior</i> Kauffm. herb.	II. 359
— — <i>Aschers. et Gr.</i>	IV. —	— — <i>α. hirsuta</i> Kauffm. herb.	II. —
— <i>pilosa</i> Willd.	I. 228	— — <i>b. pusilla</i> Mart.	II. 358
— <i>sudetica</i> DC. <i>γ. pallescens</i> Wahlb. IV. 39		— <i>silvestris</i> L.	II. 357
<i>Lychnis</i> L.	II. 107	<i>Malvaceae</i> R. Br.	II. 356
— <i>alba</i> Mill.	II. 105	<i>Maruta</i> Cotula DC.	III. 261
— <i>arvensis</i> Roth.	II. —	<i>Matricaria</i> L.	III. 269
— <i>dioica</i> L.	II. —	— <i>Chamomilla</i> L.	III. —
— — <i>α. rubra</i> L.	II. —	— <i>discoidea</i> DC.	III. 270
— — <i>diurna</i> Sibth.	II. —	— <i>inodora</i> L.	III. —
— — <i>flos cuculi</i> L.	II. 107 II. IV. 65	— — <i>α. ambiguum</i> (Rchb.).	III. 271 II. IV. 151
— — <i>β. albiflora</i> Tin.	IV. —	— <i>suaveolens</i> (Pursh.) Buchenau.	III. 270
— — <i>α. latifolia</i> Bolle.	IV. —	<i>Medicago</i> L.	II. 290
— <i>Githago</i> Lam.	II. 108	— <i>falcata</i> L.	II. 291 II. IV. 111
— <i>pratensis</i> Spreng.	II. 105	— — <i>β. media</i> DC.	II. 291
— <i>silvestris</i> Hoppe.	II. —	— — <i>β. pubescens</i> Rouy et Fouc. IV. 111	
— <i>vespertina</i> Sibth.	II. —		
<i>Lycium</i> L.	III. 117		
— <i>barbarum</i> L.	III. —		
— <i>chinifolium</i> Mill.	III. —		
<i>Lycopersicum esculentum</i> Mill.	III. 119		

<i>Medicago facata</i> L. α . <i>typica</i>	IV. 141
— Pospich.	IV. 141
— <i>lupulina</i> L. II. 290 II	IV. —
— α . <i>Willdenowii</i> Boenng.	II. 291
— — (Boenng.) Aschers. et Gr.	IV. 141
— <i>sativa</i> L. II. 292 II	IV. —
<i>Melampyrum</i> L. III. 171	IV. 171
— <i>arvense</i> L. III. 172	IV. 172
— <i>cristatum</i> L. III. 171 II	IV. 147
— <i>laciniatum</i> Kosch. et Zinger.	IV. —
— <i>nemorosum</i> L. III. 172	IV. 172
— <i>pratense</i> L. III. 172 II	IV. 147
— γ . <i>commutatum</i> (Tausch)	IV. —
— Beck.	IV. —
— α . <i>integerrimum</i> Doell.	III. 173 II IV. 147
— — β . <i>pseudo-silvaticum</i> Kauffm.	III. 173
— — <i>typicum</i> Beck. III. 172 II	IV. 147
— <i>silvaticum</i> L. III. 173	IV. 173
<i>Melandryum</i> Roehl. II. 104	IV. 104
— <i>album</i> (Mill.) Garcke. II. 105 II	IV. 65
— α . <i>coloratum</i> Rostr.	IV. —
— <i>noctiflorum</i> (L.) Fries. II. 106 II	IV. —
— <i>pratense</i> Roehl. II. 105	IV. 105
— <i>rubrum</i> (Weig.) Garcke.	II. —
— <i>silvestre</i> Roehl.	II. —
— <i>viscosum</i> (L.) Cel.	II. 107
<i>Melica</i> L. I. 132	IV. 132
— <i>altissima</i> L.	I. —
— — <i>f. interrupta</i> Rchb.	I. —
— <i>nutans</i> L.	I. —
<i>Melilotus</i> Juss. II. 292	IV. 292
— <i>alba</i> Desr. II. 293	IV. 293
— <i>officinalis</i> Desr. II. 292 II	IV. 142
— — α . <i>typicus</i> Pospich.	IV. —
— <i>vulgaris</i> Willd. II. 293	IV. 293
<i>Mercurialis</i> L. II. 336	IV. 336
— <i>perennis</i> L. II. 337	IV. 337
<i>Mentha</i> L. III. 70	IV. 70
— <i>aquatica</i> L. III. 72	IV. 72
— <i>arvensis</i> L. III. 73	IV. 73
— — α . <i>conferta</i> Kauffm.	III. 74
— — β . <i>glabriuscula</i> Koch.	III. —
— <i>austriaca</i> Jacq. III. 73	IV. 73
— — δ . <i>multiflora</i> Host. III. 74 II	IV. 140
— — β . <i>nemorum</i> (Boreau) GB.	III. 74
— — γ . <i>parietarifolia</i> (Becker).	III. 74 II IV. 140
— — α . <i>typica</i> GB.	III. 74
— <i>longifolia</i> (L.) Huds. III. 70 II	IV. 140
— — α . <i>vulgaris</i> Koch.	III. 71
— — <i>f. b.</i> Koch.	III. —
— <i>longifolia</i> L. III. 70	IV. 70
— <i>piperita</i> L. III. 72	IV. 72
— <i>silvestris</i> L. III. 70	IV. 70
— — α . <i>vulgaris</i> Koch.	III. 71
— <i>spicata</i> Huds.	III. —
— <i>viridis</i> L. III. 70	IV. 70
<i>Menyanthes</i> L. III. 33	IV. 33
— <i>trifoliata</i> L. III. 34	IV. 34
<i>Mespilus Cotoneaster</i> L.	II. 273
— <i>nigra</i> Ehrh. II. 272	IV. 272
— <i>Oxyacantha</i> Crantz.	II. 275
<i>Microstylis</i> Lindl. I. 270	IV. 270
— <i>monophyllos</i> Lindl. I. 270 II	IV. 50
<i>Milium</i> L. I. 108	IV. 108
— <i>effusum</i> L. I. 109	IV. 109

<i>Mimulus</i> L. III. 137	IV. 137
— <i>luteus</i> L. III. 137 II	IV. 137
<i>Mochringia</i> L. II. 118	IV. 118
— <i>lateriflora</i> (L.) Fenzl.	II. 118
— <i>trinervia</i> (L.) Clairv.	II. 117
<i>Molinia</i> Schrank. I. 131	IV. 131
— <i>coerulea</i> Moench. I. 131 II	IV. 15
— — <i>var. altissima</i> Link.	I. 132
— — α . <i>arundinacea</i> Aschers.	I. 132 II IV. 15
— — — Schr.	I. 132
<i>Moneses Salisb.</i> III. 8	IV. 8
— <i>grandiflora</i> Salisb.	III. —
<i>Monotropa</i> L. III. 11	IV. 11
— <i>Hypophega</i> Wallr. III. 11 II	IV. 137
— <i>Hypopitys</i> (L.) Wallr. III. 11 II	IV. —
— — α . <i>glabra</i> Koch.	III. 11
— — β . <i>hirsuta</i> Roth.	III. —
<i>Monotropaceae</i> A.Br. III. —	IV. —
<i>Montia</i> L. II. 96	IV. 96
— <i>fontana</i> L.	II. —
— — β . <i>erecta</i> Pers.	II. —
— — <i>minor</i> Gmel.	II. —
— <i>rivularis</i> Gmel. II. 96 II	IV. 64
<i>Moraceae</i> Endl. II. 55	IV. 55
<i>Mulgedium</i> Cass. III. 332	IV. 332
— <i>macrophyllum</i> (Willd.) DC.	III. —
<i>Myagrum dentatum</i> Willd.	II. 204
— <i>paniculatum</i> L.	II. 207
— <i>sativum</i> L.	II. 203
<i>Myosotis</i> L. III. 61	IV. 61
— <i>arenaria</i> Schrad.	III. 64
— <i>arvensis</i> Ehrh.	III. —
— — Roth.	III. 65
— <i>caespitosa</i> C.F. Schultz. III. 63 II	IV. 139
— — <i>minima</i> Selm.	IV. 139
— — <i>nana</i> Choroschkov.	III. 63
— — α . <i>pumila</i> Choroschkov.	III. 63 II IV. 139
— — — III. 63 II	IV. 139
— <i>collina</i> Ehrh. III. 65 II	IV. 66
— <i>intermedia</i> Link. III. 65 II	IV. 139
— <i>Lappula</i> L.	III. 50
— <i>lingulata</i> Lehm.	III. 63
— <i>micrantha</i> (Pall.) Lehm.	III. 64
— <i>montana</i> Bess.	III. —
— — Hoffm. α . <i>lactea</i> Boenng.	III. 65
— <i>palustris</i> (L.) Hill.	III. 62
— — α . <i>memor</i> Kitte.	III. —
— — β . <i>strigulosa</i> (Rchb.) Mert.	III. —
— — et Koch.	III. —
— — <i>f. gracilis</i> Boenng.	III. 62 II IV. 139
— — — III. 62 II	IV. 139
— — <i>f. obtusifolia</i> GB.	III. 62
— <i>palustris</i> Roth.	III. —
— — With.	III. —
— <i>scorpioides</i> L.	III. —
— — α . <i>arvensis</i> L.	III. 65
— — β . <i>palustris</i> L.	III. 62
— <i>scorpioides</i> L. excl. <i>var. \beta</i>	III. 65 II IV. 139
— — — III. 65 II	IV. 139
— — α . <i>agrestis</i> Schlecht.	III. 65
— — γ . <i>pumila</i>	IV. 140
— — β . <i>silvestris</i> Schlecht.	III. 66
— <i>silvatica</i> Ehrh.	III. 64
— — Hoffm.	III. —
— — β . <i>alpestris</i> Koch.	III. —
— <i>sparsiflora</i> Mik.	III. 66

<i>Myosotis sparsiflora</i> Mik. var. <i>major</i> [Maxim.]	III. 66
— <i>stricta</i> Link.	III. 64
<i>Myosurus</i> L.	II. 151
— <i>minimus</i> L.	II. —
<i>Myriophyllum</i> L.	II. 389
— <i>pectinatum</i> DC.	II. 390
— <i>spicatum</i> L.	II. —
— <i>verticillatum</i> L.	II. 389 II IV. 135
— <i>β. intermedium</i> Koch.	II. 389
— <i>β. pectinatum</i> Koch.	II. 390
— <i>γ.</i> — Wallr.	II. —
— <i>α. pinnatifidum</i> Wallr.	II. 389
<i>Myrrhis bulbosa</i> Spreng.	II. 426

Myadaceae Lindl.	I. 83
<i>Najas</i> L.	I. —
— <i>minor</i> All.	I. 83 II IV. 40
<i>Nardus</i> L.	I. 110
— <i>stricta</i> L.	I. —
<i>Nasturtium</i> R. Br.	II. 173
— <i>amphibium</i> (L.) R. Br.	II. 175
— <i>β. aquaticum</i> L.	II. 176
— <i>β. auriculatum</i> Rchb.	II. —
— <i>α. indivisum</i> DC.	II. —
— <i>α. riparium</i> Tausch.	II. 174, 176 II IV. 82
— var. <i>submersum</i> Tausch.	II. 176
— <i>γ. variifolium</i> DC.	II. —
— <i>anceps</i> DC.	II. 177
— Rchb.	II. —
— <i>armoracioides</i> Tausch.	II. —
— <i>austriacum</i> Crantz.	II. 174 II IV. 82
— <i>palustre</i> DC.	II. 179
— <i>riparium</i> Wallr.	II. 176
— <i>silvestre</i> (L.) R. Br.	II. 178
— <i>α. pinnatifidum</i> Kauffm.	II. —
— <i>β. subindivisum</i> Kauffm.	II. 177
<i>Naumburgia</i> Moench.	III. 23
— <i>guttata</i> Moench.	III. —
— <i>thyrsiflora</i> Rchb.	III. —
<i>Nepenthes luteum</i> Hayne.	II. 132
<i>Neottia</i> L.	I. 265
— <i>nidus avis</i> Rich.	I. 266 II IV. 49
— <i>repens</i> Sw.	I. 268
<i>Nepeta</i> L.	III. 87
— <i>Cataria</i> L.	III. 87 II IV. 141
— <i>citriodora</i> Becker.	III. 88
— — Dumoulin ex Lej.	III. —
— <i>β. immaculata</i>	III. —
— <i>suaveolens</i> Henn.	III. —
— <i>nuda</i> L.	III. 88
— <i>ucranica</i> L.	III. —
<i>Neslea</i> Desv.	II. 207
— <i>paniculata</i> Desv.	II. —
<i>Nerandra</i> Adans.	III. 121
— <i>physaloides</i> (L.) Gaertn.	III. 122
<i>Nonnea</i> Medik.	III. 53
— <i>pulla</i> (L.) DC.	III. 53 II IV. 139
<i>Nuphar</i> Sm.	II. 131
— <i>advenum</i> Soland.	IV. 72
— <i>luteum</i> (L.) Sm.	II. 132
— <i>pumilum</i> (Timm.) Sm.	II. 132 II IV. 72
<i>Nymphaea</i> L.	II. 133
— <i>alba</i> L.	II. —
— <i>biradiata</i> Sommer.	II. —

<i>Nymphaea candida</i> Presl.	II. 133
— <i>lutea</i> L.	II. 132
Nymphaeaceae DC.	II. 131
Odontites Pers.	III. 158
— <i>rubra</i> Gilib.	III. —
— <i>α. serotina</i> Lam.	III. 159
— <i>verna</i> Bell.	III. —
<i>Oenanthe</i> L.	II. 404
— <i>aquatica</i> (L.) Lam.	II. 405
— <i>Phellandrium</i> Lam.	II. —
<i>Oenothera biennis</i> L.	II. 387
Oleaceae Lindl.	III. 30
<i>Omphalodes</i> Moench.	III. 51
— <i>scorpioides</i> Schrank.	III. —
<i>Onobrychis</i> Tourn.	II. 307
— <i>sativa</i> Lam.	II. —
— <i>viciaefolia</i> Scop.	II. 307 II IV. 116
— <i>α. culta</i> Rouy.	IV. —
<i>Onoclea</i> L.	I. 45
— <i>Struthopteris</i> Hoffm.	I. 45 II IV. 3
— <i>α. serrata</i> Baenitz.	IV. 3
<i>Ononis</i> L.	II. 288
— <i>arvensis</i> Smith.	II. —
— <i>hircina</i> Jacq.	II. —
— <i>α. spinescens</i> Ledeb.	II. 289
— <i>spinosa</i> L.	II. 288
<i>Onopordon</i> L.	III. 305
— <i>Acanthium</i> L.	III. 306
<i>Onosma</i> L.	III. 59
— <i>tinctoria</i> MB.	III. —
<i>Oenothera</i> L.	II. 386
— <i>biennis</i> L.	II. 387 II IV. 135
Oenotheraceae Endl.	II. 381
Ophioglossaceae R. Br.	I. 46
<i>Ophioglossum</i> L.	I. —
— <i>vulgatum</i> L.	I. 47
<i>Ophrys</i> L.	IV. 41
— <i>cordata</i> L.	I. 267
— <i>monophyllos</i> L.	I. 270
— <i>Monorchis</i> L.	I. 261
— <i>muscifera</i> Huds.	IV. 41
— <i>α. genuina</i> M. Schulze.	IV. —
— <i>Nidus avis</i> L.	I. 266
— <i>ovata</i> L.	I. —
Orchidaceae Juss.	I. 248
<i>Orchis</i> L.	I. 252 II IV. 42
— <i>bifolia</i> L.	I. 259
— <i>conopsea</i> L.	I. 257
— <i>coriophora</i> L.	I. 254
— <i> cuculata</i> L.	I. 258
— <i>incarnata</i> L.	I. 255 II IV. 44
— <i>β. brevicarata</i> (Rchb. fil.) Aschers. et Gr.	IV. —
— — Rchb. fil.	I. 255
— <i>incarnata</i> ssp. <i>lanceata</i> Rchb. fil.	I. 255 II IV. 44
— <i>α. typica</i> Aschers. et Gr.	IV. —
— — <i>4. albiflora</i> Lec. et Lamott.	IV. —
— — <i>3. hematodes</i> M. Schulze.	IV. —
— — <i>1. macrophylla</i> (Schur) Aschers. et Gr.	IV. —

<i>Orchis incarnata</i> L. ssp. α 2. <i>stenophylla</i>		<i>Orobis vernus</i> L. II. 320 II	IV. 120
Aschers. et Gr.	IV. 44	<i>Osmunda Lunaria</i> L.	I. 47
— — var <i>macrophylla</i> Schur.	I. 256	— <i>Struthiopteris</i> L.	I. 45
— — γ . <i>strictifolia</i> Opiz. I. 256 II	IV. 44	— <i>virginiana</i> L.	I. 49
— — δ . <i>retusa</i> Rehb.	IV. 45	<i>Ostericum Hoffm.</i>	II. 412
— — δ . <i>rhombellabia</i> M. Schulze.	IV. —	— <i>palustre</i> Bess.	II. —
— — δ . <i>trifurca</i> Rehb.	IV. —	<i>Oxalidaceae</i> DC.	II. 331
— <i>incarnata</i> L. \times <i>Traunsteineri</i>		<i>Oxalis</i> L.	II. 332
Saut. ssp. <i>Russowii</i> (Klinge)		— <i>Acetosella</i> L.	II. —
Aschers. et Gr.	IV. —	— <i>stricta</i> L.	IV. 121
— <i>latifolia</i> L.	I. 255	<i>Oxyccoccus palustris</i> Pers.	III. 16
— — β . <i>angustifolia</i> Nyland.	I. 256		
— <i>maculata</i> L.	I. 256 II	<i>Panicum</i> L.	I. 104
— — β . <i>albiflora</i> auct. pl. I. 257 II	IV. 47	— <i>arenarium</i> MB.	I. 105
— — α . <i>genuina</i> Rehb.	IV. 46	— <i>Crus-galli</i> L.	I. 105 II
— — δ . <i>Biermanni</i> (Ortm.)		— — <i>aristata</i> Rehb.	I. 106
Aschers. et Gr.	IV. —	— — α . <i>brevisetum</i> Doell.	IV. 11
— — δ . <i>candidissima</i> M.		— — <i>erectum</i>	IV. —
Schulze.	IV. —	— — <i>prostratum</i>	IV. —
— — δ . <i>comosa</i> Schur.	IV. —	— — β . <i>longisetum</i> Doell.	I. 106 II
— — δ . <i>obtusifolia</i> Schur.	IV. —	— — <i>erectum</i>	IV. —
— — δ . <i>typica</i> Aschers. et Gr.	IV. —	— — <i>prostratum</i>	IV. —
— — β . <i>macrostachys</i> Aschers.		— <i>filiforme</i> Garcke.	I. 105
et Gr.	IV. —	— <i>glabratum</i> Gaud.	I. —
— — α . <i>Meyeri</i> Rehb. fil. I. 257 II	IV. 47	— <i>glaucum</i> L.	I. 107
— <i>incarnata</i> \times <i>maculata</i>	IV. —	— <i>lineare</i> Krock.	I. 105
— <i>militaris</i> L.	I. 253 II	— <i>miliaceum</i> L.	I. 106
— — β . <i>interdens</i> GB.	IV. —	— <i>muticum</i> Mart.	I. 105
— — α . <i>typica</i> GB.	IV. —	— <i>viride</i> L.	I. 107
— <i>Rivini</i> Gouan.	I. 253	<i>Papaver</i> L.	II. 165
— <i>Russowii</i> Klinge.	I. 256	— <i>Rhoeas</i> L.	II. —
— <i>Traunsteineri</i> Sauter. I. 256 II	IV. 45	— <i>somniferum</i> L.	II. —
— ssp. <i>cu-Traunsteineri</i> Aschers.		<i>Papaveraceae</i> DC.	II. —
et Gr.	IV. —	<i>Paris</i> L.	I. 245
— ssp. <i>Nylanderi</i> (Klinge)		— <i>quadrifolia</i> L.	I. —
Aschers. et Gr.	IV. —	— — <i>quinquefolia</i> Mart.	I. —
— — α . <i>genuina</i> (Klinge)		<i>Parnassia</i> L.	II. 219
Aschers. et Gr.	IV. —	— <i>palustris</i> L.	II. —
— ssp. <i>Russowii</i> (Klinge)		<i>Parthenocissus</i> Planchon.	II. 354
Aschers. et Gr.	IV. —	— <i>quinquefolius</i> (L.) Planchon.	II. —
— <i>tridentata</i> Scop.	I. 253	<i>Pastinaca</i> L.	II. 417
— <i>ustulata</i> L.	IV. 43	— <i>opaca</i> Bernh.	II. 418
— <i>variegata</i> All.	I. 253	— <i>pratensis</i> Fl. Dan.	II. —
— <i>viridis</i> All.	I. 260	— <i>sativa</i> L.	II. —
<i>Origanum</i> L.	III. 76	— — α . <i>glabra</i> Kauffm.	II. —
— <i>vulgare</i> L.	III. —	— — β . <i>pubescens</i> Kauffm.	II. —
— — γ . <i>albiflorum</i> Lej.	III. 77	— — β . <i>silvestris</i> Rupr.	II. —
— — α . <i>glabrescens</i> GB.	III. —	— — α . <i>typica</i> Rupr.	II. —
— — δ . <i>hirsutum</i> de Visiani.	III. —	<i>Pavia flava</i> DC.	II. 350
— — <i>humile</i> (album) Mart.	III. —	— <i>rubra</i> Lam.	II. —
— — β . <i>virens</i> Benth.	III. —	<i>Pedicularis</i> L.	III. 168
— — Hoffms et Link.	III. —	— <i>comosa</i> L.	III. 169 II
<i>Oriza</i> Tourn.	I. 100	— <i>Kauffmanni</i> Pinz.	III. 169
— <i>clandestina</i> A. Br.	I. 100 II	— <i>palustris</i> L.	III. 168
<i>Ornithogalum luteum</i> L.	I. 233	— <i>Sceptrum</i> L.	III. 170
— <i>minimum</i> L.	I. 234	— <i>sceptrum Carolinum</i> L.	III. 170 II
— <i>silvaticum</i> Pers.	I. 233	<i>Peplis</i> L.	II. 380
— <i>spathaceum</i> W.	I. 234	— <i>Portula</i> L.	II. —
<i>Orobanchaceae</i> Lindl.	III. 178	<i>Peristylus bracteatus</i> Lindl.	I. 261
<i>Orobanche</i> L.	III. —	— <i>viridis</i> Lindl.	I. 260
— <i>alba</i> Steph.	III. —	<i>Petasites</i> Adans.	III. 277
— <i>caryophyllaceae</i> Sm.	III. —	— <i>officinalis</i> Moench.	III. —
— <i>Galli</i> Duby.	III. —	— <i>spurius</i> Rehb.	III. 278
— <i>Libanotidis</i> Rupr.	III. 478 II		
— <i>purpurea</i> Jacq.	III. 179		
<i>Orobis</i> L.	II. 320		
— <i>niger</i> L.	II. 321		

<i>Petasites tomentosus</i> DC.	III. 278	<i>Pimpinella</i> Saxif. <i>γ. major</i> Kauffm.	II. 403
<i>Petroselinum</i> Hoffm.	II. 399	— — <i>β. nigra</i> Kauffm.	II. —
— <i>sativum</i> Hoffm.	II. —	— — — Willd.	II. —
<i>Peucedanum</i> L.	II. 414	— — <i>α. poterifolia</i> Koch.	II. 402
— <i>Cervaria</i> (L.) Cass.	II. 415	<i>Pinus</i> L.	I. 61
— — Lap.	II. —	— <i>Abies</i> L.	I. 59
— <i>Oreoselinum</i> (L.) Moench.	II. —	— <i>balsamea</i> Pall.	I. 58
— <i>palustre</i> (L.) Moench.	II. —	— <i>Cembra</i> L.	I. 61
— <i>Silaus</i> L.	II. 409	— <i>Larix</i> L.	I. 60
<i>Phalaris</i> L.	I. 100	— <i>silvestris</i> L.	I. 62
— <i>arundinacea</i> L.	I. 101	— — <i>β. conis aggregatis</i>	I. 63
— — <i>fol. variegatis</i>	I. 102	— — <i>α. nana</i> Pall.	I. 63 II. 4
— <i>canariensis</i> L.	I. 100	— <i>Strobis</i> L.	I. 62
— <i>erucaeformis</i> L.	I. 108	<i>Pirola</i> L.	III. 5
— <i>picta</i> L.	I. 102	— <i>chlorantha</i> Sw.	III. 6 II. 137
<i>Phaseolus</i> L.	II. 321	— <i>media</i> Sw.	III. 7 II. 4
— <i>multiflorus</i> Willd.	II. 322	— <i>minor</i> L.	III. 8
— <i>vulgaris</i> L.	II. —	— <i>rotundifolia</i> L.	III. 6
<i>Phegopteris Dryopteris</i> Fée.	I. 40	— <i>secunda</i> L.	III. 10
— <i>polypodioides</i> Fée.	I. —	— <i>umbellata</i> L.	III. 9
<i>Phellandrium aquaticum</i> L.	II. 405	— <i>uniflora</i> L.	III. 8
<i>Philadelphus</i> L.	II. 220	<i>Pirolaceae</i> Dumort.	III. 5
— <i>coronarius</i> L.	II. —	<i>Pirus</i> L.	II. 277
— <i>inodorus</i> L.	II. —	— <i>communis</i> L.	II. 277 II. 108
— <i>latifolius</i> Schrad.	II. 221	— <i>Malus</i> L.	II. 278 II. 4
<i>Phleum</i> L.	I. 111	— — <i>α. glabra</i> Koch.	II. 278
— <i>Boehmeri</i> Wib.	I. 412 II. 42	— — <i>ssp. silvestris</i> L.	IV. 108
— — <i>angustifolium</i> Beck.	IV. —	<i>Pisum</i> L.	II. 316
— — <i>β. macrantha</i> Kauffm.	IV. —	— <i>sativum</i> L.	II. —
— — <i>vivipara</i> Aschers.	IV. —	<i>Plantaginaceae</i> Juss.	III. 179
— <i>nodosum</i> L.	I. 111	<i>Plantago</i> L.	III. 180
— <i>pratense</i> L.	I. —	— <i>altissima</i> L.	III. 183
— — <i>α. nodosum</i> L. (sp.)	I. —	— <i>arenaria</i> W. K.	III. —
<i>Phlomis</i> L.	III. 109	— <i>lanceolata</i> L.	III. 182
— <i>tuberosa</i> L.	III. —	— — <i>α. capitata</i> Sonder.	III. 183
— — <i>β. longifolia</i>	III. 110	— — <i>var. silvatica</i> Mart.	III. —
— — <i>α. typica</i>	III. —	— — <i>β. silvatica</i> Pers.	III. —
<i>Phragmites communis</i> Trin.	I. 430 II. 45	— — <i>sphaerostachya</i> M. et K.	III. —
— — <i>α. flavescens</i> Aschers.	IV. —	— <i>major</i> L.	III. 180
— — <i>β. typica</i> Aschers. et Gr.	IV. —	— — <i>α. intermedia</i> (Gilib.) Willd.	—
— <i>Phragmites</i> Karst.	I. 430	— — <i>et Durand</i>	III. 181 II. 148
<i>Physocarpus</i> Maxim.	II. 227	— — <i>β. minima</i> Dumort.	III. 181
— <i>opulifolius</i> Maxim.	II. —	— — <i>γ. phyllostachya</i> Wallr.	IV. 148
<i>Phyteuma</i> L.	III. 218	— — <i>media</i> L.	III. 181
— <i>nigra</i> Schmidt.	III. 219	— — <i>ramosa</i> (Gilib.) Aschers.	III. 183
— <i>spicatum</i> L.	III. 218 II. 219	— — <i>silvatica</i> (altissima) Mart.	III. —
— — <i>v. nigrum</i>	III. —	<i>Platanthera</i> Rich.	I. 258
— — <i>α. ovatum</i> Schmidt.	III. —	— <i>bifolia</i> (L.) Rich.	I. 259 II. 47
<i>Picea</i> Link.	I. 59	— — <i>ssp. genuina</i> Aschers. et Gr.	IV. —
— <i>excelsa</i> Link.	I. —	— — — <i>δ. aceras</i> Goldb.	IV. 48
— — <i>var. fennica</i> Regel.	I. 60	— — — <i>β. densiflora</i> (Drej.)	IV. —
— <i>vulgaris</i> Link.	I. 59	— — — <i>Aschers. et Gr.</i>	IV. —
— — <i>Uwarowii</i> Kauffm.	I. 60	— — — <i>γ. laxiflora</i> (Drej.)	IV. —
<i>Picris</i> L.	III. 323	— — — <i>Aschers. et Gr.</i>	IV. —
— <i>hieracioides</i> L.	III. —	— — — <i>γ. pervia</i> (Rchb.) Aschers.	IV. —
<i>Pilosella Laschii</i> Schultz frat.	III. 354	— — <i>et Gr.</i>	IV. —
<i>Pimpinella</i> L.	II. 401	— — <i>chlorantha</i> Rchb.	I. 259 II. 47
— <i>dissecta</i> herb. Goldb.	II. 403	— — <i>solstitialis</i> Boenng.	I. 259 II. 47
— <i>magna</i> L.	II. —	— — — <i>α. aceras</i> Goldb.	I. 259
— <i>nigra</i> Willd.	II. —	— — — <i>viridis</i> Lindl.	I. 260
— <i>Saxifraga</i> L.	II. 401	<i>Poa</i> L.	I. 135
— — <i>γ. dissectifolia</i> Wallr.	II. 403	— <i>angustifolia</i> L.	I. 141
— — <i>α. integrifolia</i> Wallr.	II. 402 II. 436	— <i>annua</i> L.	I. 136
— — — <i>δ. magna</i> L.	II. 403	— — <i>α. polystachya</i> Kauffm.	I. —
— — — <i>var. tereticaulis</i> Cel.	II. —	— — <i>aquatica</i> L.	I. 144
		— — <i>bulbosa</i> L.	I. 136
		— — <i>α. vivipara</i> L.	I. 137

<i>Poa Chaixii</i> Vill.	I. 139 n	IV. 20	<i>Polygalavulgaris</i> L. β . <i>rosulata</i> Fries. IV. —		
— α . <i>remota</i> Fries.	I. 139 n	IV. —	Polygalaceae Juss.	II. 334	
— <i>compressa</i> L.	I. 138 n	IV. —	Polygonaceae Juss.	II. 61	
— β . <i>Langiana</i> Koch. I. 139 n	IV. —		<i>Polygonatum</i> Moench.	I. 243	
— γ . <i>polynoda</i> Aschers. et Gr. IV. —			— <i>multiflorum</i> All.	I. 244 n IV. 40	
— α . <i>typica</i> Aschers. et Gr.	I. 139 n	IV. —	— α . <i>intermedium</i> Baker.	IV. —	
— <i>distans</i> L.	I. 145		— <i>officinale</i> All.	I. 243 n IV. —	
— <i>fertilis</i> Host.	I. 138		— α . <i>ambiguum</i> Link (sp.).	IV. —	
— <i>fluitans</i> Scop.	I. 143		<i>Polygonum</i> L.	II. 71	
— <i>laxa</i> Aschers. et Gr.	I. 139		— <i>amphibium</i> L.	II. 72 n IV. 54	
— <i>memoralis</i> L.	I. 137 n	IV. 19	— α . <i>aquaticum</i> Mart.	II. 73	
— γ . <i>coarctata</i> Gaud.	IV. —		— — — — — <i>Leyss.</i>	IV. 54	
— β . <i>firma</i> Gaud.	I. 137 n	IV. —	— α . <i>natans</i> Moench.	II. 73	
— γ . <i>rigidula</i> herb. Goldb.	I. 137		— β . <i>terrestre</i> Leers.	II. —	
— δ . <i>vivipara</i>	I. 138		— β . — — — — — <i>Leyss.</i>	IV. 54	
— α . <i>vulgaris</i> Gaud.	I. 137		— <i>angustifolium</i> Roth.	II. 77	
— <i>memorosa</i> L.	I. —		— <i>aviculare</i> L.	II. 77 n IV. 57	
— <i>palustris</i> (L.) Roth. I. 138 n	IV. 19		— <i>angustifolium</i> herb. Goldb.	II. 78	
— β . <i>depauperata</i> Aschers. et Gr. IV. —			— <i>angustissimum</i> Meisn.	II. —	
— α . <i>glabrata</i> Aschers.	IV. —		— <i>erectum</i> Hayne.	IV. 58	
— <i>pratensis</i> L.	I. 141		— — — — — subf. <i>diversifolium</i> (Schur) Aschers. et Gr.	IV. —	
— γ . <i>angustifolia</i> Sm.	I. —		— β . <i>erectum</i> Roth.	II. 78	
— — — — — <i>1. straminea</i> Roth.	IV. 20		— γ . <i>neglectum</i> Bess.	II. —	
— β . <i>Lejeunii</i> Dum. (sp.).	I. 141		— — — — — (Bess.) Rchb.	IV. 58	
— ϵ . <i>pubescens</i> Goldb.	I. —		— <i>parvulum</i> Zapal.	IV. —	
— ϵ . <i>setacea</i> Doell.	IV. 20		— α . <i>procumbens</i> (Gilib.) Ledb.	II. 78	
— <i>straminea</i> Roth.	IV. —		— — — — — <i>Hayne.</i>	IV. 59	
— δ . <i>strigosa</i> Hoffm.	I. 141		— — — — — subf. <i>virgatum</i> (Petersm.) Aschers. et Gr.	IV. —	
— α . <i>vulgaris</i> Aschers. et Gr.	I. —		— — — — — subf. <i>vulgaris</i> (Kittel.) Aschers. et Gr.	IV. —	
— <i>quadripedalis</i> Ehrh.	I. 139		— — — — — <i>petiolatum</i> (O. Kuntze) Aschers. et Gr.	IV. —	
— <i>serotina</i> Ehrh.	I. 138		— — — — — <i>rotundifolium</i> Schur.	IV. 58	
— — — — — <i>Schröd.</i>	I. 137		— — — — — <i>triviale</i> Rchb.	IV. —	
— <i>silvatica</i> Vill.	I. 139		— — — — — subf. <i>arenastrum</i> (Gen-til.) Aschers. et Gr.	IV. —	
— <i>strigosa</i> Hoffm.	I. 141		— — — — — subf. <i>ovalifolium</i> (Alfr. Lehm.) Aschers. et Gr.	IV. —	
— <i>sudetica</i> Haenke.	I. 139		— <i>Bistorta</i> L.	II. 72 n IV. 54	
— <i>trivialis</i> L.	I. 140 n	IV. 20	— — — — — ssp. <i>latifolium</i> Hayne. IV. —		
— — — — — <i>coarctata</i> Kauffm.	I. 140		— — — — — β . <i>griseum</i> (Beck) Aschers. et Gr.	IV. —	
— β . <i>effusa</i> Aschers. et Gr.	I. —		— — — — — α . <i>nitens</i> (F. et M.) Aschers. et Gr.	IV. —	
— — — — — <i>clatior</i> Kauffm.	I. 141		— — — — — <i>macrophyllum</i> (Zapal.). IV. —		
— — — — — <i>microstachya</i> Kauffm.	I. —		— — — — — <i>puberulum</i> (Beck) Aschers. et Gr.	IV. —	
— — — — — <i>mosquensis</i> Hoffm.	I. 140		— <i>Convolvulus</i> L.	II. 79	
— δ . <i>multiflora</i> Rchb.	I. 141		— <i>dubium</i> Stein.	II. 76	
— ϵ . <i>pallens</i> Stebl. et Volkh.	IV. 20		— <i>dumetorum</i> L.	II. 79	
— — — — — γ . <i>semineutra</i> Trin.	I. 141		— <i>Fagopyrum</i> L.	II. 80	
— — — — — α . <i>vulgaris</i> Rchb.	I. 140		— <i>hybridum</i> Chaubard.	II. 76	
Polemoniaceae Vent.	III. 46		— <i>Hydropiper</i> L.	II. 76 n IV. 56	
<i>Polemonium</i> L.	III. 47		— — — — — α . <i>vulgaris</i> Meisn.	IV. —	
— <i>coeruleum</i> L.	III. —		— — — — — <i>1. ciliatum</i> Schur.	IV. —	
<i>Polygala</i> L.	II. 334		— — — — — <i>3. radicans</i> Schur.	IV. —	
— <i>amara</i> L.	II. 336 n	IV. 123	— — — — — <i>2. ramosissimum</i> Zapal.	IV. —	
— — — — — <i>var. austriaca</i> Crantz.	IV. —		— — — — — <i>5. remotum</i> Zapal.	IV. —	
— α . <i>genuina</i> Koch.	II. 336		— — — — — <i>1. simplex</i> Zapal.	IV. —	
— <i>amarella</i> Crantz.	II. 336 n	IV. 123	— <i>incanum</i> Schmidt.	II. 74	
— — — — — α . <i>uliginosa</i> Rchb.	IV. —		— <i>lapathifolium</i> L.	II. 73, 75 n IV. 55	
— <i>comosa</i> Schkuhr.	II. 335 n	IV. —	— — — — — β . <i>incanum</i> Kauffm.	II. 74	
— — — — — <i>var. leucostachys</i> Borb.	IV. —		— — — — — — — — — <i>Schmidt.</i>	II. —	
— <i>uliginosa</i> Rchb.	II. 336		— — — — — γ . <i>nodosum</i> Koch.	II. —	
— <i>vulgaris</i> L.	II. 334, 335 n	IV. 122			
— — — — — γ . <i>elata</i> [Maxim.].	II. 334				
— — — — — β . <i>elongata</i> Mart.	II. —				
— — — — — α . <i>genuina</i> Cel.	IV. 122				
— — — — — δ . <i>Lejeunei</i> Borb. (sp.).	IV. 123				
— — — — — γ . <i>oxyptera</i> Rchb. (sp.).	IV. 122				
— — — — — — — — — <i>collinum</i> Rchb.	IV. —				
— — — — — — — — — <i>pratense</i> Rchb.	IV. —				

<i>Polygonum lapath.</i> 7.—Pers (sp.). . . IV. 55	<i>Potamogeton alpinus</i> Balbis & pur-
— — β . <i>tomentosum</i> Schrank (sp.). IV. —	— <i>purascens</i> Seidel. . . I. 75 n IV. 9
— — subf. <i>prostratum</i> Wimm. IV. —	— <i>complanatus</i> Willd. . . I. 79
— — α . <i>typicum</i> G. Beck. . . IV. —	— <i>compressus</i> L. . . I. —
— — subf. <i>prostratum</i> Aschers. . . IV. —	— <i>crispum</i> L. . . I. 78
— et Gr. . . IV. —	— <i>crispus</i> L. . . I. —
— — α . <i>typicum</i> Kauffm. . . II. 73	— — α . <i>serrulatus</i> Rehb. . . I. —
— minus Ait. . . II. 77	— <i>Friesii</i> Rupr. . . I. 80
— — Curt. . . II. —	— <i>Goldbachii</i> Borchm. herb. . . I. 79
— — Hud. . . II. 77 n IV. 56, 57	— <i>gramineus</i> L. . . I. 77 n IV. 10
— — α . <i>commune</i> A. Br. . . IV. 57	— — α . <i>graminifolius</i> Fries. . . I. 78
— — 2. <i>interruptum</i> Meisn. IV. —	— — β . <i>heterophyllus</i> Fries. . . I. 78 n IV. 9
— — 1. <i>subcontinuum</i> Meisn. IV. —	— — γ . <i>terrestris</i> Fries. . . I. 78
— — β . <i>Niemirowiense</i> Zapal. IV. —	— <i>lucens</i> L. . . I. 77 n IV. 9
— — 2. <i>interruptum</i> Meisn. IV. —	— — β . <i>acuminatus</i> Fries. . . IV. —
— — 1. <i>subcontinuum</i> Meisn. IV. —	— — γ . <i>nitens</i> (Willd.) Cham. . . IV. —
— minus L. . . II. 77	— — α . <i>vulgaris</i> Cham. . . IV. —
— mite Coss. et Germ. . . II. 76	— <i>mucronatus</i> Schrad. . . I. 80 n IV. 10
— — β . <i>minus</i> Coss. et Germ. . . II. 77	— <i>natans</i> L. . . I. 74 n IV. 9
— — α . <i>typicum</i> Kauffm. . . II. 76	— — β . <i>ovalifolius</i> Fieber. . . IV. —
— mite Schrank. . . II. 76 n IV. 56	— — γ . <i>pygmaeus</i> Gaud. . . IV. —
— nodosum Pers. . . II. 75 n IV. 55	— — α . <i>vulgaris</i> Koch. et Ziz. . . IV. —
— <i>Persicaria</i> L. . . II. 75 n IV. —	— <i>obtusifolius</i> Mert. et Koch. . . I. 79
— <i>tomentosum</i> Schrank. II. 73, 74 n IV. 54	— <i>pectinatus</i> L. . . I. 81 n IV. 10
— — α . <i>incanum</i> Schmidt. II. 74 n IV. 55	— — γ . <i>interruptus</i> Kit. I. 82 n IV. —
— — γ . <i>prostratum</i> Aschers. . . II. 74	— — α . <i>scoparius</i> Wallr. I. 82 n IV. —
— — β . <i>viride</i> Litw. II. 74 n IV. 55	— — β . <i>tenuifolius</i> Mert. et Koch. IV. —
<i>Polypodiaceae</i> Mart. . . I. 37	— <i>perfoliatum</i> L. . . I. 76
<i>Polypodium cristatum</i> L. . . I. 43	— <i>perfoliatus</i> L. . . I. —
— <i>dentatum</i> Hoffm. . . I. 38	— — β . <i>cordato-lanceolatus</i> Mert. et Koch. . . I. —
— <i>Dryopteris</i> L. . . I. 40	— — α . <i>typicus</i> Aschers. et Gr. . . I. —
— <i>Filix femina</i> St. . . I. 38	— <i>planicaulis</i> Goldb. . . I. 79
— <i>Filix mas</i> L. . . I. 42	— <i>praelongus</i> Wulf. . . I. 76 n IV. 9
— <i>fragilis</i> St. . . I. 39	— <i>pusillum</i> L. . . I. 80
— <i>molle</i> All. . . I. 38	— <i>pusillus</i> L. . . I. 80 n IV. 10
— <i>Phegopteris</i> L. . . I. 40	— — δ . <i>capitatus</i> A. Bennett. . . IV. —
<i>Polystichum cristatum</i> Roth. . . I. 43	— — <i>major</i> Fries. . . I. 80
— <i>Filix mas</i> Roth. . . I. 42	— — β . <i>squarrosus</i> Aschers. et Gr. . . I. 81 n IV. 10
— <i>Oreopteris</i> DC. . . I. —	— — γ . <i>tenuissimus</i> Mert. et Koch. . . I. 81 n IV. —
— <i>spinulosum</i> DC. . . I. 43	— — α . <i>vulgaris</i> Fries. I. 81 n IV. —
— — <i>dilatatum</i> Koch. . . I. 44	— <i>rufescens</i> Schrad. . . I. 75
— — <i>vulgare</i> Koch. . . I. —	— <i>zosteriaefolius</i> Schum. . . I. 79
— <i>Thelypteris</i> Roth. . . I. 41	<i>Potamogetonaceae</i> Aschers. . . I. 73
<i>Populus</i> L. . . II. 37	<i>Potentilla</i> L. . . II. 251 n IV. 98
— <i>alba</i> L. . . II. 39	— <i>alba</i> L. . . II. 254 n IV. —
— <i>angulata</i> Ait. . . II. 41	— <i>anserina</i> L. . . II. 268 n IV. 106
— <i>balsamifera</i> L. . . II. 42	— — <i>var. nuda</i> Gaud. . . IV. —
— — α . <i>suaveolens</i> Loud. . . II. —	— — <i>var. sericea</i> Hayne. II. 268 n IV. —
— <i>berolinensis</i> Dippel. . . II. 44	— — <i>var. vulgaris</i> Hayne. . . IV. —
— — Koch. . . II. —	— — <i>f. incisa</i> Th. Wolf. . . IV. —
— <i>canadensis</i> Desf. . . II. 40	— <i>arenaria</i> Borkh. . . II. 265 n IV. 105
— — Moench. . . II. —	— — <i>f. concolor</i> Th. Wolf. . . IV. —
— <i>candicans</i> Ait. . . II. 41	— — α . <i>cuneifolia</i> Th. Wolf. . . II. 266 n IV. —
— <i>italica</i> Duroi \times <i>laurifolia</i> Ledb. II. 44	— — <i>f. discolor</i> Th. Wolf. . . IV. —
— <i>laurifolia</i> Ledb. . . II. 43	— — <i>f. eglandulosa</i> Th. Wolf. . . IV. —
— <i>moskoviensis</i> Schroeder. . . II. —	— — <i>f. glandulosa</i> Th. Wolf. . . IV. —
— <i>nigra</i> L. . . II. 40	— — <i>f. longifolia</i> Th. Wolf. . . IV. —
— <i>suaveolens</i> Fisch. . . II. 42	— <i>arenaria</i> \times <i>thuringiaca</i> v. <i>elongata</i> IV. —
— <i>suaveolens</i> \times <i>laurifolia</i> Schroeder. II. 43	— <i>arenaria</i> \times <i>thyrsiflora</i> . . . II. 258 n IV. 102
— <i>tremula</i> L. . . II. 39	— <i>argentea</i> L. . . II. 255 n IV. 98
<i>Portulacaceae</i> Juss. . . II. 96	— — <i>var. decumbens</i> (Jord.) Focke. IV. 99
<i>Potamogeton</i> L. . . I. 73	— — β . — Jord. . . II. 256
— <i>alpinus</i> Balbis. . . I. 75 n IV. 9	
— — β . <i>angustifolius</i> Aschers. . . IV. —	
— et Gr. . . IV. —	
— — γ . <i>obscurus</i> (DC.) Aschers. . . IV. —	
— et Gr. . . IV. —	

<i>Potentilla argentea</i> L. β . var. <i>dissecta</i>	Wallr. II. 256 n IV. 99
— — 2. <i>cinerascens</i> Th. Wolf.	IV. —
— — 1. <i>viridescens</i> Th. Wolf.	IV. —
— — var. <i>incanescens</i> (Opiz.)	Focke. IV. 100
— — 2. <i>angustisecta</i> (Saut.)	Th. Wolf. IV. —
— — 1. <i>latisecta</i> Th. Wolf.	IV. —
— — δ . <i>incanescens</i> Opiz.	II. 256
— — var. <i>perincisa</i> Borbas.	II. —
— — 7. <i>tenuiloba</i> Jord.	II. —
— — var. — Swartz.	IV. 99
— — α . <i>typica</i> Beck. II. 256 n	IV. 100
— — 2. <i>angustisecta</i> (Saut.)	Th. Wolf. IV. —
— — 1. <i>latisecta</i> Th. Wolf.	IV. —
— — <i>argentea</i> \times <i>leucopolitana</i> .	IV. 103
— — <i>argentea</i> \times <i>thyrsiflora</i> . II. 256 n	IV. 100
— — <i>argenteiformis</i> Kauffm.	II. 258 n IV. 101
— — <i>canescens</i> Bess.	II. 254
— — DC.	II. 260
— — <i>cinerea</i> Chaix.	II. 265
— — <i>collina</i> Wibel. . II. 256, 258 n	IV. 100
— — <i>erecta</i> (L.) Zimm.	II. 266
— — <i>fruticosa</i> L.	II. 253
— — <i>hirta</i> L.	II. 260
— — <i>incana</i> Fl. Wett.	II. 265
— — <i>intermedia</i> L.	II. 260 n 262
— — 7. <i>canescens</i> Rupr.	II. 261 n IV. 103
— — β . <i>composita</i> Rupr.	II. 261
— — α . <i>typica</i> Rupr.	II. —
— — <i>leucopolitana</i> P. I. Müller.	IV. 102
— — var. <i>pliodonta</i> Th. Wolf.	IV. —
— — var. <i>Schultzii</i> (P. I. Müller)	Th. Wolf. IV. —
— — <i>leucopolitana</i> \times <i>thyrsiflora</i>	IV. —
— — <i>leucopolitanoides</i> Blocki.	IV. —
— — <i>Nestleriana</i> Tratt.	II. 263
— — <i>norvegica</i> L.	II. 259 n IV. 103
— — var. <i>degenerata</i> Lehm.	IV. —
— — β . <i>ruthenica</i> Willd.	II. 260
— — α . <i>varians</i> Moench (sp.).	II. —
— — <i>obscura</i> Mart.	II. —
— — Willd.	II. 260 n 262
— — <i>okensis</i> Petunn.	II. 265 n IV. 105
— — <i>opaca</i> L.	II. 264 n IV. 104
— — f. <i>glandulosa</i> Th. Wolf.	IV. 105
— — <i>opaciformis</i> Th. Wolf.	IV. 104
— — <i>palustris</i> Scop.	IV. 107
— — <i>paradoxa</i> Nutt.	IV. 103
— — <i>patula</i> W. K.	II. 264 n IV. 104
— — <i>recta</i> L.	II. 262 n IV. 103
— — var. <i>pallida</i> Lam. et DC.	IV. 104
— — <i>reptans</i> L.	II. 267 n IV. 105
— — <i>rubens</i> Zimm.	II. 264 n IV. 104
— — <i>Ruthenica</i> Willd.	II. 260 n IV. 103
— — <i>silvestris</i> Neck.	II. 266 n IV. 105
— — 7. <i>latiloba</i> Aschers. et Gr.	II. 267 n IV. —
— — f. <i>macrophylla</i> Paiche.	IV. —
— — β . <i>strictissima</i> Beck.	II. 267 n IV. —
— — α . <i>typica</i> Beck.	II. 267 n IV. —
— — <i>supina</i> L.	II. 259 n IV. 103

<i>Potentilla supina</i> L. f. <i>elatior</i> Lehm. IV. 103	
— — var. <i>paradoxa</i> (Nutt.) Th. Wolf.	IV. —
— — <i>thuringiaca</i> Bernh.	II. 262
— — α . <i>elongata</i> (Ser.) Th. Wolf.	II. —
— — b. <i>humilior</i> Rupr.	II. —
— — a. <i>major</i> Rupr.	II. —
— — β . <i>Goldbachii</i> Rupr. (sp.).	II. 263
— — <i>thyrsiflora</i> Hülsen. . II. 257 n	IV. 101
— — (Hüls.) Zimm.	IV. —
— — var. <i>argenteiformis</i> (Kauffm.)	Th. Wolf. IV. —
— — <i>Tormentilla</i> Neck.	IV. —
— — Scop.	II. 266
— — <i>varians</i> Moench.	IV. 103
— — <i>verna</i> L.	II. 265
— — <i>Wibeliana</i> Th. Wolf.	IV. 100
— — <i>Poterium</i> L.	II. 240
— — <i>Sanguisorba</i> L.	II. —
— — <i>Prenanthes muralis</i> L.	III. 331
— — <i>Primula</i> L.	III. 27
— — <i>elatior</i> Jacq.	III. 28
— — <i>officinalis</i> Jacq.	III. —
— — <i>veris</i> (L. excl. var. β . et γ .) Huds.	III. —
— — L.	III. —
— — β . <i>Elatior</i> Mart.	III. —
— — α . <i>officinalis</i> Mart.	III. —
— — <i>vulgaris</i> Sm.	III. —
— — <i>Primulaceae</i> Vent.	III. 20
— — <i>Prunella grandiflora</i> Moench.	III. 113
— — <i>vulgaris</i> L.	III. 112
— — β . <i>grandiflora</i> Steph.	III. 113
— — <i>Prunus</i> L.	II. 279
— — <i>Chamaecerasus</i> Jacq.	II. 281
— — <i>Cerasus</i> L.	II. 282
— — <i>domesticus</i> L.	II. 281
— — <i>fruticosa</i> Pall.	II. 281 n IV. 109
— — β . <i>dispar</i> Beck.	IV. —
— — α . <i>typica</i> Beck.	IV. —
— — <i>nana</i> Stokes.	II. 281
— — <i>Padus</i> L.	II. 282 n IV. 109
— — α . <i>typica</i> Koehne.	IV. —
— — 1. <i>genuina</i> Aschers. et Gr.	IV. —
— — <i>spinosa</i> L.	II. 280 n IV. —
— — β . <i>dasyphylla</i> Schur. II. 280 n	IV. —
— — α . <i>typica</i> C. K. Schneid.	IV. —
— — f. <i>coactanea</i> (W. et G.)	Aschers. et Gr. IV. —
— — <i>virginiana</i> L.	II. 283
— — <i>Psilonema calycinum</i> C. A. Mey.	II. 198
— — <i>Ptarmica cartilaginea</i> Ledeb.	III. 263
— — <i>Pteridium Gleditsch</i>	I. 46
— — <i>aquilinum</i> Kuhn.	I. —
— — <i>Pteris aquilina</i> L.	I. —
— — <i>Pulicaria Gaertn</i>	III. 252
— — <i>prostrata</i> (Gilib.) Aschers.	III. —
— — <i>vulgaris</i> Gaertn.	III. —
— — <i>Pulmonaria</i> L.	III. 56
— — <i>angustifolia</i> L.	III. 57
— — Mart.	III. —
— — <i>azurea</i> Bess.	III. —
— — <i>officinalis</i> L.	III. —
— — α . <i>obscura</i> Dumort.	III. —
— — <i>Pulsatilla Tourn</i>	II. 148
— — <i>patens</i> (L.) Mill.	II. —
— — <i>pratensis</i> Mill.	II. —
— — <i>vulgaris</i> Mill.	II. —

<i>Pyrethrum Balsamita</i> Willd.	III. 266	<i>Ranunculus Flammula</i> β . <i>serratus</i> DC.	IV. 80
— <i>inodorum</i> Sm.	III. 270	— <i>typicus</i> Beck.	IV. 79
<i>Pyrola chlorantha</i> Swartz.	III. 6	— <i>fluitans</i> Lam.	II. 153 n IV. 77
— <i>media</i> Swartz.	III. 7	— <i>fluvialis</i> Wigg.	II. 153
— <i>minor</i> L.	III. 8	— <i>heterophyllus</i> Wigg.	II. —
— <i>rotundifolia</i> L.	III. 6	— <i>illyricus</i> L.	II. 159
— <i>secunda</i> L.	III. 10	— <i>Kaffmannii</i> Clerc.	IV. 77
— <i>umbellata</i> L.	III. 9	— <i>Lingua</i> L.	II. 158 n IV. 80
— <i>uniflora</i> L.	III. 8	— α . <i>hirsutus</i> Wallr.	II. 158 n IV. —
— <i>virens</i> Schweigg. et Koerthe.	III. 6	— <i>typicus</i> Beck.	IV. —
<i>Pyrus communis</i> L.	II. 277	— <i>memorosus</i> DC.	II. 162 n IV. 81
— <i>Malus</i> L.	II. 278	— <i>polyanthemos</i> L.	II. 161 n IV. —
<i>Quercus</i> L.	II. 52	— γ . <i>fl. pleno</i>	II. 161 n IV. —
— <i>pedunculata</i> Ehrh.	II. —	— α . <i>glaber</i> Wimm. et Grab.	II. 161 n IV. —
— <i>robur</i> L.	II. —	— β . <i>latifolius</i> Rupr.	IV. —
— α . <i>Annenkowi</i> Kauffm.	II. 53	— β . <i>memorosus</i> Kauffm.	II. 162
<i>Quinaria hederacea</i> Rafinsque.	II. 354	— <i>polyphyllus</i> W.K.	II. 158
<i>Ramischia</i> Opiz	III. 10	— <i>pseudoflaccidus</i> Petunn.	II. 153 n IV. 77
— <i>secunda</i> Garcke.	III. —	— α . <i>emersus</i> Petunn.	II. 154
<i>Ranunculaceae</i> Juss.	II. 134	— <i>repens</i> L.	II. 162 n IV. 81
<i>Ranunculus</i> L.	II. 151 n IV. 77	— <i>erectus</i> DC.	IV. —
— <i>acer</i> L.	II. 169	— <i>glaberrimus</i> Koch.	IV. —
— α . <i>hortensis</i> Mart.	II. 161 n IV. 80	— <i>hirsutus</i> Koch.	IV. —
— <i>aconitifolius</i> L.	II. 160	— <i>myrrhiphyllus</i> Wallr.	IV. —
— <i>acris</i> L.	II. —	— <i>parviflorus</i> Busch.	IV. —
— <i>aquatilis</i> auct. pl. mosq.	II. 155	— <i>procumbens</i> Gaud.	IV. —
— L.	II. 153	— <i>typicus</i> Beck.	IV. —
— β . <i>brevifolius</i> Rossm.	II. —	— <i>reptans</i> L.	II. 157
— <i>auricomus</i> L.	II. 159 n IV. 80	— <i>rigidus</i> Hoffm.	II. 155
— β . <i>cassubicus</i> Kauffm.	II. 160	— <i>sceleratus</i> L.	II. 163
— β . <i>fallax</i> Wimm. et Grab.	IV. 80	<i>Raphanus</i> Tourn.	II. 210
— α . <i>incisifolius</i> (Rchb.) Rupr.	II. 160 n IV. —	— <i>Raphanistrum</i> L.	II. —
— α . <i>typicus</i> Kauffm.	II. 159 n IV. —	— <i>sativus</i> L.	II. —
— <i>bulbosus</i> L.	II. 162	<i>Rapistrum paniculatum</i> Gaertn.	II. 207
— <i>caespitosus</i> Thuill.	IV. 78	<i>Rhamnaceae</i> R.Br.	II. 352
— <i>campestris</i> Mart.	II. 162	<i>Rhamnus</i> L.	II. —
— <i>carinatus</i> (Schur) Freyn.	IV. 78	— <i>cathartica</i> L.	II. —
— var. <i>Kauffmannii</i> (Clerc)	IV. 78 n IV. 79	— <i>Frangula</i> L.	II. 353
— Petunn.	IV. 78 n IV. 79	<i>Rhinanthus Crista galli</i> L.	III. 166
— <i>cassubicus</i> L.	II. 160 n IV. 80	— α . <i>fallax</i> Wimm.	III. 168
— α . <i>elator</i> Rupr.	IV. —	— β . <i>major</i> Kauffm.	III. 167
— α . <i>fallax</i> Wimm. et Grab.	II. 160 n IV. —	— β . <i>minor</i> Ehrh.	III. —
— <i>circinatus</i> Sibth.	II. 155 n IV. 79	— α . — Kauffm.	III. 167 n 168
— var. <i>petiolatus</i> Zapal.	IV. —	— γ . <i>villosus</i> Kauffm.	III. 166
— <i>confervoides</i> Fries.	II. 154	— <i>major</i> Ehrh.	III. —
— α . <i>terrestris</i> Freyn.	II. 155 n IV. 78	— <i>minor</i> Ehrh.	III. 167
— <i>divaricatus</i> Schrank.	II. 155	— <i>villosus</i> Pers.	III. 166
— α . <i>aquatilis</i>	II. —	<i>Rhynchospora</i> Vahl.	I. 168
— β . <i>terrestris</i>	II. 154	— <i>alba</i> Vahl.	I. 168 n IV. 25
— <i>Ficaria</i> L.	II. 163	<i>Ribes</i> L.	II. 221
— <i>flaccidus</i> Boenng.	II. 153	— <i>alpina</i> L.	II. 222
— Pers.	II. 153 n IV. 77	— <i>aureum</i> Pursch.	II. 224
— <i>Flammula</i> L.	II. 156 n IV. 79	— <i>Grossularia</i> L.	II. 222
— α . <i>erectus</i> Neilr.	IV. —	— α . <i>uva-crispa</i> L.	II. —
— subf. <i>natans</i> Glück.	IV. 80	— <i>nigrum</i> L.	II. 223 n IV. 89
— subf. <i>submersus</i> Glück.	IV. —	— <i>pubescens</i> Hedl.	IV. —
— δ . <i>gracilis</i> G. Mey.	II. 156 n IV. —	— <i>rubrum</i> L.	II. 223 n IV. 88
— γ . <i>pilifer</i> Beck.	IV. —	— var. <i>pubescens</i> Schwarz.	IV. 89
— ϵ . <i>reptans</i> L. (sp)	II. 157 n IV. —	— <i>spinosa</i> L. β . <i>Uva-crispa</i> auct.	II. 222
		— <i>spinosum</i> Lam.	II. —
		— α . <i>glanduloso-setosum</i> Koch.	II. —
		— <i>Uva crispa</i> L.	II. —
		<i>Robinia Caragana</i> L.	II. 302
		— <i>frutescens</i> L.	II. —
		— <i>pygmaea</i> L.	II. 303
		<i>Rosa</i> L.	II. 231

<i>Rosa alpina</i> L.	II. 236	<i>Rumex Acetosella</i> L. c. <i>integrifolius</i>	
— <i>canina</i> L.	II. 233	(Wallr.) Aschers. et Gr. . . .	IV. 53
— <i>centifolia</i> L.	II. —	— — subspatulatus	IV. —
— <i>cinnamomea</i> L.	II. 234	(Trautv.) Aschers. et Gr. . .	IV. —
— — <i>β. glabrifolia</i> C.A.Mey. .	II. 235	— — <i>b. lanceolatus</i> (Wallr.)	IV. —
— — — <i>b. subglobosa</i> Petunn. .	II. —	Aschers. et Gr.	IV. —
— — — <i>a. typica</i>	II. —	— — <i>a. latifolius</i> (Wallr.) .	IV. —
— — <i>α. vulgaris</i> C.A.Mey. . .	II. —	Aschers. et Gr.	IV. —
— — — <i>elliptica</i> C.A.Mey. . .	II. —	— — — <i>umbrosa</i> (Beck) . .	IV. —
— — — <i>subglobosa</i> C.A.Mey. .	II. —	Aschers. et Gr.	IV. —
— — — <i>turbinella</i> C.A.Mey. .	II. —	— — — <i>d. rubripunctatus</i> (Beck)	IV. 54
— <i>gallica</i> L.	II. 232	Aschers. et Gr.	IV. 67
— — <i>α. centifolia</i> L. (sp.) . .	II. 233	— <i>acutus</i> L.	II. 67
— <i>lutea</i> Mill.	II. 237	— <i>alpinus</i> L.	II. 68
— <i>pendulina</i> L.	II. 236	— — MB.	II. —
— — <i>β. alpina</i> L. (sp.)	II. —	— <i>aquaticus</i> L.	II. 67 n IV. 52
— — <i>α. lagenaria</i> Vill.	II. —	— — <i>α. heleolapathum</i> Rouy. .	IV. —
— <i>pimpinellifolia</i> L.	II. —	— <i>β. hippolapathum</i> Rouy. .	IV. —
— <i>rubrifolia</i> Vill.	II. 233	— <i>aquaticus</i> × <i>confertus</i> . . .	II. 68
— <i>rugosa</i> Thunb.	II. 235	— <i>auriculatus</i> Wallr.	II. 69
— — <i>α. flore pleno</i> Hort. . . .	II. 236	— <i>confertus</i> Willd.	II. 68 n IV. 52
— <i>solstitialis</i> Bess.	II. 233	— — <i>α. denudatus</i> Zapal. . . .	IV. —
Rosaceae Juss.	II. 224	— <i>crispus</i> L.	II. 65 n IV. —
Rubiaceae Juss.	III. 184	— — <i>γ. nudivalvis</i> Meisn. II. 66 n	IV. —
Rubus L.	II. 243	— — <i>α. trigranulatus</i> Bosv. . .	IV. —
— <i>arcticus</i> L.	II. 244 n IV. 97	— — — <i>integerrimus</i> Schur. . .	IV. —
— <i>caesius</i> L.	II. 247 n IV. —	— — — <i>subcordatus</i> Warren. .	IV. —
— — <i>α. aquaticus</i> Wh. et N. . .	IV. —	— — <i>β. unicallosus</i> Petern. . .	II. 65 n IV. —
— — <i>γ. arvalis</i> Rehb.	IV. —	— <i>domesticus</i> Hartm.	II. 66
— — <i>β. dunensis</i> Noelcke . . .	IV. —	— <i>Hydrolapathum</i> Huds. II. 65 n	IV. 52
— <i>caesio</i> × <i>idaeus</i> G.F.W.Mey. .	II. 246	— — <i>α. bugensis</i> Zapal.	IV. —
— <i>chamaemorus</i> L.	II. 243 n IV. 96	— <i>limosus</i> Thuill.	II. 63 n IV. 50 n 51
— <i>corylifolius</i> Smith.	II. 247	— <i>maritimus</i> L.	II. 63 n IV. 50 n 51
— <i>fruticosus</i> L.	II. 246	— — <i>β. palustris</i> Sm.	II. 63
— — <i>β. corylifolius</i> Smith. . .	II. 247	— <i>maximus</i> Schreb.	II. 64 n 67
— — <i>β. Nessensis</i> (W. Hall.)	II. 246	— <i>multifidus</i> L.	II. 70
— <i>Kauffm.</i>	II. 246	— <i>obtusifolius</i> L.	II. 64 n IV. 51
— <i>idaeus</i> L.	II. 245 n IV. 97	— — <i>β. agrestis</i> Fries. II. 64 n	IV. 52
— — <i>α. angustifolius</i> Schmidely .	IV. —	— — <i>α. silvestris</i> Fries.	IV. 51
— — <i>β. inciso-serratus</i> Utsch. .	IV. —	— <i>palustris</i> Sm.	II. 63 n IV. —
— <i>nemorosus</i> Hayne.	II. 247	— <i>pseudo-alpinus</i> Hoffm. . . .	II. 68
— <i>odoratus</i> L.	II. 244	— <i>rossicus</i> Murb.	IV. 51
— <i>saxatilis</i> L.	II. 245	— <i>thyrsiflorus</i> Fingerh.	IV. 53
— <i>suberectus</i> Anders.	II. 246	— <i>ucranicus</i> Fisch.	II. 64
Rudbeckia L.	IV. 150		
— <i>hirta</i> L.	IV. —		
Rumex	II. 61		
— <i>Acetosella</i> L.	II. 69 n IV. 53	Sagina L.	II. 115
— — <i>β. angulatus</i> Beck.	II. 70	— <i>nodosa</i> (L.) Fenzl.	II. 116 n IV. 69
— — <i>β. auriculatus</i> Koch. . . .	II. 69	— — <i>α. glandulosa</i> (Bess.) Aschers.	IV. —
— — <i>α. —</i> Wallr. II. 69 n IV. 53	IV. —	— — <i>α. pubescens</i> Koch. II. 116 n	IV. —
— — <i>ssp. pratensis</i> Wallr. . . .	IV. —	— <i>procumbens</i> L.	II. 115 n IV. —
— — — <i>c. angustifolius</i> (Beck)	IV. —	— — <i>β. bryoides</i> (Fröhl.) Hausm.	IV. —
Aschers. et Gr.	IV. —	— — <i>α. glaberrima</i> Neilr. . . .	IV. —
— — — <i>d. crispus</i> (Roth) . . .	IV. —	— — <i>γ. intermixta</i> Beck. . . .	IV. —
Aschers. et Gr.	IV. —	Sagittaria L.	I. 88
— — — <i>b. oblongifolius</i> (W. et G.)	IV. —	— <i>natans</i> Mart.	I. —
Aschers. et Gr.	IV. —	— <i>sagittifolia</i> L.	I. —
— — — <i>a. ovalifolius</i> (W. et G.)	IV. —	— — <i>α. Bollei</i> Aschers. et Gr. .	I. —
Aschers. et Gr.	IV. —		
— <i>Acetosella</i> L.	II. 70 n IV. 53	Salicaceae Rich.	II. 7
— — <i>angustifolius</i> Koch.	II. 70	Salix L.	II. —
— — <i>β. integrifolius</i> Wallr. . . .	II. —	— <i>acuminata</i> Hoffm.	II. 26 n 28
— — <i>β. multidentatus</i> DC. . . .	IV. 54	— — Sm.	II. 35
— — <i>β. multifidus</i> L.	II. 70	— <i>acutifolia</i> Willd.	II. 33
— — <i>γ. umbrosus</i> Beck.	II. —	— — <i>livonica</i> Goldb.	II. —
— — <i>α. vulgaris</i> Koch.	IV. 53		

<i>Salix alba</i> L.	II. 47	<i>Salix livida</i> β . <i>cinerascens</i> Wahlenb.	II. 25
— α . <i>argentea</i> Wimm.	II. 18	— <i>longifolia</i> Host.	II. 35
— β . <i>coerulea</i> Wimm.	II. —	— <i>lutescens</i> Kern.	II. 30
— <i>alba</i> \times <i>fragilis</i> Ritschl.	II. —	— <i>monandra</i> Hoffm.	II. 36
— <i>alba</i> \times <i>pentandra</i> Ritschl.	II. 49	— <i>multinervis</i> Doell.	II. 30
— <i>alopeuroides</i> Tausch.	II. 17	— <i>myrsinites</i> L.	II. 22
— <i>Amanniana</i> Willd.	II. 22	— <i>myrtilloides</i> L.	II. 20 u IV. 50
— <i>ambigua</i> Ehrh.	II. 20	— <i>nigricans</i> Sm.	II. 22
— <i>amygdalina</i> auct. pl.	II. 17	— γ . <i>crassifolia</i> Wimm.	II. 23
— — L.	II. 16	— β . <i>eriocarpa</i> Koch.	II. 30
— β . <i>concolor</i> Koch.	II. —	— δ . <i>hermaphroditica</i> L. (sp.)	II. 23
— α . <i>discolor</i> Koch.	II. 17	— α . <i>lancifolia</i> Wimm.	II. —
— <i>angustifolia</i> Wulf.	II. 20	— β . <i>parvifolia</i> Wimm.	II. —
— <i>aquatica</i> Sm.	II. 29	— <i>onusta</i> Bess.	II. 21
— <i>aurita</i> L.	II. 25	— <i>palustris</i> Host.	II. 19
— β . <i>sublivida</i> Laestad.	II. 26	— <i>pentandra</i> L.	II. 14
— <i>aurita</i> \times <i>cinerea</i> Wimm.	II. 30	— <i>polyandra</i> de Bray.	II. —
— <i>aurita</i> \times <i>livida</i> Wimm.	II. 26	— <i>pentandra</i> \times <i>alba</i> Wimm.	II. 19
— <i>aurita</i> \times <i>myrtilloides</i> Wimm.	II. 21	— <i>phylicifolia</i> (L.) Sm.	II. 23
— <i>bicolor</i> Ehrh.	II. 23	— <i>pruinosa</i> Wendl.	II. 33
— <i>canescens</i> Fries.	II. 28	— <i>puberula</i> Doell.	II. 30
— <i>caprea</i> L.	II. 26	— <i>purpurea</i> L.	II. 36
— <i>caprea</i> \times <i>cinerea</i> Wimm.	II. 28 u 29	— — <i>Helix</i> Koch.	II. —
— <i>caprea</i> \times <i>Gmelini</i> Teplouch.	II. 35	— <i>purpurea</i> \times <i>repens</i> Wimm.	II. 37
— <i>caprea</i> \times <i>laponum</i> Wimm.	II. 28	— <i>pyriformis</i> Goldb.	II. 22
— <i>caprea</i> \times <i>nigricans</i> F. Brunner.	II. 27	— <i>Reichardtii</i> A. Kern.	II. 29
— <i>caprea</i> \times <i>phylicifolia</i> Wimm.	II. 24	— <i>repens</i> L.	II. 20
— <i>cerasifolia</i> Goldb.	II. 22	— — var. <i>angustifolia</i> Wulf.	II. —
— <i>cinerea</i> L.	II. 28	— — var. <i>rosmarinifolia</i> (L.) Koch.	II. —
— β . <i>aquatica</i> Sm.	II. 25 u 28	— <i>rosmarinifolia</i> Koch.	II. —
— α . <i>spuria</i> Wimm.	II. 29	— <i>rugulosa</i> Anders.	II. 21
— <i>cinerea</i> \times <i>repens</i> Wimm.	II. 31	— <i>spatulata</i> Willd.	II. 28
— <i>coerulescens</i> Doell.	II. 26	— <i>speciosa</i> Host.	II. 17
— <i>cuspidata</i> Schult.	II. 15	— — <i>Loud.</i>	II. 31
— <i>daphnoides</i> Vill.	II. 33	— <i>Starkeana</i> Willd.	II. 24
— — <i>acutifolia</i> Willd.	II. —	— <i>stipularis</i> Sm.	II. 33 u 34
— α . <i>praecox</i> Hoppe.	II. —	— <i>subsericea</i> Doell.	II. 31
— <i>dasyclados</i> Wimm.	II. 35	— <i>triandra</i> L.	II. 16
— <i>depressa</i> L.	II. 24	— α . <i>concolor</i> Koch.	II. —
— α . <i>velutina</i> Fries.	II. 25	— β . <i>discolor</i> Koch.	II. 17
— <i>depressa</i> \times <i>amygdalina</i> L.	II. 24	— — <i>glaucescens</i> Goldb.	II. —
— <i>Doniana</i> Sm.	II. 37	— — <i>virescens</i> Goldb.	II. 16
— <i>excelsior</i> Host.	II. 49	— <i>vagans</i> Anders.	II. 24
— <i>fragilis</i> L.	II. 14, 18 u IV. 50	— <i>versifolia</i> Wahlenb.	II. 32
— <i>fragilis</i> \times <i>alba</i> Wimm.	II. 18	— <i>viminialis</i> L.	II. 33, 35 u IV. 50
— <i>fragilis</i> \times <i>pentandra</i> Wimm.	II. 15	— <i>viridis</i> Fries.	II. 18
— <i>fragilis</i> \times <i>triandra</i> Wimm.	II. 17	— — β . <i>glabra</i> Wimm.	II. 19
— <i>Gmelini</i> Pall.	II. 33 u IV. 50	— β . <i>vestita</i> Wimm.	II. —
— — β . <i>pseudostipularis</i> Teplouch.	II. 34	— <i>vitellina</i> L.	II. 18
— — α . <i>subviminalis</i> Teplouch.	II. —	— <i>Weigeliana</i> Willd.	II. 23
— — γ . <i>Wobstii</i> (Schroed.) Teplouch.	II. —	<i>Salsola</i> L.	II. 94
— — <i>Helix</i> L.	II. 36	— <i>Kali</i> L.	II. 94 u IV. 64
— <i>hermaphroditica</i> L.	II. 23	— — <i>pseudotragus</i> Beck.	IV. —
— <i>hexandra</i> Ehrh.	II. 19	<i>Salvia</i> L.	III. 82
— <i>incubacea</i> Willd.	II. 20	— <i>glutinosa</i> L.	III. 83
— <i>Laestadiana</i> Hartm.	II. 28	— <i>memorosa</i> L.	III. 85 u IV. 141
— — <i>canescens</i> Anders.	II. —	— <i>pratensis</i> L.	III. 84
— <i>laponum</i> L.	II. 31	— — α . <i>fl. albo.</i>	III. —
— <i>laponum</i> \times <i>myrtilloides</i> Wimm.	II. 32	— <i>silvestris</i> L.	III. 84 u 85
— <i>latifolia</i> Forbes.	II. 27	— <i>verticillata</i> L.	III. 86
— <i>laurifolia</i> Wesmael.	II. 29	<i>Sambucus</i> L.	III. 200
— <i>laurina</i> Sm.	II. 24	— <i>Ebulus</i> L.	III. 200 u IV. 149
— <i>limosa</i> Wahlenb.	II. 31	— <i>nigra</i> L.	III. 201
— <i>livescens</i> Doell.	II. 26 u IV. 50	— <i>racemosa</i> L.	III. —
— <i>livida</i> Wahlenb.	II. 24	— — α . <i>serratifolia</i> Hort.	III. 202
— — α . <i>bicolor</i> Fries.	II. 25	— <i>rubra</i> Rupr.	III. 201
		— <i>Sanguisorba</i> L.	II. 239

<i>Sanguisorba officinalis</i> L. II. 240 n	IV. 96	<i>Scorzonera humilis</i> L. γ. <i>ramosa</i> GB. III. 327	
— <i>α. auriculata</i> (Scop.) Focke. IV. —		— <i>purpurea</i> L. III. 328	
<i>Sanicula</i> L. II. 396	II. 396	<i>Scrophularia</i> L. III. 132	
— <i>europaea</i> L. II. 396 n	IV. 135	— <i>alata</i> Gilib. III. 133	
— var. <i>genuina</i> Wolf. IV. —		— <i>aquatica</i> L. III. —	
<i>Santalaceae</i> R.Br. II. 58	II. 58	— <i>nodosa</i> L. III. 132	
<i>Saponaria</i> L. II. 114	II. 114	— <i>vernalis</i> L. III. 134	
— <i>officinalis</i> L. II. 114 n	IV. 68	<i>Scrophulariaceae</i> R. Br. III. 123	
— <i>genuina</i> Rouy et Fouc. IV. —		<i>Scutellaria</i> L. III. 110	
— <i>β. hortensis</i> Mart. II. 114	II. 114	— <i>galericulata</i> L. III. 111	
— <i>puberula</i> (Syme, in herb). Rouy et Fouc. IV. 68		— <i>α. pubescens</i> Benth. III. —	
— <i>α. typica</i> Beck. . II. 114 n	IV. —	— <i>hastifolia</i> L. III. —	
<i>Satureja</i> L. III. 81	III. 81	<i>Secale</i> L. I. 162	
— <i>Acinos</i> (L.) Scheele. III. —		— <i>cereale</i> L. I. 163	
<i>Clinopodium</i> Caruel. III. 82	III. 82	<i>Sedum</i> L. II. 213	
— <i>α. variegatum</i> Mart. III. —		— <i>acre</i> L. II. 215	
— <i>hortensis</i> L. IV. 141	IV. 141	— <i>β. sexangulare</i> L. II. —	
<i>Satyrion bifolium</i> Wahlb. I. 259	I. 259	— <i>Fabaria</i> Koch. II. —	
— <i>conopseum</i> Wahlb. I. 257	I. 257	— <i>maximum</i> Suter. II. 214	
— <i>Monorchis</i> Pers. I. 261	I. 261	— <i>purpurascens</i> Koch. II. —	
— <i>repens</i> L. I. 268	I. 268	— <i>purpureum</i> Link. II. 215	
— <i>viride</i> L. I. 260	I. 260	— <i>sexangulare</i> L. II. —	
<i>Saxifraga</i> L. II. 218	II. 218	— <i>Telephium</i> L. II. 213	
— <i>Hirculus</i> L. II. —		— <i>γ. dilute-purpureum</i> Kauffm. II. 214	
<i>Saxifragaceae</i> Vent. II. 217	II. 217	— <i>α. maximum</i> Rchb. II. —	
<i>Scabiosa</i> L. III. 213	III. 213	— <i>α. —</i> Suter (sp.). II. —	
— <i>arvensis</i> L. III. 211	III. 211	— <i>β. purpureum</i> Kauffm. II. —	
— <i>ochroleuca</i> L. III. 213	III. 213	— <i>γ. —</i> Link (sp.). II. 215	
— <i>Succisa</i> L. III. 212	III. 212	— <i>β. purpureo - maculatum</i> Kauffm. II. 214	
— <i>sylvatica</i> Duby. III. 211	III. 211	— <i>β. vulgaris</i> Link (sp.). II. —	
<i>Scandix Cerefolium</i> L. II. 423	II. 423	— <i>vulgare</i> Link. II. —	
<i>Scheuchzeria</i> L. I. 84	I. 84	<i>Selinum</i> L. II. 411	
— <i>palustris</i> L. I. 84 n	IV. 10	— <i>Carvifolia</i> L. II. —	
<i>Schoenoplectus lacustris</i> Palla. IV. 25	IV. 25	— <i>α. silvaticum</i> Spreng. II. 412	
<i>Schoenus albus</i> L. I. 168	I. 168	— <i>carvifolium</i> L. II. 411	
<i>Scilla</i> L. I. 240	I. 240	— <i>Oreoselinum</i> Scop. II. 415	
— <i>cernua</i> Red. I. 240 n	IV. 40	— <i>palustre</i> L. II. 416	
— <i>sibirica</i> Andrews. IV. —		— <i>pratense</i> Spreng. II. 406 n	408
<i>Scirpus</i> L. I. 171	I. 171	— <i>silvestre</i> L. II. 408	
— <i>acicularis</i> L. I. 170	I. 170	<i>Sempervivum</i> L. II. 216	
— <i>caricinus</i> Schrad. I. 174	I. 174	— <i>Arachnoideum</i> L. II. —	
— <i>Caricis</i> Retz. I. —		— <i>globiferum</i> Mart. II. —	
— <i>compressus</i> Pers. I. —		— <i>hirtum</i> L. II. —	
— <i>lacustris</i> L. I. 172 n	IV. 25	— <i>soboliferum</i> Sims. . II. 216 n	IV. 88
— <i>maritimus</i> L. I. 172 n	IV. —	— <i>tectorum</i> L. II. 216	
— <i>β. genuinus</i> Pospich. IV. 26	IV. 26	<i>Senecio</i> L. III. 279	
— <i>α. typicus</i> Aschers. et Gr. IV. 25	IV. 25	— <i>aquaticus</i> Huds. var. <i>Mosquensis</i> Pinz. III. 284	
— <i>multicaulis</i> Gmel. I. 170	I. 170	— <i>erucifolius</i> L. III. 283	
— <i>ovatus</i> Roth. I. —		— <i>α. latilobus</i> Boiss. III. 284	
— <i>palustris</i> L. I. 169	I. 169	— <i>β. tenuifolius</i> DC. III. —	
— <i>pauciflorus</i> Lightf. I. 171	I. 171	— <i>fluviatilis</i> Wallr. III. 285	
— <i>radicans</i> Schkuhr. . I. 174 n	IV. 25 n	— <i>Jacobaea</i> L. III. 284	
— <i>sylvaticus</i> L. I. 173 n	IV. 25 n	— <i>α. abbreviatus</i> Peterm. IV. 151	
— <i>α. dissitiflorus</i> Sonder. IV. 26	IV. 26	— <i>paludosus</i> L. III. 285	
<i>Scleranthus</i> L. II. 130	II. 130	— <i>α. nudiusculus</i> Ledeb. III. 286	
— <i>annuus</i> L. II. 131	II. 131	— <i>paluster</i> DC. III. 280	
— <i>α. agrestis</i> Rupr. II. —		— <i>palustris</i> (L.) Hook. III. —	
— <i>β. arenarius</i> Rupr. II. —		— <i>sarracenicus</i> L. III. 285	
<i>Scolochloa</i> Link. I. 145	I. 145	— <i>sylvaticus</i> L. III. 282 n	IV. 151
— <i>festuacea</i> Link. 145 n	IV. 22	— <i>humilis</i> Mart. III. 283	
— <i>α. remota</i> IV. —		— <i>nanus</i> Lackowitz. III. —	
<i>Scorzonera</i> L. III. 326	III. 326	— <i>vernalis</i> W. K. III. —	
— <i>hispanica</i> L. III. 327	III. 327	— <i>viscidus</i> L. III. 282	
— <i>humilis</i> L. III. —		— <i>viscosus</i> L. III. —	
— <i>α. angustifolia</i> Fl. dan. III. —		— <i>vulgaris</i> L. III. 281	
— <i>β. latifrons</i> GB. III. —			

<i>Serapias grandiflora</i> Gaud.	I. 263	<i>Smilacina bifolia</i> Desf.	I. 242
— <i>lanceifolia</i> Smith.	I. —	Solanaceae Juss.	III. 116
— <i>latifolia</i> Willd.	I. 264	<i>Solanum</i> L.	III. 118
— <i>longifolia</i> L.	I. 265	— <i>Dulcamara</i> L.	III. 120
— <i>palustris</i> Scop.	I. —	— — <i>α. indivisum</i> Boiss.	III. 121 n IV. 142
<i>Serratula</i> L.	III. 308	— — <i>persicum</i> Willd.	III. 121
— <i>altissima</i> Steph.	III. 309	— <i>Lycopersicum</i> L.	III. 119
— <i>arvensis</i> L.	III. 304	— <i>Melanogena</i> L.	III. —
— <i>coronata</i> L.	III. 309	— <i>nigrum</i> L.	III. 120
— <i>tinctoria</i> L.	III. 308	— — <i>β. chlorocarpum</i> Spenner.	III. —
— — <i>α. integrifolia</i> Wallr.	III. —	— — <i>β. ochroleucum</i> Coss. et Germ.	III. —
<i>Seseli</i> L.	II. 406	— — <i>α. vulgare</i> Coss. et Germ.	III. —
— <i>annuum</i> L.	II. 406 n IV. 136	— — <i>α. vulgaris</i> L.	III. —
— <i>coloratum</i> Ehrh.	II. 406	— <i>tuberosum</i> L.	III. 119
<i>Setaria</i> P.B.	I. 106	— <i>villosum</i> Lam.	III. 120
— <i>glauca</i> P.B.	I. 107	<i>Solidago</i> L.	III. 237
— <i>viridis</i> P.B.	I. —	— <i>canadensis</i> L.	III. 238
<i>Sherardia</i> Dill.	III. 185	— <i>virga aurea</i> L.	III. 237
— <i>arvensis</i> L.	III. —	— — <i>β. foliosa</i> Fiori.	III. 238 n IV. 149
<i>Silene</i> L.	II. 409	— — <i>α. vulgaris</i> Lam.	III. 238
— <i>baccifera</i> Willd.	II. 99	— <i>Virgaurea</i> L.	III. 237
— <i>Cucubalus</i> Wib.	IV. 64	<i>Sonchus</i> L.	III. 332
— — <i>δ. carneiflora</i> Le Gr.	IV. —	— <i>arvensis</i> L.	III. 334
— — <i>β. latifolia</i> Rouy et Fouc.	IV. —	— — <i>β. glaber</i> Schult.	III. 335
— — <i>γ. Tenoreana</i> Colla.	IV. —	— — <i>γ. hastatus</i> Kauffm.	III. —
— — <i>α. typica</i> Beck.	IV. —	— — <i>β. laevipes</i> Koch.	III. —
— <i>dichotoma</i> Ehrh.	II. 103 n IV. 65	— — <i>α. typicus</i> GB.	III. —
— — <i>α. parviflora</i> Choroschkoy.	II. 104	— <i>asper</i> (L.) Hill.	III. 334 n IV. 151
— <i>inflata</i> Sm.	II. 101	— — <i>α. inermis</i> Bisch.	IV. —
— — <i>var. vulgaris</i> Othl.	IV. 64	— — <i>β. pungens</i> Bisch.	IV. —
— <i>noctiflora</i> L.	II. 106	— <i>asper</i> Vill.	III. 334
— <i>nutans</i> L.	II. 101 n IV. 64	— <i>oleraceus</i> L.	III. 333
— — <i>α. typica</i> Beck.	IV. —	— — <i>β. asper</i> L.	III. 334
— <i>Otites</i> (L.) Sm.	II. 103 n IV. 65	— — <i>α. integrifolius</i> Wallr.	III. 333
— <i>procumbens</i> Murr.	II. 100 n IV. 64	— — <i>β. lacerus</i> Coss. et Germ.	III. —
— <i>tatarica</i> (L.) Pers.	II. 102 n IV. 65	— — — Wallr.	III. —
— <i>venosa</i> (Gilib.) Aschers.	II. 101 n IV. 64	— — <i>α. laevis</i> Steph.	III. —
— <i>viscosa</i> Pers.	II. 107	— <i>palustris</i> L.	III. 335
<i>Silybum</i> (Vaill.) Adans.	III. 307	— <i>uliginosus</i> MB.	III. —
— <i>Marianum</i> (L.) Gaertn.	III. —	<i>Sorbaria</i> A. Br.	II. 234
<i>Sinapis</i> L.	II. 196	— <i>sorbifolia</i> A. Br.	II. —
— <i>alba</i> L.	II. 196 n IV. 86	<i>Sorbus</i> L.	II. 278
— <i>arvensis</i> L.	II. 196	— <i>Aucuparia</i> Gaertn.	II. 279
— — <i>β. dasycarpa</i> Neilr.	II. —	— — L.	II. 279 n IV. 108
— — <i>α. leiocarpa</i> Neilr.	II. —	— — <i>α. typica</i> C. K. Schneider.	IV. —
<i>Siphisia macrophylla</i> Aschers.	II. 59	Sparganiaceae Agardh (Engl.).	I. 69
<i>Sisymbrium</i> L.	II. 186	<i>Sparganium</i> L.	I. 69 n IV. 4
— <i>Alliaria</i> (L.) Scop.	II. 190 n IV. 84	— <i>affine</i> Schnitzl.	I. 72 n IV. 7
— <i>amphibium</i> L.	II. 175	— — <i>α. Borderi</i> Weberbauer.	I. 72
— <i>juncum</i> MB.	II. 190	— <i>affine</i> × <i>Friesii</i> Roth.	IV. 8
— <i>Loeselii</i> L.	II. 188 n IV. 84	— <i>erectum</i> L. <i>α.</i>	I. 70
— — <i>α. dense-hirta</i> N. Busch.	IV. —	— <i>Friesii</i> Beurl.	IV. 7
— <i>officinale</i> (L.) Scop.	II. 187	— <i>Friesii</i> × <i>simplex</i> Rothert.	IV. 8
— <i>palustre</i> L.	II. 179	— <i>glomeratum</i> Laest.	IV. 6
— <i>pannonicum</i> Jacq.	II. 187	— <i>minimum</i> Fries.	I. 72 n IV. 8
— <i>silvestre</i> L.	II. 178	— — <i>β. flaccidum</i> Aschers. et Gr.	I. 72, 73
— <i>sinapistrum</i> Crantz.	II. 187	— — <i>γ. ratis</i> Meinsh. (sp.).	I. —
— <i>Sophia</i> L.	II. 189 n IV. 84	— — <i>α. typicum</i> Aschers. et Gr.	I. 72, 73
— — <i>α. glabratum</i> N. Busch.	IV. —	— <i>natans</i> L.	I. 72
— <i>strictissimum</i> L.	II. 189 n IV. —	— <i>neglectum</i> Beeby.	I. 70 n IV. 6
— <i>Thalianum</i> (L.) Gay et Monn.	II. 190	— <i>ramosum</i> Huds.	I. 70 n IV. —
— <i>wolgens</i> MB.	II. 188	— — <i>α. microcarpum</i> Cel.	IV. —
<i>Sium</i> L.	II. 404	— — <i>f. simplicior</i> Rothert.	IV. —
— <i>latifolium</i> L.	II. —	— <i>neglectum</i> Beeby.	IV. —
— — <i>α. angustifolium</i> Rupr.	II. —	— <i>polyedrum</i> Aschers. et Gr.	IV. —
— — <i>β. longifolium</i> Presl.	II. —		

<i>Sparganium simplex</i> Huds. . . I. 70 u	IV. 6	<i>Stellaria glauca</i> With.	IV. 122
— <i>β. angustifolium</i> Beckmann. . .	I. 71	— <i>α. linearis</i> Fenzl.	IV. 122
— <i>fluitans</i> Godr. et Gren.	I. —	— <i>graminea</i> L.	IV. 122
— <i>γ. longissimum</i> Fries.	I. —	— <i>γ. ciliata</i> Fenzl.	IV. 122
— <i>α. typicum</i> Aschers. et Gr. . . .	I. —	— <i>β. lanceolata</i> Fenzl. II. 123 u	IV. 70
<i>Spergula</i> L.	II. 128	— <i>α. linearis</i> Fenzl.	II. 123
— <i>arvensis</i> L.	II. —	— <i>Holostea</i> L.	II. 122 u
— <i>γ. maxima</i> Koch.	II. 129	— <i>α. genuina</i> Rouy et Fouc. . .	IV. —
— — (Weihe) Mert. et Koch. . . .	II. —	— <i>longifolia</i> Mühlb.	II. 124
— — Weihe.	II. —	— <i>media</i> (L.) Cyrill. II. 121 u	IV. 69
— <i>α. sativa</i> Boenng.	II. —	— <i>α. genuina</i> Rouy et Fouc. . .	IV. —
— — Koch.	II. —	— — <i>subf. undulata</i> Breb. . .	IV. —
— — (Boenng.) Mert. et Koch. . .	II. —	— <i>β. maxima</i> (Schur) Gürcke. .	IV. 70
— <i>β. vulgaris</i> Boenng.	II. —	— <i>α. neglecta</i> (Weihe) Mert. et Koch. . .	II. 121 u
— — Koch.	II. —	— <i>media</i> Vill.	II. 121
— — (Boenng.) Mert. et Koch. . .	II. —	— <i>β. major</i> Koch.	II. —
— <i>nodosa</i> L.	II. 116	— <i>var. oligandria</i> Fenzl. . . .	IV. 69
<i>Spergularia</i> Pers.	II. 129	— <i>mosquensis</i> MB.	II. 124 u
— <i>rubra</i> Presl.	II. —	— <i>nemorum</i> L.	II. 120 u
— <i>α. campestris</i> Fenzl.	II. 130	— <i>α. bracteata</i> Ledb.	IV. —
— <i>β. pinguis</i> Fenzl.	II. —	— <i>β. subbracteata</i> Ledb. . . .	IV. —
<i>Spinacia</i> L.	II. 88	— <i>palustris</i> Ehrh.	IV. 70
— <i>inermis</i> Moench.	II. —	— <i>α. communis</i> Fenzl.	IV. —
— <i>oleracea</i> L.	II. —	— <i>δ. Dilleniana</i> Moench (sp.). .	IV. —
— <i>α. inermis</i> Moench (sp.). . . .	II. —	— <i>γ. parviflora</i> Richt.	IV. —
— <i>β. spinosa</i> Moench (sp.). . . .	II. 89	— <i>β. viridis</i> Fries.	IV. —
— <i>spinosa</i> Moench.	II. —	— <i>palustris</i> Retz.	II. 122
<i>Spiraea</i> L.	II. 228	— <i>α. Dilleniana</i> Moench. . . .	II. 123
— <i>chamaedryfolia</i> L.	II. 230	— <i>var. glauca</i> Goldb.	II. 122
— <i>crenata</i> Pall.	II. 229	— <i>uliginosa</i> Murr.	II. 124
— <i>crenifolia</i> C. A. Mey.	II. —	<i>Stenactis annua</i> Nees.	III. 242
— <i>denudata</i> Presl.	II. 242	<i>Stipa</i> L.	I. 109
— <i>Filipendula</i> L.	II. —	— <i>pennata</i> L.	I. —
— <i>hypericifolia</i> L.	II. 229	<i>Stratiotes</i> L.	I. 90
— <i>laevigata</i> L.	II. 231	— <i>Aloides</i> L.	I. 91 u
— <i>media</i> Schmidt.	II. 229	<i>Struthiopteris germanica</i> Willd. .	I. 45
— <i>opulifolia</i> L.	II. 227	<i>Stupa pennata</i> Aschers. et Gr. .	I. 109
— <i>salicifolia</i> L.	II. 230	<i>Sturmia Loeselii</i> Rehb.	I. 269
— <i>sorbifolia</i> L.	II. 231	<i>Succisa</i> Coult.	III. 212
— <i>triloba</i> Pall.	II. 229	— <i>praemorsa</i> (Gilib.) Aschers. .	III. —
— <i>Ulmaria</i> L.	II. 241	— <i>β. albiflora</i> (Wildem. et Durand).	III. —
— <i>α. denudata</i> Koch.	II. 242	— <i>α. glabrata</i> (Schultz). . . .	III. —
— <i>β. discolor</i> Koch.	II. —	— <i>γ. roseiflora</i>	III. —
— <i>ulmifolia</i> Scop.	II. 230	— <i>pratensis</i> Moench.	III. —
<i>Spirodela</i> Schleid.	I. 219	<i>Symphoricarpus</i> Juss.	III. 205
— <i>polyrrhiza</i> Schleid.	I. 219 u	— <i>racemosus</i> Michx.	III. —
<i>Stachys</i> L.	III. 101	<i>Symphytum</i> L.	III. 54
— <i>annua</i> L.	III. 103	— <i>aspermum</i> M.B.	III. 55
— <i>Betonica</i> Benth.	III. 105 u	— — Sims.	III. —
— <i>δ. alba</i> (Mart. sp.). III. 105 u	IV. 141	— <i>asperum</i> Lep.	III. —
— <i>β. legitima</i> Aschers.	III. 105	— <i>β. fol. aureo-marginatis</i> . . .	III. 56
— <i>γ. stricta</i> (Ait.) Aschers. . . .	IV. 141	— <i>α. hispidum</i> Kauffm.	III. —
— <i>α. typica</i> GB.	III. 105	— <i>bohemicum</i> Schm.	III. 55
— <i>palustris</i> L.	III. 103	— <i>officinale</i> L.	III. 54
— <i>α. serratum</i> Kauffm.	III. —	— (album) Mart.	III. 55
— <i>recta</i> L.	III. 104	— <i>β. hispidum</i> Kauffm.	III. 56
— <i>silvatica</i> L.	III. 102	— <i>α. ochroleucum</i> DC.	III. 55
<i>Stellaria</i> L.	II. 120	— <i>β. patens</i> Sibth.	III. —
— <i>Alsine</i> Reichardt.	II. 124	— <i>patens</i> Sibth.	III. —
— <i>aquatica</i> Pollich.	II. —	<i>Syringa</i> L.	III. 30
— <i>arvensis</i> Hoppe.	II. 123	— <i>Josikaea</i> Jacq. fil.	III. 31
— <i>crassifolia</i> Ehrh.	II. 125 u	— <i>vulgaris</i> L.	III. 30
— <i>α. brevifolia</i> Rafin.	IV. —	— <i>α. fl. pleno</i> Hort.	III. 31
— <i>β. paludosa</i> (Laest.) Fries. . .	IV. —		
— <i>Friesiana</i> Ser.	II. 124		

Tanacetum Balsamita L.	III.	266	Thymus vulgaris L.	III.	79 n	80
— crispum Mart.	III.	268	Thysselinum palustre Hoffm.	II.		416
— Pischma Pall.	III.	267	Tilia L.	II.		354
— β. crispum Pall.	III.	268	— cordata Mill.	II.		—
— vulgare L.	III.	267	— cordata × platyphylos	II.		355
— β. crispum DC.	III.	268	— cordifolia Bess.	II.		354
— var. tenuifolia [Maxim.].	III.	—	— europaea L.	II.		—
Taraxacum Juss.	III.	328	— Sm.	II.		355
— officinalis Knaut.	III.	329	— grandifolia Ehrh.	II.		—
— Vill.	III.	—	— hollandica Hort.	II.		—
— Wigg.	III.	—	— intermedia DC.	II.		—
— vulgare (Lam.) Schrank.	III.	—	— microphylla Vent.	II.		354
Telekia speciosa Baumg.	III.	253	— parvifolia Ehrh.	II.		—
Thalictrum L.	II.	143	— platyphylla Scop.	II.		355
— angustifolium Jacq.	II.	146	— platyphyllus Scop.	II.		—
— β. heterophyllum Gaud.	II.	—	— silvestris Desf.	II.		354
— — Koch.	II.	—	— ulmifolia Scop.	II.		—
— — Wimm. et Grab.	II.	—	— vulgaris Hayne.	II.		355
— γ. laserpitifolium Koch.	II.	—	Tiliaceae Juss.	II.		354
— μ. — Willd.	II.	—	Tordylium Anthriscus L.	II.		422
— β. platyphyllum Goldb.	II.	—	Torilis Adans.	II.		421
— α. stenophyllum Jacq.	II.	—	— Anthriscus (L.) Gmel.	II.		422
— — Koch.	II.	—	Tragopogon L.	III.		324
— — Wimm. et Grab.	II.	146 n	— orientalis L.	III.	326 n	IV. 151
— aquilegifolium L.	II.	144	— α. revolutus Bisch.	III.		326
— flavum L.	II.	146 n	— porrifolius L.	III.		324
— α. genuinum Regel. II. 147 n	IV.	—	— pratense L.	III.		325
— β. rufinerve Regel. II. 147 n	IV.	—	— pratensis L.	III.		—
— galioides Nestl.	II.	146	— α. micrantes Wimm.	III.		—
— lucidum L.	II.	—	Trichera arvensis Schrad.	III.		211
— majus Jacq.	II.	144	— β. integrifolia Rupr.	III.		—
— α. genuinum Kauffm.	II.	—	Trichodium caninum Schrad.	I.		418
— majus Murray.	II.	—	Trientalis L.	III.		22
— minus L.	II.	144 n	— europaea L.	III.		—
— γ. appendiculatum Regel.	II.	145	Trifolium L.	II.		293
— var. collina Busch.	IV.	76	— agrarium L.	II.	300 n	IV. 114
— var. collinum Wallr.	IV.	—	— alpestre L.	II.	295 n	IV. 113
— δ. Ledebouriana (C.A.M.)			— f. distachyum (Ser.) Aschers.			IV. —
Busch.	IV.	—	— et Gr.	IV.		—
— var. pratensis Busch.	IV.	—	— α. eu-alpestre Aschers. et Gr.	IV.		—
— α. procerum Regel.	II.	145	— f. monostachyum (Ser.)			IV. —
— β. virens Regel.	II.	—	Aschers. et Gr.	IV.		—
— ruthenicum Fisch.	II.	144	— arvense L.	II.	296 n	IV. —
— simplex L.	II.	145	— α. typicum Beck.	IV.		—
Thesium L.	II.	58	— — 1. agrestis Rouy et Fouc.	IV.		114
— ebracteatum Hayne. II. 58 n	IV.	50	— — 2. Brittingeri Beck.	IV.		—
Thlaspi L.	II.	204	— campestre Schreb.	II.	300 n	IV. 115
— arvense L.	II.	205	— α. genuinum Rouy et Fouc.	IV.		—
— Bursa pastoris L.	II.	207	— carneum Mart.	II.		296
Thuja Tourn.	I.	63	— elegans Savi.	II.		298 n
— occidentalis L.	I.	—	— flexuosum Jacq.	II.		296
Thymelaeaceae Rehb.	II.	377	— hybridum L.	II.	298 n	IV. 114
Thymus L.	III.	77	— β. elegans (Savi) Garcke.			II. 299 n
— Aeinos L.	III.	81	— α. fistulosum (Gilib.) Rouy			IV. —
— Chamaedrys Fries.	III.	79	et Fouc.	IV.		—
— glaber Mill.	III.	79 n	— medium L.	II.	296 n	IV. 113
— Lövyanus Opiz.	III.	78	— β. eriocalycinum Hausskn.	IV.		—
— Marschallianus Willd. III. 79 n	IV.	141	— α. typicum Aschers. et Gr.	IV.		—
— Serpyllum L.	III.	78 n	— sf. pedunculatum Ser.	IV.		—
— β. albiflorus (Choroschkov).	III.	79	— Melilotus officinalis L.	II.		292
— α. angustifolius (Pers.) Wallr.	III.	78	— montanum L.	II.	297 n	IV. 114
— — Pers. f. albiflorus Cho-			— α. glabrescens Beck.	IV.		—
roschkov.	III.	79	— officinalis Sw.	II.		292
— α. Chamaedrys Koch.	III.	—	— pratense L.	II.	294 n	IV. 112
— β. Marschallianus Ledb.	III.	—	— β. sativum Schreb. et Hoppe.	II.		295
— γ. vulgaris Ledb.	III.	80	— — Schreb.	IV.		112

<i>Trifolium pratense</i> β . 1. <i>albiflora</i> Sanio.	IV.	112
— — α . <i>spontaneum</i> Willk.	IV.	—
— — 1. <i>genuinum</i> Rouy et Fouc.	IV.	—
— — 2. <i>rotundifolium</i> Lej. et Court.	IV.	—
— <i>procumbens</i> L.	II.	300
— — α . <i>majus</i> Koch.	II.	—
— <i>repens</i> L.	II.	297 n IV. 114
— — <i>giganteum</i> Lagr.-Foss.	IV.	—
— — <i>roseum</i> Peterm.	IV.	—
— <i>sativum</i> Boenngh.	II.	299
— <i>spadiceum</i> L.	II.	299
— <i>strepens</i> Crantz.	IV.	114
<i>Triglochin</i> L.	I.	85
— <i>maritima</i> L.	I. 85 n IV.	11
— <i>palustris</i> L.	I.	86
<i>Trisetum</i> Pers.	I.	128
— <i>flavescens</i> P.B.	II. 128 n IV.	14
— — β . <i>glabratum</i> Aschers.	IV.	—
— — α . <i>lutescens</i> Aschers.	I. 128 n IV.	—
— — β . <i>variegatum</i> Aschers.	I. 128 n IV.	—
— — α . <i>villosum</i> Fiek.	IV.	—
<i>Triticum</i> L.	I.	158
— <i>aestivum</i> L.	I.	162
— <i>caninum</i> L.	I.	159
— <i>Cereale</i> Schrank.	I.	162
— <i>cristatum</i> Schreb.	I.	161
— <i>elongatum</i> Host.	I.	160
— <i>glaucum</i> L.	I.	—
— <i>hibernum</i> L.	I.	162
— <i>intermedium</i> Host.	I.	160
— — α . <i>campestre</i> Aschers. et Gr.	I.	161
— <i>repens</i> L.	I. 160 n IV.	23
— — <i>caesium</i> C. Bolle.	I.	160
— — <i>collinum</i> (Opiz) Aschers. et Gr.	IV.	23
— — <i>glaucescens</i> A. Engler.	I.	160
— — <i>Leersianum</i> Rehb.	I.	—
— — <i>subulatum</i> Schreb.	I.	—
— — <i>vulgaris</i> Doell.	I.	—
— <i>rigidum</i> Schrad.	I.	—
— <i>vulgare</i> Vill.	I.	162
— — α . <i>aestivum</i> L.	I.	—
— — β . <i>hibernum</i> L.	I.	—
<i>Trollius</i> L.	II.	137
— <i>europaeus</i> L.	II. 137 n IV.	73
<i>Tulipa</i> L.	I.	240
— <i>Biebersteiniana</i> R. et Sch.	I. 240 n IV.	40
— — Schult. fil.	IV.	—
— <i>silvestris</i> L.	I.	240
<i>Turritis</i> L.	II.	180
— <i>glabra</i> L.	II.	181
— <i>hirsuta</i> L.	II.	182
— <i>Loeselii</i> R.Br.	II.	188
<i>Tussilago</i> L.	III.	276
— <i>Farfara</i> L.	III.	—
— <i>farfara</i> L.	III.	—
— <i>hybrida</i> Mart.	III.	277
— <i>paradoxa</i> Retz.	III.	278
— <i>Petasites</i> L.	III.	277
<i>Typha</i> L.	I.	68
— <i>angustifolia</i> L.	I. 68 n IV.	4
— <i>latifolia</i> L.	I.	68
— — <i>f. elatior</i> Graebn.	I.	—
<i>Typhaceae</i> Jaume St. Hillaire.	I.	67

<i>Udora canadensis</i> Nutt.	I.	300
Ulmaceae Mirbel.	II.	—
<i>Ulmus</i> L.	II.	—
— <i>campestris</i> L.	II.	—
— — α . <i>nuda</i> Koch.	II.	—
— <i>ciliata</i> Ehrh.	II.	54
— <i>effusa</i> Willd.	II.	—
— <i>montana</i> With.	II.	53
— <i>pedunculata</i> Foug.	II. 54 n IV.	50
— <i>scabra</i> Mill.	II.	53
Umbelliferae Juss.	II.	391
<i>Urtica</i> L.	II.	56
— <i>cannabina</i> L.	II.	—
— <i>dioica</i> L.	II.	57
— <i>urens</i> L.	II.	56
Urticaceae Juss.	II.	—
<i>Utricularia</i> L.	III.	174
— <i>intermedia</i> Hayne.	III.	176
— — α . <i>Grafiana</i> Koch.	III.	177
— — β . <i>Kochiana</i> Cel.	III.	—
— <i>major</i> Schmidel.	III.	175
— <i>minor</i> L.	III.	177
— — α . <i>platyloba</i> Meister.	III.	178
— <i>neglecta</i> Lehm.	III.	175
— <i>vulgaris</i> L.	III.	—
Utriculariaceae Endl.	III.	174
Vaccaria Medik.	II.	115
— <i>pyramidata</i> Medik.	II.	—
— — α . <i>grandiflora</i> Fisch.	II. 115 n IV.	68
— <i>vulgaris</i> Host.	II.	115
<i>Vaccinium</i> L.	III.	14
— <i>microcarpum</i> (Turcz.) J. D. Hook.	III.	17
— <i>Myrtillus</i> L.	III.	14
— — β . <i>pruinum</i> Aschers. et Magnus.	III. 15 n IV.	137
— — α . <i>turfosum</i> Choroschkov.	III. 15 n IV.	—
— <i>Oxycoccus</i> L.	III.	16
— <i>uliginosum</i> L.	III.	15
— <i>Vitis idaea</i> L.	III.	16
<i>Valeriana</i> L.	III.	208
— <i>officinalis</i> L.	III.	—
— — δ . <i>alternifolia</i> Ledb.	III. 210 n IV.	149
— — α . <i>angustifolia</i> Fries.	III.	209
— — β . — Wahlenb.	III.	—
— — α . <i>intermedia</i> Rupr.	III.	—
— — γ . <i>verticillata</i> Zinger.	III.	—
Valerianaceae DC.	III.	208
Verbasum L.	III.	126
— <i>collinum</i> Schrad.	III. 129 n IV.	142
— <i>Lychnitis</i> L.	III.	129
— <i>nigrum</i> L.	III.	130
— — β . <i>alopecurus</i> Thuill.	III.	131
— — ϵ . <i>bracteatum</i> G. Mey.	III.	—
— — δ . <i>cordatum</i> Kauffm.	III.	—
— — var. <i>cuspidatum</i> Wirtg.	III.	—
— — α . <i>genuinum</i> Koch.	III.	—
— — γ . <i>glabratum</i> Sonder.	III.	—
— — var. <i>lanatum</i> Schrad.	III.	—
— — β . <i>thyrsoideum</i> Koch.	III.	—

<i>Verbascum orientale</i> M.B.	III. 131	<i>Veronica spicata</i> L. <i>γ. latifolia</i> Koch.	III. 153
— <i>phlomoides</i> L.	III. 128 n IV. 142	— — <i>β. rosea</i> Mart.	III. —
— <i>phoeniceum</i> L.	III. 131	— <i>spuria</i> L.	III. 150
— <i>Schraderi</i> Mey.	III. 127	— — <i>β. foliosa</i> W. K.	III. —
— <i>thapsiforme</i> Schrad.	III. 127 n IV. 142	— <i>Teucrium</i> L.	III. 147
— <i>Thapso</i> × <i>nigrum</i> Schiede.	III. 129	— — <i>ssp. pseudochamaedrys</i> (Jacq.)	
— <i>Thapsus</i> L.	III. 127	— — Nym.	III. 148
— — <i>α. silvaticum</i> Schultz.	III. —	— — <i>c. incisa</i> Watzl.	IV. 143
<i>Veratrum</i> L.	I. 230	— — <i>a. major</i> Schrad.	III. 148
— <i>album</i> L.	I. —	— — <i>b. minor</i> Schrad.	III. —
— — <i>α. Lobelianum</i> Koch.	I. 231 n IV. 39	— <i>triphyllus</i> L.	III. 155 n 156
— <i>nigrum</i> L.	I. 231	— <i>verna</i> L.	III. 155
<i>Veronica</i> L.	III. 140	<i>Viburnum</i> L.	III. 202
— <i>agrestis</i> L.	III. 157	— <i>Lantana</i> L.	III. —
— — <i>v. opaca</i> Fries.	III. —	— <i>Opulus</i> L.	III. —
— <i>Anagallis</i> L.	III. 144	<i>Vicia</i> L.	II. 308
— <i>Anagallis-aquatica</i> L.	III. —	— <i>angustifolia</i> All.	II. 314
— — <i>β. anagalliformis</i> Boreau.	III. —	— — <i>β. Bobartii</i> Forst.	II. —
— — <i>α. latifolia</i> Schultz.	III. —	— — <i>α. segetalis</i> Koch.	II. —
— — <i>γ. terrestris</i> Schleich	III. 145	— <i>angustifolia</i> Roth.	II. 314 n IV. 119
— <i>anagalloides</i> Guss.	III. 144	— <i>cassubica</i> L.	II. 311 n IV. 116
— <i>arvensis</i> L.	III. 155 n IV. 143	— — <i>f. pauciflora</i> Domin.	IV. —
— <i>austriaca</i> L.	III. 148	— — <i>f. pubescens</i> Cel.	IV. —
— — <i>γ. bipinnatifida</i> Koch.	III. 149	— — <i>f. subglabra</i> Domin.	IV. —
— — <i>ssp. Jacquini</i> (Baumg.) Maly		— <i>Cracca</i> L.	II. 311 n IV. —
— — <i>var. bipinnatifida</i> Koch.	III. —	— — <i>f. latifolia</i> Neilr.	IV. 116 n 117
— — <i>β. pinnatifida</i> Koch.	III. 148	— — <i>α. leptophylla</i> Fries.	II. 312 n IV. —
— — <i>α. prostrata</i> Kauffm.	III. 147	— — <i>γ. linearis</i> Peterm.	IV. —
— <i>Beccabunga</i> L.	III. 145	— — <i>γ. platyphylla</i> Rupr.	II. 312
— — <i>α. tenerrima</i> Schmidt.	III. —	— — <i>β. pseudocassubica</i> Klett. et	
— <i>chamaedrys</i> L.	III. 146	— — Rich.	II. 312 n IV. 117
— <i>dentata</i> Schmidt.	III. 147	— — <i>α. vulgaris</i> Neilr.	IV. —
— <i>gentianoides</i> Vahl.	III. 150	— <i>Faba</i> L.	II. 315
— <i>hederaefolia</i> L.	III. 156	— <i>pisiformis</i> L.	II. 310
— <i>hybrida</i> L.	III. 153	— <i>sativa</i> L.	II. 313 n IV. 118
— <i>incana</i> L.	III. —	— — <i>f. cordifolia</i> Beck.	IV. 119
— — <i>α. canescens</i> Schrad.	III. 154	— — <i>δ. cordiflora</i> Willk.	IV. 118 n 119
— — <i>γ. fl. albo.</i>	III. —	— — <i>γ. nemoralis</i> Pers.	IV. —
— — <i>β. fl. roseo.</i>	III. —	— — <i>α. obovata</i> Ser.	IV. —
— — <i>latifolia</i> Ait.	III. 147	— — <i>β. torulosa</i> Rouy.	IV. —
— — <i>α. major</i> Schrad.	III. 148	— <i>segetalis</i> Thuill.	II. 314
— — <i>β. minor</i> Schrad.	III. —	— <i>sepium</i> L.	II. 313 n IV. 118
— — <i>latifolia</i> L.	III. 147	— — <i>β. angustifolia</i> Koch.	II. 313 n IV. —
— — <i>α. major</i> Koch.	III. 148	— — <i>β. montana</i> Koch.	IV. —
— — <i>β. minor</i> Koch.	III. —	— — <i>α. vulgaris</i> Gaud.	IV. —
— — <i>longifolia</i> L.	III. 151	— — <i>α.</i> Koch.	II. 313
— — <i>α. glabra</i> Koch.	III. 152	— <i>silvatica</i> L.	II. 310 n IV. 116
— — <i>γ. maritima</i> L.	III. —	— <i>tenuifolia</i> Roth.	II. 312
— — <i>β. pubescens</i> Kauffm.	III. —	— <i>villosa</i> Roth.	IV. 117
— — <i>longifolia</i> Schrad.	III. 151	— — <i>α. culta</i> Aschers. et Gr.	IV. 118
— — <i>maritima</i> Schrad.	III. 152	<i>Vinca</i> L.	III. 40.
— — <i>media</i> Schrad.	III. —	— <i>minor</i> L.	III. —
— — <i>multifida</i> L.	III. 149	<i>Vincetoxicum</i> Moench.	III. 41
— — <i>neglecta</i> Vahl.	III. 154	— <i>laxum</i> Gren. et Godr.	III. 42
— — <i>officinalis</i> L.	III. 146	— — <i>officinale</i> Moench.	III. —
— — <i>opaca</i> Fries.	III. 157	— — <i>α. laxum</i> (Bartl.) Wildm.	
— — <i>orchida</i> Crantz.	III. 152	— — et Durand.	III. —
— — <i>prostrata</i> L.	III. 147 n IV. 142	<i>Viola</i> L.	II. 366
— — <i>scutellata</i> L.	III. 143	— <i>arenaria</i> DC.	II. 375 n IV. 129
— — <i>parvularia</i> Poit. et Turp.	III. 144	— — <i>β. glabrescens</i> Neum.	IV. —
— — <i>α. pilosa</i> Vahl.	III. —	— — <i>var. rupestris</i> (Schmidt)	
— — <i>pubescens</i> Crep.	III. —	— — Neum.	IV. —
— — <i>typica</i>	III. 143	— — <i>α. typica</i> (Neum., Wahlst.	
— — <i>serpyllifolia</i> L.	III. 154	— — Murb.) Kupffer.	IV. —
— — <i>spicata</i> L.	III. 152	— <i>arenaria</i> DC. × <i>canina</i> Rehb. <i>β.</i>	
— — <i>α. hybrida</i> L.	III. 153	— — <i>ericetorum</i> Rehb.	IV. 130
— — — Krock.	III. —		

<i>Viola arenaria</i> DC. \times <i>canina</i> Rchb. δ .	
— <i>montana</i> Rchb.	IV. 130
— <i>arvensis</i> Murr.	II. 377 II. IV. 130
— — <i>var. communis</i> (With.) Neum.	IV. 131
— — <i>var. patens</i> (With.) Neum.	IV. 132
— <i>bicolor</i> Hoffm.	II. 376
— <i>Braunii</i> Borb.	IV. 129
— <i>campestris</i> MB.	II. 369 II. IV. 126
— <i>canina</i> L.	II. 372 II. IV. 127
— — β . <i>ericetorum</i> Rchb.	II. 372
— — γ . <i>lucorum</i> Rchb.	II. 373
— — — <i>major</i> Ann.	II. —
— — γ . <i>montana</i> L.	II. —
— — δ . — Rchb.	II. —
— — α . <i>sabulosa</i> Rchb.	II. 372
— — β . <i>typicum</i> Trautv.	II. 373
— <i>canina</i> (L. p. p.) Rchb.	IV. 127
— — (L.) Rchb. β . <i>ericetorum</i>	
(Schräd. p. sp.) Rchb.	IV. —
— — γ . <i>lucorum</i> Rchb.	IV. —
— — δ . <i>montana</i> (Fr.) Rchb.	IV. —
— — α . <i>sabulosa</i> Rchb.	IV. —
— <i>collina</i> Bess.	II. 370 II. IV. 126
— — α . <i>violacea</i> Wiesb.	IV. —
— <i>collina</i> \times <i>hirta</i>	II. 371
— <i>collina</i> \times <i>hirta</i> Val de Lièvre. .	IV. 127
— <i>elatior</i> Fries.	II. 373
— <i>epipsila</i> Ledeb.	II. 368
— <i>epipsila</i> \times <i>palustris</i>	II. 369 II. IV. 125
— <i>glauca</i> MB.	II. 375
— <i>hirta</i> L.	II. 369 II. IV. 125
— — <i>ssp. brevifimbriata</i> W. Becker.	
IV. 126	
— — <i>f. brevifoliata</i> W. Becker. .	IV. —
— — <i>var. dumetorum</i> Hausskn. .	II. 370
— — γ . <i>fraterna</i> Rchb. II. 370 II.	IV. 126
— — — <i>lactiflora</i> Rchb.	II. 370
— — β . <i>glabrifolia</i> W. Becker. .	IV. 126
— — <i>var. hirtifolia</i> W. Becker .	IV. —
— — <i>ssp. longifimbriata</i> W. Becker.	
IV. —	
— — <i>f. longifoliata</i> W. Becker. IV.	—
— — <i>subv. planecordata</i> W. Becker.	
IV. —	
— — <i>var. pratensis</i> Hausskn. .	II. 370
— — <i>subv. profundecordata</i> W. Becker.	
IV. 126	

<i>Viola hirta</i> var. <i>pubescentifolia</i>	
W. Becker.	IV. 126
— — <i>subv. subtruncata</i> W. Becker.	IV. —
— — α . <i>vulgaris</i> Rchb. II. 370 II.	IV. —
— — <i>Kitaebeliana</i> R. et Sch.	IV. 130
— — <i>lancifolia</i> MB.	II. 373
— — <i>mirabilis</i> L.	II. 374
— — <i>montana</i> L. β . <i>persicifolia</i> Willd.	II. 373
— — <i>odorata</i> L.	II. 371
— — <i>palustris</i> L.	II. 367, 368 II. IV. 125
— — <i>parvula</i> Opiz.	II. 370
— — <i>pratensis</i> M. et K.	II. 374 II. IV. 128
— — <i>pumila</i> Chaix.	II. 374 II. IV. —
— — <i>Riviniana</i> Rchb.	II. 375 II. IV. 129
— — <i>Ruprechtiana</i> Borb.	II. 369
— — <i>silvestris</i> Lam.	II. 375
— — <i>stagnina</i> Kit.	II. 374 II. IV. 129
— — <i>stricta</i> Hornm.	II. 373
— — <i>tricolor</i> L.	II. 376 II. IV. 130, 131
— — β . <i>arvensis</i> Murr.	II. 377
— — <i>ssp. genuina</i> Witttr.	IV. 131
— — α . <i>vulgaris</i> Koch.	II. 376
— — <i>uliginosa</i> Bess.	II. 369
— — — Schräd.	II. —
<i>Violaceae</i> DC.	II. 366
<i>Viscaria</i> Roehl.	II. 104
— — <i>vulgaris</i> Roehl.	II. —
— — α . <i>albiflora</i> (Sweet.) Rouy	
et Fouc.	II. —
<i>Vitaceae</i> Juss.	II. 353
<i>Vitis quinquefolia</i> Moench. . . .	II. 354

<i>Xanthium</i> L.	III. 254
— <i>spinosum</i> L.	III. 255
— <i>Strumarium</i> L.	III. 254

<i>Zannichellia</i> L.	I. 82
— <i>palustris</i> L.	I. 83
— — β . <i>major</i> Boenng.	I. —
— — α . <i>repens</i> Boenng.	I. —
<i>Zea</i> L.	I. 103
— <i>Mays</i> L.	I. 104

Замѣченныя опечатки.

ВЪ I-й ЧАСТИ.

Страница.	Строка.	Напечатано.	Слѣдуетъ.
5.	12 сверху.	лѣстничные.	лѣстничные.
11.	14 снизу.	Umbelliferae.	Umbelliferae.
19.	6 сверху.	простаго.	простаго.
19.	9 сверху.	двойного.	двойного.
20.	2 снизу.	ланцетные.	ланцетные.
22.	2 сверху.	Nymphaeaceae.	Nymphaeaceae.
22.	5 снизу.	3-лопастной.	3-лопастный.
24.	4 снизу.	Alchemilla.	Alchimilla.
29.	12 снизу.	Alchemilla.	Alchimilla.
48.	3 сверху.	Шеламово.	Шеламово, Руз. у.
54.	3 сверху.	24. variegatum.	23. E. variegatum.
58.	12 снизу.	выщербленно—	выщербленно—
64.	7 снизу.	дерево.	дерево.
71.	15 сверху.	Gord.	Godr.
73.	3 сверху.	и д. Воронцовой	и д. Воронцовой, Руз. у.
80.	13 снизу.	Лужки, Срп. у.	Лужники.
80.	4 снизу.	выщербленнымъ.	выщербленнымъ.
81.	13 снизу.	б. ч. 3 съ жилками.	б. ч. съ 3 жилками.
108.	1 сверху.	Клм. у., Карапчево.	Клм. у. (К.).—Карапчево.
112.	16 снизу.	Серпуховъ (П.).	Серпуховъ (К.).
112.	17 снизу.	Бѣлы Колодези, Клм. у.	Бѣлые Колодези, Клм. у. (П.).
117.	7 сверху.	ланцетные.	ланцетныя.
118.	10 снизу.	Aschr. de Gr.	Ascher. et Gr.
129.	16 сверху.	дерновники.	дерновники.
135.	22 сверху.	nemorosa.	nemoralis.
135.	17 снизу.	Ohaixii	Chaixii.
144.	8 снизу.	Лужки, Срп. у.	Лужники.
182.	18 снизу.	самого.	самаго.
189.	5 сверху.	длины.	длины.
197.	14 снизу.	Schkuhr.	Schkuhr.
198.	11 сверху.	съ.	съ.
219.	11 сверху.	Schlei.	Schleid.
237.	1 сверху.	однихъ.	однѣхъ.
239.	7 сверху.	—пушистыя.	—пушистыя.
240.	подъ рисунокъ.	Bebersteiniana.	Biebersteiniana.
240.	18 сверху.	silvestris.	silvestris.
248.	7 снизу.	(gymnostenium).	(gynostenium).
259.	11 снизу.	254.	255 и дайте всѣ №№.
267.	3 снизу.	надрѣзанныя.	надрѣзанныя.

ВО II-й ЧАСТИ.

Стран.	Строка.	Напечатано.	Слѣдуетъ.
2.	3 снизу.	Alchemilla.	Alchimilla.
33.	11 снизу.	S. Gmelinii.	S. Gmelini.
34.	подъ рисунок.	Salix Gmelinii.	Salix Gmelini.
34.	18 снизу.	Ulmus ciliata.	Ulmus ciliata Ehrh.
84.	18 сверху.	Лужняки.	Лужники.
87.	1 сверху.	прерывчатыхъ.	прерывчатыхъ.
94.	3 снизу.	Amaranthus.	Amarantus.
114.	6 снизу.	Лужняки.	Лужники.
120.	13 сверху.	овально-	овально-
120.	15 сверху.	5.	6.
120.	17 сверху.	6.	5.
130.	7 сверху.	α.	β.
131.	1 снизу.	отвѣтани.	отцвѣтани.
151.	11 сверху.	431.	421.
153.	14 сверху.	Макс. Пуш.	Макс. Пут.
154.	21 снизу.	arise.	oblongo.
168.	5 снизу.	листьями.	листьями.
174.	5 сверху.	ярко-желтый	ярко-желтый. 2.
189.	15 сверху.	стручковъ.	стручковъ.
200.	18 снизу.	стелящийся.	стелящийся.
210.	5 сверху.	поздноразвитый.	поздноразвитый.
211.	1 сверху.	»	»
214.	10 сверху.	у самого.	у самого.
222.	12 снизу.	spinosa.	spinosum.
228.	8 снизу.	crenifolia.	crenifolia.
236.	15 снизу.	α.	β.
236.	18 снизу.	β.	α.
239.	5 снизу.	Митиши.	Митиши.
240.	3 сверху.	цвѣтожѣ.	цвѣтоложѣ.
241.	1 сверху.	отвѣтани.	отцвѣтани.
252.	13 сверху.	10. Нижняя сторона	10. Верхняя сторона.
256.	19 снизу.	3-лопастной	3-лопастный.
263.	3 снизу.	Корновище.	Корневище.
264.	подъ рисунок.	ruben.	rubens.
274.	3 сверху.	—лопастные.	—лопастные.
285.	3 сверху.	Aschers. et Graeg.	Aschers. et Graeb.
293.	1 сверху.	до 5 мм.	до 6 мм.
293.	6 снизу.	Лужняки.	Лужники.
304.	15 снизу.	парноперистые.	непарноперистые.
314.	1 снизу.	чашечку.	чашечки.
322.	1 сверху.	multiflorus.	multiflorus.
322.	14 сверху.	маленькіе.	маленькихъ.
347.	9 сверху.	tatarica.	tataricum.
351.	2 сверху.	струковидная.	стручковидная.
361.	12 снизу.	черныхъ.	черныхъ.
366.	17 сверху.	связзникъ.	связзникъ.
366.	10 снизу.	uliginosa Schräd.	uliginosa Bess.
377.	9 снизу.	лопасти вѣнчика.	лопасти околоцвѣтника.
378.	6 снизу.	4-лопастной.	4-лопастный.
383.	3 сверху.	неизбѣгающіе.	неизбѣгающіе.
397.	2 снизу.	головку.	головки.

Стран.	Строка.	Напечатано.	Слѣдуетъ.
404.	18 снизу.	такіе же.	такія же.
430.	14 сверху.	aurea-marginata	aureo-marginata.
434.	19 свер. 1 столб.	119.	109.


ВЪ III-й ЧАСТИ.

28.	7 снизу.	однихъ.	однѣхъ.
39.	5 сверху.	umbellatum.	C. umbellatum.
44.	10 сверху.	Röm. et Schultz.	Röm. et Schult.
51.	18 снизу.	шоссѣ.	шоссе.
56.	15 сверху.	Суканово.	Суханово.
66.	6 снизу.	племовидный.	племовидная.
78.	5 снизу.	цвѣточными.	цвѣточными.
91.	9 сверху.	Хорошева.	Хорошова.
117.	8 снизу.	barbatum.	barbarum.
131.	20 сверху.	orientale.	orientale.
133.	1 снизу.	Дубенка.	Дубна.
135.	19 снизу.	шереховатыя.	шереховатыя.
147.	14 сверху.	б. г.	б. ч.
148.	15 снизу.	latifolis.	latifolia.
149.	9 снизу.	Boemica.	Bohemica.
166.	20 снизу.	vilosus.	villosus.
185.	6 снизу.	Петупскимъ.	Нитупскимъ.
186.	3 снизу.	Galum.	Galium.
199.	3 снизу.	rubicides.	rubrioides.
204.	8 сверху.	розоватыя.	розоватыя.
207.	11 сверху.	форма.	формы.
213.	5 снизу.	Cucurbitaceae.	Сем. Cucurbitaceae.
223.	7 снизу.	слѣдующія.	слѣдующія.
228.	14 сверху.	vulgata.	vulgata.
237.	17 и 18 сверху.	Влизъ.	Влизъ.
239.	2 сверху.	Гирѣво.	Горенки.
239.	2, 4 и 5 снизу.	близъ.	близъ.
271.	12 сверху.	Chrysanthemum.	Chrysanthemum.
309.	5 сверху.	Семьковымъ.	Сальковымъ.
310.	9 снизу.	ланцетные.	ланцетные.
343.	20 сверху.	spatophyllum.	spathophyllum.
377.	23 снизу.	1905.	1904.

ВЪ IV-й ЧАСТИ.

2.	18 снизу.	monsr.	monstr.
3.	6 сверху.	Onoclea.	Onoclea.
25.	2 снизу.	mari imus	maritimus.
29.	3 снизу.	Klarke.	Clarke.
»	13 снизу.	C. B. Clarke.	C. B. Clarke.
30.	5 сверху.	C. B. Clarke.	C. B. Clarke.
33.	1 сверху.	Carex umbosa Host.	Carex umbrosa Host.
47.	8 снизу.	Platanthera.	Platanthera.
50.	14 снизу.	Salix Gmelinii Pall.	Salix Gmelini Pall.
100.	17 снизу.	Potentilla Wibelina	Potentilla Wibeliana.

Цена на простой бумаге 2 р., на велевой 3 р.



New York Botanical Garden Library



3 5185 00270 4482

